19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 380 000**

51 Int. Cl.:
C12N 15/77 (2006.01)
C07K 14/34 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

- 96 Número de solicitud europea: **07123772 .1**
96 Fecha de presentación: **21.12.2005**
97 Número de publicación de la solicitud: **1908841**
97 Fecha de publicación de la solicitud: **09.04.2008**

54 Título: **Promotores múltiples y su uso para la expresión de genes**

30 Prioridad:
22.12.2004 DE 102004061846

45 Fecha de publicación de la mención BOPI:
07.05.2012

45 Fecha de la publicación del folleto de la patente:
07.05.2012

73 Titular/es:
BASF SE
67056 Ludwigshafen , DE

72 Inventor/es:
Haefner, Stefan;
Schröder, Hartwig;
Zelder, Oskar;
Klopprogge, Corinna y
Herold, Andrea

74 Agente/Representante:
Carvajal y Urquijo, Isabel

ES 2 380 000 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Promotores múltiples y su uso para la expresión de genes

La presente invención se refiere a una bacteria corineforme genéticamente modificada, transformada con al menos un vector que contiene al menos un casete de expresión, en cuyo caso el casete de expresión en dirección 5' - 3' comprende un módulo de secuencia de la siguiente fórmula general II:

donde

n representa un valor de número entero de 0 a 10,

A_x y A_y son iguales o diferentes y representan un enlace químico o una secuencia de ácido nucleico – enlazadora;

10 P₁, P_x y P_y representan secuencias promotoras iguales o diferentes derivadas de bacterias corineformes iguales o diferentes que comprenden al menos un segmento que enlaza polimerasa-ARN; y al menos P_y comprende un segmento de secuencia 3' –terminal, que interviene en el enlace de ribosoma,

G representa al menos una secuencia de ácido nucleico codificante que está conectada funcionalmente con la secuencia regulatoria situada 5' - corriente arriba;

15 así como a procesos para la preparación de productos biosintéticos mediante el cultivo de la bacteria corineforme genéticamente modificada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

20 Diferentes productos biosintéticos se preparan mediante procesos metabólicos naturales en las células y se usan en muchas ramas de la industria, incluida la industria de productos alimenticios, de forrajes y piensos, de cosméticos, de comida para animales y alimento para humanos. Estas sustancias, que se denominan en conjunto como productos de la química fina / proteínas, comprenden, entre otros, ácidos orgánicos tanto aminoácidos proteinogénicos como también

25 no proteinogénicos, nucleótidos y nucleósidos, lípidos y ácidos grasos, dioles, carbohidratos, compuestos aromáticos, vitaminas y cofactores, así como proteínas y enzimas. Su producción se efectúa a gran escala de la manera más conveniente por medio del cultivo de cepas de bacterias o de otros microorganismos que se desarrollaron para producir y secretar grandes cantidades de la sustancia deseada. Para este propósito organismos particularmente adecuados son bacterias corineformes, bacterias gram positivas no patógenas.

30 Es conocido que pueden producirse aminoácidos mediante fermentación de cepas de bacterias corineformes, principalmente *Corynebacterium glutamicum*. Debido a la gran importancia se trabaja permanentemente en el mejoramiento de los métodos de producción. Los mejoramientos del método pueden referirse a medidas industriales de fermentación, como por ejemplo agitación y suministro de oxígeno, o la composición de los medios de nutrición como, por ejemplo, la concentración de azúcar durante la fermentación, o el procesamiento para elaborar un producto, por ejemplo mediante cromatografía de intercambio iónico aunque también secamiento por pulverización, o las propiedades de desempeño intrínsecas del microorganismo mismo.

35 Desde hace unos años se emplean igualmente métodos de la tecnología de ADN recombinante para el mejoramiento de cepas de *Corynebacterium* que producen productos de química fina/proteínas, amplificando genes individuales e investigando el efecto en la producción de productos de química fina / proteínas.

40 Otras formas para desarrollar un método para la producción de productos de química fina o proteínas o para elevar o mejorar la productividad de un método ya existente para la producción de productos de química fina o proteínas comprenden el incremento o la modificación de la expresión de uno o varios genes y/o la influencia de la traducción de un ARNm mediante secuencias adecuadas de polinucleótidos. La influencia puede comprender en este contexto el incremento, la reducción o también otros parámetros de la expresión de los genes, como patrón temporal de expresión.

45 El experto en la materia conoce diferentes componentes de secuencias de regulación bacterianas. Se distinguen los puntos de enlace de reguladores, llamados también operadores, los puntos de enlace de ARN-polimerasa-holoenzimas, también llamadas regiones 35 y 10, y el sitio de enlace de ARN 16S ribosómico, también llamado sitio de enlace ribosómico (RBS) o llamado también secuencia Shine-Dalgarno.

En la bibliografía (E. coli y S. typhimurium, Neidhardt F.C. 1995 ASM Press) se describe que tanto la composición de la secuencia de polinucleótido de la secuencia Shine-Dalgarno, la sucesión de secuencia de las bases, pero también la distancia de una secuencia de polinucleótido que está contenida en la secuencia Shine-Dalgarno hasta el codón de inicio, tienen una influencia esencial en la velocidad de la traducción.

5 Las secuencias de ácido nucleico con actividad de promotor pueden influir de manera diferente la formación de ARNm. Los promotores cuyas actividades son independientes de la fase fisiológica de crecimiento del organismo se llaman constitutivos. Otros promotores a su vez reaccionan a estímulos externos químicos y físicos, como oxígeno, metabolitos, calor, pH, etc. A su vez, otros muestran en diferentes fases de crecimiento una fuerte dependencia de su actividad. Por ejemplo, en la bibliografía se describen promotores que muestran una actividad particularmente
10 pronunciada durante la fase de crecimiento exponencial de los microorganismos, aunque también en la fase estacionaria del crecimiento microbiano. Ambas características de los promotores pueden tener una influencia favorable en la productividad para una producción de productos de química fina y proteínas, según la ruta metabólica.

15 En especies de Corynebacterium podían aislarse ya aquellas secuencias que pueden utilizarse para un incremento o un debilitamiento de la expresión génica. Estos promotores regulados pueden incrementar o reducir la velocidad con la que un gen se transcribe, independientemente de las condiciones internas y/o externas de la célula. La presencia de un factor determinado, conocido como inductor, puede estimular en parte la velocidad de la transcripción del promotor. Los inductores puede influenciar directa, pero también indirectamente, la transcripción del promotor. Otra clase de factores conocidos como supresores está en capacidad de reducir, pero también de inhibir, la transcripción,
20 del promotor. Tal como los inductores también, los supresores también pueden actuar directa o indirectamente. Sin embargo, también se conocen promotores que se regulan mediante la temperatura. De esta manera el nivel de transcripción de tales promotores puede elevarse o atenuarse elevando la temperatura de crecimiento por encima de la temperatura normal de crecimiento de la célula.

25 Hasta el día de hoy se ha descrito una cantidad baja de promotores de C. Glutamicum. El promotor del gen de malato-sintasa de C. Glutamicum se describió en DE-A- 44 40 118. Este promotor se inserta corriente arriba de un gen estructural que codifica una proteína. Después de la transformación de una estructura así en una bacteria corineforme, se regula la expresión del gen estructural insertado corriente abajo del promotor. La expresión del gen estructural se induce tan pronto se adiciona al medio un inductor correspondiente.

30 Reinscheid et al., Microbiology 145:503 (1999) han descrito una fusión de transcripción entre el promotor pta-ack de C. glutamicum y un gen reportero (cloramfenicol acetiltransferasa). Las células de C. Glutamicum que contienen una fusión de transcripción así, tienen una expresión elevada del gen reportero al crecer en medio que contiene acetato. Al compararse con éstas, las células transformadas que crecían en glucosa no mostraron expresión incrementada de este gen reportero.

35 En Patek et al., Microbiology 142:1297 (1996) se describieron algunas secuencias de ADN a partir de C. glutamicum, las cuales pueden reforzar la expresión de un gen reportero en células de C. glutamicum. Estas secuencias se compararon entre sí para definir secuencias de consenso para promotores de C. Glutamicum.

40 Otras secuencias de ADN de C. glutamicum, las cuales pueden utilizarse para la regulación de la expresión génica se habían descrito en la WO 02/40679. Estos polinucleótidos aislados representan unidades de expresión de corynebacterium glutamicum, las cuales pueden utilizarse o bien para el incremento o, no obstante, para la reducción de una expresión de gen. Además, en este documento se describen plásmidos recombinantes en los que se asocian las unidades de expresión de corynebacterium glutamicum con genes heterólogos. Los métodos aquí descritos, la fusión de un promotor de corynebacterium glutamicum con un gen heterólogo, pueden emplearse, entre otras, para la regulación de los genes de la biosíntesis de aminoácidos.

45 De las solicitudes de patente más antiguas, no publicadas previamente, DE-A-103 59 594, DE-A-103 59 595, DE-A-103 59 660 y DE-A-10 2004 035 065 se conocen promotores individuales especiales de C. glutamicum.

Descripción breve de la invención

El objetivo fundamental de la invención era suministrar más bacterias corineformes genéticamente modificadas que se transforman con un vector que contiene un casete de expresión. Estas bacterias corineformes genéticamente modificadas tienen propiedades ventajosas con respecto a la expresión de determinados genes. El objetivo se logró
50 de acuerdo con la invención proporcionando una bacteria corineforme genéticamente modificada, transformada con al menos un vector que contienen al menos un casete de expresión, en cuyo caso el casete de expresión comprende un módulo de secuencia en dirección 5' - 3' de la siguiente fórmula general:

donde

n representa un valor de número entero de 0 a 10,

A_x y A_y son iguales o diferentes y representan un enlace químico o una secuencia de enlazante-ácido nucleico;

5 P_1 , P_x y P_y codifican secuencias de promotor iguales o diferentes derivadas de bacterias corineformes iguales o diferentes, que comprenden al menos un segmento que enlaza ARN-polimerasa; y al menos P_y comprende un segmento de secuencia 3'-terminal, que interviene en el enlace de ribosoma,

G representa al menos una secuencia de ácido nucleico codificante, la cual está unida funcionalmente con la secuencia regulatoria situada 5' – corriente arriba.

Según una forma de realización, P_1 , P_x y P_y se derivan de bacterias corineformes iguales o diferentes.

10 Según una forma de realización preferida, P_1 , P_x y P_y se derivan respectivamente de una secuencia continua de 35 a 500 residuos de nucleótido, preferible 35 a 300 residuos de nucleótido, aún más preferible 35 a 210 residuos de nucleótido y muy particularmente preferible 35 a 100 residuos de nucleótidos, la cual se encuentra en el genoma del organismo 5'-corriente arriba de la secuencia codificante para una proteína, por ejemplo para una proteína que interviene en una vía de biosíntesis del organismo.

15 Según una forma preferida de realización, P_1 , P_x y P_y de la unidad de expresión se seleccionan independientemente entre sí entre secuencias de promotor para la secuencia codificante de una proteína con alta abundancia en una bacteria corineforme, como por ejemplo en una del género corynebacterium o brevibacterium, como por ejemplo de una especie o de una cepa según la lista en la tabla 3.

20 Adicionalmente, entre las secuencias del promotor pueden seleccionarse secuencias de promotor, individuales o todas ellas, para la secuencia codificante de una proteína listada en la tabla 1 y que participa en la biosíntesis de aminoácido de un microorganismo. Pero al menos uno de los promotores del casete de expresión debe tener en tal caso una alta abundancia, tal como aquí se define.

25 Según otra forma preferida de realización, P_1 , P_x y P_y del casete de expresión se seleccionan independientemente entre sí entre las secuencias de nucleótidos representadas en la figura 1, o como más tarde aún se explicará, se derivan de SEQ ID NO:1 (pGRO), SEQ ID NO:2 (pEFTs), SEQ ID NO:3 (pEFTu) y SEQ ID NO: 4 (pSOD).

Según otra forma de realización, P_1 , P_x y P_y del casete de expresión se seleccionan independientemente entre sí entre los promotores fuertes constitutivos o regulables.

La bacteria de la invención contiene un casete de expresión que comprende un módulo de secuencia en dirección 5'-3' de la siguiente fórmula general II:

30 $5'-P_1-(A_x-P_x)_n-A_y-P_y-G-3'$ (II)

donde

n, A_x , A_y , P_1 , P_x y P_y son tal como se definieron arriba y G representa al menos una secuencia de ácido nucleico codificante, la cual está unida funcional u operativamente con la secuencia regulatoria situada 5'-corriente arriba.

Según una forma preferida de realización del casete de expresión G se selecciona entre

35 a) ácidos nucleicos que codifican una proteína de la vía de biosíntesis de aminoácidos proteinogénicos y no proteinogénicos,

b) ácidos nucleicos que codifican una proteína de la vía de biosíntesis de nucleótidos y nucleósidos,

c) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de ácidos orgánicos,

d) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de lípidos y ácidos grasos,

40 e) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de dioles,

f) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de carbohidratos,

- g) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de compuestos aromáticos,
- h) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de vitaminas,
- i) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de cofactores,
- j) ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de enzimas, y
- 5 k) ácidos nucleicos que codifican una proteína del metabolismo central.

Según una forma particularmente preferida de realización del casete de expresión G se selecciona entre ácidos nucleicos que codifican proteínas a partir de la vía de biosíntesis de aminoácidos, seleccionados entre cinasa de aspartato, deshidrogenasa de semialdehído de aspartato, deshidrogenasa de diaminopimelato, descarboxilasa de diaminopimelato, sintetasa de dihidrodipicolinato, reductasa de dihidrodipicolinato, deshidrogenasa de gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa, cinasa de 3-fosfoglicerato, carboxilasa de piruvato, isomerasa de triosafofato, regulador transcripcional LuxR, regulador transcripcional LysR1, regulador transcripcional LysR2, oxidoreductasa de malato-quinona, deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato, deshidrogenasa de 6-fosfogluconato, transcetolasa, transaldolasa, O-acetiltransferasa de homoserina, gamma-sintasa de cistationina, beta-liasa de cistationina, hidroximetiltransferasa de serina, sulfhidrilasa de O-acetilhomoserina, reductasa de metil-tetrahidrofolato, aminotransferasa de fosfoserina, fosfatasa de fosfoserina, transferasa de serina-acetilo, deshidrogenasa de homoserina, cinasa de homoserina, sintasa de treonina, treonina-exportador-portador, deshidratasa de treonina, oxidasa de piruvato, exportador de lisina, ligasa de biotina, sintasal de cisteína, sintasa II de cisteína, sintasa de metionina dependiente de la coenzima B12, subunidades 1 y 2 de sulfatadeniltransferasa, reductasa de fosfosulfato fosfoadenosina, reductasa de ferredoxina-sulfito, reductasa ferredoxina NADP, deshidrogenasa de 3-fosfoglicerato, regulador RXA00655, regulador RXN2910, sintetasa de ARNt arginilo, carboxilasa de fosfoenolpiruvato, proteína de treonina Efflux, serinhidroximetiltransferasa, fructosa-1,6-bisfosfatasa, proteína de la reducción de sulfato RXA077, proteína de la reducción de sulfato RXA248, proteína de la reducción de sulfato RXA247, proteína OpcA, 1-fosfofructocinasa y 6-fosfofructocinasa, succinilasa de tetrahidropicolinato, aminotransferasa de succinil-aminocetopimelato, desuccinilasa de succinil-diaminopimelato, epimerasa de diaminopimelato, dehidrogenasa de 6-fosfogluconato, isomerasa de glucosafosfato, mutasa de fosfoglicerato, enolasa, cinasa de piruvato, transaminasa de aspartato, enzima de malato.

La bacteria de la invención se transforma con un vector que comprende al menos uno de los casetes de expresión previamente mencionados.

La presente invención se refiere a una bacteria corineforme genéticamente modificada que se transforma con al menos uno de los vectores mencionados previamente, o contiene al menos uno de los casetes de expresión previamente mencionados, preferiblemente en forma integrada.

Según otro aspecto, la presente invención se refiere a un método para la preparación de un producto biosintético, en cuyo caso se cultiva una de las bacterias corineformes genéticamente modificadas, previamente mencionadas y el producto deseado se aísla del cultivo.

Según una forma de realización del método el producto biosintético se selecciona entre ácidos orgánicos, proteínas, nucleótidos y nucleósidos, aminoácidos tanto proteinogénicos como también no proteinogénicos, lípidos y ácidos grasos, dioles, carbohidratos, compuestos aromáticos, vitaminas y cofactores, enzimas y proteínas. Productos de biosíntesis muy particularmente preferidos son lisina, metionina, treonina y trehalosa.

Descripción de las figuras

La figura 1 muestra secuencias específicas para cuatro promotores que se usan para la preparación de los promotores múltiples descritos en los ejemplos de realización. Se representan las secuencias de promotor para pEFTu (Figura 1A); para el promotor pGRO (Figura 1 B), para el promotor pEFTs (Figura 1 C) y para el promotor pSOD (figura 1D). Para cada promotor se indican dos secuencias, la más larga (secuencia superior) indica respectivamente la secuencia completa de promotor que incluye el sitio de enlace ribosómico (RBS), impreso en letra negrilla y cursiva. En el caso de una disposición 3'-terminal del promotor respectivo en el constructo de promotor múltiple se usa en cada caso respectivamente la secuencia de nucleótido más larga (incluido RBS). Las secuencias de promotor, 5'-corriente arriba hacia la unidad del promotor 3'-terminal no comprenden RBS y se usaron en la secuencia de ácido nucleico abreviada, indicada en la segunda posición respectivamente (sin RBS). Secuencias parciales 3'-terminales, indicadas en letras mayúsculas y negrillas, de las secuencias más cortas de promotor opcionalmente pueden faltar. "Regiones-10" potenciales se representan subrayadas.

Descripción detallada de la invención

I. Definiciones generales:

Por un "producto biosintético" en el sentido de la invención se entienden aquellos que se producen mediante procesos metabólicos naturales (vías de biosíntesis) en células. Se usan de múltiples maneras, principalmente en la industria de productos alimenticios, de forrajes y piensos, de cosméticos, de comida para animales y alimentos para humanos, y en la industria farmacéutica. Estas sustancias, que se denominan en conjunto productos de química fina / proteínas, comprenden entre otros ácidos orgánicos, aminoácidos tanto proteinogénicos como también no proteinogénicos, nucleótidos y nucleósidos, lípidos y ácidos grasos, dioles, carbohidratos, compuestos aromáticos, vitaminas y cofactores, así como proteínas y enzimas.

Por un "promotor", un "ácido nucleico con actividad de promotor" o una "secuencia de promotor" se entiende un ácido nucleico que regula la transcripción de este ácido nucleico al estar enlazado con un ácido nucleico a transcribir.

En tanto no se haga referencia expresa a "promotores individuales", el término "promotor" también abarca, según el contexto, la disposición secuencial de más de una secuencia de ácido nucleico (es decir "promotores múltiples"), cada uno de los cuales individualmente sería capaz de regular la transcripción de un ácido nucleico a transcribirse, al enlazarse funcionalmente con éste.

El término "promotor individual" se refiere de manera correspondiente a una única secuencia de ácido nucleico que es capaz de regular la transcripción de un ácido nucleico a transcribirse y que al enlazarse funcionalmente con una secuencia de ácido nucleico a transcribirse puede transcribirla.

En el caso de "promotores múltiples", al menos dos secuencias de ácido nucleico, iguales o diferentes, de las cuales cada una individualmente al enlazarse funcionalmente con un ácido nucleico a transcribir sería capaz de regular su transcripción (promotores individuales), se enlazan secuencialmente de tal manera que un inicio de transcripción de, opcionalmente, una de las secuencias de ácido nucleico podría producir un transcripto que contiene el ácido nucleico a transcribir. Entre dos promotores individuales respectivamente pueden insertarse más secuencias son función de promotor, por ejemplo un linker (enlazador) que tiene, por ejemplo, uno o más sitios de corte de restricción. Opcionalmente, dos promotores individuales pueden enlazarse entre sí respectivamente de manera directa. Preferiblemente los promotores múltiples contienen solamente un sitio de enlace ribosómico (RBS), principalmente en la región del extremo 3'-terminal del promotor.

Por secuencia de promotores para la secuencia codificante de una proteína con "alta abundancia" se entienden principalmente "promotores fuertes". Si se desea emplear promotores múltiples para reforzar genes, se combinan preferiblemente aquellos promotores fuertes de manera adecuada. Los promotores fuertes regulan la transcripción de genes de tal forma que la frecuencia de lectura por la polimerasa de ARN es mayor que en el caso de la mayoría de los genes del organismo. En la mayoría de los casos la presencia de un promotor fuerte resulta en que también se presenta una gran cantidad de transcripto en la célula. Si el transcripto adopta una participación porcentual mayor en relación con otros transcriptos celulares, se habla de un "transcripto abundante". En bacterias, la cantidad de transcripto y de la proteína codificada correspondiente del mismo se correlacionan por lo regular; es decir, "transcriptos abundantes" conducen casi siempre a "proteínas abundantes". A continuación se describe, por ejemplo, un método que permite la identificación de "promotores fuertes" mediante la abundancia de proteínas. Detalles sobre el procedimiento metódico así como otras referencias pueden encontrarse, por ejemplo, en Proteomics in Practice - A Laboratory Manual of Proteome Analysis (autores: R. Westermeier, T. Naven; editorial: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002). Las células bacterianas se abren y las proteínas del extracto celular se dividen por medio de electroforesis de gel 2D. Las proteínas se tiñen entonces por métodos comunes tales como, por ejemplo, teñido con Coomassie, tinta fluorescente o plata. El sobreteñido de la proteína se evita aquí para posibilitar que las manchas de la proteína individual se cuantifiquen después. Subsecuentemente, el gel se explora y la imagen obtenida se evalúa con la ayuda de un programa de ordenador adecuado (por ejemplo, Melanie, de Amersham Biosciences). Para este propósito, primero se identifican todas las manchas detectables y se determina el volumen de la mancha. La suma de todos los volúmenes de las manchas corresponde, en una primera aproximación, a la proteína total. Con ayuda del programa de ordenador para análisis de imagen, pueden seleccionarse entonces las manchas con volúmenes de mancha particularmente grandes. Por ejemplo, las manchas con volúmenes que ocupan más del 0.1% del volumen de manchado total pueden denominarse abundantes. Subsecuentemente, las manchas que contienen proteínas particularmente abundantes se extraen del gel. Normalmente, la proteína presente en el gel se digiere entonces de manera proteolítica (por ejemplo, con tripsina) y se determina la masa molar de los péptidos resultantes, por ejemplo con la ayuda de MALDI-ToF MS (Matrix assisted laser desorption ionization - Time of Flight Mass Spectrometry o ionización de desorción láser asistida por matriz espectrometría de masas de tiempo de vuelo). Con base en la masa molar de algunos de los péptidos tripticos de la proteína, se puede entonces identificar la proteína correspondiente en los registros de las bases de datos. Esto es posible en particular si el genoma del organismo a estudiarse ha sido secuenciado, como es el caso de la *C. glutamicum*, *E. coli*, y muchas otras bacterias. La ORF (estructura de lectura abierta) que codifica dicha proteína puede entonces determinarse con base en la identidad de dicha proteína. En las bacterias, los promotores que regulan dicho gen están usualmente localizados inmediatamente corriente arriba del codón de inicio. Por lo tanto, los promotores "fuertes" también se encuentran

frecuentemente en una región de aproximadamente 200 nucleótidos corriente arriba del codón de inicio de proteínas "abundantes".

5 Promotores "artificiales" comprenden en particular aquellas secuencias que no tienen actividad transcripcional in situ y las cuales son transcripcionalmente activas en otro contexto de secuencia, tal como principalmente en el contexto de una unidad de expresión o casete de expresión de la invención.

Por "actividad del promotor" se entiende la cantidad de ARN formado por el promotor en un tiempo particular, es decir, la velocidad de transcripción.

Por actividad del promotor "específica" se entiende la cantidad por cada promotor de ARN formado mediante el promotor en un tiempo determinado.

10 En una actividad del promotor "provocada", o una velocidad de transcripción con respecto a un gen, en comparación con el tipo silvestre, la formación de un ARN que no estaba presente en este tipo silvestre se provoca de esta manera en comparación con el tipo silvestre.

15 En una actividad del promotor "modificada" o una velocidad de transcripción con respecto a un gen, en comparación con el tipo silvestre, la cantidad formada de ARN se modifica de esta manera en comparación con el tipo silvestre en un tiempo determinado.

Por "modificada" se entiende este contexto preferiblemente incrementada o reducida.

20 Por un enlace "funcional" u "operativo" se entiende en este contexto, por ejemplo, la disposición secuencial de un ácido nucleico con actividad de promotor y de una secuencia de ácido nucleico a transcribirse y opcionalmente otros de elementos regulatorios como, por ejemplo, de una secuencia de ácido nucleico, los cuales garantizan la transcripción de ácidos nucleicos, así como por ejemplo, un terminador de tal modo que cada uno de los elementos regulatorios puede cumplir su función en la transcripción de la secuencia de ácido nucleico. Esto no requiere necesariamente un enlace directo en el sentido químico. Secuencias de control genéticas tales como, por ejemplo, secuencias reforzadoras también pueden ejercer su función en la secuencia objetivo desde posiciones más distantes o aún desde otras moléculas de ADN. Se da preferencia a disposiciones en las que la secuencia del ácido nucleico a transcribirse se posiciona detrás (es decir, en el extremo 3') de la secuencia del promotor, de manera que las dos secuencias están conectadas de manera covalente entre sí. La distancia entre la secuencia del promotor y la secuencia del ácido nucleico a expresarse de manera transgénica es aquí preferiblemente de menos de 200 pares de bases, particularmente preferible de menos de 100 pares de bases, muy particularmente preferible de menos de 50 pares de bases.

30 Como secuencia de un "sitio de enlace ribosómico" o "sitio de enlace de ribosoma" (RBS) (o denominado secuencia Shine - Dalgarno) se entienden secuencias de polinucleótidos ricas en A/G que se encuentran hasta 30 bases corriente arriba del codón de inicio de la traducción.

35 Por "transcripción" se entiende el proceso por el cual a partir de una matriz de ADN se produce una molécula de ARN complementaria. En este proceso intervienen proteínas, como la polimerasa de ARN, los llamados factores sigma y las proteínas reguladoras transcripcionales. Entonces, el ARN sirve como matriz en el proceso de traducción que conduce luego a la proteína biosintéticamente activa.

40 Por una "región núcleo" de un promotor se entiende una secuencia de ácido nucleico contigua de aproximadamente 20 a 80, o 30 a 60, nucleótidos, que comprende al menos una llamada "región-10" potencial. Ejemplos de regiones - 10 potenciales se describen aquí para secuencias de promotor preferidas individuales; compárese principalmente la Figura 1. "regiones-10" también se denominan cajas TATA o secuencias Pribnow-Schaller. Cada promotor empleado debería contener al menos una de estas regiones-10 potenciales, como por ejemplo 1, 2, 3, 4 o 5. La región núcleo se localiza 5' corriente arriba del RBS y puede estar a una distancia de ésta de 1 a 200 o 10 a 150 o 20 a 100 residuos de nucleótidos.

45 Por una "unidad de expresión" se entiende un ácido nucleico que tiene actividad de expresión, que comprende un promotor múltiple como se definió aquí y el cual, después de la unión funcional a un ácido nucleico o un gen a expresarse, regula la expresión, es decir, la transcripción o la traducción, de este ácido nucleico o de este gen. Por esto, en este contexto también se habla de una "secuencia de ácido nucleico reguladora". Además del constructo del promotor múltiple, pueden estar contenidos otros elementos reguladores tales como, reforzadores (enhancer), por ejemplo.

50 Por un "casete de expresión" se entiende una unidad de expresión que esta enlazada de manera funcional al ácido nucleico a expresarse o al gen a expresarse. En contraste a una unidad de expresión, un casete de expresión comprende de esta manera no solo secuencias de ácidos nucleicos que regulan la transcripción y traducción, sino

también las secuencias de ácidos nucleicos las cuales deben expresarse como proteína como resultado de la transcripción y traducción.

Por "actividad de expresión" se entiende la cantidad de proteína formada por el casete de expresión o su unidad de expresión en un tiempo determinado; es decir, la velocidad de expresión.

- 5 Por "actividad de expresión específica" se entiende la cantidad de proteína formada por el casete de expresión o su unidad de expresión en un tiempo determinado, por unidad de expresión.

En el caso de una "actividad de expresión provocada" o velocidad de expresión con respecto a un gen, en comparación con el tipo silvestre, se provoca de esta manera la formación de una proteína que no estaba presente en esta forma en el tipo silvestre, en comparación con el tipo silvestre.

- 10 En el caso de una "actividad de expresión modificada" o velocidad de expresión con respecto a un gen en comparación con el tipo silvestre, se altera de esta manera la cantidad de proteína formada en un tiempo determinado en comparación con el tipo nativo. En este contexto, por "modificada" se entiende incrementada o reducida, preferiblemente. Esto puede efectuarse, por ejemplo, incrementando o reduciendo la actividad específica de la unidad de expresión endógena, por ejemplo por mutación o por estimulación o inhibición. La actividad de expresión modificada, o velocidad de expresión, pueden lograrse además, por ejemplo, regulando la expresión de genes en el microorganismo por unidades de expresión de la invención, en cuyo caso los genes son heterólogos con respecto a las unidades de expresión.

- 15 La "velocidad de formación" a la cual se produce una proteína biosintéticamente activa es un producto de la velocidad de transcripción y la traducción. Ambas velocidades pueden ser influenciadas y de esta manera influenciar la velocidad de formación de los productos/productos de química fina en un microorganismo.

Por el término "tipo silvestre" se entiende el microorganismo de partido correspondiente y no debe corresponder obligatoriamente a un organismo de procedencia natural.

Según el contexto, por el término "microorganismo" pueden entenderse el microorganismo de partida (tipo silvestre) o un microorganismo genéticamente modificado de la invención o ambos.

- 25 Preferiblemente y en particular en casos en los que no es posible clasificar el microorganismo o el tipo silvestre de manera unívoca, por "tipo silvestre" se entiende un "organismo de referencia" para modificar o provocar la actividad del promotor o la velocidad de transcripción, para modificar o provocar la actividad de expresión o la velocidad de expresión y para incrementar el contenido de producto biosintético, respectivamente. En una modalidad preferida, este "organismo de referencia" es *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13032 o un microorganismo que se deriva de ATCC 13032 por mutación dirigida o no dirigida.

Principalmente se usan "microorganismos de partida" que ya están en capacidad de producir el producto deseado (productos de química fina/ proteína).

- 35 Por una secuencia "derivada", por ejemplo una secuencia de promotor derivada, si no se hacen otras indicaciones, se entiende una secuencia que tiene una identidad con la secuencia de partida de al menos 80% o al menos 90%, principalmente 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% y 99%.

- 40 Por "identidad" entre dos ácidos nucleicos se entiende la identidad de los nucleótidos por toda la longitud del ácido nucleico, principalmente la identidad que se calcula con ayuda del programa de ordenador Vector NTI Suite 7.1 de la empresa Informax (USA) aplicando el método Clustal (Higgins DG, Sharp PM. Fast and sensitive multiple sequence alignments on a microcomputer. *Comput Appl. Biosci.* 1989 Ap;5(2):151-1) ajustando los siguientes parámetros:

Multiple alignment parameter:
 Gap opening penalty 10
 Gap extension penalty 10
 Gap separation penalty range 8
 45 Gap separation penalty off
 % identity for alignment delay 40
 Residue specific gaps off
 Hydrophilic residue gap off

Transition weighing 0

- 50 Pairwise alignment parameter:

FAST algorithm on
 K-tuplesize 1
 Gap penalty 3
 Window size 5
 5 Number of best diagonals 5

10 Por "hibridar" se entiende la capacidad de un poli- u oligonucleótido de enlazarse en condiciones severas a una secuencia casi complementaria, mientras que en estas condiciones no se forman enlaces no específicos entre partes no complementarias. Para este propósito, las secuencias deben ser complementarias preferiblemente 90-100%. La propiedad de las secuencias complementarias de ser capaces de poder enlazarse de manera específica entre sí se aprovecha, por ejemplo en la técnica de Northern- o Southern-Blot o en la unión de cebador en PCR o RT-PCR.

15 La "hibridación" se efectúa en condiciones severas. Las condiciones de la hibridación de este tipo se describen, por ejemplo, en Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T., en: Molecular Cloning (A Laboratory Manual), 2. Edición, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989, páginas 9.31-9.57 o en Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, N.Y. (1989), 6.3.1-6.3.6. Por condiciones de hibridación severas se entienden principalmente:
 La incubación a 42°C por una noche en una solución que se compone de formamida 50 %, 5 x SSC (NaCl de 750 mM, citrato trisódico de 75 mM), fosfato de sodio de 50 mM (pH7,6), 5x solución de Denhardt, sulfato de dextrano de 10% y 20 g/ml de ADN de esperma de salmón cizallado, desnaturalizado, seguido del lavado de los filtros con 0.1 x SSC a 65° C.

20 Por "esencialmente idéntica" se entiende una actividad del promotor específica que tiene al menos 50%, como por ejemplo al menos 60%, 70%, 80%, 90%, o al menos 95% de la actividad del promotor específica de la secuencia de partida.

II. Unidades de expresión, casetes de expresión y sus componentes

a) Unidades de expresión

25 La invención se refiere a bacterias corineformes genéticamente modificadas que se transformaron con al menos un vector que contiene al menos un casete de expresión. Casetes de expresión contienen unidades de expresión que contienen promotores múltiples, unidos funcionalmente con una secuencia de ácido nucleico traducible.

Esta unidad de expresión que contiene un promotor múltiple, comprende un módulo de secuencia en dirección 5'-3' de la siguiente fórmula general (I)

30 $5'-P_1-(A_x-P_x)_n-A_y-P_y-3'$

donde

n representa un valor de números enteros de 0 a 10, como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 o 6;

A_x y A_y son iguales o diferentes y representan un enlace químico, principalmente covalente, o una secuencia de ácido nucleico - enlazador químicamente integrada, en particular integrada de manera covalente;

35 P_1 , P_x y P_y codifican secuencias de promotor iguales o diferentes derivadas de bacterias corineformes iguales o diferentes, las cuales comprenden al menos una región que enlaza polimerasa de ARN, como por ejemplo una región de núcleo; y al menos, solo como por ejemplo, P_y comprende un segmento de secuencia 3'-terminal que facilita el enlace de ribosoma.

40 Las secuencias de promotor P_1 , P_x y P_y pueden derivarse de genes de bacterias corineformes que codifican proteínas que intervienen en una vía de biosíntesis del organismo. Las secuencias de promotor se encuentran en tal caso en el genoma del organismo 20 a 500 residuos de nucleótidos, o 20 a 300 residuos de nucleótidos, por ejemplo 20 a 210 residuos de nucleótidos y principalmente 20 a 100 o 35 a 100 residuos de nucleótidos 5'-corriente arriba de la secuencia codificante de la proteína respectiva.

45 Ejemplos de secuencias de las cuales pueden derivarse las secuencias del promotor P_1 , P_x y P_y son los genes enlistados en la Tabla 1 más adelante.

Ejemplos no limitantes de secuencias del promotor especiales se derivan de las secuencias del ácido nucleico de acuerdo a la SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3 y SEQ ID NO:4, y la figura 1, aunque sin limitarse a las mismas.

En tal caso, la SEQ ID NO:1 corresponde a la secuencia situada corriente arriba de la región codificante del GroES Chaperonin (pGRO), la SEQ ID NO:2 corresponde a la secuencia que está situada corriente arriba de la región codificante del factor TS de elongación de la proteína (pEFTs), la SEQ ID NO: 3 corresponde a la secuencia situada corriente arriba de la región codificante del factor TU de elongación de la proteína (pEFTu) y la SEQ ID NO:4 corresponde a la secuencia situada corriente arriba de la región codificante de la dismutasa de superóxido (pSOD), en cada caso de *Corynebacterium glutamicum*. Las SEQ ID NO:1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3 y SEQ ID NO: 4 corresponden a las secuencias del promotor del tipo silvestre.

Por una secuencia "derivada" se entiende una secuencia que tiene una identidad con la secuencia de partida de al menos 80% o al menos 90%, tal como 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, y principalmente 99%. Este grado de identidad es válido principalmente para la "región núcleo" anteriormente definida del promotor respectivo. Fuera de la región núcleo respectiva, el grado de identidad en tal caso puede ser más bajo y estar en el intervalo de 0 a 80%, como por ejemplo 10 a 80%, 20 a 70%, 30 a 60% o 40 a 50%.

Regiones núcleo útiles se encuentran, por ejemplo, para pGRO en el intervalo de posición 50 a 80 de SEQ ID NO:1; para pEFTs en el intervalo de posición 130 a 170 de SEQ ID NO:2; para pEFTu en el intervalo de posición 30 a 110 de SEQ ID NO:3; para pSOD en el intervalo de posición 50 a 100 de SEQ ID NO:4.

Las unidades de expresión contienen principalmente dos o más secuencias de ácido nucleico con actividad de promotor,

a) preferentemente derivadas de secuencias iguales o diferentes, seleccionadas entre SEQ. ID. NO. 1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3 y SEQ ID NO:4; u otras secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior;

b) en cuyo caso opcionalmente una o más de dichas secuencias representan una secuencia derivada por sustitución, inserción, inversión o delección (eliminación) o adición de nucleótidos que tiene principalmente en la región núcleo una identidad de al menos 80% a nivel del ácido nucleico con una secuencia preferiblemente seleccionada de entre la SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 u otras secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior,

c) o en cuyo caso opcionalmente una o más de estas secuencias de ácido nucleico contenidas hibrida con una secuencia en condiciones severas que es complementaria a una de las secuencias de ácido nucleico según SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 y/o a otras secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior.

Otros promotores naturales que pueden utilizarse como un componente de un promotor múltiple de la invención pueden detectarse fácilmente, por ejemplo, a partir de diferentes bacterias corineformes cuya secuencia genómica es conocida, comparando las identidades de las secuencias de ácidos nucleicos de bases de datos con las secuencias SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 anteriormente descritas o de acuerdo a la Figura 1 u otras secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior.

Otros promotores naturales adecuados pueden detectarse fácilmente a partir de las secuencias de ácido nucleico descritas previamente principalmente a partir de las secuencias SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 y/o de secuencias promotor para genes con abundancia comparable o superior de bacterias corineformes diferentes cuya secuencia genómica no se conoce, aplicando técnicas de hibridación de una manera conocida per se.

Otros promotores naturales adecuados también pueden aislarse por métodos conocidos por el experto en la materia, tal como se describen por ejemplo en Cadenas et al (1991) Gene 98, 117-121; Eikmanns et al, (1991) Gene 102, 93-98.; Patek et al (1996) Microbiology 142, 1297-1309 o Santamaria et al (1987) Gene 56, 199-208. Para esto usualmente se usan vectores de "sonda promotora" en los que se insertan fragmentos genómicos del genoma en cuestión. La actividad de promotor de un fragmento individual puede entonces determinarse en el montaje (setup) experimental mencionado midiendo la actividad de un gen reportero corriente abajo, por ejemplo, la acetil transferasa de cloramfenicol.

La unidad de expresión que contiene promotores múltiples también comprende, por lo tanto, la combinación de tales promotores, los cuales no se encuentran enlistados aquí por el nombre. Esto también se refiere a la combinación de promotores individuales ya conocidos, como los descritos, por ejemplo, en (Patek et al (2003). J of Biotechnology 104, 311-323; Vasicova et al. (1999) J. Bacteriol 181, 6188-6191).

Ácidos nucleicos con actividad de promotor para incorporación a una unidad de expresión que contiene promotores múltiples, también comprenden los ácidos nucleicos con actividad de promotor que comprenden una secuencia de ácido nucleico que hibrida en condiciones severas con la secuencia de ácido nucleico SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 o secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior. Esta secuencia de ácido nucleico comprende al menos 10, preferible más de 12, 15, 30, 50 o más de 150 nucleótidos.

5 Secuencias promotoras artificiales para la incorporación a una unidad de expresión que comprende promotores múltiples pueden prepararse fácilmente a partir de la secuencia SEQ ID NO: 1, 2, 3 o 4 o de acuerdo con la Figura 1 y/o las secuencias de promotor para genes con abundancia comparable o superior mediante variación artificial y mutación, por ejemplo mediante adición, sustitución, inserción, inversión o eliminación de uno o varios residuos de nucleótidos individuales o contiguos. (Patek et al (2003). J of Biotechnology 104, 311-323; Vasicova et al. (1999) J. Bacteriol 181, 6188-6191) y las referencias mencionadas allí).

10 Segmentos adecuados de secuencia 3'-terminal, que facilitan el enlace de ribosomas, de una secuencia de promotor P_y son, por ejemplo, el RBS de pGRO: GGAGGGA; el RBS de pEFTs: AGGAGGA; el RBS de pEFTu: AGGAGGA; así como el RBS de pSOD : GGAGGGA (compárese también la figura 1 adjunta). El RBS óptimo por teoría, es decir la secuencia que es 100 % complementara para la secuencia anti-Shine-Dalgarno en el ARNr 16S de *C. glutamicum* es: 5'GAAAGGAGG3'. Otros segmentos de secuencia RBS adecuados pueden producirse por ejemplo mediante variación artificial y mutación, por ejemplo por sustitución, inserción, inversión, adición o eliminación de nucleótidos, o detectarse por comparaciones de homología con secuencias de promotor en los bancos de datos.

Ejemplos no limitantes de unidades de expresión que contienen promotores múltiples se seleccionan entre:

15 e) Secuencias que codifican

PeftuPsod, de posición 18 a 390 en SEQ ID NO: 45;

PsodPeftu, de posición 18 a 395 en SEQ ID NO: 52;

PgroPsod, de posición 18 a 369 en SEQ ID NO: 55;

PgroPsodPefts, de posición 11 a 538 en SEQ ID NO: 59;

20 PeftuPsodPefts; de posición 11 a 559 en SEQ ID NO: 60;

o

f) Secuencias derivadas de secuencias según e) mediante sustitución, inserción, inversión, adición o eliminación de nucleótidos que en comparación con esta secuencia de partida tienen una identidad de al menos 80 % o al menos 90% a nivel de ácido nucleico; o

25 g) Secuencias de ácido nucleico, que hibridan con una secuencia complementaria a e) en condiciones severas;

Las unidades de expresión pueden comprender preferentemente uno o varios de los siguientes elementos genéticos: una región-10; un inicio de transcripción, una región de reforzador (enhancer); y una región de operador.

Estos elementos genéticos son específicos para las especies corinebacteria, especialmente para *Corynebacterium glutamicum*.

30 Los promotores bacterianos normalmente consisten de tres sitios de reconocimiento de la polimerasa de ARN, más precisamente la región -10, la región -35 y el elemento UP. Estos elementos promotores son altamente conservados en *E.coli* aunque no en *C. glutamicum*. Esto se refiere especialmente a la región -35. Con frecuencia este puede por lo tanto no derivarse de la secuencia, o puede derivarse solo de manera no confiable. La región -10 igualmente es menos fuertemente conservada que en organismos con genomas ricos en AT. Como secuencias de consenso aquí se han prescrito TGNNGNTA(C/T)AATGG o GNTANAATNG (Patek et al (2003), J. of Biotechnology 104, 311-323; Vasicova et al. (1999) J. Bacteriol 181, 6188-6191).

40 En general se conoce que en bacterias con un contenido de GC moderado o alto (como, por ejemplo, *C. glutamicum*) ocurre en general una alta variabilidad en las secuencias de consenso (Boum and Babb, 1995., Bashiam et al, 1996). Esto es válido particularmente para la región -35 que por lo tanto con frecuencia no puede pronosticarse. Esto se describe, por ejemplo, en Patek et al (2003). J of Biotechnology 104, 325-334.

b) Casetes de expresión

Unidades de expresión que contienen promotores múltiples, funcionalmente unidas con una secuencia de ácido nucleico traducible, se denominan casetes de expresión.

45 Por un "enlace funcional" en este contexto se entiende, por ejemplo, la disposición secuencial de una de las unidades de expresión y de una secuencia de ácido nucleico a expresarse de manera transgénica y opcionalmente

de otros elementos reguladores tal como un terminador, por ejemplo, de tal modo que cada uno de los elementos reguladores pueda cumplir una función en la expresión transgénica de la secuencia del ácido nucleico. Para esto no se requiere obligatoriamente un enlace directo en el sentido químico. Las secuencias de control genético tales como, por ejemplo, secuencias reforzadoras (enhancer) también pueden ejercer su función en la secuencia objetivo desde posiciones más distantes o aún desde otras moléculas de DNA. Se prefieren disposiciones en las cuales la secuencia de ácido nucleico a expresarse de manera transgénica se posiciona detrás (es decir, en el extremo 3') de la secuencia de la unidad de expresión de la invención, de manera que ambas secuencias se enlazan de manera covalente entre sí. La distancia entre la secuencia de la unidad de expresión y la secuencia del ácido nucleico a expresarse de manera transgénica es aquí preferiblemente de menos de 200 pares de base, particularmente preferible de menos de 100 pares de base, muy particularmente preferible de menos de 50 pares de base.

Por medio de los casetes de expresión que contienen promotores múltiples se crea la posibilidad de lograr una actividad de expresión diferente, en comparación con la actividad de expresión original, y de esta manera efectuar una regulación fina de la expresión del gen deseado.

Preferentemente, la regulación de la expresión de genes en bacteria corineforme se logra mediante unidades de expresión

- introduciendo una o más unidades de expresión, opcionalmente con actividad de expresión específica modificada al genoma de la bacteria corineforme de manera que la expresión de uno o más genes endógenos se efectúa bajo el control de las unidades de expresión introducidas de la invención; o

- introduciendo a la bacteria corineforme uno o más constructos de ácidos nucleicos que contienen una unidad de expresión de la invención, opcionalmente con actividad de expresión específica modificada y enlazando de manera funcional, uno o más ácidos nucleicos a expresarse, es decir, un casete de expresión.

En los casetes de expresión de la invención, la posición física de la unidad de expresión con relación al gen a ser expresado se elige de modo que la unidad de expresión regule la transcripción y preferiblemente también la traducción del gen a expresarse y de esta manera posibilitar la formación de una o más proteínas. "Posibilitar la formación" aquí incluye incrementar de manera constitutiva dicha formación, atenuar o bloquear la formación en condiciones específicas y/o incrementar la formación en condiciones específicas. Las "condiciones" comprenden en tal caso:

(1) adición de un componente al medio de cultivo, (2) retiro de un componente del medio de cultivo, (3) reemplazo de un componente en el medio de cultivo por un segundo componente, (4) incremento de la temperatura del medio de cultivo, (5) reducir la temperatura del medio de cultivo y (6) regular las condiciones atmosféricas tales como, por ejemplo, la concentración de oxígeno o la concentración de nitrógeno, en la que se mantiene el medio de cultivo.

c) Indicaciones generales:

Todos los ácidos nucleicos anteriormente mencionados con actividad de promotor y unidades de expresión y casetes de expresión también pueden prepararse de una manera conocida per se, mediante síntesis química de las unidades estructurales de nucleótidos, por ejemplo mediante condensación de fragmentos de las unidades estructurales de ácidos nucleicos complementarios superpuestos individuales de la doble hélice. La síntesis química de los oligonucleótidos puede llevarse a cabo, por ejemplo, en una manera conocida per se, según el método de fosfoamidita. (Voet, Voet, 2. Edición, Wiley Press New York, páginas 896-897). La adición de los oligonucleótidos sintéticos y el relleno de huecos con ayuda del fragmento Klenow de la polimerasa de ADN y reacciones de ligazón, así como métodos generales de clonación se describen en Sambrook et al. (1989), Molecular cloning: A laboratory manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Para las presentes invenciones se utilizaron métodos y técnicas que son conocidas para el experto en la materia que esté ejercitado en las técnicas microbiológicas y de ADN recombinante. Los métodos y técnicas para el crecimiento de células bacterianas, la introducción de moléculas de ADN aisladas a la célula huésped y el aislamiento, clonación y secuenciación de moléculas de ácidos nucleicos aisladas, etc., son ejemplos de tales técnicas y métodos. Estos métodos se describen en muchas referencias bibliográficas estándar: Davis et al., Basic Methods In Molecular Biology (1986); J. H. Miller, Experiments in Molecular Genetics, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York (1972); J.H. Miller, A Short Course in Bacterial Genetics, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York (1992); M. Singer and P. Berg, Genes Genomes, University Science Books, Mill Valley, California (1991); J. Sambrook, E.F. Fritsch and T. Maniatis, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2nd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York (1989); P.B. Kaufmann et al., Handbook of Molecular and Cellular Methods in Biology and Medicine, CRC Press, Boca Raton, Florida (1995); Methods in Plant Molecular Biology and Biotechnology, B.R. Glick and J.E. Thompson, eds., CRC Press, Boca Raton, Florida (1993); and P.F. Smith-Keary, Molecular Genetics of Escherichia coli, The Guilford Press, New York, NY (1989).

Todas las moléculas de ácidos nucleicos se presentan preferiblemente en la forma de una molécula de ácido nucleico aislada. Una molécula de ácido nucleico "aislada" se separa de otras moléculas de ácido nucleico presentes en la fuente natural del ácido nucleico y puede estar además esencialmente libre de otro material celular o medio de cultivo si se produce por técnicas recombinantes, o estar libre de precursores químicos u otros productos químicos, si se sintetiza químicamente.

Las secuencias de nucleótidos de la invención también permiten la generación de sondas y cebadores que pueden utilizarse para identificar y/o clonar secuencias homologas en otros tipos de células y microorganismos. Tales sondas o cebadores usualmente comprenden una región de la secuencia de nucleótido que, en condiciones severas, hibrida en al menos aproximadamente 12, preferiblemente al menos cerca de 25, como por ejemplo cerca de 40, 50 o 75, nucleótidos sucesivos de una cadena sense (sentido) de una secuencia de ácido nucleico de la invención o de una cadena antisense (antisentido) correspondiente.

III. Vectores de expresión

El experto en la materia conoce bien los vectores y éstos pueden encontrarse, por ejemplo, en "Cloning Vectors" (Pouwels P. H. et al., editores, Elsevier, Amsterdam-New York-Oxford, 1985). Por vectores también se entienden, además de plásmidos, todos los otros vectores conocidos por el experto en la materia, como por ejemplo fagos, transposones, elementos IS, fásmidos, cósmidos, y ADN lineales o circulares. Estos vectores pueden replicarse de manera autónoma en el organismo huésped o cromosómicamente.

Como plásmidos son adecuados aquellos que se replican en bacterias corineformes. Numerosos vectores de plásmido conocidos, como por ejemplo pZ1 (Menkel et al., Applied and Environmental Microbiology (1989) 64: 549-554), pEKEx1 (Eikmanns et al., Gene 102: 93-98 (1991)) o pHS2-1 (Sonnen et al., Gene 107: 69-74 (1991)) se basan en los plásmidos crípticos pHM1519, pBL1 o pGA1. Otros vectores de plásmido como, por ejemplo, pCLiK5MCS (véase ejemplo 11), o aquellos que se basan en pCG4 (US-A 4,489,160) o pNG2 (Serwold-Davis et al., FEMS Microbiology Letters 66, 119-124 (1990)) o pAG1 (US-A 5,158,891), pueden usarse de igual manera.

Además, también son adecuados aquellos vectores de plásmidos con la ayuda de los cuales puede aplicarse el método de amplificación del gen mediante integración al cromosoma, como se describió, por ejemplo, por Remscheid et al. (Applied and Environmental Microbiology 60, 126-132 (1994)) para la duplicación o amplificación del operon *hom-thrB*. En este método, se clona el gen completo en un vector de plásmido que puede replicarse en un huésped (típicamente *E. coli*) pero no en *C. glutamicum*. Como vectores se consideran, por ejemplo pSUP301 (Simon et al., Bio/Technology 1,784-791 (1983)), pK18mob o pK19mob (Schäfer et al., Gene 145,69-73 (1994)), Bernard et al., Journal of Molecular Biology, 234: 534-541 (1993)), pEM1 (Schrumpf et al. 1991, Journal of Bacteriology 173: 4510-4516) o pBGS8 (Spratt et al., 1986, Gene 41: 337-342). El vector de plásmido que contiene el gen a amplificarse se transfiere a continuación por transformación a la cepa de *C. glutamicum* deseada. Los métodos de transformación se describen, por ejemplo, en Thierbach et al. (Applied Microbiology and Biotechnology 29, 356-362 (1988)), Dunican y Shivnan (Biotechnology 7, 1067-1070 (1989)) y Tauch et al. (FEMS Microbiological Letters 123,343-347 (1994)).

IV. Genes y proteínas codificadas por los mismos

La velocidad de transcripción y/o la velocidad de traducción de genes en bacterias corineformes, en comparación con el tipo silvestre, pueden alterarse o provocarse regulando la transcripción de genes en la bacteria corineforme mediante unidades de expresión de la invención, en cuyo caso los genes son heterólogos con respecto a las unidades de expresión.

Esto se logra preferiblemente

- introduciendo uno o más ácidos nucleicos con actividad de promotor al genoma de la bacteria corineforme de manera que la transcripción de uno o más genes endógenos se efectúe bajo el control del ácido nucleico introducido con actividad de promotor, opcionalmente con actividad de promotor específica modificada, o

- introduciendo a la bacteria corineforme uno o varios constructos de ácidos nucleicos que contienen un ácido nucleico con tiene actividad de promotor y, enlazando funcionalmente uno o varios ácidos nucleicos exógenos o endógenos a transcribirse.

Sí uno o más genes se introducen al genoma de la bacteria corineforme de manera que uno o varios genes introducidos se transcriben bajo el control de los ácidos nucleicos de la invención, la inserción puede tener lugar para que el gen o los genes se integren a las regiones codificantes o no codificantes. La inserción preferiblemente tiene lugar a las regiones no codificantes.

La inserción de constructos de ácido nucleico puede efectuarse en tal caso de manera cromosómica o extracromosómica. Preferentemente, la inserción de los constructos de ácido nucleico se efectúa de manera cromosómica. Una integración "cromosómica" es la inserción de un fragmento de ADN al cromosoma de una célula huésped.

5 Por "endógeno" se entienden informaciones genéticas que ya están contenidas en el genoma de tipo silvestre (como se definió arriba).

10 Por "exógeno" se entienden informaciones genéticas como, por ejemplo, genes que no están contenidos en el genoma de tipo silvestre. Si las informaciones genéticas exógenas, por ejemplo las unidades de expresión que contienen promotores múltiples, se introducen al genoma de una cepa de tipo silvestre, generando por medio de esto una cepa genéticamente modificada, entonces estas informaciones genéticas son endógenas en comparación de la cepa genética inicialmente generada con su descendencia, por lo contrario exógena una comparación con la cepa de tipo silvestre original la cual no contenía estas informaciones genéticas.

15 Por el término "genes" respecto de la regulación de la transcripción mediante ácidos nucleicos de la invención con actividad de promotor se entienden preferentemente ácidos nucleicos que contienen una región a transcribirse, es decir, por ejemplo, una región que regula la traducción, una región codificante, así como opcionalmente otros elementos de regulación como, por ejemplo, un terminador.

Por el término "genes" respecto de la regulación de la expresión mediante las unidades de expresión de la expresión se entienden preferentemente ácidos nucleicos que contienen una región codificantes, así como opcionalmente otros elementos de regulación, como por ejemplo un terminador.

20 Por una "región codificante" se entiende una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína.

Por "heterólogo" respecto de ácidos nucleicos con actividad de promotor y genes se entiende que los genes usados en el tipo silvestre no se transcriben regulando los ácidos nucleicos con actividad de promotor, sino que surge un nuevo enlace funcional que no se presenta en el tipo silvestre y la combinación funcional de ácido nucleico con actividad de promotor y gen específico no se presenta en el tipo silvestre.

25 Por "heterólogo" respecto de unidades de expresión y genes se entiende que los genes usados no se expresan en el tipo silvestre regulando las unidades de expresión de la invención, sino que se produce un nuevo enlace funcional que no se presenta en el tipo silvestre, y la combinación funcional de la unidad de expresión de la invención y el gen específico no ocurren en el tipo silvestre.

30 Los genes se seleccionan del grupo de ácidos nucleicos que codifican una proteína de la vía de biosíntesis de productos de química fina, en cuyo caso los genes pueden contener opcionalmente otros elementos de regulación.

35 Los genes se seleccionan preferiblemente de: ácidos nucleicos que codifican una proteína de la vía de biosíntesis de aminoácidos proteinogénicos y no proteinogénicos, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de nucleótidos y nucleósidos, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de ácidos orgánicos, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de lípidos y ácidos grasos, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de dioles, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de compuesto aromático, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de vitaminas, ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de cofactores y ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de enzimas, ácidos nucleicos que codifican una proteína del metabolismo central, en cuyo caso los genes opcionalmente pueden contener otros elementos de regulación.

Particularmente se prefieren las proteínas a partir de la vía de biosíntesis de aminoácidos seleccionados, a saber:

45 Aspartato cinasa, aspartato-semialdehído-deshidrogenasa, diaminopimelato-deshidrogenasa, diaminopimelato-decarboxilasa, dihidrodipicolinato-sintetasa, dihidrodipicolinato - reductasa, glicerinaldehído-3-fosfato-dehidrogenasa, 3-fosfoglicerato-cinasa, piruvato-carboxilasa, triosefosfato-isomerasa, regulador transcripcional LuxR, regulador transcripcional LysR1, regulador transcripcional LysR2, malato-quinona-oxidoreductasa, glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, transcetolasa, transaldolasa, homoserina-O-acetiltransferasa, cistahionina-gamma-sintasa, cistahionina-beta-liasa, serina-hidroximetiltransferasa, O-acetilhomoserina-sulfhidrilasa, metilen-tetrahidrofolato-reductasa, fosfoserina-aminotransferasa, fosfoserina-fosfatasa, serina-acetil-transferasa, homoserina-deshidrogenasa, homoserina-cinasa, treonina-sintasa, treonina-exportador-portador, treonina-deshidratasa, piruvato-oxidasa, lisina-exportador, biotina-ligasa, cisteína-sintasa I, cisteína-sintasa II, metionina-sintasa dependiente de coenzima B12, actividad de metionina-sintasa dependiente de coenzima B12, sulfatadeniltransferasa subunidad 1 y 2, fosfoadenosina fosfosulfato reductasa, ferredoxin-sulfito-reductasa,

5 ferredoxin NADP reductasa, 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, regulador RXA00655, regulador de RXN2910, arginil-ARN-t sintetasa, fosfoenolpiruvato-carboxilasa, treonina Efflux-proteína, serinhidroxi metiltransferasa, fructosa-1,6-afosfatasa, proteína de la reducción de sulfato RXA077, proteína de la reducción de sulfato RXA248, proteína de la reducción de sulfato RXA247, proteína OpcA, 1-fosfofructocinasa, 6-fosfofructocinasa, tetrahidropicolinato-succinilasa, succinilo-aminocetopimelato-aminotransferasa, succinil-diaminopimelato-desuccinilasa, diaminopimelato-epimerasa, 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, glucosafosfato-isomerasa, fosfoglicerato-mutasa, enolasa, piruvato-cinasa, aspartato-transaminasa, malato-enzima.

10 Proteínas y ácidos nucleicos que codifican estas proteínas son secuencias de proteína o secuencias de ácido nucleico de origen microbiano, preferentemente de bacterias del género *Corynebacterium* o *Brevibacterium*, preferiblemente de bacterias corineformes, particularmente preferible de *Corynebacterium glutamicum*.

Ejemplos de secuencias de proteínas particularmente preferidas y de secuencias de ácidos nucleicos correspondientes que codifican estas proteínas a partir de la vía de biosíntesis de aminoácidos, su documento de referencia y su denominación en el documento de la referencia se listan en la tabla 1:

Tabla 1

Proteína	Ácido nucleico que codifica proteína	Documento de referencia	SEQ. ID. NO. en el documento de referencia
Aspartato de cinasa	ask o lysC	EP1108790	ADN: 281 Proteína: 3781
Aspartato-semialdehído-deshidrogenasa	asd	EP1108790	ADN:331 Proteína: 3831
Dihidrodipicolinato-Sintetasa	dapA	WO 0100843	ADN: 55 Proteína: 56
Dihidrodipicolinato-Reductasa	dapB	WO 0100843	ADN: 35 Proteína: 36
Meso-diaminopimelato-D-deshidrogenasa	ddh	EP1108790	DNA : 3494 Proteína : 6944
Diaminopicolinato-Decarboxilasa	lysA	EP1108790	ADN:3451 Prot.:6951
Exportador de Lisina	lysE	EP1108790	ADN: 3455 Prot.: 6955
Tetrahidropicolinato-Succinilasa	dapD	EP1108790	DNA : 1229 Prot : 4729
Succinilo-aminocetopimelato-Aminotransferasa	dapC	WO 0100843	DNA : 327 Prot: 328
Succinilo-Diaminopimelato-Desuccinilasa	dapE	WO 0100843	ADN: 31 Prot: 32
Diaminopimelato-Epimerasa	dapF	EP1108790	ADN:2131 Prot: 5632
Arginilo-ARN-t Sintetasa	argS	EP1108790	ADN: 3450 Prot.: 6950
Glucose-6-fosfat-Deshidrogenasa	zwf	WO 0100844	ADN: 243 Prot.: 244
Transcetolasa	RXA2739	EP 1108790	ADN: 1740 Prot: 5240
Transaldolasa	RXA2738	WO 0100844	ADN: 245 Prot: 246
OPCA	opcA	WO 0100804	ADN: 79 Prot: 80
6-Fosfogluconolactonasa	RXA2735	WO 0100844	ADN: 1 Prot.: 2
6-Fosfogluconato-Deshidrogenasa		EP1108790	ADN:1605 Prot: 5105
Glucosefosfato-Isomerasa	gpi	WO 0100844	ADN: 41 Prot.: 42
Malato-Quinona-Oxodoreductasa	mqq	WO 0100844	ADN: 569 Proteína: 570

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Proteína	Ácido nucleico que codifica proteína	Documento de referencia	SEQ. ID. NO. en el documento de referencia
Gliceraldehído-3-Fosfato-Deshidrogenasa	gap	WO 0100844	ADN: 187 Prot.: 188
3-Fosfogliceratcinasa	pgk	WO 0100844	ADN: 69 Prot.: 70
Triosefosfato-Isomerasa	tpi	WO 0100844	ADN: 61 Prot.: 62
1-Fosfofructocinasa 1	pfk1	WO0100844	ADN: 55 Proteína: 56
1-Fosfofructocinasa 2	pfk2	WO0100844	ADN: 57 Proteína: 58
6-Fosfofructocinasa 1	6-pfk1	EP 1108790	ADN: 1383 Proteína: 4883
6-Fosfofructocinasa 2	6-pfk2	DE 10112992	ADN: 1 Proteína: 2
Fructose-1,6-bisfosfatasa 1	fbr1	EP1108790	ADN: 1136 Proteína: 4636
Piruvato Oxidasa	poxB	WO 0100844	DNA : 85 Proteína: 86
Fosfoglicerato-mutasa		WO 0100844	ADN: 49 Prot.: 50
Enolasa	eno	WO 0100844	ADN: 71 Prot.: 72
Piruvato-Cinasa	pykA	WO 0100844	ADN: 75 Prot.: 76
Piruvato-Cinasa	pykA	EP1108790	ADN: 3328 Prot.: 6828
Piruvato-Carboxilasa	pycA	EP1108790	ADN: 765 Prot.: 4265
Aspartato-Transaminasa		EP1108790	ADN: 3226 Prot: 4726 ADN: 3134 Prot.: 6634 ADN: 2861 Prot.: 6361 ADN: 911 Prot.: 4411
PEP-Carboxilasa	pck	EP1108790	ADN: 3470 Prot.: 6970
Malato-Enzima	malE	EP1108790	ADN: 3328 Prot: 6828
Biotina-Ligasa	birA	EP1108790	ADN: 786 Prot.: 4286
Homoserina Cinasa	thrB	WO 0100843	ADN: 173 Prot.: 174
Treonina Sintasa	thrC	WO 0100843	ADN: 175 Prot.: 176
Exportador portador de Treonina	thrE	WO 0251231	ADN: 41 Prot.: 42
Treonina Efflux Proteína	RXA2390	WO 0100843	ADN: 7 Prot.: 8
Treonina Dehidratasa	ilva	EP 1108790	ADN: 2328 Prot.: 5828
Homoserina-O-Acetiltransferasa	metA	EP 1108790	ADN:727 Prot: 4227
Cistationina-gammasintasa	metB	EP 1108790	ADN:3491 Prot: 6991
Cistationina-beta-Liasa	metC	EP 1108790	ADN:2535 Prot: 6035

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Proteína	Ácido nucleico que codifica proteína	Documento de referencia	SEQ. ID. NO. en el documento de referencia
Metionina-Sintasa dependiente de coenzima B12, -	methH	EP 1108790	ADN:1663 Prot.: 5163
O-Acetilhomoserina-Sulfhidrilasa	metY	EP 1108790	ADN:726 Prot.: 4226
Metilentetrahidrofolat-Reductasa	metF	EP 1108790	ADN:2379 Prot.: 5879
D-3-Fosfoglicerato-Deshidrogenasa	serA	EP 1108790	ADN:1415 Prot.: 4915
Fosfoserina-Fosfatasa 1	serB	WO 0100843	ADN: 153 Prot.: 154
Fosfoserina-Fosfatasa 2	serB	EP 1108790	ADN: 467 Prot.: 3967
Fosfoserina-Fosfatasa 3	serB	EP 1108790	ADN: 334 Prot.: 3834
Fosfoserina-Aminotransferasa	serC	WO 0100843	ADN: 151 Prot.: 152
Serina Acetil-Transferasa	cysE	WO 0100843	ADN: 243 Prot.: 244
Cisteína-Sintasa I	cysK	EP 1108790	ADN: 2817 Prot.: 6317
Cisteína Sintasa II	CysM	EP 1108790	ADN: 2338 Prot.: 5838
Homoserina-Deshidrogenasa	hom	EP 1108790	ADN: 3452 Prot.: 6952
Metionina-Sintasa independiente de coenzima B12	metE	WO 0100843	ADN:755 Prot.: 756
Serina-Hidroximetiltransferasa	glyA	WO 0100843	ADN: 143 Prot.: 144
Proteína en reducción de sulfato	RXA247	EP 1108790	ADN: 3089 Prot.: 6589
Proteína en reducción de sulfato	RXA248	EP 1108790	ADN: 3090 Prot.: 6590
Sulfatadeniltransferasa Subunidad 1	CysN	EP 1108790	ADN: 3092 Prot.: 6592
Sulfatadeniltransferasa Subunidad 2	CysD	EP 1108790	ADN: 3093 Prot.: 6593
Fosfoadenosina Fosfosulfato Reductasa	CysH	WO 02729029	ADN: 7 Prot.: 8
Ferredoxina-Sulfito-Reductasa	RXA073	WO 0100842	ADN: 329 Prot.: 330
Ferredoxina NADP Reductasa	RXA076	WO 0100843	ADN: 79 Prot.: 80
Regulador transcripcional LuxR	luxR	WO 0100842	ADN: 297 Proteína: 298
Regulador transcripcional LysR1	lysR1	EP 1108790	ADN: 676 Proteína: 4176
Regulador transcripcional LysR2	lysR2	EP 1108790	ADN: 3228 Proteína: 6728
Regulador transcripcional LysR3	lysR3	EP 1108790	ADN: 2200 Proteína: 5700
Regulador RXA00655	RXA655	US2003162267.2	ADN: 1 Prot.: 2
Regulador RXN02910	RXN291 0	US2003162267.2	ADN: 5 Prot.: 6

De los genes listados arriba se selecciona preferiblemente el gen G objetivo a regular.

Otras secuencias de proteínas particularmente preferidas a partir de la vía de biosíntesis de aminoácidos tienen en cada caso la secuencia de aminoácido indicada en la tabla 1 para esta proteína, donde la proteína respectiva tiene, en al menos una de las posiciones del aminoácido indicadas en la tabla 2, columna 2 para esta secuencia del aminoácido, otro aminoácido proteinogénico, diferente del respectivo aminoácido indicado en la tabla 2, columna 3 en el mismo renglón. En otra modalidad preferida las proteínas tienen, en al menos una de las posiciones del aminoácido indicadas en la tabla 2, columna 2 para la secuencia del aminoácido, el aminoácido indicado en la tabla 2, columna 4 en el mismo renglón. Las proteínas indicadas en la tabla 2 son proteínas mutadas de la vía de biosíntesis de los aminoácidos, que tienen propiedades particularmente ventajosas y, por lo tanto, son particularmente adecuadas para expresar los ácidos nucleicos correspondientes a través de un constructo promotor de la invención y para la producción de aminoácidos. Por ejemplo, la mutación T3111 conduce a desactivación de la inhibición-feedback (retroalimentación) de ask.

Los ácidos nucleicos correspondientes que codifican una proteína de la tabla 2, mutada, descrita previamente, puede prepararse por métodos usuales.

Como punto de partida para la preparación de las secuencias de ácido nucleico, que codifican una proteína mutada es adecuado, por ejemplo, el genoma de una cepa de *Corynebacterium glutamicum* que puede obtenerse de la American Type Culture Collection bajo la denominación ATCC 13032 o las secuencias de ácido nucleico referidas en la tabla 1. Para la re-traducción de la secuencia de aminoácidos de las proteínas mutadas en las secuencias de ácido nucleico que codifican estas proteínas, es ventajoso utilizar el codon usage del organismo al cual se introducirá la secuencia del ácido nucleico o en el cual está presente la secuencia del ácido nucleico. Por ejemplo, es ventajoso utilizar el codon usage de *Corynebacterium glutamicum* para *Corynebacterium glutamicum*. El codon usage del respectivo organismo puede comprobarse de una forma conocida per se a partir de bases de datos o de solicitudes de patente que describen al menos una proteína y un gen que codifica esta proteína a partir del organismo deseado.

Los datos en la tabla 2 han de entenderse de la siguiente manera:

En la columna 1 "Identificación" se expone una denominación unívoca para cada secuencia respecto de la tabla 1.

En la columna 2 "AS-POS" el número respectivo se refiere a la posición de aminoácido de la secuencia de polipéptido correspondiente de la Tabla 1. Un "26" en la columna "AS-POS" significa por consiguiente la posición de aminoácido 26 de la secuencia de polipéptido indicada de manera correspondiente. La numeración de la posición empieza en la terminal N en +1.

En la columna 3 "AS-tipo silvestre", la letra respectiva designa el aminoácido – representado en código de una letra en la posición indicada en la columna 2, en la cepa correspondiente de tipo silvestre de la secuencia de la Tabla 1.

En la columna 4 "AS-Mutante", la letra respectiva designa el aminoácido – representado en el código de una letra – en la posición indicado en la columna 2 en la cepa mutante correspondiente.

En la columna 5 "Función" se presenta la función fisiológica de la secuencia de polipéptido correspondiente.

Para una proteína mutada con una función determinada (columna 5) y una secuencia determinada de aminoácido de partida (Tabla 1), en las columnas 2, 3 y 4 se describe al menos una mutación, y también varias mutaciones se describen para algunas secuencias. Estas varias mutaciones se refieren siempre a la secuencia de aminoácido inicial más cercana anterior respectiva (tabla 1). El término "al menos una de las posiciones del aminoácido" de una secuencia del aminoácido determinada significa preferiblemente al menos una de las mutaciones descritas para esta secuencia del aminoácido en las columnas 2, 3 y 4.

Código de una letra de los aminoácidos proteinogénicos:

	A Alanina	I Isoleucina	Q Glutamina
	C Cisteína	K Lisina	R Arginina
	D Aspartato	L Leucina	S Serina
45	E Glutamato	M Metionina	T Treonina
	F Fenilalanina	N Asparagina	V Valina
	G Glicina	P Prolina	W Triptofano

ES 2 380 000 T3

H Histidina Y Tirosina

Tabla 2

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
Identificación	AS Posición	AS tipo silvestre	AS Mutante	Función
ask	317	S	A	Cinasa de aspartato
	311	T	I	
	279	A	T	
asd	66	D	G	Aspartato-Semialdehído-Dehidrogenasa
	234	R	H	
	272	D	E	
	285	K	E	
	20	L	F	
dapA	2	S	A	Dihidrodipicolinato Sintetasa
	84	K	N	
	85	L	V	
dapB	91	D	A	Dihidrodipicolinato-Reductasa
	83	D	N	
ddh	174	D	E	Meso-Diaminopimelato-D-Dehidrogenasa
	235	F	L	
	237	S	A	
lysA	265	A	D	Diaminopicolinato-Decarboxilasa
	320	D	N	
	332	I	V	
argS	355	G	D	Arginilo-ARN-t-Sintetasa
	156	A	S	
	513	V	A	
	540	H	R	

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
Identificación	AS Posición	AS tipo silvestre	AS Mutante	Función
zwf	8	S	T	Glucosa-6-Fosfato-Dehidrogenasa
	150	T	A	
	321	G	S	
gap	264	G	S	Glicerinaldehído-3-Fosfato-Deshidrogenasa
pycA	7	S	L	Piruvato-Carboxilasa
	153	E	D	
	182	A	S	
	206	A	S	
	227	H	R	
	455	A	G	
	458	P	S	
	639	S	T	
	1008	R	H	
	1059	S	P	
1120	D	E		
pck	162	H	Y	PEP-Carboxilasa
	241	G	D	
	829	T	R	
thrB	103	S	A	Homoserina Cinasa
	190	T	A	
	133	A	V	
	138	P	S	
thrC	69	G	R	Treonina Sintasa
	478	T	I	

(continuación)

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
Identificación	AS Posición	AS tipo silvestre	AS Mutante	Función
RXA330	85	I	M	Treonina-Efflux Proteína
	161	F	I	
	195	G	D	
hom	104	V	I	Homoserina-Deshidrogenasa
	116	T	I	
	148	G	A	
	59	V	A	
	270	T	S	
	345	R	P	
	268	K	N	
	61	D	H	
	72	E	Q	
lysR1	80	R	H	regulador transcripcional LysR1 1
lysR3	142	R	W	regulador transcripcional LysR3
	179	A	T	
RXA2739	75	N	D	Transcetolasa
	329	A	T	
	332	A	T	
	556	V	I	
RXA2738	242	K	M	Transaldolasa
opcA	107	Y	H	OpcA
	219	K	N	
	233	P	S	
	261	Y	H	
	312	S	F	
	65	G	R	Aspartato-1-Decarboxilasa
	33	G	S	6- Fosfogluconolactonasa

Microorganismos modificados genéticamente

- 5 Los casetes de expresión anteriormente descritos se introducen en bacterias corineformes mediante métodos conocidos por el trabajador experto, tal como la conjugación o electroporación (como por ejemplo Liebl et al (1989) FEMS Microbiology Letters 53, 299-303).

- 10 La selección de casetes de expresión integrados se efectúa preferentemente mediante el método SacB. El método SacB es conocido por el experto en la materia y se describe, por ejemplo, en Schäfer A, Tauch A, Jäger W, Kalinowski J, Thierbach G, Pühler A.; Small mobilizable multi-purpose cloning vectors derived from the Escherichia coli plasmids pK18 and K19: selection of defined deletions in the chromosome of Corynebacterium glutamicum, Gene. 1994 Julio 22;145(1):69-73 y Blomfield IC, Vaughn V, Rest RF, Eisenstein BI.; Allelic exchange in Escherichia coli using the Bacillus subtilis sacB gene and a temperature-sensitive pSC101 replicon; Mol Microbiol. 1991 Jun;5(6): 1447-57.

- 15 De acuerdo con la invención, se prefiere usar como microorganismos de inicio aquellos que producen ya el producto valioso deseado (producto de química fina/proteína).

La invención por lo tanto también se refiere a una bacteria corineforme genéticamente modificada que contiene un casete de expresión o un vector que comprende el casete de expresión.

La presente invención se relaciona de manera particularmente preferible a bacterias corineformes genéticamente modificadas, en particular bacterias corineformes, las cuales contienen un vector, principalmente un vector transportador o vector de plásmido, que porta al menos un casete de expresión.

5 Bacterias corineformes son bacterias del género *Corynebacterium*, principalmente de las especies *Corynebacterium glutamicum*, *Corynebacterium acetoglutamicum*, *Corynebacterium acetoacidophilum*, *Corynebacterium thermoaminogenes*, *Corynebacterium melassecola* y *Corynebacterium efficiens* o del género *Brevibacterium*, principalmente de las especies *Brevibacterium flavum*, *Brevibacterium lactofermentum* y *Brevibacterium divaricatum*.

10 Bacterias particularmente preferidas de los géneros *Corynebacterium* y *Brevibacterium* se seleccionan del grupo de *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13032, *Corynebacterium acetoglutamicum* ATCC 15806, *Corynebacterium acetoacidophilum* ATCC 13870, *Corynebacterium thermoaminogenes* FERM BP-1539, *Corynebacterium melassecola* ATCC 17965, *Corynebacterium efficiens* DSM 44547, *Corynebacterium efficiens* DSM 44548, *Corynebacterium efficiens* DSM 44549, *Brevibacterium flavum* ATCC 14067, *Brevibacterium lactofermentum* ATCC 13869, *Brevibacterium divaricatum* ATCC 14020, *Corynebacterium glutamicum* KFCC10065 y *Corynebacterium glutamicum* ATCC 21608, así como cepas que se derivan de las mismas, por ejemplo mediante mutación y
15 selección clásica o mediante mutación dirigida.

La abreviatura KFCC significa Korean Federation of Culture Collection (Federación Coreana de Colección de Cultivos), la abreviatura ATCC significa American type strain culture collection (Colección de Cultivos Tipo Americano), y la abreviación DSM (o DSMZ) significa Colección Alemana de Microorganismos y Cultivos Celulares (Deutsche Sammlung van Mikroorganismen and Zellkulturen).

20 Otras bacterias particularmente preferidas adicionales del género *Corynebacterium* y *Brevibacterium* se listan en la tabla 3:

Tabla 3

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Brevibacterium	ammoniagenes	21054							
Brevibacterium	ammoniagenes	19350							
Brevibacterium	ammoniagenes	19351							
Brevibacterium	ammoniagenes	19352							
Brevibacterium	ammoniagenes	19353							
Brevibacterium	ammoniagenes	19354							
Brevibacterium	ammoniagenes	19355							
Brevibacterium	ammoniagenes	19356							
Brevibacterium	ammoniagenes	21055							
Brevibacterium	ammoniagenes	21077							
Brevibacterium	ammoniagenes	21553							
Brevibacterium	ammoniagenes	21580							
Brevibacterium	ammoniagenes	39101							
Brevibacterium	butanicum	21196							

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Brevibacterium	divaricatum	21792	P928						
Brevibacterium	flavum	21474							
Brevibacterium	flavum	21129							
Brevibacterium	flavum	21518							
Brevibacterium	flavum			B11474					
Brevibacterium	flavum			B11472					
Brevibacterium	flavum	21127							
Brevibacterium	flavum	21128							
Brevibacterium	flavum	21427							
Brevibacterium	flavum	21475							
Brevibacterium	flavum	21517							
Brevibacterium	flavum	21528							
Brevibacterium	flavum	21529							
Brevibacterium	flavum			B11477					
Brevibacterium	flavum			B11478					
Brevibacterium	flavum	21127							
Brevibacterium	flavum			B11474					
Brevibacterium	healii	15527							
Brevibacterium	ketoglutamicum	21004							
Brevibacterium	ketoglutamicum	21089							
Brevibacterium	ketosoreductum	21914							
Brevibacterium	lactofermentum				70				
Brevibacterium	lactofermentum				74				
Brevibacterium	lactofermentum				77				
Brevibacterium	lactofermentum	21798							
Brevibacterium	lactofermentum	21799							

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Brevibacterium	lactofermentum	21800							
Brevibacterium	lactofermentum	21801							
Brevibacterium	lactofermentum			B11470					
Brevibacterium	lactofermentum			B11471					
Brevibacterium	lactofermentum	21086							
Brevibacterium	lactofermentum	21420							
Brevibacterium	lactofermentum	21086							
Brevibacterium	lactofermentum	31269							
Brevibacterium	linens	9174							
Brevibacterium	linens	19391							
Brevibacterium	linens	8377							
Brevibacterium	paraffinolyticum					11160			
Brevibacterium	spec.						717.73		
Brevibacterium	spec.						717.73		
Brevibacterium	spec.	14604							
Brevibacterium	spec.	21860							
Brevibacterium	spec.	21864							
Brevibacterium	spec.	21865							
Brevibacterium	spec.	21866							
Brevibacterium	spec.	19240							
Corynebacterium	acetoacidophilum	21476							
Corynebacterium	acetoacidophilum	13870							
Corynebacterium	acetoglutamicum			B11473					
Corynebacterium	acetoglutamicum			B11475					
Corynebacterium	acetoglutamicum	15806							
Corynebacterium	acetoglutamicum	21491							

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Corynebacterium	acetoglutamicum	31270							
Corynebacterium	acetophilum			B3671					
Corynebacterium	ammoniagenes	6872						2399	
Corynebacterium	ammoniagenes	15511							
Corynebacterium	fujikense	21496							
Corynebacterium	glutamicum	14067							
Corynebacterium	glutamicum	39137							
Corynebacterium	glutamicum	21254							
Corynebacterium	glutamicum	21255							
Corynebacterium	glutamicum	31830							
Corynebacterium	glutamicum	13032							
Corynebacterium	glutamicum	14305							
Corynebacterium	glutamicum	15455							
Corynebacterium	glutamicum	13058							
Corynebacterium	glutamicum	13059							
Corynebacterium	glutamicum	13060							
Corynebacterium	glutamicum	21492							
Corynebacterium	glutamicum	21513							
Corynebacterium	glutamicum	21526							
Corynebacterium	glutamicum	21543							
Corynebacterium	glutamicum	13287							
Corynebacterium	glutamicum	21851							
Corynebacterium	glutamicum	21253							
Corynebacterium	glutamicum	21514							
Corynebacterium	glutamicum	21516							
Corynebacterium	glutamicum	21299							

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Corynebacterium	glutamicum	21300							
Corynebacterium	glutamicum	39684							
Corynebacterium	glutamicum	21488							
Corynebacterium	glutamicum	21649							
Corynebacterium	glutamicum	21650							
Corynebacterium	glutamicum	19223							
Corynebacterium	glutamicum	13869							
Corynebacterium	glutamicum	21157							
Corynebacterium	glutamicum	21158							
Corynebacterium	glutamicum	21159							
Corynebacterium	glutamicum	21355							
Corynebacterium	glutamicum	31808							
Corynebacterium	glutamicum	21674							
Corynebacterium	glutamicum	21562							
Corynebacterium	glutamicum	21563							
Corynebacterium	glutamicum	21564							
Corynebacterium	glutamicum	21565							
Corynebacterium	glutamicum	21566							
Corynebacterium	glutamicum	21567							
Corynebacterium	glutamicum	21568							
Corynebacterium	glutamicum	21569							
Corynebacterium	glutamicum	21570							
Corynebacterium	glutamicum	21571							
Corynebacterium	glutamicum	21572							
Corynebacterium	glutamicum	21573							
Corynebacterium	glutamicum	21579							

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Corynebacterium	glutamicum	19049							
Corynebacterium	glutamicum	19050							
Corynebacterium	glutamicum	19051							
Corynebacterium	glutamicum	19052							
Corynebacterium	glutamicum	19053							
Corynebacterium	glutamicum	19054							
Corynebacterium	glutamicum	19055							
Corynebacterium	glutamicum	19056							
Corynebacterium	glutamicum	19057							
Corynebacterium	glutamicum	19058							
Corynebacterium	glutamicum	19059							
Corynebacterium	glutamicum	19060							
Corynebacterium	glutamicum	19185							
Corynebacterium	glutamicum	13286							
Corynebacterium	glutamicum	21515							
Corynebacterium	glutamicum	21527							
Corynebacterium	glutamicum	21544							
Corynebacterium	glutamicum	21492							
Corynebacterium	glutamicum			B8183					
Corynebacterium	glutamicum			B8182					
Corynebacterium	glutamicum			B12416					
Corynebacterium	glutamicum			B12417					
Corynebacterium	glutamicum			B12418					
Corynebacterium	glutamicum			B11476					
Corynebacterium	glutamicum	21608							
Corynebacterium	lilium		P973						

ES 2 380 000 T3

(continuación)

Bacteria		Número de depósito							
Género	especie	ATCC	FERM	NRRL	CEC T	NCIMB	CBS	NCT C	DSM Z
Corynebacterium	nitrilophilus	21419				11594			
Corynebacterium	spec.		P4445						
Corynebacterium	spec.		P4446						
Corynebacterium	spec.	31088							
Corynebacterium	spec.	31089							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	31090							
Corynebacterium	spec.	15954							20145
Corynebacterium	spec.	21857							
Corynebacterium	spec.	21862							
Corynebacterium	spec.	21863							

Las abreviaturas tienen el siguiente significado:

5 ATCC: American Type Culture Collection, Rockville, MD, EUA

FERM: Fermentation Research Institute, Chiba, Japón

NRRL: ARS Culture Collection, Northern Regional Research Laboratory, Peoria, IL, EUA

CECT: Colección Española de Cultivos Tipo, Valencia, España

NCIMB: National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd., Aberdeen, Reino Unido

10 CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, NL (Holanda)

NCTC: National Collection of Type Cultures, London, UK (Reino Unido)

DSMZ: Deutsche Sammlung de Mikroorganismen y Zellkulturen, Brunswick, Alemania

15 Aquí se prefieren particularmente microorganismos de las bacterias del género *Corynebacterium*, principalmente aquellas que ya son capaces de producir L-lisina, L-metionina y/o L-treonina. Estas son principalmente corinebacterias en las que, por ejemplo, el gen que codifica una aspartato cinasa (gen ask) está desregulado o está eliminada o reducida la inhibición feedback (de retroalimentación). Por ejemplo, tales bacterias tienen una mutación en el gen ask, que conduce a una reducción o a una eliminación de la inhibición feedback (de retroalimentación) tal como, por ejemplo, la mutación T3111.

20 Las unidades de expresión permiten regular las vías metabólicas hacia productos biosintéticos específicos en las bacterias corineformes genéticamente modificadas anteriormente descritas de acuerdo con la invención.

Para este propósito, las vías metabólicas que conducen hacia un producto biosintético específico, por ejemplo, se refuerzan provocando o aumentando la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de los genes de esta

vía biosintética en la que la elevada cantidad de proteína conduce a una actividad total incrementada de estas proteínas de la vía biosintética deseada y, de esta manera, hacia un flujo metabólico reforzado hacia el producto biosintético deseado.

5 Además, las vías metabólicas que no conducen a un producto biosintético específico pueden atenuarse reduciendo la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de genes de esta vía biosintética divergente en la que la cantidad reducida de proteína conduce a una actividad total reducida de estas proteínas de la vía biosintética no deseada y, de esta manera, adicionalmente a un flujo metabólico reforzado hacia el producto biosintético deseado.

10 Las bacterias corineformes genéticamente modificadas de la invención son capaces, por ejemplo, de producir productos biosintéticos a partir de glucosa, sacarosa, lactosa, fructosa, maltosa, melaza, almidón, celulosa o de glicerina y etanol.

La invención, por lo tanto, se refiere a un proceso para producir productos biosintéticos cultivando las bacterias corineformes genéticamente modificadas de la invención.

15 Dependiendo del producto biosintético deseado, la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de diferentes genes debe aumentarse o reducirse. Por lo regular es ventajoso modificar la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de varios genes; es decir, aumentar la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de una combinación de genes y/o reducir la velocidad de transcripción o la velocidad de expresión de una combinación de genes.

20 En las bacterias corineformes genéticamente modificadas de la invención, al menos una velocidad de transcripción o velocidad de expresión modificada, es decir incrementada o reducida, de un gen puede atribuirse a una unidad de expresión.

Otras velocidades de expresión modificadas adicionales, es decir adicionalmente aumentadas o adicionalmente reducidas, de otros genes en la bacteria corineforme genéticamente modificada pueden, aunque no tienen que, originarse en las unidades de expresión.

25 La invención, por lo tanto, se refiere además a un proceso para producir productos biosintéticos cultivando bacterias corineformes genéticamente modificadas de la invención.

V. Campos de aplicación de la invención

Los casetes de expresión y los vectores pueden (utilizarse), por ejemplo, de manera particularmente ventajosa en procesos mejorados para la producción por fermentación de productos biosintéticos, tal como se describe a continuación.

30 Los casetes de expresión que comprenden unidades de expresión, que contienen promotores múltiples, tienen principalmente la ventaja de permitir una modulación de la expresión del gen estructural enlazado funcionalmente.

35 Los casetes de expresión que comprenden unidades de expresión pueden utilizarse para modificar, es decir aumentar o reducir, o para provocar la velocidad de expresión de genes en microorganismos, en comparación con los de tipo silvestre. Esto proporciona la posibilidad, en el caso de un aumento en la velocidad de expresión, de maximizar la expresión del gene en cuestión. Eligiendo una unidad de expresión adecuada, sin embargo, la expresión también puede efectuarse a una intensidad que está por debajo del valor máximo que puede obtenerse mediante otra unidad de expresión, pero la cual al mismo tiempo libera el producto de expresión en una cantidad más compatible para el microorganismo que se está expresando. Esto es particularmente ventajoso si son tóxicas concentraciones demasiado altas del producto de expresión para el microorganismo que se está expresando. Las unidades de expresión de la invención permiten de esta manera, mediante selección entre unidades de expresión con intensidad de expresión respectivamente diferente, la regulación fina de la expresión a un valor óptimo, principalmente en el caso de expresión a largo plazo.

40 Además, los casetes de expresión que comprenden unidades de expresión pueden servir para regular y reforzar la formación de productos biosintéticos diferentes, como por ejemplo productos de química fina, proteínas, principalmente aminoácidos, en microorganismos, principalmente especies de *Corynebacterium*.

VI. Productos biosintéticos y métodos de producción preferidos

Los productos biosintéticos preparados de acuerdo con la invención son productos de química fina.

El término "producto de química fina" es corriente para el experto en la materia e incluye compuestos que se producen por un organismo y son utilizados en diversas ramas de la industria, tales como, por ejemplo, aunque sin restringirse a, la industria farmacéutica, agrícola, de cosméticos, de alimentos y comida para animales. Estos compuestos comprenden ácidos orgánicos tales como, por ejemplo, ácido láctico, ácido succínico, ácido tartárico, ácido itacónico y ácido diaminopimélico y aminoácidos, tanto proteínogénicos como también no proteínogénicos, bases de purina y bases de pirimidina, nucleósidos y nucleótidos (como se describe por ejemplo en Kuninaka, A. (1996) Nucleotides and related compounds, páginas 561-612, en *Biotechnology* volumen 6, Rehm et al., editores VCH: Weinheim y las citas allí contenidas), lípidos, ácidos grasos saturados e insaturados (por ejemplo, ácido araquidónico), dioles (por ejemplo, propandiol y butandiol), carbohidratos (por ejemplo, ácido hialurónico y trehalosa), compuestos aromáticos (por ejemplo, aminas aromáticas, vanilina e índigo), vitaminas y cofactores (tal como se describen en *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, volumen A27, "Vitamins", páginas 443-613 (1996) VCH: Weinheim y las citas allí contenidas; y Ong, A.S., Niki, E. y Packer, L. (1995) "Nutrition, Lipids, Health and Disease" *Proceedings of the UNESCO/Confederation of Scientific and Technological Associations in Malaysia and the Society for Free Radical Research - Asia*, celebrada 1.-3. Sept. 1994 en Penang, Malasia, AOCS Press (1995)), Enzimas y todas los otros químicos descritos por Gutcho (1983) en *Chemicals by Fermentation*, Noyes Data Corporation, ISBN: 0818805086 y las referencias bibliográficas allí indicadas.

Productos biosintéticos particularmente preferidos se seleccionan del grupo de ácidos orgánicos, proteínas, nucleótidos y nucleósidos, aminoácidos, tanto proteínogénicos como también no proteínogénicos, lípidos y ácidos grasos, dioles, carbohidratos, compuestos aromáticos, vitaminas y cofactores, enzimas y proteínas.

Ácidos orgánicos preferidos son ácido láctico, ácido succínico, ácido tartárico, ácido itacónico y ácido diaminopimélico.

Nucleósidos y nucleótidos preferidos se describen preferiblemente en Kuninaka, A. (1996) Nucleotides and related compounds, páginas 561-612, en *Biotechnology* volumen 6, Rehm et al., editores VCH: Weinheim y las citas allí contenidas.

Los productos biosintéticos preferidos son, además, lípidos, ácidos grasos saturados y no saturados tal como, por ejemplo, el ácido araquidónico, dioles tales como, por ejemplo, propandiol y butandiol, carbohidratos tales como, por ejemplo, el ácido hialurónico y trehalosa, compuestos aromáticos tales como, por ejemplo, aminas aromáticas, vanilina e índigo vitaminas y cofactores como se describe, por ejemplo, en *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, volumen A27, "Vitamins", páginas 443-613 (1996) VCH: Weinheim y las citas allí contenidas; y Ong, A.S., Niki, E. y Packer, L. (1995) "Nutrition, Lipids, Health and Disease" *Proceedings of the UNESCO/Confederation of Scientific and Technological Associations in Malaysia and the Society for Free Radical Research - Asia*, celebrada en 1.-3. Sept. 1994 en Penang, Malasia, AOCS Press (1995)), enzimas policétidos (Cane et al. (1998) *Science* 282: 63-68), y todos los otros productos químicos descritos por Gutcho (1983) en *Chemicals by Fermentation*, Noyes Data Corporation, ISBN: 0818805086 y las referencias bibliográficas allí citadas.

Productos biosintéticos particularmente preferidos son aminoácidos, de manera particularmente preferida aminoácidos esenciales, principalmente L-glicina, L-alanina, L-leucina, L-metionina, L-fenilalanina, L-triptófano, L-lisina, L-glutamina, ácido L-glutámico, L-serina, L-prolina, L-valina, L-isoleucina, L-cisteína, L-tirosina, L-histidina, L-arginina, L asparagina, ácido L-aspártico y L-treonina, L-homoserina, principalmente L-lisina, L-metionina y L-treonina. En lo sucesivo, por un aminoácido como, por ejemplo, lisina, metionina y treonina se entiende aquí respectivamente la forma L y D del aminoácido, preferiblemente la forma L, es decir, por ejemplo L-lisina, L-metionina y L-treonina.

En las secciones siguientes se describe más exactamente la producción de lisina, de metionina y de treonina, que se prefieren particularmente.

a) Producción de lisina

La invención se refiere principalmente a un proceso para producir lisina cultivando bacterias corineformes genéticamente modificadas con velocidad de expresión aumentada o provocada de al menos un gen en comparación con el de tipo silvestre, donde

- la expresión de al menos un gen en la bacteria corineforme se causa o se modifica introduciendo a la bacteria corineforme un casete de expresión de la invención, el cual comprende el gen.

Los genes se seleccionan aquí en particular de entre ácidos nucleicos que codifican un aspartato cinasa, ácidos nucleicos que codifican un aspartato semialdehído dehidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un diaminopimelato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un diaminopimelato descarboxilasa, ácidos nucleicos que codifican un dihidrodipicolinato sintetasa, ácidos nucleicos que codifican un dihidrodipicolinato reductasa, ácidos nucleicos que codifican una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que

codifican una 3-fosfoglicerato cinasa, ácidos nucleicos que codifican una piruvato carboxilasa, ácidos nucleicos que codifican una triosafosfato isomerasa, ácidos nucleicos que codifican un regulador transcripcional LuxR, ácidos nucleicos que codifican un regulador transcripcional LysR1, ácidos nucleicos que codifican un regulador transcripcional LysR2, ácidos nucleicos que codifican un malato quinona oxidoreductasa, ácidos nucleicos que codifican una glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican una transaldolasa, ácidos nucleicos que codifican un exportador de lisina, ácidos nucleicos que codifican una biotina ligasa, ácidos nucleicos que codifican un arginil-ARNt sintetasa, ácidos nucleicos que codifican una fosfoenolpiruvato carboxilasa, ácidos nucleicos que codifican una fructosa-1,6-bifosfatasa, ácidos nucleicos que codifican una proteína OpcA, ácidos nucleicos que codifican una 1-fosfofructocinasa, ácidos nucleicos que codifican una 6-fosfofructocinasa, ácidos nucleicos que codifican una tetrahidropicolinato succinilasa, ácidos nucleicos que codifican una succinil aminocetopimelato aminotransferasa, ácidos nucleicos que codifican una succinil diaminopimelato desuccinilasa, ácidos nucleicos que codifican una diaminopimelato epimerasa, ácidos nucleicos que codifican una 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican una glucosa fosfato isomerasa, ácidos nucleicos que codifican una fosfoglicerato mutasa, ácidos nucleicos que codifican una enolasa, ácidos nucleicos que codifican una piruvato-cinasa, ácidos nucleicos que codifican una aspartato-transaminasa y ácidos nucleicos que codifican una malato-enzima.

Otra forma de realización preferida del proceso descrito previamente para producir lisina se caracteriza porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas en comparación con el tipo silvestre presenta una actividad elevada, al menos una de las actividades seleccionadas entre:

20 Actividad de aspartato-cinasa, actividad de aspartato-semialdehído-deshidrogenasa, actividad de diaminopimelato-deshidrogenasa, actividad de diaminopimelato-decarboxilasa, actividad de dihidrodipicolinato-sintetasa, actividad de dihidrodipicolinato-reductasa, actividad de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, actividad de 3-fosfoglicerato-cinasa, actividad de piruvato carboxilasa, actividad de triosafosfato-isomerasa, actividad del Regulador transcripcional LuxR, actividad del regulador transcripcional LysR1, actividad del regulador transcripcional LysR2, actividad de malato-quinona-oxidoreductasa, actividad de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, actividad de 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, actividad de transcetolasa, actividad de transaldolasa, actividad de exportador de lisina, actividad de arginilo-ARN-t-sintetasa, actividad de fosfoenolpiruvato-carboxilasa, actividad de fructosa 1,6-bifosfatasa, actividad de la proteína OpcA, actividad de la 1-fosfofructocinasa, actividad de la 6-fosfofructocinasa, actividad de biotina ligasa, y actividad de tetrahidropicolinato succinilasa, actividad de succinil aminocetopimelato aminotransferasa, actividad de succinil diaminopimelato desuccinilasa, actividad de diaminopimelato epimerasa, actividad de 6-fosfogluconato deshidrogenasa, actividad de glucosa fosfato isomerasa, actividad de fosfoglicerato mutasa, actividad de enolasa, actividad de piruvato cinasa, actividad de aspartato transaminasa y actividad de enzima de malato.

Otra modalidad particularmente preferida del proceso descrito anteriormente para producir lisina se caracteriza porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas que tienen, en comparación con el tipo silvestre, adicionalmente una actividad reducida, de al menos una de las actividades seleccionadas del grupo de actividad de treonina deshidratasa, actividad de homoserina O-acetiltransferasa, actividad de O-acetilhomoserina sulfhidrilasa, actividad de fosfoenolpiruvato carboxilasa, actividad de piruvato oxidasa, actividad de homoserina cinasa, actividad de homoserina deshidrogenasa, actividad del exportador de treonina, actividad de proteína de efflux-treonina, actividad de asparaginasa, actividad de aspartato descarboxilasa y actividad de treonina sintasa.

b) Producción de metionina

La invención se refiere además a un proceso para producir metionina cultivando bacterias corineformes genéticamente modificadas con velocidad de expresión incrementada o provocada de al menos un gen en comparación con el tipo silvestre, en cuyo caso

45 - la expresión de al menos un gen en la bacteria corineforme se provoca o se modifica introduciendo en las bacterias corineformes un casete de expresión que comprende el gen.

Los genes se seleccionan aquí principalmente entre ácidos nucleicos que codifican una aspartato cinasa, ácidos nucleicos que codifican un aspartato semialdehído deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un homoserina deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un 3-fosfoglicerato cinasa, ácidos nucleicos que codifican un piruvato carboxilasa, ácidos nucleicos que codifican un triosafosfato isomerasa, ácidos nucleicos que codifican un homoserina O-acetiltransferasa, ácidos nucleicos que codifican una cistahionina gamma-sintasa, ácidos nucleicos que codifican una cistahionina beta liasa, ácidos nucleicos que codifican una serina hidroximetiltransferasa, ácidos nucleicos que codifican una O-acetilhomoserina sulfhidrilasa, ácidos nucleicos que codifican una metileno-tetrahidrofolato reductasa, ácidos nucleicos que codifican una fosfoserina aminotransferasa, ácidos nucleicos que codifican una fosfoserina fosfatasa, ácidos nucleicos que codifican una serina acetil transferasa, ácidos nucleicos que codifican una actividad de cisteína cintasa I, ácidos nucleicos que codifican una actividad de cisteína sintasa II, ácidos nucleicos que codifican una actividad de metionina sintasa dependiente de la coenzima B 12, ácidos nucleicos que codifican una actividad de

- metionina sintasa independiente de la coenzima B-12, ácidos nucleicos que codifican una actividad de un sulfato adeniltransferasa, ácidos nucleicos que codifican una actividad de una fosfoadenosina fosfosulfato reductasa, ácidos nucleicos que codifican una actividad de una ferredoxin sulfito reductasa, ácidos nucleicos que codifican un actividad de ferredoxin NADPH reductasa, ácidos nucleicos que codifican un actividad de ferredoxin, ácidos nucleicos que codifican un proteína de reducción RXA077 de sulfato, ácidos nucleicos que codifican un proteína de reducción de sulfato RXA248, ácidos nucleicos que codifican un proteína de reducción de sulfato RXA247, ácidos nucleicos que codifican un regulador RXA655 y ácidos nucleicos que codifican un regulador RXN2910. Ácidos nucleicos que codifican 6-fosfogluconato deshidrogenasa, glucosa fosfato isomerasa, fosfoglicerato mutasa, enolasa, piruvato cinasa, aspartato transaminasa o enzima de malato.
- 5
- 10 Otra modalidad preferida del proceso descrito anteriormente para producir metionina se caracteriza porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas, en comparación con el tipo silvestre, tienen adicionalmente una actividad incrementada de al menos una de las actividades seleccionadas del grupo de actividad de aspartato cinasa, actividad de aspartato-semialdehído-deshidrogenasa, actividad de homoserina deshidrogenasa, actividad de glicerinaldehído-3-fosfato deshidrogenasa, actividad de 3-fosfoglicerato cinasa, actividad de piruvato carboxilasa,
- 15 actividad de triosafosfato isomerasa, actividad de homoserina O-acetiltransferasa, actividad de cistahionina gamma-sintasa, actividad de cistahionina beta-liasa, actividad de serina-hidroxi metiltransferasa, actividad de O-acetilhomoserina-sulfhidrilasa, actividad de metilen-tetrahidrofolato-reductasa, actividad de fosfoserina-aminotransferasa, actividad de fosfoserina-fosfatasa, actividad de serina acetil-transferasa, actividad de cisteína-sintasa, actividad de cisteína-sintasa II, actividad de de metionina-sintasa dependiente de coenzima B12, actividad de metionina-sintasa independiente de coenzima B12, actividad de sulfato-adeniltransferasa, actividad de fosfoadenosina-fosfosulfato-reductasa, actividad de ferredoxina-sulfito-reductasa, actividad de ferredoxina NADPH-reductasa, actividad de ferredoxina, actividad de proteína de la reducción de sulfato RXA077, actividad de una proteína de la reducción de sulfato RXA248, actividad de una proteína de la reducción de sulfato RXA247, actividad de un regulador RXA655 y actividad de un regulador RXN2910, actividad de una 6-fosfogluconato-deshidrogenasa,
- 20 actividad de una glucosafosfato-isomerasa, actividad de una fosfoglicerato-mutasa, actividad de una enolasa, actividad de una piruvato-cinasa, actividad de una aspartato-transaminasa y actividad de la malato-enzima.
- 25

- Otra modalidad particularmente preferida del método descrito anteriormente para producir metionina se caracteriza porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas tienen adicionalmente, en comparación con el tipo silvestre, una actividad reducida, de al menos una de las actividades seleccionadas del grupo de actividad de homoserina cinasa, actividad de treonina deshidratasa, actividad de treonina sintasa, actividad de meso-diaminopimelato D-deshidrogenasa, actividad de fosfoenolpiruvato carboxicinas, actividad de piruvato oxidasa, actividad de dihidrodipicolinato sintasa, actividad de dihidropicolinato reductasa y actividad de diaminopicolinato descarboxilasa.
- 30

c) Producción de treonina

- 35 La invención se refiere además a un proceso para producir treonina cultivando bacterias corineformes genéticamente modificadas con velocidad de expresión incrementada o provocada de al menos un gen en comparación con el tipo silvestre, en cuyo caso

- la expresión de al menos un gen en la bacteria corineforme se provoca o se modifica introduciendo a la bacteria corineforme un casete de expresión que comprende el gen.

- 40 Los genes se seleccionan aquí principalmente entre ácidos nucleicos que codifican un aspartato cinasa, ácidos nucleicos que codifican un aspartato semialdehído deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un 3- fosfoglicerato cinasa, ácidos nucleicos que codifican un piruvato carboxilasa, ácidos nucleicos que codifican una triosafosfato isomerasa, ácidos nucleicos que codifican una homoserina-cinasa, ácidos nucleicos que codifican una treonina sintasa, ácidos nucleicos que codifican un portador transportador de treonina, ácidos nucleicos que codifican una glucose-6-fosfato-deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican una transaldolasa, ácidos nucleicos que codifican una transcetolasa, ácidos nucleicos que codifican una malato-quinona-oxidoreductasa, ácidos nucleicos que codifican una 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, ácidos nucleicos que codifican un exportador de lisina, ácidos nucleicos que codifican una biotina-ligasa, ácidos nucleicos que codifican una fosfoenolpiruvato-carboxilasa, ácidos nucleicos que codifican una proteína Efflux de treonina, ácidos nucleicos que codifican una fructosa-1,6-bisfosfatasa, ácidos nucleicos que codifican una proteína OpcA, ácidos nucleicos que codifican una 1-fosfofructocinasa, ácidos nucleicos que codifican una 6-fosfofructocinasa, y ácidos nucleicos que codifican una homoserina-deshidrogenasa y ácidos nucleicos que codifican una 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, glucosafosfato-isomerasa, fosfoglicerato-mutasa, enolasa, piruvato-cinasa, aspartato-transaminasa y malato-enzima.
- 45
- 50

- 55 Otra modalidad preferida del método descrito previamente para producir treonina se caracteriza porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas tienen adicionalmente, en comparación con el tipo silvestre, una actividad incrementada, de al menos una de las actividades seleccionadas del grupo:

5 actividad de aspartatocinasa, actividad de aspartato-semialdehído-deshidrogenasa, actividad de gliceraldehído-3-
fosfato deshidrogenasa, actividad de 3-fosfoglicerat cinasa, actividad de piruvato carboxilasa, actividad de
triosafosfato isomerasa, actividad de treonina sintasa, actividad de un portador transportador de treonina, actividad
de transaldolasa, actividad de transcetolasa, actividad de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, actividad de malato-
quinona-oxidoreductasa, actividad de homoserina-cinasa, actividad de biotina-ligasa, actividad de fosfoenolpiruvato-
carboxilasa, actividad de proteína de efflux-treonina, actividad de proteína OpcA, actividad de 1-fosfofructocinasa,
15 actividad de 6-fosfofructocinasa, actividad de fructosa 1,6-bisfosfatasa, actividad de 6-fosfogluconato-
deshidrogenasa, actividad de homoserina-deshidrogenasa, actividad de una 6-fosfogluconato-deshidrogenasa,
actividad de una glucosafosfato-isomerasa, actividad de una fosfoglicerato-mutasa, actividad de una enolasa,
20 actividad de una piruvato-cinasa, actividad de una aspartato-transaminasa y actividad de la malato-enzima.

Otra modalidad particularmente preferida del proceso previamente descrito para producir treonina se caracteriza
porque las bacterias corineformes genéticamente modificadas tienen adicionalmente, en comparación con el tipo
silvestre, una actividad reducida, de al menos una de las actividades, seleccionadas del grupos de actividad de
15 treonina – deshidratasa, actividad de homoserina O-acetiltransferasa, actividad de serina-hidroximetiltransferasa,
actividad de O-acetilhomoserina-sulfhidrilasa, actividad de meso-diaminopimelato D-deshidrogenasa, actividad de
fosfoenolpiruvato-carboxicinas, actividad de piruvato-oxidasa, actividad de dihidrodipicolinato sintetasa, actividad de
dihidrodipicolinato reductasa, actividad de asparaginasa, actividad de aspartato-descarboxilasa, actividad de
exportador de lisina, actividad de acetolactato-sintasa, actividad de ácido cetol reductoisomerasa, actividad de
20 aminotransferasa de cadena ramificada, actividad de metionina sintasa dependiente de la coenzima B-12, actividad
de metionina sintasa independiente de la coenzima B-12, actividad de dihidroxi ácido deshidratasa y actividad de
diaminopicolinato descarboxilasa.

d) Otros datos sobre la producción de bioproductos según la invención

Estas actividades incrementadas o reducidas adicionales de al menos una de las actividades descritas
anteriormente pueden, aunque no necesariamente, provocarse por una unidad de expresión de la invención o por un
25 casete de expresión de la invención. Actividades de al menos una de las actividades previamente descritas pueden,
pero no tienen que, ocasionarse por uno o por un casete de expresión.

Por el término "actividad" de una proteína se entiende, en el caso de una enzima, la actividad enzimática de la
proteína correspondiente; en el caso de otras proteínas, como por ejemplo proteínas de estructura o de transporte,
la actividad fisiológica de las proteínas.

30 Las enzimas por lo regular están en capacidad de transformar un sustrato a un producto o de catalizar este paso de
transformación. Por consiguiente, por "actividad" de una enzima se entiende la cantidad convertida del sustrato o la
cantidad formada de producto por parte de la enzima en un tiempo determinado.

En el caso de una actividad incrementada en comparación con el tipo silvestre se incrementa de esta manera la
cantidad transformada de sustrato o la cantidad formada de producto por parte de la enzima, en comparación con el
35 tipo silvestre en un tiempo determinado.

A manera de ejemplo, este incremento de la "actividad", en el caso de todas las actividades descritas antes y
después, es de al menos 1 a 5 %, como por ejemplo de al menos 20 %, de al menos 50 %, de al menos 100 %, de
al menos 300 %, o de al menos 500%, o de al menos 600 % de la "actividad del tipo silvestre".

En el caso de una actividad reducida en comparación con el tipo silvestre, se reduce la cantidad convertida de
40 sustrato o la cantidad de producto formado por parte de la enzima en un tiempo determinado.

Por una actividad reducida se entiende preferentemente la supresión o bloqueo parcial o esencialmente total,
basado en diferentes mecanismos biológicos celulares, de la funcionalidad de estas enzimas en un microorganismo.

Una reducción de la actividad comprende una disminución cuantitativa de una enzimas hasta una ausencia
esencialmente completa de la enzimas (es decir, falta de detectabilidad de la correspondiente actividad o falta de
45 detectabilidad inmunológica de la enzima). La actividad en el microorganismo se reduce en comparación con el tipo
silvestre en al menos 5 %, como al menos 20 %, al menos 50 %, o en aproximadamente 100 %. "Reducción"
también significa principalmente la falta total de la actividad correspondiente.

La actividad de determinadas enzimas en microorganismos genéticamente modificados así como en el tipo silvestre
y de esta manera el incremento o la reducción de la actividad enzimática pueden determinarse de acuerdo con
50 métodos conocidos, como por ejemplo ensayos enzimáticos.

Un incremento adicional de actividades puede efectuarse de diferentes manera, por ejemplo desconectando mecanismos de regulación inhibitorios a nivel de expresión o de proteína o incrementando la expresión del gen de ácidos nucleicos que codifican las proteínas previamente descritas en comparación con el tipo silvestre.

5 El incremento de la expresión del gen de los ácidos nucleicos que codifican las proteínas descritas anteriormente frente al tipo nativo puede efectuarse igualmente de maneras diferentes, por ejemplo induciendo el gen mediante activadores o, como se describió anteriormente, incrementando la actividad de promotor o incrementando la actividad de expresión o introduciendo una o más copias del gen en el microorganismo.

10 Por aumento de la expresión del gen de un ácido nucleico que codifica una proteína también se entiende de acuerdo con la invención la manipulación de la expresión de las proteínas endógenas propias del microorganismo. Esto puede lograrse por ejemplo, como se describió anteriormente, modificando las secuencias de promotor de los genes, introduciendo una unidad de expresión para el control regulador de los genes y modificando las unidades de expresión introducidas. Una modificación tal, que tiene como consecuencia una velocidad de expresión incrementada del gen, puede efectuarse por ejemplo por eliminación o inserción de secuencias de ADN.

15 Es posible, tal como se describió previamente, modificar la expresión de las proteínas endógenas mediante la aplicación de estímulos exógenos. Esto puede efectuarse mediante condiciones fisiológicas particulares, es decir mediante la aplicación de sustancias externas.

20 Para lograr un incremento de la expresión del gen el experto en la materia puede adoptar otras medidas diferentes, de manera individual o en combinación. Así, por ejemplo, el número de copias de los genes correspondientes puede elevarse o la región de promotor y regulación, o el sitio de enlace ribosómico que se encuentra corriente arriba del gen estructural, puede mutarse. Adicionalmente es posible incrementar la expresión durante la producción fermentativa a través de promotores inducibles. Los procedimientos para prolongar el tiempo de vida del ARNm mejoran igualmente la expresión. Además, la actividad enzimática también se refuerza previniendo la degradación de la proteína de la enzima. Los genes o las constructos del gen pueden estar presentes en plásmidos con diferente número de copias o integrados y amplificados en el cromosoma. De manera alterna, también puede lograrse una sobreexpresión de los genes relevantes modificando la composición del medio y mediante el control del cultivo.

25 El experto en la materia encuentra instrucciones para esto, entre otras, en Martin et al. (Biotechnology 5, 137-146 (1987)), en Guerrero et al. (Gene 138, 35-41 (1994)), Tsuchiya y Morinaga (Bio/Technology 6, 428-430 (1988)), en Eikmanns et al. (Gene 102, 93-98 (1991)), in der EP-A-0472869, en US -A-4,601,893, en Schwarzer y Pühler (Biotechnology 9, 84-87 (1991)), en Remscheid et al. (Applied and Environmental Microbiology 60,126-132 (1994)), en LaBarre et al. (Journal of Bacteriology 175, 1001-1007 (1993)), en la WO 96/15246, en Malumbres et al. (Gene 134, 15-24 (1993)), en la JP-A-10-229891, en Jensen y Hammer (Biotechnology and Bioengineering 58,191-195 (1998)), en Makrides (Microbiological Reviews 60 : 512-538 (1996)) y en textos de enseñanza conocidos de genética y biología molecular.

35 Adicionalmente puede ser ventajoso para la producción de productos biosintéticos, principalmente L-lisina, L-metionina y L-treonina, junto con la expresión o intensificación de un gen, eliminar reacciones laterales no deseadas (Nakayama: "Breeding of Amino Acid Producing Microorganisms", en: Overproduction of Microbial Products, Krumfanzl, Sikyta, Vanek (eds.), Academic Press, London, UK, 1982).

40 En una modalidad preferida, el incremento de la expresión del gen de un ácido nucleico que codifica una de las proteínas descritas anteriormente, se efectúa introduciendo al microorganismo al menos un ácido nucleico que codifica una proteína correspondiente. La introducción del ácido nucleico puede efectuarse de manera cromosómica o de manera extracromosómica, es decir, incrementando en el microorganismo huésped el número de copias en el cromosoma y/o una copia del gen sobre un plásmido que se replica.

45 La introducción del ácido nucleico, por ejemplo en la forma de un casete de expresión de la invención que comprende el ácido nucleico, preferiblemente se efectúa de manera cromosómica, principalmente por el método SacB descrito previamente. Es posible en principio usar para este propósito cualquier gen que codifica una de las proteínas descritas previamente.

50 En el caso de secuencias de ácidos nucleicos genómicos de fuentes eucariotas las cuales contienen intrones, si el microorganismo huésped es incapaz o no puede ser hecho capaz de expresar las proteínas correspondientes se prefiere usar secuencias de ácidos nucleicos las cuales ya han sido procesadas, tal como los ADNc correspondientes.

Ejemplos de genes correspondientes se listan en las tablas 1 y 2.

La reducción de las actividades descritas previamente en bacterias corineformes se efectúa preferentemente mediante al menos uno de los siguientes métodos:

- la introducción de al menos una secuencia de ácido ribonucleico sense (sentido) para inducir una cosupresión o de un casete de expresión que garantiza su expresión
 - la introducción de al menos un factor de enlace de ADN o de proteína para un gen correspondiente, un ARN o una proteína o de un casete de expresión que garantiza su expresión
- 5
- la introducción de al menos una secuencia de ácido nucleico viral la cual provoca degradación de ARN o de un casete de expresión que garantiza su expresión
- la introducción de al menos un constructo para generar una pérdida de función, tal como, por ejemplo, la generación de stop-codones o desplazamientos en la estructura de lectura, de un gen, por ejemplo generando una inserción, eliminación, inversión o mutación en un gen. Preferiblemente pueden generarse mutantes knockout mediante inserción dirigida al gen objetivo deseado a través de la recombinación homóloga o de la introducción de nucleasas de secuencias específicas contra el gen objetivo.
- 10
- la introducción de un promotor con actividad de promotor reducida o de una unidad de expresión con actividad de expresión reducida.
 - La introducción de un ARN antisense (de antisentido) que reduce la traslación del ARN sense (de sentido) (ARNm).
- 15
- Para el experto en la materia es conocido que también pueden emplearse otros métodos en el contexto de la presente invención para reducir su actividad o función. Por ejemplo, también puede ser ventajosa la introducción de una variante negativa dominante de una proteína o de un casete de expresión que garantiza su expresión.

Además, cada uno de estos procesos individuales puede producir una reducción en la cantidad de proteína, la cantidad de ARNm y/o la actividad de una proteína. También es concebible una aplicación combinada. Otros métodos son conocidos por el experto en la materia y pueden comprender impedir o suprimir el procesamiento de la proteína, el transporte de la proteína o su ARNm, la inhibición de la adición del ribosoma, la inhibición de la unión del ARN, la inducción de una enzima que degrada el ARN y/o la inhibición o la terminación de la elongación de la traslación.

VII. Cultivo de bacterias corineformes y aislamiento de producto

- 25
- En el proceso de la invención para producir productos biosintéticos, la etapa de cultivo de los microorganismos genéticamente modificados es preferiblemente seguida por un aislamiento los productos biosintéticos de los microorganismos y/o del caldo de fermentación. Estas etapas pueden tener lugar al mismo tiempo y/o preferiblemente después de la etapa de cultivo.

30

Las bacterias corineformes genéticamente modificados de la invención pueden cultivarse para producir productos biosintéticos, principalmente L-lisina, L-metionina, L-treonina, de manera continua o de manera discontinua en un proceso por lotes (cultivo por lote) o en procesos de alimentación por lotes o de alimentación por lotes repetidos. Un resumen de métodos de cultivo conocidos se encuentra en el libro de texto de Chemiel (Bioprozeßtechnik 1. Einführung in die Bioverfahrenstechnik (Tecnología de bioprocesos 1. Introducción a la tecnología de bioprocesos) (Editorial Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1991)) o en el libro de texto de Storhas (Bioreaktoren y periphere Einrichtungen (Bioreactores y dispositivos periféricos) (editorial Vieweg Verlag, Brunswick/Wiesbaden, 1994)).

35

El medio de cultivo a usarse debe satisfacer de una manera adecuada las exigencias de las cepas respectivas. Existen descripciones de medios de cultivo para diversos microorganismos en el manual "Manual of Methods for General Bacteriology" de la American Society for Bacteriology (Washington D.C., USA, 1981).

- 40
- Estos medios que pueden emplearse de acuerdo a la invención usualmente comprenden una o más fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, sales inorgánicas, vitaminas y/o microelementos.

Fuentes de carbono preferidas son los azúcares tales como los mono-, di- o polisacáridos. Ejemplos de fuentes de carbono muy buenas son la glucosa, fructosa, manosa, galactosa, ribosa, sorbosa, ribulosa, lactosa, maltosa, sacarosa, rafinosa, almidón o celulosa. Los azúcares pueden también ponerse en el medio a través de compuestos complejos tales como las melazas u otros subproductos de la refinación de azúcar. También puede ser ventajoso

45

agregar mezclas de diversas fuentes de carbono. Otras posibles fuentes de carbono son los aceites y las grasas tales como, por ejemplo, aceite de soya, aceite de girasol, aceite de cacahuete y grasa de coco, ácidos grasos tales como, por ejemplo, ácido palmítico, ácido esteárico o ácido linoleico, alcoholes tales como, por ejemplo, glicerina, metanol o etanol y ácidos orgánicos tales como, por ejemplo, ácido acético o ácido láctico.

Las fuentes de nitrógeno son usualmente compuestos de nitrógeno orgánicos e inorgánicos o materiales que contienen estos compuestos. Ejemplos de fuentes de nitrógeno comprenden gas amoniacal o sales de amonio tales

50

como sulfato de amonio, cloruro de amonio, fosfato de amonio, carbonato de amonio o nitrato de amonio, nitratos, urea, aminoácidos o fuentes de nitrógeno de complejas tales como agua de infusión de maíz, harina de soya, proteína de soya, extracto de levadura, extracto de carne y otros. Las fuentes de nitrógeno pueden usarse de manera individual o como mezcla.

- 5 Los compuestos de sales inorgánicas los cuales pueden estar presentes en el medio comprenden las sales de cloruro, de fósforo, o sales sulfatos de calcio, magnesio, sodio, cobalto, molibdeno, potasio, manganeso, cinc, cobre y hierro.

10 Como fuentes de azufre para producir productos de química fina, principalmente metionina, pueden usarse compuestos inorgánicos tales como, por ejemplo, sulfatos, sulfitos, ditionitos, tetracionatos, tiosulfatos, sulfuros, pero también compuestos de azufre orgánicos tales como mercaptanos y tioles.

Como fuente de fósforo puede usarse ácido fosfórico, dihidrofosfato de potasio o hidrofosfato de dipotasio o las sales correspondientes que contienen sodio.

15 Pueden agregarse agentes formadores de quelatos al medio para mantener los iones metálicos en solución. Agentes formadores de quelatos particularmente adecuados comprenden dihidroxifenoles tales como catecol o protocatecate o ácidos orgánicos tal como el ácido cítrico.

20 Los medios de fermentación empleados de acuerdo con la invención usualmente también contienen otros factores de crecimiento tales como vitaminas o promotores de crecimiento, a los cuales pertenecen por ejemplo, biotina, riboflavina, tiamina, ácido fólico, ácido nicotínico, pantotenato y piridoxina. Los factores de crecimiento y las sales frecuentemente provienen de componentes complejos del medio, tales como extracto de levadura, melazas, agua de infusión de maíz, y similares. También pueden agregarse precursores adecuados al medio de cultivo. La composición exacta de los compuestos en el medio depende en gran medida del experimento respectivo y se decide de manera individual para cada caso específico. Información sobre la optimización del medio se puede obtener del manual "Applied Microbiol. Physiology, A Practical Approach" (editores P.M. Rhodes, P.F. Stanbury, IRL Press (1997) páginas 53-73, ISBN 0 19 963577 3). Medios de cultivo también pueden comprarse de proveedores comerciales, como Standard 1 (Merck) o BHI (Brain heart infusion, DIFCO) y similares.

25 Todos los componentes del medio se esterilizan ya sea con calor (20 min a 1,5 bar y 121°C) o mediante esterilización por filtración. Los componentes pueden esterilizarse ya sea juntos o si es necesario de manera separada. Todos los componentes del medio pueden estar presentes al inicio del cultivo u opcionalmente pueden agregarse de manera continua o a manera de lotes.

30 La temperatura del cultivo está normalmente entre 15°C y 45°C, preferiblemente a 25°C hasta 40°C y puede mantenerse constante o modificarse durante el experimento. El pH del medio debe estar en el rango de 5 a 8,5, preferiblemente alrededor de 7,0. El pH para el cultivo puede controlarse durante el cultivo agregando compuestos básicos tales como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, amoníaco o amoníaco acuoso o compuestos ácidos tales como ácido fosforito o ácido sulfúrico. El desarrollo de espuma puede controlarse empleando antiespumantes tales como, por ejemplo, esteres de poliglicol de ácido graso. La estabilidad de los plásmidos puede mantenerse agregando sustancias adecuadas al medio con una acción selectiva, tal como, por ejemplo, antibióticos. Las condiciones aeróbicas se mantienen introduciendo al cultivo oxígeno o mezclas de gas que contienen oxígeno, como por ejemplo aire de ambiente. La temperatura del cultivo es normalmente 20°C a 45°C. El cultivo se continúa hasta que la formación del producto deseado se encuentra al máximo. Este objetivo normalmente se alcanza dentro de 10 horas a 160 horas.

El contenido de materia seca de los caldos de fermentación obtenidos de esta manera es normalmente de 7,5 a 25% en peso.

45 Adicionalmente también es ventajoso realizar la fermentación con límite de azúcar al menos al final, pero en particular en al menos 30% del tiempo de fermentación. Esto quiere decir que la concentración de azúcar utilizable en el medio de fermentación se mantiene en 0 a 3 g/l, o se reduce, durante este tiempo.

Los productos biosintéticos se aíslan del caldo de fermentación y/o de los microorganismos de una manera conocida per se de acuerdo con las propiedades físicas/químicas del producto biosintético requerido y de los subproductos biosintéticos.

50 El caldo de fermentación puede procesarse a continuación, por ejemplo. Dependiendo del requerimiento, la biomasa puede retirarse totalmente o parcialmente del caldo de fermentación por métodos de separación tales como, por ejemplo, centrifugación, filtración, decantación o una combinación de estos métodos, o dejarse completamente en este.

A continuación, el caldo de fermentación puede espesarse o concentrarse por métodos conocidos tales como, por ejemplo, con la ayuda de un evaporador rotatorio, evaporador de película delgada, evaporador de película de caída, por osmosis inversa o por nanofiltración. A continuación, este caldo de fermentación concentrado puede procesarse por secado por congelamiento, secado por pulverización, granulación por pulverización o por otros métodos.

- 5 Sin embargo, también es posible seguir purificando los productos biosintéticos, especialmente la L-lisina, L-metionina y la L-treonina. Para este propósito, el caldo que contiene el producto se somete, después de la eliminación de la biomasa, a una cromatografía usando una resina adecuada, en cuyo caso el producto deseado o las impurezas se retienen total o parcialmente en la resina cromatográfica. Estas etapas cromatograficas pueden repetirse sí se requiere, en cuyo caso se usan resinas de cromatografía iguales o diferentes. El experto en la materia es hábil en la selección de resinas de cromatografía adecuadas y sus usos más efectivos. El producto purificado puede concentrarse por filtración o ultrafiltración y almacenarse a una temperatura a la cual la estabilidad del producto es máxima.

Los productos biosintéticos pueden resultar en diversas formas, por ejemplo en forma de sus sales o ésteres.

- 15 La identidad y pureza del (de los) compuesto (s) aislado(s) puede determinarse por técnicas del estado de la técnica. Estas comprenden cromatografía líquida a alta presión (HPLC), métodos espectroscópicos, métodos de teñido, cromatografía de capa delgada, NIRS, ensayos de enzima o ensayos microbiológicos. Estos métodos analíticos se resumen en: Patek et al. (1994) Appl. Environ. Microbiol. 60:133-140; Malakhova et al. (1996) Biotekhnologiya 11 27-32; y Schmidt et al. (1998) Bioprocess Engineer. 19:67-70. Ulmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1996) volumen A27, VCH: Weinheim, páginas 89-90, páginas 521-540, páginas 540-547, páginas 559-566, 575-581 y páginas 581-587; Michal, G (1999) Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology, John Wiley and Sons; Fallon, A. et al. (1987) Applications of HPLC in Biochemistry in: Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, volumen 17.

La invención se describe ahora en más detalle por medio de los siguientes ejemplos no limitantes:

Ejemplo 1:

- 25 Preparación del vector pCLiK5MCS

Primero la resistencia a la ampicilina y el origen de replicación del vector pBR322 se amplificaron con la ayuda de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) usando los cebadores oligonucleótidos de SEQ NO:5 y SEQ ID: 6.

SEQ ID NO: 5:

5'-CCCGGGATCCGCTAGCGGCGCGCCGGCCCGGCGGTGTGAAATACCGCACA
G-3'

SEQ ID NO: 6:

5'-TCTAGACTCGAGCGGCCGCGCCGGCCTTTAAATTGAAGACGAAAGGGCCTC
G-3'

- 30 Aparte de las secuencias complementarias para el pBR322, el cebador de oligonucleótido de SEQ ID NO: 5 comprende, en la dirección 5'-3', los sitios de corte para la endonucleasa de restricción SmaI, BamHI, NheI, y AclI, y el cebador de oligonucleótido de SEQ ID NO: 6 comprende, en la dirección 5'-3', los sitios de corte para las endonucleasas de restricción XbaI, XhoI, NotI y DraI. La reacción PCR se lleva a cabo mediante un método estándar tal como el Innis et al. (PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press (1990)) con PfuTurbo Polymerase (Stratagene, La Jolla, USA). El fragmento de ADN obtenido, cuyo tamaño es aproximadamente de 2.1 kb, se purifica usando el Kit de Purificación de PCR, ADN, GFX™ y Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del proveedor. Los extremos romos del fragmento de ADN se ligan entre sí usando el Rapid DNA Ligation Kit (Rache Diagnostics, Mannheim, Alemania) de acuerdo con las indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transforma según los métodos estándar tal como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección sobre células que portan plásmido colocando en placas con sobre agar LB que contiene ampicilina (50 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

El ADN plásmido de un clon individual se aisló usando el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según las indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. El plásmido obtenido de esta forma recibe el nombre de pCLiK1.

5 A partir del plásmido pWLT1 (Liebl et al., 1992) como plantilla para una reacción PCR, se amplificó un casete de resistencia a kanamicina usando los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID N:7 y SEQ ID NO:8.

SEQ ID NO:7:

5'-GAGATCTAGACCCGGGGATCCGCTAGCGGGCTGCTAAAGGAAGCGGA-3'

SEQ ID NO:8

5'-GAGAGGCGCGCCGCTAGCGTGGGCGAAGAAGTCCAGCA-3'

10 Aparte de las secuencias complementarias para pWLT1, el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO:7 contiene, en la dirección 5'-3', los sitios de corte para las endonucleasas de restricción XbaI, BamHI, NheI, y el cebador de oligonucleótido de SEQ ID NO: 8 contiene, en la dirección 5'-3', los sitios de corte para las endonucleasas de restricción AclI y NheI. La reacción PCR se realiza según el método estándar tal como Innis et al. (PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press (1990)) usando polimerasa PfuTurbo (Stratagene, La Jolla, EUA). El fragmento de ADN obtenido, cuyo tamaño es aproximadamente de 1,3 kb, se purificó usando el GFX™PCR y Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. El fragmento de ADN se cortó mediante las endonucleasas de restricción XbaI y AclI (New England Biolabs, Beverly, EUA) y nuevamente se purificó a continuación usando GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit, (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. El vector pCLiK1 se cortó igualmente con las nucleasas de restricción XbaI y AclI y se desfosforiló con fosfatasa alcalina (I (Roche Diagnostics, Mannheim)) según indicaciones del fabricante. Después de electroforesis en un gel de agarosa al 0,8% se aisló el vector linealizado (cerca de 2,1kb) con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Este fragmento de vector se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante con el fragmento PCR cortado y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB Agar que contiene ampicilina (50 µg/ml) y kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

30 El ADN plásmido de un clon individual se aisló usando el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. El plásmido obtenido de esta manera recibe el nombre de pCLiK2.

35 El vector pCLiK2 se cortó con la endonucleasa de restricción DraI (New England Biolabs, Beverly, EUA). Después de electroforesis en un gel de agarosa al 0,8% se aisló un fragmento de vector con un tamaño de cerca de 2,3 kb con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Este fragmento de vector se re-ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón según métodos estándar tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

40 El ADN de plásmido de un clon individual se aisló con el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. El plásmido obtenido obtiene el nombre de pCLiK3.

A partir de plásmido pWLQ2 (Liebl et al., 1992) como planilla para una reacción PCR se amplificó el origen de replicación pHM1519 con cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO:9 y SEQ ID NO:10.

45 SEQ ID NO:9:

5'-GAGAGGGCGGCCGCGCAAAGTCCCGCTTCGTGAA-3'

SEQ ID NO:10:

5'-GAGAGGGCGGCCGCTCAAGTCGGTCAAGCCACGC-3'

5 Junto a las secuencias complementarias a pWLQ2, los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO:9 y SEQ ID NO:10 contienen sitios de corte para la nucleasa de restricción NotI. La reacción PCR se realizó según método estándar como Innis et al. (PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press (1990)) con PfuTurbo Polymerase (Stratagene, La Jolla, EUA). El fragmento de ADN obtenido con un tamaño de aproximadamente 2,7 kb se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. El fragmento de ADN se cortó con la endonucleasa de restricción NotI (New England Biolabs, Beverly, EUA) y a continuación a esto nuevamente se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. El vector pCLiK3 se cortó igualmente con la endonucleasa de restricción NotI y se desfosforiló con fosfatasa alcalina (I (Roche Diagnostics, Mannheim)) según indicaciones del fabricante. Después de electroforesis en un gel de agarosa al 0,8% se aisló el vector linealizado (cerca de 2,3kb) con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Este fragmento de vector se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante con el fragmento de PCR cortado y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como los descritos en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante cultivo en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

20 El ADN de plásmido de un clon individual se aisló con el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. El plásmido obtenido de esta manera obtiene el nombre de pCLiK5.

Para la ampliación de pCLiK5 en un "multiple cloning site" (MCS) ambos oligonucleótidos sintéticos, en gran medida complementarios, de SEQ ID NO:11 y SEQ ID NO:12, que contienen sitios de corte para las nucleasas de restricción SwaI, XhoI, AatI, ApaI, Asp718, MluI, NdeI, SpeI, EcoRV, Sall, ClaI, BamHI, XbaI y SmaI, se fusionan mediante calentamiento conjunto a 95°C y enfriamiento lento para producir un fragmento de ADN bicatenario.

SEQ ID NO:11:

5' -TCGAATTTAAATCTCGAGAGGCCTGACGTCGGGCCCGGTACCACGCGTCATAT
GACTAGTTCGGACCTAGGGATATCGTCGACATCGATGCTCTTCTGCGTTAATTAAC
AATTGGGATCCTCTAGACCCGGGATTTAAAT-3'

25

SEQ ID NO:12:

5' -GATCATTTAAATCCCGGGTCTAGAGGATCCCAATTGTTAATTAACGCAGAAGAG
CATCGATGTCGACGATATCCCTAGGTCCGAAGTACATATGACGCGTGGTACCG
GGCCCGACGTCAGGCCTCTCGAGATTTAAAT-3'

30 El vector pCLiK5 se cortó con las endonucleasas de restricción XhoI y BamHI (New England Biolabs, Beverly, EUA) y se desfosforiló con fosfatasa alcalina (I (Roche Diagnostics, Mannheim)) según indicaciones del fabricante. Después de electroforesis en un gel de agarosa al 0,8% se aisló el vector linealizado (cerca de 5,0 kb) con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Este fragmento de vector se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante con el fragmento de ADN sintético y la mezcla de ligazón se transformó, según métodos estándar como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, EUA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

35

El ADN de plásmido de un clon individual se aisló con el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. El plásmido obtenido de esta manera recibe el nombre de pCLiK5MCS.

40 Las reacciones de secuenciación se realizaron según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciación se fraccionaron y se evaluaron por medio de ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pCLiK5MCS se lista como SEQ ID NO:13.

Ejemplo 2:

Preparación del plásmido PmetA metA

ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO: 14 y SEQ ID NO: 15, el ADN cromosómico como plantilla y Pfu Turbo Polymerase (de la empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar, tal como se describe en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó el gen metA que incluye la región 5' no codificante.

SEQ ID NO: 14

5'-GCGCGGTACCTAGACTCACCCAGTGCT -3'

y

SEQ ID NO: 15

5'-CTCTACTAGTTTAGATGTAGAACTCGATGT -3'

El fragmento de ADN obtenido de aproximadamente 1,3 kb de tamaño se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. A continuación, se escindió con las enzimas de restricción Asp718 y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim) y el fragmento de ADN se purificó con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

El vector pClik5MCS SEQ ID NO: 13 se cortó con las enzimas de restricción Asp718 y SpeI y se aisló un fragmento con un tamaño de 5 kb, después de la separación electroforética con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

El fragmento de vector se ligó junto con el con el fragmento de PCR con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en *E. coli* XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron Reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciación se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pClik5MCS PmetA metA se lista como SEQ ID NO 16.

Ejemplo 3:

Preparación del plásmido pClik5MCS Psod metA

ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO 17 y SEQ ID NO 18, del ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar como Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 pares de bases de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) de la dismutasa de superóxido (Psod).

SEQ ID NO: 17

5'-GAGACTCGAGAGCTGCCAATTATTCCGGG-3'

y

SEQ ID NO: 18

5'-CCTGAAGGCGCGAGGGTGGGCATGGGTAAAAAATCCTTTTCG -3'

El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

5 A partir del plásmido PmetA metA SEQ ID NO: 16 como plantilla para una reacción PCR, con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO: 19: y SEQ ID NO: 20: se amplificó una parte de metA.

SEQ ID NO: 19

5'-CCCACCCTCGCGCCTTCAG -3'

y

SEQ ID NO: 20

10 5'-CTGGGTACATTGCGGCC -3'

El fragmento de ADN obtenido de aproximadamente 470 pares de bases se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.

15 En otra reacción PCR se emplearon como plantilla ambos fragmentos obtenidos arriba. En el transcurso de la reacción PCR, mediante las secuencias homólogas a metA introducidas con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO: 18, se produce una adición de ambos fragmentos entre sí y un alargamiento para producir una cadena de ADN continua por la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en el sentido que los cebadores de oligonucleótidos usados SEQ ID NO: 17 y SEQ ID NO: 20 solo se adicionan a la mezcla de reacción al inicio del segundo ciclo.

20 El fragmento de ADN amplificado de aproximadamente 675 pares de bases se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. A continuación se escindió con las enzimas de restricción XhoI y NcoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. Después se purificó de la agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) el fragmento de ADN con un tamaño de aproximadamente 620 pares de bases.

25 El plásmido PmetA metA SEQ ID NO 16: se escindió con las enzimas de restricción NcoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim). Después de separación electroforética en gel, un fragmento de metA de aproximadamente 0,7 kb de grande se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

El vector pClik5MCS SEQ ID NO:13 se cortó con las enzimas de restricción XhoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se aisló un fragmento de 5 kb de grande después de separación electroforética con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

30 El fragmento de vector se ligó junto con el fragmento de PCR y el fragmento de metA con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contienen kanamicina (20 µg/ml)

35 (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

40 El plásmido resultante pClik5MCS PSODmetA se lista como SEQ ID NO: 21:.

Ejemplo 4:

Preparación del plásmido pClik5MCS P EF-TU metA

45 ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO 22 y SEQ ID NO 23, el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en

cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar como Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 pares de bases de la región 5' no codificante (región de promotor) de la dismutasa de superóxido (Psod).

SEQ ID NO: 22

5 5'-GAGACTCGAGGGCCGTTACCTGCGAATG -3'

y

SEQ ID NO: 23

5'-CCTGAAGGCGCGAGGGTGGGCATTGTATGTCCTCCTGGAC -3'

10 El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

A partir del plásmido PmetA metA SEQ ID NO: 16 como plantilla para una reacción PCR una parte de metA se amplificó con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO: 24 y SEQ ID NO: 25.

SEQ ID NO: 24

5'-CCCACCCTCGCGCCTTCAG -3'

15 y

SEQ ID NO: 25

5'-CTGGGTACATTGCGGCC -3'

El fragmento de ADN obtenido, de aproximadamente 470 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.

20 En otra reacción PCR como plantilla se emplearon conjuntamente ambos fragmentos obtenidos arriba. Mediante las secuencias homólogas a metA introducidas con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO: 18, en el transcurso de la reacción PCR se produce una adición de ambos fragmentos entre sí y un alargamiento hacia una cadena de ADN continua mediante la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en tal sentido que los cebadores de oligonucleótido usados SEQ ID NO: 22 y SEQ ID NO: 25 se agregan solamente con el inicio del segundo ciclo.

25 El fragmento de ADN amplificado, de aproximadamente 675 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. Después de esto, se escindió con las enzimas de restricción XhoI y NcoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación, el fragmento de ADN de un tamaño aproximado de 620 pares de base se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg).

30 El plásmido PmetA metA SEQ ID NO: 16 se escindió con las enzimas de restricción NcoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim). Después de separación electroforética en gel, un fragmento de metA, con un tamaño aproximado de 0,7 kb, se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

35 El vector pClik5MCS SEQ ID NO: 13 se cortó con las enzimas de restricción XhoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se aisló un fragmento de 5 kb de grande después de separación electroforética en gel con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

40 El fragmento de vector se ligó junto con el fragmento de PCR y el fragmento de metA con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of

Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pCLiK5MCS P_EFTUmetA se lista como SEQ ID NO: 26.

Ejemplo 5:

5 Preparación del plásmido pCLiK5MCS Pgro metA

ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido SEQ ID NO 27 y SEQ ID NO 28, el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar como Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 pares de bases de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen GroES (Pgro).

SEQ ID NO: 27

5'-GAGACTCGAGCGGCTTAAAGTTTGGCTGCC -3'

SEQ ID NO :28

15 5'-CCTGAAGGCGCGAGGGTGGGCATGATGAATCCCTCCATGAG -3'

El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. A partir del plásmido PmetA metA como plantilla, para una reacción PCR, se amplificó con los cebadores de oligonucleótido SEQ ID NO:29 y SEQ ID NO: 30 una parte de metA.

20 SEQ ID NO: 29

5'-CCCACCCTCGCGCCTTCAG -3'

SEQ ID NO: 30

5'-CTGGGTACATTGCGGCC -3'

25 El fragmento de ADN obtenido, de aproximadamente 470 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.

En otra reacción PCR ambos fragmentos obtenidos arriba se emplearon conjuntamente como plantilla. Mediante las secuencias homólogas a metA introducidas con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO: 28, en el transcurso de la reacción PCR se produjo una adición de ambos fragmentos entre sí y un alargamiento hacia una cadena de ADEN continua mediante la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en tal sentido que los cebadores de oligonucleótido usados SEQ ID NO: 27 y SEQ ID NO: 30 solo se adicionaron a la mezcla de reacción con el inicio del segundo ciclo.

35 El fragmento de ADN amplificado, de aproximadamente 675 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. Después de esto se escindió con las enzimas de restricción XhoI y NcoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. Después, el fragmento de ADN con un tamaño aproximado de 620 pares de bases se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg).

El plásmido PmetA metA SEQ ID NO: 16 se escindió con las enzimas de restricción NcoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim). Después de separación electroforética en gel, un fragmento metA de aproximadamente 0,7 kb de grande se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

40 El vector pCLiK5MCS SEQ ID NO: 13 se cortó con las enzimas de restricción XhoI y SpeI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se aisló un fragmento de 5 kb de grande después de separación electroforética en gel con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

El fragmento de vector se ligó junto con el fragmento de PCR y el fragmento de metA, con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó

según métodos estándar, tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en *E.coli* XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

- 5 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pCLiK5MCS Pgro metA se lista como SEQ ID NO: 31.

10 **Ejemplo 6:**

Preparación del plásmido P EF-TS metA

- 15 ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótidos BK 1849 (SEQ ID NO: 32) y BK 1862 (SEQ ID NO: 33), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (Empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar, tal como se describe Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó el gen metA, que codifica la homoserina-O-acetiltransferasa.

BK 1849 (SEQ ID NO: 32)

5'-GTGTGTCGACTTAGATGTAGAACTCGATGTAG-3'

- 20 y

BK 1862 (SEQ ID NO: 33)

5'-ATGCCACCCCTCGCGCC-3'

El fragmento de ADN obtenido, de un tamaño aproximado de 1134 bp, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

- 25 Con los cebadores de oligonucleótido Haf 26 (SEQ ID NO: 34) y Haf 27 (SEQ ID NO: 35), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (Empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar, como se describe en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 pares de bases de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen que codifica el factor de elongación TS.

- 30 Haf 26 (SEQ ID NO: 34)

5'-GAGAGGATCCCCCCCACGACAATGGAAC-3'

y

Haf 27 (SEQ ID NO: 35)

5'-CCTGAAGGCGCGAGGGTGGGCATTACGGGCGATCCTCCTTATG-3'

- 35 El fragmento de ADN obtenido, de aproximadamente 195 bp de largo se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

Los cebadores Haf 27 y BK 1862 contienen una secuencia que se solapa y son homólogos entre sí en su extremo 5'.

Los productos PCR obtenidos arriba se emplearon como plantilla para otra PCR en la que se utilizan los cebadores BK 1849 (SEQ ID NO: 32) y Haf 26 (SEQ ID NO: 34).

Con esta mezcla pudo amplificarse un fragmento de ADN que correspondía al tamaño esperado de 1329 bp. Esta fusión P EF-TS/metA se clonó luego por los sitios de corte de restricción BamHI y Sall en el vector pClik 5a MCS (SEQ ID NO: 13).

5 El fragmento de vector se ligó junto con el fragmento de PCR con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó, según métodos estándar como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

10 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante se designó con pClik 5a MCS P EF-TS metA (SEQ ID NO: 36).

15 **Ejemplo 7:**

Preparación del plásmido P EF-Tu pSOD metA (H473)

ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido BK 1753 (SEQ ID NO: 37) y BK 1754 (SEQ ID NO: 38), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar, como en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó el terminador GroEL.

BK 1753 (SEQ ID NO: 37)

GGATCTAGAGTTCTGTGAAAAACACCGTG

BK 1754 (SEQ ID NO: 38)

25 GCGACTAGTGCCCCACAAATAAAAAACAC

El fragmento de ADN obtenido, de un tamaño aproximado de 77 bp, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante, se cortó con las enzimas de restricción XbaI y Bcu I y se purificó una vez más.

30 El vector pClik5MCS (SEQ ID NO: 13) se linealizó con la enzima de restricción XbaI y se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

35 El vector linealizado se ligó junto con el fragmento de PCR con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

40 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante se designó con H247 (SEQ ID NO: 39).

Este plásmido se trató con las enzimas de restricción BcuI y Sall y se purificó con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

45 Una PCR se realizó con los oligonucleótidos BK 1848 (SEQ ID NO: 40) y BK 1849 (SEQ ID NO: 41), el plásmido pClik5MCS Psod metA (SEQ ID NO: 21) como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene) según métodos estándar, tal como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications,

ES 2 380 000 T3

Academic Press. El fragmento amplificado tenía una longitud esperada de cerca de 1350 bp y se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante, se cortó con las enzimas de restricción BclI y Sall y se purificó una vez más.

5 Este fragmento se ligó con el plásmido H247 (sitios de corte BclI y Sall) con ayuda del Rapid DNA Ligation Kits (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

10 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante se denominó pG A4 (H344) y se listó bajo SEQ ID NO: 42.

15 SEQ ID NO: 40 (BK 1848)

GAGAACTAGTAGCTGCCAATTATTCCGGG

SEQ ID NO: 41 (BK 1849)

GTGTGTCGACTTAGATGTAGAACTCGATGTAG

20 El plásmido pG A4 (SEQ ID NO: 42) se cortó con las enzimas de restricción XhoI y BclI y se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

Construcción de H473:

25 ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido BK 1695 (SEQ ID NO: 43) y Haf16 (SEQ ID NO: 44), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (Empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar, tal como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 182 pares de bases de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen EF Tu (PefTu).

SEQ ID NO: 43 (BK1695)

30 GAGACTCGAGGGCCGTTACCCTGCGAATG

SEQ ID NO: 44 (Haf16)

GAGAACTAGTGTGGCTACGACTTTTCGCAGC

35 El fragmento de ADN obtenido, de un tamaño aproximado de 200 bp, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante, se cortó con las enzimas de restricción XhoI y BclI y se purificó una vez más.

40 Este fragmento se ligó con el plásmido pG A4 (H344) (sitios de corte XhoI y BclI) con ayuda del Rapid DNA Ligation Kits (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, EUA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

El plásmido obtenido se llamó pClik5MCS PefTuPsod metA (H473). Se lista bajo SEQ ID NO: 45. Contiene (de 5' a 3') un promotor PefTu, un unidad de expresión Psod y directamente a continuación el metA open reading frame.

Ejemplo 8:

Preparación del plásmido PsodPeftu metA (H505)

5 ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido SEQ ID NO: 46 (Haf64) y SEQ ID NO: 47 (Haf65), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar, tal como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen EF Tu (Peftu).

SEQ ID NO: 46 (Haf64)

GAGAACTAGTGGCCGTTACCCTGCGAATG

10 SEQ ID NO: 47 (Haf65)

GCGCGAGGGTGGGCATTGTATGTCCTCCTGGACTTC

El fragmento de ADN obtenido, de aproximadamente 200 bp de tamaño, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

15 En una segunda PCR con los cebadores de oligonucleótidos BK1862 (SEQ ID NO: 48) y BK1849 (SEQ ID NO: 49) y el plásmido H344 (SEQ ID NO: 42) como plantilla, se amplificó el metA open reading frame, según métodos estándar, como se describe en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press. El fragmento obtenido de aproximadamente 1140 bp de longitud se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

SEQ ID NO: 48 (BK1862)

20 ATGCCACCCCTCGCGCC

SEQ ID NO: 49 (BK1849)

GTGTGTCGACTTAGATGTAGAACTCGATGTAG

25 En otra reacción PCR se emplearon conjuntamente ambos fragmentos obtenidos arriba como plantilla. Mediante secuencias homólogas a metA, introducidas con el cebador de oligonucleótido Haf 65 SEQ ID NO: 47, en el transcurso de la reacción PCR se produjo una adición de ambos fragmentos y un alargamiento hacia una cadena de ADN continua mediante la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en tal sentido que los cebadores de oligonucleótidos usados Haf 64 y BK 1849 SEQ ID NO: 46 y SEQ ID NO: 49 solo se adicionaron a la mezcla de reacción con el inicio del segundo ciclo.

30 El fragmento de ADN amplificado, de aproximadamente 1350 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. A continuación, se escindió con las enzimas de restricción BclI y Sall (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el fragmento de ADN de un tamaño aproximado de 1340 pares de bases se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg). Este fragmento contiene la unidad de expresión Peftu fusionada con el metA ORF (= fragmento de Peftu-metA).

35 Con los cebadores de oligonucleótidos BK 1697 (SEQ ID NO: 50) y Haf17 (SEQ ID NO:51), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN (longitud total: 193 bp, de estos 173 de pSOD) de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen SOD (Psod).

40 SEQ ID NO: 50 (BK 1697)

GAGACTCGAGAGCTGCCAATTATTCCGGG

SEQ ID NO: 51 (Haf 17)

GAGAACTAGTTAGTTTCCGCACCGAGC

5 El fragmento de ADN amplificado se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. Después de esto se escindió con las enzimas de restricción XhoI y BclI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el fragmento de ADN con un tamaño de aproximadamente 180 pares de bases se purificó de agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) (= fragmento Psod).

El plásmido (H344) pG A4 SEQ ID NO: 42 se escindió con las enzimas de restricción XhoI y Sall (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el vector linealizado se purificó de agarosa con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg).

10 El vector linealizado se ligó con ambos fragmentos (fragmento Peftu-metA y fragmento Psod) con ayuda del Rapid DNA Ligation Kits (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describe en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

15 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pClik5MCS PsodPeftu metA se listó como SEQ ID NO: 52.

20 **Ejemplo 9:**

Preparación del plásmido pClik5MCS Pgro Psod metA (H472)

25 ADN cromosómico de C. glutamicum ATCC 13032 se preparó según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO: 53 (BK1701) y SEQ ID NO: 54 (Haf18), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR), según métodos estándar, como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 175 Nt. Contiene 155 pares de bases de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen GRO EL (Pgro) y de a un sitio de corte de restricción en extremos 5' y 3' (XhoI o BclI).

30 SEQ ID NO: 53 (BK1701)

GAGACTCGAGCGGCTTAAAGTTTGGCTGCC

SEQ ID NO: 54 (Haf018)

GAGAACTAGTATTTTGTGTGTGCCGGTTGTG

35 El fragmento de ADN obtenido, de un tamaño aproximado de 175 bp, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Después de esto se escindió con las enzimas de restricción XhoI y BclI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se purificó el fragmento de ADN con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

40 El plásmido H344 (SEQ ID NO: 42) se cortó con las enzimas de restricción XhoI y BclI y un fragmento con un tamaño de aproximadamente 6.4 kb después de la separación electroforética en gel se aisló con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

45 El producto de PCR y el plásmido cortado H344 se ligaron con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, tal como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1 Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido preparando en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467.

- Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante contiene un promotor Pgro directamente seguido de una unidad de expresión Psod y el metA ORF. pCLiK5MCS PgroPsod metA (H472) se lista como SEQ ID NO: 55.

5 **Ejemplo 10:**

Preparación del plásmido PgroPsod Pefts metA (H501)

10 Con los cebadores de oligonucleótidos BK1782 (SEQ ID NO: 56) y Haf63 (SEQ ID NO: 57) y el plásmido pCLiK5MCS Pgro Psod metA (SEQ ID NO: 55 (H472)) como plantilla se realizó una PCR según métodos estándar, como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press. El fragmento amplificado comprende aproximadamente 474 pares de bases y contiene un casete Pgro-Psod con un sitio de corte Acc651 en el extremo 3'. El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFXTMPCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. A continuación, se escindió con las enzimas de restricción XhoI y Acc65I y el fragmento de ADN (333 pares de base) se purificó con GFXTMPCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

15 SEQ ID NO: 56 (BK1782)

TCGAGAGATTGGATTCTTAC

SEQ ID NO: 57 (Haf 63)

TCTCGGTACCCCGCACCGAGCATATACATC

20 El plásmido H479 (SEQ ID NO: 58) contiene la unidad de expresión Pefts fusionada con el metA ORF. Se cortó con las enzimas de restricción XhoI y Acc651 (upstream directamente de Pefts) y un fragmento de aproximadamente 6.4 kb de grande se aisló después de separación electroforética en gel con GFXTMPCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

25 A continuación, se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante con el fragmento de PCR (casete Pgro-Psod) y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido preparando en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

30 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante contiene los 3 promotores Pgro Psod y P EF-Ts fusionados con el metA ORF. pCLiK5MCS Pgro Psod Pefts metA (H501) se listó como SEQ ID NO: 59.

Ejemplo 11:

35 Preparación del plásmido Peftu Psod Pefts metA (H502)

40 Con los cebadores de oligonucleótidos BK1782 (SEQ ID NO: 56) y Haf63 (SEQ ID NO: 57) y el plásmido pCLiK5MCS Peftu Psod (SEQ ID NO: 45 (H473)) como plantilla, se realizó una PCR según métodos estándar, como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press. El fragmento amplificado comprende aproximadamente 495 pares de bases y contiene un casete Peftu-Psod con un sitio de corte Acc65I en el extremo 3'. El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFXTMPCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. A continuación se escindió con las enzimas de restricción XhoI y Acc65I y el fragmento de ADN (354 pares de bases) se purificó con GFXTMPCR, DNA and Gel Band Purification Kit.

SEQ ID NO: 56 (BK1782)

45 TCGAGAGATTGGATTCTTAC

SEQ ID NO: 57 (Haf 63)

TCTCGGTACCCCGCACCCGAGCATATACATC

5 El plásmido H479 (SEQ ID NO: 58) contiene la unidad de expresión Pefts fusionada con el metA ORF. Se cortó con las enzimas de restricción XhoI y Acc65I (upstream directamente de Pefts) y un fragmento de aproximadamente 6.4 kb de tamaño se aisló con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit después de separación electroforética en gel.

10 A continuación se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante con el fragmento de PCR (casete Peftu-Psod) y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido preparando en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

15 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante contiene las 3 secuencias regulatorias Peftu Psod y P EF -Ts fusionadas con el metA ORF. pClik5MCS Peftu Psod Pefts metA (H501) se listó como SEQ ID NO: 60.

Ejemplo 12:

Medición de las actividades de metA

20 La cepa *Corynebacterium glutamicum* ATCC13032 se transformó con los plásmidos pClik5 MCS, pClik MCS Psod metA, pClik MCS Peftu metA, pClik5 MCS Pefts metA, pClik5 MCS Peftu Psod metA, pClik5 MCS Psod Peftu metA, pClik5 MCS Pgro Psod meta, pClik5 MCS Pgro Psod Pefts metA, pClik5 MCS Peftu Psod Pefts metA de acuerdo con el método descrito (Liebl, et al. (1989) FEMS Microbiology Letters 53:299-303). La mezcla de transformación se preparó en placas de CM que contenían adicionalmente 20 mg/l de kanamicina para lograr una selección en células que contienen plásmido. Los clones resistentes a Kan se escogen y se aislan.

30 Cepas de *C. glutamicum*, que contenían uno de estos constructos de plásmido se cultivaron en medio MMA ((40 g/l de sacarosa, 20 g/l de (NH₄)₂SO₄, 1 g/l KH₂PO₄, 1 g/l de K₂HPO₄, 0,25g/l de MgSO₄ x 7H₂O, 54 g de Aces, 1 ml de CaCl₂ (10 g/l), 1 ml de protocatecoato (300 mg/10 ml), 1 ml de solución de microelementos (10 g/l de FeSO₄ x /H₂O, 10 g/l de MnSO₄ x H₂O, 2 g/l ZnSO₄ x 7 H₂O, 0,2 g/l de CuSO₄, 0,02 g/l de NiCl₂ x 6 H₂O), 100 µg/l de vitamina B12, 0,3 mg/l de tiamina, 1mM de leucina, 1 mg/l de piridoxal HCl, 1 ml de biotina (100 mg/l), pH 7,0) a 30°C por una noche. Las células se centrifugaron a 4°C y se lavaron dos veces con búfer Tris-HCl frío (0,1%, pH 8,0). Después de centrifugación renovada las células se recogen en búfer de Tris-HCl frío (0,1%, pH 8,0) y se ajustó una OD₆₀₀ de 160. Para la ruptura de células se transfirió 1 ml de esta suspensión de células a tubos de Ribolyser de 2 ml de la empresa Hibaidd y se lisó tres veces por 30 s respectivamente en un Ribolyser de la empresa Hibaidd a un ajuste de rotación de 6,0. El lisado se clarificó mediante centrifugación por 30 minutos a 15.000 rpm a 4°C en una centrífuga Eppendorf y el sobrenadante se transfirió a una nueva copa Eppendorf. El contenido de proteína se determinó según Bradford, M.M. (1976) Anal. Biochem. 72:248-254.

40 La actividad enzimática de MetA se realizó como sigue. Las mezclas de reacción de 1 ml contenía 100 mM de búfer de fosfato de potasio (pH 7,5), 5mM de MgCl₂, 100 µM de acetil CoA, 5mM de L-homoserina, 500 µM de DTNB (reactivo de Ellmans) y extracto celular. El ensayo inició adicionando el lisado respectivo de proteína y se incubó a temperatura ambiente. Luego se registró una cinética a 412 nm por 10 min.

Los resultados se muestran en la Tabla 1a.

Tabla 1a

Cepa	Designación de constructo interna	Actividad específica [nMol/mg/min]
ATCC 13032 pClik5MCS	H356 (metZ)	3,1

(continuación)

Cepa	Designación de constructo interna	Actividad específica [nMol/mg/min]
ATCC 13032 pCLiK5MCS Psod metA	H144	1308,7
ATCC 13032 pCLiK5MCS Peftu metA	H146	1233,0
ATCC 13032 pCLiK5MCS Pefts metA	H479	2339,0
ATCC 13032 pCLiK5MCS Peftu Psod metA	H473	2308,1
ATCC 13032 pCLiK5MCS Psod Peftu metA	H505	2061,9
ATCC 13032 pCLiK5MCS Pgro Psod metA	H472	1501,6
ATCC 13032 pCLiK5MCS Pgro Psod Pefts metA	H501	1773,4
ATCC 13032 pCLiK5MCS Peftu Psod Pefts metA	H502	2262,2

La actividad de MetA pudo modularse usando las diversas combinaciones de promotores/unidades de expresión.

5 Ejemplo 13:

Construcción de plásmido pCIS lysC

10 Para generar una cepa que produce lisina se realizó un intercambio alélico del gen lysC de tipo silvestre en *Corynebacterium glutamicum* ATCC13032. En tal caso se realizó un intercambio de nucleótido en el gen lysC, de modo que en la proteína resultante el aminoácido Thr se intercambió en la posición 311 por un Ile. A partir del ADN cromosómico de ATCC13032 como plantilla para una reacción PCR, lysC se amplificó con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO:61 y SEQ ID NO:62 con ayuda del Pfu-Turbo PCR Systems (Stratagene USA) según indicaciones del fabricante.

SEQ ID NO:61

5'-GAGAGAGAGACGCGTCCCAGTGGCTGAGACGCATC-3'

15 SEQ ID NO:62

5'-CTCTCTCTGTCGACGAATTCAATCTTACGGCCTG-3'

20 Se preparó ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. El fragmento amplificado se flanquea en su extremo 5' por un corte de restricción Sall y en su extremo 3' se flanquea por un corte de restricción MluI. Antes de la clonación el fragmento amplificado se digirió mediante estas dos enzimas de restricción y se purificó con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg).

25 El polinucleótido obtenido se clonó por los cortes de restricción Sall y MluI en pCLiK5 MCS integrativ SacB, llamado en lo sucesivo pCIS (SEQ ID NO: 63) y se transformó en *E.coli* XL-1 blue. Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 µg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1: 190). El plásmido se aisló y se confirmó la secuencia de nucleótido mediante secuenciación. La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA

74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron por medio de ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt). El plásmido pCIS lysC obtenido se lista como SEQ ID NO:64.

Ejemplo 14:

Mutagénesis del gen lysC de *C. glutamicum*

5 La mutagénesis dirigida del gen lysC de *C. glutamicum* se realizó con el QuickChange Kit (empresa Stratagene/USA) según indicaciones del fabricante. La mutagénesis se realizó en el plásmido pCIS lysC, SEQ ID NO:64. Para el intercambio de thr 311 a 311 ile con ayuda del método Quickchange (Stratagene) se sintetizaron los siguientes cebadores de oligonucleótidos:

SEQ ID NO:65

10 5'-CGGCACCACCGACATCATCTTCACCTGCCCTCGTTCCG -3'

SEQ ID NO:66

5'-CGGAACGAGGGCAGGTGAAGATGATGTCCGGTGGTGCCG -3'

15 El empleo de estos cebadores en la reacción Quickchange conduce en el gen lysC SEQ ID NO:67 a un intercambio del nucleótido en posición 932 (de C a T). El intercambio de aminoácido resultante Thr311Ile en el gen lysC se confirmó después de la transformación en *E.coli* XL1-blue y la preparación de plásmido se confirmó por reacciones de secuenciación. El plásmido obtuvo la denominación pCIS lysC thr311ile y se lista como SEQ ID NO:68.

20 El plásmido pCIS lysC thr311ile se transformó en *C. glutamicum* ATCC13032 mediante electroporación, tal como se describe en Liebl, et al. (1989) FEMS Microbiology Letters 53:299-303. Se describen modificaciones del protocolo en DE 10046870. La disposición cromosómica del locus lysC de transformantes individuales se verificaron con métodos estándar mediante southern blot e hibridación tal como se describe en Sambrook et al. (1989), Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor. De esta manera se aseguró que los transformantes fueran aquellos que tienen integrado el plásmido transformado mediante recombinación homóloga en el lysC-Lokus. Después del crecimiento de tales colonias por una noche en medios que no contienen antibiótico, las células se ponen en placas en un medio de sacarosa-CM-agar (10% de sacarosa, 10 g/l de glucosa; 2,5 g/l de NaCl; 2 g/l de urea, 10 g/l de Bacto Peptone (empresa Difco); 10 g/l de extracto de levadura, 22,0 g/L de agar (Difco)) y se incuban a 30°C por 24 horas.

25 Puesto que la sacarosa que contiene el gen sacB en el vector pCIS lysC thr311ile se convierte en un producto tóxico, solo pueden crecer aquellas colonias que han eliminado el gen sacB mediante un segundo paso de recombinación homólogo entre el gen lysC de tipo silvestre y el gen mutado lysC thr311ile. Durante la recombinación homóloga puede eliminarse o bien el gen de tipo silvestre, o bien el gen mutado junto con el gen sacB. Si el gen sacB se retira junto con el gen de tipo silvestre, resulta un transformante mutado.

30 Las colonias que iban creciendo se recogieron y se investigaron para un fenotipo sensible a kanamicina. Los clones con el gen sacB eliminado deben, al mismo tiempo, presentar comportamiento de crecimiento sensible a la kanamicina. Tales clones sensibles a la Kan se prueban en un frasco agitador para su productividad de lisina. (véase ejemplo 19). Para comparación se cultivó ATCC13032 del *C. glutamicum* no tratado. Se seleccionaron los clones con una producción de lisina incrementada frente al control, se produjo ADN cromosómico y se amplificó y se secuenció la región correspondiente del gen lysC mediante una reacción PCR. Un clon así, con la propiedad de biosíntesis de lisina incrementada y mutación detectada en lysC en el sitio 932 se designó con ATCC13032 lysCfor.

Ejemplo 15:

40 Preparación del plásmido pCIS Peftu ddh

45 Se preparó ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 según Tauch et al. (1995) Plasmid 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) Microbiology 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO: 69 (Old38) y SEQ ID NO: 70 (Old 39), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar, como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 200 de la región 5' no codificante (región de la unidad de expresión) del gen EF Tu (Peftu).

SEQ ID NO: 69 (Old38)

ACATCCATGGTGGCCGTTACCCTGCGAAT

SEQ ID NO: 70 (Old 39)

TGTATGTCCTCCTGGACTTC

5 El fragmento de ADN obtenido de tamaño aproximado de 200 bp se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

10 En una segunda PCR con los cebadores de oligonucleótidos Old40 (SEQ ID NO: 71) y SEQ ID NO: 72 (Old 37) y ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 como plantilla, se amplificó el ddh open reading frame según métodos estándar, como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press. El fragmento obtenido, de aproximadamente 1017 bp de longitud, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante.

Old40 (SEQ ID NO: 71)

GAAGTCCAGGAGGACATACAATGACCAACATCCGCGTAGC

Old 37 (SEQ ID NO: 72)

GAAACCACACTGTTTCCTTGC

15 En otra reacción PCR los dos fragmentos obtenidos arriba se emplearon conjuntamente como plantilla. Mediante las secuencias homólogas a Pefu introducidas con el cebador de oligonucleótido Old40 SEQ ID NO: 71, en el transcurso de la reacción PCR se produce una adición de ambos fragmentos entre sí y un alargamiento para producir una cadena de AD continua mediante la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en tal sentido que los cebadores de oligonucleótidos usados Old37 y Old 38 (SEQ ID NO: 72 y SEQ ID NO: 69) solo se
20 adicionaron a la mezcla de reacción con el principio del segundo ciclo.

25 El fragmento de ADN amplificado, de aproximadamente 1207 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. A continuación se escindió con las enzimas de restricción NcoI y XhoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. Después el fragmento de ADN de aproximadamente 1174 pares de bases de tamaño se purificó de la agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg). Este fragmento contiene la unidad de expresión Pefu fusionada con el ddh ORF (= fragmento Pefu-ddh).

30 Con los cebadores de oligonucleótido Old 32 (SEQ ID NO: 73) y Old 33 (SEQ ID NO: 74), el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar como se describen en Innis et al. (1990) PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de la región 5' no codificante del gen ddh.

SEQ ID 73 (Old32)

ATCAACGCGTCGACACCACATCATCAATCAC

SEQ ID 74 (Old33)

ATCACCATGGGTTCTTGTAATCCTCCAAAATTG

35 El fragmento de ADN amplificado se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante. A continuación se escindió con las enzimas de restricción MluI y NcoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el fragmento de ADN de aproximadamente 720 pares de bases de tamaño se purificó de la agarosa con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) (= fragmento 5' ddh).

40 El plásmido pCIS (SEQ ID NO: 63) se escindió con las enzimas de restricción MluI y XhoI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación se purificó de la agarosa el vector linealizado con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg).

45 El vector linealizado se ligó con ambos fragmentos (fragmento Pefu-ddh y fragmento 5' ddh) con ayuda del Rapid DNA Ligation Kits (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory

Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en *E. coli* XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 mg/ml) (Lennox, 1955, *Virology*, 1:190).

- 5 La preparación del plásmido de ADN se realizó según métodos y con materiales de la empresa Quiagen. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 74:5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron por medio de ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt).

El plásmido resultante pCIS Peftu ddh se lista como SEQ ID NO: 75.

Ejemplo 16:

- 10 Preparación de pCIS PeftuPsod ddh

15 Se preparó ADN cromosómico de *C. glutamicum* ATCC 13032 según Tauch et al. (1995) *Plasmid* 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) *Microbiology* 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido SEQ ID NO: 76 y SEQ ID NO: 77, el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar como se describen en Innis et al. (1990) *PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications*, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 677 pares de bases de la región 5' del gen ddh (fragmento 5'ddh).

SEQ ID NO: 76 (CK461)

CCTGACGTCGCAATATAGGCAGCTGAATC

SEQ ID NO : 77 (CK466)

- 20 GCCCAATTGGTTCTTGTAATCCTCCAAAA

25 El fragmento de ADN obtenido se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. A continuación se separó con las enzimas de restricción AatII y MunI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el fragmento de ADN de aproximadamente 661 pares de bases de tamaño se purificó de la agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg). El fragmento resultante contiene la región 5' del ddh-ORF.

A partir del plásmido P EF-Tu pSOD meta (H473) (SEQ ID 45) como plantilla para una reacción PCR, con los cebadores de oligonucleótidos SEQ ID NO:-78 y SEQ ID NO: 79 se amplificó un casete PeftuPsod.

SEQ ID NO: 78 (CK426)

- 30 CGCCAATTGTCGAGGGCCGTTACCT

SEQ ID NO: 79 (CK463)

GCTACGCGGATGTTGGTCATGGGTA,4AATCCTTTCGTA

El fragmento de ADN obtenido, de aproximadamente 378 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.

- 35 En una PCR siguiente se amplificó el ddh ORF. Para esto se preparó ADN cromosómico de *C. Glutamicum* ATCC 13032 según Tauch et al. (1995) *Plasmid* 33:168-179 o Eikmanns et al. (1994) *Microbiology* 140:1817-1828. Con los cebadores de oligonucleótido SEQ ID NO: 80 (CK464) y SEQ ID NO: 81 (CK467=, el ADN cromosómico como plantilla y polimerasa Pfu Turbo (empresa Stratagene), con ayuda de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) según métodos estándar como se describen en Innis et al. (1990) *PCR Protocols. A Guide to Methods and Applications*, Academic Press, se amplificó un fragmento de ADN de aproximadamente 992 pares de bases (ddh-ORF) (fragmento ddh). El fragmento de ADN amplificado se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.
- 40

SEQ ID NO: 80 (CK464)

TACGAAAGGATTTTTTACCCATGACCAACATCCGCTAGC

SEQ ID NO: 81 (CK467)

AGACCCGGGTTAGACGTCGCGTGCGATCA

5 En otra reacción PCR ambos fragmentos obtenidos arriba (casete PeftuPsod y ddh-ORF) se emplearon conjuntamente como plantilla. Mediante las secuencias homólogas a Psod, introducidas con el cebador de oligonucleótido SEQ ID NO: 80 (CK464), en el transcurso de la reacción PCR se produce una adición de ambos fragmentos entre sí y un alargamiento para producir una cadena de ADN continua mediante la polimerasa empleada. El método estándar se modificó en tal sentido que los cebadores de oligonucleótidos usados SEQ ID NO: 79 (CK426) y SEQ ID NO: 81 (CK467) se adicionan a la mezcla de reacción solo con el inicio del segundo ciclo. El fragmento de ADN amplificado, de aproximadamente 1359 pares de bases, se purificó con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit según indicaciones del fabricante.

10 A continuación se escindió con las enzimas de restricción MunI y SmaI (Roche Diagnostics, Mannheim) y se separó mediante electroforesis en gel. A continuación el fragmento de ADN de aproximadamente 1349 pares de bases de tamaño se purificó de la agarosa con GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg). El fragmento resultante contiene (de 5' a 3') un promotor Peftu, una unidad de expresión Psod y directamente a continuación el ddh open reading frame (PeftuPsod ddh).

20 El vector pCIS se cortó con las endonucleasas de restricción AatII y SmaI y se desfosforiló con fosfatasa alcalina (Roche Diagnostics, Mannheim) según indicaciones del fabricante. Después de electroforesis en un gel de agar al 0,8%, el vector linealizado (aproximadamente 4.2 kb) se aisló con el GFX™PCR, DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia, Freiburg) según indicaciones del fabricante. Este fragmento de vector se ligó con ayuda del Rapid DNA Ligation Kit (Roche Diagnostics, Mannheim), según indicaciones del fabricante, con ambos fragmentos PCR cortados (5'ddh y PeftuPsod ddh) y la mezcla de ligazón se transformó según métodos estándar, como se describen en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, (1989)), en E.coli XL-1Blue competente (Stratagene, La Jolla, USA). Se logró una selección en células que portan plásmido mediante preparación en placas de LB agar que contiene kanamicina (20 mg/ml) (Lennox, 1955, Virology, 1:190).

25 El ADN de plásmido de clones individuales se aisló con el Qiaprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden) según indicaciones del fabricante y se verificó por digestión de restricción. Se secuenciaron 2 plásmidos correctos. Se realizaron reacciones de secuenciación según Sanger et al. (1977) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74: 5463-5467. Las reacciones de secuenciador se separaron y se evaluaron mediante ABI Prism 377 (PE Applied Biosystems, Weiterstadt). El plásmido resultante pClik Peftu Psod ddh es adecuado para integrar con ayuda de 2 sucesos de recombinación sucesivas el casete PeftuPsod antes de ddh-ORF cromosómico. El plásmido pCIS PeftuPsod ddh se lista como SEQ ID NO: 82.

Ejemplo 17:

Generación de las cepas ATCC13032 lysCfor Peftu ddh y ATCC13032 lysCfor PeftuPsod ddh

35 Se transformaron células de la cepa E. coli Mn522 (empresa Stratagene, Amsterdam, Holanda) con uno de los plásmidos pCIS Peftu ddh y pCIS PeftuPsod ddh así como con el plásmido pTc15AcgIM según Liebl, et al. (1989) FEMS Microbiology Letters 53:299-303. El plásmido pTc15AcgIM hace posible la metilación de DNA según el patrón de metilación de *Corynebacterium glutamicum* (DE 10046870). Mediante esta metilación se incrementa la estabilidad de los plásmidos pCIS Peftu ddh y pCIS PeftuPsod ddh en células de *C. glutamicum*. El ADN de plásmido se aisló a continuación de las células Mn522 según métodos estándar y con ayuda de electroporación se introdujo la cepa arriba descrita de *Corynebacterium glutamicum* ATCC 13032 ask (fbr). De esta electroporación y de la selección subsiguiente en placas de CM con kanamicina (25 µg/ml) se obtuvieron varios transconjugantes. Para la selección en el segundo suceso de recombinación que debe conducir a la escisión del vector, se cultivaron estos transconjugantes en medio de CM por una noche sin kanamicina y a continuación para la selección se cultivó en placas de CM 10% de sacarosa. El gen sacB presente en el vector pCIS codifica la enzima Laevansucrase y al crecer en sacarosa conduce a la síntesis de laevan. Puesto que laevan es tóxico para *C. glutamicum* solo las células de *C. glutamicum* que han perdido el plásmido de integración por el segundo paso de recombinación pueden crecer en el medio que contiene sacarosa (Jäger et al., Journal of Bacteriology 174 (1992) 5462-5466). 100 clones resistentes a sacarosa se probaron en su sensibilidad a kanamicina. Para varios de los clones ensayados, además de la resistencia frente a sacarosa, también pudo detectarse una sensibilidad frente a kanamicina, lo cual se espera en la escisión deseada de las secuencias del vector. Por medio de reacción en cadena de polimerasa (PCR) también se verificó si se había realizado la integración deseada de la unidad de expresión Peftu o PeftuPsod. Para esto, de la placa de agar se retiraron los clones respectivos con un palillo y se suspendieron en 100 µl de H₂O e hirvieron por 10 min a 95°C. Se emplearon 10 µl respectivamente de la solución obtenida como plantilla en la PCR. Como cebadores se usaron oligonucleótidos que son homólogos a la unidad de expresión a introducir y al gen ddh. 50 Las condiciones de PCR se seleccionaron como sigue: desnaturalización previa: 5 min a 95°C; desnaturalización: 30 s a 95°C; hibridación 30 s a 55°C; amplificación 2 min a 72°C; 30 ciclos; extensión final 5 min a 72°C. En la mezcla

5 con el ADN de la cepa de partida no pudo generarse un producto de PCR mediante elección de los oligonucleótidos. Solo , se esperaba una banda en caso de clones que han realizado mediante la segunda recombinación la integración de las unidades de expresión Peftu o PeftuPsod directamente en 5' del gen ddh. La integración exitosa de los clones aquí ensayados positivamente se confirmó además mediante análisis de Southern blot (según métodos estándar, como se describen, por ejemplo, en Sambrook et al. (Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor (1989)). Para cada una de las cepas a generarse se realizaron en tal caso 2 hidrólisis diferentes con enzimas de restricción que permiten una diferenciación unívoca de la cepa de partida (ATCC13032 ask (fbr)) y la cepa deseada. Además, con ayuda de una sonda que es homóloga al gen de resistencia a kanamicina se confirmó que las cepas obtenidas no tienen genes-kanamicina en el cromosoma. De esta manera pudieron generarse las siguientes cepas:

10 ATCC13032 lysCfbr Peftu ddh

ATCC13032 lysCfbr PeftuPsod ddh

Todas estas cepas contienen ungen ask feedback-desregulado y producen, por lo tanto, lisina. Se diferencian exclusivamente por la unidad de regulación que controla la transcripción del gen ddh.

15 **Ejemplo 18:**

Efecto del refuerzo de ddh mediante promotor doble en la producción de lisina

Para investigar el efecto del gen ddh con ayuda de un promotor doble se investigaron las siguientes cepas para la producción de lisina:

ATCC13032 lysCfbr

20 ATCC13032 lysCfbr Peftu ddh

ATCC13032 lysCfbr Peftu Psod ddh

25 Para este propósito se cultivaron por 2 días a 30°C las cepas en placas de CM (10,0 g/L de D-glucosa, 2,5 g/L de NaCl, 2,0 g/L de urea, 10,0 g/L de Bacto Pepton (Difco), 5,0 g/L de Yeast Extract (Difco), 5,0 g/L de Beef Extract (Difco), 22,0 g/L de agar (Difco), se autoclavó (20 min. 121°C)). A continuación, se rasparon las células de la placa y se resuspendieron en solución salina. Para el cultivo principal se inocularon 10 ml de medio I y 0,5 g de CaCO₃ autoclavado (Riedel de Haen) en un matraz Erlenmeyer de 100 ml con la suspensión de las células hasta una OD₆₀₀ de 1,5 y se incubó por 40h en uno de tipo Infors AJ118 (empresa Infors, Bottmingen, Suiza) a 220 rpm. A continuación se determinó la concentración de la lisina secretada en el medio.

Medio I:

30 40g/l Sacarosa

60g/l Melaza (calculada respecto del 100% de contenido de azúcar)

10g/l (NH₄)₂SO₄

0.4g/l MgSO₄*7H₂O

0.6g/l KH₂PO₄

35 0.3mg/l Tiamina*HCl

1mg/l Biotina (de una solución madre esterilizada por filtración cuyo pH se ajustó a 8,0 con NH₄OH)

2mg/l FeSO₄

2mg/l MnSO₄

Se ajustó con NH₄OH a pH 7,8, se autoclavó (121 °C, 20 min).

ES 2 380 000 T3

Adicionalmente se agregó vitamina B12 (hidroxicobalamina, Sigma Chemicals) de una solución madre (200 µg/ml, esterilizada por filtración) hasta una concentración final de 100 µg/l

- 5 La determinación de la concentración de aminoácido se efectuó mediante cromatografía líquida de alta presión según Agilent en un sistema HPLC LC de Agilent 1100 Series. Una derivatización de las pre-columnas con orto-ftalaldehído permite la cuantificación de los aminoácidos formados, la separación de la mezcla de aminoácidos tiene lugar en una columna Hypersil AA (Agilent). El resultado de la investigación se representa en la siguiente tabla.

Cepa	Concentración de lisina relativa (%)
ATCC13032 lysCfbr	100
ATCC13032 lysCfbr Peftu ddh	102,9
ATCC13032 lysCfbr PeftuPsod ddh	106,9

LISTADO DE SENCUENCIAS

- <110> BASF AG
- 10 <120> Promotores múltiples
- <130> M/45256
- <160> 84
- <170> PatentIn version 3.1
- <210> 1
- 15 <211> 177
- <212> DNA
- <213> Corynebacterium glutamicum
- <220>
- <221> características_misceláneas
- 20 <223> pGRO
- <220>
- <221> características_misceláneas
- <222> (1)..(177)
- <223> secuencia de promotor si no se presenta promotor adicional corriente abajo
- 25 <220>
- <221> características_misceláneas
- <222> (1)..(155)
- <223> secuencia de promotor si se une un promotor adicional corriente abajo
- <220>

<221> características_misceláneas

<222> (70)..(75)

<223> region 10 putativa

<220>

5 <221> características_misceláneas

<222> (165)..(172)

<223> secuencia putativa de enlazamiento de ribosoma

<400> 1

```

cggcttaaag tttggctgcc atgtgaattt ttagcaccct caacagttga gtgctggcac    60
tctcgggggt agagtgccaa ataggttggt tgacacacag ttgttcaccc gcgacgacgg    120
ctgtgctgga aaccacaac cggcacacac aaaatttttc tcatggaggg attcatc    177
    
```

10 <210> 2

<211> 195

<212> DNA

<213> corynebacterium glutamicum

<220>

15 <221> características_misceláneas

<223> pEFTS

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (1)..(195)

20 <223> secuencia de promotor si no se presenta promotor adicional corriente abajo

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (1)..(178)

<223> secuencia de promotor si se une un promotor adicional corriente abajo

25 <220>

<221> características_misceláneas

<222> (147)..(152)

<223> región 10 putativa

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (162)..(167)

<223> región 10 putativa

<220>

5 <221> características_miscláneas

<222> (179)..(185)

<223> secuencia putativa de enlazamiento de ribosoma

<400> 2

ccccacgac aatggaactt tgacttttaa aatttcacg ccgtgggggc ttttgggca	60
gccagcccgc cgtgtcgcaa cgtaatcgac tgaatacctg tacgatcact ttttagacgg	120
gcgggtaggg ctactgtgcc ctaacctaag cttgtaaagc attaattatc catacataag	180
gaggatcgcc ccgta	195

10 <210> 3

<211> 199

<212> DNA

<213> corynebacterium glutamicum

<220>

15 <221> características_miscláneas

<223> pEFTU

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (1)..(199)

20 <223> secuencia de promotor si no se presenta promotor adicional corriente abajo

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (1)..(176)

<223> secuencia de promotor si se une un promotor adicional corriente abajo

25 <220>

<221> características_miscláneas

<222> (36)..(41)

<223> región 10 putativa

- <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (63)..(68)
- <223> región 10 putativa
- 5 <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (92)..(97)
- <223> región 10 putativa
- <220>
- 10 <221> características_miscláneas
- <222> (187)..(193)
- <223> secuencia putativa de enlazamiento de ribosoma
- <400> 3
ggccgttacc	ctgcgaatgt	ccacagggta	gctggtagtt	tgaaaatcaa	cgccgttgcc	60
cttaggattc	agtaactggc	acattttgta	atgcgctaga	tctgtgtgct	cagtcttcca	120
ggctgcttat	cacagtgaaa	gcaaaaaccaa	ttcgtggctg	cgaaagtcgt	agccaccacg	180
aagtccagga	ggacataca					199
- 15 <210> 4
- <211> 191
- <212> DNA
- <213> Corynebacterium glutamicum
- <220>
- 20 <221> características_miscláneas
- <223> pSOD
- <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (1)..(191)
- 25 <223> secuencia de promotor si no se presenta promotor adicional corriente abajo
- <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (1)..(173)

ES 2 380 000 T3

<223> secuencia de promotor si se une un promotor adicional corriente abajo

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (65)..(70)

5 <223> región 10 putativa

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (86)..(92)

<223> región 10 putativa

10 <220>

<221> características_miscláneas

<222> (175)..(181)

<223> secuencia putativa de enlazamiento de ribosoma

<400> 4

agctgccaat tattccgggc ttgtgacccg ctacccgata aataggctcg ctgaaaaatt	60
tcgttgcaat atcaacaaaa aggcctatca ttgggaggtg tcgcaccaag tacttttgcg	120
aagcgccatc tgacggattt tcaaaagatg tatatgctcg gtgcggaaac ctacgaaagg	180
atTTTTtacc c	191

15

<210> 5

<211> 52

<212> DNA

<213> Secuencia Artificial

20 <220>

<223> Cebador

<400> 5

cccgggatcc gctagcggcg cgccggccgg cccggtgtga aataccgcac ag 52

<210> 6

25 <211> 53

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

ES 2 380 000 T3

<223> Cebador

<400> 6

tctagactcg agcggccgcg gccggccttt aaattgaaga cgaaagggcc tcg 53

<210> 7

5 <211> 47

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

10 <400> 7

gagatctaga cccggggatc cgctagcggg ctgctaaagg aagcgga 47

<210> 8

<211> 38

<212> ADN

15 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 8

gagaggcgcg ccgctagcgt gggcgaagaa ctccagca 38

20 <210> 9

<211> 34

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

25 <223> Cebador

<400> 9

gagagggcgcg ccgcgcaaag tcccgttcg tgaa 34

<210> 10

<211> 34

30 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

ES 2 380 000 T3

<220>

<223> Cebador

<400> 10

gagagggcgg ccgctcaagt cggtaagcc acgc 34

5 <210> 11

<211> 140

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

10 <223> oligonucleótido

<400> 11

tcgaatttaa atctcgagag gcctgacgtc gggcccggta ccacgcgtca tatgactagt 60

tcggacctag ggatatcgtc gacatcgatg ctcttctgcg ttaattaaca attgggatcc 120

tctagacccg ggatttaaatt 140

<210> 12

15 <211> 140

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> oligonucleótido

20 <400> 12

gatcatttaa atcccgggtc tagaggatcc caattgttaa ttaacgcaga agagcatcga 60

tgctgacgat atccctaggt ccgaactagt catatgacgc gtggtaccgg gcccgacgtc 120

aggcctctcg agatttaaatt 140

<210> 13

<211> 4323

<212> ADN

25 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_miscláneas

<223> Plásmido pCLiK5MCS

<220>

5 <221> características_miscláneas

<222> (457)..(1248)

<223> KanR

<220>

<221> características_miscláneas

10 <222> (3840)..(4302)

<223> PsacB (complementario)

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (2418)..(3839)

15 <223> SacB (complementario)

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (1515)..(2375)

<223> Ori-EC (pMB) (complementario)

20 <400> 13

tcgagaggcc	tgacgtcggg	cccggtagca	cgcgatcatat	gactagttcg	gacctagggg	60
tatcgtcgc	atcgaatgct	ttctgctgta	attaacaatt	gggatcctct	agacccggga	120
tttaaatcgc	tagcgggctg	ctaaaggaag	cggaacacgt	agaaagccag	tccgcagaaa	180
cggtgctgac	cccggatgaa	tgtagctac	tggtctatct	ggacaagggg	aaacgcaagc	240
gcaaagagaa	agcaggtagc	ttgtagtggg	cttacctggc	gatagctaga	ctgggctggt	300
ttatggacag	caagcgaacc	ggaattgcca	gctggggcgc	cctctggtaa	ggttgggaag	360
ccctgcaaag	taaactggat	ggctttcttg	ccgccaagga	tctgatggcg	caggggatca	420
agatctgatc	aagagacagg	atgaggatcg	tttcgcatga	ttgaacaaga	tggattgcac	480
gcaggttctc	cggccgcttg	ggtggagagg	ctattcggct	atgactgggc	acaacagaca	540
atcggctgct	ctgatgccgc	cgtgttccgg	ctgtcagcgc	aggggcgccc	ggttcttttt	600
gtcaagaccg	acctgtccgg	tgccctgaat	gaactgcagg	acgaggcagc	gcggctatcg	660
tggctggcca	cgacgggctg	tccttgcgca	gctgtgctcg	acgttgctac	tgaagcggga	720
agggactggc	tgctattggg	cgaagtgccg	gggcaggatc	tcctgtcatc	tcaccttgct	780
cctgccgaga	aagtatccat	catggctgat	gcaatgcggc	ggctgcatac	gcttgatccg	840
gctacctgcc	cattcgacca	ccaagcgaag	catcgcatcg	agcagcagc	tactcggatg	900
gaagccggtc	ttgtcgaatc	ggatgatctg	gacgaagagc	atcaggggct	cgcgccagcc	960
gaactgttcg	ccaggctcaa	ggcgcgcatg	cccgcggcgc	aggatctcgt	cgtgacctat	1020
ggcgaatgct	gcttgccgaa	tatcatggtg	gaaaatggcc	gcttttctgg	attcatcgac	1080
tgtggccggc	tggtgtggtg	ggaccgctat	caggacatag	cgttggtctc	ccgtgatatt	1140
gctgaagagc	ttggcggcga	atgggctgac	cgcttctctg	tgctttacgg	tatcgccgct	1200
cccgaatcgc	agcgcacgac	cttctatcgc	cttcttgacg	agttcttctg	agcgggactc	1260
tggggttcga	aatgaccgac	caagcgcgac	ccaacctgcc	atcacgagat	ttcgaattcca	1320
ccgccgcctt	ctatgaaagg	ttgggcttcg	gaatcgtttt	ccgggacgcc	ggctggatga	1380
tcctccagcg	cggggatctc	atgctggagt	tcttcgcca	cgctagcggc	gcgcccggcg	1440
gcccgggtgtg	aaataaccga	cagatgcgta	aggagaaaat	accgcatcag	gcgctcttcc	1500
gcttctctgc	tactgactc	gctgcgctcg	gtcgttcggc	tgcggcgagc	ggtatcagct	1560
caactaaagg	cggtaatagc	ggtatccaca	gaatcagggg	ataacgcagg	aaagaacatg	1620
tgagcaaaaag	gccagcaaaa	ggccaggaac	cgtaaaaagg	ccgcgttgct	ggcgtttttc	1680
cataggctcc	gccccctga	cgagcatcac	aaaaatcgac	gctcaagtca	gaggtggcga	1740
aacccgacag	gactataaag	ataccaggcg	ttccccctg	gaagctccct	cgtgcgctct	1800
cctgttccga	ccctgccgct	taccggatac	ctgtccgcct	ttctcccttc	gggaagcgtg	1860
gcgctttctc	atagctcacg	ctgtaggtat	ctcagttcgg	tgtaggtcgt	tcgctccaag	1920

ES 2 380 000 T3

ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttata cggtaactat 1980
cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac 2040
aggattagca gagcgaggta tgtaggcggg gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac 2100
tacggctaca ctagaaggac agtatttggg atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc 2160
ggaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt 2220
tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc 2280
tttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg 2340
agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaagg ccggccgagg ccgccatcgg 2400
cattttcttt tgcgttttta tttgttaact gttaattgtc cttgttcaag gatgctgtct 2460
ttgacaacag atgttttctt gcctttgatg ttcagcagga agctcggcgc aaacgttgat 2520
tgtttgtctg cgtagaatcc tctgtttgtc atatagcttg taatcacgac attgtttcct 2580

ttcgcttgag gtacagcga ggtgagtaa gtaaaggtta catcgtagg atcaagatcc 2640
attttaaca caaggccagt tttgttcagc ggcttgtagt ggccagttaa agaattagaa 2700
acataacca gcatgtaaat atcgtagac gtaatgccgt caatcgtcat tttgatccg 2760
cgggagtcag tgaacaggta ccatttgccg ttcattttaa agacgttcgc gcgttcaatt 2820
tcatctgta ctgtgtaga tgcaatcagc ggtttcatca ctttttcag tgtgtaatca 2880
tcgttagct caatcatacc gagagcggc tttgctaact cagccgtgcg tttttatcg 2940
cttgcagaa gttttgact ttcttgacgg aagaatgatg tgcttttgcc atagtatgct 3000
ttgtaaata aagattcttc gccttgtagt ccatcttcag ttccagtgtt tgcttcaaat 3060
actaagtatt tgtggccttt atcttctacg tagtgaggat ctctcagcgt atggtgtcg 3120
cctgagctgt agttgccttc atcgatgaac tgctgtacat tttgatacgt tttccgta 3180
ccgtcaaaga ttgattata atcctctaca ccgttgatgt tcaaagagct gtctgatgct 3240
gatacgtaa cttgtgagc tgctcaggtt gttttgccgt aatggttacc ggagaaatca 3300
gtgtagaata aacggatfff tccgtcagat gtaaatgtgg ctgaacctga ccattcttgt 3360
gtttggtctt ttaggataga atcatttga tcgaatttgt cgctgtcttt aaagacgagg 3420
ccagcgtfff tccagctgtc aatagaagtt tcgccgactt tttgatagaa catgtaaadc 3480
gatgtgcat ccgcattfff aggatctccg gctaatagca agacgatgtg gtagccgtga 3540
tagtttgcga cagtgcgctc agcgttttgt aatggccagc tgtcccaaac gtccaggcct 3600
tttgcagaag agatattfff aattgtggac gaatcaaatt cagaaacttg atattttca 3660
ttttttgct gttcagggat ttgcagcata tcatggcgtg taatatggga aatgccgtat 3720
gtttccttat atggcttttg gttcgtttct ttcgcaaacg cttgagttgc gcctcctgcc 3780
agcagtgcgg tagtaaagg taatactgtt gcttgttttg caaacctttt gatgttcac 3840
gttcatgtct cttttttat gtactgtgtt agcggctctc ttcttcagc cctcctgttt 3900
gaagatggca agttagttac gcacaataaa aaaagaccta aaatatgtaa ggggtgacgc 3960
caaagtatac actttgccct ttacacattt taggtcttgc ctgctttatc agtaacaaac 4020
ccgcgcgatt tacttttcca cctcattcta ttagactctc gtttggattg caactggtct 4080
attttctct tttgtttgat agaaaatcat aaaaggattt gcagactacg ggctaaaga 4140
actaaaaa ctatctgttt cttttcattc tctgtatfff ttatagtttc tgttgcattg 4200

ES 2 380 000 T3

gcataaagtt gcctttttaa tcacaattca gaaaatatca taatatctca tttcactaaa 4260
taatagttaa cggcagggtat atgtgatggg ttaaaaagga tcggcggccg ctcgatttaa 4320
atc 4323

<210> 14

<211> 28

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 14

gcgcggtacc tagactcacc ccagtgt 28

10 <210> 15

<211> 30

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 15

ctctactagt ttagatgtag aactcgatgt 30

<210> 16

<211> 6349

20 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

25 <221> características_miscláneas

<223> pCLiK5MCS PmetA metA

<220>

<221> características_miscláneas

- <222> (1727)..(2518)
<223> KanR
<220>
<221> características_miscláneas
- 5 <222> (4799)..(5920)
<223> Proteína Rep
<220>
<221> características_miscláneas
<222> (3791)..(4465)
- 10 <223> Ori-Ec (pMB) (komplementär)
<220>
<221> características_miscláneas
<222> (2785)..(3645)
<223> orf1
- 15 <220>
<221> características_miscláneas
<222> (42)..(177)
<223> PmetA
<220>
- 20 <221> características_miscláneas
<222> (178)..(1311)
<223> metA
<400> 16

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa tctcgagagg cctgacgtcg ggccccgtac ctagactcac cccagtgctt	60
aaagcgctgg gtttttcttt ttcagactcg tgagaatgca aactagacta gacagagctg	120
tccatataca ctggacgaag ttttagtctt gtccaccag aacaggcggg tattttcatg	180
cccaccctcg cgccttcagg tcaacttgaa atccaagcga tcggtgatgt ctccaccgaa	240
gccggagcaa tcattacaaa cgctgaaatc gcctatcacc gctgggggta ataccgcgta	300
gataaagaag gacgcagcaa tgtcgttctc atcgaacacg ccctcactgg agattccaac	360
gcagccgatt ggtgggctga cttgctcggg cccggcaaag ccatcaacac tgatatttac	420
tgcgtgatct gtaccaacgt catcgggtgg tgcaacgggt ccaccggacc tggctccatg	480
catccagatg gaaatttctg gggtaatcgc ttccccgcca cgtccattcg tgatcaggta	540
aacgccgaaa aacaattcct cgacgcactc ggcatcacca cggtcgccgc agtacttggt	600
ggttccatgg gtgggccccg caccctagag tgggccgcaa tgtaccaga aactgttggc	660
gcagctgctg ttcttgcaat ttctgcacgc gccagcgcct ggcaaactcg cattcaatcc	720
gcccaaatta aggcgattga aaacgaccac cactggcacg aaggcaacta ctacgaatcc	780
ggctgcaacc cagccaccgg actcggcgcc gcccgcgca tcgcccacct cacctaccgt	840

ES 2 380 000 T3

ggcgaactag	aaatcgacga	acgcttcggc	accaaagccc	aaaagaacga	aaaccactc	900
ggtccctacc	gcaagcccga	ccagcgcttc	gccgtggaat	cctacttggga	ctaccaagca	960
gacaagctag	tacagcgttt	cgacgccggc	tcctacgtct	tgctcaccga	cgccctcaac	1020
cgccacgaca	ttggtcgcga	ccgcggaggc	ctcaacaagg	cactcgaatc	catcaaagtt	1080
ccagtccttg	tcgcaggcgt	agataccgat	atthttgtacc	cctaccacca	gcaagaacac	1140
ctctccagaa	acctgggaaa	tctactggca	atggcaaaaa	tcgtatcccc	tgctcgccac	1200
gatgctttcc	tcaccgaaaag	ccgccaaatg	gatcgcacgc	tgaggaactt	cttcagcctc	1260
atctccccag	acgaagacaa	cccttcgacc	tacatcgagt	tctacatcta	aactagttcg	1320
gacctagggg	tatcgtcgac	atcgatgctc	ttctgcgtta	attaacaatt	gggatcctct	1380
agaccgggga	tttaaatcgc	tagcgggctg	ctaaaggaag	cggaacacgt	agaaagccag	1440
tccgcagaaa	cggtgctgac	cccggatgaa	tgctcagctac	tgggctatct	ggacaagggg	1500
aaacgcaagc	gcaaagagaa	agcaggtagc	ttgcagtggg	cttacatggc	gatagctaga	1560
ctgggcgggt	ttatggacag	caagcgaacc	ggaattgcca	gctggggcgc	cctctggtaa	1620
ggttgggaag	ccctgcaaag	taaactggat	ggctttcttg	ccgccaagga	tctgatggcg	1680
caggggatca	agatctgatc	aagagacagg	atgaggatcg	tttcgcatga	ttgaacaaga	1740
tggattgcac	gcaggttctc	cggccgcttg	ggtggagagg	ctattcggct	atgactgggc	1800
acaacagaca	atcggtgct	ctgatgccgc	cgtgttccgg	ctgtcagcgc	aggggcgccc	1860
ggttcttttt	gtcaagaccg	acctgtccgg	tgccctgaat	gaactgcagg	acgaggcagc	1920
gcggctatcg	tggctggcca	cgacgggcgt	tccttgcgca	gctgtgctcg	acgttgctac	1980
tgaagcggga	agggactggc	tgctattggg	cgaagtgcgg	gggcaggatc	tcctgtcatc	2040
tcaccttgct	cctgccgaga	aagtatccat	catggctgat	gcaatgcggc	ggctgcatac	2100
gcttgatccg	gctacctgcc	cattcgacca	ccaagcgaag	catcgcacgc	agcgagcacg	2160
tactcggatg	gaagccggtc	ttgtcgatca	ggatgatctg	gacgaagagc	atcaggggct	2220
cgcgccagcc	gaactgttcg	ccaggctcaa	ggcgcgcacg	cccgcggcgc	aggatctcgt	2280
cgtgacccat	ggcgtgcct	gcttgccgaa	tatcatggtg	gaaaatggcc	gcttttctgg	2340
attcatcgac	tgtggccggc	tgggtgtggc	ggaccgctat	caggacatag	cgttggctac	2400
ccgtgatatt	gctgaagagc	ttggcggcga	atgggctgac	cgcttcctcg	tgctttacgg	2460
tatcgccgct	cccgatcgc	agcgcacgc	.cttctatcgc	cttcttgacg	agttcttctg	2520
agcgggactc	tggggttcga	aatgaccgac	caagcgacgc	ccaacctgcc	atcacgagat	2580
ttcgattcca	ccgccgcctt	ctatgaaagg	ttgggcttcg	gaatcgtttt	ccgggacgcc	2640
ggctggatga	tcctccagcg	cggggatctc	atgctggagt	tcttcgcca	cgctagcggc	2700
gcgcccggccg	gcccgggtgtg	aaataccgca	cagatgcgta	aggagaaaat	accgcatcag	2760
gcgctcttcc	gcttctcgc	tactgactc	gctgcgctcg	gtcgttcggc	tgcggcgagc	2820
ggtatcagct	cactcaaagg	cggtaatcgc	ggtatccaca	gaatcagggg	ataacgcagg	2880
aaagaacatg	tgagcaaaaag	gccagcaaaa	ggccaggaac	cgtaaaaagg	ccgcgttgct	2940
ggcgtttttc	cataggctcc	gccccctga	cgagcatcac	aaaaatcgac	gctcaagtca	3000
gaggtggcga	aaccgcagag	gactataaag	ataccaggcg	tttccccctg	gaagctccct	3060
cgtgcgctct	cctgttccga	ccctgccgct	taccggatac	ctgtccgcct	ttctcccttc	3120

ES 2 380 000 T3

gggaaagcgtg ggcctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt 3180
 tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct ggccttatac 3240
 cggtaaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc 3300
 cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg 3360
 gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggg atctgcgctc tgctgaagcc 3420
 agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag 3480
 cggtggtttt tttgtttga agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga 3540
 tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gtaagggtat 3600
 tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaagg ccggccgcgg 3660
 ccgcgcaaag tcccgttcg tgaaaattht cgtgccgctg gatthttccgc caaaaacttht 3720
 aacgaacgtt cgttataatg gtgtcatgac cttcacgacg aagtactaaa attggcccga 3780
 atcatcagct atggatctct ctgatgtcgc gctggagctc gacgcgctcg atgctgccgt 3840
 cgatttaaaa acggtgatcg gatthttccg agctctcgat acgacggacg cgccagcatc 3900
 acgagactgg gccagtgccg cgagcgacct agaaactctc gtggcggatc ttgaggagct 3960
 ggctgacgag ctgcgtgctc ggccagcgcc aggaggacgc acagtagtgg aggatgcaat 4020
 cagttgcgcc tactgcggtg gcctgattcc tccccggcct gaccgcgag gacggcgcg 4080
 aaaatattgc tcagatgctg gtcgtgccg agccagccgc gagcgcgcca acaaacgcca 4140
 cgccgaggag ctggaggcgg ctaggctcga aatggcgctg gaagtgcgtc ccccgagcga 4200
 aatthtgcc atggctctca cagagctgga agcggcagcg agaattatcg cgatcgtggc 4260
 ggtgcccgca ggcatagcaa acatcgtaaa tgccgcgttt cgtgtgccgt ggccgcccag 4320
 gacgtgtcag cgccgccacc acctgcaccg aatcggcagc agcgtcgcgc gtcgaaaaag 4380
 cgcacaggcg gcaagaagcg ataagctgca cgaatacctg aaaaatgtht aacgccccgt 4440
 gagcggtaac tcacagggcg tcggctaacc cccagthcaa acctgggaga aagcgtcaa 4500
 aaatgactct agcggattca cgagacattg acacaccggc ctggaaattht tccgctgatc 4560
 tgthcgacac ccatcccag ctgcgctgc gatcacgtgg ctggacgagc gaagaccgcc 4620
 gcgaattcct cgctcacctg ggcagagaaa atthccaggg cagcaagacc cgcgacttctg 4680
 ccagcgttg gatcaagac ccggacacgg agaaacacag ccgaagtht accgagthtgg 4740
 thcaaatcg cthgcccgt gccagatgt tgctctgac cagcgcgagc acgcagccgt 4800
 gctthctctg gacattgatg tgccgagcca ccaggccggc gggaaatcg agcacgtaaa 4860
 ccccgaggtht tacgcgattt tggagcgtg ggcacgcctg gaaaaagcgc cagctthgat 4920
 cggcgtgaaat ccactgagcg ggaatgcca gthcatctgg thcattgatc cggthgatgc 4980
 cgcagcaggc atgagcagcc cgaatagcgc cctgctggct gcaacgaccg aggaaatgac 5040
 ccgcgttht ggcgctgacc aggtthttht acataggctg agccgtggcc actgcactct 5100
 ccgacgatcc cagccgtacc gctggcatgc ccagcacaat cgcgtggatc gcctagctga 5160
 ththtgag gthgctcga thgatctcagg cacagaaaa cthaaaaaac gctatgagca 5220
 ggagthttht agcggacggg cacgtatcga agcggcaaga aaagccactg cggagcaaa 5280
 agcacttht acgctthgag caagcctgcc gagcgcgct gaagcgtctg gagagctgat 5340
 cgacggcgtc cgtgthctct ggactgtht agggcgtgcc gcccgthgat agacggcttht 5400
 thgccagct thgactgthg gataccagtht aaaagcggct gthgagcgc taaaagacac 5460

ES 2 380 000 T3

caagggatcat cgagcctacg agcgtgccta caccgtcgct caggcggtcg gaggaggccg 5520
 tgagcctgat ctgccgccgg actgtgaccg ccagacggat tggccgacac gtgtgacgag 5580
 ctacgtcgct aaagggcagc cagtcgtccc tgctcgctcag acagagacgc agagccagcc 5640
 gaggcgaaaa gctctggcca ctatgggaag acgtggcggt aaaaaggccg cagaacgctg 5700
 gaaagaccca aacagtgagt acgcccgagc acagcgagaa aaactagcta agtccagtca 5760
 acgacaagct aggaaagcta aaggaaatcg cttgaccatt gcaggttggt ttatgactgt 5820
 tgagggagag actggctcgt ggccgacaat caatgaagct atgtctgaat ttagcgtgtc 5880
 acgtcagacc gtgaatagag cacttaaggt ctgctgggcat tgaacttcca cgaggacgcc 5940
 gaaagcttcc cagtaaatgt gccatctcgt aggcagaaaa cggttcccc gtagggcttc 6000
 tctcttggcc tcctttctag gtcgggctga ttgctcttga agctctctag gggggctcac 6060
 accataggca gataacgttc cccaccggct cgcctcgtaa gcgcacaagg actgctccca 6120
 aagatcttca aagccactgc cgcgactgcc ttcgcgaagc cttgccccgc ggaaatttcc 6180
 tccaccgagt tcgtgcacac ccctatgcca agcttctttc accctaaatt cgagagattg 6240
 gattcttacc gtggaaattc ttcgcaaaaa tcgtcccctg atcgcccctg cgacgttggc 6300
 gtcggtgccg ctggttgccg ttggcttgac cgacttgatc agcggccgc 6349

<210> 17

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 17

gagactcgag agctgccaat tattccggg 29

10 <210> 18

<211> 41

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 18

cctgaaggcg cgaggggtggg catgggtaaa aaatccttc g 41

<210> 19

<211> 19

- <212> ADN
<213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Cebador
- 5 <400> 19
cccaccctcg cgccttcag 19
<210> 20
<211> 18
<212> ADN
- 10 <213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Cebador
<400> 20
ctgggtacat tgcggccc 18
- 15 <210> 21
<211> 6386
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial
<220>
- 20 <223> Plásmido
<220>
<221> características_miscláneas
<223> pCLiK5MCS PSODmetA
<220>
- 25 <221> características_miscláneas
<222> (1752)..(2543)
<223> KanR
<220>
<221> características_miscláneas
- 30 <222> (4824)..(5945)
<223> Proteína Rep

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (2810)..(3670)

<223> Ori-Ec (pMB) (complementario)

5 <220>

<221> características_misceláneas

<222> (3816)..(4490)

<223> orf1

<220>

10 <221> características_misceláneas

<222> (6)..(196)

<223> Psod

<220>

<221> características_misceláneas

15 <222> (197)..(1330)

<223> metA

<400> 21

ES 2 380 000 T3

tcgagagctg	ccaattattc	cgggcttggtg	acccgctacc	cgataaatag	gtcggctgaa	60
aaatttcggt	gcaatatcaa	caaaaaggcc	tatcattggg	aggtgtcgca	ccaagtactt	120
ttgcaagcg	ccatctgacg	gattttcaaa	agatgtatat	gctcgggtgcg	gaaacctacg	180
aaaggatfff	ttaccatgc	ccaccctcgc	gccttcaggt	caacttgaaa	tccaagcgat	240
cggatgatg	tccaccgaag	cggagcaat	cattacaaac	gctgaaatcg	cctatcaccg	300
ctggggtgaa	taccgcgtag	ataaagaagg	acgcagcaat	gtcgttctca	tcgaacacgc	360
cctcactgga	gattccaacg	cagccgattg	gtgggctgac	ttgctcggtc	ccggcaaagc	420
catcaacact	gatatttact	gcgtgatctg	taccaacgtc	atcgggtggtt	gcaacggttc	480
caccggacct	ggctccatgc	atccagatgg	aaatttctgg	ggtaatcgct	tccccgccac	540
gtccattcgt	gatcaggtaa	acgccgaaaa	acaattcctc	gacgcactcg	gcatcaccac	600
ggtcgcccga	gtacttggtg	gttccatggg	tggtgcccgc	accctagagt	gggcccgaat	660
gtaccagaa	actggtggcg	cagctgctgt	tcttgacggt	tctgcacgcg	ccagcgcctg	720
gcaaatcggc	attcaatccg	cccaaattaa	ggcgattgaa	aacgaccacc	actggcacga	780
aggcaactac	tacgaatccg	gctgcaacc	agccaccgga	ctcggcgccg	cccgacgcat	840
cgcccacctc	acctaccgtg	gcgaactaga	aatcgacgaa	cgcttcggca	ccaaagccca	900
aaagaacgaa	aaccactcg	gtccctaccg	caagcccgac	cagcgcttcg	ccgtggaatc	960
ctacttgga	taccaagcag	acaagctagt	acagcgtttc	gacgccggct	cctacgtctt	1020
gctcaccgac	gccctcaacc	gccacgacat	tggtcgcgac	cgcgagggcc	tcaacaaggc	1080
actcgaatcc	atcaaagtcc	cagtccttgt	cgcaggcgta	gataccgata	ttttgtaccc	1140
ctaccaccag	caagaacacc	tctccagaaa	cctgggaaat	ctactggcaa	tggcaaaaat	1200
cgtatcccct	gtcggccacg	atgctttcct	caccgaaagc	cgccaaatgg	atcgcacgct	1260

ES 2 380 000 T3

gaggaacttc ttcagcctca tctccccaga cgaagacaac ccttcgacct acatcgagtt 1320
 ctacatctaa catatgacta gttcggacct agggatctcg tgcacatcga tgctcttctg 1380
 cgtaattaa caattgggat cctctagacc cgggatttaa atcgctagcg ggctgctaaa 1440
 ggaagcggaa cacgtagaaa gccagtcgcg agaaacgggtg ctgacccccg atgaatgtca 1500
 gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcgaaa gagaaagcag gtagcttgca 1560
 gtgggcttac atggcgatag ctgactggg cggttttatg gacagcaagc gaaccggaat 1620
 tgccagctgg ggcgacctct ggtaagggtg ggaagccctg caaagtaaac tggatggctt 1680
 tcttgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagatc tgatcaagag acaggatgag 1740
 gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg 1800
 agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt 1860
 tccggctgtc agcgcagggg cggccggttc tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc 1920
 tgaatgaact gcaggacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt 1980
 gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga ctggctgcta ttgggcgaag 2040
 tgccggggca ggtatcctc tcatctcacc ttgctcctgc cgagaaagta tccatcatgg 2100
 ctgatgcaat gcggcggctg catacgttg atccggctac ctgcccattc gaccaccaag 2160
 cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc gtagggaagc cggctctgtc gatcaggatg 2220
 atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcgccagg ctcaaggcgc 2280
 gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga tgcctgcttg ccgaatatca 2340
 tggtgaaaaa tggccgcttt tctggattca tgcactgtgg cggctgggt gtggcggacc 2400
 gctatcagga catagcgttg gctaccgctg atattgctga agagcttggc ggcgaatggg 2460
 ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc atgccttct 2520
 atgccttct tgacgagttc ttctgagcgg gactctgggg ttcgaaatga ccgaccaagc 2580
 gacgcccac ctgccatcac gagatttcga ttccaccgcc gccttctatg aaaggttggg 2640
 ctctggaatc gttttccggg acgccggctg gatgatctc cagcgcgggg atctcatgct 2700
 ggagttcttc gccacgcta gcggcgcgc ggccggcccg gtgtgaaata ccgcacagat 2760
 gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgtt cttccgctc ctgctcact gactcgtgc 2820
 gctcggctgt tcggctgcgg cgagcgtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat 2880
 ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca 2940
 ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgccc cctgacgagc 3000
 atcacaaaaa tcgacgtca agtcagaggt ggcgaaacc gacaggacta taaagatacc 3060
 aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg 3120
 gatacctgtc gcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgt ttctcatagc tcacgtgta 3180
 ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgt ccaagctggg ctgtgtgcac gaacccccg 3240
 ttacgcccga cgctgcgcc ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaaagac 3300
 acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag 3360
 gcggtgctac agagttcttg aagtgggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat 3420
 ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa aagagttggg agctcttgat 3480
 ccggcaaaaca aaccaccgct ggtagcgggtg gttttttgt ttgcaagcag cagattacgc 3540
 gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatctttc tacggggtct gacgctcagt 3600

ES 2 380 000 T3

ggaacgaaaa ctcacgttaa gggatthttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct 3660
 agatcctttt aaaggccggc cgcggccgcg caaagtcccg cttcgtgaaa attttcgtgc 3720
 cgcgtgattt tccgcaaaa actttaacga acgttcgtta taatgggtgc atgaccttca 3780
 cgacgaagta ctaaaattgg cccgaatcat cagctatgga tctctctgat gtcgctggtg 3840
 agtccgacgc gctcgatgct gccgctgatt taaaaacggt gatcggattt ttccgagctc 3900
 tcgatacgac ggacgcgcca gcatcacgag actgggcccag tgccgagcgc gacctagaaa 3960
 ctctcgtggc ggatcttgag gagctggctg acgagctgcg tgctcggcca gcgccaggag 4020
 gacgcacagt agtggaggat gcaatcagtt gcgcctactg cgggtggcctg attcctcccc 4080
 ggctgacctt gcgaggacgg cgcgcaaaa attgctcaga tgctgtctgt gccgcagcca 4140
 gccgagcgc cgccaacaaa cgcacgccc aggagctgga ggccgctagg tcgcaaatgg 4200
 cgctggaagt gcgtccccc agcgaattt tggccatggt cgtcacagag ctggaagcgg 4260
 cagcgagaat tatcgcgatc gtggcgggtgc ccgagggcat gacaaacatc gtaaatgccg 4320
 cgttctgtgt gccgtggccg cccaggacgt gtcagcgcgc ccaccacctg caccgaatcg 4380
 gcagcagcgt cgcgctcga aaaagcgcac aggcggcaag aagcgataag ctgcacgaat 4440
 acctgaaaaa tgttgaacgc cccgtgagcg gtaactcaca gggcgtcggc taacccccag 4500
 tccaaacctg ggagaaagcg ctcaaaaatg actctagcgg attcacgaga cattgacaca 4560
 ccggcctgga aatthtccgc tgatctgttc gacaccatc ccgagctcgc gctgcatca 4620
 cgtggctgga cgagcgaaga ccgcccga tctctcgtc acctgggag agaaaatttc 4680
 cagggcagca agaccgcga cttcgcagc gcttgatca aagaccgga cacggagaaa 4740
 cacagccgaa gttataccga gttggttcaa aatcgttgc ccggtgccag tatggtgctc 4800
 tgacgcacgc gcagcacgca gccgtgcttg tcttgacat tgatgtgcc agccaccagg 4860
 ccggcgggaa aatcgagcac gtaaaccctg aggtctacgc gatthtggag cgctgggac 4920
 gcctggaaaa agcgcagct tggatcggcg tgaatccact gagcgggaaa tgccagctca 4980
 tctggctcat tgatccggtg tatgccgag caggcatgag cagcccgaat atgcgctgc 5040
 tggtgcaac gaccgaggaa atgaccgcg thttcggcgc tgaccaggct thttcacata 5100
 ggctgagccg tggccactgc actctccgac gatcccagcc gtaccgctgg catgcccagc 5160
 acaatcgcgt ggatcgccta gctgatctta tggaggttgc tcgcatgatc tcaggcacag 5220
 aaaaacctaa aaaacgctat gagcaggagt thtttagcgg acgggcacgt atcgaagcgg 5280
 caagaaaagc cactgcggaa gcaaaagcac ttgccagct tgaagcaagc ctgccgagcg 5340
 ccgctgaagc gtctggagag ctgatcgagc gcgtccgtgt cctctggact gctccagggc 5400
 gtgccgcccg tgatgagacg gctthttcgc acgctthtgc tgtgggatac cagthaaaag 5460
 cggctggtga gcgcctaaaa gacaccaagg gtcatcgagc ctacgagcgt gcctacaccg 5520
 tcgctcaggc ggtcggagga ggccgtgagc ctgatctgcc gccggactgt gaccgccaga 5580
 cggattggcc gcgacgtgtg cgcggctacg tcgctaaagg ccagccagtc gtccctgctc 5640
 gtcagacaga gacgcagagc cagccgaggc gaaaagctct ggccactatg ggaagacgtg 5700
 gcggtaaaaa ggccgagaa cgctggaaag acccaaacag tgagtacgcc cgagcacagc 5760
 gagaaaaact agctaagtcc agtcaacgac aagctaggaa agctaaagga aatcgttga 5820
 ccattgcagg ttgthttatg actgthtgg gagagactgg ctcgtggccg acaatcaatg 5880

ES 2 380 000 T3

aagctatgtc tgaatttagc gtgtcacgtc agaccgtgaa tagagcactt aaggctctgcg 5940
 ggcattgaac ttccacgagg acgccgaaag cttcccagta aatgtgccat ctcgtaggca 6000
 gaaaacggtt cccccgtagg gtctctctct tggcctcctt tctaggtcgg gctgattgct 6060
 cttgaagctc tctagggggg ctcacacat aggcagataa cgttccccac cggctcgcct 6120
 cgtaagcgca caaggactgc tcccaaagat cttcaaagcc actgccgca ctgccttcgc 6180
 gaagccttgc cccgcggaaa tttcctccac cgagttcgtg cacacccta tgccaagctt 6240
 ctttcaccct aaattcgaga gattggattc ttaccgtgga aattcttcgc aaaaatcgtc 6300
 ccctgatcgc ctttgcgacg ttggcgtcgg tgccgctggt tgcgcttggc ttgaccgact 6360
 tgatcagcgg ccgctcgatt taaatc 6386

<210> 22

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 22

gagactcgag ggccgttacc ctgcgaatg 29

10 <210> 23

<211> 40

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 23

cctgaaggcg cgagggtggg cattgtatgt cctcctggac 40

<210> 24

<211> 19

20 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 24

- cccaccctcg cgccttcag 19
- <210> 25
- <211> 18
- <212> ADN
- 5 <213> Secuencia Artificial
- <220>
- <223> Cebador
- <400> 25
- ctgggtacat tgcggccc 18
- 10 <210> 26
- <211> 6394
- <212> ADN
- <213> Secuencia Artificial
- <220>
- 15 <223> Plásmido
- <220>
- <221> características_misceláneas
- <223> pCLiK5MCS P EFTUmetA
- <220>
- 20 <221> características_misceláneas
- <222> (1772)..(2563)
- <223> KanR
- <220>
- <221> características_misceláneas
- 25 <222> (4844)..(6965)
- <223> Proteína Rep
- <220>
- <221> características_misceláneas
- <222> (2830)..(3690)
- 30 <223> Ori-Ec (pMB) (complementario)
- <220>

<221> características_miscláneas

<222> (3836)..(4510)

<223> orf1

<220>

5 <221> características_miscláneas

<222> (18)..(216)

<223> Peftu

<220>

<221> características_miscláneas

10 <222> (217)..(1350)

<223> metA

<400> 26

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa	tctcgagggc	cgttaccctg	cgaatgtcca	cagggtagct	ggtagtttga	60
aaatcaacgc	cgttgccctt	aggattcagt	aactggcaca	ttttgtaatg	cgctagatct	120
gtgtgctcag	tcttccaggc	tgcttatcac	agtgaaagca	aaaccaattc	gtggctgcga	180
aagtcgtagc	caccacgaag	tccaggagga	catacaatgc	ccaccctcgc	gccttcaggt	240
caacttgaaa	tccaagcgat	cggtgatgtc	tccaccgaag	ccggagcaat	cattacaaac	300
gctgaaatcg	cctatcaccg	ctggggtgaa	taccgcgtag	ataaagaagg	acgcagcaat	360
gtcgttctca	tcgaacacgc	cctcactgga	gattccaacg	cagccgattg	gtgggctgac	420
ttgctcggtc	ccggcaaagc	catcaacact	gatatttact	gcgtgatctg	taccaacgtc	480
atcggtggtt	gcaacggttc	caccggacct	ggctccatgc	atccagatgg	aaatttctgg	540
ggtaatcgct	tccccgccac	gtccattcgt	gatcaggtaa	acgccgaaaa	acaattcctc	600
gacgcactcg	gcatcaccac	ggtcgccgca	gtacttggtg	gttccatggg	tggtgccccg	660
accctagagt	gggcccgaat	gtaccagaa	actgttggcg	cagctgctgt	tcttgagtt	720
tctgcacgcg	ccagcgcctg	gcaaactggc	attcaatccg	cccaaattaa	ggcgattgaa	780
aacgaccacc	actggcacga	aggcaactac	tacgaatccg	gctgcaaccc	agccaccgga	840
ctcggcgccg	cccgacgcat	cgcccacctc	acctaccgtg	gcgaactaga	aatcgacgaa	900
cgcttcggca	ccaaagccca	aaagaacgaa	aaccactcg	gtccctaccg	caagcccgac	960
cagcgcttcg	ccgtggaatc	ctacttgga	taccaagcag	acaagctagt	acagcgtttc	1020
gacgccggct	cctacgtctt	gctcaccgac	gccctcaacc	gccacgacat	tggtcgcgac	1080
cgcgagggcc	tacaacaggc	actcgaatcc	atcaaagttc	cagtccttgt	cgcaggcgta	1140
gataccgata	ttttgtacc	ctaccaccag	caagaacacc	tctccagaaa	cctgggaaat	1200
ctactggcaa	tggcaaaaat	cgtatcccct	gtcggccacg	atgctttcct	caccgaaagc	1260
cgccaaatgg	atcgcatcgt	gaggaacttc	ttcagcctca	tctccccaga	cgaagacaac	1320
ccttcgacct	acatcgagtt	ctacatctaa	catatgacta	gttcggacct	agggatatcg	1380
tcgacatcga	tgctcttctg	cgtaattaa	caattgggat	cctctagacc	cgggatttaa	1440
atcgttagcg	ggctgctaaa	ggaagcggaa	cacgtagaaa	gccagtccgc	agaaacggtg	1500
ctgacccccg	atgaatgtca	gctactgggc	tatctggaca	agggaaaacg	caagcgcaaa	1560
gagaaagcag	gtagcttgca	gtgggcttac	atggcgatag	ctagactggg	cggttttatg	1620
gacagcaagc	gaaccggaat	tgccagctgg	ggcgccctct	ggtaaggttg	ggaagccctg	1680
caaagtaaac	tggatggctt	tcttgccgcc	aaggatctga	tggcgcaggg	gatcaagatc	1740

ES 2 380 000 T3

tgatcaagag acaggatgag gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg 1800
 ttctccggcc gcttgggtgg agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg 1860
 ctgctctgat gccgccgtgt tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa 1920
 gaccgacctg tccggtgccc tgaatgaact gcaggacgag gcagcgcggc tatcgtggct 1980
 ggccacgacg ggcgttcctt gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaagggg 2040
 ctggctgcta ttgggcgaag tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc 2100
 cgagaaagta tccatcatgg ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac 2160
 ctgccattc gaccaccaag cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc 2220
 cggcttgtc gatcaggatg atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact 2280
 gttcgccagg ctcaaggcgc gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga 2340
 tgcctgcttg ccgaatatca tgggtgaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg 2400
 ccggctgggt gtggcggacc gctatcagga catagcgttg gctaccctg atattgctga 2460
 agagcttggc ggcgaatggg ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga 2520
 ttcgacgcgc atcgccttct atcgccttct tgacgagttc ttctgagcgg gactctgggg 2580
 ttcgaaatga ccgaccaagc gacgcccac ctgccatcac gagatttcga ttccaccgcc 2640
 gccttctatg aaaggttggg cttcggaaatc gttttccggg acgccggctg gatgatcctc 2700
 cagcgcgggg atctcatgct ggagttcttc gccacgcta gcggcgcgcc ggccggcccg 2760
 gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgct cttccgcttc 2820
 ctcgctcact gactcgctgc gctcggctgt tcggctgcgg cgagcggat cagctcactc 2880
 aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc 2940
 aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag 3000
 gctccgccc cctgacgagc atcacaataa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaacc 3060
 gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt 3120
 tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc ctttcgggaa gcgtggcgct 3180
 ttctcatagc tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag gtcgctcgt ccaagctggg 3240
 ctgtgtgcac gaacccccg ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccgta actatcgtct 3300
 tgagtccaac ccgtaagac acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat 3360
 tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg aagtgtggc ctaactacgg 3420
 ctacactaga aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ctttcgga 3480
 aagagttggt agctcttgat ccggcaaca aaccaccgct ggtagcggtg gttttttgt 3540
 ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc 3600
 tacggggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt 3660
 atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt aaaggccggc cgcgcccgcg caaagtccc 3720
 cttcgtgaaa attttcgtgc cgcgtgattt tccgccaaaa actttaacga acgttcgtta 3780
 taatgggtgtc atgacctca cgacgaagta ctaaaattgg cccgaatcat cagctatgga 3840
 tctctctgat gtcgcgctgg agtccgacgc gctcgtatgct gccgtcgatt taaaaacgg 3900
 gatcggattt ttccgagctc tcgatacgac ggacgcgcca gcatcacgag actgggccc 3960
 tgccgcgagc gacctagaaa ctctcgtggc ggatcttgag gagctggctg acgagctgcg 4020

ES 2 380 000 T3

tgctcggcca gcgccaggag gacgcacagt agtggaggat gcaatcagtt ggcctactg 4080
 cgggtggcctg attcctcccc ggctgaccc gcgaggacgg cgcgcaaat attgctcaga 4140
 tgcgtgtcgt gccgcagcca gccgcgagcg cgccaacaaa gccacgccg aggagctgga 4200
 ggcggctagg tcgcaaatgg cgctggaagt gcgtccccg agcgaattt tggccatggt 4260
 cgtcacagag ctggaagcgg cagcgagaat tatcgcgac gtggcgggtc ccgcaggcat 4320
 gacaaacatc gtaaatgccg cgtttcgtgt gccgtggccg cccaggacgt gtcagcgcg 4380
 ccaccacctg caccgaatcg gcagcagcgt cgcgcgtcga aaaagcgcac aggcggcaag 4440
 aagcgataag ctgcacgaat acctgaaaa tgttgaacgc cccgtgagcg gtaactcaca 4500
 gggcgtcggc taacccccag tccaaacctg ggagaaagcg ctcaaaaatg actctagcgg 4560
 attcacgaga cattgacaca ccggcctgga aattttccgc tgatctgttc gacaccatc 4620
 ccgagctcgc gctgcgatca cgtggctgga cgagcgaaga ccgccgcgaa ttctcgcctc 4680
 acctgggcag agaaaatttc cagggcagca agaccgcga cttcgcagc gcttggatca 4740
 aagaccggga caggagaaa cacagccgaa gttataccga gttggttcaa aatcgcttgc 4800
 ccggtgccag tatgttgctc tgacgcacgc gcagcacgca gccgtgcttg tcctggacat 4860
 tgatgtgccg agccaccagg ccggcgggaa aatcgagcac gtaaaccgag aggtctacgc 4920
 gattttggag cgctgggcac gcctggaaaa agcgcagct tggatcggcg tgaatccact 4980
 gagcgggaaa tgccagctca tctggctcat tgatccggtg tatgccgcag caggcatgag 5040
 cagcccgaat atgcgcctgc tggctgcaac gaccgaggaa atgaccgagc tttcggcgc 5100
 tgaccaggct tttcacata ggctgagccg tggccactgc actctccgac gatccagcc 5160
 gtaccgctgg catgccagc acaatcgcgt ggatcgccta gctgatctta tggaggttgc 5220
 tcgcatgatc tcaggcacag aaaaacctaa aaaacgctat gagcaggagt tttctagcgg 5280
 acgggcacgt atcgaagcgg caagaaaagc cactgcggaa gcaaaaagcac ttgccacgct 5340
 tgaagcaagc ctgccgagcg ccgctgaagc gtctggagag ctgatcgacg gcgtccgtgt 5400
 cctctggact gctccagggc gtgccgcccg tgatgagacg gcttttcgcc acgctttgac 5460
 tgtgggatac cagttaaaag cgctgggtga gcgcctaaaa gacaccaagg gtcacgagc 5520
 ctacgagcgt gcctacaccg tcgctcaggg ggtcggagga ggccgtgagc ctgatctgcc 5580
 gccggactgt gaccgccaga cggattggcc gcgacgtgtg cgcggctacg tcgctaaagg 5640
 ccagccagtc gtccctgctc gtcagacaga gacgcagagc cagccgaggc gaaaagctct 5700
 ggccactatg ggaagacgtg gcggtaaaaa ggccgcagaa cgctggaaag acccaaacag 5760
 tgagtacgcc cgagcacagc gagaaaaact agctaagtcc agtcaacgac aagctaggaa 5820
 agctaaagga aatcgcttga ccattgcagg ttggtttatg actggtgagg gagagactgg 5880
 ctcgtggccg acaatcaatg aagctatgtc tgaatttagc gtgtcacgtc agaccgtgaa 5940
 tagagcactt aaggctctgc ggcatgaaac ttccacgagg acgccgaaag cttcccagta 6000
 aatgtgccat ctcgtaggca gaaaacggtt cccccgtagg gtctctctct tggcctcctt 6060
 tctaggtcgg gctgattgct cttgaagctc tctagggggg ctcacacat aggcagataa 6120
 cgttccccac cggctcgcct cgtaagcgc caaggactgc tcccaaagat cttcaaagcc 6180
 actgccgcga ctgccttcgc gaagccttgc cccgcggaaa tttcctccac cgagtctgtg 6240
 cacacccta tgccaagctt ctttcacctt aaattcgaga gattggattc ttaccgtgga 6300
 aattcttcgc aaaaatcgtc ccctgatcgc ccttgcgacg ttggcgtcgg tgccgctggt 6360

tgcgcttggc ttgaccgact tgatcagcgg ccgc

6394

<210> 27

<211> 30

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 27

gagactcgag cggcttaaag tttggctgcc 30

10 <210> 28

<211> 41

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 28

cctgaaggcg cgagggtggg catgatgaat ccctccatga g 41

<210> 29

<211> 19

20 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 29

25 cccaccctcg cgccttcag 19

<210> 30

<211> 18

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

30 <220>

<223> Cebador
 <400> 30
 ctgggtacat tgcggccc 18
 <210> 31
 5 <211> 6372
 <212> ADN
 <213> Secuencia Artificial
 <220>
 <223> Plásmido
 10 <220>
 <221> características_misceláneas
 <223> pCLiK5MCS PGroESmetA
 <220>
 <221> características_misceláneas
 15 <222> (1735)..(2526)
 <223> KanR
 <220>
 <221> características_misceláneas
 <222> (4807)..(5928)
 20 <223> Proteína Rep
 <220>
 <221> características_misceláneas
 <222> (2793)..(3653)
 <223> Ori-EC (pMB) (complementario)
 25 <220>
 <221> características_misceláneas
 <222> (3799)..(4473)
 <223> orf1
 <220>
 30 <221> características_misceláneas
 <222> (3)..(179)

<223> Pgro

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (180)..(1313)

5 <223> metA

<400> 31

ES 2 380 000 T3

agcggcttaa agtttggtg ccatgtgaat ttttagcacc ctcaacagtt gagtgctggc 60
 actctcgggg gtagagtgcc aataggttg tttgacacac agttgttcac cgcgcacgac 120
 ggctgtgctg gaaaccaca accggcacac acaaaatfff tctcatggag ggattcatca 180
 tgcccaccct cgcgccttca ggtcaacttg aatccaagc gatcgggtgat gtctccaccg 240
 aagccggagc aatcattaca aacgctgaaa tcgcctatca ccgctggggg gaataccgcg 300
 tagataaaga aggacgcagc aatgtcgttc tcatcgaaca cgccctcact ggagattcca 360
 acgcagccga ttggtgggct gacttgctcg gtcccggcaa agccatcaac actgatattt 420
 actgctgat ctgtaccaac gtcacgggtg gttgcaacgg ttccaccgga cctggctcca 480
 tgcattcaga tggaaatttc tggggtaatc gcttccccgc cacgtccatt cgtgatcagg 540
 taaacgccga aaaacaattc ctcgacgcac tcggcatcac cacggtcgcc gcagtacttg 600
 gtggttccat ggggtgggtcc cgcaccctag agtgggcccgc aatgtacca gaaactgttg 660
 gcgcagctgc tgttcttgca gtttctgcac gcgccagcgc ctggcaaadc ggcattcaat 720
 ccgcccacat taaggcgatt gaaaacgacc accactggca cgaaggcaac tactacgaat 780
 ccggctgcaa cccagccacc ggactcggcg ccgcccgacg catcgcaccac ctcacctacc 840
 gtggcgaact agaaatcgac gaacgcttcg gcaccaaagc ccaaaagaac gaaaaccac 900
 tcggtcccta ccgcaagccc gaccagcgtc tcgccgtgga atcctacttg gactaccaag 960
 cagacaagct agtacagcgt ttcgacgccg gctcctacgt cttgctcacc gacgccctca 1020
 accgccacga cattggtcgc gaccgcggag gcctcaacaa ggcactcgaa tccatcaaag 1080
 ttccagtcct tgtcgcaggc gtagataccg atatfffgtta cccctaccac cagcaagaac 1140
 acctctccag aaacctggga aatctactgg caatggcaaa aatcgtatcc cctgtcggcc 1200
 acgatgcttt cctcaccgaa agccgcaaaa tggatcgcac cgtgaggaac ttcttcagcc 1260
 tcatctcccc agacgaagac aacccttga cctacatcga gttctacatc taacatatga 1320
 ctagttcggga cctagggata tcgtcgacat cgatgctctt ctgctgtaat taacaattgg 1380
 gatcctctag acccgggatt taaatcgcta gcgggctgct aaaggaagcg gaacacgtag 1440
 aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgacc cggatgaatg tcagctactg ggctatctgg 1500
 acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaaag caggtagctt gcagtgggct tacatggcga 1560
 tagctagact gggcggffff atggacagca agcgaaccgg aattgccagc tggggcggcc 1620
 tctggaagg ttgggaagcc ctgcaaagta aactggatgg ctttcttgcc gccaaggatc 1680
 tgatggcgca ggggatcaag atctgatcaa gagacaggat gaggatcgtt tcgcatgatt 1740
 gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg tggagaggct attcggctat 1800
 gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgccg tgttccggct gtcagcgcag 1860
 gggcgcccgg ttctffffgt caagaccgac ctgtccggtg ccctgaatga actgcaggac 1920
 gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc cttgctcagc tgtgctcgac 1980
 gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattggggc agtgccggg gcaggatctc 2040
 ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa gtatccatca tggctgatgc aatgcggcgg 2100
 ctgcatacgc ttgatccggc tacctgcccc ttcgaccacc aagcgaacaa tcgcatcgag 2160

ES 2 380 000 T3

cgagcacgta ctcggatgga agccggcttt gtcgatcagg atgatctgga cgaagagcat 2220
 caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg cgcgcatgcc cgacggcgag 2280
 gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc ttgccgaata tcatggtgga aaatggccgc 2340
 ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg accgctatca ggacatagcg 2400
 ttggctaccg gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat gggctgaccg cttcctcgtg 2460
 ctttacggta tcgccgctcc cgattcgag cgcacgcct tctatgcct tcttgacgag 2520
 ttcttctgag cgggactctg gggttcgaat tgaccgacca agcgacgccc aacctgccat 2580
 cacgagattt cgattccacc gccgccttct atgaaaggtt gggcttcgga atcgttttcc 2640
 gggacgccgg ctggatgatc ctccagcggc gggatctcat gctggagttc ttcgcccacg 2700
 ctacggcgc gccggccggc ccggtgtgaa ataccgcaca gatgcgtaag gagaaaatac 2760
 cgcatcaggc gctcttcgc ttcctcgtc actgactcgc tgcgctcggc cgttcggctg 2820
 cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggc tatccacaga atcaggggat 2880
 aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc 2940
 gcgttgctgg cgttttcca taggctccgc cccctgacg agcatcaca aaatcgacgc 3000
 tcaagtcaga ggtggcgaat cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga 3060
 agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta ccgatacct gtccgccttt 3120
 ctccctcgg gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct gtaggtatct cagttcggctg 3180
 taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc 3240
 gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aaccggtaa gacacgactt atcgccactg 3300
 gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc 3360
 ttgaagtggc ggcctaacta cggctacact agaaggacag tatttggat ctgctcctg 3420
 ctgaagccag ttacctcgg aaaaagagtt ggtagctctt gatccggca acaaacacc 3480
 gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct 3540
 caagaagatc ctttgatctt ttctacggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt 3600
 taagggattt tggatcatg attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaaggcc 3660
 ggccgcggcc gcgcaaagtc ccgcttcgtg aaaattttcg tgccgcgtga tttccgcca 3720
 aaaactttaa cgaacgttcg ttataatggt gtcatgacct tcacgacgaa gtactaaaat 3780
 tggcccgaat catcagctat ggatctctct gatgtcgcgc tggagtccga cgctcctgat 3840
 gctgccgctc atttaaaaac ggtgatcggg ttttccgag ctctcgatac gacggacgcg 3900
 ccagcatcac gagactggc cagtgccgcg agcgacctag aaactctcgt ggcggatctt 3960
 gaggagctgg ctgacgagct gcgtgctcgg ccagcgccag gaggacgcac agtagtggag 4020
 gatgcaatca gttgctccta ctgagggtgg ctgattcctc cccggcctga cccgagga 4080
 cggcgcgcaa aatattgctc agatgcgtgt cgtgccgag ccagccgca gcgcccac 4140
 aaacgccacg ccgaggagct ggaggcggct aggtcgcaaa tggcgtgga agtgcgtccc 4200
 ccgagcgaat ttttggccat ggtcgtcaca gagctggaag cggcagcag aattatcgcg 4260
 atcgtggcgg tgcccgcagg catgacaaac atcgtaaag ccgctttcg tgtgccgtgg 4320
 ccgcccagga cgtgtcagc ccgccaccac ctgcaccgaa tcggcagcag cgtcgcgcgt 4380
 cgaaaaagcg cacaggcggc aagaagcgat aagctgcacg aatacctgaa aaatggtgaa 4440

ES 2 380 000 T3

cgccccgtga gcggtaaactc acagggcgtc ggctaacccc cagtccaaac ctgggagaaa 4500
gcgctcaaaa atgactctag cggattcacg agacattgac acaccggcct ggaaattttc 4560
cgctgatctg ttcgacaccc atcccagact cgcgctgcga tcacgtggct ggacgagcga 4620
agaccgccgc gaattcctcg ctcacctggg cagagaaaat ttccagggca gcaagaccgc 4680
cgacttcgcc agcgcttggg tcaaagaccc ggacacggag aaacacagcc gaagttatac 4740
cgagttgggt caaaatcgct tgcccgggtc cagtatgtt ctctgacgca cgcgcagcac 4800
gcagccgtgc ttgtcctgga cattgatgtg ccgagccacc aggccggcgg gaaaatcgag 4860
cacgtaaacc ccgaggtcta cgcgattttg gagcgctggg cacgcctgga aaaagcgcca 4920
gcttggatcg gcgtgaatcc actgagcggg aatgcccagc tcacttggct cattgatccg 4980
gtgtatgccg cagcaggcat gagcagcccg aatatgcgcc tgctggctgc aacgaaccgag 5040
gaaatgacct gcgttttcgg cgctgaccag gctttttcac ataggctgag ccgtggccac 5100
tgcactctcc gacgatccca gccgtaccgc tggcatgccc agcacaatcg cgtggatcgc 5160
ctagctgata ttatggaggt tgctcgcata atctcaggca cagaaaaacc taaaaaacgc 5220
tatgagcagg agttttctag cggacgggca cgtatcgaag cggcaagaaa agccactgcg 5280
gaagcaaaaag cacttgccac gcttgaagca agcctgccga gcgccgctga agcgtctgga 5340
gagctgatcg acggcgtccg tgtcctctgg actgctccag ggcgtgccgc ccgtgatgag 5400
acggcttttc gccacgcttt gactgtggga taccagttaa aagcggctgg tgagcgccta 5460
aaagacacca agggctatcg agcctacgag cgtgcctaca ccgtcgtca ggcggctgga 5520
ggaggccgtg agcctgatct gccgccggac tgtgaccgcc agacggattg gccgcgacgt 5580
gtgcgcccgt acgtcgttaa aggccagcca gtcgtccctg ctctcagac agagacgag 5640
agccagccga ggcgaaaagc tctggccact atgggaagac gtggcggtaa aaaggccgca 5700
gaacgctgga aagaccctaa cagtgagtac gcccgagcac agcgagaaaa actagctaag 5760
tccagtcaac gacaagctag gaaagctaaa ggaaatcgct tgaccattgc aggttggttt 5820
atgactgttg agggagagac tggctcgtgg ccgacaatca atgaagctat gtctgaattt 5880
agcgtgtcac gtcagaccgt gaatagagca cttaaggtct gcgggcattg aacttcacg 5940
aggacgccga aagcttccca gtaaattgtc catctcgtag gcagaaaacg gttccccctg 6000
agggctcttc tcttggcctc ctttctaggt cgggctgatt gctcttgaag ctctctaggg 6060
gggctcacac cataggcaga taacgttccc caccggctcg cctcgtgtaag gcacaaggac 6120
tgctcccaaa gatcttcaaa gccactgccg cgactgcctt cgcaagcct tgccccgcg 6180
aaatttcttc caccgagttc gtgcacaccc ctatgccaaag cttctttcac cctaaattcg 6240
agagattgga ttcttaccgt ggaaattctt cgcaaaaatc gtcccctgat cgcccttgcg 6300
acgttggcgt cggtgccgct ggttgccgct ggcttgaccg acttgatcag cggccgctcg 6360
atttaaattc cg 6372

<211> 32

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

5 <223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK 1849

<400> 32

10 gtgtgtcgac ttagatgtag aactcgatgt ag 32

<210> 33

<211> 17

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

15 <220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK 1862

20 <400> 33

atgcccaccc tcgcgcc 17

<210> 34

<211> 28

<212> ADN

25 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

30 <223> designación interna: Haf 26

<400> 34

gagaggatcc cccccacgac aatggaac 28
<210> 35
<211> 44
<212> ADN
5 <213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Cebador
<220>
<221> características_misceláneas
10 <223> designación interna: Haf 27)
<400> 35
cctgaaggcg cgagggtggg cattacgggg cgatcctcct tatg 44
<210> 36
<211> 6389
15 <212> ADN
<213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Plásmido
<220>
20 <221> características_misceláneas
<223> pCLiK5MCS P EF-TS metA
<220>
<221> características_misceláneas
<222> (1767)..(2558)
25 <223> KanR
<220>
<221> características_misceláneas
<222> (4839)..(5960)
<223> Proteína Rep
30 <220>
<221> características_misceláneas

<222> (2825)..(3685)

<223> Ori-Ec (pMB) (complementario)

<220>

<221> características_miscláneas

5 <222> (3831)..(4505)

<223> Orf1

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (1217)..(1411)

10 <223> P EF-TS (complementario)

<220>

<221> características_miscláneas

<222> (83)..(1216)

<223> metA (complementario)

15 <400> 36

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa	tctcgagagg	cctgacgtcg	ggcccgggtac	cacgcgcat	atgactagtt	60
cggacctagg	gatatcgtcg	acttagatgt	agaactcgat	gtaggtcgaa	gggttgtctt	120
cgtctgggga	gatgaggctg	aagaagttcc	tcacgatgcg	atccatttgg	cggctttcgg	180
tgaggaaagc	atcgtggccg	acaggggata	cgatttttgc	cattgccagt	agatttccca	240
ggtttctgga	gaggtgttct	tgctggtggt	aggggtacaa	aatatcggta	tctacgcctg	300
cgacaaggac	tggaactttg	atggattcga	gtgccttggt	gaggcctccg	cggctcgcgac	360
caatgtcgtg	gcggttgagg	gcgtcggtag	gcaagacgta	ggagccggcg	tcgaaacgct	420
gtactagctt	gtctgcttgg	tagtccaagt	aggattccac	ggcgaagcgc	tggtcgggct	480
tgcggtaggg	accgagtggg	ttttcgttct	tttgggcttt	ggtgccgaag	cgttcgtcga	540
tttctagttc	gccacggtag	gtgaggtggg	cgatgcgtcg	ggcggcgccg	agtcgggtgg	600
ctgggttgca	gccggattcg	tagtagttgc	cttcgtgcca	gtggtggtcg	ttttcaatcg	660
ccttaatttg	ggcggattga	atgccgattt	gccagggcgt	ggcgcgtgca	gaaactgcaa	720
gaacagcagc	tgcccaaca	gtttctgggt	acattgcggc	ccactctagg	gtgcgggcac	780
cacccatgga	accaccaagt	actgcggcga	ccgtggtgat	gccgagtgcg	tcgaggaatt	840
gtttttcggc	gtttacctga	tcacgaatgg	acgtggcggg	gaagcgatta	ccccagaaat	900
ttccatctgg	atgcatggag	ccaggtccgg	tggaaccggt	gcaaccaccg	atgacgttgg	960
tacagatcac	gcagtaaata	tcagtgttga	tggctttgcc	gggaccgagc	aagtcagccc	1020
accaatcggc	tgctttgga	tctccagtga	gggcgtgttc	gatgagaacg	acattgctgc	1080
gtccttcttt	atctacgcgg	tattcacccc	agcggtgata	ggcgatttca	gcgtttgtaa	1140
tgattgctcc	ggcttcggtg	gagacatcac	cgatcgcttg	gatttcaagt	tgacctgaag	1200
gcgcgagggg	gggcattacg	ggcgcgtcct	ccttatgtat	ggataattaa	tgctttacaa	1260
gcttaggtta	gggcacagta	gccctacccg	cccgtctaaa	aagtgatcgt	acaggtattc	1320
agtcgattac	gttgcgacac	ggcgggctgg	ctgcccaaaa	agccccacg	gcgatgaaat	1380
tttaaagtc	aaagttccat	tgctgtgggg	gggatcctct	agaccgggga	tttaaatcgc	1440
tagcgggctg	ctaaaggaag	cggaacacgt	agaaagccag	tccgcagaaa	cgggtctgac	1500
cccggatgaa	tgctagctac	tggtctatct	ggacaaggga	aaacgcaagc	gcaaagagaa	1560
agcaggtagc	ttgcagtggg	cttacaatggc	gatagctaga	ctgggcgggt	ttatggacag	1620

ES 2 380 000 T3

caagcgaacc ggaattgcc a gctggggcgc cctctggtaa ggttgggaag ccctgcaaag 1680
 taaactggat ggctttcttg ccgccaagga tctgatggcg caggggatca agatctgatc 1740
 aagagacagg atgaggatcg tttcgc atga ttgaacaaga tggattgcac gcaggttctc 1800
 cggccgcttg ggtggagagg ctattcggct atgactgggc acaacagaca atcggctgct 1860
 ctgatgccgc cgtgttccgg ctgtcagcgc aggggcgccc ggttcttttt gtcaagaccg 1920
 acctgtccgg tgccctgaat gaactgcagg acgaggcagc gcggctatcg tggctggcca 1980
 cgacgggctg tccttgcgca gctgtgctcg acgttgctac tgaagcggga agggactggc 2040
 tgctattggg cgaagtgccg gggcaggatc tcctgtcatc tcaccttgct cctgccgaga 2100
 aagtatccat catggctgat gcaatgcggc ggctgcatac gcttgatccg gctacctgcc 2160
 cattcgacca ccaagcga aa catcgc atcg agcgcagcac tactcggatg gaagccggtc 2220
 ttgtc gatca ggatgatctg gacgaagagc atcaggggct cgcgccagcc gaactgttctg 2280
 ccaggctcaa ggcgcgatg cccgacggcg aggatctcgt cgtgacctat ggcgatgcct 2340
 gcttgccgaa tatcatgggt gaaaatggcc gcttttctgg attcatcgac tgtggccggc 2400
 tgggtgtggc ggaccgctat caggacatag cgttggtctac ccgtgatatt gctgaagagc 2460
 ttggcggcga atgggctgac cgcttcctcg tgctttacgg tatcgcctgct cccgattcgc 2520
 agcgc atcgc cttctatcgc cttcttgacg agttcttctg agcgggactc tggggttcga 2580
 aatgaccgac caagcgacgc ccaacctgcc atcacgagat ttcgattcca ccgccgcctt 2640
 ctatgaaagg ttgggcttct gaatcgtttt ccgggacgcc ggctggatga tcctccagcg 2700
 cggggatctc atgctggagt tcttcgccc a cgctagcggc gcgccggccg gcccggtgtg 2760
 aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc 2820
 tcaactgact gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg 2880
 cggtaatcag gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaaag 2940
 gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcggttct ggcggttttc cataggctcc 3000
 gccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aaccgcagac 3060
 gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga 3120
 ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaaagcgtg gcgctttctc 3180
 atagctcacg ctgtaggtat ctgagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg 3240
 tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttata cggtactat cgtcttgagt 3300
 ccaaccgggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca 3360
 gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca 3420
 ctagaaggac agtatttggg atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag 3480
 ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cgggtgtttt tttgtttgca 3540
 agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg 3600

 ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gtaagggat tttggtcatg agattatcaa 3660
 aaaggatctt cacctagatc cttttaaagg ccggccgcgg ccgcgcaaag tcccgcctcg 3720
 tgaaaatttt cgtgccgctg gatcttccgc caaaaacttt aacgaacggt cgttataatg 3780
 gtgtcatgac cttcacgacg aagtactaaa attggcccga atcatcagct atggatctct 3840
 ctgatgtcgc gctggagtcc gacgcgctcg atgctgccgt cgatttaaaa acggtgatcg 3900

ES 2 380 000 T3

gatuuuuuag agctctcgat acgacggacg cgccagcatc acgagactgg gccagtgccg 3960
cgagcgacct agaaactctc gtggcggatc ttgaggagct ggctgacgag ctgctgtctc 4020
ggccagcgcc aggaggacgc acagtagtgg aggatgcaat cagttgcgcc tactgcggtg 4080
gcctgattcc tccccggcct gacccgcgag gacggcgcgc aaaatattgc tcagatgcgt 4140
gtcgtgccgc agccagccgc gagcgcgcca acaaacgcca cgccgaggag ctggaggcgg 4200
ctaggtcgca aatggcgctg gaagtgcgct ccccgagcga aatthtggcc atggctgca 4260
cagagctgga agcggcagcg agaattatcg cgatcgtggc ggtgcccga ggcatgacaa 4320
acatcgtaaa tgccgcgttt cgtgtgccgt ggccgccag gacgtgtcag cgccgccacc 4380
acctgcaccg aatcggcagc agcgtcgcgc gtcgaaaaag cgcacaggcg gcaagaagcg 4440
ataagctgca cgaatacctg aaaaatgttg aacgccccgt gagcggtaac tcacagggcg 4500
tcggctaacc cccagtccaa acctgggaga aagcgtcaa aatgactct agcggattca 4560
cgagacattg acacaccggc ctggaaattt tccgctgac tgttcgacac ccatcccag 4620
ctcgcgctgc gatcacgtgg ctggacgagc gaagaccgcc gcgaattcct cgctcacctg 4680
ggcagagaaa atttccaggg cagcaagacc cgcgacttcg ccagcgttg gatcaaagac 4740
ccggacacgg agaaacacag ccgaagttat accgagttgg tcaaaatcg cttgcccgt 4800
gccagtatgt tgctctgacg cacgcgcagc acgcagccgt gcttgcctg gacattgatg 4860
tgccgagcca ccaggccggc gggaaaatcg agcacgtaaa cccgaggtc tacgcgattt 4920
tggagcgctg ggcacgcctg gaaaaagcgc cagcttggat cggcgtgaat cactgagcg 4980
ggaaatgcca gctcatctgg ctcatctgac cgtgtatgc cgcagcaggc atgagcagcc 5040
cgaatatgcy cctgctggct gcaacgaccg aggaaatgac ccgcgttttc ggcgctgacc 5100
aggctttttc acataggctg agccgtggcc actgcactct ccgacgatcc cagccgtacc 5160
gctggcatgc ccagcacaat cgcgtggatc gcctagctga tcttatggag gttgctcgca 5220
tgatctcagg cacagaaaaa ctaaaaaaac gctatgagca ggagttttct agcggacggg 5280
cacgtatcga agcggcaaga aaagccactg cggagcaaaa agcacttgcc acgcttgaag 5340
caagcctgcc gagcgcgct gaagcgtctg gagagctgat cgacggcgtc cgtgtcctct 5400
ggactgctcc agggcgtgcc gcccgatg agacggcttt tcgccacgct ttgactgtgg 5460
gataccagtt aaaagcggct ggtgagcgc taaaagacac caagggtcat cgagcctacg 5520
agcgtgccta caccgtcgtc caggcggtcg gaggaggccg tgagcctgat ctgccccgg 5580
actgtgaccg ccagacggat tggccgcgac gtgtgcgcgg ctacgtcgtc aaaggccagc 5640
cagtcgtccc tgctcgtcag acagagacgc agagccagcc gaggcgaaaa gctctggcca 5700
ctatgggaag acgtggcggg aaaaaggccg cagaacgctg gaaagacca aacagtgagt 5760
acgcccgagc acagcgagaa aaactagcta agtccagtca acgacaagct aggaaagcta 5820
aaggaaatcg cttgaccatt gcaggttggt ttatgactgt tgagggagag actggctcgt 5880
ggccgacaat caatgaagct atgtctgaat ttagcgtgtc acgtcagacc gtgaatagag 5940
cacttaaggt ctgccccat tgaacttcca cgaggacgcc gaaagcttc cagtaaatgt 6000
gccatctcgt aggcagaaaa cggttcccc gtagggtctc tctctggcc tcctttctag 6060
gtcgggctga ttgctcttga agctctctag gggggctcac accataggca gataacgttc 6120
cccaccggct cgcctcgtaa gcgcacaagg actgctccca aagatcttca aagccactgc 6180
cgcgactgcc ttcgcaagc cttgccccgc ggaatttcc tccaccgagt tcgtgcacac 6240

ES 2 380 000 T3

ccctatgcc a gctttctttc accctaaatt cgagagattg gattcttacc gtggaaattc 6300
ttcgcaaaaa tcgtcccctg atcgcccttg cgacgttggc gtcggtgccg ctggttgcg 6360
ttggcttgac cgacttgatc agcggccgc 6389

<210> 37

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: BK 1753

<400> 37

ggatctagag ttctgtgaaa aacaccgtg 29

<210> 38

<211> 29

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK 1754

<400> 38

gcgactagtg ccccaaaat aaaaaaac 29

<210> 39

25 <211> 5156

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_misceláneas

<223> H247

5 <400> 39

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa tctcgagagg cctgacgtcg ggccccgttac cacgcgtcat atgactagtt 60
 cggacctagg gatatcgtcg acatcgatgc tcttctgcgt taattaacaa ttgggatcct 120
 ctagagttct gtgaaaaaca ccgtggggca gtttctgctt cgcggtgttt tttatattgtg 180
 gggcactaga cccgggattt aaatcgttag cgggctgcta aaggaagcgg aacacgtaga 240
 aagccagtcc gcagaaacgg tgctgacccc ggatgaatgt cagctactgg gctatctgga 300
 caagggaaaa cgcaagcgcg aagagaaagc aggtagcttg cagtgggctt acatggcgat 360
 agctagactg ggcggtttta tggacagcaa gcgaaccgga attgccagct ggggcgccct 420
 ctggtaaagg tgggaagccc tgcaaagtaa actggatggc tttcttgccg ccaaggatct 480
 gatggcgcag gggatcaaga tctgatcaag agacaggatg aggatcgttt cgcgatgattg 540
 aacaagatgg attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt ggagaggcta ttcggctatg 600
 actgggcaca acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt gttccggctg tcagcgcagg 660
 ggcgcccggg tctttttgtc aagaccgacc tgtccgggtgc cctgaatgaa ctgcaggacg 720
 aggcagcgcg gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc ttgcgagct gtgctcgacg 780
 ttgtcactga agcgggaagg gactggctgc tattgggcga agtgccgggg caggatctcc 840
 tgtcatctca ccttgctcct gccgagaaag tatccatcat ggctgatgca atgcggcggc 900
 tgcatacgtt tgatccggct acctgccat tcgaccacca agcgaaacat cgcacgcagc 960
 gagcacgtac tcggatggaa gccggctttg tcgatcagga tgatctggac gaagagcatc 1020
 aggggctcgc gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc gcgcatgccc gacggcgagg 1080
 atctcgtcgt gaccatggc gatgcctgct tgccgaatat catggtggaa aatggccgct 1140
 tttctggatt catcgactgt ggcggctgg gtgtggcggc ccgctatcag gacatagcgt 1200
 tggctacccg tgatattgct gaagagcttg gcggcgaatg ggctgaccgc ttcctcgtgc 1260
 tttacggtat cggcgtccc gattcgcagc gcatcgcctt ctatcgcctt cttgacgagt 1320
 tcttctgagc gggactctgg ggttcgaaat gaccgaccaa gcgacgcca acctgccatc 1380
 acgagatttc gattccaccg ccgccttcta tgaaaggttg ggcttcggaa tcgttttccg 1440
 ggacgccggc tggatgatcc tccagcgcgg ggatctcatg ctggagttct tcgcccacgc 1500
 tagcggcgcg ccggccggcc cgggtgtaaa taccgcacag atgcgtaagg agaaaatacc 1560
 gcatcaggcg ctcttccgct tcctcgtca ctgactcgt gcgctcggtc gttcggctgc 1620
 ggcgagcggg atcagctcac tcaaaggcgg taatacgggt atccacagaa tcaggggata 1680
 acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg 1740
 cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct 1800
 caagttagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa 1860
 gctccctcgt gcgctctcct gttccgacct tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc 1920
 tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcgggtg 1980
 aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg 2040
 ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggtgag acacgactta tcgccactgg 2100
 cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcgggtgct acagagttct 2160

ES 2 380 000 T3

tgaagtgggtg gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggatc tgcgctctgc 2220
 tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg 2280
 ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc 2340
 aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt 2400
 aagggatttt ggatcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaaggccg 2460
 gccgcgccg cgcaaagtcc cgcttcgtga aaatcttcgt gccgctgat tttccgcaa 2520
 aaactttaac gaacgttcgt tataatgggtg tcatgacctt cacgacgaag tactaaaatt 2580
 ggcccgaatc atcagctatg gatctctctg atgtcgcgct ggagtccgac gcgctcgatg 2640
 ctgccgtcga tttaaaaacg gtgatcggat ttttccgagc tctcgatacg acggacgcgc 2700
 cagcatcacg agactgggccc agtgccgcga gcgacctaga aactctctgt gcggatcttg 2760
 aggagctggc tgacgagctg cgtgctcggc cagcgccagg aggacgcaca gtagtggagg 2820
 atgcaatcag ttgcgcttac tgcggtggcc tgattcctcc ccggcctgac ccgcgaggac 2880
 ggcgcgcaaa atattgctca gatgctgtgc gtgccgcagc cagccgcgag cgcgccaaca 2940
 aacgccacgc cgaggagctg gaggcgcta ggtcgcaaat ggcgctggaa gtgctcccc 3000
 cgagcgaaat tttggccatg gtcgtcacag agctggaagc ggcagcgaga attatcgcga 3060
 tcgtggcggg gcccgcaggc atgacaaaca tcgtaaagc cgctttcgt gtgccgtggc 3120

 cgcccaggac gtgtcagcgc cgccaccacc tgcaccgaat cggcagcagc gtcgcgctc 3180
 gaaaaagcgc acaggcggca agaagcgata agctgcacga atacctgaaa aatggtgaac 3240
 gccccgtgag cgtaactca cagggcgtcg gctaaccccc agtccaaacc tgggagaaaag 3300
 cgctcaaaaa tgactctagc ggattcacga gacattgaca caccggcctg gaaatcttc 3360
 gctgatctgt tcgacaccca tcccagctc gcgctgcgat cacgtggctg gacgagcgaa 3420
 gaccgcccgc aattcctcgc tcacctgggc agagaaaatt tccagggcag caagaccgc 3480
 gacttcgcca gcgcttggat caaagacccg gacacggaga aacacagccg aagttatacc 3540
 gagttggttc aaaatcgctt gcccggtgcc agtatgttg tctgacgcac gcgcagcacg 3600
 cagccgtgct tgcctggac attgatgtgc cgagccacca ggccggcggg aaaatcgagc 3660
 acgtaaacc cgaggctac gcgattttgg agcgtgggc acgcctggaa aaagcgccag 3720
 cttggatcgg cgtgaatcca ctgagcggga aatgccagct catctggctc attgatccg 3780
 tgtatgccgc agcaggcatg agcagcccga atatgcccct gctggctgca acgaccgagg 3840
 aatgacccg cgttttcggc gctgaccagg ctttttcaca taggctgagc cgtggccact 3900
 gcactctccg acgatcccag ccgtaccgct ggcattgcca gcacaatcgc gtggatcgcc 3960
 tagctgatct tatggagggt gctcgcata tctcaggcac agaaaaacct aaaaaacgct 4020
 atgagcagga gttttctagc ggacgggcac gtatcgaagc ggcaagaaaa gccactgcgg 4080
 aagcaaaagc acttgccacg cttgaagcaa gcctgccgag cggcgtgaa gcgtctggag 4140
 agctgatcga cggcgtccgt gtcctctgga ctgctccagg gcgtgccgc cgtgatgaga 4200
 cggcttttcg ccacgcttg actgtgggat accagttaa agcggctggt gagcgcctaa 4260
 aagacaccaa ggtcatcga gcctacgagc gtgcctacac cgtcgtcag gcggtcggag 4320
 gaggccgtga gcctgatctg ccgccgact gtgaccgcca gacggattgg ccgacgctg 4380
 tgcgcggcta cgtcgtctaa ggcacccag tcgtccctgc tcgtcagaca gagacgcaga 4440

ES 2 380 000 T3

gccagccgag gcgaaaagct ctggcacta tgggaagacg tggcggtaaa aaggccgcag 4500
aacgctggaa agacccaaac agtgagtacg cccgagcaca gcgagaaaaa ctagctaagt 4560
ccagtcaacg acaagctagg aaagctaaag gaaatcgctt gaccattgca ggttggttta 4620
tgactgttga gggagagact ggctcgtggc cgacaatcaa tgaagctatg tctgaattta 4680
gCGTgtcacg tcagaccgtg aatagagcac ttaaggtctg cgggcattga acttccacga 4740
ggacgccgaa agcttcccag taaatgtgcc atctcgtagg cagaaaacgg ttccccgta 4800
gggtctctct cttggcctcc tttctaggtc gggctgattg ctcttgaagc tctctagggg 4860
ggctcacacc ataggcagat aacgttcccc accggctcgc ctcgtaagcg cacaaggact 4920
gctcccaaag atcttcaaag ccaactgccgc gactgccttc gcgaagcctt gccccgcgga 4980
aatttctcc accgagttcg tgcacacccc tatgccaagc ttctttcacc ctaaattcga 5040
gagattggat tcttaccgtg gaaattcttc gcaaaaatcg tcccctgatc gcccttgcca 5100
cgttggcgtc ggtgccgctg gttgcgcttg gcttgaccga cttgatcagc ggccgc 5156

<210> 40

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: BK 1848

<400> 40

gagaactagt agctgccaat tattccggg 29

<210> 41

<211> 32

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK 1849

<400> 41

gtgtgtcgac ttagatgtag aactcgatgt ag 32

<210> 42

5 <211> 6464

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

10 <220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: pG A4 (H344)

<400> 42

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa tctcgagagg cctgacgtcg ggcccggtag cacgcgtcat atgactagta	60
gctgccaatt attccgggct tgtgacccgc taccgataa ataggtcggc tgaaaaattt	120
cgttgcaata tcaacaaaaa ggcctatcat tgggaggtgt cgcaccaagt acttttgca	180
agcgccatct gacggatttt caaaagatgt atatgctcgg tcgaggaaacc tacgaaagga	240
ttttttacc atgcccacc tcgcgcttc aggtcaactt gaaatccaag cgatcgggta	300
tgtctccacc gaagccggag caatcattac aaacgctgaa atcgcctatc accgctgggg	360
tgaataccgc gtagataaag aaggacgcag caatgtcgtt ctcatcgaac acgccctcac	420
tggagattcc aacgcagccg attggtgggc tgacttgctc ggtcccggca aagccatcaa	480
cactgatatt tactgctgta tctgtaccaa cgatcgcgtt ggttgcaacg gttccaccgg	540
acctggctcc atgcatccag atggaaattt ctggggtaat cgcttccccg ccacgtccat	600
tcgtgatcag gtaaacgccg aaaaacaatt cctcgacgca ctcggcatca ccacggtcgc	660
cgcagtactt ggtggttcca tgggtggtgc ccgcacccta gagtgggccg caatgtacc	720
agaaactggt ggcgcagctg ctgttcttgc agtttctgca cgcgccagcg cctggcaaat	780
cggcattcaa tccgccc aaa ttaaggcgat tgaaaacgac caccactggc acgaaggcaa	840
ctactacgaa tccggctgca acccagccac cggactcggc gccgcccgac gcatcgccca	900
cctcacctac cgtggcgaac tagaaatcga cgaacgcttc ggcaccaaag cccaaaagaa	960
cgaaaacca ctcggtccct accgcaagcc cgaccagcgc ttcgccgtgg aatcctactt	1020
ggactaccaa gcagacaagc tagtacagcg tttcgacgcc ggctcctacg tcttgctcac	1080
cgacgccctc aaccgccacg acattggtcg cgaccgcgga ggcctcaaca aggactcga	1140
atccatcaaa gttccagtcc ttgtcgcagg cgtagatacc gatattttgt acccctacca	1200
ccagcaagaa cacctctcca gaaacctggg aaatctactg gcaatggcaa aaatcgtatc	1260
ccctgtcggc cacgatgctt tcctcaccga aagccgcaa atggatcga tcgtgaggaa	1320
cttcttcagc ctcatctccc cagacgaaga caaccctcg acctacatcg agttctacat	1380
ctaagtgcac atcgatgctc ttctgcgtta attaacaatt gggatcctct agagttctgt	1440
gaaaaacacc gtggggcagt ttctgcttcg cgggtgtttt tattttgtggg gcactagacc	1500
cgggatttaa atcgctagcg ggctgctaaa ggaagcggaa cacgtagaaa gccagtcgc	1560
agaaacggtg ctgaccccg atgaatgtca gctactgggc tatctggaca agggaaaacg	1620

ES 2 380 000 T3

caagcgcaaa gagaaagcag gtagcttgca gtgggcttac atggcgatag ctagactggg 1680
 cggttttatg gacagcaagc gaaccggaat tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg 1740
 ggaagccctg caaagtaaac tggatggctt tcttgccgcc aaggatctga tggcgcaggg 1800
 gatcaagatc tgatcaagag acaggatgag gatcgtttcg catgattgaa caagatggat 1860
 tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg agaggctatt cggctatgac tgggcacaac 1920
 agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc 1980
 tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc tgaatgaact gcaggacgag gcagcgcggc 2040
 tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag 2100
 cgggaagga ctggctgcta ttgggcgaag tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc 2160
 ttgctcctgc cgagaaagta tccatcatgg ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg 2220
 atccggctac ctgcccattc gaccaccaag cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc 2280
 ggatggaagc cggctttgtc gatcaggatg atctggacga agagcatcag gggctcgcgc 2340
 cagccgaact gttcgccagg ctcaaggcgc gcatgcccga cggcgaggat ctctcgtga 2400
 cccatggcga tgcttcttg ccgaatatca tgggtgaaaa tggccgcttt tctggattca 2460

 tcgactgtgg ccggctgggt gtggcggacc gctatcagga catagcgttg gctaccctg 2520
 atattgctga agagcttggc ggcgaatggg ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg 2580
 ccgctcccga ttgcagcgc atcgccttct atcgccttct tgacgagttc ttctgagcgg 2640
 gactctgggg ttcgaaatga ccgaccaagc gacgcccac ctgccatcac gagatctcga 2700
 ttccaccgcc gccttctatg aaaggttggg cttcggaaatc gttttccggg acgcccggctg 2760
 gatgatcctc cagcgcgggg atctcatgct ggagtcttc gccacgcta gcggcgcgcc 2820
 ggccggcccg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgct 2880
 cttccgcttc ctgctcact gactcgtgc gctcggctgt tcggctgcgg cgagcggat 2940
 cagctcactc aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga 3000
 acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt 3060
 ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt 3120
 ggcgaaacc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc 3180
 gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa 3240
 gcgtggcgct ttctcatagc tcacgctgta ggtatctcag ttcgggtgtag gtcgttcgct 3300
 ccaagctggg ctgtgtgcac gaacccccg ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta 3360
 actatcgtct tgagtccaac ccggtaaagc acgacttatc gccactggca gcagccactg 3420
 gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag gcggtgtac agagttcttg aagtgggtggc 3480
 ctaactacgg ctacactaga aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta 3540
 ccttcgaaaa aagagttggt agctcttgat ccggcaaaaa aaccaccgct ggtagcggtg 3600
 gttttttgt ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt 3660
 tgatcttttc tacgggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttg 3720
 tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt aaaggccggc cgcgccgcg 3780
 caaagtcccg cttcgtgaaa attttcgtgc cgcgtgattt tccgcaaaa actttaacga 3840
 acgttcgtta taatggtgtc atgaccttca cgacgaagta ctaaaattgg cccgaatcat 3900

ES 2 380 000 T3

cagctatgga tctctctgat gtcgCGctgg agtccgacgc gctcGatgct gccgtcGatt 3960
 taaaaacggt gatcggattt ttccgagctc tcgatacGac ggacgcGcca gcatcagGag 4020
 actgggccaG tgccgcgagc gacctagaaa ctctcgtggc ggatcttgag gagctggctg 4080
 acgagctgcg tgctcggcca gcgccaggag gacgcacagt agtggaggat gcaatcagtt 4140
 gcgcctactg cggTggcctg attcctcccc ggctgaccC gcgaggacgg cgcGcaaaat 4200
 attgctcaga tgctgtctgt gccgcagcca gccgcgagcg cgccaacaaa cgccacgccc 4260
 aggagctgga ggcggttagg tcgcaaatgg cgctggaagt gcgtccccC agcgaaatTT 4320
 tggccatggt cgTcacagag ctggaagcgg cagcgagaat tatcgcgatc gtggcggtgc 4380
 ccgagggcat gacaaacatc gtaaAtgccc cgTttcgtgt gccgtggccc cccaggacgt 4440
 gtcagcGccc ccaccacctg caccgaatcg gcagcagcgt cgcgcgtcga aaaagcgcac 4500
 aggcggcaag aagcgataag ctgcacgaat acctgaaaaa tgttgaacgc cccgtgagcg 4560
 gtaactcaca gggcgtcggc taacccccag tccaaacctg ggagaaagcg ctcaaaaaatg 4620
 actctagcgg attcacgaga cattgacaca ccggcctgga aattttccgc tgatctgttc 4680
 gacaccatc ccgagctcgc gctgGatca cgtggctgga cgagcgaaga ccgcccGgaa 4740
 ttctcGctc acctgggcag agaaaatTt cagggcagca agaccCGca cttcGccagc 4800
 gcttggatca aagaccCGga cacggagaaa cacagccGaa gttataccga gttggttcaa 4860
 aatcGcttgC ccggtgcccag tatgttgctc tgacgcacgc gcagcacgca gccgtgcttg 4920
 tcctggacat tgatgtgccc agccaccagg ccggcgggaa aatcGagcac gtaaaccCCC 4980
 aggtctacgc gatTTtgag cgctgggcac gcctggaaaa agcGccagct tggatcggcg 5040
 tgaatccact gagcgggaaa tgccagctca tctggtcat tgatccggtg tatgcccGag 5100
 caggcatgag cagcccgaat atgcgcctgc tggctgcaac gaccgaggaa atgaccCGcg 5160
 tttcGgcgc tgaccaggct ttttcacata ggctgagccc tggccactgc actctcccag 5220
 gatcccagcc gtaccgctgg catgcccagc acaatcGcgt ggatcGccta gctgatctta 5280
 tggaggttgC tcgcatgatc tcaggcacag aaaaacctaa aaaacgctat gagcaggagt 5340
 tttctagcgg acgggcacgt atcgaagcgg caagaaaagc cactgcggaa gcaaaagcac 5400
 ttgccacgct tgaagcaagc ctgcccagcg ccgctgaagc gtctggagag ctgatcGagc 5460
 gcgtcccgtg cctctggact gctccagggc gtgcccGccg tgatgagacg gcttttcGcc 5520
 acgctttgac tgtgggatac cagttaaaag cggtcgtgga gcgcctaaaa gacaccaagg 5580
 gtcatcGagc ctacgagcgt gcctacaccg tcgctcaggc ggtcggagga ggccgtgagc 5640
 ctgatctgcc gccggactgt gaccGCCaga cggattggcc gcgacgtgtg cgcggttacg 5700
 tcgctaaagg ccagccagtc gtccctgctc gtcagacaga gacgcagagc cagcccaggc 5760
 gaaaagctct ggccactatg ggaagacgtg gcggtaaaaa ggccGcagaa cgctggaaag 5820
 acccaaacag tgagtacgcc cgagcacagc gagaaaaact agctaagtcc agtcaacgac 5880
 aagctaggaa agctaaagga aatcGcttga ccattgCagg ttggtttatg actgttgagg 5940
 gagagactgg ctcgtggccc acaatcaatg aagctatgtc tgaatttagc gtgtcacgtc 6000
 agaccgtgaa tagagcactt aaggtctgcg ggcatgaaC ttccacgagg acgcccGaaag 6060
 ctccagta aatgtgccat ctcgtaggca gaaaacggtt cccccgtagg gtctctctct 6120
 tggcctcctt tctaggtcGg gctgattgct cttgaagctc tctagggggg ctcacaccat 6180

ES 2 380 000 T3

aggcagataa cgttccccac cggctcgcct cgtaagcgca caaggactgc tcccaaagat 6240
 cttcaaagcc actgccgcga ctgccttcgc gaagccttgc cccgcggaaa tttcctccac 6300
 cgagttcgtg cacacccta tgccaagctt ctttcaccct aaattcgaga gattggattc 6360
 ttaccgtgga aattcttcgc aaaaatcgtc ccctgatcgc ccttgcgacg ttggcgtcgg 6420
 tgccgctggt tgcgcttggc ttgaccgact tgatcagcgg ccgc 6464

<210> 43

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: BK 1695

<400> 43

gagactcgag ggccgttacc ctgcgaatg 29

<210> 44

<211> 30

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: Haf16

<400> 44

gagaactagt gtggctacga ctttcgcagc 30

<210> 45

25 <211> 6604

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

5 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: pCliK5MCS PeftuPsod metA (H473)

<400> 45

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa	tctcgagggc	cgttaccctg	cgaatgtcca	cagggtagct	ggtagtttga	60
aatcaacgc	cgttgccctt	aggattcagt	aactggcaca	ttttgtaatg	cgctagatct	120
gtgtgctcag	tcttccaggc	tgcttatcac	agtgaaagca	aaaccaattc	gtggctgcga	180
aagtcgtagc	cacactagta	gctgcccaatt	attccgggct	tgtgaccgcg	tacccgataa	240
ataggtcggc	tgaaaaattt	cgttgcaata	tcaacaaaaa	ggcctatcat	tgggaggtgt	300
cgcaccaagt	acttttgcg	agcgccatct	gacggatttt	caaaagatgt	atatgctcgg	360
tgcggaacc	tacgaaagga	ttttttacc	atgccaccc	tcgcgcttc	aggtcaactt	420
gaaatccaag	cgatcgggta	tgtctccacc	gaagccggag	caatcattac	aaacgctgaa	480
atgcctatc	accgctgggg	tgaataccgc	gtagataaag	aaggacgcag	caatgtcggt	540
ctcatcgaac	acgccctcac	tggagattcc	aacgcagccg	attggtgggc	tgacttgctc	600
ggccccggca	aagccatcaa	cactgatatt	tactgctgta	tctgtacca	cgatcgggt	660
ggttgcaacg	gttccaccgg	acctggctcc	atgcatccag	atggaaattt	ctggggtaat	720
cgcttccccg	ccacgtccat	tcgtgatcag	gtaaacgccg	aaaaacaatt	cctcgacgca	780
ctcggcatca	ccacggtcgc	cgcagtactt	ggtggttcca	tgggtggtgc	ccgcacccta	840
gagtgggccc	caatgtacc	agaaactggt	ggcgagctg	ctgttcttgc	agtttctgca	900
cgcgccagcg	cctggcaaat	cggcattcaa	tccgccaaa	ttaaggcgat	tgaaaacgac	960
caccactggc	acgaaggcaa	ctactacgaa	tccggctgca	accagccac	cggactcggc	1020
gccgcccgac	gcacgcca	cctcacctac	cgtggcgaac	tagaaatcga	cgaacgcttc	1080
ggcaccaaag	cccaaaagaa	cgaaaacca	ctcggctcct	accgcaagcc	cgaccagcgc	1140
ttcgccgtgg	aatcctactt	ggactacca	gcagacaagc	tagtacagcg	tttcgacgcc	1200
ggctcctacg	tcttgctcac	cgacgccctc	aaccgccacg	acattggtcg	cgaccgcgga	1260
ggcctcaaca	aggcactcga	atccatcaaa	gttccagtcc	ttgtcgcagg	cgtagatacc	1320
gatattttgt	accctacca	ccagcaagaa	cacctctcca	gaaacctggg	aaatctactg	1380
gcaatggcaa	aatcgtatc	ccctgtcggc	cacgatgctt	tcctcaccga	aagccgcaa	1440
atggatcgca	tcgtgaggaa	cttcttcagc	ctcatctccc	cagacgaaga	caacccttcg	1500
acctacatcg	agttctacat	ctaagtcgac	atcgatgctc	ttctgcgta	attaacaatt	1560
gggatcctct	agagttctgt	gaaaaacacc	gtggggcagt	ttctgcttcg	cggtgttttt	1620
tatttggtggg	gcactagacc	cgggatttaa	atcgctagcg	ggctgctaaa	ggaagcggaa	1680
cacgtagaaa	gccagtccgc	agaaacgggtg	ctgaccccgg	atgaatgtca	gctactgggc	1740
tatctggaca	agggaaaacg	caagcgcaaa	gagaaagcag	gtagcttgca	gtgggcttac	1800
atggcgatag	ctagactggg	cggttttatg	gacagcaagc	gaaccggaat	tgccagctgg	1860
ggcgccctct	ggtaagggtg	ggaagccctg	caaagtaaac	tggatggctt	tcttgccgcc	1920

ES 2 380 000 T3

aaggatctga tggcgcaggg gatcaagatc tgatcaagag acaggatgag gatcgtttcg 1980
catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg agaggctatt 2040
cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt tccggctgtc 2100
agcgcagggg cgccccggttc tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc tgaatgaact 2160
gcaggacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt gcgcagctgt 2220
gctcgacgtt gtcactgaag cgggaagggg ctggctgcta ttgggcgaag tgccggggca 2280
ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc cgaaaaagta tccatcatgg ctgatgcaat 2340
gcggcggctg catacgttg atccggctac ctgcccattc gaccaccaag cgaaacatcg 2400
catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc cggctttgtc gatcaggatg atctggacga 2460
agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcggcagg ctcaaggcgc gcatgcccga 2520
cggcgaggat ctgctcgtga cccatggcga tgctgcttg ccgaatatca tgggtgaaaa 2580
tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg ccggctgggt gtggcggacc gctatcagga 2640
catagcgttg gctaccctg atattgctga agagcttggc ggcgaatggg ctgaccgctt 2700
cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc atcgcttct atcgcttct 2760
tgacgagttc ttctgagcgg gactctgggg ttcgaaatga ccgaccaagc gacgccaac 2820
ctgccatcac gagatttca ttccaccgcc gccttctatg aaaggttggg cttcggaatc 2880
gttttccggg acgccggctg gatgatcctc cagcgcgggg atctcatgct ggagtcttc 2940
gcccacgcta gcggcgcgcc ggccggcccg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag 3000
aaaataccgc atcaggcgct cttccgcttc ctgctcact gactcgtgc gctcggctgt 3060
tcggctgcgg cgagcggat cagctcactc aaaggcggta atacggttat ccacagaatc 3120
aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa 3180
aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgccc cctgacgagc atcacaaaa 3240
tcgacgtca agtcagaggt ggcgaaacc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc 3300
ccctggaagc tcctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc 3360
cgcctttctc cttcgggaa gcgtggcgt ttctcatagc tcacgctgta ggtatctcag 3420
ttcgggtag gtcgttcgt ccaagctggg ctgtgtgcac gaacccccg ttcagcccga 3480
ccgctgcgcc ttatccgta actatcgtct tgagtccaac ccgtaagac acgacttatc 3540
gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac 3600
agagtcttg aagtgggtgc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat ttggtatctg 3660
cgctctgctg aagccagtta cttcggaaa aagagttggt agctcttgat ccggcaaaca 3720
aaccaccgct ggtagcggtg gttttttgt ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaa 3780
aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc tacgggtct gacgctcagt ggaacgaaaa 3840
ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt 3900
aaaggccggc cgcgccgcg caaagtccc cttcgtgaaa attttcgtgc cgcgtgattt 3960
tccgcaaaa actttaacga acgttcgtta taatggtgtc atgaccttca cgacgaagta 4020
ctaaaattgg cccgaatcat cagctatgga tctctctgat gtcgcgctgg agtccgacgc 4080
gctcgatgct gccgtcgatt taaaaacggt gatcggattt ttccgagctc tcgatacgac 4140
ggacgcgcca gcatcacgag actgggccag tgccgcgagc gacctagaaa ctctcgtggc 4200
ggatcttgag gagctggctg acgagctgcg tgctcggcca gcgccaggag gacgcacagt 4260

ES 2 380 000 T3

agtggaggat gcaatcagtt ggcctactg cggtggcctg attcctccc gccctgacct 4320
 gcgaggacgg cgcgcaaat attgctcaga tgcgtgtcgt gccgcagcca gccgcgagcg 4380
 cgccaacaaa cgccacgccc aggagctgga ggcggctagg tcgcaaatgg cgctggaagt 4440
 gcgtcccccg agcgaatgt tggccatggt cgtcacagag ctggaagcgg cagcgagaat 4500
 tatcgcgatc gtggcgggtc ccgcaggcat gacaaacatc gtaaatgccg cgtttcgtgt 4560
 gccgtggccc cccaggacgt gtcagcgcgg ccaccacctg caccgaatcg gcagcagcgt 4620
 cgcgcgctga aaaagcgcac aggcggcaag aagcgataag ctgcacgaat acctgaaaaa 4680
 tgttgaacgc cccgtgagcg gtaactcaca gggcgtcggc taacccccag tccaaacctg 4740
 ggagaaagcg ctcaaaaatg actctagcgg attcacgaga cattgacaca ccggcctgga 4800
 aattttccgc tgatctgttc gacaccatc ccgagctcgc gctgcgatca cgtggctgga 4860
 cgagcgaaga ccgccgcgaa ttctcgcctc acctgggcag agaaaattc cagggcagca 4920
 agaccgcgga cttcgcagc gcttgatca aagaccgga cacggagaaa cacagccgaa 4980
 gtataaccga gttggtcaa aatcgttgc ccggtgccag tatgttgctc tgacgcacgc 5040
 gcagcacgca gccgtgcttg tcctggacat tgatgtgccg agccaccagg ccggcgggaa 5100
 aatcgagcac gtaaaccgc aggtctacgc gattttggag cgctgggcac gcctggaaaa 5160
 agcgcagct tggatcggcg tgaatccact gagcgggaaa tgccagctca tctggctcat 5220
 tgatccggtg tatgccgag caggcatgag cagcccgaat atgcgcctgc tggctgcaac 5280
 gaccgaggaa atgaccgcg ttttcggcgc tgaccaggct tttcacata ggctgagccg 5340
 tggccactgc actctccgac gatcccagcc gtaccgctgg catgccagc acaatcgcgt 5400
 ggatcgccta gctgatctta tggaggttgc tcgcatgatc tcaggcacag aaaaacctaa 5460
 aaaacgctat gagcaggagt tttctagcgg acgggcacgt atcgaagcgg caagaaaagc 5520
 cactgcggaa gcaaaagcac ttgccacgct tgaagcaagc ctgccgagcg ccgctgaagc 5580
 gtctggagag ctgatcgacg gcgtccgtgt cctctggact gctccagggc gtgccgcccg 5640
 tgatgagacg gcttttcgcc acgctttgac tgtgggatac cagttaaaag cggctggtga 5700
 gcgcctaaaa gacaccaagg gtcacgagc ctacgagcgt gcctacaccg tcgctcaggc 5760
 ggtcggagga gccgtgagc ctgatctgcc gccggactgt gaccgcaga cggattggcc 5820
 gcgacgtgtg cgcggctacg tcgctaaagg ccagccagtc gtccctgctc gtcagacaga 5880
 gacgcagagc cagccgaggc gaaaagctct ggccactatg ggaagacgtg gcggtaaaaa 5940
 ggccgcagaa cgctgaaaag acccaaacag tgagtacgcc cgagcacagc gagaaaaact 6000
 agctaagtcc agtcaacgac aagctaggaa agctaaagga aatcgcttga ccattgcagg 6060
 ttggtttatg actgttgagg gagagactgg ctcgtggccg acaatcaatg aagctatgtc 6120
 tgaathtagc gtgtcacgct agaccgtgaa tagagcactt aaggctcgcg ggcattgaac 6180
 ttccacgagg acgccgaaag cttcccagta aatgtgccat ctcgtaggca gaaaacggtt 6240
 cccccgtagg gtctctctct tggcctcctt tctaggtcgg gctgattgct cttgaagctc 6300
 tctagggggg ctcacaccat aggcagataa cgttccccac cggctcgcct cgtaagcgca 6360
 caaggactgc tccaaagat cttcaaagc actgccgca ctgccttcgc gaagccttgc 6420
 cccgcggaaa tttctccac cgagttcgtg cacacccta tgccaagctt ctttcacctt 6480
 aaattcgaga gattggattc ttaccgtgga aattcttcgc aaaaatcgtc ccctgatcgc 6540

cccttgcgacg ttggcgtccg tgccgctggt tgcgccttggc ttgaccgact tgatcagcgg 6600
ccgc 6604

<210> 46

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: Haf64

<400> 46

gagaactagt ggccgttacc ctgcgaatg 29

<210> 47

<211> 36

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: Haf65

<400> 47

gcgcgagggt gggcattgta tgcctcctg gacttc 36

<210> 48

25 <211> 17

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK1862)

<400> 48

5 atgccacccc tcgcgcc 17

<210> 49

<211> 32

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

10 <220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: BK1849)

15 <400> 49

gtgtgtcgac ttagatgtag aactcgatgt ag 32

<210> 50

<211> 29

<212> ADN

20 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

25 <223> designación interna: BK 1697

<400> 50

gagactcgag agctgccaat tattccggg 29

<210> 51

<211> 28

30 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

5 <223> designación interna: Haf17)

<400> 51

gagaactagt taggtttccg caccgagc 28

<210> 52

<211> 6609

10 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

15 <221> características_miscláneas

<223> designación interna: pCLiK5MCS Psod Peft metA (H505)

<400> 52

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa tctcgagagc tgccaattat tccgggcttg tgacccgcta cccgataaat	60
aggtcggctg aaaaatttcg ttgcaatata aacaaaaagg cctatcattg ggagggtgctg	120
caccaagtac ttttgcaag cgccatctga cggattttca aaagatgtat atgctcggctg	180
cggaaaccta actagtggcc gttaccctgc gaatgtccac agggtagctg gtagtttgaa	240
aatcaacgcc gttgccctta ggattcagta actggcacat tttgtaatgc gctagatctg	300
tgtgctcagt cttccaggct gcttatcaca gtgaaagcaa aaccaattcg tggctgcgaa	360
agtcgtagcc accacgaagt ccaggaggac atacaatgcc caccctcgcg ccttcaggctc	420
aacttgaaat ccaagcgatc ggtgatgtct ccaccgaagc cggagcaatc attacaaacg	480
ctgaaatcgc ctatcaccgc tgggggtgaat accgcgtaga taaagaagga cgcagcaatg	540
tcgttctcat cgaacacgcc ctactggag attccaacgc agccgattgg tgggctgact	600
tgctcggctc cggcaaagcc atcaacactg atatttactg cgtgatctgt accaacgtca	660
tcggtggttg caacggttcc accggacctg gctccatgca tccagatgga aatttctggg	720
gtaatcgctt ccccgccacg tccattcgtg atcaggtaaa cgccgaaaa caattcctcg	780
acgcactcgg catcaccacg gtcgccgag tacttgggtg ttccatgggt ggtgcccgc	840
ccctagagtg ggccgcaatg taccagaaa ctggtggcgc agctgctgtt cttgcagttt	900
ctgcacgcgc cagcgcttg caaatcggca ttcaatccgc ccaaattaag gcgattgaaa	960
acgaccacca ctggcacgaa ggcaactact acgaatccgg ctgcaacca gccaccggac	1020
tcggcgccgc cgcacgatc gccacactca cctaccgtgg cgaactagaa atcgacgaac	1080
gcttcggcac caaagccaa aagaacgaaa acccactcgg tccctaccgc aagcccgacc	1140
agcgcttcgc cgtggaatcc tacttggact accaagcaga caagctagta cagcgtttcg	1200
acgccggctc ctacgtcttg ctaccgacg ccctcaaccg ccacgacatt ggtcgcgacc	1260
gcggaggcct caacaaggca ctgcaatcca tcaaagtcc agtccttgtc gcaggcgtag	1320
ataccgatat tttgtacccc taccaccagc aagaacacct ctccagaaac ctgggaaatc	1380
tactggcaat ggcaaaaatc gtatcccctg tcggccacga tgctttctc accgaaagcc	1440

ES 2 380 000 T3

gccaaatgga tcgcatcgtg aggaacttct tcagcctcat ctccccagac gaagacaacc 1500
 cttcgaccta catcgagttc tacatctaag tcgacatcga tgctcttctg cgттааттаа 1560
 caattgggat cctctagagt tctgtgaaaa acaccgtggg gcagtttctg cttcgcggtg 1620
 ttttttattt gtggggcact agaccggga tttaaатсгс tagcgggctg ctaaaggaag 1680
 cggaacacgt agaaagccag tccgcagaaa cgggtctgac cccggatgaa tgtcagctac 1740
 tgggctatct ggacaagggg aaacgcaagc gcaaagagaa agcaggtagc ttgcagtggg 1800
 cttacatggc gatagctaga ctgggсggtt ttatggacag caagcgaacc ggaattgcca 1860
 gctggggcgc cctctggtaa ggttgggaag ccctgcaaag taaactggat ggctttcttg 1920
 ccgccaagga tctgatggcg caggggatca agatctgac aagagacagg atgaggatcg 1980
 tttcgcatga ttgaacaaga tggattgcac gcaggttctc cggccgcttg ggtggagagg 2040
 ctattcggt atgactgggc acaacagaca atcggtgct ctgatgccgc cgtgttccgg 2100
 ctgtcagcgc aggggcgccc ggttcttttt gtcaagaccg acctgtccgg tgccctgaat 2160
 gaactgcagg acgaggcagc gcggctatcg tggctggcca cgacggcgt tccttgсгса 2220
 gctgtgctcg acgttgтсac tgaagcggga agggactggc tgctattggg cgaagtgccg 2280
 gggcaggatc tcctgtcatc tcaccttgct cctgccgaga aagtatccat catggctgat 2340
 gcaatgcggc ggctgcatac gcttgatccg gctacctgcc cattcgacca ccaagcгaaa 2400
 catcgcatcg agcгagcacg tactcggatg gaagccggtc ttgtcgatca ggatgatctg 2460
 gacgaagagc atcaggggct cgcgccagcc gaactgttcg ccaggctcaa ggcgcgatg 2520
 cccgacggcg aggatctcgt cgtgacctat ggcgatgcct gcttgccgaa tatcatggtg 2580
 gaaaatggcc gcttttctgg attcatcgac tgtggccggc tgggtgtggc ggaccgctat 2640
 caggacatag cgttggtac ccgtgatatt gctgaagagc ttggcggcga atgggctgac 2700
 cgcttcctcg tgctttacgg tatcgccgct cccgattcgc agcгcatcgc cttctatcgc 2760
 cttcttgacg agttcttctg agcgggactc tggggttcga aatgaccgac caagcгacgc 2820
 ccaacctgcc atcacgagat ttcgattcca ccgccgctt ctatgaaagg ttgggcttcg 2880
 gaatcgtttt ccgggacgcc ggctggatga tcctccagcg cgggatctc atgctggagt 2940
 tcttcgcca cgctagcggc gcgccggccg gcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta 3000
 aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc tctactgactc gctgcgctcg 3060
 gtcgttcggc tgcggcгagc ggtatcagct cactcaaagg cgгтаатаcг gttatccaca 3120
 gaatcagggg атаacгcagг aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac 3180
 cгтаaaaagg ccгcгттгct ggcгттттc cataggctcc gccccctga cgagcatcac 3240
 aaaaatcгac gctcaagtca gaggtggcga aaccгgacag gactataaag ataccaggcг 3300
 tttccccctg gaagctccct cgtgcгctct cctgttccga ccctgcгct taccggatac 3360
 ctgtccgctt ttctcccttc gggaaгcгtg gcгctttctc atagctcag ctgtaggtat 3420
 ctcagttcгg tгtaggtcгt tcгctccaag ctgggctgtg tgcacгaacc cccгттcag 3480
 cccгaccгct gcгccttatc cггтаactat cгtcttgagt ccaaccгgt aagacacгac 3540
 ttatcгccac tggcagcagc cactггтаac aggattagca gagcгagгта tгtaggcгgt 3600
 gctacagagt tctгaaгtg gтgcctaac tacгgctaca ctagaaggac agtattгgt 3660
 atctgcгctc tгctгaaгcc agttacctc ggaaaaagag ttgгtagctc ttgatccгgc 3720

ES 2 380 000 T3

aaacaaacca ccgctggtag cgggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga 3780
 aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac 3840
 gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc 3900
 cttttaaagg ccggccgcgg ccgcgcaaag tcccgcctcg tgaaaatttt cgtgccgcgt 3960
 gattttccgc caaaaacttt aacgaacggt cgttataatg gtgtcatgac cttcacgacg 4020
 aagtactaaa attggcccga atcatcagct atggatctct ctgatgtcgc gctggagtcc 4080
 gacgcgctcg atgctgccgt cgatttaaaa acggtgatcg gatttttccg agctctcgat 4140
 acgacggacg cgccagcatc acgagactgg gccagtgccg cgagcgacct agaaaactctc 4200
 gtggcggatc ttgaggagct ggctgacgag ctgctgtgctc ggccagcgcc aggaggacgc 4260
 acagtagtgg aggatgcaat cagttgcgcc tactgcggtg gcctgattcc tccccggcct 4320
 gacccgcgag gacggcgcgc aaaatattgc tcagatgctg gtcgtgccgc agccagccgc 4380
 gagcgcgcca acaaacgcca cgccgaggag ctggaggcgg ctaggtcgca aatggcgctg 4440
 gaagtgcgtc ccccgagcga aattttggcc atggtctgca cagagctgga agcggcagcg 4500
 agaattatcg cgatcgtggc ggtgcccgca ggcatgacaa acatcgtaa tgccgcgttt 4560
 cgtgtgccgt ggccgcccag gacgtgtcag cgccgccacc acctgcaccg aatcggcagc 4620
 agcgtcgcgc gtcgaaaaag cgcacaggcg gcaagaagcg ataagctgca cgaatacctg 4680
 aaaaatgttg aacgccccgt gagcggtaac tcacagggcg tcggctaacc cccagtccaa 4740
 acctgggaga aagcgctcaa aaatgactct agcggattca cgagacattg acacaccggc 4800
 ctggaaatth tccgctgatc tgttcgacac ccatcccagag ctcgcgctgc gatcacgtgg 4860
 ctggacgagc gaagaccgcc gcgaattcct cgctcacctg ggacagagaaa atttccaggg 4920
 cagcaagacc cgcgacttgc ccagcgcttg gatcaaagac ccggacacgg agaaacacag 4980
 ccgaagtatt accgagttgg ttcaaaatcg cttgcccggg gccagtatgt tgctctgacg 5040
 cacgcgcagc acgcagccgt gcttgtcctg gacattgatg tgccgagcca ccaggccggc 5100
 gggaaaatcg agcacgtaaa ccccgaggtc tacgcgattt tggagcgtg ggcacgcctg 5160
 gaaaaagcgc cagcttggat cggcgtgaat ccaactgagcg ggaaatgcca gctcatctgg 5220
 ctattgatc cgggtgatgc cgcagcaggc atgagcagcc cgaatatgcg cctgtctggct 5280
 gcaacgaccg aggaaatgac ccgctgtttc ggctgtgacc aggctttttc acataggctg 5340
 agccgtggcc actgcactct ccgacgatcc cagccgtacc gctggcatgc ccagcacaat 5400
 cgcgtggatc gcctagctga tcttatggag gttgctcgca tgatctcagg cacagaaaaa 5460
 cctaaaaaac gctatgagca ggagttttct agcggacggg cacgtatcga agcggcaaga 5520
 aaagccactg cggaagcaaa agcacttgcc acgcttgaag caagcctgcc gagcggcgt 5580
 gaagcgtctg gagagctgat cgacggcgtc cgtgtcctct ggactgctcc agggcgtgcc 5640
 gcccgatgat agacggcttt tcgccacgct ttgactgtgg gataccagtt aaaagcggct 5700
 ggtgagcgc taaaagacac caagggtcat cgagcctacg agcgtgccta caccgtcgt 5760
 caggcggctg gaggaggccc tgagcctgat ctgccgccgg actgtgaccg ccagacggat 5820
 tggccgcgac gtgtgcgcgg ctacgtcgtc aaaggccagc cagtcgtccc tgctcgtcag 5880
 acagagacgc agagccagcc gaggcgaaaa gctctggcca ctatgggaag acgtggcgg 5940
 aaaaaggccg cagaacgctg gaaagaccca aacagtgagt acgcccagc acagcgagaa 6000
 aaactagcta agtccagtca acgacaagct aggaaagcta aaggaaatcg cttgaccatt 6060

ES 2 380 000 T3

gcaggttggg ttatgactgt tgagggagag actggctcgt ggccgacaat caatgaagct 6120
 atgtctgaat ttagcgtgtc acgtcagacc gtgaatagag cacttaaggt ctgcgggcat 6180
 tgaacttcca cgaggacgcc gaaagcttcc cagtaaagt gccatctcgt aggcagaaaa 6240
 cggttccccc gtagggctct tctcttgcc tcctttctag gtcgggctga ttgctcttga 6300
 agctctctag gggggctcac accataggca gataacgttc cccaccggct cgcctcgtaa 6360
 gcgcacaagg actgctccca aagatcttca aagccactgc cgcgactgcc ttcgcaagc 6420
 cttgccccgc ggaaatttcc tccaccgagt tcgtgcacac ccctatgcca agcttctttc 6480
 accctaaatt cgagagattg gattcttacc gtggaaattc ttcgcaaaaa tcgtcccctg 6540
 atcgcccttg cgacgttggc gtcggtgccg ctggttgccg ttggcttgac cgacttgatc 6600
 agcggccgc 6609

<210> 53

<211> 30

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

10 <223> designación interna: BK1701

<400> 53

gagactcgag cggcttaaag tttggctgcc 30

<210> 54

<211> 31

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_miscláneas

<223> designación interna: Haf018

<400> 54

gagaactagt atttgtgtg tgccggtgt g 31

<210> 55

<211> 6583

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_misceláneas ,

10 <223> designación interna: pCLiK5MCS PgroPsod metA (H472)

<400> 55

ES 2 380 000 T3

tcgatttaaa	tctcgagcgg	cttaaagttt	ggctgccatg	tgaattttta	gcaccctcaa	60
cagttgagtg	ctggcactct	cgggggtaga	gtgccaaata	ggttgtttga	cacacagttg	120
ttcaccgcg	acgacggctg	tgctggaaac	ccacaaccgg	cacacacaaa	atactagtag	180
ctgccaatta	ttccgggctt	gtgacccgct	acccgataaa	taggtcggct	gaaaaatttc	240
gttgcaatat	caacaaaaag	gcctatcatt	gggaggtgtc	gcaccaagta	cttttgcgaa	300
gcgccatctg	acggattttc	aaaagatgta	tatgctcggg	gcggaaacct	acgaaaggat	360
tttttacc	tgcccaccct	cgcgcttca	ggtcaacttg	aatccaagc	gatcggtgat	420
gtctccaccg	aagccggagc	aatcattaca	aacgctgaaa	tcgcctatca	ccgctggggg	480
gaataccg	tagataaaga	aggacgcagc	aatgtcgttc	tcatcgaaca	cgccctact	540
ggagattcca	acgcagccga	ttggtgggct	gacttgctcg	gtcccggcaa	agccatcaac	600
actgatattt	actgcgtgat	ctgtaccaac	gtcatcggtg	gttgcaacgg	ttccaccgga	660
cctggctcca	tgcatccaga	tggaaatttc	tggggtaatc	gcttccccgc	cacgtccatt	720
cgtgatcagg	taaacgccga	aaaacaattc	ctcgacgcac	tcggcatcac	cacggtcgcc	780
gcagtacttg	gtggttccat	gggtggtgcc	cgcaccttag	agtgggccgc	aatgtacca	840
gaaactgttg	gcgcagctgc	tgttcttgca	gtttctgcac	gcgccagcgc	ctggcaaadc	900
ggcattcaat	ccgcccfaat	taaggcgatt	gaaaacgacc	accactggca	cgaaggcaac	960
tactacgaat	ccggctgcaa	cccagccacc	ggactcggcg	ccgcccgacg	catcgcacc	1020
ctcacctacc	gtggcgaact	agaatcgcac	gaacgcttcg	gcaccaaagc	ccaaaagaac	1080
gaaaaccac	tcggtcccta	ccgcaagccc	gaccagcgtc	tcgccgtgga	atcctacttg	1140
gactaccaag	cagacaagct	agtacagcgt	ttcgacgccg	gctcctacgt	cttgctcacc	1200
gacgccctca	accgccacga	cattggctgc	gaccgcggag	gcctcaacaa	ggcactcgaa	1260
tccatcaaag	ttccagtcct	tgctgcaggc	gtagataccg	atattttgta	cccctaccac	1320
cagcaagaac	acctctccag	aaacctggga	aatctactgg	caatggcaaa	aatcgtatcc	1380
cctgtcggcc	acgatgcttt	cctcaccgaa	agccgccaaa	tggatcgcac	cgtgagggaac	1440
ttcttcagcc	tcctctccc	agacgaagac	aacccttcga	cctacatcga	gttctacatc	1500
taagtcgaca	tcgatgctct	tctgcgttaa	ttaacaattg	ggatcctcta	gagttctgtg	1560
aaaaacaccg	tggggcagtt	tctgcttcgc	ggtgtttttt	atgtgtgggg	cactagaccc	1620
gggatttaaa	tcgctagcgg	gctgctaaag	gaagcggaac	acgtagaaag	ccagtccgca	1680
gaaacggtgc	tgaccccgga	tgaatgtcag	ctactgggct	atctggacaa	gggaaaacgc	1740

ES 2 380 000 T3

aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgacg tgggcttaca tggcgatagc tagactgggc 1800
ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg gtaaggttgg 1860
gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt cttgccgcca aggatctgat ggcgcagggg 1920
atcaagatct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac aagatggatt 1980
gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact gggcacaaca 2040
gacaatcggc tgctctgatg ccgctgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc gcccggttct 2100
ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caggacgagg cagcgcggct 2160
atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg tctactgaagc 2220
gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt catctcacct 2280
tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc atacgcttga 2340
tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag cacgtactcg 2400
gatggaagcc ggtcttgctg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg ggctcgcgcc 2460
agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgcg catgcccgcg ggcgaggatc tcgtcgtgac 2520
ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt ctggattcat 2580
cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg ctaccctgga 2640
tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt acggtatcgc 2700
cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct tctgagcggg 2760
actctggggt tcgaaatgac cgaccaagcg acgccaacc tgccatcacg agatttcgat 2820
tccaccgccg ccttctatga aaggttgggc ttcggaatcg tttccggga cgccggctgg 2880
atgatctcc agcgcgggga tctcatgctg gagttcttcg cccacgctag cggcgcgccg 2940
gccggcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc 3000
ttccgcttcc tcgctcactg actcgtgctg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcgggtatc 3060
agctcactca aaggcggtaa tacggttata cacagaatca ggggataacg caggaaagaa 3120
catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcggt 3180
tttccatagg ctccgcccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg 3240
gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg 3300
ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc ctccgggaag 3360
cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc 3420
caagctgggc tgtgtgcacg aacccccctg tcagcccgcg cgctgcgcct tatccggtaa 3480
ctatcgtctt gagtccaacc cggtaaagaca cgacttatcg ccaactggcag cagccactgg 3540
taacagatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtgggtggc 3600
taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggatctgct gctctgctga agccagttac 3660
cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaaaa accaccgctg gtagcgggtg 3720
ttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt 3780
gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaa tcacgttaag ggattttggt 3840
catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aaggccggcc gcggccgcgc 3900
aaagtcccgc ttcgtgaaaa ttttcgtgcc gcgtgatttt ccgcaaaaa cttaacgaa 3960
cgttcgttat aatgggtgtca tgacctcac gacgaagtac taaaattggc ccgaatcatc 4020

ES 2 380 000 T3

agctatggat ctctctgatg tcgcgctgga gtccgacgcg ctcgatgctg ccgtcgattt 4080
 aaaaacgggtg atcggatttt tccgagctct cgatacgcg gacgcgccag catcacgaga 4140
 ctgggccagt gccgcgagcg acctagaaac tctcgtggcg gatcttgagg agctggctga 4200
 cgagctgcgt gctcggccag cgccaggagg acgcacagta gtggaggatg caatcagttg 4260
 cgcctactgc ggtggcctga ttctccccg gcctgacccg cgaggacggc gcgcaaaata 4320
 ttgctcagat gcgtgtcgtg ccgagccag ccgcgagcgc gccacaac gccacgccga 4380
 ggagctggag gcggctaggt cgcaaatggc gctggaagtg cgtccccga gcgaaatfff 4440
 ggccatggtc gtcacagagc tggaagcggc agcgagaatt atcgcgatcg tggcgggtcc 4500
 cgaggcatg acaaacatcg taaatgccg gtttcgtgtg ccgtggccgc ccaggacgtg 4560
 tcagcgccgc caccacctgc accgaatcgg cagcagcgtc gcgcgtcga aaagcgcaca 4620
 ggcggcaaga agcgataagc tgcacgaata cctgaaaaat gttgaacgcc ccgtgagcgg 4680
 taactcacag ggcgtcggct aacccccagt ccaaacctgg gagaaagcgc tcaaaaatga 4740
 ctctagcgga ttcacgagac attgacacac cggcctggaa attttccgct gatctgttcg 4800
 acacccatcc cgagctcgcg ctgcgatcac gtggctggac gagcgaagac cgccgcgaat 4860
 tcctcgtca cctgggcaga gaaaatttcc agggcagcaa gaccgcgcac ttcgccagcg 4920
 cttggatcaa agaccggac acggagaaac acagccgaag ttataccgag ttggttcaaa 4980
 atcgttggc cggtgccagt atgttgctct gacgcacgcg cagcacgcag ccgtgcttgt 5040
 cctggacatt gatgtgccga gccaccaggc cggcgggaaa atcgagcacg taaacccccga 5100
 ggtctacgcg attttggagc gctgggcacg cctggaaaaa gcgccagctt ggatcggcgt 5160
 gaatccactg agcgggaaat gccagctcat ctggctcatt gatccgggtg atgccgcagc 5220
 aggcatgagc agcccgaata tgcgcctgct ggctgcaacg accgaggaat tgacccgcgt 5280
 tttcggcgt gaccaggctt tttcacatag gctgagccgt ggccactgca ctctccgacg 5340
 atcccagccg taccgctggc atgcccagca caatcgcgtg gatcgcctag ctgatcttat 5400
 ggaggttgc cgcatgatct caggcacaga aaaacctaaa aaacgctatg agcaggagtt 5460
 ttctagcgga cgggcacgta tcgaagcggc aagaaaagcc actgcggaag caaaagcact 5520
 tgccacgctt gaagcaagcc tgccgagcgc cgctgaagcg tctggagagc tgatcgacgg 5580
 cgtccgtgct ctctggactg ctccaggcgc tgccgcccgt gatgagacgg cttttcgcca 5640
 cgctttgact gtgggatacc agttaaagc ggctgggtgag cgcctaaaag acaccaaggg 5700
 tcatcgagcc tacgagcgtg cctacaccgt cgctcaggcg gtcggaggag gccgtgagcc 5760
 tgatctgccg ccgactgtg accgccagac ggattggccg cgacgtgtgc gcggctacgt 5820
 cgctaaaggc cagccagtcg tccctgctcg tcagacagag acgcagagcc agccgaggcg 5880
 aaaagctctg gccactatgg gaagacgtgg cggtaaaaag gccgcagaac gctggaaaga 5940
 cccaaacagt gactacgccc gagcacagcg agaaaaacta gctaagtcca gtcaacgaca 6000
 agctaggaaa gctaaaggaa atcgcctgac cattgcaggt tggtttatga ctggtgaggg 6060
 agagactggc tcgtggccga caatcaatga agctatgtct gaatttagcg tgtcacgtca 6120
 gaccgtgaat agagactta aggtctcggc gcattgaact tccacgagga cgccgaaagc 6180
 ttcccagtaa atgtgccatc tcgtaggcag aaaacggttc ccccgtaggg tctctctctt 6240
 ggctccttt ctaggtcggg ctgattgctc ttgaagctct ctaggggggc tcacaccata 6300
 ggagataac gttccccacc ggctcgcctc gtaagcgcac aaggactgct cccaaagatc 6360

ES 2 380 000 T3

ttcaaagcca ctgccgac tgccttcgag aagccttgcc ccgcggaaat ttcctccacc 6420
gagttcgtgc acaccctat gccaagcttc tttcacccta aattcgagag attggattct 6480
taccgtggaa attcttcgca aaaatcgtcc cctgatcgcc cttgcgacgt tggcgtcggt 6540
gccgctgggt gcgcttggt tgaccgactt gatcagcggc cgc 6583

<210> 56

<211> 20

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: BK1782

<400> 56

tcgagagatt ggattctac 20

<210> 57

<211> 30

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: Haf63

<400> 57

tctcgtacc ccgcaccgag catatacatc 30

<210> 58

25 <211> 6450

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_misceláneas

5 <223> designación interna: H479 (pCliK5MCS PEF-TS metA)

<400> 58

ES 2 380 000 T3

aaatctcgag cttggtctat agtggctagg taccceccca cgacaatgga actttgactt 60
 ttaaaatttc atcgccgtgg gggctttttg ggcagccagc ccgccgtgtc gcaacgtaat 120
 cgactgaata cctgtacgat cacttttttag acgggagggt agggctactg tgccctaacc 180
 taagcttgta aagcattaat tatccataca taaggaggat cgccccgtaa tgcccaccct 240
 cgcgccctca ggtcaacttg aaatccaagc gatcgggtgat gtctccaccg aagccggagc 300
 aatcattaca aacgctgaaa tcgcctatca ccgctggggg gaataccgcg tagataaaga 360
 aggacgcagc aatgtcgttc tcatcgaaca cgccctcact ggagattcca acgcagccga 420
 ttggtgggct gacttgctcg gtcccggcaa agccatcaac actgatattt actgcgtgat 480

 ctgtaccaac gtcacggtg gttgcaacgg ttccaccgga cctggctcca tgcatccaga 540
 tggaaatttc tggggtaatc gcttccccgc cacgtccatt cgtgatcagg taaacgccga 600
 aaaacaattc ctcgacgcac tcggcatcac cacggctgcc gcagtacttg gtggttccat 660
 gggtggtgcc cgcacccctag agtgggccgc aatgtacca gaaactgttg gcgcagctgc 720
 tgttcttgca gtttctgcac gcgccagcgc ctggcaaate ggcattcaat ccgcccaaat 780
 taaggcgatt gaaaacgacc accactggca cgaaggcaac tactacgaat ccggctgcaa 840
 cccagccacc ggactcggcg ccgcccgacg catcgccac ctcacctacc gtggcgaaact 900
 agaaatcgac gaacgcttcg gcaccaaagc caaaagaac gaaaaccac tcggtcccta 960
 ccgcaagccc gaccagcgtc tcgccgtgga atcctacttg gactaccaag cagacaagct 1020
 agtacagcgt ttcgacgccg gtcctacgt cttgctcacc gacgccctca accgccacga 1080
 cattggtcgc gaccgcggag gcctcaaaa ggcactcga tccatcaaag ttccagtctt 1140
 tgctgcaggc gtagataccg atattttgta cccctaccac cagcaagaac acctctccag 1200
 aaacctggga aatctactgg caatggcaaa aatcgtatcc cctgtcggcc acgatgcttt 1260
 cctcaccgaa agccgcaaaa tggatcgcac cgtgaggaaac ttcttcagcc tcactcccc 1320
 agacgaagac aacccttcga cctacatcga gttctacatc taagtcgaca tcgatgctct 1380
 tctgcgttaa ttaacaattg ggatcctcta gagttctgtg aaaaacaccg tggggcagtt 1440
 tctgcttcgc ggtgtttttt atttgtgggg cactagaccg gggatttaa tcgctagcgg 1500
 gctgctaaag gaagcggaa acgtagaaag ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga 1560
 tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg 1620
 tagcttgtag tgggcttaca tggcgatagc tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg 1680
 aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg gtaagggttg gaagccctgc aaagtaaaact 1740
 ggatggcttt cttgcccca aggatctgat ggcgcagggg atcaagatct gatcaagaga 1800
 caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg 1860
 cttgggtgga gaggctattc ggctatgact gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg 1920
 ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc gcccggttct tttgtcaag accgacctgt 1980
 ccggtgccct gaatgaactg caggacgagg cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg 2040

ES 2 380 000 T3

gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg tctactgaagc gggaaagggac tggctgctat 2100
 tgggcaagc gccggggcag gatctcctgt catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat 2160
 ccatcatggc tgatgcaatg cggcggtcgc atacgcttga tccggctacc tgcccattcg 2220
 accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg 2280
 atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc 2340
 tcaaggcgcg catgcccgcg ggcgaggatc tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc 2400
 cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg 2460
 tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg ctaccctgta tattgctgaa gagcttggcg 2520
 gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca 2580
 tcgcttctta tcgcttctt gacgagttct tctgagcggg actctggggg tcgaaatgac 2640
 cgaccaagcg acgccaacc tgccatcacg agatttcgat tccaccgccg ctttctatga 2700
 aaggttgggc ttcggaatcg ttttccggga cgcggctgg atgatcctcc agcgcgggga 2760
 tctcatgctg gagttcttcg cccacgctag cggcgcgccg gccggcccgg tgtgaaatac 2820
 cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc ttcgcttcc tcgctcactg 2880
 actcgtcgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggatc agctcactca aaggcggtaa 2940
 tacggttata cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc 3000
 aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgctg tgctggcgtt tttccatagg ctccgcccc 3060
 ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaaccgc acaggactat 3120
 aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtcgc ctctcctggt ccgaccctgc 3180
 cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct 3240
 cagcgttagg gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg 3300
 aacccccgt tcagcccgcg cgctgcgctt tatccggtaa ctatcgtctt ggtccaacc 3360
 cggtaaagaca cgacttatcg ccaactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga 3420
 ggtatgtagg cgggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa 3480
 ggacagtatt tggatctgc gctctgctga agccagttac cttcgaaaaa agagttggta 3540
 gctcttgatc cggcaaaaa accaccgctg gtagcgtggt tttttttggt tgcaagcagc 3600
 agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg 3660
 acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga 3720
 tcttcaccta gatcctttta aaggccggcc gcggccgcgc aaagtcccgc ttcgtgaaaa 3780
 tttcgtgcc gcgtgatttt ccgcaaaaaa cttaacgaa cgttcgttat aatgggtgca 3840
 tgacctcac gacgaagtac taaaattggc ccgaatcatc agctatggat ctctctgatg 3900
 tcgctgtagg gtccgacgcg ctcgatgctg ccgtcgattt aaaaacggtg atcggatttt 3960
 tccgagctct cgatacgacg gacgcgccag catcacgaga ctgggcccagt gccgagcgcg 4020
 acctagaaac tctcgtggcg gatcttgagg agctggctga cgagctgcgt gctcggccag 4080
 cgccaggagg acgcacagta gtggaggatg caatcagttg gcctactgc ggtggcctga 4140
 ttctccccg gcctgaccg cgaggacggc gcgcaaaata ttgctcagat gcgtgtcgtg 4200
 ccgagccag ccgagcgc gccacaac gccacgccga ggagctggag gcggctaggt 4260
 cgcaaatggc gctggaagtg cgtccccga gcgaaatttt ggccatggtc gtcacagagc 4320

ES 2 380 000 T3

tggaaagcggc agcgagaatt atcgcgatcg tggcgggtgcc cgcaggcatg acaaacatcg 4380
 taaatgccgc gtttcgtgtg ccgtggccgc ccaggacgtg tcagcgccgc caccacctgc 4440
 accgaatcgg cagcagcgtc gcgcgtcgaa aaagcgcaca ggcggcaaga agcgataagc 4500
 tgcacgaata cctgaaaaat gttgaacgcc ccgtgagcgg taactcacag ggcgtcggct 4560
 aacccccagt ccaaacctgg gagaaagcgc tcaaaaatga ctctagcggg ttcacgagac 4620
 attgacacac cggcctggaa attttccgct gatctgttcg acacccatcc cgagctcgcg 4680
 ctgcgatcac gtggctggac gagcgaagac cgccgcgaat tcctcgctca cctgggcaga 4740
 gaaaatttcc agggcagcaa gaccgcgac ttcgccagcg cttggatcaa agacccggac 4800
 acggagaaac acagccgaag ttataccgag ttggttcaaa atcgcttgcc cggtgccagt 4860
 atgttgctct gacgcacgcg cagcacgcag ccgtgcttgt cctggacatt gatgtgccga 4920
 gccaccaggc cggcgggaaa atcgagcacg taaaccccga ggtctacgcg attttgagc 4980
 gctgggcacg cctggaaaaa gcgccagctt ggatcggcgt gaatccactg agcgggaaat 5040
 gccagctcat ctggctcatt gatccggtgt atgccgcagc aggcatgagc agcccgaata 5100
 tgcgcctgct ggctgcaacg accgaggaaa tgaccgcgct ttcggcgct gaccaggctt 5160
 tttcacatag gctgagccgt ggccactgca ctctccgacg atcccagccg taccgctggc 5220
 atgccagca caatcgcgtg gatcgcctag ctgatcttat ggaggttgct cgcgatgatct 5280
 caggcacaga aaaacctaaa aaacgctatg agcaggagtt ttctagcggg cgggcacgta 5340
 tcgaagcggc aagaaaagcc actgcggaag caaaagcact tgccacgctt gaagcaagcc 5400
 tgccgagcgc cgctgaagcg tctggagagc tgatcgacgg cgctccgtgc ctctggactg 5460
 ctccagggcg tgccgcccgat gatgagacgg cttttcgcca cgctttgact gtgggatacc 5520
 agttaaagc ggctggtgag cgcctaaaag acaccaaggg tcatcgagcc tacgagcgtg 5580
 cctacaccgt cgctcaggcg gtcggaggag gccgtgagcc tgatctgccg ccggactgtg 5640
 accgccagac ggattggccg cgacgtgtgc ggggtacgt cgctaaaggc cagccagtcg 5700
 tcctgctcg tcagacagag acgcagagcc agccgaggcg aaaagctctg gccactatgg 5760
 gaagacgtgg cggtaaaaag gccgcagaac gctggaaaga cccaaacagt gagtacgccc 5820
 gagcacagcg agaaaaacta gctaagtcca gtcaacgaca agctaggaaa gctaaaggaa 5880
 atcgcttgac cattgcaggt tggtttatga ctggtgagg agagactggc tcgtggccga 5940
 caatcaatga agctatgtct gaatttagcg tgtcacgtca gaccgtgaat agagcactta 6000
 aggtctgagg gcattgaact tccacgagga cgccgaaagc ttcccagtaa atgtgccatc 6060
 tcgtaggcag aaaacggttc ccccgtaggg tctctctctt ggctccttt ctaggtcggg 6120
 ctgattgctc ttgaagctct ctaggggggc tcacaccata ggcagataac gttccccacc 6180
 ggctcgcctc gtaagcgcac aaggactgct ccaaagatc ttcaaagcca ctgccgcgac 6240
 tgccttcgag aagccttgcc ccgcggaaat ttctccacc gagttcgtgc acaccctat 6300
 gccaaagctt tttcaccta aattcgagag attggattct taccgtggaa attcttcgca 6360
 aaaatcgcc cctgatcgcc cttgcgacgt tggcgtcggg gccgctgggt gcgcttggt 6420
 tgaccgactt gatcagcggc cgctcgattt 6450

<210> 59

<211> 6759

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

5 <220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: H501 (pCliK5MCS Pgro Psod Pefts metA)

10 <400> 59

ES 2 380 000 T3

aaatctcgag cggcttaaag tttggctgcc atgtgaattt ttagcacct caacagttga 60
 gtgctggcac tctcgggggt agagtgccaa ataggttggt tgacacacag ttgttcaccc 120
 gcgacgacgg ctgtgctgga aaccacaac cggcacacac aaaatactag tagctgccaa 180
 ttattccggg cttgtgacct gctacccgat aaataggctc gctgaaaaat ttcgttgcaa 240
 tatcaacaaa aaggcctatc attgggaggt gtcgcaccaa gtacttttgc gaagcgccat 300
 ctgacggatt ttcaaaagat gtatatgctc ggtgcgggggt accccccac gacaatggaa 360
 ctttgacttt taaaatttca tcgccgtggg ggctttttgg gcagccagcc cgccgtgtcg 420
 caacgtaatc gactgaatac ctgtacgatc actttttaga cgggcgggta gggctactgt 480
 gccctaacct aagcttgtaa agcattaatt atccatacat aaggaggatc gccccgtaat 540
 gccaccctc gcgccttcag gtcaacttga aatccaagcg atcgggtgatg tctccaccga 600
 agccggagca atcattacaa acgctgaaat cgcctatcac cgctggggtg aataccgcgt 660
 agataaagaa ggacgcagca atgtcgttct catcgaacac gccctcactg gagattcaa 720
 cgcagccgat tgggtgggctg acttgetcgg tcccggcaaa gccatcaaca ctgatattta 780
 ctgcgtgatc tgtaccaacg tcatcgggtg ttgcaacggg tccaccggac ctggctccat 840
 gcatccagat ggaaatttct ggggtaatcg cttccccgcc acgtccattc gtgatcaggt 900
 aaacgccgaa aaacaattcc tcgacgcact cggcatcacc acggtcgccg cagtacttgg 960
 tggttccatg ggtggtgcc gcaccctaga gtgggccgca atgtaccag aaactgttgg 1020
 cgcagctgct gttcttgacg tttctgcacg cgccagcgcc tggcaaactc gcattcaatc 1080
 cgcccaaatt aaggcgattg aaaacgacca cactggcac gaaggcaact actacgaatc 1140
 cggctgcaac ccagccaccg gactcggcgc cgcccagcgc atcgcccacc tcacctaccg 1200
 tggcgaacta gaaatcgacg aacgcttcgg caccaaagcc caaaagaacg aaaaccact 1260
 cggtccttac cgcaagcccg accagcgctt cgccgtggaa tcctacttgg actaccaagc 1320
 agacaagcta gtacagcgtt tcgacgccgg ctctacgtc ttgctcaccg acgcccctcaa 1380
 ccgccacgac attggtcgcg accgcggagg cctcaacaag gactcgaat ccatcaaagt 1440
 tccagtcctt gtcgcaggcg tagataccga tttttgtac ccctaccacc agcaagaaca 1500
 cctctccaga aacctgggaa atctactggc aatggcaaaa atcgtatccc ctgtcggcca 1560
 cgatgctttc ctcaccgaaa gccgcaaat ggatcgcac gtgaggaact tcttcagcct 1620
 catctccca gacgaagaca acccttcgac ctacatcgag ttctacatct aagtcgacat 1680
 cgatgctctt ctgcgttaat taacaattgg gatcctctag agttctgtga aaaacaccgt 1740

ES 2 380 000 T3

ggggcagttt	ctgcttcgcg	gtgtttttta	tttgtggggc	actagacccg	ggattttaa	1800
cgctagcggg	ctgctaaagg	aagcgggaaca	cgtagaaagc	cagtccgcag	aaacgggtgct	1860
gaccccgat	gaatgtcagc	tactgggcta	tctggacaag	ggaaaacgca	agcgcaaaga	1920
gaaagcaggt	agcttgacgt	gggcttacat	ggcgatagct	agactgggcg	gttttatgga	1980
cagcaagcga	accggaattg	ccagctgggg	cgccctctgg	taaggttggg	aagccctgca	2040
aagtaactg	gatggctttc	ttgccgcaa	ggatctgatg	gcgcagggga	tcaagatctg	2100
atcaagagac	aggatgagga	tcgtttcga	tgattgaaca	agatggattg	cacgcaggtt	2160
ctccggccgc	ttgggtggag	aggctattcg	gctatgactg	ggcacaacag	acaatcggtc	2220
gctctgatgc	cgccgtgttc	cggctgtcag	cgcaggggcg	cccgttctt	tttgtcaaga	2280
ccgacctgtc	cggtgccctg	aatgaactgc	aggacgaggc	agcgcgcta	tcgtggctgg	2340
ccacgacggg	cgttccttgc	gcagctgtgc	tcgacgttgt	caactgaagcg	ggaagggact	2400
ggctgctatt	ggcggaagtg	ccggggcagg	atctcctgtc	atctcacctt	gctcctgccg	2460
agaaagtatc	catcatggct	gatgcaatgc	ggcggctgca	tacgcttgat	ccggctacct	2520
gccattcga	ccaccaagcg	aaacatcgca	tcgagcgagc	acgtactcgg	atggaagccg	2580
gtcttgctga	tcaggatgat	ctggacgaag	agcatcaggg	gctcgcgcca	gccgaactgt	2640
tcgccaggct	caaggcgcgc	atgcccgacg	gcgaggatct	cgctcgtgacc	catggcgatg	2700
cctgcttgcc	gaatatcatg	gtggaaaatg	gccgcttttc	tggattcatc	gactgtggcc	2760
ggctgggtgt	ggcggaccgc	tatcaggaca	tagcgttggc	taccgtgat	attgctgaag	2820
agcttggcgg	cgaatgggct	gaccgcttcc	tcgtgcttta	cggtatcgcc	gctcccatt	2880
cgcagcgcac	cgccttctat	cgccttcttg	acgagttctt	ctgagcggga	ctctggggtt	2940
cgaaatgacc	gaccaagcga	cgcccaacct	gccatcacga	gatttcgatt	ccaccgccgc	3000
cttctatgaa	aggttgggct	tcggaatcgt	tttccgggac	gccggctgga	tgatcctcca	3060
gcgcggggat	ctcatgctgg	agttcttcgc	ccacgctagc	ggcgcgccgg	ccggcccggg	3120
gtgaaatacc	gcacagatgc	gtaaggagaa	aataccgcat	caggcgtctt	tccgcttctt	3180
cgctcactga	ctcgtgcgc	tcggtcgttc	ggctgcggcg	agcggtatca	gctcactcaa	3240
aggcggtaat	acggttatcc	acagaatcag	gggataacgc	aggaaagaac	atgtgagcaa	3300
aaggccagca	aaaggccagg	aaccgtaaaa	aggccgcggt	gctggcggtt	ttccataggc	3360
tccgcccccc	tgacgagcat	cacaaaaatc	gacgctcaag	tcagaggtgg	cgaaacccga	3420
caggactata	aagataccag	gcgtttcccc	ctggaagctc	cctcgtgcgc	tctcctgttc	3480
cgaccctgcc	gcttaccgga	tacctgtccg	cctttctccc	ttcgggaagc	gtggcgcttt	3540
ctcatagctc	acgctgtagg	tatctcagtt	cggtgtaggt	cgttcgctcc	aagctgggct	3600
gtgtgcacga	acccccggtt	cagccccgacc	gctgcgcctt	atccggtaac	tatcgtcttg	3660
agtccaaccc	ggtaagacac	gacttatcgc	cactggcagc	agccactggt	aacaggatta	3720
gcagagcgag	gtatgtaggc	ggtgctacag	agttcttgaa	gtggggcct	aactacggct	3780
acactagaag	gacagtattt	ggtatctgcg	ctctgctgaa	gccagttacc	ttcggaaaaa	3840
gagttggtag	ctcttgatcc	ggcaaacaaa	ccaccgctgg	tagcggtggt	ttttttggtt	3900
gcaagcagca	gattacgcgc	agaaaaaaag	gatctcaaga	agatcctttg	atcttttcta	3960
cggggtctga	cgctcagtg	aacgaaaact	cacgttaagg	gattttggtc	atgagattat	4020

ES 2 380 000 T3

caaaaaggat cttcacctag atccttttaa aggccggccg cggccgcgca aagtcccgct 4080
tcgtgaaaat tttcgtgccg cgtgattttc cgccaaaac tttaacgaac gttcgttata 4140
atggtgtcat gaccttcacg acgaagtact aaaattggcc cgaatcatca gctatggatc 4200
tctctgatgt cgcgctggag tccgacgcgc tcgatgctgc cgtcgattta aaaacgggta 4260
tcggatTTTT ccgagctctc gatacgcgag acgcgccagc atcacgagac tgggccagtg 4320
ccgcgagcga cctagaaact ctcgtggcgg atcttgagga gctggctgac gagctgcgtg 4380
ctcggccagc gccaggagga cgcacagtag tggaggatgc aatcagttgc gcctactgcg 4440
gtggcctgat tcctccccgg cctgacccgc gaggacggcg cgaaaatat tgctcagatg 4500
cgtgtcgtgc cgcagccagc cgcgagcgcg ccaacaaacg ccacgccgag gagctggagg 4560
cggctaggtc gcaaatggcg ctggaagtgc gtccccgag cgaaattttg gccatggctg 4620
tcacagagct ggaagcggca gcgagaatta tcgcatcgt ggcggtgccc gcaggcatga 4680
caaacatcgt aaatgccgcg tttcgtgtgc cgtggccgcc caggacgtgt cagcgcgcc 4740
accacctgca ccgaatcggc agcagcgtcg cgcgtcgaaa aagcgcacag gcggcaagaa 4800
gcgataagct gcacgaatac ctgaaaaatg ttgaacgcc cgtgagcggc aactcacagg 4860
gcgtcggcta acccccagtc caaacctggg agaaagcgt caaaaatgac tctagcggat 4920
tcacgagaca ttgacacacc ggcctgaaa tttccgctg atctgttcga cacccatccc 4980
gagctcgcgc tgcgatcacg tggctggacg agcgaagacc gccgcgaatt cctcgtcac 5040
ctgggcagag aaaatttcca gggcagcaag acccgcgact tcgccagcgc ttgatcaaa 5100
gacccggaca cggagaaaca cagccgaagt tataccgagt tggttcaaaa tcgcttgccc 5160
ggtgccagta tgttgctctg acgcacgcgc agcacgcagc cgtgcttgtc ctggacattg 5220
atgtgccgag ccaccaggcc ggcgggaaaa tcgagcacgt aaaccccag gtctacgcga 5280
ttttggagcg ctgggcacgc ctgaaaaag cgccagcttg gatcggcgtg aatccactga 5340
gcgggaaatg ccagctcadc tggctcattg atccggtgta tgccgcagca ggcagtagca 5400
gccgaatat gcgcctgctg gctgcaacga ccgaggaaat gaccgcgtt ttcggcgtg 5460
accaggcttt ttcacatagg ctgagccgtg gccactgcac tctccgacga tcccagccgt 5520
accgctggca tgcccagcac aatcgcgtgg atgcctagc tgatcttatg gaggttgcctc 5580
gcatgatctc aggacagaaa aaacctaana aacgctatga gcaggagttt tctagcggac 5640
gggcacgtat cgaagcggca agaaaagcca ctgcggaagc aaaagcactt gccacgcttg 5700
aagcaagcct gccgagcgcg gctgaagcgt ctggagagct gatcgcggc gtccgtgtcc 5760
tctggactgc tccagggcgt gcccccgtg atgagacggc ttttcgccac gctttgactg 5820
tgggatacca gttaaaagcg gctggtgagc gcctaaaaga caccaagggt catcagcct 5880
acgagcgtgc ctacaccgtc gctcaggcgg tcggaggagg ccgtgagcct gatctgccgc 5940
cggactgtga ccgccagacg gattggccgc gacgtgtgcg cggctacgtc gctaaaggcc 6000
agccagtcgt ccctgctcgt cagacagaga cgcagagcca gccgaggcga aaagctctgg 6060
ccactatggg aagacgtggc ggtaaaaagg ccgcagaacg ctggaagac ccaaacagtg 6120
agtacgcccg agcacagcga gaaaaactag ctaagtccag tcaacgacaa gctaggaag 6180
ctaaaggaaa tcgcttgacc attgcaggtt ggtttatgac tgttgaggga gagactggct 6240
cgtggccgac aatcaatgaa gctatgtctg aatttagcgt gtcacgtcag accgtgaata 6300
gagcacttaa ggtctgcccg cattgaactt ccacgaggac gccgaaagct tcccagtaaa 6360

ES 2 380 000 T3

tgtgccatct cgtaggcaga aaacggttcc cccgtagggg ctctctcttg gcctcctttc 6420
taggtcgggc tgattgctct tgaagctctc taggggggct cacaccatag gcagataacg 6480
ttccccaccg gctcgcctcg taagcgcaca aggactgctc ccaaagatct tcaaagccac 6540
tgccgcgact gccttcgcga agccttgccc cgcggaaatt tcctccaccg agttcgtgca 6600
caccctatg ccaagcttct ttcaccctaa attcgagaga ttggattctt accgtggaaa 6660
ttcttcgcaa aaatcgctcc ctgatcggcc ttgcgacggt ggcgtcggtg ccgctgggtg 6720
cgcttggtt gaccgacttg atcagcggcc gctcgattt 6759

<210> 60

<211> 6780

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: H502 (pCliK5MCS Pefu Psod Pefts metA)

<400> 60

ES 2 380 000 T3

aaatctcgag	ggccgttacc	ctgcgaatgt	ccacagggta	gctggtagtt	tgaaaatcaa	60
cgccgttgcc	cttaggattc	agtaactggc	acattttgta	atgcgctaga	tctgtgtgct	120
cagtcttcca	ggctgcttat	cacagtgaaa	gcaaaaccaa	ttcgtggctg	cgaaagtcgt	180
agccacacta	gtagctgcca	attattccgg	gcttgtgacc	cgctacccga	taaataggtc	240
ggctgaaaaa	tttcgttgca	atatcaacaa	aaaggcctat	cattgggagg	tgtcgcacca	300
agtacttttg	cgaagcgcca	tctgacggat	tttcaaaaga	tgtatatgct	cggtgcgggg	360
taccccccca	cgacaatgga	actttgactt	ttaaaatttc	atcgccgtgg	gggctttttg	420
ggcagccagc	ccgccgtgtc	gcaacgtaat	cgactgaata	cctgtacgat	cactttttag	480
acgggcgggg	agggctactg	tgccctaacc	taagcttgta	aagcattaat	tatccataca	540
taaggaggat	cgccccgtaa	tgcccaccct	cgcgcttca	ggtcaacttg	aaatccaagc	600
gatcggtgat	gtctccaccg	aagccggagc	aatcattaca	aacgctgaaa	tcgcctatca	660
ccgctggggg	gaataccgcg	tagataaaga	aggacgcagc	aatgtcgttc	tcatcgaaca	720
cgccctcact	ggagattcca	acgcagccga	ttggtgggct	gacttgctcg	gtcccggcaa	780
agccatcaac	actgatattt	actgcgtgat	ctgtaccaac	gtcatcggtg	gttgcaacgg	840
ttccaccgga	cctggctcca	tgcattccaga	tggaaatttc	tggggtaatc	gcttccccgc	900
cacgtccatt	cgtgatcagg	taaacgccga	aaaacaattc	ctcgacgcac	tcggcatcac	960
cacggtcgcc	gcagtacttg	gtggttccat	gggtggtgcc	cgcacccctag	agtgggccgc	1020
aatgtacca	gaaactgttg	gcgcagctgc	tgttcttgca	gtttctgcac	gcgccagcgc	1080
ctggcaaatc	ggcattcaat	ccgccc aaat	taaggcgatt	gaaaacgacc	accactggca	1140

ES 2 380 000 T3

cgaaggcaac	tactacgaat	ccggctgcaa	cccagccacc	ggactcggcg	ccgcccgacg	1200
catgcccac	ctcacctacc	gtggcgaact	agaaatcgac	gaacgcttcg	gcaccaaagc	1260
ccaaaagaac	gaaaaccac	tcggtcctta	ccgcaagccc	gaccagcgct	tcgccgtgga	1320
atcctacttg	gactaccaag	cagacaagct	agtacagcgt	ttcgacgccg	gctcctacgt	1380
cttgctcacc	gacgccctca	accgccacga	cattggctgc	gaccgcggag	gcctcaacaa	1440
ggcactcgaa	tccatcaaag	ttccagtcct	tgtcgcaggc	gtagataccg	atattttgta	1500
cccctaccac	cagcaagaac	acctctccag	aaacctggga	aatctactgg	caatggcaaa	1560
aatcgatcc	cctgtcggcc	acgatgcttt	cctcaccgaa	agccgcaaaa	tggatcgcat	1620
cgtaggaac	ttcttcagcc	tcattctccc	agacgaagac	aacccttcga	cctacatcga	1680
gttctacatc	taagtcgaca	tcgatgctct	tctgcgtaa	ttaacaattg	ggatcctcta	1740
gagttctgtg	aaaaacaccg	tggggcagtt	tctgcttcgc	ggtgtttttt	atgtgtgggg	1800
cactagacc	gggatttaaa	tcgctagcgg	gctgctaaag	gaagcggaac	acgtagaaag	1860
ccagtcgcga	gaaacggtgc	tgaccccgga	tgaatgtcag	ctactgggct	atctggacaa	1920
gggaaaacgc	aagcgcaaag	agaaagcagg	tagcttgtag	tgggcttaca	tggcgatagc	1980
tagactgggc	ggttttatgg	acagcaagcg	aaccggaatt	gccagctggg	gcgcccctctg	2040
gtaaggttg	gaagccctgc	aaagtaaact	ggatggcttt	cttgccgcca	aggatctgat	2100
ggcgcagggg	atcaagatct	gatcaagaga	caggatgagg	atcgtttcgc	atgattgaac	2160
aagatggatt	gcacgcaggt	tctccggccg	cttgggtgga	gaggctattc	ggctatgact	2220
gggcacaaca	gacaatcggc	tgctctgatg	ccgccgtggt	ccggctgtca	gcgcagggggc	2280
gcccggttct	ttttgtcaag	accgacctgt	ccggtgccct	gaatgaactg	caggacgagg	2340
cagcgcggct	atcgtggctg	gccacgacgg	gcgttccttg	cgagctgtg	ctcgacgttg	2400
tcactgaagc	gggaagggac	tggtctgctat	tgggcgaagt	gccggggcag	gatctcctgt	2460
catctcacct	tgctcctgcc	gagaaagtat	ccatcatggc	tgatgcaatg	cggcggctgc	2520
atacgcttga	tccggctacc	tgcccattcg	accaccaagc	gaaacatcgc	atcgagcgag	2580
cacgtactcg	gatggaagcc	ggtcttgtcg	atcaggatga	tctggacgaa	gagcatcagg	2640
ggctcgcgcc	agccgaactg	ttcggcaggc	tcaaggcgcg	catgcccgac	ggcgaggatc	2700
tcgtcgtgac	ccatggcgat	gcctgcttgc	cgaatatcat	ggtggaaaat	ggccgctttt	2760
ctggattcat	cgactgtggc	cggctgggtg	tggcggaccg	ctatcaggac	atagcgttgg	2820
ctaccctgga	tattgctgaa	gagcttggcg	gcgaatgggc	tgaccgcttc	ctcgtgcttt	2880
acggtatcgc	cgctcccgat	tcgcagcgca	tcgccttcta	tcgccttctt	gacgagttct	2940
tctgagcggg	actctggggt	tcgaaatgac	cgaccaagcg	acgccaacc	tgccatcacg	3000
agatttcgat	tccaccgccg	ccttctatga	aaggttgggc	ttcggaatcg	ttttccggga	3060
cgccggctgg	atgatcctcc	agcgcgggga	tctcatgctg	gagttcttcg	cccacgctag	3120
cggcgcgccg	gccggcccgg	tgtgaaatac	cgcacagatg	cgtaaggaga	aaataccgca	3180
tcaggcgctc	ttccgcttcc	tcgctcactg	actcgtctgc	ctcggtcggt	cggctgcggc	3240
gagcggtatc	agctcactca	aaggcggtaa	tacggttatc	cacagaatca	ggggataacg	3300
caggaaagaa	catgtgagca	aaaggccagc	aaaaggccag	gaaccgtaaa	aaggccgcgt	3360
tgctggcggt	tttccatagg	ctccgcccc	ctgacgagca	tcacaaaaat	cgacgctcaa	3420
gtcagaggtg	gcgaaaccgg	acaggactat	aaagatacca	ggcgtttccc	cctggaagct	3480

ES 2 380 000 T3

ccctcgtgcg ctctcctggt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc 3540
 cttcggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg 3600
 tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aacccccctg tcagccccgac cgctgcgctt 3660
 tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccaactggcag 3720
 cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga 3780
 agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggatctgc gctctgctga 3840
 agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaaaa accaccgctg 3900
 gtacgggtgg ttttttgggt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaaa ggatctcaag 3960
 aagatccttt gatcttttct acggggctctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag 4020
 ggattttgggt catgagatta tcaaaaagga tcttcacctg gatcctttta aaggccggcc 4080
 gcggccgctc aaagtcccgc ttcgtgaaaa ttttcgtgcc gcgtgatttt ccgcaaaaa 4140
 cttaaacgaa cgttcgttat aatgggtgtca tgaccttcac gacgaagtac taaaattggc 4200
 ccgaatcatc agctatggat ctctctgatg tcgcgctgga gtccgacgcg ctcgatgctg 4260
 ccgtcgattt aaaaacggtg atcggatttt tccgagctct cgatacgacg gacgcgccag 4320
 catcacgaga ctgggccagt gccgcgagcg acctagaaac tctcgtggcg gatcttgagg 4380
 agctggctga cgagctgctg gctcggccag cgccaggagg acgcacagta gtggaggatg 4440
 caatcagttg cgcctactgc ggtggcctga ttctccccg gcctgaccg cgaggacggc 4500
 gcgcaaaaata ttgctcagat gcgtgtcgtg ccgcagccag ccgcgagcgc gccacaac 4560
 gccacgccga ggagctggag gcggctaggt cgcaaatggc gctggaagtg cgtccccga 4620
 gcgaaatttt ggcatggtc gtcacagagc tggaaagcggc agcgagaatt atcgcgatcg 4680
 tggcgggtgcc cgaggcatg acaaacatcg taaatgccgc gtttcgtgtg ccgtggccgc 4740
 ccaggacgtg tcagcggcg caccacctgc accgaatcgg cagcagcgtc gcgcgtcgaa 4800
 aaagcgcaca ggcggcaaga agcgataagc tgcacgaata cctgaaaaat gttgaacgcc 4860
 ccgtgagcgg taactcacag ggcgtcggct aacccccagt ccaaacctgg gagaaagcgc 4920
 tcaaaaatga ctctagcggg ttacagagac attgacacac cggcctggaa attttccgct 4980
 gatctgttcg acaccatcc cgagctcgcg ctgcatcac gtggctggac gagcgaagac 5040
 cgccgcgaat tctcgtctca cctgggcaga gaaaatttcc agggcagcaa gaccgcgac 5100
 ttcgccagcg cttggatcaa agaccgggac acggagaaac acagccgaag ttataccgag 5160
 ttggttcaaa atcgcttgcc cggtgccagt atgttgctct gacgcacgcg cagcacgag 5220
 ccgtgcttgt cctggacatt gatgtgccga gccaccaggc cggcgggaaa atcgagcacg 5280
 taaacccga ggtctacgcg attttgagc gctgggcacg cctggaaaaa gcgccagctt 5340
 ggatcggcgt gaatccactg agcgggaaat gccagctcat ctggctcatt gatccggtgt 5400
 atgccgcagc aggcagcagc agcccgaata tgcgcctgct ggctgcaacg accgaggaaa 5460
 tgaccgcgct tttcggcgct gaccaggctt tttcacatag gctgagccgt ggccactgca 5520
 ctctccgacg atcccagccg taccgctggc atgccagca caatcgcgtg gatcgcctag 5580
 ctgatcttat ggaggttgct cgcagatct caggcacaga aaaacctaaa aaacgctatg 5640
 agcaggagtt ttctagcggg cgggcacgta tcgaagcggc aagaaaagcc actgcggaag 5700
 caaaagcact tgccacgctt gaagcaagcc tgccgagcgc cgctgaagcg tctggagagc 5760

ES 2 380 000 T3

tgatcgacgg cgctccgtgtc ctctggactg ctccagggcg tgccgcccgt gatgagacgg 5820
 cttttcgcca cgctttgact gtgggatacc agttaaagc ggctggtgag cgcctaaaag 5880
 acaccaaggg tcatcgagcc tacgagcgtg cctacaccgt cgctcaggcg gtcggaggag 5940
 gccgtgagcc tgatctgccg ccggactgtg accgccagac ggattggccg cgacgtgtgc 6000
 gcggtctacgt cgctaaaggc cagccagtcg tccctgctcg tcagacagag acgcagagcc 6060
 agccgagggc aaaagctctg gccactatgg gaagacgtgg cggtaaaaag gccgcagaac 6120
 gctggaaaga cccaaacagt gagtacgcc gagcacagcg agaaaaacta gctaagtcca 6180
 gtcaacgaca agctaggaaa gctaaaggaa atcgcttgac cattgcaggt tggtttatga 6240
 ctggtgaggg agagactggc tcgtggccga caatcaatga agctatgtct gaatttagcg 6300
 tgtcacgtca gaccgtgaat agagcactta aggtctgcgg gcattgaact tccacgagga 6360
 cgccgaaagc ttcccagtaa atgtgccatc tcgtaggcag aaaacggttc ccccgtaggg 6420
 tctctctctt ggcctccttt ctaggctcggg ctgattgctc ttgaagctct ctaggggggc 6480
 tcacaccata ggcagataac gttccccacc ggctcgcctc gtaagcgcac aaggactgct 6540
 cccaaagatc ttcaaagcca ctgccgcgac tgccttcgcg aagccttgcc ccgcgaaat 6600
 ttctccacc gagttcgtgc acaccctat gccaaagcttc tttcaccta aattcgagag 6660
 attggattct taccgtggaa attcttcgca aaaatcgccc cctgatcgcc cttgacgct 6720
 tggcgtcggg gccgctgggt gcgcttggct tgaccgactt gatcagcggc cgctcgattt 6780

<210> 61

<211> 35

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 61

gagagagaga cgctccag tggctgagac gcac 35

10 <210> 62

<211> 34

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 62

ctctctctgt cgacgaattc aatcttacgg cctg 34

<210> 63

<211> 4323

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

10 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: pCLiK5 MCS integrante SacB (también denominado pClS)

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (457)..(1248)

15 <223> KanR

<220>

<221> características_misceláneas

<222> (3840)..(4302)

<223> PsacB (complementario)

20 <220>

<221> características_misceláneas

<222> (2418)..(3839)

<223> SacB (complementario)

<220>

25 <221> características_misceláneas

<222> (1515)..(2375)

<223> Ori-Ec (pMB) (complementario)

<400> 63

ES 2 380 000 T3

tcgagaggcc	tgacgtcggg	cccggtagca	cgcgatcatat	gactagttcg	gacctagggg	60
tatcgtcgac	atcgatgctc	ttctgcgta	attaacaatt	gggatcctct	agacccggga	120
tttaaactgc	tagcgggctg	ctaaaggaag	cggaacacgt	agaaagccag	tccgcagaaa	180
cggtgctgac	cccggatgaa	tgtagctac	tgggctatct	ggacaagggg	aaacgcaagc	240
gcaaagagaa	agcaggtagc	ttgcagtggg	cttacctggc	gatagctaga	ctgggagggt	300
ttatggacag	caagcgaacc	ggaattgcca	gctggggcgc	cctctggtaa	ggttgggaag	360
ccctgcaaag	taaactggat	ggctttcttg	ccgccaagga	tctgatggcg	caggggatca	420
agatctgatc	aagagacagg	atgaggatcg	tttcgcatga	ttgaacaaga	tggattgcac	480
gcaggttctc	cggccgcttg	ggtggagagg	ctattcggct	atgactgggc	acaacagaca	540
atcggctgct	ctgatgccgc	cgtgttccgg	ctgtcagcgc	aggggcgccc	ggttcttttt	600

ES 2 380 000 T3

gtcaagaccg acctgtccgg tgcctgaat gaactgcagg acgaggcagc gcggctatcg 660
 tggctggcca cgacggggt tccttgcgca gctgtgctcg acgttgctac tgaagcggga 720
 agggactggc tgctattggg cgaagtgccg gggcaggatc tcctgtcatc tcaccttgc 780
 cctgccgaga aagtatccat catggctgat gcaatgcggc ggctgcatac gcttgatccg 840
 gctacctgcc cattcgacca ccaagcgaaa catcgcacg agcgagcacg tactcggatg 900
 gaagccggtc ttgtcgatca ggatgatctg gacgaagagc atcaggggct cgcgccagcc 960
 gaactgttcg ccaggctcaa ggcgcgcatg cccgacggcg aggatctcgt cgtgacccat 1020
 ggcgatgcct gcttgccgaa tatcatggtg gaaaatggcc gcttttctgg attcatcgac 1080
 tgtggccggc tgggtgtggc ggaccgctat caggacatag cgttggctac ccgtgatatt 1140
 gctgaagagc ttggcggcga atgggctgac cgcttctcgt tgctttacgg tatcggcgt 1200
 cccgattcgc agcgcacgc cttctatcgc cttcttgacg agttcttctg agcgggactc 1260
 tggggttcga aatgaccgac caagcgacgc ccaacctgcc atcacgagat ttcgattcca 1320
 ccgccgcctt ctatgaaagg ttgggcttcg gaatcgtttt ccgggacgcc ggctggatga 1380
 tcctccagcg cgggatctc atgctggagt tcttcgcca cgctagcggc gcgccggccg 1440
 gcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttc 1500
 gcttctcgc tcaactgact gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct 1560
 cactcaaagg cgtaatacgt gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg 1620
 tgagcaaaa gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcggtgct ggcgtttttc 1680
 cataggctcc gccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga 1740
 aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct 1800
 cctgttccga cctgcccgt taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaaagcgtg 1860
 gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg ttaggtcgt tcgctccaag 1920
 ctgggctgtg tgcacgaacc cccggtcag cccgaccgct gcgccttatc cgtaactat 1980
 cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac 2040
 aggattagca gagcgaggta ttaggctggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac 2100
 tacggctaca ctagaaggac agtatttggg atctgcgctc tgctgaagcc agttacctc 2160
 ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cgggtggttt 2220
 tttgttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc 2280
 ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg 2340
 agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaagg ccggccgcgg ccgccatcgg 2400
 cattttcttt tgcgttttta tttgttaact gttaattgtc cttgttcaag gatgctgtct 2460
 ttgacaacag atgtttctt gcctttgatg ttcagcagga agctcggcgc aaacgttgat 2520
 tgtttgtctg cgtagaatcc tctgtttgtc atatagcttg taatcacgac attgtttcct 2580
 ttcgcttgag gtacagcgaa gtgtgagtaa gtaaaggta catcgttagg atcaagatcc 2640
 atttttaaca caaggccagt tttgttcagc ggcttgtatg ggccagttaa agaattagaa 2700
 acataaccaa gcatgtaaat atcgttagac gtaatgccgt caatcgcat tttgatccg 2760
 cgggagtcag tgaacaggta ccatttggc ttcatthtaa agacgttcgc gcgttcaatt 2820
 tcatctgtta ctgtgttaga tgcaatcagc ggtttcatca ctttttcag tgtgtaatca 2880

ES 2 380 000 T3

tcgtttagct caatcatacc gagagcgccg tttgctaact cagccgtgcg tttttatcg	2940
ctttgcagaa gtttttgact ttcttgacgg aagaatgatg tgcttttgcc atagtatgct	3000
ttgttaaata aagattcttc gccttggtag ccatcttcag ttccagtgtt tgcttcaat	3060
actaagtatt tgtggccttt atcttctacg tagtgaggat ctctcagcgt atggttgtcg	3120
cctgagctgt agttgccttc atcgatgaac tgctgtacat tttgatacgt tttccgtca	3180
ccgtcaaaga ttgatttata atcctctaca ccgttgatgt tcaaagagct gtctgatgct	3240
gatacgtaa cttgtgcagt tgtcagtgtt tgtttgccgt aatgtttacc ggagaaatca	3300
gtgtagaata aacggatttt tccgtcagat gtaaatgtgg ctgaacctga ccattcttgt	3360
gtttggcttt ttaggataga atcatttgca tcgaatttgt cgctgtcttt aaagacgagg	3420
ccagcgtttt tccagctgtc aatagaagtt tcgccgactt tttgatagaa catgtaaadc	3480
gatgtgtcat ccgcattttt aggatctccg gctaatagcaa agacgatgtg gtagccgtga	3540
tagtttgca cagtgccgtc agcgttttgt aatggccagc tgtcccaaac gtccaggcct	3600
tttgcaag agatattttt aattgtggac gaatcaaatt cagaaacttg atatttttca	3660
ttttttgct gttcagggat ttgcagcata tcatggcgtg taatatggga aatgccgtat	3720
gtttccttat atggcttttg gttcgtttct ttcgcaaacg cttgagttgc gcctcctgcc	3780
agcagtgcgg tagtaaaggt taatactggt gcttgttttg caaactttt gatgttcatc	3840
gttcatgtct cttttttat gtactgtggt agcggctctg ttcttccagc cctcctgttt	3900
gaagatggca agttagttac gcacaataaa aaaagacctt aaatatgtaa ggggtgacgc	3960
caaagtatac actttgccct ttacacattt taggtcttgc ctgctttatc agtaacaaac	4020
ccgcgcgatt tacttttcga cctcattcta ttagactctc gtttgattg caactggctt	4080
attttctct tttgtttgat agaaaatcat aaaaggattt gcagactacg ggcctaaaga	4140
actaaaaaat ctatctgttt cttttcattc tctgtatttt ttatagtttc tgttgcatgg	4200
gcataaagtt gcctttttta tcacaattca gaaaatatca taatatctca tttactaaa	4260
taatagttaa cggcaggtat atgtgatggg ttaaaaagga tcggcggccg ctcgatttaa	4320
atc	4323

<210> 64

<211> 5860

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_miscláneas

- <222> (155)..(1420)
- <223> lysC
- <220>
- <221> características_miscláneas
- 5 <222> (3935)..(5356)
- <223> sacB (Bacillus subtilis)
- <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (5357)..(5819)
- 10 <223> Promotor sacB complemento
- <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (1974)..(2765)
- <223> kanR
- 15 <220>
- <221> características_miscláneas
- <222> (3032)..(3892)
- <223> Ori-EC complemento
- <220>
- 20 <221> características_miscláneas
- <222> (3913)..(3934)
- <223> sacB región corriente abajo (complemento)
- <400> 64

ES 2 380 000 T3

cccggtacca cgcgtcccag tggctgagac gcatccgcta aagccccagg aaccctgtgc 60
 agaaagaaaa cactcctctg gctaggtaga cacagtttat aaaggtagag ttgagcgggt 120
 aactgtcagc acgtagatcg aaaggtgcac aaaggtggcc ctggtcgtac agaaatatgg 180
 cggttcctcg cttgagagtg cggaacgcat tagaaacgtc gctgaacgga tcgttgccac 240
 caagaaggct ggaaatgatg tcgtggttgt ctgctccgca atgggagaca ccacggatga 300
 acttctagaa cttgcagcgg cagtgaatcc cgttccgcca gctcgtgaaa tggatatgct 360
 cctgactgct ggtgagcgtg tttctaacgc tctcgtcgcc atggctattg agtcccttg 420
 cgcagaagcc caatctttca cgggctctca ggctggtgtg ctcaccaccg agcggccacgg 480
 aaacgcacgc attggtgatg tcaactccagg tcgtgtgctg gaagcactcg atgagggcaa 540
 gatctgcatt gttgctgggt tccaggggtg taataaagaa acccgcgatg tcaccacggt 600
 gggtcgtggt ggttctgaca ccaactgcagt tgcgttggca gctgctttga acgctgatgt 660
 gtgtgagatt tactcggacg ttgacgggtg gtataccgct gacccgcgca tcgttcctaa 720
 tgcacagaag ctggaaaagc tcagcttcga agaaatgctg gaacttgctg ctgttggctc 780
 caagatthttg gtgctgcgca gtgttgaata cgctcgtgca ttcaatgtgc cacttcgcgt 840

ES 2 380 000 T3

acgctcgtct tatagtaatg atccccggcac tttgattgcc ggctctatgg aggatattcc 900
 tgtggaagaa gcagtcctta ccggtgtcgc aaccgacaag tccgaagcca aagtaaccgt 960
 tctgggtatt tccgataagc caggcgaggc tgcgaaggtt ttccgtgcgt tggctgatgc 1020
 agaatcaac attgacatgg ttctgcagaa cgtctcttct gtagaagacg gcaccaccga 1080
 catcaccttc acctgccctc gttccgacgg ccgccgcgcg atggagatct tgaagaagct 1140
 tcaggttcag ggcaactgga ccaatgtgct ttacgacgac caggtcggca aagtctcctt 1200
 cgtgggtgct ggcatgaagt ctacccaggc tgttaccgca gagttcatgg aagctctgcg 1260
 cgatgtcaac gtgaacatcg aattgatttc cacctctgag attcgtattt ccgtgctgat 1320
 ccgtgaagat gatctggatg ctgctgcacg tgcattgcat gagcagttcc agctgggcgg 1380
 cgaagacgaa gccgtcgttt atgcaggcac cggacgctaa agttttaag gagtagtttt 1440
 acaatgacca ccatcgcagt tgttggtgca accggccagg tcggccaggt tatgvcgacc 1500
 cttttggaag agcgaattht cccagctgac actgttcgtt tctttgcttc cccacgttcc 1560
 gcaggccgta agattgaatt cgctgacatc gatgctcttc tgcgttaatt aacaattggg 1620
 atcctctaga cccgggattt aaatcgctag cgggctgcta aaggaagcgg aacacgtaga 1680
 aagccagtcc gcagaaacgg tgctgacccc ggatgaatgt cagctactgg gctatctgga 1740
 caagggaaaa cgcaagcgca aagagaaagc aggtagcttg cagtgggctt acatggcgat 1800
 agctagactg ggccgtttta tggacagcaa gcgaaccgga attgccagct ggggcgcctt 1860
 ctggttaaggt tgggaagccc tgcaaagtaa actggatggc tttcttgccg ccaaggatct 1920
 gatggcgtag gggatcaaga tctgatcaag agacaggatg aggatcgttt cgcattgattg 1980
 aacaagatgg attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt ggagaggcta ttcggctatg 2040
 actgggcaca acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt gttccggctg tcagcgcagg 2100
 ggcgcccggg tctttttgtc aagaccgacc tgtccggtgc cctgaatgaa ctgcaggacg 2160
 aggcagcgcg gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc ttgvcgagct gtgctcgcg 2220
 ttgtcactga agcgggaagg gactggctgc tattgggcga agtgccgggg caggatctcc 2280
 tgtcatctca ccttgctcct gccgagaaag tatccatcat ggctgatgca atgcggcggc 2340
 tgcatacgtc tgatccggct acctgcccac tcgaccacca agcgaacat cgcattcgcg 2400
 gagcacgtac tcggatggaa gccggtcttg tcgattcagga tgattctggac gaagagcatt 2460
 aggggctcgc gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc gcgcatgccc gacggcgagg 2520
 atctcgtcgt gacctatggc gatgcctgct tgccgaatat catggtggaa aatggccgct 2580
 tttctggatt catcactgtg ggccggctgg gtgtggcgga ccgctatcag gacattcgtg 2640
 tggctaccgg tgatattgct gaagagcttg gcggcgaatg ggctgaccgc ttcctcgtgc 2700
 tttacggtat cgccgctccc gattcgcagc gcattcgcctt ctatcgcctt cttgacgagt 2760
 tcttctgagc gggactctgg ggttcgaaat gaccgaccaa gcgacgcccac acctgccatc 2820
 acgagatttc gattccaccg ccgccttcta tgaaaggctg ggcttcgga tcgttttccg 2880
 ggacgccggc tggatgatcc tccagcgcgg ggattctcatg ctggagttct tcgcccacgc 2940
 tagcggcgcg ccggccggcc cgggtgtgaaa taccgcacag atgcgtaagg agaaaatacc 3000
 gcatcaggcg ctcttccgct tctcgcctca ctgactcgcct gcgctcggct gttcggctgc 3060
 ggcgagcggg atcagctcac tcaaaggcgg taatacgggt atccacagaa tcaggggata 3120
 acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccc 3180

ES 2 380 000 T3

cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct 3240
 caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa 3300
 gtcacctcgt gcgctctcct gttccgacct tgccgcttac cggataacct tccgcctttc 3360
 tcccttcggg aagcgtyggc ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcgggtg 3420
 aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg 3480
 ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggttaag acacgactta tcgccactgg 3540
 cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggatgt aggcgggtgct acagagtctt 3600
 tgaagtgggt gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggatc tgcgctctgc 3660
 tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaacaccg 3720
 ctggtagcgg tggttttttt gtttgaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc 3780
 aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt 3840
 aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaaggccg 3900
 gccgcgccg ccatcggcat tttcttttgc gtttttattt gttaactggt aattgtcctt 3960
 gttcaaggat gctgtctttg acaacagatg ttttcttgcc tttgatgttc agcaggaagc 4020
 tcggcgcaaa cgttgattgt ttgtctcgt agaatcctct gtttgcata tagcttghaa 4080
 tcacgacatt gtttctttc gcttgaggta cagcgaagtg tgagtaagta aaggttacat 4140
 cgttaggatc aagatccatt tttaacacaa ggccagtttt gttcagcggc ttgatgggc 4200
 cagttaaaga attagaaaca taaccaagca tgtaaatac gttagacgta atgccgtaa 4260
 tcgtcatttt tgatccgcgg gagtcagtga acaggtacca tttgccgttc attttaaaga 4320
 cgttcgcgcg ttcaatttca tctgttactg tgtagatgc aatcagcggg ttcactactt 4380
 ttttcagtgt gtaatcatcg tttagctcaa tcataccgag agcggcgttt gctaactcag 4440
 ccgtgcgttt tttatcgctt tgcaagatt tttgactttc ttgacggaag aatgatgtgc 4500
 ttttgccata gtatgctttg ttaaataaag attcttcgcc ttggtagcca tcttcagttc 4560
 cagtgtttgc ttcaaatact aagtatttgt ggcctttatc ttctacgtag tgaggatctc 4620
 tcagcgtatg gttgtcgcct gagctgtagt tgccttcac gatgaactgc tgtacatttt 4680
 gatacgtttt tccgtcaccg tcaaagattg atttataatc ctctacaccg ttgatgttca 4740
 aagagctgtc tgatgctgat acgttaactt gtgcagttgt cagtgtttgt ttgccgtaat 4800
 gtttaccgga gaaatcagtg tagaataaac ggatttttcc gtcagatgta aatgtggctg 4860
 aacctgacca ttcttgtgtt tggcttttta ggatagaatc atttgcacg aatttgcgc 4920
 tgtctttaa gacgcggcca gcgtttttcc agctgtcaat agaagtttcg ccgacttttt 4980
 gatagaacat gtaaatcgat gtgtcatccg ctttttagg atctccggct aatgcaaaga 5040
 cgatgtggta gccgtgatag tttgcgacag tgccgtcagc gttttgtaat ggccagctgt 5100
 cccaaacgtc caggcctttt gcagaagaga tatttttaat tggggacgaa tcaaattcag 5160
 aaacttgata tttttcattt ttttctgtt cagggatttg cagcatatca tggcgtgtaa 5220
 tatgggaaat gccgtatggt tccttatatg gcttttggtt cgtttctttc gcaaacgctt 5280
 gagttgcgcc tcctgccagc agtgccgtag taaaggttaa tactgttgct tgttttgcaa 5340
 actttttgat gttcatcgtt catgtctcct tttttatgta ctgtgttagc ggtctgcttc 5400
 ttccagccct cctgtttgaa gatggcaagt tagttacgca caataaaaaa agacctaaaa 5460

ES 2 380 000 T3

tatgtaaggg gtgacgcaa agtatacact ttgcccttta cacattttag gtcttgcctg 5520
ctttatcagt aacaaacccg cgcgatttac ttttcgacct cattctatta gactctcgtt 5580
tggattgcaa ctgggtctatt ttcctctttt gtttgataga aatcataaa aggatttgca 5640
gactacgggc ctaaagaact aaaaaatcta tctgtttctt ttcattctct gtatttttta 5700
tagtttctgt tgcattgggca taaagttgcc tttttaatca caattcagaa aatatcataa 5760
tatctcattt cactaaataa tagtgaacgg caggtatatg tgatgggta aaaaggatcg 5820
gcggccgctc gatttaaadc tcgagaggcc tgacgtcggg 5860

<210> 65

<211> 38

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<400> 65

cggcaccacc gacatcatct tcacctgcc tcgttccg 38

10 <210> 66

<211> 38

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

15 <223> Cebador

<400> 66

cggaacgagg gcaggtgaag atgatgctgg tgggtccg 38

<210> 67

<211> 1263

20 <212> ADN

<213> Corynebacterium glutamicum

<220>

<221> características_misceláneas

<223> lysc gen

ES 2 380 000 T3

<400> 67

gtggccctgg tcgtacagaa atatggcggg tcctcgcttg agagtgcgga acgcattaga	60
aacgtcgctg aacggatcgt tgccaccaag aaggctggaa atgatgtcgt ggttgtctgc	120
tccgcaatgg gagacaccac ggatgaactt ctagaacttg cagcggcagt gaatcccgtt	180
ccgccagctc gtgaaatgga tatgctcctg actgctgggtg agcgtatttc taacgctctc	240
gtcgccatgg ctattgagtc ccttggcgca gaagcccaat ctttcacggg ctctcaggct	300
gggtgtgctca ccaccgagcg ccacggaaac gcacgcattg ttgatgtcac tccaggctcgt	360
gtgctggaag cactcgatga gggcaagatc tgcattggtg ctggtttcca ggggtgtaat	420
aaagaaacc gcgatgtcac cacgttgggt cgtggtgggt ctgacaccac tgcagttgcg	480
ttggcagctg ctttgaacgc tgatgtgtgt gagatttact cggacgttga cgggtgtgat	540
accgctgacc cgcgcatcgt tcctaatagca cagaagctgg aaaagctcag cttcgaagaa	600
atgctggaac ttgctgctgt tggctccaag attttgggtgc tgcgcagtgt tgaatacgct	660
cgtgcattca atgtgccact tcgctacgc tcgtcttata gtaatgatcc cggcactttg	720
attgccggct ctatggagga tattcctgtg gaagaagcag tccttaccgg tgtcgcaacc	780
gacaagtccg aagccaaagt aaccgttctg ggtatttccg ataagccagg cgaggctgcg	840
aaggttttcc gtgcttggc tgatgcagaa atcaacattg acatggttct gcagaacgtc	900
tcttctgtag aagacggcac caccgacatc accttcacct gccctcgttc cgacggccgc	960
cgcgcgatgg agatcttgaa gaagcttcag gttcagggca actggaccaa tgtgctttac	1020
gacgaccagg tcggcaaagt ctccctcgtg ggtgctggca tgaagtctca cccagggtgtt	1080
accgcagagt tcatggaagc tctgcgcat gtcaacgtga acatcgaatt gatttccacc	1140
tctgagattc gtatttccgt gctgatccgt gaagatgatc tggatgctgc tgcacgtgca	1200
ttgcatgagc agttccagct gggcggcgaa gacgaagccg tcgtttatgc aggcaccgga	1260
cgc	1263

<210> 68

5 <211> 5860

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

10 <220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: pCIS sysc thr311ile

<220>

- <221> características_miscláneas
<222> (155)..(1420)
<223> lysC
<220>
- 5 <221> características_miscláneas
<222> (3935)..(5356)
<223> sacB (Bacillus subtilis) complemento
<220>
<221> características_miscláneas
- 10 <222> (5357)..(5819)
<223> Promotor sacB complement
<220>
<221> características_miscláneas
<222> (1974)..(2765)
- 15 <223> kanR
<220>
<221> características_miscláneas
<222> (3032)..(3892)
<223> ori-EC complemento
- 20 <400> 68

ES 2 380 000 T3

cccggtagca	cgcgtagcag	tggctgagac	gcatccgcta	aagccccagg	aaccctgtgc	60
agaaagaaaa	cactcctctg	gctaggtaga	cacagtttat	aaaggtagag	ttgagcgggt	120
aactgtcagc	acgtagatcg	aaaggtgcac	aaaggtggcc	ctggctgtac	agaaatatgg	180
cggttcctcg	cttgagagtg	cggaacgcat	tagaaacgtc	gctgaacgga	tcgttgccac	240
caagaaggct	ggaaatgatg	tcgtggttgt	ctgctccgca	atgggagaca	ccacggatga	300
acttctagaa	cttgacagcg	cagtgaatcc	cgttccgcca	gctcgtgaaa	tggatatgct	360
cctgactgct	ggtgagcgtg	tttctaacgc	tctcgtcgcc	atggctattg	agtccttgg	420
cgcagaagcc	caatctttca	cggtctctca	ggctggtgtg	ctcaccaccg	agcggcacgg	480
aaacgcacgc	attggtgatg	tactccagg	tcgtgtgctg	gaagcactcg	atgagggcaa	540
gatctgcatt	gttgctgggt	tccaggggtg	taataaagaa	acccgcgatg	tcaccacggt	600
gggtcgtggt	ggttctgaca	ccactgcagt	tgcgttgcca	gctgctttga	acgctgatgt	660
gtgtgagatt	tactcggacg	ttgacgggtg	gtataccgct	gacccgcgca	tcgttcctaa	720
tgcacagaag	ctggaaaagc	tcagcttcga	agaaatgctg	gaacttgctg	ctgttggctc	780
caagattttg	gtgctgcgca	gtgttgaata	cgctcgtgca	ttcaatgtgc	cacttcgcgt	840
acgctcgtct	tatagtaatg	atcccggcac	tttgattgcc	ggctctatgg	aggatattcc	900
tgtggaagaa	gcagtcctta	ccggtgtcgc	aaccgacaag	tccgaagcca	aagtaaccgt	960
tctgggtatt	tccgataagc	cagggcaggg	tgcgaagggt	ttccgtgcgt	tggctgatgc	1020
agaaatcaac	attgacatgg	ttctgcagaa	cgctcttctt	gtagaagacg	gcaccaccga	1080
catcatcttc	acctgcctc	gttccgacgg	ccgccgcgcg	atggagatct	tgaagaagct	1140
tcaggttcag	ggcaactgga	ccaatgtgct	ttacgacgac	caggtcggca	aagtctcctt	1200
cgtgggtgct	ggcatgaagt	ctcaccacgg	tgttaccgca	gagttcatgg	aagctctgcg	1260
cgatgtcaac	gtgaacatcg	aattgatttc	cacctctgag	attcgtattt	ccgtgctgat	1320

ES 2 380 000 T3

ccgtgaagat gatctggatg ctgctgcacg tgcattgcat gagcagttcc agctggggcgg 1380
 cgaagacgaa gccgctgttt atgcaggcac cggacgctaa agttttaaag gagtagtttt 1440
 acaatgacca ccatcgcagt tgttggtgca accggccagg tcggccagggt tatgvcgacc 1500
 cttttggaag agcgcattt cccagctgac actgttcggt tctttgcttc cccaggttcc 1560
 gcaggccgta agattgaatt cgtcgacatc gatgctcttc tgcgtaatt aacaattggg 1620
 atcctctaga cccgggattt aaatcgctag cgggctgcta aaggaagcgg aacacgtaga 1680
 aagccagtcc gcagaaacgg tgctgacccc ggatgaatgt cagctactgg gctatctgga 1740
 caagggaaaa cgcaagcgca aagagaaagc aggtagcttg cagtgggctt acatggcgat 1800
 agctagactg ggcggtttta tggacagcaa gcgaaccgga attgccagct ggggcgcct 1860
 ctggaaggt tgggaagccc tgcaaagtaa actggatggc tttcttgccg ccaaggatct 1920
 gatggcgcag gggatcaaga tctgatcaag agacaggatg aggatcgttt cgcattgattg 1980
 aacaagatgg attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt ggagaggcta ttcggctatg 2040
 actgggcaca acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt gttccggctg tcagcgcagg 2100
 ggcgcccggg tctttttgtc aagaccgacc tgtccgggtc cctgaatgaa ctgcaggacg 2160
 aggcagcgcg gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc ttgvcgagct gtgctcgacg 2220
 ttgtcactga agcgggaagg gactggctgc tattgggcga agtgccgggg caggatctcc 2280
 tgtcatctca cttgctcct gccgagaaag tatccatcat ggctgatgca atgcggcggc 2340
 tgcatacgt tgatccggct acctgccat tcgaccacca agcgaacat cgcattcgagc 2400
 gagcacgtac tcggatggaa gccggtcttg tcgatcagga tgatctggac gaagagcatc 2460
 aggggctcgc gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc gcgcatgcc cagggcgagg 2520
 atctcgtcgt gacccatggc gatgcctgct tgccgaatat catggtggaa aatggccgct 2580
 tttctggatt catcgactgt ggccggctgg gtgtggcgga ccgctatcag gacatagcgt 2640
 tggctacccg tgatattgct gaagagcttg gcggcgaatg ggctgaccgc ttcctcgtgc 2700
 tttacggtat cgccgctccc gattcgcagc gcatcgcctt ctatcgcctt cttgacgagt 2760
 tcttctgagc gggactctgg ggttcgaaat gaccgaccaa gcgacgcca acctgccatc 2820
 acgagatttc gattccaccg ccgcttcta tgaaaggtg ggcttcgga tcgttttccg 2880
 ggacgccggc tggatgatcc tccagcgcgg ggatctcatg ctggagtct tcgcccacgc 2940
 tagcggcgcg ccggccggcc cggtgtgaaa taccgcacag atgcgtaagg aaaaaatacc 3000
 gcatcaggcg ctcttccgct tcctcgtca ctgactcgt gcgctcggtc gttcggctgc 3060
 ggcgagcggg atcagctcac tcaaaggcgg taatacgggt atccacagaa tcaggggata 3120
 acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg 3180
 cgttgctggc gtttttccat aggtccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgcagct 3240
 caagttagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa 3300
 gctccctcgt gcgctctcct gttccgacct tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc 3360
 tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata gctcagctg taggtatctc agttcgggtg 3420
 aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg 3480
 ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggtgaa acacgactta tcgccactgg 3540
 cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggatgt aggcgggtgct acagagttct 3600

ES 2 380 000 T3

tgaagtgggtg gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc 3660
 tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg 3720
 ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc 3780
 aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt 3840
 aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaaggccg 3900
 gccgcggccg ccatcggcat tttcttttgc gtttttattt gttaactgtt aattgctcct 3960
 gttcaaggat gctgtctttg acaacagatg ttttcttgcc tttgatgttc agcaggaagc 4020
 tcggcgcaaa cgttgattgt ttgtctgcgt agaatcctct gtttgtcata tagcttgtaa 4080
 tcacgacatt gtttcctttc gcttgaggtg cagcgaagtg tgagtaagta aaggttacat 4140
 cgtaggatac aagatccatt ttaacacaa ggccagtttt gttcagcggc ttgtatgggc 4200
 cagttaaaga attagaaaca taaccaagca tgtaaatac gtttagacgta atgccgtaaa 4260
 tcgtcatttt tgatccgagg gagtcagtga acaggtacca tttgccgttc attttaaaga 4320
 cgttcgcggg ttcaatttca tctgttactg tgtagatgc aatcagcggg ttcatacact 4380
 ttttcagtgt gtaatcatcg ttttagctcaa tcataccgag agcgcctgtt gctaactcag 4440
 ccgtgcgttt tttatcgctt tgcagaagtt tttgactttc ttgacggaag aatgatgtgc 4500
 ttttgccata gtagtctttg ttaaataaag attcttcgcc ttggtagcca tcttcagttc 4560
 cagtgtttgc ttcaataact aagtatttgt ggcctttatc ttctacgtag tgaggatctc 4620
 tcacgctatg gttgtcgcct gagctgtagt tgccttcac gatgaactgc tgtacatttt 4680
 gatacgtttt tccgtcaccg tcaaagattg atttataatc ctctacaccg ttgatgttca 4740
 aagagctgtc tgatgctgat acgttaactt gtgcagttgt cagtgtttgt ttgccgtaat 4800
 gtttaccgga gaaatcagtg tagaataaac ggatttttcc gtcagatgta aatgtggctg 4860
 aacctgacca ttctgtgtt tggcttttta ggatagaatc atttgcatcg aatttgtcgc 4920
 tgtctttaa gacgcggcca gcgtttttcc agctgtcaat agaagtttcg ccgacttttt 4980
 gatagaacat gtaaactgat gtgtcatccg ctttttagg atctccggct aatgcaaaga 5040
 cgatgtggta gccgtgatag tttgcgacag tgccgtcagc gttttgtaat ggccagctgt 5100
 cccaaacgtc caggcctttt gcagaagaga ttttttaat tgtggacgaa tcaaattcag 5160
 aaacttgata tttttcattt ttttgctgtt cagggatttg cagcatatca tggcgtgtaa 5220
 tatgggaaat gccgatgtt tccttatatg gcttttggtt cgtttcttc gcaaacgctt 5280
 gagttgcgcc tctgccagc agtgcgtag taaaggtaa tactgttgct tgttttgcaa 5340
 actttttgat gttcatcgtt catgtctcct tttttatgta ctgtgtagc ggtctgctc 5400
 ttccagccct cctgtttgaa gatggcaagt tagttacgca caataaaaa agacctaaa 5460
 tatgtaaggg gtgacgcaa agtatacact ttgcccttta cacatttag gtcttgctg 5520
 ctttatcagt acaaaacccg cgcgatttac ttttcgacct cattctatta gactctcgtt 5580
 tggattgcaa ctggtctatt ttcctctttt gtttgataga aatcataaa aggatttgca 5640
 gactacgggc ctaaagaact aaaaaatcta tctgtttctt ttcattctct gtatttttta 5700
 tagtttctgt tgcattggca taaagttgcc ttttaataca caattcagaa aatatcataa 5760
 tatctcattt cactaaataa tagtgaacgg caggtatatg tgatgggta aaaaggatcg 5820
 gcggccgctc gatttaaata tcgagagcc tgacgtcggg 5860

<210> 69
<211> 29
<212> ADN
<213> Secuencia Artificial
5 <220>
<223> Cebador
<220>
<221> características_miscláneas
<223> designación interna: Old38
10 <400> 69
acatccatgg tggccgttac cctgcgaat 29
<210> 70
<211> 20
<212> ADN
15 <213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Cebador
<220>
<221> características_miscláneas
20 <223> designación interna: Old 39
<400> 70
tgtatgcct cctggacttc 20
<210> 71
<211> 40
25 <212> ADN
<213> Secuencia Artificial
<220>
<223> Cebador
<220>
30 <221> características_miscláneas
<223> designación interna: old40

<400> 71

gaagtcagg aggacataca atgaccaaca tccgcgtagc 40

<210> 72

<211> 21

5 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

10 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: old 37

<400> 72

gaaaccacac tgttccttg c 21

<210> 73

15 <211> 31

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

20 <220>

<221> características_misceláneas

<223> designación interna: old 32

<400> 73

atcaacggt cgacaccaca tcatcaatca c 31

25 <210> 74

<211> 33

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

30 <223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: old33

<400> 74

atcaccatgg gttcttgtaa tctcctcaaaa ttg 33

5 <210> 75

<211> 6187

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

10 <223> Plásmido

<220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: pCIS Pefu ddh (pCLiK int sacB Pefu ddh)

<400> 75

ES 2 380 000 T3

tcgagctaaa	ttagacgtcg	cgtgcatca	gatcgtccaa	gttctctggg	gagagcaggt	60
atggagcaac	ttcgaggacg	gtgaaagctc	cgctttggcc	ctgctgcttc	atgcggtgag	120
ctgcgcgacc	gaaagcgatc	tgtgaggaag	cggtgaaatc	tgggtttcgg	tccagcttga	180
ggatgtattc	cacggtgtgg	ttgaagccac	cggtgtcgcc	ggtggtaatc	acgtggccac	240
cgtgtggcat	gccggtgtgc	tcggagtcga	aggttgcttc	gtcgatgaag	ttgacttcga	300
cttcgtagcc	aacgaagtaa	tcaggcatgg	tgcggatgtc	gttttcgatg	cgctcgtgat	360
cggccgcgtc	ggcaaccacg	aagcattggc	gcttgtgggt	ttgctttccg	gtaaggctgc	420
cggcttcgcc	gcggcgggccc	ttttccaggg	cgtcttcgga	tgggaggggtg	tactggactg	480
ccttttgaac	gccaggggatg	cgctcgaaag	catcggagtg	gccctgtgac	aaacctgggc	540
cccagaaggt	gtgctgctgg	tgctcggcta	agactgccgc	tgcgtagacg	cggttgatgg	600
agaacattcc	tggatcccag	ccggtagaga	ccagtgcaac	gttgccggct	gcggtggcgg	660
cttcgttcat	gacctggcgg	tggcgtggga	tgtcgcggtg	gttgtcgtag	gtgtctacgg	720
tgcaggcgaa	ctgcgcgaac	tttggctcct	gctcagggat	gtcgggtggcg	gagcccatgc	780
acaggaacag	cacgtccacg	tcgtcggcgt	gcttgtccac	gtcggcgaca	tcaaagactg	840
gcgtctttgt	gtcaggggtg	gcccggcgcg	agaagattcc	tacaaggctc	atgtcgggct	900
gcttggaat	aagcttttcg	acgctgcgtc	ccaggtttcc	gtagcccacg	atagctacgc	960
ggatgttggt	cattgtatgt	cctcctggac	ttcgtgggtg	ctacgacttt	cgcagccacg	1020
aattggtttt	gctttcactg	tgataagcag	cctggaagac	tgagcacaca	gatctagcgc	1080
attacaaaat	gtgccagtta	ctgaatccta	agggcaacgg	cgttgatttt	caaactacca	1140
gctaccctgt	ggacattcgc	agggtaacgg	ccaccatggg	ttcttgtaat	cctccaaaat	1200
tgtggtggca	ctgtcctggt	cgagcttacc	gagatgcata	cttagatgat	gattcagggga	1260
catctctttc	atcaggaccg	aaagcgaacg	tttcgtattg	ttgagccttt	tggttccacc	1320
acggatgcgc	tgatctatct	tcatggctcc	cagcagtcag	gatctgtggg	gcgagcttc	1380
accaacagga	cttttgatcc	gttgccgttc	atggtgggtt	atccggatgg	ggtggatcag	1440
cattggaatg	atgcgcggtt	gggtttggat	gaaaataccc	gccatttagg	cattgatgat	1500
gtggggttct	ttgtaaaact	cgccacgcac	ttgggcaaca	cgtatggcat	caagaggatc	1560

ES 2 380 000 T3

tttattgttg gctattccaa cgggtgggcag atgggtgttg ggctcatgca tgaggttccc 1620
 aagatgctca gtggcgctgc aaccattgca tccaacatgc cagttgcaga gaatacgctg 1680
 ccgcaggtga aaaccttcaa gacacatccg gtgccttatt tggcgatggc tggaactgcc 1740
 gataactttt caccgatga ggggtggcgat gccggattg gtcgcgaaca ccgccgtggc 1800
 gtgggcatgt ccgccttga ttcagctgcc tatattgccg cccgaaacgg actgaccgaa 1860
 caccgccacg acgtgattga tgatgtggtg tgcagcgtc atatgactag ttcggaccta 1920
 gggatatcgt cgacatcgat gctcttctgc gttaattaac aattgggatc ctctagacct 1980
 gggatttaaa tcgctagcgg gctgctaaag gaagcggaac acgtagaaag ccagtcggca 2040
 gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa gggaaaacgc 2100
 aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgtag tgggcttaca tggcgatagc tagactgggc 2160
 ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg gtaagggttg 2220
 gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt cttgccgcca aggatctgat ggcgcagggg 2280
 atcaagatct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac aagatggatt 2340
 gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact gggcacaaca 2400
 gacaatcggc tgctctgat ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc gcccggttct 2460
 ttttgcaag accgacctgt ccgggtgcct gaatgaaact caggacgagg cagcgcggct 2520
 atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg tcaactgaagc 2580
 ggggaaggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt catctcacct 2640
 tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc atacgcttga 2700
 tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag cacgtactcg 2760
 gatggaagcc ggtcttctgc atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg ggctcgcgcc 2820
 agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgcg catgcccgcg ggcgaggatc tcgtcgtgac 2880
 ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaat ggcgctttt ctggattcat 2940
 cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg ctaccctgga 3000
 tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgctc ctcgtgcttt acggtatcgc 3060
 cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct tctgagcggg 3120
 actctggggt tcgaaatgac cgaccaagcg acgccaacc tgccatcacg agatttcgat 3180
 tccaccgccg ctttctatga aagggtgggc ttcggaatcg ttttccggga cgccggctgg 3240
 atgatcctcc agcgcgggga tctcatgctg gagttctctg cccacgctag cggcgcgccg 3300
 gccggcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc 3360
 ttccgcttcc tcgctcactg actcgtctgc ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggatc 3420
 agctcactca aaggcggtaa tacggttata cacagaatca ggggataacg caggaaagaa 3480
 catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcggt 3540
 tttccatagg ctccgcccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagagggtg 3600
 gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg 3660
 ctctcctgtt ccgacctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag 3720
 cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc 3780
 caagctgggc tgtgtgcacg aacccccgt tcagcccgcg cgctgcgcct tatccggtaa 3840
 ctatcgtctt gagtccaacc cggtaaagaca cgacttatcg ccaactggcag cagccactgg 3900

ES 2 380 000 T3

taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtgggtggcc 3960
 taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggatctctgc gctctgctga agccagttac 4020
 cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaaaa accaccgctg gtagcgggtg 4080
 tttttttggt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt 4140
 gatcttttct acggggctctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt 4200
 catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aaggccggcc gcggccgcca 4260
 tcggcatttt cttttgcggt tttatttggt aactgttaat tgccttggt caaggatgct 4320
 gtctttgaca acagatgttt tcttgcttt gatgttcagc aggaagctcg gcgcaaactg 4380
 tgattgtttg tctgcgtaga atcctctggt tgtcatatag cttgtaatca cgacattggt 4440
 tcctttcgcg tgaggtagag cgaagtgtga gtaagtaaag gttacatcgt taggatcaag 4500
 atccattttt aacacaaggc cagttttggt cagcggcttg tatgggccag ttaaagaatt 4560
 agaaacataa ccaagcatgt aatatcgtt agacgtaatg ccgtaaatcg tcatttttga 4620
 tccgcgggag tcagtgaaca ggtaccattt gccgttcatt ttaaagacgt tcgcgcggtc 4680
 aatttcatct gttactgtgt tagatgcaat cagcggtttc atcacttttt tcagtgtgta 4740
 atcatcgttt agctcaatca taccgagagc gccgtttgct aactcagccg tgcgtttttt 4800
 atcgctttgc agaagttttt gactttcttg acggaagaat gatgtgcttt tgccatagta 4860
 tgctttgtta aataaagatt cttcgccttg gtagccatct tcagttccag tgtttgcttc 4920
 aaatactaag tatttgtggc ctttatcttc tacgtagtga ggatctctca gcgtatgggt 4980
 gtcgcctgag ctgtagttgc cttcatcgat gaactgctgt acattttgat acgtttttcc 5040
 gtcaccgtca aagattgatt tataatcctc tacaccgttg atgttcaaag agctgtctga 5100
 tgctgatacg ttaacttggt cagttgtcag tgtttgtttg ccgtaatggt taccggagaa 5160
 atcagtgtag aataaacgga tttttccgctc agatgtaaag gtggctgaac ctgaccattc 5220
 ttgtgtttgg tcttttagga tagaatcatt tgcacgaat ttgtcgctgt ctttaaagac 5280
 gcggccagcg tttttccagc tgtcaataga agtttcgccg actttttgat agaacatgta 5340
 aatcgatgtg tcatccgcat ttttaggac tccggctaata gcaaagacga tgtggtagcc 5400
 gtgatagttt gcgacagtgc cgtcagcgtt ttgtaatggc cagctgtccc aaacgtccag 5460
 gccttttgca gaagagatat ttttaattgt ggacgaatca aattcagaaa cttgatattt 5520
 ttcatttttt tgctgttcag ggatttgag catatcatgg cgtgtaatat gggaaatgcc 5580
 gtatgtttcc ttatatggct tttggttcgt ttctttcgca aacgcttgag ttgcgcctcc 5640
 tgccagcagt gcggtagtaa aggttaatac tgttgcttgt tttgcaaact tttgatggt 5700
 catcgttcat gtctcctttt ttatgtactg tgttagcggg ctgcttcttc cagccctcct 5760
 gtttgaagat ggcaagttag ttacgcacaa taaaaaaga cctaaaatat gtaaggggtg 5820
 acgcaaaagt atacactttg ccctttacac attttaggtc ttgcctgctt tatcagtaac 5880
 aaaccgcgc gatttacttt tcgacctcat tctattagac tctcgtttgg attgcaactg 5940
 gtctattttc ctcttttggt tgatagaaaa tcataaaagg atttgcagac tacgggccta 6000
 aagaactaaa aaatctatct gtttctttc attctctgta tttttatag tttctgttgc 6060
 atgggcataa agttgccttt ttaatcacia ttcagaaaat atcataatat ctcatttcac 6120
 taaataatag tgaacggcag gtatatgtga tgggttaaaa aggatcggcg gccgctcgat 6180

ttaaadc

6187

<210> 76

<211> 29

<212> ADN

5 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_misceláneas

10 <223> designación interna: CK461

<400> 76

cctgacgtcg caatataggc agctgaatc 29

<210> 77

<211> 29

15 <212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

20 <221> características_misceláneas

<223> designación interna: CK466

<400> 77

gccaattgg ttcttgaat cctcaaaa 29

<210> 78

25 <211> 26

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

30 <220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: CK426

<400> 78

cgccaattgt cgaggccgt tacct 26

5 <210> 79

<211> 40

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

<220>

10 <223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: Eck463

<400> 79

15 gctacgcgga tgttggtcat gggtaaaaa tccttcgta 40

<210> 80

<211> 40

<212> ADN

<213> Secuencia Artificial

20 <220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: CK464

25 <400> 80

tacgaaagga tttttaccc atgaccaaca tccgcgtagc 40

<210> 81

<211> 29

<212> ADN

30 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Cebador

<220>

<221> características_miscláneas

<223> designación interna: CK467

5 <400> 81

agacccgggt tagacgtcgc gtgcgatca 29

<210> 82

<211> 6233

<212> ADN

10 <213> Secuencia Artificial

<220>

<223> Plásmido

<220>

<221> características_miscláneas

15 <223> designación interna: pCIS PefuPsod ddh = pcliK int sacB PefuPs od ddh

<400> 82

ES 2 380 000 T3

gggatttaaa tcgctagcgg gctgctaaag gaagcggaac acgtagaaag ccagtccgca 60
 gaaacgggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa gggaaaacgc 120
 aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgacg tgggcttaca tggcgatagc tagactgggc 180
 ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg gtaaggttgg 240
 gaagccctgc aaagtaaact ggatggcctt cttgccgcca aggatctgat ggcgcagggg 300
 atcaagatct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac aagatggatt 360
 gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact gggcacaaca 420
 gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc gcccggttct 480
 ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caggacgagg cagcgcggct 540
 atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg tcaactgaagc 600
 ggggaaggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt catctcacct 660
 tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc atacgcttga 720
 tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag cacgtactcg 780
 gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg ggctcgcgcc 840
 agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgcg catgcccgac ggcgaggatc tcgtcgtgac 900
 ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt ctggattcat 960
 cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg ctaccctgga 1020

 tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt acggtatcgc 1080
 cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct tctgagcggg 1140
 actctggggt tcgaaatgac cgaccaagcg acgcccacc tgccatcacg agatttcgat 1200
 tccaccgccg cttctatga aaggttgggc ttcggaatcg ttttccggga cggcggctgg 1260
 atgatcctcc agcgcgggga tctcatgctg gagttcttcg cccacgctag cggcgcgccg 1320
 gccggcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataaccgca tcaggcgctc 1380
 ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggctcgtt cggctgcggc gagcggtatc 1440

ES 2 380 000 T3

agctcactca	aaggcggtaa	tacggttatc	cacagaatca	ggggataacg	caggaaagaa	1500
catgtgagca	aaaggccagc	aaaaggccag	gaaccgtaaa	aaggccgcgt	tgctggcggt	1560
tttccatagg	ctccgcccc	ctgacgagca	tcacaaaaat	cgacgctcaa	gtcagagggtg	1620
gcgaaacccg	acaggactat	aaagatacca	ggcgtttccc	cctggaagct	ccctcgtagc	1680
ctctcctggt	ccgaccctgc	cgcttaccgg	atacctgtcc	gcctttctcc	cttcgggaag	1740
cgtggcgctt	tctcatagct	cacgctgtag	gtatctcagt	tcggtgtagg	tcgttcgctc	1800
caagctgggc	tgtgtgcacg	aacccccgt	tcagccccgac	cgctgcgctt	tatccggtaa	1860
ctatcgtctt	gagtccaacc	cggtaagaca	cgacttatcg	ccactggcag	cagccactgg	1920
taacaggatt	agcagagcga	ggtatgtagg	cggtgctaca	gagttcttga	agtgggtggc	1980
taactacggc	tacactagaa	ggacagtatt	tggtatctgc	gctctgctga	agccagttac	2040
cttcggaaaa	agagttggta	gctcttgatc	cggcaaacia	accaccgctg	gtagcgggtg	2100
tttttttgtt	tgcaagcagc	agattacgag	cagaaaaaaaa	ggatctcaag	aagatccttt	2160
gatcttttct	acggggtctg	acgctcagtg	gaacgaaaac	tcacgttaag	ggattttggt	2220
catgagatta	tcaaaaagga	tcttcaccta	gatcctttta	aaggccggcc	gcggccgcca	2280
tcggcatttt	cttttgcggt	tttatttggt	aactgttaat	tgtccttggt	caaggatgct	2340
gtctttgaca	acagatgttt	tcttgccctt	gatgttcagc	aggaagctcg	gcgcaaactg	2400
tgattgtttg	tctgtagtag	atcctctggt	tgtcatatag	cttgtaatca	cgacattggt	2460
tcctttcgct	tgaggtacag	cgaagtgtga	gtaagtaaag	gttacatcgt	taggatcaag	2520
atccattttt	aacacaaggc	cagttttggt	cagcggcttg	tatgggccag	ttaaagaatt	2580
agaaacataa	ccaagcatgt	aaatatcggt	agacgtaatg	ccgtcaatcg	tcatttttga	2640
tccgcgggag	tcagtgaaca	ggtaccattt	gccgttcatt	ttaaagacgt	tcgtagcttc	2700
aatttcatct	gttactgtgt	tagatgcaat	cagcggtttc	atcacttttt	tcagtgtgta	2760
atcatcgttt	agctcaatca	taccgagagc	gccgtttgct	aactcagccg	tcggtttttt	2820
atcgctttgc	agaagttttt	gactttcttg	acggaagaat	gatgtgcttt	tgccatagta	2880
tgctttgtta	aataaagatt	cttcgccttg	gtagccatct	tcagttccag	tgtttgcttc	2940
aaatactaag	tatttgtggc	ctttatcttc	tacgtagtga	ggatctctca	gcgatagggt	3000
gtcgcctgag	ctgtagttgc	cttcatcgat	gaactgctgt	acattttgat	acgtttttcc	3060
gtcaccgtca	aagattgatt	tataatcctc	tacaccgttg	atgttcaaag	agctgtctga	3120
tgctgatacg	ttaacttggt	cagttgtcag	tgtttgttg	ccgtaatggt	taccggagaa	3180
atcagtgtag	aataaacgga	ttttccgctc	agatgtaaat	gtggctgaac	ctgaccattc	3240
ttgtgtttgg	tcttttagga	tagaatcatt	tgcatcgaat	ttgtcgctgt	ctttaaagac	3300
gcgccagcgc	ttttccagc	tgtcaataga	agtttcgccg	actttttgat	agaacatgta	3360
aatcgatgtg	tcacccgat	ttttaggac	tccggctaata	gcaaagacga	tgtggtagcc	3420
gtgatagttt	gcgacagtgc	cgctcagcgt	ttgtaatggc	cagctgtccc	aaacgtccag	3480
gccttttgca	gaagagatat	ttttaattgt	ggacgaatca	aattcagaaa	cttgatattt	3540
ttcatttttt	tgctgttcag	ggatttgcag	catatcatgg	cggtgtaatat	gggaaatgcc	3600
gtatgtttcc	ttatatggct	tttggttcgt	ttctttcgca	aacgcttgag	ttgtagctcc	3660
tgccagcagc	gcggtagtaa	aggtaataac	tgttgcttgt	tttgcaact	ttttgatggt	3720

ES 2 380 000 T3

catcgttcat gtctcctttt ttatgtactg tgtagcggc ctgcttcttc cagccctcct 3780
 gtttgaagat ggcaagttag ttacgcacaa taaaaaaga cctaaaatat gtaaggggtg 3840
 acgccaaagt atacactttg ccctttacac attttaggtc ttgcctgctt tatcagtaac 3900
 aaaccgcgc gatttacttt tcgacctcat tctattagac tctcgtttg attgcaactg 3960
 gtctattttc ctcttttggt tgatagaaaa tcataaaagg atttgcagac tacgggcta 4020
 aagaactaaa aaatctatct gtttcttttc atttctgta tttttatag tttctggtg 4080
 atgggcataa agttgccttt ttaatcacia ttcagaaaat atcataatat ctcatctcac 4140
 taaataatag tgaacggcag gtatatgtga tgggttaaaa aggatcggcg gccgctcgat 4200
 ttaaactctg agaggcctga cgtcgaata taggcagctg aatcaaaggc ggacatgcc 4260
 acgccacggc ggtgttcgag accaataaccg gcatcgccac cctcatcagg tgaaaagta 4320
 tcggcagttc cagccatcgc caaataaggc accggatgtg tcttgaagg tttcacctgc 4380
 ggcagcgtat tctctgcaac tggcatgtg gatgcaatg ttgcagcgc actgagcatc 4440
 ttgggaacct catgcatgag ccgcaacacc atctgccac cgttgaata gccaacaata 4500
 aagatctct tgatgcata cgtgttgccc aagtgcgtg cgagttttac aaagaacccc 4560
 acatcatcaa tgcctaaatg gcgggtattt tcatcacaac ccaaccgcgc atcattcaa 4620
 tgctgatcca cccatccgg ataaaccacc atgaacggca acggatcaaa agtcctgtg 4680
 gtgaagctgc gccccacaga tcctgactgc tgggagccat gaaaatagat cagcgcattc 4740
 gtggtggaac caaaaggctc aacaatacga aacgttcgct ttcggtcctg atgaaagaga 4800
 tgtccctgaa tcatcatcta agtatgcatc tcggtaagct cgaccaggac agtgccacca 4860

 caatthtga ggattacaag aaccaattgt cgagggccgt taccctgcga atgtccacag 4920
 ggtagctggt agtttgaana tcaacgccgt tgcccttagg attcagtaac tggcacattt 4980
 tgtaatgag tagatctgtg tgctcagtct tccaggctgc ttatcacagt gaaagcaaaa 5040
 ccaattcgtg gctgcgaaag tcgtagccac actagtagct gccaattatt ccgggcttgt 5100
 gaccgcctac ccgataaata ggtcggctga aaaatttctg tgcaatatca acaaaaaggc 5160
 ctatcattgg gaggtgtcgc accaagtact tttgcaagc gccatctgac ggattttcaa 5220
 aagatgtata tgctcgggtc ggaacactac gaaaggattt tttaccatg accaacatcc 5280
 gcgtagctat cgtgggtac ggaacactg gacgcagcgt cgaaaagctt attgccaagc 5340
 agccgacat ggacctgta ggaatcttct cgcgccggc caccctgac acaaagacgc 5400
 cagtctttga tctcggcgc gtggacaagc acgccgacga cgtggacgtg ctgttctgt 5460
 gcatgggctc cgccaccgac atccctgagc aggcacaaa gttcgcgag ttcgctgca 5520
 ccgtagacac ctacgacaac caccgcgaca tcccacgcca ccgccaggtc atgaacgaag 5580
 ccgccaccgc agccggaac gttgactgg tcttaccgg ctgggatcca ggaatgttct 5640
 ccatcaaccg cgtctacgca gcggcagtct tagccgagca ccagcagcac accttctggg 5700
 gccagggtt gtcacagggc cactccgatg ctttgcgag catccctggc gttcaaaagg 5760
 cagtccagta caccctcca tccgaagacg ccctggaaaa ggcccgcgc ggcgaagccg 5820
 gcgaccttac cgaaagcaa accacaagc gccaatgctt cgtggttgcc gacgcggccg 5880
 atcacgagc catcgaaaac gacatccgca ccatgcctga ttacttcggt ggctacgaag 5940
 tcgaagtcaa cttcatcgac gaagcaacct tcgactccga gcacaccggc atgccacag 6000

gtggccacgt gattaccacc ggcgacaccg gtggcttcaa ccacaccgtg gaatacatcc 6060
 tcaagctgga ccgaaacca gatttcaccg cttcctcaca gatcgctttc ggtcgcgag 6120
 ctcaccgcat gaagcagcag ggccaaagcg gagctttcac cgtcctcgaa gttgctccat 6180
 acctgctctc cccagagaac ttggacgac tgatgcgacg cgacgtctaa ccc 6233

<210> 83

<211> 7

<212> ADN

5 <213> Corynebacterium glutamicum

<220>

<221> características_miscláneas

<223> secuencia de enlazamiento de ribosoma

<400> 83

10 aggagga

<210> 84

<211> 1365

<212> ADN

<213> corynebacterium glutamicum

15 <220>

<221> características_miscláneas

<223> RAX077

<400> 84

ES 2 380 000 T3

atgaatgatg agaatattca aagctccaac tatkagccat tcccgagttt tgacgattgg	60
aaacagatcg aggtgtcgct cttagatgtc atcgaatcct cacgccattt ttctgatttg	120
aaagatagca ctgatcgttc tgcgttagat gctgcgctag agagagcaaa aagagctgcc	180
gcagttgata ccaatgccat agaaggaatc ttccaaaactg atcgcgggtt tacccataca	240
gttgcaacgc aggtaggggc ttgggagcaa caaatggcga tgaaaggcaa acatgttaag	300
cctgcgtttg acgatactct agaaggcttt gagtatgttc tcgatgcagt aactggtaga	360
actccaatct ctcagcaatg gattagaaat ttgcacgccg tcattctgcy gagccaagaa	420
agccacgagg tttttacagc cgttggagtc caaaatcagg cgcttcagaa aggcgagtat	480
aaaactcagc caaatagtcc acagcgctca gatggatctg tacatgcata cgccccagtt	540
gaagatactc ctgctgaaat ggctagattt atttcagaac ttgaatctaa ggaattctta	600
gcagccgaga aggttattca agctgcctat gccactatg ctttcgatg tattcatcct	660
tttgagatg ggaatggacg agttgcacga gccttggtta gtgtttttct atacaaagat	720
cctggtgtcc ctctcgtaat ctaccaagat caacgcagag attacatcca tgctctagaa	780
gcagcggaca agaataacc gctcctgctg attagattct ttgctgaacg agtgaccgat	840
actattaact ctattatcgt tgatctcact accccgatcg cgggtaaate tggttcggct	900
aagctttcgg atgctgctac cccactcgc gtattaccag aattacatga tgctgcacat	960
aggctccaag aaagtttatt tacagaaatc cgatctcgat tggatgaaga aggaaaaagg	1020
aatgggttgg agtttctact tcaacggatt tttatcggtt cccattcaa tctgccagag	1080
ggctataacg ctttccctga tagctattgt ctgaccttag ctttcaatag caactctcca	1140
aaacaaatct tccaccgct atccatagta atagcagctc gagatgggaa aagagcgagc	1200
agcgacctcg tggcagctac ttctattgga tacaactttc acgcttacgg acgtgaagtc	1260
gagcctgttg ttactgaaag ctttcgagaa cgtgtgaaaa tttacgccga cgggattgta	1320
gatcacttct taaccgaact ggctaaaaag tttcaacaga attaa	1365

REIVINDICACIONES

1. Bacteria corineforme genéticamente modificada, transformada con al menos un vector que contiene al menos un casete de expresión, en cuyo caso el casete de expresión comprende en dirección 5' -3' un módulo de secuencia de la siguiente fórmula general II:

Donde

n representa un valor de número entero de 0 a 10,

A_x y A_y son iguales o diferentes y representan un enlace químico o una secuencia de ácido nucleico enlazante;

10 P₁, P_x y P_y codifican secuencias de promotores iguales o diferentes derivadas de bacterias corineformes iguales o diferentes, que comprenden al menos un segmento que enlaza polimerasa de ARN;

y al menos P_y comprende un segmento de secuencia terminal 3' que facilita el enlace ribosómico,

G representa al menos una secuencia de ácido nucleico codificante que está enlazada funcionalmente con la secuencia regulatoria ubicada corriente arriba de 5'.

15 2. Bacteria corineforme genéticamente modificada según la reivindicación 1, en cuyo caso las bacterias corineformes son bacterias del género corynebacterium o brevibacterium.

3. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 o 2, que contiene al menos un casete de expresión en forma integrada.

4. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 3, en cuyo caso P₁, P_x y P_y presentan una identidad hacia la secuencia de partida de al menos 80% o son secuencias de promotores artificiales.

20 5. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 4, en cuyo caso P₁, P_x y P_y se derivan respectivamente de una secuencia continua de 35 a 500 residuos de nucleótido, la cual se encuentra en el genoma del organismos corriente arriba de 5' de la secuencia que codifica una proteína y presenta una identidad de al menos 80% con la secuencia de partida.

25 6. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 5, en cuyo caso P₁, P_x y P_y se seleccionan independientemente entre sí entre las secuencias de promotores para la secuencia codificante de una proteína con alta abundancia en un organismo.

7. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 6, en cuyo caso P₁, P_x y P_y independientemente entre sí se selecciona entre SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3 y SEQ ID NO:4.

30 8. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 7, en cuyo caso los promotores se seleccionan entre promotores fuertes, constitutivos o regulables.

9. Bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1-8, en cuyo caso G se selecciona entre

a. ácidos nucleicos que codifican una proteína de la vía biosintética aminoácidos proteinogénicos y no proteinogénicos,

35 b. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de nucleótidos y nucleósidos,

c. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de ácidos orgánicos,

d. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de lípidos y ácidos grasos,

e. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de dioles,

f. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de carbohidratos,

g. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de compuestos aromáticos,

h. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de vitaminas,

i. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de cofactores y

j. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir de la vía de biosíntesis de enzimas.

5 k. ácidos nucleicos que codifican una proteína a partir del metabolismo central.

10. Bacteria corineforme genéticamente modificada, según la reivindicación 9a) en cuyo caso los ácidos nucleicos que codifican proteínas de la vía biosintética, seleccionadas entre cinasa de aspartato, aspartato-semialdehído-deshidrogenasa, diaminopimelato-deshidrogenasa, diaminopimelato-descarboxilasa, dihidrodipicolinato-sintetasa, dihidrodipicolinatos-reductasa, gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa, 3-fosfoglicerato-cinasa, piruvato-carboxilasa, triosafofato-isomerasa, regulador transcripcional LuxR, regulador transcripcional LysR1, regulador transcripcional LysR2, malato-quinona-oxidoreductasa, glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, 6-fosfogluconato deshidrogenasa, transcetolasa, transaldolasa, homoserina-O-acetiltransferasa, cistahionina-gamma-sintasa, cistahionina-beta-liasa, serina-hidroximetiltransferasa, O-acetilhomoserina-sulfhidrilasa, metilen-tetrahidrofolato-reductasa, fosfoserina-aminotransferasa, fosfoserina-fosfatasa, serina-acetil-transferasa, homoserina-deshidrogenasa, homoserina-cinasa, treonina-sintasa, exportador-portador de treonina, treonina-deshidratasa, piruvato-oxidasa, exportador de lisina, biotina-ligasa, cisteína-sintasa I, cisteína-sintasa II, metionina – sintasa dependiente de coenzima B12, actividad de metionina-sintasa independiente de coenzima B12, sulfatadeniltransferasa subunidad 1 y 2, fosfoadenosina fosfosulfato reductasa, ferredoxina-sulfito-reductasa, ferredoxina NADP reductasa, 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, regulador RXA00655, regulador RXN2910-R, arginil-ARN-t-sintetasa, fosfoenolpiruvato-carboxilasa, proteína treonina Efflux, serinahidroximetiltransferasa, fructosa-1,6-afosfatasa, proteína de la reducción de sulfato RXA077, proteína de la reducción de sulfato RXA248, proteína de la reducción de sulfato RXA247, proteína OpcA, 1-fosfofructocinasa, 6-fosfofructocinasa, tetrahidropicolinato-succinilasa, succinilo-aminocetopimelato-aminotransferasa, succinil-diaminopimelato-desuccinilasa, diaminopimelato-epimerasa, 6-fosfogluconato-deshidrogenasa, glucosafosfato-isomerasa, fosfoglicerato-mutasa, enolasa, piruvato-cinasa, aspartato-transaminasa, y malato-enzima.

11. Método para producir un producto biosintético, en cuyo caso se cultiva una bacteria corineforme genéticamente modificada según una de las reivindicaciones 1 a 10 y se aísla del cultivo el producto deseado.

12. Método según la reivindicación 11, en cuyo caso el producto biosintético se selecciona entre ácidos orgánicos, proteínas, nucleótidos y nucleósidos, aminoácidos tanto proteinogénicos como también no proteinogénicos, lípidos y ácidos grasos, dioles, carbohidratos, compuestos aromáticos, vitaminas y cofactores, enzimas y proteínas.

Figura 1

A) pEFTu

>EFTU\rxa01284\
 ggccggttacccctgcgaatgtccacagggtagctggtagtttgaaaatcaacgccgttgccctaggattca
 gtaactggcacatTTTTgtaatggcctagatctgtgtgctcagtcttcaggctgcttatcacagtgaaagc
 aaaaccaattcgtggctgcgaaagtcgtagccaccacgaagtcctcaggagcatata

ggccggttacccctgcgaatgtccacagggtagctggtagtttgaaaatcaacgccgttgccctaggattca
 gtaactggcacatTTTTgtaatggcctagatctgtgtgctcagtcttcaggctgcttatcacagtgaaagc
 aaaaccaattcgtggctgcgaaagtcgtagccac**CACGAAGTCC**

B) pGRO

>groES\rxa00497\
 cggcttaaagtttggtgcatgtgaatTTTTtagcaccctcaacagttgagtgctggcactctcggggg
 tagagtgccaaataggttgTTTTgacacacagttgTTcaccgcgacgacggctgtgctggaaaccacaa
 ccggcacacacaaaatTTTTctcatTTTCTCAT

cggcttaaagtttggtgcatgtgaatTTTTtagcaccctcaacagttgagtgctggcactctcggggg
 tagagtgccaaataggttgTTTTgacacacagttgTTcaccgcgacgacggctgtgctggaaaccacaa
 ccggcacacacaaaat**TTTTCTCAT**

C) pEFTs

>elongationsfaktor \rxa01913\
 cccccacgacaatggaactttgactTTTTaaaatttcacgcgcgtgggggctTTTTgggcacagccgc
 cgtgtcgcaacgtaatcgactgaatacctgtacgatcactTTTTtagacgggcggtagggctactgtgcc
 ctaacctaaagcttgtaaaagcatttaattatccatacataagcagcttcgccccgta

ccccacgacaatggaactttgactTTTTaaaatttcacgcgcgtgggggctTTTTgggcagccagccgc
 cgtgtcgcaacgtaatcgactgaatacctgtacgatcactTTTTtagacgggcggtagggctactgtgcc
 ctaacctaaagcttgtaaaagcatttaattatccatacata

D) pSOD

>superoxid\dismutase\rxa03119\
 agctgccattattccgggcttgtagcccgctaccgcgataaataggctggctgaaaatttcgttgcaat
 atcaacaaaaaggcctatcattgggaggtgtcgaccaagtaactTTTTggaagcgccatctgacggattt
 tcaaaagatgtatatgctcgggtgcggaaacctacgaaaggtTTTTtacc

agctgccattattccgggcttgtagcccgctaccgcgataaataggctggctgaaaatttcgttgcaat
 atcaacaaaaaggcctatcattgggaggtgtcgaccaagtaactTTTTggaagcgccatctgacggattt
 tcaaaagatgtatatgctcgggtgcggaaacctac