19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 524 564**

51 Int. Cl.:

C07K 14/435 (2006.01)

A61K 38/17 (2006.01)

C12N 15/63 (2006.01)

C12N 15/12 (2006.01)

A61P 25/04 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **15.01.2010 E 10703318 (5)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **08.10.2014 EP 2387581**

54 Título: **Identificación de nuevas toxinas antagonistas de canales de calcio de tipo T de aplicación analgésica**

30 Prioridad:

15.01.2009 FR 0900174

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

10.12.2014

73 Titular/es:

**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (CNRS) (50.0%)**

3, rue Michel-Ange

75794 Paris Cedex 16 , FR y

**UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS
(50.0%)**

72 Inventor/es:

BOURINET, EMMANUEL;

ESCOUBAS, PIERRE;

MARGER, FABRICE;

NARGEOT, JOËL y

LAZDUNSKI, MICHEL

74 Agente/Representante:

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

ES 2 524 564 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Identificación de nuevas toxinas antagonistas de canales de calcio de tipo T de aplicación analgésica

Campo técnico de la invención

5 La presente invención se refiere a una toxina antagonista de canales de calcio de tipo T ("canales de tipo T"). En particular, se refiere a un péptido compuesto por un péptido, a ácidos nucleicos que codifican este péptido y al uso de dicho péptido como antagonista y/o agonista inverso de canales de calcio de tipo T. La presente invención se refiere igualmente al uso de este péptido para la fabricación de un medicamento.

Encuentra aplicación especialmente en el tratamiento del dolor, en patologías cardiovasculares, en el tratamiento de la disfunción eréctil y potencialmente en el tratamiento de cánceres.

10 En la descripción siguiente, las referencias indicadas como " Ref. " remiten a la lista de referencias presentadas después de los ejemplos.

Estado de la técnica

15 La toma en consideración y el tratamiento del dolor son esenciales para la calidad de vida. El dolor afecta a un número significativo de personas. En Europa, se estima que 60 millones de personas están afectadas cada año por el dolor, lo que representa un coste anual de 1.000 millones de dólares en medicamentos para su tratamiento. Los gastos efectuados anualmente en medicamentos analgésicos pueden evaluarse en aproximadamente 25.000 millones de dólares y deberían alcanzar los 42.000 millones en 2010. El dolor se divide en dos categorías: el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo corresponde a un dolor rápido y breve, limitado en el tiempo, en contraposición con el dolor crónico, que es un dolor persistente y que puede estar ligado, por ejemplo, a una hiperalgesia.

20 Se han efectuado numerosos estudios referentes a la identificación de los mecanismos que permiten la transmisión del dolor. La transmisión de la señal de dolor por el sistema nervioso hace intervenir a receptores neuronales que transforman el estímulo doloroso en una señal eléctrica. Esta se transmitirá entonces al sistema nervioso central por los nervios, haciendo intervenir a receptores moleculares específicos.

25 Entre las diversas neuronas sensoriales, se pueden citar las neuronas nociceptivas, que reaccionan específicamente a los estímulos dolorosos.

30 A causa de su especificidad, las neuronas nociceptivas poseen un repertorio único de canales iónicos, que son proteínas responsables de la excitabilidad celular, y que representan una clase importante de dianas de medicamentos. Así, los canales iónicos expresados específicamente en las neuronas nociceptivas representan también dianas para el descubrimiento de nuevos analgésicos.

Las moléculas que inhiben el dolor, o analgésicos, son conocidas desde hace mucho tiempo. Se pueden citar, por ejemplo, la clase de los opiáceos, que actúan sobre la señalización de la señal de dolor y estimulan las vías nerviosas inhibitoras del dolor. Se usan otras moléculas para tratar los dolores crónicos. Son, por ejemplo, moléculas que actúan sobre los receptores de GABA como badofeno, diazepam, tizanidina y dantroleno.

35 Las moléculas analgésicas usadas actualmente presentan varios inconvenientes. Es bien conocido que los derivados de los opioides pueden provocar fenómenos alucinatorios y depresiones cardiorrespiratorias. Son igualmente fuente de dependencias, como por ejemplo dependencia de morfina, metadona, etc. Por último, el tratamiento con opiáceos está asociado a efectos indeseables como un estreñimiento grave.

40 Existen igualmente casos de habituación de estos medicamentos, es decir, que deba aumentarse la dosis necesaria para obtener un efecto constante. Esta habituación crece con el tiempo y conlleva por tanto la necesidad de aumentar las dosis y puede conllevar la ineficacia del medicamento. Efectivamente, la cantidad necesaria puede volverse superior a la dosis tóxica de dicho medicamento.

45 Por ejemplo, en el caso de dolores neuropáticos, que pueden aparecer en casos de diabetes, cáncer, tratamientos quimioterapéuticos, dolores inflamatorios crónicos, casos de síndrome del colon irritable, etc., el tratamiento del dolor con analgésicos y antálgicos conocidos induce frecuentemente un fenómeno de habituación y por tanto problemas de tratamiento de estos dolores.

Existe por tanto una necesidad real de encontrar nuevas moléculas analgésicas o antálgicas que palien estos defectos, inconvenientes y obstáculos de la técnica anterior con el fin de reducir los costes y mejorar el tratamiento del dolor y el bienestar de los pacientes.

50

Exposición de la invención

Los inventores han mostrado mediante experimentos de inhibición de la expresión del gen *Cacna1h*, que codifica el canal de calcio de tipo T $Ca_v3.2$ presente en los nocirreceptores, que dicho canal está implicado en la percepción del dolor.

- 5 Los canales $Ca_v3.2$ forman parte de la familia de los canales de calcio de "umbrales bajos" o "de tipo T" y se expresan en neuronas nociceptivas

Al usar un enfoque de represión génica por inyección intratecal de ADN anticodificante en rata, como se describe en Bourinet, E., *et al.*, "Silencing of the $Ca_v3.2$ T-type calcium channel gene in sensory neurons demonstrates its major role in nociception". Embo J. 2005. 24(2) : pág. 315-24 (Ref 1), los inventores han demostrado que la disminución de los canales de calcio $Ca_v3.2$ en neuronas nociceptivas de animales sanos o en estado de neuropatía conlleva una analgesia espectacular. En consecuencia, los canales de calcio de tipo T representan una diana potencial para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos del tratamiento del dolor.

Por otro lado, se ha demostrado que los canales de calcio $Ca_v3.2$ están implicados en la proliferación celular (Taylor, J.T., Zeng, X.B., Pottle, J.E., Lee, K., Wang, A.R., Yi, S.G., Scruggs, J.A., Sikka, S.S. y Li, M. (2008) "Calcium signaling and T-type calcium channels in cancer cell cycling". World J. Gastroenterol., 14, 4984-4991 (Ref 8)) y en la regulación de la tensión sanguínea (Chen, C.C., Lamping, K.G., Nuno, D.W., Barresi, R., Prouty, S.J., Lavoie, J.L., Cribbs, L.L., England, S.K., Sigmund, C.D., Weiss, R.M., Williamson, R.A., Hill, J.A. y Campbell, K.P. (2003) "Abnormal coronary function in mice deficient in $\alpha 1H$ T-type Ca^{2+} channels". Science, 302, 1416-1418. (Ref 9)). Los canales de calcio de tipo T representan una diana potencial para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos del tratamiento del de hipertensión y cánceres, por ejemplo cánceres ligados a una proliferación anárquica de las células cancerosas.

Puede tratarse de cánceres de diversos órganos, por ejemplo:

- cáncer de próstata (véase Gackière F, Bidaux G, Delcourt P, Van Coppenolle F, Katsogiannou M, Dewailly E, Bavencoffe A, Van Chuoi-Mariot MT, Mauroy B, Prevarskaya N, Mariot P.(2008) " $Ca_v3.2$ T-type calcium channels are involved in calcium-dependent secretion of neuroendocrine prostate cancer cells". J. Biol. Chem., 283(15): 10162-73 (Ref 16),
- glioma (véase Panner A, Cribbs LL, Zainelli GM, Origitano TC, Singh S, Wurster RD. (2005) "Variation of T-type calcium channel protein expression affects cell division of cultured tumor cells". Cell Calcium, 37(2): 105-19 (Ref 11)),
- 30 • carcinoma de esófago (véase Lu F, Chen H, Zhou C, Liu S, Guo M, Chen P, Zhuang H, Xie D, Wu S. (2008) "T-type Ca^{2+} channel expression in human esophageal carcinomas: a functional role in proliferation" Cell Calcium. 43(1): 49-58 (Ref 12))
- cáncer de mama (véase Taylor JT, Huang L, Pottle JE, Liu K, Yang Y, Zeng X, Keyser BM, Agrawal KC, Hansen JB, Li M (2008) "Selective blockade of T-type Ca^{2+} channels suppresses human breast cancer cell proliferation". Cancer Lett., 18; 267(1): 116-24 (Ref 13).

En particular, es el objeto de la presente patente un enfoque farmacológico que usa antagonistas selectivos del canal $Ca_v3.2$ de tipo T.

La invención responde precisamente a la necesidad de encontrar nuevas moléculas analgésicas o antálgicas que proporcionen una nueva molécula capaz de inhibir especialmente una señal de dolor, más particularmente una molécula capaz de inhibir los receptores responsables de esta señal. Esta molécula es un péptido de secuencia: YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1).

Se entiende por "derivado" que estos "fragmentos" o "derivados" son aquellos que conservan las propiedades del péptido de la presente invención. Puede considerarse igualmente que los derivados o fragmentos son análogos del péptido de la presente invención.

45 Por ejemplo, un derivado puede ser el péptido de secuencia ID NO1 con modificaciones en al menos uno de los aminoácidos. Las modificaciones son, por ejemplo, las siguientes:

- reemplazo de al menos un aminoácido por otro de la misma familia (aromática, hidrófoba, básica, etc.);
- reemplazo de un aminoácido natural (aminoácido L) por el mismo aminoácido en forma D;
- reemplazo de un enlace peptídico entre dos aminoácidos por un enlace seudopeptídico.
- 50 • modificación independiente de los extremos N y C terminales del péptido.

Estos derivados podrán comprender aminoácidos naturales, aminoácidos modificados, por ejemplo selenocisteínas, aminoácidos no naturales y/o modificaciones de la estructura del péptido como ciclaciones.

Los derivados pueden comprender igualmente, por ejemplo, péptidos modificados con vistas a un marcaje por agentes como biotina, agrupamientos fluoróforos o un isótopo radiactivo.

- 5 Las modificaciones de los extremos N o C terminales pueden ser, por ejemplo, isoprenilación, glipiación, miristoilación o palmitoilación. El extremo C terminal puede modificarse igualmente, por ejemplo, por amidación, que conduce a la formación de una función amida en el extremo C terminal. Se presentan ejemplos de modificaciones postraduccionales encontradas en péptidos en Han KK, Martinage A (1992) "Post-translational chemical modification(s) of proteins". *Int. J. Biochem.* 24(1): 19-28 y Walsh G, Jefferis R (2006) "Post-translational modifications in the context of therapeutic proteins", *Nature Biotechnology* - 24, 1241-1252 (Ref 17)).
- 10 Estas modificaciones son modificaciones que pueden encontrarse en toxinas de insectos (véase, por ejemplo, Escoubas P. (2006) "Molecular diversification in spider venoms: a web of combinatorial peptide libraries". *Mol Divers.* 10(4): 545-54 (Ref 18)).

- 15 En la descripción siguiente, se entiende por péptido de secuencia ID NO 1 la secuencia peptídica ID NO 1 o una secuencia derivada de la misma.

La invención responde igualmente a la necesidad de encontrar nuevas moléculas antihipertensivas al proporcionar una nueva molécula especialmente capaz de disminuir la presión arterial.

La invención responde igualmente a la necesidad de encontrar nuevas moléculas para el tratamiento del cáncer al proporcionar una nueva molécula especialmente capaz de inhibir la proliferación celular.

- 20 La nueva molécula de la presente invención es un péptido. Este péptido se ha aislado por primera vez por los inventores a partir del veneno de una araña del género *Paraphysa* (Psp3) (*Araneae: Theraphosidae*).

También, la presente invención se refiere igualmente a cualquier secuencia de ácidos nucleicos que codifica el péptido de secuencia YCQKFLWTCDSERPCCCEGLVCRWLWCKIN (SEQ ID NO 1).

- 25 El ácido nucleico de la presente invención puede ser cualquier secuencia que codifica el péptido de secuencia SEQ ID NO 1, teniendo en cuenta la degeneración del código genético. Por ejemplo, puede tratarse de ácidos nucleicos de las secuencias siguientes:

**5' TAT TGC CAG AAA TTT CTG TGG ACC TGC GAT AGC GAA CGC
CCG TGC TGC GAA GGC CTG GTG TGC CGC CTG TGG TGC AAA
ATT AAC 3' (SEQ ID NO 2)**

**5' TAY TGY CAR AAR TTY YTN TGG ACN TGY GAY WSN GAR MGN
CCN TGY TGY GAR GGN YTN GTN TGY MGN YTN TGG TGY AAR ATH
AAY 3' (SEQ ID NO 3)**

- 30 en las que A es adenosina, C es citidina, G es guanosina, T es timidina y H es A o C o T, M es A o C, N es A o C o G o T, R es A o G, S es C o G, W es A o T e Y es C o T:

La invención se refiere igualmente a un sistema de expresión que comprende un plásmido y/o un vector de expresión que codifica el péptido de SEQ ID NO 1.

En la presente, el sistema de expresión puede comprender al menos una secuencia de ácidos nucleicos que codifica el péptido de secuencia YCQKFLWTCDSERPCCCEGLVCRWLWCKIN (SEQ ID NO 1).

- 35 Se entiende por "vector de expresión" en la presente una secuencia de ácidos nucleicos en la que es posible insertar uno o varios fragmentos de ácidos nucleicos que se desea expresar en un hospedador. El vector de expresión puede constar de elementos que permitan la expresión de la secuencia de ácido nucleico en el hospedador. Por ejemplo, el vector puede comprender una secuencia promotora o una secuencia que codifica un péptido señal. Los vectores pueden ser cualquier vector conocido por el especialista en la materia.

- 40 Por ejemplo, los vectores de expresión pueden elegirse del grupo que comprende plásmidos, virus, vectores bacterianos, cromosomas artificiales de levadura (YAC) y cromosomas artificiales de bacterias (BAC). Los vectores de expresión pueden ser igualmente vectores de sobreexpresión de proteínas recombinantes con o sin fusión con una proteína soluble como, por ejemplo, GST o tiorredoxina o cualquier otra proteína de fusión conocida por el especialista en la materia.

- 45 Por ejemplo, los vectores utilizables en la presente invención pueden elegirse especialmente del grupo que comprende el plásmido pT7-7 (SEQ ID NO 4, Figura 5), un plásmido de la serie pGEX (SEQ ID NO 5, Figura 6),

comercializado por ejemplo por la compañía Pharmacia, o un plásmido de la serie pET32 (SEQ ID NO 6, Figura 7), comercializado por ejemplo por la compañía Novagen.

Se describe un hospedador que comprende un vector de expresión del péptido de secuencia YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO1).

- 5 En la presente, se entiende por "hospedador" cualquier célula que pueda transformarse con un vector de expresión o modificarse genéticamente con el fin de producir el péptido de la invención.

La transformación de dicho "hospedador" puede realizarse, por ejemplo, mediante electroporación o cualquier otro método conocido por el especialista en la materia. La secuencia que codifica el péptido de secuencia ID NO 1 usado en la transformación puede ser libre o incorporarse a uno de los vectores anteriormente citados. Después de la introducción, puede incorporarse dicha secuencia de ácidos nucleicos al genoma del hospedador mediante recombinación genética, permanecer en forma libre en el hospedador y/o permanecer en el vector, siendo reconocida a continuación dicha secuencia de ácidos nucleicos por las proteínas y/o enzimas del hospedador y expresándose por el mismo.

10 El hospedador puede elegirse del grupo que comprende células eucarióticas o procarióticas, por ejemplo bacterias como *Escherichia coli*, levaduras como *Pichia pastoris*, células de insectos como células de *Drosophila* o *Spodoptera*, células de mamíferos y cualquier otra célula conocida por el especialista en la materia que permita la producción de péptidos y/o de proteínas a partir de vectores de expresión.

15 Las células procarióticas o eucarióticas pueden permitir, de preferencia, la sobreexpresión del péptido que codifica el vector. Así, es utilizable cualquier célula hospedadora capaz de expresar un vector de expresión del péptido de la invención, por ejemplo, *Escherichia coli*.

20 Preferiblemente, las células eucarióticas o procarióticas elegidas son aquellas que permiten la sobreexpresión del péptido de la invención. Por ejemplo, se trata de células Sf9 de *Spodoptera*, de células S2 de *Drosophila*, de levaduras de tipo *Pichia pastoris* o de bacterias *Escherichia coli*.

25 Los inventores muestran en los ejemplos siguientes que el péptido de secuencia SEQ ID NO 1 es un antagonista o un antagonista parcial de los canales de tipo T.

También la presente invención se refiere igualmente al péptido de secuencia YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1) como antagonista de un canal de calcio de tipo T.

También la presente invención se refiere igualmente al péptido que es antagonista de un canal de calcio de tipo T de secuencia de aminoácidos: YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO:1).

- 30 Se entiende por "antagonista" un agente, por ejemplo una molécula química, una proteína, un péptido, etc., que interacciona con un sitio receptor sobre un canal y que impide funcionar dicho canal.

El antagonista puede disminuir eficazmente el efecto farmacológico del agonista, se trata entonces de un "antagonista parcial".

35 La invención tiene igualmente como objeto el uso del péptido de secuencia SEQ ID NO 1 como agonista inverso de un canal de tipo T. Se entiende por "agonista inverso" un agente, por ejemplo una molécula química, una proteína, etc., que interacciona con el mismo receptor que un agonista de este receptor pero que produce el efecto farmacológico opuesto.

40 En otros términos, el antagonista, antagonista parcial o agonista inverso puede ser una sustancia que se fija sobre los mismos receptores celulares al nivel de sitios idénticos o diferentes de una sustancia de referencia, impidiéndola producir todos o parte de sus efectos habituales o produciendo el efecto inverso.

En la presente, se entiende por "canales de calcio de tipo T" los canales de calcio de bajo umbral de activación, es decir, que tienen un potencial de activación comprendido entre -80 y -20 mV, de preferencia entre -70 y -50 mV

Por ejemplo, los canales de calcio de tipo T pueden ser canales de calcio generados por las subunidades Ca_v3.1, Ca_v3.2, Ca_v3.3 y todas sus variantes de corte y empalme en asociación con sus subunidades reguladoras o no.

- 45 Preferiblemente, el péptido se usa como antagonista y/o agonista inverso de los canales de calcio de tipo T.

Aún más preferiblemente, el péptido es un antagonista y/o agonista inverso de los canales de calcio Ca_v3.2 y/o de los canales de calcio Ca_v3.1 y/o Ca_v3.3.

50 La presente invención se refiere igualmente al péptido antagonista de un canal de calcio de tipo T de secuencia de aminoácidos: YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO:1), siendo dicho canal un canal elegido del grupo que comprende el canal Cav3.2 y el canal Cav3.1.

La invención tiene igualmente como objeto el uso del péptido de secuencia YCQKFLWTCDSERPCCGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1) y/o de un ácido nucleico que codifica el péptido de secuencia YCQKFLWTCDSERPCCGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1) para la fabricación de un medicamento. Este medicamento puede ser para uso humano o veterinario.

- 5 En la presente, el péptido puede estar asociado a cualquier soporte farmacológicamente aceptable con el fin, por ejemplo, de mejorar su biodisponibilidad, su solubilidad, su estabilidad en solución y/o la fabricación del medicamento.

La presente invención se refiere igualmente al péptido de secuencia de aminoácidos: YCQKFLWTCDSERPCCGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO:1), para su uso como medicamento.

- 10 La presente invención se refiere igualmente al péptido de secuencia de aminoácidos: YCQKFLWTCDSERPCCGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO:1), para su uso en el tratamiento del dolor.

La presente invención se refiere igualmente al péptido de secuencia de aminoácidos: YCQKFLWTCDSERPCCGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO:1), para su uso como medicamento analgésico.

- 15 En la presente, se entiende por "soporte farmacéuticamente aceptable" cualquier compuesto conocido por el especialista en la materia por usarse en medicamentos. Puede tratarse, por ejemplo, de los compuestos citados en la obra "Pharmacie galénique" de A. LEHIR (Ed. Masson, 1992 (6ª edición)) (Ref 7).

En la presente, se entiende por "asociación" un enlace covalente con el soporte, un enlace por interacciones iónicas o la presencia de una solución del soporte y del péptido de la invención.

- 20 El medicamento que comprende el péptido de secuencia SEQ ID NO 1 puede formularse de cualquier forma que permita su administración a un paciente o animal. Puede tratarse, por ejemplo, de una formulación que permita una administración por vía oral, intravenosa, peridural, cutánea o transdérmica.

- 25 En la presente, se entiende por "formulación" una formulación inyectable (por ejemplo, como por Octaplex (marca registrada) o Synergon (marca registrada)), una formulación oral, por ejemplo un jarabe, un polvo (por ejemplo, como por Octaplex (marca registrada)), gránulos, un comprimido (como, por ejemplo, por Estima (marca registrada)), un comprimido con película (como por ejemplo por Provames (marca registrada)), una cápsula, un pulverizador, una formulación local como por ejemplo una crema (como por ejemplo por la crema Trophicrème (marca registrada)), una loción, un gel, una formulación ocular, por ejemplo un colirio, una formulación para inyección intravenosa, una formulación inyectable por dispositivos de autoinyección de tipo lápiz de insulina, un parche transdérmico, comprimidos disponibles orales, una formulación para ingestión sublingual o una formulación para inyección peridural.
- 30

Por ejemplo, puede tratarse igualmente de las diferentes composiciones farmacéuticas descritas en la obra "Pharmacie galénique" de A. LEHIR (Ed. Masson, 1992 (6ª edición)) (Ref 7).

El medicamento puede administrarse, por ejemplo, en forma de cápsulas, comprimidos, parches, soluciones inyectables, supositorios y/o polvos.

- 35 La concentración del péptido de la invención en el medicamento y/o el producto veterinario puede ser cualquier concentración eficaz desde el punto de vista farmacéutico y aceptable por el paciente o animal tratado, incluyendo por ejemplo entre 1 nM y 1000 nM.

- 40 El medicamento que comprende el péptido de la invención se administra de preferencia con el fin de obtener una concentración intravenosa que permita un efecto biológico. Esta concentración plasmática eficaz puede determinarse igualmente, por ejemplo, según el tiempo de semivida del péptido de la invención después de su inyección por vía intravenosa en un mamífero y por medida de su concentración por espectrometría de masas. El tiempo de semivida corresponde al tiempo necesario para que la concentración de dicho medicamento sea igual a la mitad de la concentración inicial.

- 45 El medicamento y/o el producto veterinario que comprende el péptido de secuencia SEQ ID NO 1 puede acondicionarse para una administración de una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, cada dos días, cada tres días o una vez por semana.

El modo de administración y la cantidad administrada pueden adaptarse a cada individuo y pueden determinarse por el facultativo, especialmente en función de las características fisiológicas del individuo tratado.

- 50 En la presente, el medicamento puede ser un producto para el tratamiento de dolor, migraña, epilepsia, enfermedad de Parkinson, disritmias talámicas, trastornos del sueño y la vigilia, trastornos bipolares, patologías cardiovasculares (hipertrofia cardíaca, hipertensión), patologías ligadas a la liberación de aldosterona, disfunciones eréctiles y patologías cancerosas.

De preferencia, el medicamento de la presente invención es un producto para el tratamiento del dolor, por ejemplo un antálgico, un analgésico o un antialodínico.

Preferiblemente, el medicamento y/o el producto veterinario de la presente invención es un analgésico.

5 La presente invención tiene igualmente como objeto un procedimiento de síntesis del péptido de secuencia YCQKFLWTCDSERPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1) que comprende una etapa de síntesis química sobre soporte sólido o una síntesis por recombinación genética.

El procedimiento de síntesis en la presente invención es un procedimiento de síntesis química sobre soporte sólido o una síntesis por recombinación genética.

10 El procedimiento de síntesis por recombinación genética puede usar un sistema de expresión o un vector tal como se definen anteriormente.

El procedimiento de síntesis del péptido de la invención por recombinación genética puede comprender especialmente las etapas siguientes:

- transformar una célula hospedadora con un vector de expresión que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica el péptido de la invención,
- 15 • cultivar la célula hospedadora transformada en condiciones de cultivo tales que fabrique el péptido de la invención a partir de dicho vector de expresión y,
- recuperar dicho péptido fabricado por la célula hospedadora.

20 Las etapas de transformación, de cultivo, así como de aislamiento del péptido pueden realizarse mediante técnicas habituales de la recombinación genética, por ejemplo, las técnicas descritas en el documento Sambrook, Fritsch y Maniatis, "Molecular cloning, A laboratory manual", 2ª edición, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989 (Ref 3).

Por ejemplo, el péptido de secuencia SEQ ID NO 1 puede prepararse mediante técnicas clásicas de síntesis química en fase sólida, por ejemplo, según la metodología de síntesis peptídica sobre soporte sólido ("Fmoc solid Phase peptide synthesis, a practical approach", publicado por W.C. Chan y P. D.White, Oxford university press, 2000 (Ref 4)).

25 Otras características y ventajas de la invención surgirán con la lectura de la descripción siguiente, con referencia a las figuras adjuntas.

Breve descripción de las figuras

30 La Figura 1 es un diagrama que representa el perfil de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de veneno de Psp3 (columna de fase inversa) (parte superior) expresado en mUA en función del tiempo. El diagrama inferior representa el perfil de cromatografía de HPLC (columna de intercambio iónico) de las fracciones indicadas por la parte gris del diagrama superior. La parte gris del perfil de HPLC inferior corresponde a un pico puro que contiene la toxina Psp3Tx1.

35 La Figura 2 es un diagrama que representa la corriente generada por los canales Ca_v3.2 en nanoamperios (nA) en función del tiempo. La curva muestra el efecto de aplicación de una parte de la Psp3Tx1 purificada por HPLC presentado en la Figura 1 sobre la actividad del canal Ca_v3.2 expresado en ovocitos de *Xenopus*. La corriente se registra en una solución que contiene bario 5 mM como portador de cargas y se provoca por una despolarización a -30 mV a partir de un potencial de reposo de -100 mV.

40 La Figura 3 es un diagrama que representa varios registros de corrientes de tipo T en nanoamperios en función del tiempo generados por la subunidad Ca_v3.2 a varios potenciales antes (control) y durante la aplicación de la Psp3Tx1 (Psp3TX1).

La Figura 4 es un diagrama que representa las relaciones de corriente-potencial para los registros presentados en la Figura 3. La abscisa representa la corriente en nanoamperios en función del potencial en milivoltios (mV).

Figura 5: secuencia del plásmido pT7-7 (SEQ ID NO 4).

Figura 6: secuencia del plásmido de la serie pGEX (SEQ ID NO 5).

45 Figura 7: secuencia del plásmido de la serie pET32 (SEQ ID NO 6).

La Figura 8 es un diagrama que representa el porcentaje de inhibición de la corriente generada por los canales Ca_v3.2 en función de la concentración de la toxina. La ordenada representa el porcentaje de inhibición de la corriente generada por los canales Ca_v3.2 y la abscisa el logaritmo decimal de la concentración molar de la toxina. La curva

con círculos negros corresponde a la curva de inhibición con la toxina Psp3Tx1, la curva con círculos blancos corresponde a la curva de inhibición con la toxina sintética.

EJEMPLOS

Ejemplo 1: caracterización del péptido de la invención

5 Se diluyó el veneno de PARAPHYSA SP3 a 1:1000 en la solución extracelular usada para análisis de fijación de membrana. Esta solución es de la composición siguiente (en mM): NaCl 135, TEACl 20, HEPES 10, CaCl₂ 2, MgCl₂ 1 (pH 7,3 con TEAOH).

10 Se transfectaron células HEK293 con un plásmido de expresión pcDNA3 que contenía ADN complementario del canal de calcio Cav3.2 humano y un gen informador (CD8) con la ayuda del reactivo jetPEI™ (distribuido por la compañía Q-biogen). Después de 48 horas de expresión, se dispersaron las células transfectadas con la ayuda de tripsina y se sembraron después a baja densidad en placas de cultivo para análisis de fijación de membrana.

15 Se localizaron las células transfectadas positivamente con la ayuda de bolas magnéticas recubiertas con un anticuerpo anti-CD8 (Dyna) como se describe anteriormente en Jiménez, C., Bourinet, E., Leuranguer, V., Richard, S., Snutch, T.P. y Nargeot, J. (2000) "Determinants of voltage-dependent inactivation affect Mibefradil block of calcium channels." *Neuropharmacology*, 39, 1-10 (Ref 2). Se realizan los registros electrofisiológicos por la técnica de "fijación de membrana" en configuración "célula entera" con la ayuda de un amplificador Axopatch200B guiado por una interfaz Digidata y el software pClamp9 (Molecular Devices). Se describe anteriormente la solución de registro extracelular que contiene calcio 2 mM. Se realizan los registros con la ayuda de pipetas de borosilicato (Sutter Instruments) estiradas para tener una resistencia de 1,5 a 2,5 mΩ. La solución intrapipeta usada para los registros tiene la composición siguiente: CsCl 130 mM, HEPES 10 mM, EGTA 10 mM, CaCl₂ 2 mM, MgCl₂ 1 mM, MgATP 4 mM, TrisGTP 0,3 mM (pH 7,3 con NaOH). Se realiza el análisis de los resultados con la ayuda del software Clampfit (marca comercial), Excel (marca comercial) y GraphPad Prism (marca comercial).

25 Los aparatos usados en este ejemplo para los registros electrofisiológicos son el amplificador Axopatch200B (Molecular Device), Digidata 1300 (Molecular Device), el software pClamp9 (Molecular Devices), el amplificador GeneClamp500 (Molecular Device), el microscopio inverso Olympus IX70 (Olympus France) y el micromanipulador Sutter (Sutter Instruments). Los compuestos, reactivos y células usados procedían, para los productos químicos, de la compañía Sigma-Aldrich France, siendo las células usadas células HEK293 (ATCC), las bolas Dynal anti-CD8 de la compañía Invitrogen France, el reactivo jetPEI (marca comercial) de la compañía Q-biogen France y el microorganismo *Xenopus Laevis* (CRBM - CNRS Montpellier France)

30 Para visualizar las corrientes de calcio de tipo T generadas por los canales Ca_v3.2 recombinantes expresados en las células transfectadas, se usa el protocolo de estimulación siguiente: a partir de un potencial de reposo de -100 mV, se aplica una despolarización de 100 ms a un potencial de -30 mV cada 10 segundos. Se mide la amplitud de corriente generada por esta estimulación en condiciones controladas y después de la aplicación del veneno de PARAPHYSA SP3. Para hacer esto, se aspira el veneno de PARAPHYSA SP3 en una pipeta idéntica a la pipeta de registro. Esta pipeta que contiene el veneno se conecta con un sistema de presión neumática que permite aplicar de 35 1 a 2 microlitros de veneno cerca de la célula registrada.

40 Se efectúa la caracterización de las fracciones de veneno de PARAPHYSA SP3 en un sistema de expresión diferente. Se inyecta el ADNc que codifica Cav3.2 humano en los ovocitos de *Xenopus* (*Xenopus laevis*) como se describe en Altier, C., Dubel, S.J., Barrère, C., Jarvis, S.E., Stotz, S.C., Spaetgens, R.L., Scott, J.D., Cornet, V., De Waard, M., Zamponi, G.W., Nargeot, J. y Bourinet, E. (2002) "Trafficking of L-type calcium channels mediated by the postsynaptic scaffolding protein AKAP79". *J. Biol. Chem.*, 277, 33598-33603 (Ref 5) y en Dubel, S.J., Altier, C., Chaumont, S., Lory, P., Bourinet, E. y Nargeot, J. (2004) "Plasma Membrane Expression of T-type Calcium Channel {alpha}1 Subunits Is Modulated by High Voltage-activated Auxiliary Subunits." *J. Biol. Chem.*, 279, 29263-29269 (Ref 6). Se registran las corrientes mediante la técnica de voltaje impuesto por doble microelectrodo con la ayuda de un amplificador GenClamp500 (marca comercial) (Molecular Devices (marca registrada)) guiado por el software pClamp9 (marca comercial). Se disuelven las diferentes fracciones cromatográficas obtenidas a partir del veneno en la solución extracelular que contiene (en mM): 5 BaOH₂, 25 TEAOH, 25 NaOH, 2 CsOH, 30 NMDG, 5 HEPES (pH a 45 7,3 con ácido metanosulfónico). Se realizan los registros en una microcubeta de 15 µl. Se aplican manualmente las fracciones (10 µl), directamente sobre el ovocito registrado con la ayuda de una pipeta.

50 Desde la aplicación de la toxina purificada, se inhibe fuertemente la corriente del canal Cav3.2 al cabo de 30 segundos (Figura 2). En el lavado del efecto de la toxina, se obtiene la recuperación de la amplitud de la corriente de partida después de varios minutos.

55 Por otro lado, tal como se muestra en la Figura 4, la aplicación del extracto provoca un desplazamiento de aproximadamente 20 mMV hacia los potenciales positivos de la relación de corriente-potencial. Este desplazamiento es una característica de las toxinas que provocan una inhibición del "sensor de voltaje" de los canales iónicos. Este efecto clásico de las toxinas de araña se describe en Winterfield JR, Swartz KJ. (2000) "A hot spot for the interaction of gating modifier toxins with voltage-dependent ion channels". *J. Gen. Physiol.*, 116(5): 637-44.) (Ref 10). Se trata de un bloqueo de la parte del canal que detecta la variación de potencial (el "sensor de voltaje"). La consecuencia es

que la apertura del canal se vuelve más difícil y requiere una despolarización más alta. Así, la relación de corriente-potencial se desplaza hacia potenciales más positivos.

Parece por tanto claro que el extracto consta de un antagonista de un canal de tipo T. Esta molécula es por tanto una nueva molécula que permite inhibir la señal de dolor.

5 **Ejemplo 2: aislamiento y secuenciación del péptido de la invención**

Se han aislado las fracciones de veneno que inhiben la actividad de los canales de calcio tales como se presentan en el ejemplo precedente, y se ha efectuado la búsqueda del compuesto responsable de esta inhibición mediante etapas sucesivas de ensayos de actividad acopladas con etapas de fraccionamiento.

10 Se obtuvo el veneno de PARAPHYSA SP mediante estimulación eléctrica de los quelíceros de hembras adultas. Se recogió el veneno en microtubos y se liofilizó.

La preparación del veneno para los análisis de actividad y para la separación cromatográfica consistió en una disolución del liofilizado en agua ultrapura a una dilución de 10 veces la del volumen de veneno inicial, una centrifugación (14.000 rpm, 20 min) y una filtración por membrana de 0,45 µm (SJHVL04NS Millipore (marca comercial)).

15 Purificación del componente activo del veneno por cromatografía: En una primera etapa, se fraccionó una alícuota de 100 µl de a dilución de veneno (10 µl equivalentes de veneno bruto) mediante cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa (HPLC-FI) sobre una columna semipreparativa C8 (5C8MS, 10x250 mm, Waters). El gradiente usado está compuesto por agua + 0,1 % de ácido trifluoroacético (A) / acetonitrilo + 0,1 % de ácido trifluoroacético (B). Se programa el gradiente como sigue: 0 % de B durante 5 min, 0 a 60 % de B en 60 min, 60 a 90 % de B en 10 min, caudal 2 ml/min. Se recogen manualmente las fracciones a la salida de la columna, vigilando la variación de absorbancia UV a 215 nm. Se liofilizan a continuación estas fracciones y se ensaya después su actividad sobre el canal de calcio de tipo T como se describe anteriormente.

25 Se realiza una segunda etapa de purificación como sigue, en las fracciones de HPLC-FI activas: se analizan estas fracciones en una segunda etapa de cromatografía de intercambio catiónico, sobre una columna Tosoh SP5PW (marca comercial) (4,6 x 70 mm) (Tosoh), con un gradiente lineal de acetato de amonio en agua (de 20 mM a 1 M en 50 min) con un caudal de 0,5 ml/min. Se liofilizan las fracciones recogidas y se ensaya después su actividad sobre el canal de calcio de tipo T como se describe anteriormente.

30 Después de la identificación de la fracción activa, se determinan la pureza y el peso molecular del péptido constituyente de la fracción activa mediante espectrometría de masas MALDI-TOF (desorción/ionización por láser asistida por matriz- tiempo de vuelo).

35 Se realizan las medidas de espectrometría de masas por espectrometría de masas MALDI-TOF con un espectrómetro de masas Voyager DE-Pro (marca comercial) (Applied Biosystems (marca registrada)) en modo reflector. Se mezclan los péptidos con la matriz de ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (α-CHCA, Sigma (marca registrada) 5 mg/ml en agua:acetonitrilo:TFA 50:50:0,1) y se analizan. Se calibran los espectros de masas con patrones internos y se analizan con el software Data Explorer (marca comercial).

Se determina la secuencia del péptido purificado mediante secuenciación automática usando un secuenciador en fase gaseosa (Applied Biosystems Procise) mediante degradación de Edman.

40 Antes del análisis, se reducen los puentes disulfuro del péptido purificado con DTT (ditiotreitól 10 mM, 55 °C, 45 min) y se alquilan con IAA (ácido yodoacético, 50 mM, a 20 °C, 30min) según un protocolo conocido por el especialista en la materia (véase John M. Walker. "The Protein Protocols Handbook", Humana Press 1996 (ISBN 0-89603-339-2) (Ref 14). Se somete el péptido reducido/alquilado a un desalado mediante cromatografía HPLC-FI C18 sobre una columna Merck Chromolith Speed-Rod (marca comercial) (0,46x50 mm). Se determina a continuación la secuencia del péptido reducido/alquilado mediante secuenciación N-terminal automática en fase gaseosa en un secuenciador peptídico de modelo Applied Biosystems 477A (marca comercial) (Applied Biosystems (marca registrada)).

45 La secuencia peptídica obtenida es YCQKFLWTCDSEPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1)

Este ejemplo demuestra claramente por tanto que la molécula antagonista de los canales de tipo T es el péptido de secuencia ID N°1.

Este péptido representa por tanto una nueva molécula susceptible de inhibir la señal de dolor.

Ejemplo 3: síntesis química del péptido de secuencia SEQ ID NO 1.

50 La compañía Altergen (marca registrada) sintetiza químicamente el péptido de la invención según el protocolo siguiente: síntesis en fase sólida según la técnica de Merifield, estrategia de Fmoc.

Se ensaya la actividad inhibitora del péptido identificado en el ejemplo 2 *in vitro* sobre diferentes canales de calcio de tipo T (resultados no proporcionados).

Ejemplo 4: síntesis química del péptido de secuencia SEQ ID NO 1.

5 La compañía Genepep (marca registrada) sintetizó químicamente el péptido de la invención según el protocolo siguiente: síntesis en fase sólida según la técnica de Merifield, estrategia de Fmoc. (Ref 4).

10 La compañía Synprosis (marca registrada) replicó el péptido lineal producido por la compañía Genepep según el protocolo siguiente: incubación de péptido lineal Psp3-Tx1 10 μ M en un tampón que contiene glutatión reducido (GSH) 1 mM, glutatión oxidado (GSSG) 1 mM, trishidroximetilaminometano (TRIS) 100 mM pH 9, 25 % de glicerol. Se realizó la incubación durante 24 horas con agitación suave a temperatura ambiente. Se realizó la purificación de la toxina Psp3-Tx1 sintética en cromatografía HPLC en fase inversa sobre columna RP-C18 Chromolith (marca registrada) usando un gradiente de 10 a 50 % de acetonitrilo (ACN) en una solución con 0,1 % de trifluoroacetato (TFA).

Se realizó la verificación de la masa del péptido sintético replicado mediante espectrometría de masas, dando un valor de 3398,0 dalton (Da) de acuerdo con la formación de 3 puentes disulfuro entre las 6 cisteínas.

15 Ejemplo 5: caracterización del péptido sintético de la invención producido en el ejemplo 4.

20 Se ensayó la actividad inhibitora del péptido sintético del ejemplo 4 *in vitro* sobre el canal Ca_v3.2. Se realizó la comparación de inhibiciones con el péptido natural (Psp3-Tx1) en las mismas condiciones. Se diluyeron el péptido sintético y el péptido natural (toxina natural) a una concentración madre de 10⁻³ molar en agua destilada. A partir de esta concentración madre, se diluyeron los péptidos en una solución correspondiente a la solución extracelular usada para el análisis de fijación de membrana. Esta solución es de la composición siguiente (en mM): NaCl 135, TEACI 20, HEPES 10, CaCl₂ 2, MgCl₂ 1 (pH 7,3 con TEAOH). Las concentraciones ensayadas fueron las siguientes: para el péptido sintético: 10⁻⁸, 10⁻⁷ y 10⁻⁶ molar; para el péptido natural: 10⁻⁹, 10⁻⁸, 3x10⁻⁸, 10⁻⁷, 3x10⁻⁷ y 10⁻⁶ molar.

25 Se usaron células HEK293 (ATCC) que expresan de manera estable la secuencia de ADN complementaria del canal de calcio Cav3.2 humano. A cada pasada de la línea celular, se sembraron células a baja densidad sobre placas de cultivo para análisis de "fijación de membrana" (electrofisiología molecular).

Se localizaron las células transfectadas positivamente con la ayuda de bolas magnéticas recubiertas con un anticuerpo anti-CD8 (Dyna) como se describe anteriormente en Jiménez, C., Bourinet, E., Leuranguer, V., Richard, S., Snutch, T.P. y Nargeot, J. (2000) "Determinants of voltage-dependent inactivation affect Mibefradil block of calcium channels." *Neuropharmacology*, 39, 1-10 (Ref 2).

30 Se realizan los registros electrofisiológicos por la técnica de "fijación de membrana" en configuración de "célula entera" con la ayuda de un amplificador Axopatch200B guiado por una interfaz Digidata y el software pClamp10 (Molecular Devices). Se describe anteriormente la solución de registro extracelular que contiene calcio 2 mM.

Se realizan los registros con la ayuda de pipetas de borosilicato (Sutter Instruments) estiradas para tener una resistencia de 1,5 a 2,5 m Ω .

35 La solución intrapipeta usada para los registros es de la composición siguiente: CsCl 130 mM, HEPES 10 mM, EGTA 10 mM, CaCl₂ 2 mM, MgCl₂ 1 mM, MgATP 4 mM, TrisGTP 0,3 mM (pH 7,3 con NaOH). Se realiza el análisis de los resultados con la ayuda del software Clampfit (marca comercial), Excel (marca comercial) y GraphPad Prism (marca comercial).

40 Los aparatos usados en este ejemplo para los registros electrofisiológicos son el amplificador Axopatch200B (Molecular Device), Digidata 1440 (Molecular Device), el software pClamp10 (Molecular Devices), el amplificador GeneClamp500 (Molecular Device), el microscopio inverso Olympus IX70 (Olympus France) y el micromanipulador Sutter (Sutter Instruments). Los compuestos, reactivos y células usados procedían, para los productos químicos, de la compañía Sigma-Aldrich France, siendo las células usadas células HEK293 (ATCC), las bolas Dynal anti-CD8 de la compañía Invitrogen France y el reactivo jetPEI (marca comercial) de la compañía Q-biogen France.

45 Para visualizar las corrientes de calcio de tipo T generadas por los canales Ca_v3.2 recombinantes expresados en las células transfectadas, se usa el protocolo de estimulación siguiente: a partir de un potencial de reposo de -100 mV, se aplica una despolarización de 100 ms a un potencial de -30 mV cada 10 segundos.

50 Se mide la amplitud de la corriente generada por esta estimulación en condiciones controladas desde la aplicación de concentraciones crecientes del péptido sintético del ejemplo 4, o de concentraciones creciente de la toxina nativa Psp3-Tx1. Para hacer esto, se reparten las soluciones que contienen las diferentes concentraciones del péptido sintético o la toxina Psp3-Tx1 en tubos de perfusión conectados con un colector que permite aplicar estas diferentes soluciones cerca de la célula registrada.

Se asimila así la actividad inhibitora de cada concentración de péptido sintético o de toxina nativa midiendo la amplitud de la corriente Cav3.2 de la célula registrada en la meseta del efecto.

Se presentaron los efectos inhibidores del péptido sintético y del péptido natural en forma de porcentaje de bloqueo de cada concentración para construir las curvas de "efecto-dosis" presentadas en la Figura 8. Estas curvas de "efecto-dosis" se analizaron con el software GraphPad Prism (marca comercial) con la función de análisis sigmoideo "log(antagonista) frente a respuesta - pendiente variable". que permite calcular la dosis que inhibe un 50 % de la corriente (CE_{50}), así como la pendiente de la curva correspondiente o número de Hill.

La Figura 8 representa la curvas de dosis-respuesta para el péptido natural (Psp3Tx1) (curva con círculos negros) y el péptido sintético (curva con círculos blancos).

Así, en la Figura 8, la CE_{50} para la toxina natural es de 1,1 μM con un número de Hill de 0,87 (el número de células analizadas es de 6), y la CE_{50} para el péptido sintético es de 2,01 μM con un número de Hill de 0,89 (el número de células analizadas es igual a 20).

Los resultados muestran por tanto que el péptido sintético y el péptido nativo inhiben las corrientes del canal $Ca_v3.2$. Los resultados se describen con un coeficiente de Hill igual a aproximadamente 1, lo que implica una interacción 1:1 entre canal y péptidos.

Este ejemplo demuestra por tanto claramente que el péptido de secuencia ID NO 1, extraído de veneno de araña como se presenta en el ejemplo 1 y/o sintetizado químicamente, inhibe las corrientes del canal $Ca_v3.2$

Ejemplo 6: efecto analgésico del péptido de la invención

Se usaron ratones con el fin de observar el efecto analgésico del péptido de la invención frente a dolores inducidos por estímulos térmicos.

Los ratones son ratones C57BL/6J silvestres y ratones C57BL/6J $CaV3.2^{-/-}$. El número total de ratones es de 10 silvestres y 10 $CaV3.2^{-/-}$.

Se usan dos grupos de ratones (C57BL/6J), un grupo en el que se ha inyectado por vía intratecal una solución fisiológica que comprende el péptido de la invención a una concentración de 10 y 100 nM y un segundo grupo (grupo testigo) que solo recibe la inyección intratecal de la solución fisiológica sola. Se someten a continuación los ratones al ensayo de inmersión de la cola en baño María a 46 °C. Este experimento tiene como objetivo determinar el tiempo al cabo del cual reaccionan los ratones al calor doloroso, mostrando así el umbral de aparición de la señal de dolor ligado a la percepción del calor. Se realiza el mismo experimento en paralelo con otros dos grupos de ratones C57BL/6J desprovistos del gen que codifica el canal de calcio de tipo T codificado por la subunidad $CaV3.2$. Este experimento tiene como objetivo mostrar la selectividad del péptido de la invención.

Los resultados muestran una diferencia significativa del tiempo de reacción al calor entre el grupo de ratones en el que se ha inyectado el péptido y el grupo de ratones testigo, siendo el tiempo de reacción al calor significativamente mayor en los ratones que reciben el péptido de secuencia SEQ ID NO 1.

Se usaron ratones con el fin de observar el efecto analgésico del péptido de la invención frente estímulos mecánicos.

Los ratones son ratones C57BL/6J silvestres y ratones C57BL/6J $CaV3.2^{-/-}$. El número total de ratones es de 10 silvestres y 10 $CaV3.2^{-/-}$.

Se usan dos grupos de ratones (C57BL/6J), un grupo en el que se ha inyectado por vía intratecal una solución fisiológica que comprende el péptido de la invención a una concentración de 10 y 100 nM y un segundo grupo (grupo testigo) que solo recibe la inyección intratecal de la solución fisiológica sola. Se sometieron a continuación los ratones al experimento de estimulación mecánica por filamentos de von Frey. Este experimento tiene como objetivo determinar el umbral de reacción a un estímulo mecánico de intensidad creciente aplicado sobre la bóveda plantar. El umbral de reacción de los animales está correlacionado con la aparición de la señal de dolor ligada a la percepción de la presión mecánica. Se realiza el mismo experimento en paralelo con otros dos grupos de ratones C57BL/6J desprovistos del gen que codifica el canal de calcio de tipo T codificado por la subunidad $CaV3.2$. Este experimento tiene como objetivo mostrar la selectividad del péptido de la invención.

Los resultados muestran una diferencia significativa del umbral de percepción a la presión mecánica entre el grupo de ratones en el que se ha inyectado el péptido y el grupo de ratones testigo, siendo el umbral de presión significativamente más elevado en los ratones que reciben el péptido de secuencia SEQ ID NO 1.

El péptido de la invención tiene por tanto el efecto analgésico esperado frente a los estímulos dolorosos térmicos y mecánicos.

Este ejemplo demuestra por tanto que el péptido de secuencia SEQ ID NO 1, identificado en el ejemplo 2, es una nueva molécula para el tratamiento del dolor.

Ejemplo 7: comparación del efecto analgésico del péptido de la invención con el de un analgésico de referencia.

Los ratones y el protocolo experimental usados en el presente ejemplo son idénticos a los descritos en el ejemplo 4.

Se ensayan dos grupos de ratones suplementarios:

- 5
- un grupo en el que se ha inyectado por vía intratecal una dosis de morfina (1 µg/kg), y
 - un grupo en que lo ha sido el péptido de secuencia SEQ ID NO 1 (10 nM).

Ejemplo 8: efecto antihipertensivo del péptido de la invención

Los ratones usados en el presente ejemplo son idénticos a los descritos en el ejemplo 4.

- 10
- Se usan ratones con el fin de observar el efecto antihipertensivo del péptido de la invención. Se usan dos grupos de ratones (C57BL/6J), un grupo en el que se inyecta por vía intravenosa una solución fisiológica que comprende el péptido de la invención a una concentración de 10 y 100 nM y un segundo grupo (grupo testigo) que solo recibe la inyección intravenosa de la solución fisiológica sola. Se realiza la medida de la presión arterial por el principio del método del manguito caudal (Plehm, R., Barbosa, M.E. y Bader, M. (2006) "Animal models for hypertension/blood pressure recording". Methods Mol. Med., 129, (Ref 15)).

Ejemplo 9: efecto antiproliferativo del péptido de la invención

Se usan células cancerosas de próstata LNCAP con el fin de observar el efecto antiproliferativo del péptido de la invención.

- 20
- El medio de cultivo usado es el medio RPMI 1640 (BioWhittaker SA, Verviers, Bélgica), suplementado con L-glutamina 5 mM (Sigma-Aldrich, L'Isle d'Abeau, Francia) y 10 % de FBS (Applera France SA, Courtaboeuf, Francia) como se indica en el documento Gackière F, Bidaux G, Delcourt P, Van Coppenolle F, Katsogiannou M, Dewailly E, Bavencoffe A, Van Chuoï-Mariot MT, Mauroy B, Prevarskaya N, Mariot P. (2008) "CaV3.2 T-type calcium channels are involved in calcium-dependent secretion of neuroendocrine prostate cancer cells". J. Biol. Chem., 283(15): 10162-73. (Ref 16).

Se usan dos condiciones de células:

- 25
- una condición en la que las células se cultivan en diferentes ensayos en presencia del péptido de la invención a concentraciones de 10, 30, 100, 300, 1000 nM, y
 - una segunda condición (testigo) sin péptido.

- 30
- Se realiza la medida de la proliferación celular mediante el método CellTrace (marca comercial) CFSE (Invitrogen (marca registrada)) basado en la incorporación del trazador fluorescente CFSE por las células cultivadas y por una medida por citometría de flujo de las células marcadas.

Listas de referencias

- Ref 1** Bourinet, E., *et al.*, "Silencing of the CaV3.2 T-type calcium channel gene in sensory neurons demonstrates its major role in nociception". Embo J., 2005. 24(2) : pág. 315-24.
- 35 **Ref 2** Jiménez, C., Bourinet, E., Leuranguer, V., Richard, S., Snutch, T.P. y Nargeot, J. (2000) "Determinants of voltage-dependent inactivation affect Mibefradil block of calcium channels". Neuropharmacology, 39, 1-10.
- Ref 3** Sambrook, Fritsch y Maniatis, "Molecular cloning, A laboratory manual" 2ª edición, Cold spring Harbor Laboratory Press, 1989.
- Ref 4** "Fmoc solid Phase peptide synthesis, a practical approach", publicado por W.C. Chan et P. D. White, Oxford university press, 2000.
- 40 **Ref 5** Altier, C., Dubel, S.J., Barrère, C., Jarvis, S.E., Stotz, S.C., Spaetgens, R.L., Scott, J.D., Cornet, V., De Waard, M., Zamponi, G.W., Nargeot, J. y Bourinet, E. (2002) "Trafficking of L-type calcium channels mediated by the postsynaptic scaffolding protein AKAP79". J. Biol. Chem., 277, 33598-33603.
- 45 **Ref 6** Dubel, S.J., Altier, C., Chaumont, S., Lory, P., Bourinet, E. and Nargeot, J. (2004) "Plasma Membrane Expression of T-type Calcium Channel {alpha}1 Subunits Is Modulated by High Voltage-activated Auxiliary Subunits". J. Biol. Chem., 279, 29263-29269.
- Ref 7** "Pharmacie galénique" de A. LEHIR (Ed. Masson, 1992 (6ª edición).

- Ref 8** Taylor, J.T., Zeng, X.B., Pottle, J.E., Lee, K., Wang, A.R., Yi, S.G., Scruggs, J.A., Sikka, S.S. y Li, M. (2008) "Calcium signaling and T-type calcium channels in cancer cell cycling". World J. Gastroenterol., 14, 4984-4991.
- Ref 9** Chen, C.C., Lamping, K.G., Nuno, D.W., Barresi, R., Prouty, S.J., Lavoie, J.L., Cribbs, L.L., England, S.K., Sigmund, C.D., Weiss, R.M., Williamson, R.A., Hill, J.A. y Campbell, K.P. (2003) "Abnormal coronary function in mice deficient in alpha1H T-type Ca²⁺ channels". Science, 302, 1416-1418.
- Ref 10** Winterfield JR, Swartz KJ. (2000) "A hot spot for the interaction of gating modifier toxins with voltage-dependent ion channels". J. Gen. Physiol., 116(5): 637-44.)
- Ref 11** Panner A, Cribbs LL, Zainelli GM, Origitano TC, Singh S, Wurster RD. (2005) "Variation of T-type calcium channel protein expression affects cell division of cultured tumor cells". Cell Calcium, 37(2): 105-19.
- Ref 12** Lu F, Chen H, Zhou C, Liu S, Guo M, Chen P, Zhuang H, Xie D, Wu S. (2008) "T-type Ca²⁺ channel expression in human esophageal carcinomas: a functional role in proliferation" Cell Calcium. 43(1): 49-58.
- Ref 13** Taylor JT, Huang L, Pottle JE, Liu K, Yang Y, Zeng X, Keyser BM, Agrawal KC, Hansen JB, Li M (2008) "Selective blockade of T-type Ca²⁺ channels suppresses human breast cancer cell proliferation". Cancer Lett., 18; 267(1): 116-24.
- Ref 14** John M. Walker. "The Protein Protocols Handbook", Humana Press 1996 (ISBN 0-89603-339-2).
- Ref 15** Plehm, R., Barbosa, M.E. yBader, M. (2006) "nimal models for hypertension/blood pressure recording" Methods Mol. Med. 129.
- Ref 16** Gackière F, Bidaux G, Delcourt P, Van Coppenolle F, Katsogiannou M, Dewailly E, Bavencoffe A, Van Chuoï-Mariot MT, Mauroy B, Prevarskaya N, Mariot P.(2008) "CaV3.2 T-type calcium channels are involved in calcium-dependent secretion of neuroendocrine prostate cancer cells". J. Biol. Chem., 283(15): 10162-73.
- Ref 17** Han KK, Martinage A (1992) "Post-translational chemical modification(s) of proteins". Int. J. Biochem. 24(1): 19-28; Walsh G, Jefferis R (2006) "Post-translational modifications in the context of therapeutic proteins", Nature Biotechnology - 24, 1241-1252.
- Ref 18** Escoubas P. (2006) "Molecular diversification in spider venoms: a web of combinatorial peptide libraries". Mol Divers. 10(4): 545-54.

<220>
 <221> característica_misc
 <222> (6)..(6)
 <223> Y es C o T
 5
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (9)..(9)
 <223> R es A o G
 10
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (12)..(12)
 <223> R es A o G
 15
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (15)..(16)
 <223> Y es C o T
 20
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (18)..(18)
 <223> n es a, c, g o t
 25
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (24)..(24)
 <223> n es a, c, g o t
 30
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (27)..(27)
 <223> Y es C o T
 35
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (30)..(30)
 <223> Y es C o T
 40
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (31)..(31)
 <223> W es A o T
 45
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (32)..(32)
 <223> S es C o G
 50
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (33)..(33)
 <223> n es a, c, g o t
 55
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (36)..(36)
 <223> R es A o G
 60
 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (37)..(37)
 <223> M es A o C
 65
 <220>

- <221> característica_misc
- <222> (39)..(39)
- <223> n es a, c, g o t

- 5 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (42)..(42)
- <223> n es a, c, g o t

- 10 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (45)..(45)
- <223> Y es C o T

- 15 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (48)..(48)
- <223> Y es C o T

- 20 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (51)..(51)
- <223> R es A o G

- 25 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (54)..(54)
- <223> n es a, c, g o t

- 30 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (55)..(55)
- <223> Y es C o T

- 35 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (57)..(57)
- <223> n es a, c, g o t

- 40 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (60)..(60)
- <223> n es a, c, g o t

- 45 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (63)..(63)
- <223> Y es C o T

- 50 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (64)..(64)
- <223> M es A o C

- 55 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (66)..(66)
- <223> n es a, c, g o t

- 60 <220>
- <221> característica_misc
- <222> (67)..(67)
- <223> Y es C o T

- 65 <220>
- <221> característica_misc

ES 2 524 564 T3

<222> (69)..(69)
 <223> n es a, c, g o t

<220>
 5 <221> característica_misc
 <222> (75)..(75)
 <223> Y es C o T

<220>
 10 <221> característica_misc
 <222> (78)..(78)
 <223> R es A o G

<220>
 15 <221> característica_misc
 <222> (81)..(81)
 <223> H es A o C

<220>
 20 <221> característica_misc
 <222> (84)..(84)
 <223> Y es C o T

<400> 3

25 **taytgycara arttyytntg gacntgygay wsnrgarmgnc cntgytgyga rggnytngtn 60**

tgymgnytnt ggtgyarat haay 84

<210> 4
 <211> 2481
 30 <212> ADN
 <213> Artificial

<220>
 <223> Plásmido pT7-7

35 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (428)..(428)
 <223> n es a, c, g o t

40 <220>
 <221> característica_misc
 <222> (435)..(435)
 <223> n es a, c, g o t

45 <400> 4

aattctcatg tttgacagct tatcatcgat aagcttgggc tgcaggtcga ctctagagga 60

ES 2 524 564 T3

tccccgggcg cgaattctag ccatatgtat atctccttct taaagttaaa caaaattatt 120
 tctagaggga aaccgttggtg gtctccctat agtgagtcgt attaatttcg aagtctatca 180
 gaagttcga tgcgtgggcc tcgctggtt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat 240
 gcagctccc gagacggta cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagccc 300
 tcagggcgcg tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggcgca gccatgacct agtcacgtag 360
 cgatagcgga gtgtatatac tggcttaact atgcggcctc agagcagatt gtactgagag 420
 tgcaccanag atctntgcgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca 480
 tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgtcgcg ctcggtcggt cggctgcggc 540
 gagcggatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataaac 600
 caggaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt 660
 tgctggcgtt tttccatagg ctccgcccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgtcaa 720
 gtcagaggtg gcgaaaccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct 780
 ccctcgtgcg ctctcctggt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc 840
 cttcgggaag cgtggcgctt tctcaatgct cacgctgtag gtatctcagt tcgggttagg 900
 tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aacccccgt tcagcccagc cgctgcgctt 960
 tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtagaca cgacttatcg cactggcag 1020
 cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga 1080
 agtggtggcc taactacggc taaactagaa ggacagtatt tggatctgc gctctgctga 1140
 agccagttac cttcgaaaa agagttggtg gctcttgatc cggcaaaaa accaccgctg 1200
 gtagcgggtg tttttttggt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaaa ggatctcaag 1260
 aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag 1320
 ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta attcttgaag 1380
 acgaaagggc ctcgtgatac gcctatTTTT ataggTTaat gtcagataa taatggtttc 1440
 ttagacgtca ggtggcactt ttcggggaaa tgtgcgcgga acccctattt gtttattttt 1500
 ctaaatacat tcaaatatgt atccgctcat gagacaataa ccctgataaa tgcttcaata 1560

ES 2 524 564 T3

atattgaaaa aggaagagta tgagtattca acatttccgt gtcgccctta ttcccttttt 1620
 tgcggcattt tgccttcctg tttttgctca cccagaaacg ctggtgaaag taaaagatgc 1680
 tgaagatcag ttgggtgcac gagtgggtta catcgaactg gatctcaaca gcggtgaagat 1740
 ccttgagagt tttcgccccg aagaacgttt tccaatgatg agcactttta aagttctgct 1800
 atgtggcgcg gtattatccc gtgttgacgc cgggcaagag caactcggtc gccgcataca 1860
 ctattctcag aatgacttgg ttgagtactc accagtcaca gaaaagcatc ttacggatgg 1920
 catgacagta agagaattat gcagtgctgc cataaccatg agtgataaca ctgcggccaa 1980
 cttacttctg acaacgatcg gaggaccgaa ggagctaacc gcttttttgc acaacatggg 2040
 ggatcatgta actcgccttg atcgttggga accggagctg aatgaagcca taccaaacga 2100
 cgagcgtgac accacgatgc ctgtagcaat ggcaacaacg ttgcgcaaac tattaactgg 2160
 cgaactactt actctagctt cccggcaaca attaatagac tggatggagg cggataaagt 2220
 tgcaggacca cttctgcgct cggcccttcc ggctggctgg tttattgctg ataaatctgg 2280
 agccggtgag cgtgggtctc gcggtatcat tgcagcactg gggccagatg gtaagccctc 2340
 ccgtatcgta gttatctaca cgacggggag tcaggcaact atggatgaac gaaatagaca 2400
 gatcgtgag ataggtgcct cactgattaa gcattggtaa ctgtcagacc aagtttactc 2460
 atatatactt tagattgatt t 2481

<210> 5
 <211> 4969
 <212> ADN
 <213> Artificial

5

<220>
 <223> Plásmido pGex-4-T1

10

<400> 5

acgttatcga ctgcacggtg caccaatgct tctggcgtca ggcagccatc ggaagctgtg 60
 gtatggctgt gcaggtcgta aatcactgca taattcgtgt cgctcaaggc gcactcccgt 120
 tctggataat gttttttgcg ccgacatcat aacggttctg gcaaatattc tgaaatgagc 180
 tgttgacaat taatcatcgg ctcgtataat gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca 240

ES 2 524 564 T3

cacaggaac agtattcatg tcccctatac taggttattg gaaaattaag ggccttgtgc 300
aaccactcg acttcttttg gaatatcttg aagaaaaata tgaagagcat ttgtatgagc 360
gcatgaagg tgataaatg cgaaacaaaa agtttgaatt gggtttgag tttccaatc 420
ttccttatta tattgatggt gatgttaaat taacacagtc tatggccatc atacgttata 480
tagctgacaa gcacaacatg ttgggtggtt gtccaaaaga gcgtgcagag atttcaatgc 540
ttgaaggagc ggttttggat attagatacg gtgtttcgag aattgcatat agtaaagact 600
ttgaaactct caaagtgtat tttcttagca agctacctga aatgctgaaa atgttcgaag 660
atcgtttatg tcataaaaca tatttaaatg gtgatcatgt aaccatcct gacttcatgt 720
tgatgacgc tcttgatggt gttttataca tggaccaat gtgcctggat gcgttcccaa 780
aattagtttg ttttaaaaaa cgtattgaag ctatcccaca aattgataag tacttgaat 840
ccagcaagta tatagcatgg cttttgcagg gctggcaagc cacgtttggt ggtggcgacc 900
atcctccaaa atcggatctg gttccgcgtg gatccccgga attcccgggt cgactcgagc 960
ggccgcatcg tgactgactg acgatctgcc tcgcgcttt cggatgatgac ggtgaaaacc 1020
tctgacacat gcagctcccg gagacggtca cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca 1080
gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggcgca gccatgacct 1140
agtcacgtag cgatagcggg gtgtataatt cttgaagacg aaaggcctc gtgatacgcc 1200
tatttttata ggttaatgct atgataataa tggtttctta gacgtcaggt ggcacttttc 1260
ggggaaatgt gcgcggaacc cctatttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc 1320
cgctcatgag acaataacct tgataaatg ttcaataata ttgaaaagg aagagtatga 1380
gtattcaaca tttccgtgct gcccttattc cttttttgc ggcattttgc cttcctggtt 1440
ttgctcacc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag 1500
tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag 1560
aacgttttcc aatgatgagc acttttaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgtg 1620
ttgacgccgg gcaagagcaa ctgggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggtg 1680
agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca 1740

ES 2 524 564 T3

gtgctgccat aacctatgagt gataaactg cggccaactt acttctgaca acgatcggag 1800
 gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc 1860
 gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg 1920
 cagcaatggc aacaacgttg cgcaactat taactggcga actacttact cttagcttccc 1980
 ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc aggaccactt ctgcgctcgg 2040
 cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc cggtgagcgt gggctctcgcg 2100
 gtatcattgc agcaactggg ccagatggta agccctcccg tatcgtagtt atctacacga 2160
 cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac 2220
 tgattaagca ttgtaactg tcagaccaag ttactcata tatactttag attgatttaa 2280
 aacttcattt ttaatttaa aggatctagg tgaagatcct ttttgataat ctcatgacca 2340
 aatccctta acgtgagttt tcgttccact gagcgtcaga ccccgtagaa aagatcaaag 2400
 gatcttcttg agatcctttt tttctgcgcg taatctgctg cttgcaaaca aaaaaaccac 2460
 cgctaccagc ggtggtttgt ttgccggatc aagagctacc aactcttttt ccgaaggtaa 2520
 ctgcttcag cagagcgcag ataccaaata ctgtccttct agtgtagccg tagttaggcc 2580
 accacttcaa gaactctgta gcaccgccta catacctcgc tctgctaate ctgttaccag 2640
 tggctgctgc cagtggcgat aagtcgtgtc ttaccgggtt ggactcaaga cgatagttac 2700
 cggataaggc gcagcggtcg ggctgaacgg ggggttcgctg cacacagccc agcttggagc 2760
 gaacgacctc caccgaactg agatacctac agcgtgagct atgagaaagc gccacgcttc 2820
 ccgaaggag aaaggcggac aggtatccgg taagcggcag ggtcggaaaca ggagagcgca 2880
 cgagggagct tccaggggga aacgcctggt atctttatag tcctgtcggg tttcgcacc 2940
 tctgacttga gcgtcgattt ttgtgatgct cgtcaggggg gcggagccta tggaaaaacg 3000
 ccagcaacgc ggccttttta cggttcctgg cttttgctg gccttttct cacatgttct 3060
 ttctgcggtt atcccctgat tctgtggata accgtattac cgcctttgag tgagctgata 3120
 ccgctcggc cagccgaacg accgagcgca gcgagtcagt gagcggaggaa gcggaagagc 3180
 gcctgatgcg gtattttctc cttacgcate tgtcgggtat ttcacaccgc ataaattccg 3240

ES 2 524 564 T3

acaccatcga atggtgcaaa acctttcgcg gtatggcatg atagcgcccg gaagagagtc 3300
 aattcagggg ggtgaatgtg aaaccagtaa cgttatacga tgtcgcagag tatgccggtg 3360
 tctcttatca gaccgtttcc cgcgtggtga accaggccag ccacgtttct gcgaaaacgc 3420
 gggaaaaagt ggaagcggcg atggcggagc tgaattacat tcccaaccgc gtggcacaac 3480
 aactggcggg caaacagtcg ttgctgattg gcgttgccac ctccagtctg gccctgcacg 3540
 cgccgtcga aattgtcgcg gcgattaaat ctcgccgca tcaactgggt gccagcgtgg 3600
 tgggtgcatg ggtagaacga agcggcgtcg aagcctgtaa agcggcgggt cacaatcttc 3660
 tcgcgcaacg cgtcagtggt ctgatcatta actatccgct ggatgaccag gatgccattg 3720
 ctgtggaagc tgcctgcaact aatgttccgg cgttatttct tgatgtctct gaccagacac 3780
 ccatcaacag tattattttc tcccatgaag acggtacgcg actgggcgtg gagcatctgg 3840
 tcgcattggg tcaccagcaa atcgcgctgt tagcgggccc attaagttct gtctcggcgc 3900
 gtctcgtct ggctggctgg cataaatatc tcaactcgaa tcaaattcag ccgatagcgg 3960
 aacgggaagg cgactggagt gccatgtccg gttttcaaca aaccatgcaa atgctgaatg 4020
 agggcatcgt tcccactgcg atgctggtt ccaacgatca gatggcgtg ggcgcaatgc 4080
 gcgccattac cgagtccggg ctgcgcgttg gtgcggatat ctcggtagt ggatacgacg 4140
 ataccgaaga cagctcatgt tatatcccgc cgtaaccac catcaaacag gattttcgcc 4200
 tgctggggca aaccagcgtg gaccgcttg tcgaactctc tcagggccag gcggtgaagg 4260
 gcaatcagct gttgccgctc tcaactgtga aaagaaaaac caccctggcg cccaatcgc 4320
 aaaccgcctc tcccgcgcg ttggccgatt cattaatgca gctggcacga caggtttccc 4380
 gactggaaag cgggcagtga gcgcaacgca ataatgtga gttagctcac tcattaggca 4440
 ccccaggctt tacactttat gcttccggt cgatgtttgt gtggaattgt gagcggataa 4500
 caatttcaca caggaaacag ctatgacat gattacggat tcaactggccg tcgttttaca 4560
 acgtcgtgac tgggaaaacc ctggcgttac ccaacttaat cgccttgca cacatcccc 4620
 tttcgccagc tggcgtaata gcgaagaggc ccgcaccgat cgccttccc aacagttgcg 4680
 cagcctgaat ggcgaatggc gctttgcctg gtttccggca ccagaagcgg tgccggaaag 4740
 ctggctggag tgcgatcttc ctgaggccga tactgtcgtc gtcccccaa actggcagat 4800
 gcacggttac gatgcgccc tctacaccaa cgtaacctat cccattacgg tcaatccgcc 4860
 gttgttccc acggagaatc cgacgggtt ttactcgtc acatttaatg ttgatgaaag 4920
 ctggctacag gaaggccaga cgcgaattat ttttgatggc gttggaatt 4969

5 <210> 6
 <211> 5900

ES 2 524 564 T3

<212> ADN
 <213> Artificial

5 <220>
 <223> Plásmido pET32

<400> 6

```

atccggatat agttcctcct ttcagcaaaa aaccctcaa gaccggtta gaggcccaa      60
ggggttatgc tagttattgc tcagcgggtg cagcagccaa ctcagcttcc tttcgggctt    120
tgtagcagc cggatctcag tggtaggtg ggtggtgctc gagtgcggcc gcaagcttgt    180
cgacggagct cgaattcggg tccgatatca gccatggcct tgcgctcgtc gtcggtaccc    240
agatctgggc tgtccatgtg ctggcgttcg aatttagcag cagcggtttc tttcatacca    300
gaaccgcgtg gcaccagacc agaagaatga tgatgatgat ggtgcatatg gccagaacca    360
gaaccggcca ggtagcgtc gaggaactct ttcaactgac ctttagacag tgcaccact     420
ttggttgccg ccacttcacc gttttgaac agcagcagag tcgggatacc acggatgcca    480
tatttcggcg cagtgccagg gttttgatcg atgttcagtt ttgcaacggt cagtttgccc    540
tgatattcgt cagcgatttc atccagaatc ggggcgatca ttttgacgg accgcaccac    600
tctgccaga aatcgacgag gatcgccccg tccgcttga gtacatccgt gtcaaaactg    660
tcgtcagtca ggtgaataat tttatcgctc atatgtatat ctccttctta aagttaaaca    720
aaattatttc tagaggggaa ttgttatccg ctcaaatc ccctatagtg agtcgtatta    780
atctcgggg atcgagatcg atctgatcc tctacgccgg acgcatcgtg gccggcatca    840
ccggcggcac aggtgcggtt gctgggcctc atatcgccga catcaccgat ggggaagatc    900
gggctcgcca cttcgggctc atgagcgctt gtttcggcgt gggtatggtg gcaggccccg    960
    
```

10

ES 2 524 564 T3

tggccggggg actgttgggc gccatctcct tgcattgcacc attccttgcg gcggcgggtgc	1020
tcaacggcct caacctacta ctgggctgct tcctaattgca ggagtcgcat aagggagagc	1080
gtcagatcc cggacacccat cgaatggcgc aaaacctttc gcggtatggc atgatagcgc	1140
ccggaagaga gtcaattcag ggtggtgaat gtgaaaccag taacgttata cgatgtcgca	1200
gagtatgccg gtgtctctta tcagaccggt tcccgcgtgg tgaaccaggc cagccacggt	1260
tctgcgaaaa cgcgggaaaa agtgggaagcg gcgatggcgg agctgaatta cattcccaac	1320
cgcggtggcac aacaactggc gggcaaacag tcgttgctga ttggcgttgc cacctccagt	1380
ctggccctgc acgcgccgtc gcaaattgtc gcggcgatta aatctcgcgc cgatcaactg	1440
ggtgccagcg tgggtgtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taaagcggcg	1500
gtgcacaatc ttctcgcgca acgcgtcagt gggctgatca ttaactatcc gctggatgac	1560
caggatgcca ttgctgtgga agctgcctgc actaatgttc cggcgttatt tcttgatgtc	1620
tctgaccaga cacccatcaa cagtattatt ttctcccatg aagacggtac gcgactgggc	1680
gtggagcatc tggtcgatt gggtcaccag caaatcgcgc tgttagcggg cccattaagt	1740
tctgtctcgg cgcgctcgcg tctggctggc tggcataaat atctcactcg caatcaaatt	1800
cagccgatag cggaacggga aggcgactgg agtgccatgt ccggttttca acaaaccatg	1860
caantgtga atgagggcat cgttcccact gcgatgctgg ttgccaacga tcagatggcg	1920
ctgggcgcaa tgcgcgccat taccgagtcc gggctgcgcg ttggtgcgga catctcggta	1980
gtgggatacg acgataccga agacagctca tgttatatcc cgccgttaac caccatcaaa	2040
caggattttc gcctgctggg gcaaaccagc gtggaccgct tgctgcaact ctctcagggc	2100
caggcgggtga agggcaatca gctgttggcc gtctcactgg tgaaaagaaa aaccaccctg	2160
gcgccaata cgcaaaccgc ctctccccgc gcgttggccg attcattaat gcagctggca	2220
cgacaggttt cccgactgga aagcgggcag tgagcgaac gcaattaatg taagttagct	2280
cactcattag gcaccgggat ctcgaccgat gccctgaga gccttcaacc cagtcagctc	2340
cttccggtgg gcgcggggca tgactatcgt cgccgcactt atgactgtct tctttatcat	2400
gcaactcgta ggacaggtgc cggcagcgtc ctgggtcatt ttcggcgagg accgctttcg	2460

ES 2 524 564 T3

ctggagcgcg acgatgatcg gcctgctcgt tgcggtatcc ggaatcttgc acgccctcgc 2520
 tcaagccttc gtcactggtc ccgccaccaa acgtttcggc gagaagcagg ccattatcgc 2580
 cggcatggcg gccccacggg tgcgcatgat cgtgctcctg tcgttgagga cccggctagg 2640
 ctggcggggt tgccttactg gttagcagaa tgaatcaccg atacgcgagc gaacgtgaag 2700
 cgactgctgc tgcaaacctg ctgcgacctg agcaacaaca tgaatggtct tcggtttccg 2760
 tgtttcgtaa agtctggaag cgcggaagtc agcggcctgc accattatgt tccggatctg 2820
 catcgcagga tgctgctggc taccctgtgg aacacctaca tctgtattaa cgaagcgtg 2880
 gcattgacct tgagtgattt ttctctggtc ccgccgcatc cataaccgca gttgtttacc 2940
 ctcaaacctg tccagtaacc gggcatgttc atcatcagta acccgatcgc tgagcatcct 3000
 ctctcgtttc atcggatca ttaccccat gaacagaaat ccccttaca cggaggcatc 3060
 agtgaccaa caggaaaaa ccgcccttaa catggccgc tttatcagaa gccagacatt 3120
 aacgcttctg gagaaactca acgagctgga cgcggatgaa caggcagaca tctgtgaatc 3180
 gcttcacgac cacgctgatg agctttaccg cagctgcctc gcgcgtttcg gtgatgacgg 3240
 tgaaaacctc tgacacatgc agctcccgga gacggtcaca gcttgtctgt aagcggatgc 3300
 cgggagcaga caagcccgtc agggcgcgtc agcgggtggt ggcgggtgtc ggggcgcagc 3360
 catgaccag tcacgtagcg atagcggagt gtatactggc ttaactatgc ggcacagag 3420
 cagattgtac tgagagtgca ccatatatgc ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga 3480
 gaaaataccg catcaggcgc tcttccgctt cctcgtcac tgactcgtg cgctcggctg 3540
 ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact caaaggcggg aatacgggta tccacagaat 3600
 caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag caaaaggcca gaaaaggcc aggaaccgta 3660
 aaaaggccgc gttgctggcg tttttccata ggctccgcc ccctgacgag catcacaaaa 3720
 atcgacgctc aagtcagagg tggcgaacc cgacaggact ataaagatac caggcgtttc 3780
 cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg ttccgacct gccgcttacc ggatacctgt 3840
 ccgcctttct cccttcggga agcgtggcgc tttctcatag ctacgctgt aggtatctca 3900
 gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg gctgtgtgca cgaaccccc gttcagcccg 3960

ES 2 524 564 T3

accgctgcg cttatccggt aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga cacgacttat 4020
cgccactggc agcagccact ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta ggcggtgcta 4080
cagagttcct gaagtgggtg cctaactacg gctacactag aaggacagta tttggtatct 4140
gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa aaagagttgg tagctcttga tccggcaaac 4200
aaaccaccgc tggtagcggg ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg cgcagaaaaa 4260
aaggatctca agaagatcct ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag tggaacgaaa 4320
actcacgtta aggatatttg gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt 4380
taaattaaaa atgaagtttt aatcaatct aaagtatata tgagtaaact tggctgaca 4440
gttaccaatg cttaatcagt gaggcaccta tctcagcgat ctgtctatct cgttcatcca 4500
tagttgcctg actccccgtc gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta ccatctggcc 4560
ccagtgtgct aatgataccg cgagaccac gtcaccggc tccagattta tcagcaataa 4620
accagccagc cggaagggcc gagcgcagaa gtggctctgc aactttatcc gcctccatcc 4680
agtctattaa ttgttgccgg gaagctagag taagtagttc gccagttaat agtttgcgca 4740
acgttggtgc cattgctgca ggcacgtgg tgtcacgctc gtcgtttggg atggcttcat 4800
tcagctccgg ttcccaacga tcaaggcgag ttacatgata ccccatggtg tgcaaaaaag 4860
cggtagctc cttcggctct ccatcgttg tcagaagtaa gttggccgca gtgttatcac 4920
tcatggttat ggcagcactg cataattctc ttactgtcat gccatccgta agatgctttt 4980
ctgtgactgg tgagtactca accaagtcac tctgagaata gtgtatgcgg cgaccgagtt 5040
gctcttgccc ggcgtcaata cgggataata ccgcgccaca tagcagaact taaaagtgc 5100
tcatcattgg aaaacgttct tcggggcgaa aactctcaag gatcttaccg ctgttgagat 5160
ccagttcgat gtaaccact cgtgcacca actgatcttc agcatctttt actttcacca 5220
gcgtttctgg gtgagcaaaa acaggaaggc aaaatgccgc aaaaaagga ataaggcgca 5280
cacggaatg ttgaatactc atactcttcc tttttcaata ttattgaagc atttatcagg 5340
gttattgtct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataa caaatagggg 5400
ttccgcgcac atttccccga aaagtccac ctgaaattgt aaacgttaat attttgtaa 5460

ES 2 524 564 T3

aattcgcggt aaatTTTTgt taaatcagct cattttttaa ccaataggcc gaaatcggca	5520
aaatccctta taaatcaaaa gaatagaccg agatagggtt gagtgttggt ccagtttggg	5580
acaagagtcc actattaag aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa accgtctatc	5640
agggcgatgg cccactacgt gaaccatcac cctaatcaag tttttgggg tcgaggtgcc	5700
gtaaagcact aaatcgggaa cctaaagggg gcccccgatt tagagcttga cggggaaagc	5760
cggcgaacgt ggcgagaaag gaaggggaaga aagcgaaggg agcgggcgct agggcgctgg	5820
caagtgtagc ggtcacgctg cgcgtaacca ccacaccgc cgcgcttaat gcgcccgtac	5880
agggcgcgtc ccattcgcca	5900

REIVINDICACIONES

1. Péptido de secuencia aminoacídica
YCQKFLWTCDSERPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1).

2. Ácidos nucleicos que codifican el péptido definido en la reivindicación 1.

5 3. Ácido nucleico según la reivindicación 2, en el que la secuencia de ácido nucleico es

**5' TAY TGY CAR AAR TTY YTN TGG ACN TGY GAY WSN GAR MGN
CCN TGY TGY GAR GGN YTN GTN TGY MGN YTN TGG TGY AAR
ATH AAY 3' (SEQ ID N°3)**

en las que A es adenosina, C es citidina, G es guanosina, T es timidina y H es A o C o T, M es A o C, N es A o C o G o T, R es A o G, S es C o G, W es A o T e Y es C o T:

10 4. Sistema de expresión que comprende un plásmido y/o un vector de expresión que comprende un ácido nucleico según la reivindicación 2.

5. Péptido antagonista de un canal de calcio de tipo T de secuencia aminoacídica:

YCQKFLWTCDSERPCCEGLVCRLWCKIN (SEQ ID NO 1).

6. Péptido antagonista de un canal de calcio de tipo T según la reivindicación 5, en el que dicho canal es un canal elegido del grupo que comprende el canal Cav3.2 y el canal Cav3.1.

15 7. Péptido según la reivindicación 1, para su uso como medicamento.

8. Péptido según la reivindicación 1, para su uso en el tratamiento del dolor.

9. Péptido según la reivindicación 1, para su uso como medicamento analgésico.

10. Procedimiento de síntesis del péptido según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una etapa de síntesis química sobre soporte sólido o una etapa de síntesis por recombinación genética.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Secuencia de pT7-7:

AATTCATGTTTGGACAGCTTATCATCGATAAGCTTGGGCTGCAGGTCGACTCTAGAGGATCCCCGGGCGCGAAT
TCTAGCCATATGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAGGGAAACCGTTGTGGTCTCCCTAT
AGTGAGTCGTATTAATTTTGAAGTCTATCAGAAGTTTGAATCGCTGGGCCTCGCGCGTTTCGGTGATGACGGTGA
AAACCTCTGACACATGCAGCTCCCGGAGACGGTACAGCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGGAGCAGACAAGCCCG
TCAGGGCGCGTCAGCGGGTGTGGCGGGTGTGGGGCGCAGCCATGACCAGTCACGTAGCGATAGCGGAGTGTA
TATACTGGCTTAACTATGCGGCATCAGAGCAGATTGTACTGAGAGTGCACCANAGATCTNTGCGGTGTGAAATAC
CGCACAGATGCGTAAGGAGAAAATACCGCATCAGGCGCTCTTCCGCTTCCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGG
TCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACG
CAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCC
ATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTAT
AAAGATACCAGGCGTTTCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACC
TGCCGCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCAGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGG
TCGTTCCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCGTTACGCCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACATC
GTCTTGAGTCCAACCCGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGA
GGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTA
TCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTG
GTAGCGGTGGTTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCT
TTTCTACGGGTCTGACGCTCAGTGGAAACGAAAACCTCACGTTAAGGGATTTTGGTTCATGAGATTATCAAAAAGGA
TCTTCACCTAGATCCTTTTAATTCTTGAAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCCTATTTTTATAGGTTAATGTCAT
GATAATAATGGTTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTATTTTT
CTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAA
GAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTGCCCCCTATTCCTTTTTTGGCGCATTTTGCCTTCTGTTTTTGCTCA
CCCAGAAACGCTGGTGAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCT
CAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCT
ATGTGGCGCGGTATTATCCCGTGTGACGCCGGCAAGAGCAACTCGGTGCGCGCATACACTATTCTCAGAATGA
CTTGGTTGAGTACTACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGC
CATAACCATGAGTGATAAACTGCGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTT
TTTGACAACATGGGGGATCATGTAACCTGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGA
CGAGCGTGACACCACGATGCCTGTAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACCTATTAAGTGGCGAACTACTTACTCT
AGCTTCCCGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCC
GGCTGGCTGGTTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCC
AGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACA
GATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACGTGCAGACCAAGTTTACTCATATATACTTTAGAT
TGATTT

Figura 6 (1/2)

Secuencia de pGex-4-T1:

ACGTTATCGACTGCACGGTGCACCAATGCTTCTGGCGTCAGGCAGCCATCGGAAGCTGTGGTATGGCTGTGCAGG
 TCGTAAATCACTGCATAATTCGTGTGCTCAAGGCGCACTCCCCTTCTGGATAATGTTTTTTCGCCCGACATCAT
 AACGGTCTGGCAAAATATTCGAAATGAGCTGTTGACAATTAATCATCGGCTCGTATAATSTGTGGAATTGTGAG
 CGGATAACAATTCACACAGGAAACAGTATTCATGTCCCCATACTAGGTTATTGGAAAATTAAGGGCCTTGTGC
 AACCCACTCGACTTCTTTTGGAAATATCTTGAAGAAAAATATGAAGAGCATTGTATGAGCGCGATGAAGGTGATA
 AATGGCGAAACAAAAAGTTTGAATTGGGTTTGGAGTTTCCCAATCTTCTTATTATATTGATGGTGTATGTTAAAT
 TAACACAGTCTATGGCCATCATACGTTATATAGCTGACAAGCACAAACATGTTGGGTGGTTGTCCAAAAGAGCGTG
 CAGAGATTTCAATGCTTGAAGGAGCGGTTTTGGATATTAGATACGGTGTTCGAGAAATTGCATATAGTAAAGACT
 TTGAAACTCTCAAAGTTGATTTTCTTAGCAAGCTACCTGAAATGCTGAAAATGTTCGAAGATCGTTTATGTCATA
 AAACATATTTAAATGGTGTATGTAACCCATCCTGACTTCATGTTGTATGACGCTCTTGATGTTGTTTTATACA
 TGGACCCAATGTGCCTGGATGCGTTCCCAAAATTAGTTTTGTTTTAAAAAACGTATTGAAGCTATCCACAAAATTG
 ATAAGTACTTGAAATCCAGCAAGTATATAGCATGGCCTTTGCAGGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTGGTGGCGACC
 ATCCTCCAAAATCGGATCTGTGTTCCGCGTGGATCCCCGGAATTCGCCGGTTCGACTCGAGCGGCCGCATCGTGACT
 GACTGACGATCTGCCTCGCGCGTTTTCGGTGATGACGGTGAAAAACCTCTGACACATGCAGCTCCCGGAGACGGTCA
 CAGCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGGAGCAGACAAGCCCGTCAGGGCGCGTCAGCGGGTGTGGCGGGTGTCCGG
 GCGCAGCCATGACCCAGTCACGTAGCGATAGCGGAGTGTATAATTCTTGAAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCC
 TATTTTTATAGGTTAATGTCATGATAATAATGGTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCG
 GAACCCCTATTTGTTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGC
 TTCAATAATATTGAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTTTTTCGGGCAT
 TTTGCCCTTCCGTGTTTTTGTCTACCCAGAAAACGCTGGTGAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAG
 TGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGA
 TGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTGTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCCGC
 GCATACACTATTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTCACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGACAG
 TAAGAGAATTTATGCAGTGTGCCATAACCATGAGTGATAACACTGCGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAG
 GACCGAAGGAGCTAACCCTTTTTTGCACAACATGGGGGATCATGTAACCTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGC
 TGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCGTCAGCAATGGCAACAACGTTGCGCAAACCTAT
 TAACTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGCAACAATTAATAGACTGGATGGAGCGGATAAAGTTGCAGGAC
 CACTTCTGGGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGCG
 GTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACSGGGAGTCAGGCAA
 CTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGSTAACCTGTCAGACCAAG
 TTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACCTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTG
 ATAATCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAG
 GATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGG
 TTTGTTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACCTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAATA

Figura 6 (2/2)

CTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGC
 TAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTAC
 CGGATAAGGGCGCAGCGGTCTGGGCTGAACGGGGGGTTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCG
 AACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGG
 TAAGCGGCAGGGTCTGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTG
 TCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACG
 CCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCC
 CTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCA
 GCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTAC
 ACCGCATAAATTCGACACCATCGAATGGTGCAAAACCTTTCGCGGTATGGCATGATAGCGCCCGGAAGAGAGTC
 AATTCAGGGTGGTGAATGTGAAACCAGTAACGTTATACGATGTCGCAGAGTATGCCGGTGTCTCTTATCAGACCG
 TTCCCGCGTGGTGAACCAGGCCAGCCACGTTTCTGCGAAAACGCGGGAAAAGTGGAAGCGGCGATGGCGGAGC
 TGAATTACATCCCAACCGCGTGGCACAACAACCTGGCGGGCAAACAGTCGTTGCTGATTGGCGTTGCCACCTCCA
 GTCTGGCCCTGCACGCGCCGTGCAAAATGTGCGGGCGATTAAATCTCGCGCCGATCAACTGGGTGCCAGCGTGG
 TGGTGTGATGGTAGAACGAAGCGGCGTCAAGCCTGTAAAGCGGCGGTGCACAATCTTCTCGCGCAACGCGTCA
 GTGGGCTGATCATTAACTATCCGCTGGATGACCAGGATGCCATTGCTGTGGAAGCTGCCTGCACTAATGTTCCGG
 CGTTATTTCTTGATGTCTCTGACCAGACACCCATCAACAGTATTATTTTCTCCCATGAAGACGGTACGCGACTGG
 GCGTGGAGCATCTGGTCGATTGGGTCACCAGCAAATCGCGCTGTTAGCGGGCCCATTAAGTTCTGTCTCGGGCG
 GTCTGCGTCTGGCTGGCTGGCATAAATATCTCACTCGCAATCAAATTCAGCCGATAGCGGAACGGGAAGGCGACT
 GGAGTGCCATGTCCGGTTTTCAACAAACCATGCAAATGCTGAATGAGGGCATCGTTCCCACTGCGATGCTGGTTG
 CCAACGATCAGATGGCGCTGGGCGCAATGCGCGCCATTACCGAGTCCGGGCTGCGCGTTGGTGGCGATATCTCGG
 TAGTGGGATACGACGATACCGAAGACAGCTCATGTTATATCCCGCCGTTAACCACCATCAAACAGGATTTTCGCC
 TGCTGGGGCAAACCAGCGTGGACCGCTTGCTGCAACTCTCTCAGGGCCAGGCGGTGAAGGGCAATCAGCTGTTGC
 CCGTCTCACTGGTGAAGAAAGAAAACCACCCTGGCGCCCAATACGCAAACCGCCTCTCCCGCGCGTTGGCCGATT
 CATTAAATGCAGCTGGCACGACAGGTTTCCCGACTGGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACGCAATTAATGTGAGTTAG
 CTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAA
 CAATTCACACAGGAAACAGCTATGACCATGATTACGGATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGA
 AAACCCTGGCGTTAÇCCAACCTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGC
 CCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGAATGGCGAATGGCGCTTTCCTGGTTTCCGGCACCGA
 AGCGGTGCCGAAAGCTGGCTGGAGTGGGATCTTCCCTGAGGCGGATACTGTGTCGTCGCCCTCAAACCTGGCAGAT
 GCACGGTTACGATGCGCCCATCTACACCAACGTAACCTATCCCATTACGGTCAATCCGCCGTTTGTTCACCGGA
 GAATCCGACGGGTTGTTACTCGCTCACATTTAATGTTGATGAAAGCTGGCTACAGGAAGGCCAGACGCGAATTAT
 TTTTGATGGCGTTGGAATT

Figura 7 (1/3)

Secuencia de pET32

atccggatatagttccctcctttcagcaaaaaacccctcaagaccggttagaggccccaaggggttatgctagtt
 attgctcagcgggtggcagcagccaactcagcttcccttccgggctttgttagcagccggatctcagtggtgggtgg
 ggtgggtgctcgagtgccggccgaagcttgcgacggagctcgaattccggatccgatatcagccatggccttgcg
 tcgctcgctcggtaaccagatctgggctgtccatgtgctggcgttcgaatttagcagcagcggtttctttcatacca
 gaaccgctggcaccagaccagaagaatgatgatgatgatgggtgcataatggccagaaccagaaccggccaggtta
 gcgctcagaggaactctttcaactgaccttagacagtgcaaccactttgggtgcccggcacttcaccgtttttgaac
 agcagcagagtcgggataccacgggatgccatatttcgggagcagtgccagggttttgatcgatggtcagttttgca
 acggtcagtttgcctgatattcgtcagcagatttcatecagaatcggggcgatcattttgcacggaccgcaccac
 tctgcccagaaatcgacgaggatcgccccgtccgctttgagtacatccgtgtcaaaaactgtcgtcagtcaggtga
 ataattttatcgctcatatgtatatactccttcttaaagttaaacaaaattatcttagaggggaattggtatccg
 ctcaacaattcccctatagtgagtcgtattaatttcgggggatcgagatcgatctcgatcctctacgcccggacgca
 tcgctggccggcatcaccggcgccacaggtgcggttgcctggcgccctatatcgccgacatcaccgatggggaagatc
 gggctcgccacttcgggctcatgagcgttgtttcggcggtgggtatgggtggcaggccccgtggccgggggactgt
 tgggcgccatctccttgcattgcaccattccttgcggcgggcggtgctcaacggcctcaacctactactgggctgct
 tcctaatgcaggagtcgcataagggagagcgtcgagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaaaccttccgggt
 atggcatgatagcggcgggaagagagtcgaattcaggggtggatgaatgtgaaaccagtaacgttatacagatgtcgca
 gagtatgcgggtgtctcttatcagaccggttcccgcggtggatgaaccaggccagccacgttctcgcgaaaaacggg
 gaaaaagtggaaagcggcgatggcggaagctgaattacattcccacccgctggcacaacaactggcggggcaaacag
 tcgttgcgtgattggcgttggccacctccagctcggccctgcacgcgcccgtcgcaaatgtcgcggcgattaaatct
 cgcgccgatcaactgggtgccagcgtgggtgggtgcgatggtagaacgaagcggcgctcgaagcctgtaaagcggcg
 gtgcacaatctctcgcgcaacgcgctcagtgggctgatcattaactatccgctggatgaccaggatgccattgct
 gtggaagctgcctgcaactaatgttccggcggtatctcttgatgtctctgaccagacaccatcaacagattatt
 ttctcccatgaagacggtacgcgactggcggtggagcatctggtcgcattgggtcaccagcaaatcgcgctgta
 gcggggccattaagttctgtctcggcgcgctcgcgctcggctggctggcataaatatctcactcgcaatcaaat
 cagccgatagcggaaacgggaaggcgactggagtgccatgtccggttttcaacaaaccatgcaaatgctgaatgag
 ggcactcgttcccactgcgatgctgggttgcacaacgatcagatggcgctggcgcaatgcgcgccattaccgagtc
 gggctgcgcgcttgggtgcggaacatctcggtagtgggatacgcagataccgaagacagctcatggttatatcccggc
 ttaaccaccatcaaacaggattttcgctgctggggcaaacaccagcgtggaccgcttgcctgcaactctctcagggc
 caggcgggtgaagggcaatcagctgttgcctgctcactgggtgaaaagaaaaaccacctggcgcccaatacgc
 accgctctccccgcgcttggccgattcattaatgcagctggcacgacaggttcccgactggaaagcgggag
 tgagcgcaacgcaattaatgtaagtttagctcactcattaggcaccgggatctcgaccgatgcccttgagagcctt
 caaccagtcagctccttccgggtgggcgcggggcatgactatcgtcgcgcacttatgactgtcttctttatcat
 gcaactcgtaggacaggtgccggcagcgtctgggtcattttcggcgaggaccgcttccgctggagcgcgacgat

Figura 7 (2/3)

gatcggcctgtcgettgcggtattcggaaatcttgacgcccctcgcctcaagccttcgtcactgggtcccggccaccaa
acgtttcggcgagaagcaggccattatcgccggcatggggggccccacgggtgcgcatgatcgtgctcctgtcgtt
gaggaccggctaggtggcggggttgccctactgggttagcagaatgaatcacggatacgcgagcgaacgtgaag
cgaactgctgctgcaaacgtctgcgacctgagcaacaacatgaatggctcttcgggtttccggtgttcgtaaagtct
ggaaacgcggaagtgcgcccctgcaccattatgttcggatctgcacgcaggatgctgctggctaccctgtgg
aacacctacatctgtattaacgaagcgtggcattgaccctgagtgattttctctgggtcccggccgcatccatac
cgccagttgtttaccctcacaacgttccagtaaccgggcatggtcatcatcagtaaccggtatcgtgagcatcct
ctctcgtttcatcggtatcattacccccatgaacagaaatcccccttacacggaggcatcagtgaccaaacagga
aaaaaccgccccttaacatggcccgtttatcagaagccagacattaacgcttctgggaaaactcaacgagctgga
cgcggatgaacaggcagacatctgtgaatcgcttcacgaccacgctgatgagctttaccgcagctgctcgcgcg
ttcgggtgatgacggtgaaaacctctgacacatgcagctcccggagacggtcacagcttgctctgtaagcggatgc
cgggagcagacaagcccgtcagggcgcgctcagcgggtgttggcgggtgtcggggcgcagccatgaccagtcacg
tagcgatagcggagtgtatactggcttaactatgcggcatcagagcagattgtactgagagtgcaccatataatgc
ggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaaataccgcatcaggcgtcttccgcttctcgcctcactgact
cgctgcgctcggctcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaat
caggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcttgc
tggcgtttttccataggctcccggcccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtgcagaggtggcgaaacc
cgacaggactataaagataccaagcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgacctgccc
ttaccggataacctgtccgctttctcccttcgggaagcgtggcgtttctcatagctcacgctgtaggtatctca
gttcgggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcaagcaacccccggttcagcccagccgctgccccttat
ccggtaactatcgtcttgagtcacaaccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaaacagga
ttagcagagcagaggtatgtaggcgggtgctacagagttcttgaagtgggtggcctaactacggctacactagaagga
cagtatcttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaac
aaaccaccgctggtagcgggtggttttttggtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaggatctcaagaag
atcctttgatctttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaaactcacgttaagggattttgggtcatgagat
tatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaatataaaatgaagtttaaatcaatctaaagtataatgagt
aaacttggctctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgtctgtctatttcggtcatcca
tagttgctgactcccgtcgtgtagataactacgatacgggagggttaccatctggccccagtgctgcaatga
taccgcgagaccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaaggccgagcgcagaa
gtggctcctgcaactttatccgctccatccagttatataattggtgcccgggaagctagagtaagtagttcggcag
ttaatagtttgcgcaacggttggttgccattgctgcaggcatcgtgggtgtcacgctcgtcgtttgggtatggcttcat
tcagctccgggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatccccatggtgtgcaaaaaagcgggttagctccttcg
gtcctccgatcgtttgcaagaagtaagttggccgcagtggtatcactcatgggttatggcagcactgcataattctc
ttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtgta
tgccggcagccaggttgccttgcggcgctcaatacgggataataaccgcgccacatagcagaactttaaagtgc

Figura 7 (3/3)

tcattcattggaaaacggttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctggtgagatccagttcgatgtaac
 ccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttaactttaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggc
 aaaatgccgcgcaaaaaaggggaataagggcgacacggaaatggtgaatactcatactcttctcttttcaatattatt
 gaagcatttatcaggggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaatagggg
 ttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgaaattgtaaacgttaatattttgttaaaaattcgcggttaaatt
 tttgttaaatcagctcatttttaaccaataggccgaaatcggcaaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccg
 agataggggttgagtgttgttccagtttggacaagagtcactattaagaacgtggactccaacgtcaaagggc
 gaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcacctaatacaagtttttggggtcgaggtgcc
 gtaagcactaaatcggaaccctaaagggagccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaaacgtggcga
 gaaaggaaggaagaaagcgaaaggagcggcgctagggcgctggcaagtgtagcgggtcacgctgcgcgtaacca
 ccacacccgcgcgcttaatgcgcgcgtacagggcgctcccattcgcca

Figura 8

Inhibición de Cav3.2 recombinante
 Péptido sintético frente al natural