

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 532 634**

51 Int. Cl.:

C12N 15/113 (2010.01)

A61K 31/7105 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **13.01.2009** **E 09788160 (1)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **24.12.2014** **EP 2344637**

54 Título: **Procedimientos y medios para el salto eficiente del exón 45 en el pre-ARNm de la distrofia muscular de Duchenne**

30 Prioridad:

27.10.2008 WO PCT/NL2008/050673

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

30.03.2015

73 Titular/es:

PROSENSA TECHNOLOGIES B.V. (50.0%)

J.H. Oortweg 21

2333 CH Leiden, NL y

ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN (50.0%)

72 Inventor/es:

DE KIMPE, JOSEPHUS JOHANNES;

PLATENBURG, GERARDUS JOHANNES;

VAN DEUTEKOM, JUDITH CHRISTINA

THEODORA;

AARTSMA-RUS, ANNEMIEKE y

VAN OMMEN, GARRIT-JAN BOUDEWIJN

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

ES 2 532 634 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Procedimientos y medios para el salto eficiente del exón 45 en el pre-ARNm de la distrofia muscular de Duchenne

Campo

5 La invención se refiere al campo de la genética, más específicamente de la genética humana. La invención en particular se refiere a la modulación de ajustamiento en el pre-ARNm de la distrofia muscular de Duchenne humana.

Antecedentes de la invención

10 Las miopatías son trastornos que dan como resultado dificultad funcional de músculos. Distrofia muscular (MD) hace referencia a enfermedades genéticas que se caracterizan por debilidad y degeneración progresiva de los músculos esqueléticos. La distrofia muscular de Duchenne (DMD) y la distrofia muscular de Becker (BMD) son las formas infantiles más comunes de distrofia muscular. Son trastornos recesivos y debido a que el gen responsable de DMD y BMD reside en el cromosoma X, las mutaciones afectan principalmente a varones con una incidencia de aproximadamente 1 de cada 3500 niños.

15 DMD y BMD están causadas por defectos genéticos en el gen DMD que codifica distrofina, una proteína muscular que se requiere para interacciones entre el citoesqueleto y la matriz extracelular para mantener estabilidad de las fibras musculares durante la contracción. DMD es un trastorno grave, neuromuscular letal que da como resultado una dependencia del apoyo de una silla de ruedas antes de la edad de 12 años y los pacientes de DMD mueren frecuentemente antes de la edad de treinta debido a fallo respiratorio o a fallo cardiaco. En contraste, los pacientes de BMD frecuentemente mantienen su capacidad de andar hasta más adelante en su vida, y tienen expectativas de vida cercanas a las normales. Las mutaciones de DMD en el gen DMD se caracterizan principalmente por inserciones de cambio de marco o por deleciones o por mutaciones puntuales sin sentido, que dan como resultado la ausencia de distrofina funcional. Las mutaciones de BMD en general mantienen el marco de lectura intacto, permitiendo síntesis de una distrofina parcialmente funcional.

20 Durante la última década, la modificación específica de ajustamiento con el fin de restaurar la fase de lectura alterada del transcrito de DMD ha surgido como una terapia prometedora para distrofia muscular de Duchenne (DMD) (van Ommen, van Deutekom, Aartsma-Rus, Curr Opin Mol Ther. 2008; 10(2): 140-9, Yokota, Duddy, Partidge, Acta Myol. 2007; 26(3): 179-84, van Deutekom et al., N Engl J Med. 2007; 357(26): 2677-86).

25 Usando oligonucleótidos antisentido (AON) que interfieren con señales de ajustamiento se puede inducir el salto de exones específicos en el pre-ARNm de DMD, restaurando así la fase de lectura abierta y convirtiendo la DMD grave en un fenotipo de BMD más leve (van Deutekom et al. Hum Mol Genet. 2001; 10: 1547-54; Aartsma-Rus et al., Hum Mol Genet 2003; 12(8): 907-14.). *In vivo* la prueba de concepto se obtuvo primero en el modelo de ratón de *mdx*, que es deficiente en distrofina debido a una mutación sin sentido en el exón 23. Las inyecciones intramuscular e intravenosa de AON que tienen como objetivo el exón mutado 23 restauran la expresión de distrofina durante al menos tres meses (Lu et al. Nat Med. 2003; 8: 1009-14; Lu et al., Proc Natl Acad Sci EE.UU. 2005;102(1): 198-203). Esto se acompañó de restauración de proteínas asociadas a distrofina en la membrana de fibras así como de mejora funcional del músculo tratado. El salto *in vivo* de exones humanos se ha logrado en el modelo de ratón de hDMD, que contiene una copia completa del gen DMD humano integrado en el cromosoma 5 del ratón (Bremmer-Bout et al. Molecular Therapy. 2004; 10: 232-40; t Hoen et al. J Biol Chem. 2008; 283: 5899-907).

30 Como la mayoría de los pacientes de DMD tienen deleciones que se agrupan en zonas críticas, el salto de un número pequeño de exones es aplicable a números de pacientes relativamente grandes. La aplicabilidad real de el salto de exones puede determinarse por deleciones, duplicaciones y mutaciones puntuales comunicadas en bases de datos de mutaciones de DMD tales como la base de datos de mutación de DMD de Leiden disponible en www.dmd.nl. El salto terapéutico del exón 45 del pre-ARNm de DMD restauraría la fase de lectura abierta de pacientes de DMD que tienen deleciones incluyendo pero no limitadas a exones 12-44, 18-44, 44, 46, 46-47, 46-48, 46-49, 46-51, 46-53, 46-55, 46-59, 46-60 del pre-ARNm de DMD, que tienen lugar en un total del 16 % de todos los pacientes de DMD con una deleción (Aartsma-Rus y van Deutekom, 2007, Antisense Elements (Genetics) Research Focus, 2007 Nova Science Publishers, Inc.). Además, para algunos pacientes de DMD se requiere el salto simultáneo de uno o más exones además del exón 45, tales como los exones 51 o 53 para restaurar la fase de lectura correcta. Ejemplos no limitantes incluyen pacientes con una deleción de exones 46-50 que requieren el co-salto de los exones 45 y 51, o con una deleción de exones 46-52 que requieren el co-salto de los exones 45 y 53.

35 Recientemente, se completó exitosamente un primer estudio en seres humanos donde un AON que induce el salto del exón 51 se inyectó en un área pequeña del músculo tibialis anterior de cuatro pacientes de DMD. Se observó expresión de distrofina novedosa en la mayoría de las fibras musculares en todos los cuatro pacientes tratados y el AON fue seguro y bien tolerado (van Deutekom et al. N Engl J Med. 2007; 357: 2677-86).

40 La mayoría de los AON estudiados contienen hasta 20 nucleótidos y se ha argüido que este tamaño relativamente pequeño mejora la distribución tisular y/o la penetración celular de un AON. Sin embargo, tales AON cortos darán como resultado una especificidad limitada debida a un riesgo incrementado de la presencia de secuencias idénticas en otra parte en el genoma y una unión al objetivo limitada o una afinidad al objetivo limitada debida a una energía libre

baja del complejo objetivo de AON. Por lo tanto los autores de la invención decidieron diseñar oligonucleótidos antisentido nuevos y opcionalmente mejorados que no deberían presentar todos estos inconvenientes.

El documento WO2007/135105 divulga dos oligonucleótidos antisentido de menos de 21 nucleótidos que tienen como objetivo una subregión de SEC ID N.º: 2 del exón 45 del pre-ARNm de distrofina.

5 Descripción de la invención

Procedimiento

En un primer aspecto, la invención proporciona un procedimiento para inducir y/o promover el salto del exón 45 del pre-ARNm en un paciente, preferentemente en una célula aislada de dicho paciente, comprendiendo el procedimiento proporcionar a dicha célula y/o a dicho paciente un oligonucleótido antisentido que comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N.º: 3.

De acuerdo con ello, se suministra en este acto un procedimiento para inducir y/o promover salto del exón 45 de pre-ARNm de DMD, preferentemente en una célula aislada de un paciente, comprendiendo el procedimiento proveer a dicha célula y/o a dicho paciente con dichos oligonucleótidos antisentido.

Se entenderá que dicho procedimiento abarca un procedimiento *in vitro*, *in vivo* o *ex vivo*.

15 Según se define en el presente documento un pre-ARNm de DMD preferentemente quiere decir el pre-ARNm de un gen DMD o de un paciente de DMD o de BMD. El gen o la proteína de DMD corresponde al gen o la proteína de la distrofina.

Un paciente se desea preferentemente para querer decir un paciente que tiene DMD o BMD según se define más adelante en el presente documento o un paciente susceptible de desarrollar DMD o BMD debido a su origen genético.

20 En la divulgación, salto del exón se refiere a la inducción en una célula de un ARNm maduro que no contiene un exón particular que normalmente está presente en él. El salto del exón se logra proporcionando una célula que expresa el pre-ARNm de dicho ARNm con una molécula capaz de interferir con secuencias tales como, por ejemplo, la secuencia donante de ajustamiento o la secuencia aceptora de ajustamiento que se requieren ambas para mejorar el procedimiento enzimático de ajustamiento, o una molécula que es capaz de interferir con una señal de inclusión de exón requerida para el reconocimiento de un tramo de nucleótidos como un exón a incluirse en el ARNm. El término pre-ARNm se refiere a un ARNm precursor no procesado o procesado parcialmente que se sintetiza a partir de una plantilla de ADN en el núcleo celular por transcripción.

30 Dentro del contexto de la invención inducir y/o promover salto de un exón como se indica en el presente documento quiere decir que al menos el 1 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o más del ARNm de DMD en una o más células (musculares) de un paciente tratado no contendrá dicho exón. Esto se valora preferentemente por PCR según se define en los ejemplos.

35 Preferentemente, un procedimiento de la invención induciendo o promoviendo salto del exón 45 del pre-ARNm de la DMD en una o más células de un paciente proporciona a dicho paciente una proteína distrofina funcional y/o disminuye la producción de una proteína de distrofina aberrante en dicho paciente. Por lo tanto un procedimiento preferido es un procedimiento, en el que un paciente o una célula de dicho paciente se provee con una proteína distrofina muscular funcional y/o en el que la producción de una proteína distrofina aberrante en dicho paciente o en una célula de dicho paciente se disminuye. La disminución de la producción de la distrofina aberrante se puede valorar en el nivel de ARNm y quiere decir preferentemente que el 99 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 %, 10 %, 5 % o menos de la cantidad inicial de ARNm de distrofina aberrante, es aún detectable por RT-PCR. Un ARNm de distrofina aberrante o una proteína distrofina aberrante se refiere también en el presente documento como un ARNm de distrofina o una proteína distrofina no funcional. Una proteína distrofina no funcional es preferentemente una proteína distrofina que no es capaz de unir actina y/o miembros del complejo proteico DGC. Una proteína distrofina no funcional o un ARNm de distrofina no funcional típicamente no tiene, o no codifica una proteína de distrofina con un extremo C-terminal intacto de la proteína.

45 Incrementar la producción de una distrofina funcional en dicho paciente o en una célula de dicho paciente puede valorarse en el nivel de ARNm (por análisis de RT-PCR) y preferentemente quiere decir que una cantidad detectable de un ARNm de distrofina funcional es detectable por RT-PCR. En otra realización, el 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o más del ARNm de distrofina detectable es un ARNm de distrofina funcional. Incrementar la producción de una distrofina funcional en dicho paciente o en una célula de dicho paciente puede valorarse en el nivel de proteína (por análisis de inmunofluorescencia y por análisis de bandas de western) y preferentemente quiere decir que una cantidad detectable de una proteína distrofina funcional es detectable por análisis de inmunofluorescencia o por análisis de bandas de western. En otra realización, el 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o más de la proteína distrofina detectable es una proteína distrofina funcional.

55 Según se define en el presente documento, una distrofina funcional es preferentemente una distrofina de tipo silvestre que corresponde a una proteína que tiene la secuencia de aminoácidos como se identifica en la SEC ID N.º: 1. Una

5 distrofina funcional es preferentemente una distrofina, que tiene un dominio de unión a actina en su parte N-terminal (primeros 240 aminoácidos en el extremo N-terminal), un dominio rico en cisteína (aminoácidos 3361 hasta 3685) y un dominio C-terminal (últimos 325 aminoácidos en el extremo C-terminal) estando presente cada uno de estos dominios en una distrofina de tipo silvestre como se conoce por la persona experta. Los aminoácidos indicados en el presente documento corresponden a aminoácidos de la distrofina de tipo silvestre que están representados por SEC ID N.º: 1.

10 En otras palabras, una distrofina funcional es una distrofina que presenta al menos en algún grado una actividad de una distrofina de tipo silvestre. "Al menos en algún grado" preferentemente quiere decir al menos al 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 95 % o 100 % de una actividad correspondiente de una distrofina funcional de tipo silvestre. En este contexto, una actividad de una distrofina funcional es preferentemente unirse a actina y al complejo glucoproteico asociado a distrofina (DGC) (Aartsma-Rus A et al, (2006), Entries in the leiden Duchenne Muscular Dystrophy mutation database: an overview of mutation types and paradoxical cases that confirm the reading-frame rule, Muscle Nerve, 34: 135-144). La unión de distrofina a actina y al complejo DGC puede visualizarse bien por co-inmunoprecipitación usando extractos de proteína totales o bien por análisis de inmunofluorescencia de secciones transversales, a partir de una biopsia muscular, como se conoce por la persona experta.

15 Individuos o pacientes que sufren de distrofia muscular de Duchenne tienen típicamente una mutación en el gen DMD que impide síntesis de la proteína de distrofina completa, es decir una parada prematura impide la síntesis del extremo C-terminal. En la distrofia muscular de Becker el gen DMD también comprende una mutación comparado con el gen de tipo silvestre pero la mutación típicamente no induce una parada prematura y el extremo C-terminal típicamente se sintetiza. Como un resultado se sintetiza una proteína distrofina funcional que tiene al menos la misma actividad en clase que la proteína de tipo silvestre, aunque no necesariamente la misma cantidad de actividad. El genoma de un individuo con BMD codifica típicamente una proteína de distrofina que comprende la parte N-terminal (primeros 240 aminoácidos en el extremo N-terminal), un dominio rico en cisteínas (aminoácidos 3361 hasta 3685) y un dominio C-terminal (últimos 325 aminoácidos en el extremo C-terminal) pero su dominio en forma de barra central puede ser más corto que el de una distrofina de tipo silvestre (Aartsma-Rus A et al, (2006), Entries in the leiden Duchenne Muscular Dystrophy mutation database: an overview of mutation types and paradoxical cases that confirm the reading-frame rule, Muscle Nerve, 34: 135-144). El salto del exón para el tratamiento de DMD está orientada típicamente a superar una parada prematura en el pre-ARNm omitiendo un exón en el dominio central en forma de barra para corregir el marco de lectura y para permitir la síntesis del resto de la proteína distrofina incluyendo el extremo C-terminal, aunque la proteína es algo menor como resultado de un dominio de barra menor. En una realización preferida, un individuo que tiene DMD y que se está tratando por un procedimiento según se define en el presente documento estará provisto de una distrofina que presente al menos en algún grado una actividad de una distrofina de tipo silvestre. Más preferentemente, si dicho individuo es un paciente de Duchenne o se sospecha que puede ser un paciente de Duchenne, una distrofina funcional es una distrofina de un individuo que tiene BMD: típicamente dicha distrofina es capaz de interactuar tanto con actina como con el DGC, pero su dominio central en forma de barra puede ser más corto que el de una distrofina de tipo silvestre (Aartsma-Rus A et al, (2006), Entries in the leiden Duchenne Muscular Dystrophy mutation database: an overview of mutation types and paradoxical cases that confirm the reading-frame rule, Muscle Nerve, 34: 135-144). El dominio con forma de barra central de distrofina de tipo silvestre comprende 24 repeticiones similares a espectrina (Aartsma-Rus A et al, (2006), Entries in the leiden Duchenne Muscular Dystrophy mutation database: an overview of mutation types and paradoxical cases that confirm the reading-frame rule, Muscle Nerve, 34: 135-144). Por ejemplo, un dominio con forma de barra central de una distrofina como se proporciona en el presente documento puede comprender 5 a 23, 10 a 22 o 12 a 18 repeticiones similares a espectrina así como puede unirse a actina y a DGC.

45 Un procedimiento de la invención puede aliviar una o más características de una célula muscular de un paciente de DMD que comprende deleciones que incluyen pero no se limitan a exones 12-44, 18-44, 44, 46, 46-47, 46-48, 46-49, 46-51, 46-53, 46-55, 46-59, 46-60 del pre-ARNm de DMD de dicho paciente (Aartsma-Rus y van Deutekom, 2007, Antisense Elements (Genetics) Research Focus, 2007 Nova Science Publishers, Inc) así como de pacientes de DMD que requieren el salto simultáneo de uno o más exones además del exón 45 que incluyen pero no se limitan a pacientes con una deleción de exones 46-50 que requieren el co-salto de los exones 45 y 51, o con una deleción de exones 46-52 que requieren el co-salto de los exones 45 y 53.

50 En una realización preferida, uno o más síntoma(s) o característica(s) de una célula miogénica o de una célula muscular de un paciente de DMD se alivia(n). Tales síntomas o características pueden evaluarse al nivel celular, al nivel tisular o en el propio paciente.

55 Un alivio de uno o más síntomas o características puede valorarse por cualquiera de los siguientes ensayos en una célula miogénica o célula muscular de un paciente: captación de calcio reducida por células musculares, síntesis de colágeno disminuida, morfología alterada, biosíntesis de lípidos alterada, estrés oxidativo disminuido, y/o función de fibras musculares, integridad, y/o supervivencia mejoradas. Estos parámetros se valoran usualmente usando análisis de inmunofluorescencia y/o análisis de histoquímica de secciones transversales de biopsias musculares. La mejora de la función, de la integridad y/o de la supervivencia de fibras musculares se puede valorar usando al menos uno de los siguientes ensayos: una disminución detectable de creatina cinasa en la sangre, un decrecimiento detectable de necrosis de fibras musculares en una sección transversal de biopsia de un músculo sospechoso de ser distrófico, y/o un incremento detectable de la homogeneidad del diámetro de fibras musculares en una sección transversal de biopsia de un músculo sospechoso de ser distrófico. Cada uno de estos ensayos se conoce por la persona experta.

Se puede detectar en sangre creatina cinasa según se describe en Hodgetts et al (Hodgetts S., et al, (2006), Neuromuscular Disorders, 16: 591-602, 2006). Un decrecimiento detectable en creatina cinasa puede querer decir un decrecimiento del 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o más comparado con la concentración de creatina cinasa en un mismo paciente de DMD antes del tratamiento.

5 Un decrecimiento detectable de necrosis de fibras musculares se valora preferentemente en una biopsia muscular, más preferentemente como se describe en Hodgetts et al (Hodgetts S., et al, (2006), Neuromuscular Disorders, 16: 591-602, 2006) usando secciones transversales de biopsia. Un decrecimiento detectable de necrosis puede ser un decrecimiento del 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % o más del área en la que se ha identificado necrosis usando secciones transversales de biopsias. El decrecimiento se mide por comparación con la necrosis como se valora en un mismo paciente de DMD antes de tratamiento.

10 Un incremento detectable de la homogeneidad del diámetro de fibras musculares se valora preferentemente en una sección transversal de biopsia muscular, más preferentemente según se describe en Hodgetts et al (Hodgetts S., et al, (2006), Neuromuscular Disorders, 16: 591-602, 2006). El incremento se mide por comparación con la homogeneidad del diámetro de fibras musculares en una sección transversal de biopsia muscular de un mismo paciente de DMD antes del tratamiento.

15 Un alivio de uno o más síntomas o características puede valorarse por cualquiera de los siguientes ensayos en el propio paciente: prolongación del tiempo hasta la pérdida de la marcha, mejora de la fuerza muscular, mejora de la capacidad para levantar peso, mejora del tiempo tomado para levantarse del suelo, mejora en el tiempo para caminar nueve metros, mejora en el tiempo tomado para subir cuatro escalones, mejora del grado de función de la pierna, mejora de la función pulmonar, mejora de la función cardíaca, mejora de la calidad de vida. Cada uno de estos ensayos se conoce por la persona experta. Como un ejemplo, la publicación de Manzur et al (Manzur AY et al, (2008), Glucocorticoid corticosteroids for Duchenne muscular dystrophy (revisión), Wiley publishers, The Cochrane collaboration.) da una explicación extensa de cada uno de estos ensayos. Para cada uno de estos ensayos, tan pronto como se ha encontrado una mejora o prolongación detectable de un parámetro medido en un ensayo, ello querrá decir preferentemente que uno o más síntomas de la Distrofia Muscular de Duchenne se han aliviado en un individuo usando un procedimiento de la invención. La mejora o prolongación detectable es preferentemente una mejora estadísticamente significativa o una prolongación según se describe en Hodgetts et al (Hodgetts S., et al, (2006), Neuromuscular Disorders, 16: 591-602, 2006). Alternativamente, el alivio de uno o más síntoma(s) de la Distrofia Muscular de Duchenne puede valorarse midiendo una mejora de una función, de la integridad y/o de la supervivencia de fibras musculares según se define más tarde en el presente documento.

20 Un tratamiento en un procedimiento de acuerdo con la invención puede tener una duración de al menos una semana, al menos un mes, al menos varios meses, al menos un año, al menos 2, 3, 4, 5, 6 años o más. La frecuencia de administración de un oligonucleótido antisentido, una composición, un compuesto de la invención puede depender de varios parámetros tales como la edad del paciente, el tipo de mutación, el número de moléculas (dosis), la formulación de dicha molécula. La frecuencia puede variarse entre al menos una vez en un periodo de tiempo de dos semanas, o de tres semanas o de cuatro semanas o de cinco semanas o en un periodo de tiempo más largo. Cada oligonucleótido antisentido o equivalente del mismo según se define en el presente documento para uso de acuerdo con la invención puede ser adecuado para administración directa a una célula, tejido y/o un órgano *in vivo* de individuos afectados por o en riesgo de desarrollar DMD y puede administrarse directamente *in vivo*, *ex vivo* o *in vitro*. Un oligonucleótido antisentido como se usa en el presente documento puede ser adecuado para administración a una célula, tejido y/o un órgano *in vivo* de individuos afectados por o en riesgo de desarrollar DMD y puede administrarse *in vivo*, *ex vivo* o *in vitro*. Dicho oligonucleótido antisentido puede administrarse directamente o indirectamente a una célula, tejido y/o un órgano *in vivo* de un individuo afectado por o en riesgo de desarrollar DMD y puede administrarse directa o indirectamente *in vivo*, *ex vivo* o *in vitro*. Como la distrofia muscular de Duchenne tiene un fenotipo pronunciado en células musculares, se prefiere que dichas células sean células musculares, se prefiere adicionalmente que dicho tejido sea un tejido muscular y/o se prefiere adicionalmente que dicho órgano comprenda o consista en un tejido muscular. Un órgano preferido es el corazón. Preferentemente dichas células comprenden un gen que codifica una proteína distrofina mutante. Preferentemente dichas células son células de un individuo que sufre de DMD.

40 Un oligonucleótido antisentido o equivalente del mismo puede administrarse como está a una célula. Cuando se administra dicho oligonucleótido antisentido o equivalente del mismo a un individuo, se prefiere que esté disuelto en una solución que es compatible con el procedimiento de administración. Para administración intravenosa, subcutánea, intramuscular, intratecal y/o intraventricular se prefiere que la solución sea una solución salina fisiológica. Se prefiere particularmente para un procedimiento de la invención el uso de un excipiente que potenciará adicionalmente la administración de dicho oligonucleótido antisentido o equivalente funcional del mismo según se define en el presente documento, a una célula y dentro de una célula, preferentemente una célula muscular. El excipiente preferido se define en la sección titulada "composición farmacéutica". *In vitro*, los autores de la presente invención han obtenido resultados muy buenos usando polietilenimina (PEI, ExGen500, MBI Fermentas), como se muestra en el ejemplo.

50 En un procedimiento preferido de la invención, se usa un oligonucleótido antisentido adicional que es capaz de inducir y/o promover el salto de un exón distinto del pre-ARNm de DMD de un paciente. Preferentemente, el segundo exón se selecciona a partir de: exón 7, 44, 46, 51, 53, 59, 67 del pre-ARNm de la distrofina de un paciente. Oligonucleótidos antisentido que se pueden usar se representan en la tabla 2. Los oligonucleótidos antisentido preferidos comprenden o

consisten en cualquiera de los oligonucleótidos antisentido como se divulgan en la tabla 2. Varios oligonucleótidos antisentido se pueden usar también en combinación. De esta forma, se impide la inclusión de dos o más exones de un pre-ARNm de DMD en ARNm producido a partir de este pre-ARNm. Esta realización se refiere adicionalmente como salto del exón doble o de multi-exón (Aartsma-Rus A, Janson AA, Kaman WE, et al. Antisense-induced multiexon skipping for Duchenne muscular dystrophy makes more sense. Am J Hum Genet 2004; 74(1): 83-92, Aartsma-Rus A, Kaman WE, Weij R, den Dunnen JT, van Ommen GJ, van Deutekom JC. Exploring the frontiers of therapeutic exon skipping for Duchenne muscular dystrophy by double targeting within one or multiple exons. Mol Ther 2006; 14(3): 401-7). En la mayoría de los casos el salto del exón doble da como resultado la exclusión de solo los dos exones objetivo del pre-ARNm de la distrofina. Sin embargo, en otros casos se encontró que los exones objetivo y la región entera entre dichos exones en dicho pre-ARNm no están presentes en el ARNm producido incluso cuando otros exones (exones que intervienen) estaban presentes en tal región. Este multi-salto era principalmente así para la combinación de oligonucleótidos antisentido derivados del gen DMD, en la que un oligonucleótido antisentido para exón 45 y un oligonucleótido antisentido para exón 51 se añadieron a una célula que transcribe el gen DMD. Un diseño tal dio como resultado ARNm que se produce que no contiene exones 45 a 51. Aparentemente, la estructura del pre-ARNm en presencia de los oligonucleótidos antisentido mencionados fue tal que la maquinaria de ajustamiento se estimuló para conectar los exones 44 y 52 entre sí.

Es posible promover específicamente el salto de también los exones que intervienen proporcionando un enlace entre los dos oligonucleótidos antisentido complementarios. Así, en una realización tramos de nucleótidos complementarios a al menos dos exones de distrofina están separados por un resto de enlace. Los al menos dos tramos de nucleótidos están así unidos en esta realización tal como para formar una molécula individual.

Por si acaso, se usa más de un compuesto en un procedimiento de la invención, dichos compuestos se pueden administrar a un individuo en cualquier orden. En una realización, dichos compuestos se administran simultáneamente (significando que dichos compuestos se administran en el plazo de 10 horas, preferentemente en el plazo de una hora). Esto sin embargo no es necesario. En otra realización, dichos compuestos se administran secuencialmente.

Oligonucleótido antisentido

En un segundo aspecto, se proporciona un oligonucleótido antisentido para usar en un procedimiento según se describe en la sección anterior titulada "Procedimiento". Dicho oligonucleótido antisentido es preferentemente un oligonucleótido antisentido (AON) o un oligorribonucleótido antisentido.

Se encontró por los actuales investigadores que especialmente el exón 45 está específicamente omitido en una frecuencia alta usando un oligonucleótido antisentido que comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N.º: 3. Aunque este efecto puede asociarse con una afinidad de unión más alta de dicha molécula, comparada con una molécula que se une a un tramo continuo de menos de 21 nucleótidos, podría haber otros parámetros intracelulares implicados que favorezcan características termodinámicas, cinéticas, o estructurales del dúplex híbrido. En la divulgación, se puede usar una molécula que se une a un tramo continuo de al menos 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50 nucleótidos dentro de dicho exón.

En la divulgación, una molécula o un oligonucleótido de la invención que comprende una secuencia que es complementaria a una parte del exón 45 de pre-ARNm de DMD es tal que la parte complementaria es al menos el 50 % de la longitud del oligonucleótido, más preferentemente al menos el 60 %, incluso más preferentemente al menos el 70 %, incluso más preferentemente al menos el 80 %, incluso más preferentemente al menos el 90 % o incluso más preferentemente al menos el 95 %, o incluso más preferentemente el 98 % y lo más preferentemente hasta el 100 %. "Una parte del exón 45" preferentemente significa un tramo de al menos 21 nucleótidos. En la divulgación, un oligonucleótido consiste en una secuencia que es complementaria con parte de pre-ARNm de distrofina del exón 45 según se define anteriormente. Alternativamente, un oligonucleótido puede comprender una secuencia que es complementaria con parte de pre-ARNm de distrofina de exón 45 según se define en el presente documento y secuencias flanqueantes adicionales. En la divulgación, la longitud de dicha parte complementaria de dicho oligonucleótido es de al menos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 nucleótidos. Se pueden usar diversos tipos de secuencias flanqueantes. En la divulgación, preferentemente se usan secuencias flanqueantes adicionales para modificar la unión de una proteína a dicha molécula u oligonucleótido, o para modificar una propiedad termodinámica del oligonucleótido, más preferentemente para modificar afinidad de unión a ARN objetivo. En otra realización preferida, secuencias flanqueantes adicionales son complementarias a secuencias del pre-ARNm de DMD que no están presentes en el exón 45. Tales secuencias flanqueantes son preferentemente complementarias a secuencias que comprenden o que consisten en las secuencias consensoceptoras o donantes de sitio de ajustamiento del exón 45. En una realización preferida, tales secuencias flanqueantes son complementarias a secuencias que comprenden o que consisten en secuencias de un intrón del pre-ARNm de DMD que es adyacente a exón 45; es decir intrón 44 o 45.

En la divulgación, un tramo continuo de al menos 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50 nucleótidos dentro del exón 45 se selecciona a partir de la secuencia:

5'- CCAGGAUGGCAUUGGGCAGCGGCAAACUGUUGUCAGA
ACAUGAAUGCAACUGGGGAAGAAUAAUUCAGCAAUC -3'

(SEC ID N.º: 2).

5 Se ha encontrado que una molécula que une a una secuencia de nucleótido que comprende o que consiste en un tramo continuo de al menos 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50 nucleótidos de SEC ID N.º: 2 da como resultado salto altamente eficiente de exón 45 en una célula proporcionada con esta molécula. Se encontró que moléculas que unen a una secuencia de nucleótidos que comprende un tramo continuo de menos de 21 nucleótidos de SEC ID N.º: 2 inducían salto del exón en una manera menos eficiente que las moléculas de la divulgación. Por lo tanto, en la divulgación, se proporciona un procedimiento en el que una molécula se une a un tramo continuo de al menos 21, 25, 30, 35 nucleótidos en SEC ID N.º: 2. Al contrario de lo que se piensa generalmente, los autores de la invención encontraron sorprendentemente que se pueden alcanzar una especificidad y una eficiencia de salto de exones más altas usando oligonucleótidos que tengan una longitud de al menos 21 nucleótidos. Ninguna de las secuencias indicadas se deriva de partes conservadas de sitios de unión-ajustamiento. Por lo tanto, no es probable que dicha molécula medie ajustamiento diferencial de otros exones del pre-ARNm de DMD o de exones de otros genes.

10 En la divulgación, una molécula de la invención capaz de interferir con la inclusión de exón 45 del pre-ARNm de DMD es una molécula de compuesto que se une a la secuencia especificada, o una proteína tal como una proteína de unión a ARN o una proteína de dedos de cinc que no se da en la naturaleza que se ha modificado para ser capaz de unirse a la secuencia de nucleótidos indicada en una molécula de ARN. Procedimientos para rastrear moléculas de compuestos que unen secuencias de nucleótidos específicas se divulgan por ejemplo en el documento PCT/NL01/00697 y en la patente de los EE.UU. 6875736, que se incluyen en el presente documento por referencia. 15
20 Procedimientos para diseñar proteínas de dedos de cinc de unión a ARN que se unen a secuencias de nucleótidos específicas se divulgan por Friesen y Darby, Nature Structural Biology 5: 543-546 (1998) que se incluye en el presente documento por referencia.

25 En la divulgación, una molécula de la invención es capaz de interferir con la inclusión de exón 45 del pre-ARNm de DMD y comprende un oligonucleótido antisentido que es complementario de y puede formar pares de bases con la secuencia codificante del pre-ARNm del gen DMD. Dicho oligonucleótido antisentido contiene preferentemente un residuo de ARN, un residuo de ADN, y/o un análogo nucleotídico o equivalente, como se detallará adicionalmente más adelante en el presente documento.

30 Una molécula de la divulgación comprende una secuencia basada en nucleótidos o una secuencia de nucleótidos o una secuencia oligonucleotídica antisentido de entre 21 y 50 nucleótidos o bases, más preferida entre 21 y 40 nucleótidos, más preferida entre 21 y 30 nucleótidos, tal como de 21 nucleótidos, 22 nucleótidos, 23 nucleótidos, 24 nucleótidos, 25 nucleótidos, 26 nucleótidos, 27 nucleótidos, 28 nucleótidos, 29 nucleótidos, 30 nucleótidos, 31 nucleótidos, 32 nucleótidos, 33 nucleótidos, 34 nucleótidos, 35 nucleótidos, 36 nucleótidos, 37 nucleótidos, 38 nucleótidos, 39 nucleótidos, 40 nucleótidos, 41 nucleótidos, 42 nucleótidos, 43 nucleótidos, 44 nucleótidos, 45 nucleótidos, 46 nucleótidos, 47 nucleótidos, 48 nucleótidos, 49 nucleótidos o 50 nucleótidos. Una molécula de la divulgación comprende una secuencia basada en nucleótidos de 25 nucleótidos. 35

40 En la divulgación una molécula se une a un tramo continuo de o es complementaria a o es antisentido con respecto a al menos un tramo continuo de al menos 21 nucleótidos dentro de la secuencia de nucleótidos SEC ID N.º: 2. La divulgación proporciona una molécula que comprende o que consiste en una secuencia de nucleótidos antisentido seleccionada a partir de las secuencias de nucleótidos antisentido como se representan en la Tabla 1, salvo SEC ID N.º: 68. Una molécula de la divulgación que es antisentido con respecto a la secuencia de SEC ID N.º: 2, que está presente en el exón 45 del gen DMD comprende preferentemente o consiste preferentemente en la secuencia de nucleótidos antisentido de SEC ID N.º: 3; SEC ID N.º: 4, SEC ID N.º: 5, SEC ID N.º: 6, SEC ID N.º: 7, SEC ID N.º: 8, SEC ID N.º: 9, SEC ID N.º: 10, SEC ID N.º: 11, SEC ID N.º: 12, SEC ID N.º: 13, SEC ID N.º: 14, SEC ID N.º: 15, SEC ID N.º: 16, SEC ID N.º: 17, SEC ID N.º: 18, SEC ID N.º: 19, SEC ID N.º: 20, SEC ID N.º: 21, SEC ID N.º: 22, SEC ID N.º: 23, SEC ID N.º: 24, SEC ID N.º: 25, SEC ID N.º: 26, SEC ID N.º: 27, SEC ID N.º: 28, SEC ID N.º: 29, SEC ID N.º: 30, SEC ID N.º: 31, SEC ID N.º: 32, SEC ID N.º: 33, SEC ID N.º: 34, SEC ID N.º: 35, SEC ID N.º: 36, SEC ID N.º: 37, SEC ID N.º: 38, SEC ID N.º: 39, SEC ID N.º: 40, SEC ID N.º: 41, SEC ID N.º: 42, SEC ID N.º: 43, SEC ID N.º: 44, SEC ID N.º: 45, SEC ID N.º: 46, SEC ID N.º: 47, SEC ID N.º: 48, SEC ID N.º: 49, SEC ID N.º: 50, SEC ID N.º: 51, SEC ID N.º: 52, SEC ID N.º: 53, SEC ID N.º: 54, SEC ID N.º: 55, SEC ID N.º: 56, SEC ID N.º: 57, SEC ID N.º: 58, SEC ID N.º: 59, SEC ID N.º: 60, SEC ID N.º: 61, SEC ID N.º: 62, SEC ID N.º: 63, SEC ID N.º: 64, SEC ID N.º: 65, SEC ID N.º: 66 y/o SEC ID N.º: 67. 45
50

La divulgación proporciona una molécula que comprende o consiste en la secuencia de nucleótidos antisentido de SEC ID N.º: 3; SEC ID N.º: 4, SEC ID N.º: 5, SEC ID N.º: 6, SEC ID N.º: 7 y/o SEC ID N.º: 8.

55 La divulgación proporciona una molécula que comprende o consiste en la secuencia de nucleótidos antisentido de SEC ID N.º: 3. Se encontró que esta molécula es muy eficiente modulando ajustamiento de exón 45 del pre-ARNm de DMD en una célula muscular. En una realización preferida, se proporciona un oligonucleótido antisentido que

comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N.º: 3.

Una secuencia de nucleótidos de un oligonucleótido antisentido de la invención puede contener un residuo de ARN, un residuo de ADN, un análogo nucleotídico o equivalente como se detallará adicionalmente más adelante en el presente documento. Además, un oligonucleótido antisentido de la invención puede abarcar un equivalente funcional de dicho oligonucleótido antisentido de la invención según se define en el presente documento.

Se prefiere que un oligonucleótido antisentido de la invención comprenda un o al menos un residuo que esté modificado para incrementar resistencia a nucleasas, y/o para incrementar la afinidad del nucleótido antisentido para la secuencia objetivo. Por lo tanto, en una realización preferida, una secuencia de nucleótidos antisentido comprende un o al menos un análogo nucleotídico o equivalente, en el que un análogo nucleotídico o equivalente se define como un residuo que tiene una base modificada, y/o un armazón modificado, y/o un enlace internucleosídico que no se da en la naturaleza, o una combinación de estas modificaciones.

En una realización preferida, un análogo de nucleótido o equivalente comprende un armazón modificado. Ejemplos de tales armazones se proporcionan por armazones morfolínicos, armazones de carbamatos, armazones de siloxano, armazones de sulfuros, sulfóxidos y sulfonas, armazones de formacetilos y de tioformacetilos, armazones de metilformacetilos, armazones de riboacetilos, armazones que contienen alquenos, armazones de sulfamatos, sulfonatos y de sulfonamidas, armazones de metilenimido y de metilendihidrazino y armazones de amidas. Oligómeros de fosforodiamidato de morfolino son oligonucleótidos de armazones modificados que se han investigado anteriormente como agentes antisentido. Los oligonucleótidos de morfolino tienen un armazón no cargado en el que el azúcar de desoxirribosa de ADN se reemplaza por un anillo de seis miembros y el enlace fosfodiéster se reemplaza por un enlace de fosforodiamidato. Los oligonucleótidos de morfolino son resistentes a degradación enzimática y parecen funcionar como agentes antisentido deteniendo la traducción o interfiriendo con el ajustamiento de pre-ARNm más que activando ARNasa H. Se han administrado con éxito oligonucleótidos morfolínicos a células de cultivos tisulares por procedimientos que alteran físicamente la membrana celular y un estudio que compara varios de estos procedimientos encontró que la microinyección con Amarillo de Lucifer fue el procedimiento más eficiente de administración; sin embargo, debido a que el armazón morfolínico no está cargado, los lípidos catiónicos no son medidores efectivos de captación de oligonucleótidos morfolínicos en células. Una comunicación reciente demostró formación de tríplex por un oligonucleótido morfolínico y debido al armazón no iónico, estos estudios mostraron que el oligonucleótido morfolínico fue capaz de formación de tríplex en ausencia de magnesio.

Se prefiere adicionalmente que el enlace entre un residuo en un armazón no incluya un átomo de fósforo, tal como un enlace que se forma por enlaces internucleosídicos de alquilos o de cicloalquilos de cadena corta, o uno o más enlaces internucleosídicos heteroatómicos o heterocíclicos de cadena corta.

Un análogo nucleotídico o equivalente preferido comprende un Ácido Peptidonucleico (APN), que tiene un armazón poliamídico modificado (Nielsen, et al. (1991) Science 254: 1497-1500). Las moléculas basadas en APN son verdaderos imitadores de moléculas de ADN en términos de reconocimiento de pares de bases. El armazón del APN está compuesto de unidades de *N*-(2-aminoetil)-glicina unidas por enlaces peptídicos, en las que las nucleobases están unidas al armazón por enlaces metilencarbonílicos. Un armazón alternativo comprende un monómero de APN pirrolidínico prolongado en un carbono (Govindaraju y Kumar (2005) Chem. Commun., 495-497). Dado que el armazón de una molécula de APN contiene grupos fosfato no cargados, los híbridos de APN-ARN son usualmente más estables que los híbridos de ARN-ARN o de ARN-ADN, respectivamente (Egholm et al (1993) Nature 365, 566-568).

Un armazón adicionalmente preferido comprende un nucleótido morfolínico análogo o equivalente, en el que el azúcar de la ribosa o la desoxirribosa está reemplazado por un anillo morfolínico de 6 miembros. Un análogo o equivalente nucleotídico más preferido comprende un oligómero de morfolino fosforodiamidato (PMO), en el que el azúcar ribosa o desoxirribosa está reemplazado por un anillo morfolínico de 6 miembros y el enlace fosfodiéster aniónico entre anillos morfolínicos adyacentes está reemplazado por un enlace fosforodiamidato no iónico.

En aún una realización adicional, un análogo de nucleótido o equivalente de la invención comprende una sustitución de al menos uno de los oxígenos que no están formando puentes en el enlace fosfodiéster. Esta modificación desestabiliza ligeramente la formación de pares de bases pero añade resistencia significativa a la degradación por nucleasas. Un análogo o equivalente nucleotídico preferido comprende fosforotioato, fosforotioato quiral, fosforoditioato, fosfotriéster, aminoalquilfosfotriéster, H-fosfonato, metilo y otros alquilfosfonatos incluyendo 3'-alquilen-fosfonato, 5'-alquilen-fosfonato y fosfonato quiral, fosfinato, fosforamidato incluyendo 3'-aminofosforamidato y aminoalquilfosforamidato, tionofosforamidato, tionoalquilfosfonato, tionoalquilfosfotriéster, selenofosfato o boranofosfato.

Un análogo de nucleótidos preferido adicional o equivalente de la invención comprende uno o más restos de azúcar que están mono- o di-sustituidos en la posición 2', 3' y/o 5' tal como con -OH; un -F; un alquilo (C₁-C₁₀), alqueno (C₁-C₁₀), alquino (C₁-C₁₀), alcarilo (C₁-C₁₀), alilo (C₁-C₁₀), arilo (C₁-C₁₀), o aralquilo (C₁-C₁₀), inferior lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, que puede estar interrumpido o no por uno o más heteroátomos; un O-, S- o N-alquilo; un O-, S-, o N-alqueno; un O-, S-, o N-alquino; un O-, S- o N-alilo; un O-alquil-O-alquilo; un -metoxi; un -aminopropoxi; un aminoxi; un metoxietoxi; un -dimetilaminooxietoxi; y un dimetilaminoetoxietoxi. El resto azúcar puede ser una piranosa o un derivado de la misma, o una desoxipiranosa o un derivado de la misma, preferentemente

una ribosa o un derivado de la misma, o desoxirribosa o derivado de la misma. Tales restos de azúcar derivatizados preferidos comprenden Ácidos Nucleicos Inaccesibles (LNA) en los que el átomo de carbono 2' está unido al átomos de carbono 3' o 4' del anillo de azúcar formando de este modo un resto de azúcar bicíclico. Un LNA preferido comprende ácido nucleico provisto de puentes de 2'-O,4'-C-etileno (Morita et al. 2001. Nucleic Acid Res Suplemento N.º: 1: 241-242). Estas sustituciones vuelven al análogo o equivalente de nucleótidos resistente a ARNasa H y resistente a nucleasas e incrementan la afinidad por el ARN objetivo.

Se entiende por una persona experta que no es necesario para todas las posiciones en un oligonucleótido antisentido modificarse uniformemente. Además, más de uno de los análogos o equivalentes mencionados anteriormente se puede incorporar en un oligonucleótido antisentido individual o incluso en una posición individual en un oligonucleótido antisentido. En ciertas realizaciones, un oligonucleótido antisentido de la invención tiene al menos dos tipos diferentes de análogos o equivalentes.

Un oligonucleótido antisentido preferido de acuerdo con la invención comprende un oligonucleótido antisentido 2'-O-alquilfosforotioato, tal como ribosa 2'-O-metil modificada (ARN), ribosa 2'-O-etil modificada, ribosa 2'-O-propil modificada, y/o derivados sustituidos de estas modificaciones tales como derivados halogenados.

Un oligonucleótido antisentido más preferido de acuerdo con la invención comprende una ribosa 2'-O-metil-fosforotioato.

Un equivalente funcional de un oligonucleótido antisentido de la invención se puede definir como un oligonucleótido según se define en el presente documento en el que una actividad de dicho equivalente funcional se mantiene al menos en algún grado. Preferentemente, una actividad de dicho equivalente funcional es inducir salto del exón 45 y proporcionar una proteína distrofina funcional. Dicha actividad de dicho equivalente funcional se evalúa preferentemente por lo tanto por detección de salto del exón 45 y cuantificando la cantidad de una proteína distrofina funcional. Una proteína de distrofina funcional se define preferentemente en el presente documento como que es una distrofina capaz de unir actina y miembros del complejo proteico DGC. La valoración de dicha actividad de un oligonucleótido se hace preferentemente por RT-PCR o por análisis de inmunofluorescencia o de prueba de bandas de Western. Dicha actividad se mantiene preferentemente al menos en algún grado cuando ella representa al menos el 50 %, o al menos el 60 %, o al menos el 70 % o al menos el 80 % o al menos el 90 % o al menos el 95 % o más de la actividad correspondiente de dicho oligonucleótido del que deriva el equivalente funcional. A lo largo de esta memoria descriptiva, cuando la palabra oligonucleótido se usa se puede reemplazar por un equivalente funcional del mismo según se define en el presente documento.

Se entenderá también por una persona experta que oligonucleótidos antisentido distintos se pueden combinar para el salto de manera eficaz del exón 45 del pre-ARNm de DMD humano. En una realización preferida, una combinación de al menos dos oligonucleótidos antisentido se usa en un procedimiento de la invención, tal como dos oligonucleótidos antisentido distintos, tres oligonucleótidos antisentido distintos, cuatro oligonucleótidos antisentido distintos, o cinco oligonucleótidos antisentido distintos o incluso más. También está abarcado por la presente divulgación combinar varios oligonucleótidos o moléculas como se representan en la tabla 1 salvo SEC ID N.º: 68.

Un oligonucleótido antisentido puede unirse a un resto que potencia la captación del oligonucleótido antisentido en células, preferentemente células miogénicas o células musculares. Ejemplos de tales restos son colesteroles, carbohidratos, vitaminas, biotina, lípidos, fosfolípidos, péptidos de penetración celular que incluyen pero no están limitados a antenapedia, TAT, transportano y aminoácidos cargados positivamente tales como oligoarginina, poliarginina, oligolisina o polilisina, dominios de unión a antígenos tales como proporcionados por un anticuerpo, un fragmento Fab de un anticuerpo, o un dominio de unión a antígenos de cadena individual tal como un dominio de unión a antígenos de cadena individual de camélidos.

Un oligonucleótido antisentido preferido comprende un PMO unido a péptido.

Un oligonucleótido antisentido preferido que comprende uno o más análogos o equivalentes de nucleótidos de la invención modula ayustamiento en una o más células musculares, incluyendo células musculares cardíacas, tras administración sistémica. A este respecto, la administración sistémica de un oligonucleótido antisentido que comprende un análogo o equivalente nucleotídico específico podría resultar en marcar como objetivo un subconjunto de células musculares, mientras que un oligonucleótido antisentido que comprende un análogo nucleotídico distinto da como resultado el marcado como objetivo de un subgrupo diferente de células musculares. Por lo tanto, en una realización se prefiere usar una combinación de oligonucleótidos antisentido que comprende diferentes análogos o equivalentes de nucleótidos para modular el salto de exón 45 del pre-ARNm de DMD humano.

En la divulgación, una célula puede proverse con una molécula capaz de interferir con secuencias esenciales que dan como resultado el salto altamente eficiente de exón 45 del pre-ARNm de DMD humano por expresión oligonucleotídica antisentido derivada de plásmidos o por expresión vírica proporcionada por un vector basado en virus. Un vector basado en virus tal comprende un casete de expresión que dirige la expresión de un oligonucleótido antisentido según se define en el presente documento. Vectores basados en virus preferidos incluyen vectores basados en adenovirus o vectores basados en virus adenoasociados. La expresión se dirige preferentemente por un promotor de polimerasa III, tal como un promotor de ARN U1, un promotor de ARN U6, o un promotor de ARN U7. Una célula muscular o

miogénica se puede proporcionar con un plásmido para expresión oligonucleotídica antisentido proporcionando el plásmido en una solución acuosa. Alternativamente, se puede proporcionar un plásmido por transfección usando agentes de transfección tales como, por ejemplo, LipofectAMINE™ 2000 (Invitrogen) o polietilenimida (PEI; ExGen500 (MBI Fermentas)), o derivados de los mismos.

5 Un sistema de expresión de oligonucleótidos antisentido preferido es un vector basado en virus asociados a adenovirus (AAV). Se han desarrollado vectores basados en AAV de cadena individual y de cadena doble que se pueden usar para expresión prolongada de secuencias nucleotídicas antisentido pequeñas para el salto altamente eficiente del exón 45 del pre-ARNm de DMD.

10 Un vector basado en AAV preferido comprende un casete de expresión que está dirigido por un promotor de la polimerasa III (Pol III). Un promotor Pol III preferido es, por ejemplo, un promotor de ARN U1, un promotor de ARN U6, o un promotor de ARN U7.

La invención por lo tanto proporciona también un vector basado en virus, que comprende un casete de expresión dirigido por promotor Pol III para expresión de una o más secuencias antisentido de la invención para inducir el salto del exón 45 del pre-ARNm de DMD humano.

15 Composición farmacéutica

Si se requiere, un oligonucleótido antisentido de la invención o un vector que expresa un oligonucleótido antisentido de la invención se puede incorporar en una mezcla o composición farmacéuticamente activa añadiendo un vehículo farmacéuticamente aceptable.

20 Por lo tanto, en un aspecto adicional, la invención proporciona una composición, preferentemente una composición farmacéutica que comprende un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la invención, y/o un vector basado en virus que expresa las secuencia(s) antisentido de acuerdo con la invención y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

25 Una composición farmacéutica preferida comprende un oligonucleótido antisentido según se define en el presente documento y/o un vector según se define en el presente documento y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable, combinado opcionalmente con un oligonucleótido antisentido y/o un vector que es capaz de modular el salto del exón 7, 44, 46, 51, 53, 59, 67 del pre-ARNm de DMD.

30 Los excipientes preferidos incluyen excipientes capaces de formar complejos, vesículas y/o liposomas que administran un molécula según se define en el presente documento, preferentemente un oligonucleótido que forma un complejo o atrapado en una vesícula o liposoma por una membrana celular. Se conocen en la técnica muchos de estos excipientes. Los excipientes adecuados comprenden polietilenimina y derivados, o polímeros catiónicos similares, incluyendo copolímeros de polipropilenimina o polietilenimina (PEC) y derivados, anfífilos sintéticos, lipofectina™, DOTAP y/o proteínas de cápsides víricas que son capaces de autoensamblaje en partículas que pueden administrar tal oligonucleótido antisentido según se define en el presente documento a una célula, preferentemente a una célula muscular. Se ha demostrado que tales excipientes administran de forma eficaz ácidos nucleicos (oligonucleótidos tales como antisentido) a una amplia diversidad de células cultivadas, incluyendo células musculares. Los inventores presentes han obtenido resultados muy buenos usando polietilenimina (PEI, ExGen500, MBI Fermentas) como se muestra en el ejemplo. Su potencial de transfección alto se combina con una toxicidad de baja a moderada exenta en términos de supervivencia celular general. La facilidad de modificación estructural se puede usar para permitir modificaciones adicionales y el análisis de sus características de transferencia de ácidos nucleicos (*in vivo*) adicionales y de su toxicidad adicional.

40 La lipofectina representa un ejemplo de agente de transfección liposomal. Consiste en dos componentes lipídicos, un lípido catiónico cloruro de N-[1-(2,3 dioleoiloxi)propil]-N,N,N-trimetilamonio (DOTMA) (cp. DOTAP que es la sal metilsulfato) y un lípido neutro dioleoilfosfatidiletanolamina (DOPE). El componente neutro media la liberación intracelular. Otro grupo de sistemas de administración son nanopartículas poliméricas.

45 Policationes tales como dietilaminoetilaminoetil (DEAE)-dextrano, que se conoce bien como reactivo de transfección de ADN puede combinarse con cianoacrilato de butilo (PBCA) y cianoacrilato de hexilo (PHCA) para formular nanopartículas catiónicas que pueden administrar un oligonucleótido antisentido a través de las membranas celulares dentro de las células.

50 Además de estos materiales de nanopartículas comunes, el péptido catiónico protamina ofrece una aproximación alternativa para formular un oligonucleótido antisentido como coloides. Este sistema de nanopartículas coloidal puede formar los así llamados proticles, que se pueden preparar por un simple procedimiento de autoensamblaje para empaquetar un oligonucleótido antisentido y mediar liberación intracelular de un oligonucleótido antisentido. La persona experta puede seleccionar y adaptar cualquiera de los excipientes anteriores u otros excipientes y sistemas de administración comercialmente disponibles alternativos para empaquetar y administrar un oligonucleótido antisentido para usar en la invención actual para administrar dicho oligonucleótido antisentido para el tratamiento de Distrofia Muscular de Duchenne en seres humanos.

55 Además, un oligonucleótido antisentido podría unirse covalentemente o no covalentemente a un ligando objetivo

específicamente diseñado para facilitar la captación dentro de la célula, dentro del citoplasma y/o de su núcleo. Tal ligando podría comprender (i) un compuesto (incluyendo pero no limitado a estructuras peptídicas (o estructuras similares a las peptídicas)) que reconoce elementos celulares, tisulares o de órganos que facilita la captación celular y/o (ii) un compuesto químico capaz de facilitar la captación dentro de las células y/o la liberación intracelular de un oligonucleótido antisentido a partir de vesículas, por ejemplo endosomas o lisosomas.

Por lo tanto, en una realización preferida, se formula un oligonucleótido antisentido en un medicamento que se proporciona con al menos un excipiente y/o un ligando que dirige a objetivo para administración y/o con un dispositivo de administración de dicho compuesto a una célula y/o que potencia su administración intracelular. De acuerdo con ello, la invención también comprende una composición farmacéuticamente aceptable que comprende un oligonucleótido antisentido y que comprende adicionalmente al menos un excipiente y/o un ligando que dirige a objetivo para administración y/o un dispositivo de administración de dicho compuesto a una célula y/o que potencia su administración intracelular. Se entiende que un oligonucleótido antisentido puede no estar formulado en una composición o preparación individual. Dependiendo de su identidad, la persona experta conocerá que tipo de formulación es la más apropiada para cada compuesto.

En una realización preferida, se usa una concentración *in vitro* de un oligonucleótido antisentido según se define en el presente documento, que está oscilando entre 0,1 nM y 1 mM. Más preferentemente, la concentración usada está oscilando entre 0,3 a 400 nM, incluso más preferentemente entre 1 a 200 nM de molécula o un oligonucleótido según se define en el presente documento se puede usar a una dosis que está oscilando entre 0,1 y 20 mg/kg, preferentemente 0,5 y 10 mg/kg. Si se usan varios oligonucleótidos antisentido, estas concentraciones pueden referirse a la concentración total de oligonucleótidos antisentido o a la concentración de cada oligonucleótido antisentido añadido. Los intervalos de concentración de oligonucleótido(s) antisentido como se dan anteriormente son concentraciones preferidas para usos *in vitro* o *ex vivo*. La persona experta entenderá que dependiendo del/de los oligonucleótido(s) antisentido usado(s), de la célula objetivo a tratarse, del objetivo génico y de sus niveles de expresión, el medio usado y las condiciones de incubación y de transfección, la concentración de oligonucleótido(s) usada puede variar adicionalmente y puede necesitar optimizarse algo adicionalmente.

Más preferentemente, un oligonucleótido antisentido y un compuesto adjunto a usarse en la invención para evitar, tratar DMD se producen de forma sintética y se administran directamente a una célula, un tejido, un órgano y/o pacientes en forma de formulación en una composición o preparación farmacéuticamente aceptable. La administración de una composición farmacéutica al sujeto se lleva a cabo preferentemente por una o más inyecciones parenterales, por ejemplo administraciones intravenosa y/o subcutánea y/o intramuscular y/o intratecal y/o intraventricular, preferentemente inyecciones, en uno o en múltiples sitios en el cuerpo humano.

Uso

En aún un aspecto adicional, la invención proporciona el uso de un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la invención, y/o un vector basado en virus que expresa una o más secuencias antisentido de acuerdo con la invención y/o una composición farmacéutica, para inducir y/o promover ajustamiento del pre-ARNm de DMD. El ajustamiento está modulado preferentemente en una célula miogénica humana o en una célula muscular *in vitro*. Es más preferido que el ajustamiento esté modulado en seres humanos en una célula miogénica o en una célula muscular *in vivo*.

De acuerdo con ello, la invención se refiere adicionalmente al uso de un oligonucleótido antisentido según se define en el presente documento y/o del vector según se define en el presente documento y/o de la composición farmacéutica según se define en el presente documento induciendo y/o promoviendo el ajustamiento del pre-ARNm de DMD o para la preparación de un medicamento para el tratamiento de un paciente de DMD.

En este documento y en sus reivindicaciones, el verbo "comprende" y sus conjugaciones se usan en sentido no limitativo para significar que los elementos después de la palabra están incluidos, pero los elementos no mencionados específicamente no están excluidos. Además el verbo "consistir" se puede reemplazar por "consistir esencialmente en" significando que un oligonucleótido antisentido o un vector basado en virus o una composición según se define en el presente documento pueden comprender componente(s) adicional(es) a los identificados específicamente, no alterando dichos componente(s) adicionales la característica única de la invención. Además, la referencia a un elemento por el artículo indefinido "un" or "una" no excluye la posibilidad de que más de un elemento esté presente, a menos que el contexto requiera claramente que haya uno y solo uno de los elementos. Por tanto, el artículo indefinido "un" o "una" significa normalmente "al menos uno".

Cada una de las realizaciones como se identifican en el presente documento pueden combinarse conjuntamente a menos que se indique lo contrario. Todas las patentes y referencias bibliográficas citadas en la presente memoria descriptiva se incorporan por la presente por referencia en su totalidad.

Los siguientes ejemplos se ofrecen solo para propósitos ilustrativos, y no están destinados a limitar el alcance de la presente invención de ningún modo.

Legendas de la figura

Figura 1. En los microtubos de control de seres humanos, una serie de AON (PS220 a PS225; SEC ID N.º: 3 a 8), todos

5 uniendo a un tramo continuo de al menos 21 nucleótidos dentro de una secuencia específica del exón 45 (es decir SEC ID N.º: 2), se pusieron a prueba a dos concentraciones diferentes (200 y 500 nM). Todos los seis AON fueron eficaces en inducir el salto específico del exón 45, como se conforma por análisis de secuencia (no mostrado). PS220 (SEC ID N.º: 3) sin embargo, indujo de forma reproducible los niveles más altos de salto del exón 45 (véase Fig. 2). (NT: células no tratadas, M: marcador de tamaño).

Figura 2. En los miotubos de control de seres humanos, se puso a prueba PS220 25-mero (SEC ID N.º: 3) a concentración creciente. Se observaron niveles de salto del exón 45 de hasta el 75 % (a 400 nM) de forma reproducible, como se valora por Análisis de Agilent LabChip.

10 **Figura 3.** En miotubos control humanos, las eficiencias de un AON45-5 17-mero "corto" (SEC ID N.º: 68) y de su homólogo PS220 25-mero "largo" solapante se compararon directamente a 200 nM y 500 nM. PS220 fue marcadamente más eficiente a ambas concentraciones: al 63 % cuando se compara con al 3 % obtenido con 45-5. (NT: células no tratadas, M: marcador de tamaño).

Ejemplos

Ejemplos 1 y 2

15 Materiales y procedimientos

El diseño de AON estaba basado en estructuras secundarias abiertas (parcialmente) solapantes del ARN de exón objetivo como se predijo por el programa m-fold (Zuker, M. (2003) Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction. *Nucleic Acids Res.*, 31, 3406-3415) y estaba basado en sitios de unión a proteína SR teóricos (parcialmente) solapantes como se predijo por numerosos programas de software tales como ESEfinder (Cartegni, L. et al. (2003) ESEfinder: A web resource to identify exonic splicing enhancers. *Nucleic Acids Res.* 31, 3568-71; Smith, P. J. et al. (2006) An increased specificity score matrix for the prediction of SF2/ASF-specific exonic splicing enhancers. *Hum. Mol. Genet.*, 15, 2490-2508) que predice sitios de unión para las cuatro proteínas SR más abundantes (SF2/ASF, SC35, SRp40 y SRp55). AON se sintetizaron por Prosensa Therapeutics B.V. (Leiden, Países Bajos) y contienen 2'-O-metil ARN y armazones de fosforotioato (PS) de longitud total.

25 Cultivo de tejidos, transfección y análisis por RT-PCR

Los cultivos de miotubos derivados de un individuo saludable ("ser humano control") se obtuvieron como se describe anteriormente (Aartsma-Rus et al. *Hum Mol Genet* 2003; 12(8): 907-14). Para el rastreo de los AON, se transfectaron los cultivos de miotubos con 0 a 500 nM de cada AON. El reactivo de transfección polietilenoimina (PEI, ExGen500 MBI Fermentas) se usó de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con 2 µl de PEI por µg de AON. Las eficacias de salto del exón se determinaron por análisis de RT-PCR anidada usando cebadores en los exones que flanquean el exón 45. Se aislaron fragmentos de PCR a partir de geles de agarosa para verificación de secuencia. Para cuantificación, los productos de PCR se analizaron usando el kit Agilent DNA 1000 LabChip y el bioanalizador Agilent 2100 (Agilent Technologies, EE.UU.).

Resultados

35 Una serie de secuencias dirigidas a objetivo de AON dentro de SEC ID N.º: 2 dentro del exón 45 se diseñaron y se pusieron a prueba en cultivos de miotubos normales, por transfección y RT-PCR subsiguiente y análisis de secuencia de ARN aislado subsiguiente. PS220 (SEC ID N.º: 3) indujo reproduciblemente niveles más altos de salto del exón 45, cuando se comparó con PS221-PS225 (Figura 1). Niveles altos de salto de 45 hasta el 75 % se obtuvieron ya a PS220 400 nM (Figura 2). En una comparación directa, PS220 (un 25-mero) fue de forma reproducible más eficiente en inducir el salto del exón 45 que su homólogo 17-mero más corto AON 45-5 (SEC ID N.º: 68; anteriormente publicado como h45AON5 (Aartsma-Rus et al. *Am J Hum Genet* 2004; 74: 83-92)), tanto a concentraciones de AON de 200 nM como de 500 nM y con el 63 % frente al 3% respectivamente a 500 nM (Figura 3). Este resultado se debe probablemente al hecho de que la longitud prolongada de PS220, de hecho solapando completamente AON 45-5, incrementa la energía libre del complejo AON-objetivo de tal forma que también se incrementa la eficacia de inducir el salto del exón 45.

(continuación)

SEC ID N.º: 29	CCCAGUUGCAUUCAAUGUUUCUGACA	SEC ID N.º: 62	UGCCGCUJGCCCCAAUGCCCAUCCUGGA
SEC ID N.º: 30	CCAGUUGCAUUCAAUGUUUCUGACAA	SEC ID N.º: 63	GCCGCUJGCCCCAAUGCCCAUCCUGGAG
SEC ID N.º: 31	CAGUUUGCAUUCAAUGUUUCUGACAAC	SEC ID N.º: 64	CCGCUJGCCCCAAUGCCCAUCCUGGAGU
SEC ID N.º: 32	AGUUGCAUUCAAUGUUUCUGACAACA	SEC ID N.º: 65	CGCUJGCCCCAAUGCCCAUCCUGGAGUU
SEC ID N.º: 33	UCC UGU AGA AUA CUG GCA UC	SEC ID N.º: 66	UGU UUU UGA GGA UUG CUG AA
SEC ID N.º: 34	UGC AGA CCU CCU GCC ACC GCA GAU UCA	SEC ID N.º: 67	UGUUCUGACAAACAGUUUGCCCGUGCCCCAAU GCCAUCCUGG
SEC ID N.º: 35	UUGCAGACCCUCCUGCCACCCGAGAUUC AGGCUUC	SEC ID N.º: 68 (4-5-5)	GCCCAAUGCCCAUCCUGG

Tabla 2 AONS en exones 51,53, 7, 44, 46, 59 y 67

Exón 51 del gen DMD			
SEC ID N.º: 69	AGAGCAGGUACCUCCAACAUAAGG	SEC ID N.º: 91	UCAAGGAAGAUAGGCAUUUCUAGUUU
SEC ID N.º: 70	GAGCAGGUACCUCCAACAUAAGGA	SEC ID N.º: 92	UCAAGGAAGAUAGGCAUUUCU
SEC ID N.º: 71	AGCAGGUACCUCCAACAUAAGGAA	SEC ID N.º: 93	CAAGGAAGAUAGGCAUUUCUAGUUUG
SEC ID N.º: 72	GCAGGUACCUCCAACAUAAGGAAG	SEC ID N.º: 94	AAGGAAGAUAGGCAUUUCUAGUUUGG
SEC ID N.º: 73	CAGGUACCUCCAACAUAAGGAAGA	SEC ID N.º: 95	AGGAAGAUAGGCAUUUCUAGUUUGGA
SEC ID N.º: 74	AGGUACCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 96	GGAAGAUAGGCAUUUCUAGUUUGGAG
SEC ID N.º: 75	GGUACCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 97	GAAGAUAGGCAUUUCUAGUUUGGAGA
SEC ID N.º: 76	GUACCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 98	AAGAUAGGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 77	UACCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 99	AGAUGGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 78	ACCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 100	GAUGGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 79	CCUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 101	AUGGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 80	CUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 102	UGGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 81	CUCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 103	GGCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 82	UCCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 104	GCAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 83	CCAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 105	CAUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 84	CAACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 106	AUUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 85	AACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 107	UUUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 86	ACAUAAGGAAGAU	SEC ID N.º: 108	UUCUAGUUUGGAGAU
SEC ID N.º: 87	ACAUAAGGAAGAU		
SEC ID N.º: 88	ACAUAAGGAAGAU		
SEC ID N.º: 89	CAUAAGGAAGAU		
SEC ID N.º: 90	AUCAAGGAAGAU		
Exón 53 del gen DMD			
SEC ID N.º: 109	CCAUUGUGUUGAAUCCUUUAACAUU	SEC ID N.º: 116	CAUUAACUGUUGCCUCCGUUCUGAAGGUG
SEC ID N.º: 110	CCAUUGUGUUGAAUCCUUUAAC	SEC ID N.º: 117	CUGAAGGUGUUCUUGUACUUCAUCC

(continuación)

Exón 53 del gen DMD			
SEC ID N.º: 111	AUUGUGUUGAAUCCUUUAAC	SEC ID N.º: 118	UGUAUAGGGACCCUCCUCCAUUGACUC
SEC ID N.º: 112	CCUGUCCUAAGACCUGCUCA	SEC ID N.º: 119	AUCCACAGAUUCUGAAUUC
SEC ID N.º: 113	CUUUUGGAUUGCAUCUACUGUAUAG	SEC ID N.º: 120	UUGGCUCUGGCCUGUCCUAAGA
SEC ID N.º: 114	CAUUAACUGUUGCCUCCGGUUCUG	SEC ID N.º: 121	AAGACCUGCUCAGCUUCUCCUJAGCUUCCAGCCA
SEC ID N.º: 115	CUGUUGCCUCCGGUUCUGAAGGUG		
Exón 9 del gen DMD			
SEC ID N.º: 122	UGCAUGUUCAGUCGUUGUGUGG	SEC ID N.º: 124	AUUUACCAACCUUCAGGAUCGAGUA
SEC ID N.º: 123	CACUAUCCAGUCAAAUAJGGUCUGG	SEC ID N.º: 125	GGCCUAAAACACAUACACAU
Exón 44 del gen DMD			
SEC ID N.º: 126	UCAGCUUCUGUUAGCCACUG	SEC ID N.º: 151	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 127	UUCAGCUUCUGUUAGCCACU	SEC ID N.º: 152	CAGCUUCUGUJAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 128	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUG	SEC ID N.º: 153	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 129	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGA	SEC ID N.º: 154	AGCUUCUGUUAGCCACUGAU
SEC ID N.º: 130	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGA	SEC ID N.º: 155	GCUUCUGUJAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 131	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGA	SEC ID N.º: 156	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 132	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGA	SEC ID N.º: 157	GCUUCUGUJAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 133	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGAU	SEC ID N.º: 158	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 134	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGAU	SEC ID N.º: 159	GCUUCUGUJAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 135	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 160	AGCUUCUGUJAGCCACUGAUU
SEC ID N.º: 136	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 161	GCUUCUGUJAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 137	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 162	AGCUUCUGUJAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 138	UUCAGCUUCUGUJAGCCACUGAU	SEC ID N.º: 163	GCUUCUGUJAGCCACUGAUUAAA
SEC ID N.º: 139	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 164	CCAUUUGAUUUAGCAUGUUCUCC
SEC ID N.º: 140	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 165	AGAUACCAUUUGAUUUUJAGC
SEC ID N.º: 141	UCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 166	GCCAUUUCUCAACAGAUUCU

(continuación)

Exón 44 del gen DMD			
SEC ID N.º: 142	UUCAGCUUCUGUUAGCCACUGAUUAAA	SEC ID N.º: 167	GCCAUUUUCUACAACAGAUUCUGUCA
SEC ID N.º: 143	CAGCUUCUGUUAGCCACUG	SEC ID N.º: 168	AUUCUCAGGAAUUUGUGUCUUUC
SEC ID N.º: 144	CAGCUUCUGUUAGCCACUGAU	SEC ID N.º: 169	UCUCAGGAAUUUGUGUCUUUC
SEC ID N.º: 145	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 170	GUUCAGCUUCUGUUAGCC
SEC ID N.º: 146	CAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 171	CUGAUUAAAUAUCUUUAU C
SEC ID N.º: 147	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 172	GCCGCCAUUUCUCAACAG
SEC ID N.º: 148	CAGCUUCUGUUAGCCACUGAUU	SEC ID N.º: 173	GUUUUUAGCAUGUUCCCCA
SEC ID N.º: 149	AGCUUCUGUUAGCCACUGAUUAA	SEC ID N.º: 174	CAGGAAUUUGUGUCUUUC
SEC ID N.º: 150	CAGCUUCUGUUAGCCACUGAUUAA		
Exón 46 del gen DMD			
SEC ID N.º: 175	GCUUUUUUUUAGUUUGCUCUUU	SEC ID N.º: 203	AGGUUCAAGUGGGAUACUAGCAAUG
SEC ID N.º: 176	CUUUUUUUUUAGUUUGCUCUUU	SEC ID N.º: 204	GGUUCAAAGUGGGAUACUAGCAAUGU
SEC ID N.º: 177	UUUUUUUUUUAGUUUGCUCUUUUC	SEC ID N.º: 205	GUUCAAGUGGGAUACUAGCAAUGUU
SEC ID N.º: 178	UUUUUUUUUUAGUUUGCUCUUUUC	SEC ID N.º: 206	UUCAAAGUGGGAUACUAGCAAUGUUA
SEC ID N.º: 179	UUCUUUUUAGUUUGCUCUUUUCCA	SEC ID N.º: 207	UCAAGUGGGAUACUAGCAAUGUUUAU
SEC ID N.º: 180	UCUUUUUAGUUUGCUCUUUUCCAG	SEC ID N.º: 208	CAAGUGGGAUACUAGCAAUGUUUAUC
SEC ID N.º: 181	CUUUUAGUUUGCUCUUUUCCAGG	SEC ID N.º: 209	AAGUGGGAUACUAGCAAUGUUUAUCU
SEC ID N.º: 182	UUUUAGUUUGCUCUUUUCCAGGU	SEC ID N.º: 210	AGUGGGAUACUAGCAAUGUUUAUCUG
SEC ID N.º: 183	UUUAGUUUGCUCUUUUCCAGGUU	SEC ID N.º: 211	GUGGGAUACUAGCAAUGUUUAUCUGC
SEC ID N.º: 184	UUAGUUUGCUCUUUUCCAGGUUC	SEC ID N.º: 212	UGGGAUACUAGCAAUGUUUAUCUGCU
SEC ID N.º: 185	UAGUUUGCUCUUUUCCAGGUUCA	SEC ID N.º: 213	GGGAUACUAGCAAUGUUUAUCUGUUU
SEC ID N.º: 186	AGUUUGCUCUUUUCCAGGUUCA	SEC ID N.º: 214	GGAUACUAGCAAUGUUUAUCUGCUUC
SEC ID N.º: 187	GUUGCUCUCUUUUCCAGGUUCAAG	SEC ID N.º: 215	GAUACUAGCAAUGUUUAUCUGCUUCC
SEC ID N.º: 188	UUUGCUCUCUUUUCCAGGUUCAAGU	SEC ID N.º: 216	AUACUAGCAAUGUUUAUCUGCUUCCU
SEC ID N.º: 189	UGCUCUCUCUUUUCCAGGUUCAAGUG	SEC ID N.º: 217	UACUAGCAAUGUUUAUCUGCUUCCUC

(continuación)

Exón 46 del gen DMD			
SEC ID N.º: 190	GCGUCUCUUUUCCAGGUUCAAGUGG	SEC ID N.º: 218	ACUAGCAAUGUUUAUCUGCUUCCUCC
SEC ID N.º: 191	CUGCUCUUUUCCAGGUUCAAGUGGG	SEC ID N.º: 219	CUAGCAAUGUUUAUCUGCUUCCUCCA
SEC ID N.º: 192	UGCUCUUUUCCAGGUUCAAGUGGGA	SEC ID N.º: 220	UAGCAAUGUUUAUCUGCUUCCUCCAA
SEC ID N.º: 193	GCUCUUUUCCAGGUUCAAGUGGGAC	SEC ID N.º: 221	AGCAAUGUUUAUCUGCUUCCUCCAAC
SEC ID N.º: 194	CUCUUUUCCAGGUUCAAGUGGGAUA	SEC ID N.º: 222	GCAAUGUUUAUCUGCUUCCUCCAACC
SEC ID N.º: 195	UCUUUUCCAGGUUCAAGUGGGAUAC	SEC ID N.º: 223	CAAUGUUUAUCUGCUUCCUCCAACCA
SEC ID N.º: 196	CUUUUCCAGGUUCAAGUGGGAUACU	SEC ID N.º: 224	AAUGUUUAUCUGCUUCCUCCAACCAU
SEC ID N.º: 197	UUUCCAGGUUCAAGUGGGAUACUA	SEC ID N.º: 225	AUGUUUAUCUGCUUCCUCCAACCAUA
SEC ID N.º: 198	UUUCCAGGUUCAAGUGGGAUACUAG	SEC ID N.º: 226	UGUUUAUCUGCUUCCUCCAACCAUAA
SEC ID N.º: 199	UUCCAGGUUCAAGUGGGAUACUAGC	SEC ID N.º: 227	GUUAUCUGCUUCCUCCAACCAUAAA
SEC ID N.º: 200	UCCAGGUUCAAGUGGGAUACUAGCA	SEC ID N.º: 228	GCUGCUCUUUUCCAGGUUC
SEC ID N.º: 201	CCAGGUUCAAGUGGGAUACUAGCAA	SEC ID N.º: 229	UCUUUUCCAGGUUCAAGUGG
SEC ID N.º: 202	CAGGUUCAAGUGGGAUACUAGCAAU	SEC ID N.º: 230	AGGUUCAAGUGGGAUACUA
Exón 59 del gen DMD			
SEC ID N.º: 231	CAAUUUUUCCACUCAGUAUU	SEC ID N.º: 233	UCCUCAGGAGGCAGCUCUAAAU
SEC ID N.º: 232	UUGAAGUUCCUGGAGUCUU		
Exón 67 del gen DMD			
SEC ID N.º: 234	GCGCUGGUCACAAAAUCCUGUUGAAC	SEC ID N.º: 236	GGUGAAUAACUUACAAAUUUGGAAGC
SEC ID N.º: 235	CACUUGCUUGAAAAAGGUCUACAAAAGGA		

Listado de secuencias

- <110> Academisch ziekenhuis Leiden
- Prosensa B.V.
- Prosensa Holding B.v.
- 5 Prosensa Technologies B.v.
- <120> Procedimientos y medios para el salto eficiente del exón 45 en el pre-ARNm de DMD
- <130> P6024691PCT
- <150> PCT/JP2007/50673
- <151> 27/10/2008
- 10 <160> 236
- <170> PatentIn version 3.3
- <210> 1
- <211> 3685
- <212> PRT
- 15 <213> Homo sapiens
- <400> 1

ES 2 532 634 T3

Met Leu Trp Trp Glu Glu Val Glu Asp Cys Tyr Glu Arg Glu Asp Val
 1 5 10 15

Gln Lys Lys Thr Phe Thr Lys Trp Val Asn Ala Gln Phe Ser Lys Phe
 20 25 30

Gly Lys Gln His Ile Glu Asn Leu Phe Ser Asp Leu Gln Asp Gly Arg
 35 40 45

Arg Leu Leu Asp Leu Leu Glu Gly Leu Thr Gly Gln Lys Leu Pro Lys
 50 55 60

Glu Lys Gly Ser Thr Arg Val His Ala Leu Asn Asn Val Asn Lys Ala
 65 70 75 80

Leu Arg Val Leu Gln Asn Asn Asn Val Asp Leu Val Asn Ile Gly Ser
 85 90 95

Thr Asp Ile Val Asp Gly Asn His Lys Leu Thr Leu Gly Leu Ile Trp
 100 105 110

Asn Ile Ile Leu His Trp Gln Val Lys Asn Val Met Lys Asn Ile Met
 115 120 125

Ala Gly Leu Gln Gln Thr Asn Ser Glu Lys Ile Leu Leu Ser Trp Val
 130 135 140

Arg Gln Ser Thr Arg Asn Tyr Pro Gln Val Asn Val Ile Asn Phe Thr
 145 150 155 160

Thr Ser Trp Ser Asp Gly Leu Ala Leu Asn Ala Leu Ile His Ser His
 165 170 175

Arg Pro Asp Leu Phe Asp Trp Asn Ser Val Val Cys Gln Gln Ser Ala
 180 185 190
 Thr Gln Arg Leu Glu His Ala Phe Asn Ile Ala Arg Tyr Gln Leu Gly
 195 200 205
 Ile Glu Lys Leu Leu Asp Pro Glu Asp Val Asp Thr Thr Tyr Pro Asp
 210 215 220
 Lys Lys Ser Ile Leu Met Tyr Ile Thr Ser Leu Phe Gln Val Leu Pro
 225 230 235 240
 Gln Gln Val Ser Ile Glu Ala Ile Gln Glu Val Glu Met Leu Pro Arg
 245 250 255
 Pro Pro Lys Val Thr Lys Glu Glu His Phe Gln Leu His His Gln Met
 260 265 270
 His Tyr Ser Gln Gln Ile Thr Val Ser Leu Ala Gln Gly Tyr Glu Arg
 275 280 285
 Thr Ser Ser Pro Lys Pro Arg Phe Lys Ser Tyr Ala Tyr Thr Gln Ala
 290 295 300
 Ala Tyr Val Thr Thr Ser Asp Pro Thr Arg Ser Pro Phe Pro Ser Gln
 305 310 315 320
 His Leu Glu Ala Pro Glu Asp Lys Ser Phe Gly Ser Ser Leu Met Glu
 325 330 335
 Ser Glu Val Asn Leu Asp Arg Tyr Gln Thr Ala Leu Glu Glu Val Leu
 340 345 350
 Ser Trp Leu Leu Ser Ala Glu Asp Thr Leu Gln Ala Gln Gly Glu Ile
 355 360 365
 Ser Asn Asp Val Glu Val Val Lys Asp Gln Phe His Thr His Glu Gly
 370 375 380
 Tyr Met Met Asp Leu Thr Ala His Gln Gly Arg Val Gly Asn Ile Leu
 385 390 395 400
 Gln Leu Gly Ser Lys Leu Ile Gly Thr Gly Lys Leu Ser Glu Asp Glu
 405 410 415
 Glu Thr Glu Val Gln Glu Gln Met Asn Leu Leu Asn Ser Arg Trp Glu
 420 425 430
 Cys Leu Arg Val Ala Ser Met Glu Lys Gln Ser Asn Leu His Arg Val
 435 440 445

ES 2 532 634 T3

Leu Met Asp Leu Gln Asn Gln Lys Leu Lys Glu Leu Asn Asp Trp Leu
 450 455 460

Thr Lys Thr Glu Glu Arg Thr Arg Lys Met Glu Glu Glu Pro Leu Gly
 465 470 475 480

Pro Asp Leu Glu Asp Leu Lys Arg Gln Val Gln Gln His Lys Val Leu
 485 490 495

Gln Glu Asp Leu Glu Gln Glu Gln Val Arg Val Asn Ser Leu Thr His
 500 505 510

Met Val Val Val Val Asp Glu Ser Ser Gly Asp His Ala Thr Ala Ala
 515 520 525

Leu Glu Glu Gln Leu Lys Val Leu Gly Asp Arg Trp Ala Asn Ile Cys
 530 535 540

Arg Trp Thr Glu Asp Arg Trp Val Leu Leu Gln Asp Ile Leu Leu Lys
 545 550 555 560

Trp Gln Arg Leu Thr Glu Glu Gln Cys Leu Phe Ser Ala Trp Leu Ser
 565 570 575

Glu Lys Glu Asp Ala Val Asn Lys Ile His Thr Thr Gly Phe Lys Asp
 580 585 590

Gln Asn Glu Met Leu Ser Ser Leu Gln Lys Leu Ala Val Leu Lys Ala
 595 600 605

Asp Leu Glu Lys Lys Lys Gln Ser Met Gly Lys Leu Tyr Ser Leu Lys
 610 615 620

Gln Asp Leu Leu Ser Thr Leu Lys Asn Lys Ser Val Thr Gln Lys Thr
 625 630 635 640

Glu Ala Trp Leu Asp Asn Phe Ala Arg Cys Trp Asp Asn Leu Val Gln
 645 650 655

Lys Leu Glu Lys Ser Thr Ala Gln Ile Ser Gln Ala Val Thr Thr Thr
 660 665 670

Gln Pro Ser Leu Thr Gln Thr Thr Val Met Glu Thr Val Thr Thr Val
 675 680 685

Thr Thr Arg Glu Gln Ile Leu Val Lys His Ala Gln Glu Glu Leu Pro
 690 695 700

Pro Pro Pro Pro Gln Lys Lys Arg Gln Ile Thr Val Asp Ser Glu Ile
 705 710 715 720

Arg Lys Arg Leu Asp Val Asp Ile Thr Glu Leu His Ser Trp Ile Thr

				725						730					735				
Arg	Ser	Glu	Ala	Val	Leu	Gln	Ser	Pro	Glu	Phe	Ala	Ile	Phe	Arg	Lys				
			740					745					750						
Glu	Gly	Asn	Phe	Ser	Asp	Leu	Lys	Glu	Lys	Val	Asn	Ala	Ile	Glu	Arg				
		755					760					765							
Glu	Lys	Ala	Glu	Lys	Phe	Arg	Lys	Leu	Gln	Asp	Ala	Ser	Arg	Ser	Ala				
	770					775					780								
Gln	Ala	Leu	Val	Glu	Gln	Met	Val	Asn	Glu	Gly	Val	Asn	Ala	Asp	Ser				
					790					795									800
Ile	Lys	Gln	Ala	Ser	Glu	Gln	Leu	Asn	Ser	Arg	Trp	Ile	Glu	Phe	Cys				
				805					810										
Gln	Leu	Leu	Ser	Glu	Arg	Leu	Asn	Trp	Leu	Glu	Tyr	Gln	Asn	Asn	Ile				
			820					825					830						
Ile	Ala	Phe	Tyr	Asn	Gln	Leu	Gln	Gln	Leu	Glu	Gln	Met	Thr	Thr	Thr				
		835					840					845							
Ala	Glu	Asn	Trp	Leu	Lys	Ile	Gln	Pro	Thr	Thr	Pro	Ser	Glu	Pro	Thr				
	850					855					860								
Ala	Ile	Lys	Ser	Gln	Leu	Lys	Ile	Cys	Lys	Asp	Glu	Val	Asn	Arg	Leu				
					870					875					880				
Ser	Gly	Leu	Gln	Pro	Gln	Ile	Glu	Arg	Leu	Lys	Ile	Gln	Ser	Ile	Ala				
				885					890										
Leu	Lys	Glu	Lys	Gly	Gln	Gly	Pro	Met	Phe	Leu	Asp	Ala	Asp	Phe	Val				
			900					905					910						
Ala	Phe	Thr	Asn	His	Phe	Lys	Gln	Val	Phe	Ser	Asp	Val	Gln	Ala	Arg				
		915					920					925							
Glu	Lys	Glu	Leu	Gln	Thr	Ile	Phe	Asp	Thr	Leu	Pro	Pro	Met	Arg	Tyr				
	930					935					940								
Gln	Glu	Thr	Met	Ser	Ala	Ile	Arg	Thr	Trp	Val	Gln	Gln	Ser	Glu	Thr				
					950					955					960				
Lys	Leu	Ser	Ile	Pro	Gln	Leu	Ser	Val	Thr	Asp	Tyr	Glu	Ile	Met	Glu				
				965					970					975					
Gln	Arg	Leu	Gly	Glu	Leu	Gln	Ala	Leu	Gln	Ser	Ser	Leu	Gln	Glu	Gln				
			980					985					990						
Gln	Ser	Gly	Leu	Tyr	Tyr	Leu	Ser	Thr	Thr	Val	Lys	Glu	Met	Ser	Lys				
		995					1000					1005							

Lys Ala Pro Ser Glu Ile Ser Arg Lys Tyr Gln Ser Glu Phe Glu
 1010 1015 1020
 Glu Ile Glu Gly Arg Trp Lys Lys Leu Ser Ser Gln Leu Val Glu
 1025 1030 1035
 His Cys Gln Lys Leu Glu Glu Gln Met Asn Lys Leu Arg Lys Ile
 1040 1045 1050
 Gln Asn His Ile Gln Thr Leu Lys Lys Trp Met Ala Glu Val Asp
 1055 1060 1065
 Val Phe Leu Lys Glu Glu Trp Pro Ala Leu Gly Asp Ser Glu Ile
 1070 1075 1080
 Leu Lys Lys Gln Leu Lys Gln Cys Arg Leu Leu Val Ser Asp Ile
 1085 1090 1095
 Gln Thr Ile Gln Pro Ser Leu Asn Ser Val Asn Glu Gly Gly Gln
 1100 1105 1110
 Lys Ile Lys Asn Glu Ala Glu Pro Glu Phe Ala Ser Arg Leu Glu
 1115 1120 1125
 Thr Glu Leu Lys Glu Leu Asn Thr Gln Trp Asp His Met Cys Gln
 1130 1135 1140
 Gln Val Tyr Ala Arg Lys Glu Ala Leu Lys Gly Gly Leu Glu Lys
 1145 1150 1155
 Thr Val Ser Leu Gln Lys Asp Leu Ser Glu Met His Glu Trp Met
 1160 1165 1170
 Thr Gln Ala Glu Glu Glu Tyr Leu Glu Arg Asp Phe Glu Tyr Lys
 1175 1180 1185
 Thr Pro Asp Glu Leu Gln Lys Ala Val Glu Glu Met Lys Arg Ala
 1190 1195 1200
 Lys Glu Glu Ala Gln Gln Lys Glu Ala Lys Val Lys Leu Leu Thr
 1205 1210 1215
 Glu Ser Val Asn Ser Val Ile Ala Gln Ala Pro Pro Val Ala Gln
 1220 1225 1230
 Glu Ala Leu Lys Lys Glu Leu Glu Thr Leu Thr Thr Asn Tyr Gln
 1235 1240 1245
 Trp Leu Cys Thr Arg Leu Asn Gly Lys Cys Lys Thr Leu Glu Glu
 1250 1255 1260

Val Trp Ala Cys Trp His Glu Leu Leu Ser Tyr Leu Glu Lys Ala
 1265 1270 1275
 Asn Lys Trp Leu Asn Glu Val Glu Phe Lys Leu Lys Thr Thr Glu
 1280 1285 1290
 Asn Ile Pro Gly Gly Ala Glu Glu Ile Ser Glu Val Leu Asp Ser
 1295 1300 1305
 Leu Glu Asn Leu Met Arg His Ser Glu Asp Asn Pro Asn Gln Ile
 1310 1315 1320
 Arg Ile Leu Ala Gln Thr Leu Thr Asp Gly Gly Val Met Asp Glu
 1325 1330 1335
 Leu Ile Asn Glu Glu Leu Glu Thr Phe Asn Ser Arg Trp Arg Glu
 1340 1345 1350
 Leu His Glu Glu Ala Val Arg Arg Gln Lys Leu Leu Glu Gln Ser
 1355 1360 1365
 Ile Gln Ser Ala Gln Glu Thr Glu Lys Ser Leu His Leu Ile Gln
 1370 1375 1380
 Glu Ser Leu Thr Phe Ile Asp Lys Gln Leu Ala Ala Tyr Ile Ala
 1385 1390 1395
 Asp Lys Val Asp Ala Ala Gln Met Pro Gln Glu Ala Gln Lys Ile
 1400 1405 1410
 Gln Ser Asp Leu Thr Ser His Glu Ile Ser Leu Glu Glu Met Lys
 1415 1420 1425
 Lys His Asn Gln Gly Lys Glu Ala Ala Gln Arg Val Leu Ser Gln
 1430 1435 1440
 Ile Asp Val Ala Gln Lys Lys Leu Gln Asp Val Ser Met Lys Phe
 1445 1450 1455
 Arg Leu Phe Gln Lys Pro Ala Asn Phe Glu Gln Arg Leu Gln Glu
 1460 1465 1470
 Ser Lys Met Ile Leu Asp Glu Val Lys Met His Leu Pro Ala Leu
 1475 1480 1485
 Glu Thr Lys Ser Val Glu Gln Glu Val Val Gln Ser Gln Leu Asn
 1490 1495 1500
 His Cys Val Asn Leu Tyr Lys Ser Leu Ser Glu Val Lys Ser Glu
 1505 1510 1515

Val Glu Met Val Ile Lys Thr Gly Arg Gln Ile Val Gln Lys Lys
 1520 1525 1530
 Gln Thr Glu Asn Pro Lys Glu Leu Asp Glu Arg Val Thr Ala Leu
 1535 1540 1545
 Lys Leu His Tyr Asn Glu Leu Gly Ala Lys Val Thr Glu Arg Lys
 1550 1555 1560
 Gln Gln Leu Glu Lys Cys Leu Lys Leu Ser Arg Lys Met Arg Lys
 1565 1570 1575
 Glu Met Asn Val Leu Thr Glu Trp Leu Ala Ala Thr Asp Met Glu
 1580 1585 1590
 Leu Thr Lys Arg Ser Ala Val Glu Gly Met Pro Ser Asn Leu Asp
 1595 1600 1605
 Ser Glu Val Ala Trp Gly Lys Ala Thr Gln Lys Glu Ile Glu Lys
 1610 1615 1620
 Gln Lys Val His Leu Lys Ser Ile Thr Glu Val Gly Glu Ala Leu
 1625 1630 1635
 Lys Thr Val Leu Gly Lys Lys Glu Thr Leu Val Glu Asp Lys Leu
 1640 1645 1650
 Ser Leu Leu Asn Ser Asn Trp Ile Ala Val Thr Ser Arg Ala Glu
 1655 1660 1665
 Glu Trp Leu Asn Leu Leu Leu Glu Tyr Gln Lys His Met Glu Thr
 1670 1675 1680
 Phe Asp Gln Asn Val Asp His Ile Thr Lys Trp Ile Ile Gln Ala
 1685 1690 1695
 Asp Thr Leu Leu Asp Glu Ser Glu Lys Lys Lys Pro Gln Gln Lys
 1700 1705 1710
 Glu Asp Val Leu Lys Arg Leu Lys Ala Glu Leu Asn Asp Ile Arg
 1715 1720 1725
 Pro Lys Val Asp Ser Thr Arg Asp Gln Ala Ala Asn Leu Met Ala
 1730 1735 1740
 Asn Arg Gly Asp His Cys Arg Lys Leu Val Glu Pro Gln Ile Ser
 1745 1750 1755
 Glu Leu Asn His Arg Phe Ala Ala Ile Ser His Arg Ile Lys Thr
 1760 1765 1770
 Gly Lys Ala Ser Ile Pro Leu Lys Glu Leu Glu Gln Phe Asn Ser

ES 2 532 634 T3

1775						1780						1785		
Asp	Ile	Gln	Lys	Leu	Leu	Glu	Pro	Leu	Glu	Ala	Glu	Ile	Gln	Gln
	1790					1795					1800			
Gly	Val	Asn	Leu	Lys	Glu	Glu	Asp	Phe	Asn	Lys	Asp	Met	Asn	Glu
	1805					1810					1815			
Asp	Asn	Glu	Gly	Thr	Val	Lys	Glu	Leu	Leu	Gln	Arg	Gly	Asp	Asn
	1820					1825					1830			
Leu	Gln	Gln	Arg	Ile	Thr	Asp	Glu	Arg	Lys	Arg	Glu	Glu	Ile	Lys
	1835					1840					1845			
Ile	Lys	Gln	Gln	Leu	Leu	Gln	Thr	Lys	His	Asn	Ala	Leu	Lys	Asp
	1850					1855					1860			
Leu	Arg	Ser	Gln	Arg	Arg	Lys	Lys	Ala	Leu	Glu	Ile	Ser	His	Gln
	1865					1870					1875			
Trp	Tyr	Gln	Tyr	Lys	Arg	Gln	Ala	Asp	Asp	Leu	Leu	Lys	Cys	Leu
	1880					1885					1890			
Asp	Asp	Ile	Glu	Lys	Lys	Leu	Ala	Ser	Leu	Pro	Glu	Pro	Arg	Asp
	1895					1900					1905			
Glu	Arg	Lys	Ile	Lys	Glu	Ile	Asp	Arg	Glu	Leu	Gln	Lys	Lys	Lys
	1910					1915					1920			
Glu	Glu	Leu	Asn	Ala	Val	Arg	Arg	Gln	Ala	Glu	Gly	Leu	Ser	Glu
	1925					1930					1935			
Asp	Gly	Ala	Ala	Met	Ala	Val	Glu	Pro	Thr	Gln	Ile	Gln	Leu	Ser
	1940					1945					1950			
Lys	Arg	Trp	Arg	Glu	Ile	Glu	Ser	Lys	Phe	Ala	Gln	Phe	Arg	Arg
	1955					1960					1965			
Leu	Asn	Phe	Ala	Gln	Ile	His	Thr	Val	Arg	Glu	Glu	Thr	Met	Met
	1970					1975					1980			
Val	Met	Thr	Glu	Asp	Met	Pro	Leu	Glu	Ile	Ser	Tyr	Val	Pro	Ser
	1985					1990					1995			
Thr	Tyr	Leu	Thr	Glu	Ile	Thr	His	Val	Ser	Gln	Ala	Leu	Leu	Glu
	2000					2005					2010			
Val	Glu	Gln	Leu	Leu	Asn	Ala	Pro	Asp	Leu	Cys	Ala	Lys	Asp	Phe
	2015					2020					2025			
Glu	Asp	Leu	Phe	Lys	Gln	Glu	Glu	Ser	Leu	Lys	Asn	Ile	Lys	Asp
	2030					2035					2040			

Ser Leu Gln Gln Ser Ser Gly Arg Ile Asp Ile Ile His Ser Lys
 2045 2050 2055

Lys Thr Ala Ala Leu Gln Ser Ala Thr Pro Val Glu Arg Val Lys
 2060 2065 2070

Leu Gln Glu Ala Leu Ser Gln Leu Asp Phe Gln Trp Glu Lys Val
 2075 2080 2085

Asn Lys Met Tyr Lys Asp Arg Gln Gly Arg Phe Asp Arg Ser Val
 2090 2095 2100

Glu Lys Trp Arg Arg Phe His Tyr Asp Ile Lys Ile Phe Asn Gln
 2105 2110 2115

Trp Leu Thr Glu Ala Glu Gln Phe Leu Arg Lys Thr Gln Ile Pro
 2120 2125 2130

Glu Asn Trp Glu His Ala Lys Tyr Lys Trp Tyr Leu Lys Glu Leu
 2135 2140 2145

Gln Asp Gly Ile Gly Gln Arg Gln Thr Val Val Arg Thr Leu Asn
 2150 2155 2160

Ala Thr Gly Glu Glu Ile Ile Gln Gln Ser Ser Lys Thr Asp Ala
 2165 2170 2175

Ser Ile Leu Gln Glu Lys Leu Gly Ser Leu Asn Leu Arg Trp Gln
 2180 2185 2190

Glu Val Cys Lys Gln Leu Ser Asp Arg Lys Lys Arg Leu Glu Glu
 2195 2200 2205

Gln Lys Asn Ile Leu Ser Glu Phe Gln Arg Asp Leu Asn Glu Phe
 2210 2215 2220

Val Leu Trp Leu Glu Glu Ala Asp Asn Ile Ala Ser Ile Pro Leu
 2225 2230 2235

Glu Pro Gly Lys Glu Gln Gln Leu Lys Glu Lys Leu Glu Gln Val
 2240 2245 2250

Lys Leu Leu Val Glu Glu Leu Pro Leu Arg Gln Gly Ile Leu Lys
 2255 2260 2265

Gln Leu Asn Glu Thr Gly Gly Pro Val Leu Val Ser Ala Pro Ile
 2270 2275 2280

Ser Pro Glu Glu Gln Asp Lys Leu Glu Asn Lys Leu Lys Gln Thr
 2285 2290 2295

Asn Leu Gln Trp Ile Lys Val Ser Arg Ala Leu Pro Glu Lys Gln
 2300 2305 2310

Gly Glu Ile Glu Ala Gln Ile Lys Asp Leu Gly Gln Leu Glu Lys
 2315 2320 2325

Lys Leu Glu Asp Leu Glu Glu Gln Leu Asn His Leu Leu Leu Trp
 2330 2335 2340

Leu Ser Pro Ile Arg Asn Gln Leu Glu Ile Tyr Asn Gln Pro Asn
 2345 2350 2355

Gln Glu Gly Pro Phe Asp Val Gln Glu Thr Glu Ile Ala Val Gln
 2360 2365 2370

Ala Lys Gln Pro Asp Val Glu Glu Ile Leu Ser Lys Gly Gln His
 2375 2380 2385

Leu Tyr Lys Glu Lys Pro Ala Thr Gln Pro Val Lys Arg Lys Leu
 2390 2395 2400

Glu Asp Leu Ser Ser Glu Trp Lys Ala Val Asn Arg Leu Leu Gln
 2405 2410 2415

Glu Leu Arg Ala Lys Gln Pro Asp Leu Ala Pro Gly Leu Thr Thr
 2420 2425 2430

Ile Gly Ala Ser Pro Thr Gln Thr Val Thr Leu Val Thr Gln Pro
 2435 2440 2445

Val Val Thr Lys Glu Thr Ala Ile Ser Lys Leu Glu Met Pro Ser
 2450 2455 2460

Ser Leu Met Leu Glu Val Pro Ala Leu Ala Asp Phe Asn Arg Ala
 2465 2470 2475

Trp Thr Glu Leu Thr Asp Trp Leu Ser Leu Leu Asp Gln Val Ile
 2480 2485 2490

Lys Ser Gln Arg Val Met Val Gly Asp Leu Glu Asp Ile Asn Glu
 2495 2500 2505

Met Ile Ile Lys Gln Lys Ala Thr Met Gln Asp Leu Glu Gln Arg
 2510 2515 2520

Arg Pro Gln Leu Glu Glu Leu Ile Thr Ala Ala Gln Asn Leu Lys
 2525 2530 2535

Asn Lys Thr Ser Asn Gln Glu Ala Arg Thr Ile Ile Thr Asp Arg
 2540 2545 2550

Ile Glu Arg Ile Gln Asn Gln Trp Asp Glu Val Gln Glu His Leu
 2555 2560 2565

Gln Asn Arg Arg Gln Gln Leu Asn Glu Met Leu Lys Asp Ser Thr
 2570 2575 2580

Gln Trp Leu Glu Ala Lys Glu Glu Ala Glu Gln Val Leu Gly Gln
 2585 2590 2595

Ala Arg Ala Lys Leu Glu Ser Trp Lys Glu Gly Pro Tyr Thr Val
 2600 2605 2610

Asp Ala Ile Gln Lys Lys Ile Thr Glu Thr Lys Gln Leu Ala Lys
 2615 2620 2625

Asp Leu Arg Gln Trp Gln Thr Asn Val Asp Val Ala Asn Asp Leu
 2630 2635 2640

Ala Leu Lys Leu Leu Arg Asp Tyr Ser Ala Asp Asp Thr Arg Lys
 2645 2650 2655

Val His Met Ile Thr Glu Asn Ile Asn Ala Ser Trp Arg Ser Ile
 2660 2665 2670

His Lys Arg Val Ser Glu Arg Glu Ala Ala Leu Glu Glu Thr His
 2675 2680 2685

Arg Leu Leu Gln Gln Phe Pro Leu Asp Leu Glu Lys Phe Leu Ala
 2690 2695 2700

Trp Leu Thr Glu Ala Glu Thr Thr Ala Asn Val Leu Gln Asp Ala
 2705 2710 2715

Thr Arg Lys Glu Arg Leu Leu Glu Asp Ser Lys Gly Val Lys Glu
 2720 2725 2730

Leu Met Lys Gln Trp Gln Asp Leu Gln Gly Glu Ile Glu Ala His
 2735 2740 2745

Thr Asp Val Tyr His Asn Leu Asp Glu Asn Ser Gln Lys Ile Leu
 2750 2755 2760

Arg Ser Leu Glu Gly Ser Asp Asp Ala Val Leu Leu Gln Arg Arg
 2765 2770 2775

Leu Asp Asn Met Asn Phe Lys Trp Ser Glu Leu Arg Lys Lys Ser
 2780 2785 2790

Leu Asn Ile Arg Ser His Leu Glu Ala Ser Ser Asp Gln Trp Lys
 2795 2800 2805

Arg Leu His Leu Ser Leu Gln Glu Leu Leu Val Trp Leu Gln Leu

ES 2 532 634 T3

2810						2815						2820		
Lys	Asp	Asp	Glu	Leu	Ser	Arg	Gln	Ala	Pro	Ile	Gly	Gly	Asp	Phe
	2825					2830					2835			
Pro	Ala	Val	Gln	Lys	Gln	Asn	Asp	Val	His	Arg	Ala	Phe	Lys	Arg
	2840					2845					2850			
Glu	Leu	Lys	Thr	Lys	Glu	Pro	Val	Ile	Met	Ser	Thr	Leu	Glu	Thr
	2855					2860					2865			
Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Thr	Glu	Gln	Pro	Leu	Glu	Gly	Leu	Glu	Lys
	2870					2875					2880			
Leu	Tyr	Gln	Glu	Pro	Arg	Glu	Leu	Pro	Pro	Glu	Glu	Arg	Ala	Gln
	2885					2890					2895			
Asn	Val	Thr	Arg	Leu	Leu	Arg	Lys	Gln	Ala	Glu	Glu	Val	Asn	Thr
	2900					2905					2910			
Glu	Trp	Glu	Lys	Leu	Asn	Leu	His	Ser	Ala	Asp	Trp	Gln	Arg	Lys
	2915					2920					2925			
Ile	Asp	Glu	Thr	Leu	Glu	Arg	Leu	Gln	Glu	Leu	Gln	Glu	Ala	Thr
	2930					2935					2940			
Asp	Glu	Leu	Asp	Leu	Lys	Leu	Arg	Gln	Ala	Glu	Val	Ile	Lys	Gly
	2945					2950					2955			
Ser	Trp	Gln	Pro	Val	Gly	Asp	Leu	Leu	Ile	Asp	Ser	Leu	Gln	Asp
	2960					2965					2970			
His	Leu	Glu	Lys	Val	Lys	Ala	Leu	Arg	Gly	Glu	Ile	Ala	Pro	Leu
	2975					2980					2985			
Lys	Glu	Asn	Val	Ser	His	Val	Asn	Asp	Leu	Ala	Arg	Gln	Leu	Thr
	2990					2995					3000			
Thr	Leu	Gly	Ile	Gln	Leu	Ser	Pro	Tyr	Asn	Leu	Ser	Thr	Leu	Glu
	3005					3010					3015			
Asp	Leu	Asn	Thr	Arg	Trp	Lys	Leu	Leu	Gln	Val	Ala	Val	Glu	Asp
	3020					3025					3030			
Arg	Val	Arg	Gln	Leu	His	Glu	Ala	His	Arg	Asp	Phe	Gly	Pro	Ala
	3035					3040					3045			
Ser	Gln	His	Phe	Leu	Ser	Thr	Ser	Val	Gln	Gly	Pro	Trp	Glu	Arg
	3050					3055					3060			
Ala	Ile	Ser	Pro	Asn	Lys	Val	Pro	Tyr	Tyr	Ile	Asn	His	Glu	Thr
	3065					3070					3075			

Gln Thr Thr Cys Trp Asp His Pro Lys Met Thr Glu Leu Tyr Gln
 3080 3085 3090
 Ser Leu Ala Asp Leu Asn Asn Val Arg Phe Ser Ala Tyr Arg Thr
 3095 3100 3105
 Ala Met Lys Leu Arg Arg Leu Gln Lys Ala Leu Cys Leu Asp Leu
 3110 3115 3120
 Leu Ser Leu Ser Ala Ala Cys Asp Ala Leu Asp Gln His Asn Leu
 3125 3130 3135
 Lys Gln Asn Asp Gln Pro Met Asp Ile Leu Gln Ile Ile Asn Cys
 3140 3145 3150
 Leu Thr Thr Ile Tyr Asp Arg Leu Glu Gln Glu His Asn Asn Leu
 3155 3160 3165
 Val Asn Val Pro Leu Cys Val Asp Met Cys Leu Asn Trp Leu Leu
 3170 3175 3180
 Asn Val Tyr Asp Thr Gly Arg Thr Gly Arg Ile Arg Val Leu Ser
 3185 3190 3195
 Phe Lys Thr Gly Ile Ile Ser Leu Cys Lys Ala His Leu Glu Asp
 3200 3205 3210
 Lys Tyr Arg Tyr Leu Phe Lys Gln Val Ala Ser Ser Thr Gly Phe
 3215 3220 3225
 Cys Asp Gln Arg Arg Leu Gly Leu Leu Leu His Asp Ser Ile Gln
 3230 3235 3240
 Ile Pro Arg Gln Leu Gly Glu Val Ala Ser Phe Gly Gly Ser Asn
 3245 3250 3255
 Ile Glu Pro Ser Val Arg Ser Cys Phe Gln Phe Ala Asn Asn Lys
 3260 3265 3270
 Pro Glu Ile Glu Ala Ala Leu Phe Leu Asp Trp Met Arg Leu Glu
 3275 3280 3285
 Pro Gln Ser Met Val Trp Leu Pro Val Leu His Arg Val Ala Ala
 3290 3295 3300
 Ala Glu Thr Ala Lys His Gln Ala Lys Cys Asn Ile Cys Lys Glu
 3305 3310 3315
 Cys Pro Ile Ile Gly Phe Arg Tyr Arg Ser Leu Lys His Phe Asn
 3320 3325 3330

Tyr Asp Ile Cys Gln Ser Cys Phe Phe Ser Gly Arg Val Ala Lys
 3335 3340 3345
 Gly His Lys Met His Tyr Pro Met Val Glu Tyr Cys Thr Pro Thr
 3350 3355 3360
 Thr Ser Gly Glu Asp Val Arg Asp Phe Ala Lys Val Leu Lys Asn
 3365 3370 3375
 Lys Phe Arg Thr Lys Arg Tyr Phe Ala Lys His Pro Arg Met Gly
 3380 3385 3390
 Tyr Leu Pro Val Gln Thr Val Leu Glu Gly Asp Asn Met Glu Thr
 3395 3400 3405
 Pro Val Thr Leu Ile Asn Phe Trp Pro Val Asp Ser Ala Pro Ala
 3410 3415 3420
 Ser Ser Pro Gln Leu Ser His Asp Asp Thr His Ser Arg Ile Glu
 3425 3430 3435
 His Tyr Ala Ser Arg Leu Ala Glu Met Glu Asn Ser Asn Gly Ser
 3440 3445 3450
 Tyr Leu Asn Asp Ser Ile Ser Pro Asn Glu Ser Ile Asp Asp Glu
 3455 3460 3465
 His Leu Leu Ile Gln His Tyr Cys Gln Ser Leu Asn Gln Asp Ser
 3470 3475 3480
 Pro Leu Ser Gln Pro Arg Ser Pro Ala Gln Ile Leu Ile Ser Leu
 3485 3490 3495
 Glu Ser Glu Glu Arg Gly Glu Leu Glu Arg Ile Leu Ala Asp Leu
 3500 3505 3510
 Glu Glu Glu Asn Arg Asn Leu Gln Ala Glu Tyr Asp Arg Leu Lys
 3515 3520 3525
 Gln Gln His Glu His Lys Gly Leu Ser Pro Leu Pro Ser Pro Pro
 3530 3535 3540
 Glu Met Met Pro Thr Ser Pro Gln Ser Pro Arg Asp Ala Glu Leu
 3545 3550 3555
 Ile Ala Glu Ala Lys Leu Leu Arg Gln His Lys Gly Arg Leu Glu
 3560 3565 3570
 Ala Arg Met Gln Ile Leu Glu Asp His Asn Lys Gln Leu Glu Ser
 3575 3580 3585

Gln Leu His Arg Leu Arg Gln Leu Leu Glu Gln Pro Gln Ala Glu
 3590 3595 3600

Ala Lys Val Asn Gly Thr Thr Val Ser Ser Pro Ser Thr Ser Leu
 3605 3610 3615

Gln Arg Ser Asp Ser Ser Gln Pro Met Leu Leu Arg Val Val Gly
 3620 3625 3630

Ser Gln Thr Ser Asp Ser Met Gly Glu Glu Asp Leu Leu Ser Pro
 3635 3640 3645

Pro Gln Asp Thr Ser Thr Gly Leu Glu Glu Val Met Glu Gln Leu
 3650 3655 3660

Asn Asn Ser Phe Pro Ser Ser Arg Gly Arg Asn Thr Pro Gly Lys
 3665 3670 3675

Pro Met Arg Glu Asp Thr Met
 3680 3685

<210> 2

<211> 75

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> exón

<400> 2

ccaggauggc auugggcagc ggcaaacugu ugucagaaca uugaaugcaa cuggggaaga 60
aaauuucag caauc 75

10 <210> 3

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 2

uuugccgcug cccaugcca uccug 25

<210> 4

<211> 25

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>
<223> oligonucleótido
<400> 4
auucaauguu cugacaacag uugc 25

5 <210> 5
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>

10 <223> oligonucleótido
<400> 5
ccaguugcau ucaauguucu gacaa 25
<210> 6
<211> 22

15 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 6

20 caguugcauu caauguucug ac 22
<210> 7
<211> 20
<212> ARN
<213> artificial

25 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 7
aguugcauuc aauguucuga 20
<210> 8

30 <211> 21
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

35 <400> 8
gauugcugaa uuauuucuc c 21
<210> 9

<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 9
gauugcugaa uuauuucuuc cccag 25
<210> 10
<211> 25
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 10
15 auugcugaau uauuucuucc ccagu 25
<210> 11
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 11
uugcugaauu auuucuuccc caguu 25
<210> 12
25 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 12
ugcugaauua uuucuucccc aguug 25
<210> 13
<211> 25
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 13
gcugaauuau uucuucccca guugc 25
<210> 14
<211> 25
5 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 14
10 cugaauuaauu ucuuccccag uugca 25
<210> 15
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
15 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 15
ugaauuauuu cuuccccagu ugcau 25
<210> 16
20 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
25 <400> 16
gaauuauuc uuccccaguu gcauu 25
<210> 17
<211> 25
<212> ARN
30 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 17
aauuauuucu ucccaguug cauuc 25
35 <210> 18
<211> 25
<212> ARN

<213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 18
 5 auuauuucu cccaguugc auca 25
 <210> 19
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 10 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 19
 uuauuucuucc ccaguugca uucaa 25
 <210> 20
 15 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 20 <400> 20
 uauuucuucc ccaguugcau ucaau 25
 <210> 21
 <211> 25
 <212> ARN
 25 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 21
 auuucuucc caguugcau caaug 25
 30 <210> 22
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 35 <223> oligonucleótido
 <400> 22
 uuucuuccc aguugcauuc aaugu 25

<210> 23
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 5 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 23
 ucuuccccag uugcaucaa uguuc 25
 <210> 24
 10 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 15 <400> 24
 ucuuccccag ugcaucaa uguuc 25
 <210> 25
 <211> 25
 <212> ARN
 20 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 25
 cuuccccagu ugcaucaa uguuc 25
 25 <210> 26
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 30 <223> oligonucleótido
 <400> 26
 uuccccaguu gcaucaa uguuc 25
 <210> 27
 <211> 25
 35 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>

<223> oligonucleótido
<400> 27
uccccaguug cauucaaugu ucuga 25
<210> 28
5 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
10 <400> 28
cccaguugc auucaauguu cugac 25
<210> 29
<211> 25
<212> ARN
15 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 29
ccaguugca uucaauguuc ugaca 25
20 <210> 30
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
25 <223> oligonucleótido
<400> 30
ccaguugcau ucaauguucu gacaa 25
<210> 31
<211> 25
30 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 31
35 caguugcauu caauguucug acaac 25
<210> 32
<211> 25

- <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
- 5 <400> 32
aguugcauuc aaguucuga caaca 25
<210> 33
<211> 20
<212> ARN
- 10 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 33
uccuguagaa uacuggcauc 20
- 15 <210> 34
<211> 27
<212> ARN
<213> artificial
<220>
- 20 <223> oligonucleótido
<400> 34
ugcagaccuc cugccaccgc agauuca 27
<210> 35
<211> 34
- 25 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 35
- 30 uugcagaccu ccugccaccg cagauucagg cuuc 34
<210> 36
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
- 35 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 36

guugcauuca auguucugac aacag 25

<210> 37

<211> 25

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 37

uugcauucaa uguucugaca acagu 25

10 <210> 38

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 38

ugcauucaau guucugaca caguu 25

<210> 39

<211> 25

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 39

25 gcaucaaug uucugacaac aguuu 25

<210> 40

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 40

caucaaugu ucugacaaca guuug 25

<210> 41

35 <211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>
<223> oligonucleótido
<400> 41
auucaauguu cugacaacag uuugc 25
5 <210> 42
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
10 <223> oligonucleótido
<400> 42
ucaauguucu gacaacaguu ugccg 25
<210> 43
<211> 25
15 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 43
20 caauguucug acaacaguuu gccgc 25
<210> 44
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
25 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 44
aauguucuga caacaguuug ccgcu 25
<210> 45
30 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
35 <400> 45
auguucugac aacaguuugc cgug 25
<210> 46

<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 46
uguucugaca acaguugcc gcugc 25
<210> 47
<211> 25
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 47
15 guucugacaa caguugccg cugcc 25
<210> 48
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 48
uucugacaac aguuugccgc ugccc 25
<210> 49
25 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 49
ucugacaaca guuuugccgcu gccca 25
<210> 50
<211> 25
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 50
cugacaacag uuugccgcug ccaa 25
<210> 51
<211> 25
5 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 51
10 ugacaacagu uugccgcugc ccaau 25
<210> 52
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
15 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 52
gacaacaguu ugccgcugcc caaug 25
<210> 53
20 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
25 <400> 53
acaacaguuu gccgcugccc aaugc 25
<210> 54
<211> 25
<212> ARN
30 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 54
caacaguuug ccgcugccca augcc 25
35 <210> 55
<211> 25
<212> ARN

<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 55
5 aacaguuugc gcgugcccaa ugcca 25
<210> 56
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
10 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 56
acaguuugcc gcugcccaau gccau 25
<210> 57
15 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
20 <400> 57
caguuugccg cugcccaaug ccauc 25
<210> 58
<211> 25
<212> ARN
25 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 58
aguuugccgc ugcccaaugc caucc 25
30 <210> 59
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
35 <223> oligonucleótido
<400> 59
guuugccgcu gcccaaugcc auccu 25

<210> 60
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 5 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 60
 uuugccgcug cccaugcca uccug 25
 <210> 61
 10 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 15 <400> 61
 uugccgcugc ccaaugccau ccugg 25
 <210> 62
 <211> 25
 <212> ARN
 20 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 62
 ugccgcugcc caaugccauc cugga 25
 25 <210> 63
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 30 <223> oligonucleótido
 <400> 63
 gccgcugccc aaugccauc uggag 25
 <210> 64
 <211> 25
 35 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>

<223> oligonucleótido
<400> 64
ccgugccca augccauccu ggagu 25
<210> 65
5 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
10 <400> 65
cgcugcccaa ugccauccug gaguu 25
<210> 66
<211> 20
<212> ARN
15 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 66
uguuuuugag gauugcugaa 20
20 <210> 67
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
25 <223> oligonucleótido
<400> 67
uguucugaca acaguuugcc gcugcccaau gccauccugg gccauccugg 40
<210> 68
<211> 17
30 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 68
35 gcccaaugcc auccugg 17
<210> 69
<211> 25

<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
5 <400> 69
agagcaggua ccuccaacauc caagg 25
<210> 70
<211> 25
<212> ARN
10 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 70
gagcagguac cuccaacauc aagga 25
15 <210> 71
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
20 <223> oligonucleótido
<400> 71
agcagguacc uccaacauc agga 25
<210> 72
<211> 25
25 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 72
30 gcagguaccu ccaacauc ggaag 25
<210> 73
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
35 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 73

cagguccuc caacaucaag gaaga 25

<210> 74

<211> 25

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 74

agguaccucc aacuacaagg aagau 25

10 <210> 75

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 75

gguaccucca acaucaagga agaag 25

<210> 76

<211> 25

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 76

25 guaccuccaa caucaaggaa gaugg 25

<210> 77

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 77

uaccuccac aucaaggaag auggc 25

<210> 78

35 <211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>
<223> oligonucleótido
<400> 78
accuccaaca ucaaggaaga uggca 25

5 <210> 79
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>

10 <223> oligonucleótido
<400> 79
ccuccaacaau caaggaagau ggcau 25
<210> 80
<211> 25

15 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 80

20 cuccaacauc aaggaagau gcauu 25
<210> 81
<211> 30
<212> ARN
<213> artificial

25 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 81
cuccaacauc aaggaagau gcauuucuag 30
<210> 82

30 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

35 <400> 82
uccaacauca aggaagau gcauuu 25
<210> 83

<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 83
ccaacaucaaggaaguggc auuuc 25
<210> 84
<211> 25
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 84
15 caacaucaag gaaguggca uuuc 25
<210> 85
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 85
aacaucaagg aaguggcau uucua 25
<210> 86
25 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 86
acaucaagga agauggcauu ucuag 25
<210> 87
<211> 30
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 87
acaucaagga agauggcauu ucuaguuugg 30
<210> 88
<211> 25
5 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 88
10 acaucaagga agauggcauu ucuag 25
<210> 89
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
15 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 89
caucaaggaa gauggcauuu cuagu 25
<210> 90
20 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
25 <400> 90
aucaaggaag auggcauuuc uaguu 25
<210> 91
<211> 25
<212> ARN
30 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 91
ucaaggaaga uggcauuucu aguuu 25
35 <210> 92
<211> 20
<212> ARN

<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 92
5 ucaaggaaga uggcauuucu 20
<210> 93
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
10 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 93
caaggaagau ggcauuucua guuug 25
<210> 94
15 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
20 <400> 94
aaggaagaug gcauuucuag uuugg 25
<210> 95
<211> 25
<212> ARN
25 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 95
aggaagaugg cauuucuagu uugga 25
30 <210> 96
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
35 <223> oligonucleótido
<400> 96
ggaagauggc auuucuaguu uggag 25

<210> 97
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
5 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 97
gaagauggca uuucuaguuu ggaga 25
<210> 98
10 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
15 <400> 98
aagauggcau uucuaguuug gagau 25
<210> 99
<211> 25
<212> ARN
20 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 99
agauggcauu ucuaguuugg agaug 25
25 <210> 100
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
30 <223> oligonucleótido
<400> 100
gauggcauuu cuaguuugga gaugg 25
<210> 101
<211> 25
35 <212> ARN
<213> artificial
<220>

<223> oligonucleótido
 <400> 101
 auggcauuuc uaguuggag auggc 25
 <210> 102
 5 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 10 <400> 102
 uggcauuucu aguuuggaga uggca 25
 <210> 103
 <211> 25
 <212> ARN
 15 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 103
 ggcauuucua guuuggagau ggca 25
 20 <210> 103
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 25 <223> oligonucleótido
 <400> 103
 ggcauuucua guuuggagau ggca 25
 <210> 104
 <211> 25
 30 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 104
 35 gcuuuucua uuuggagaug gcagu 25
 <210> 105
 <211> 25

<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
5 <400> 105
cauuucuagu uuggagaugg caguu 25
<210> 106
<211> 25
<212> ARN
10 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 106
auuucuaguu uggagauggc aguuu 25
15 <210> 107
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
20 <223> oligonucleótido
<400> 107
uuucuaguuu ggagauggca guuuc 25
<210> 108
<211> 25
25 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 108
30 uucuaguuug gagauggcag uuucc 25
<210> 109
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
35 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 109

ccauguguu gaaucuuua acuu 25

<210> 110

<211> 22

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 110

ccauguguu gaaucuuua ac 22

10 <210> 111

<211> 20

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 111

auuguguuga auccuuuaac 20

<210> 112

<211> 20

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 112

25 ccuguccuaa gaccugcuca 20

<210> 113

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 113

cuuuuggauu gcaucuacug uauag 25

<210> 114

35 <211> 20

<212> ARN

<213> artificial

<220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 114
 cauUCAACUG UGCCUCCGG UUCUG 25
 5 <210> 115
 <211> 24
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 10 <223> oligonucleótido
 <400> 115
 CUGUUGCCUC CGGUUCUGA GGUG 24
 <210> 116
 <211> 31
 15 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 116
 20 cauUCAACUG UGCCUCCGG UUCUGAAGGU G 31
 <210> 117
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 25 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 117
 CUGAAGGUGU UCUUGUACUU CAUC 25
 <210> 118
 30 <211> 27
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 35 <400> 118
 UGUUAAGGA CCCUCCUCC AUGACUC 27
 <210> 119

<211> 20
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 119
auccacuga uucgaauc 20
<210> 120
<211> 22
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 120
15 uggcucugg ccuguccaa ga 22
<210> 121
<211> 35
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 121
aagaccugcu cagcuucuc cuuagcuucc agcca 35
<210> 122
25 <211> 23
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 122
ugcauguucc agucguugug ugg 23
<210> 123
<211> 25
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 122
 ugcauguucc agucguugug ugg 23
 <210> 123
 <211> 25
 5 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 123
 10 cacuauucca gucaaaauagg ucugg 25
 <210> 124
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 15 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 124
 auuuaccaac cuucaggauc gagua 25
 <210> 125
 20 <211> 21
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 25 <400> 125
 ggccuaaaac acauacacau a 21
 <210> 126
 <211> 20
 <212> ARN
 30 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 123
 ucagcuucug uuagccacug 20
 35 <210> 127
 <211> 20
 <212> ARN

<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 127
5 uucagcuucu guuagccacu 20
<210> 128
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
10 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 128
uucagcuucu guuagccacu g 21
<210> 129
15 <211> 21
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
20 <400> 129
ucagcuucug uuagccacug a 21
<210> 130
<211> 22
<212> ARN
25 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 130
uucagcuucu guuagccacu ga 22
30 <210> 131
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
<220>
35 <223> oligonucleótido
<400> 131
ucagcuucug uuagccacug a 21

<210> 132
<211> 22
<212> ARN
<213> artificial
5 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 132
uucagcuucu guuagccacu ga 22
<210> 133
10 <211> 22
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
15 <400> 133
ucagcuucug uuagccacug au 22
<210> 134
<211> 23
<212> ARN
20 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 134
uucagcuucu guuagccacu gau 23
25 <210> 135
<211> 23
<212> ARN
<213> artificial
<220>
30 <223> oligonucleótido
<400> 135
ucagcuucug uuagccacug auu 23
<210> 136
<211> 24
35 <212> ARN
<213> artificial
<220>

- <223> oligonucleótido
<400> 136
uucagcuucu guuagccacu gauuu 24
<210> 137
- 5 <211> 24
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
- 10 <400> 137
ucagcuucug uuagccacug auua 24
<210> 138
<211> 24
<212> ARN
- 15 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 138
uucagcuucu guuagccacu gaua 24
- 20 <210> 139
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
- 25 <223> oligonucleótido
<400> 139
ucagcuucug uuagccacug auuaa 25
<210> 140
<211> 26
- 30 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 140
- 35 uucagcuucu guuagccacu gauuaa 26
<210> 141
<211> 26

<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
5 <400> 141
ucagcuucug uuagccacug auuaaa 26
<210> 142
<211> 27
<212> ARN
10 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 142
uucagcuucu guuagccacu gauuaaa 27
15 <210> 143
<211> 19
<212> ARN
<213> artificial
<220>
20 <223> oligonucleótido
<400> 143
cagcuucugu uagccacug 19
<210> 144
<211> 21
25 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 144
30 cagcuucugu uagccacuga u 21
<210> 145
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
35 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 145

agcuucuguu agccacugau u 21

<210> 146

<211> 22

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 146

cagcuucugu uagccacuga uu 22

10 <210> 147

<211> 22

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 147

agcuucuguu agccacugau ua 22

<210> 148

<211> 23

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 148

25 cagcuucugu uagccacuga uua 23

<210> 149

<211> 23

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 149

agcuucuguu agccacugau uaa 23

<210> 150

35 <211> 24

<212> ARN

<213> artificial

<220>
<223> oligonucleótido
<400> 150
cagcuucugu uagccacuga uaaa
5 <210> 151
<211> 24
<212> ARN
<213> artificial
<220>
10 <223> oligonucleótido
<400> 151
agcuucuguu agccacugau uaaa 24
<210> 152
<211> 25
15 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 152
20 cagcuucugu uagccacuga uaaaa 25
<210> 153
<211> 24
<212> ARN
<213> artificial
25 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 153
agcuucuguu agccacugau uaaa 24
<210> 154
30 <211> 20
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
35 <400> 154
agcuucuguu agccacugau 20
<210> 155

<211> 20
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 155
gcuucuguua gccacugauu 20
<210> 156
<211> 21
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 156
15 agcuucuguu agccacugau u 21
<210> 157
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 157
gcuucuguua gccacugauu a 21
<210> 158
25 <211> 22
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 158
agcuucuguu agccacugau ua 22
<210> 159
<211> 22
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 159
gcuucuguua gccacugauu aa 22
<210> 160
<211> 23
5 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 160
10 agcuucuguu agccacugau uaa 23
<210> 161
<211> 23
<212> ARN
<213> artificial
15 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 161
gcuucuguua gccacugauu aaa 23
<210> 162
20 <211> 24
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
25 <400> 162
agcuucuguu agccacugau uaaa 27
<210> 163
<211> 23
<212> ARN
30 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 163
gcuucuguua gccacugauu aaa 23
35 <210> 164
<211> 24
<212> ARN

<213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 164
 5 ccauuuguau uuagcauguu ccc 23
 <210> 165
 <211> 20
 <212> ARN
 <213> artificial
 10 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 165
 agauaccuu uguauuuagc 20
 <210> 166
 15 <211> 19
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 20 <400> 166
 gccauuucuc aacagaucu 19
 <210> 167
 <211> 23
 <212> ARN
 25 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 167
 gccauuucuc aacagaucug uca 23
 30 <210> 168
 <211> 23
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 35 <223> oligonucleótido
 <400> 168
 auucucagga auuugugucu uuc 23

<210> 169
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
5 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 169
ucucaggaau uugugucuuu c 21
<210> 170
10 <211> 18
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
15 <400> 170
guucagcuuc uguuagcc 18
<210> 171
<211> 21
<212> ARN
20 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 171
cugauuaaa uaucuuuauau 21
25 <210> 172
<211> 18
<212> ARN
<213> artificial
<220>
30 <223> oligonucleótido
<400> 172
gccgccauuu cucaacag 18
<210> 173
<211> 18
35 <212> ARN
<213> artificial
<220>

<223> oligonucleótido
 <400> 173
 guauuuagca uguucccca 18
 <210> 174
 5 <211> 18
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 10 <400> 174
 caggaauuug ugucuuuc 18
 <210> 175
 <211> 25
 <212> ARN
 15 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 175
 gcuuuuuuuu uaguugcugc uuuuu 25
 20 <210> 176
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 25 <223> oligonucleótido
 <400> 176
 cuuuuuuuuu aguugcugcu cuuuu 25
 <210> 177
 <211> 25
 30 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 177
 35 uuuuuuuuuu guugcugcuc uuuuc 25
 <210> 178
 <211> 25

<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
5 <400> 178
uuucuuuuag uugcugcucu uuucc 25
<210> 179
<211> 25
<212> ARN
10 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 179
uucuuuuagu ugcugcucuu uucca 25
15 <210> 180
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
20 <223> oligonucleótido
<400> 180
ucuuuuaguu gcugcucuuu uccag 25
<210> 181
<211> 25
25 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 181
30 cuuuuaguug cugcucuuu ccagg 25
<210> 182
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
35 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 182

uuuuaguugc ugcucuuuuc caggu 25

<210> 183

<211> 25

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 183

uuuaguugcu gcucuuuucc agguu 25

10 <210> 184

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 184

uuaguugcug cucuuuuc gguuc 25

<210> 185

<211> 25

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 185

25 uaguugcugc ucuuuuccag guuca 25

<210> 186

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 186

aguugcugcu cuuuuccagg uucaa 25

<210> 187

35 <211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>
<223> oligonucleótido
<400> 187
guugcugcuc uuuuccaggu ucaag 25
5 <210> 188
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
10 <223> oligonucleótido
<400> 188
uugcugcucu uuuccagguu caagu 25
<210> 189
<211> 25
15 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 189
20 ugcugcucuu uuccagguuc aagug 25
<210> 190
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
25 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 190
gcugcucuuu uccagguuca agugg 25
<210> 191
30 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
35 <400> 191
cugcucuuuu ccagguuca guggg 25
<210> 192

<211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 5 <223> oligonucleótido
 <400> 192
 ugcucuuuuc cagguucaag uggga 25
 <210> 193
 <211> 25
 10 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 193
 15 gcucuuuucc agguucaagu gggac 25
 <210> 194
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 20 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 194
 cucuuuucca gguucaagug ggaua 25
 <210> 195
 25 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 30 <400> 195
 ucuuuuccag guucaagugg gauac 25
 <210> 196
 <211> 25
 <212> ARN
 35 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido

<400> 196
cuuuuccagg uucaaguggg auacu 25
<210> 197
<211> 25
5 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 197
10 uuuuccaggu ucaaguggga uacua 25
<210> 198
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
15 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 198
uuuccagguu caagugggau acuag 25
<210> 199
20 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
25 <400> 199
uuccagguuc aagugggaua cuagc 25
<210> 200
<211> 25
<212> ARN
30 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 200
uccagguuca agugggauac uagca 25
35 <210> 201
<211> 25
<212> ARN

<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 201
5 ccagguuca gugggauacu agcaa 25
<210> 202
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
10 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 202
cagguucaag ugggauacua gcaau 25
<210> 203
15 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
20 <400> 203
agguucaagu ggauacuag caaug 25
<210> 204
<211> 25
<212> ARN
25 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 204
gguucaagug ggauacuagc aaugu 25
30 <210> 205
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
35 <223> oligonucleótido
<400> 205
guucaagugg gauacuagca auguu 25

<210> 206
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
5 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 206
uucaaguggg auacuagcaa uguua 25
<210> 207
10 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
15 <400> 207
ucaaguggga uacuagcaau guuau 25
<210> 208
<211> 25
<212> ARN
20 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 208
caagugggau acuagcaaug uuauc 25
25 <210> 209
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
30 <223> oligonucleótido
<400> 209
aagugggaa cuagcaaugu uaucu 25
<210> 210
<211> 25
35 <212> ARN
<213> artificial
<220>

<223> oligonucleótido
<400> 210
agugggauac uagcaauguu aucug 25
<210> 211
5 <211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
10 <400> 211
gugggacuacu agcaauguua ucugc 25
<210> 212
<211> 25
<212> ARN
15 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 212
ugggauacua gcaauguuau cugcu 25
20 <210> 213
<211> 25
<212> ARN
<213> artificial
<220>
25 <223> oligonucleótido
<400> 213
gggauacuag caauguuauc ugcuu 25
<210> 214
<211> 25
30 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 214
35 ggauacuagc aauguuaucu gcuuc 25
<210> 215
<211> 25

<212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 5 <400> 215
 gauacuagca auguuaucug cuucc 25
 <210> 216
 <211> 25
 <212> ARN
 10 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 216
 auacuagcaa uguuauaucugc uuccu 25
 15 <210> 217
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 20 <223> oligonucleótido
 <400> 217
 uacuagcaau guuauaucugcu uccuc 25
 <210> 218
 <211> 25
 25 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 218
 30 acuagcaaug uuaucuggcuu ccucc 25
 <210> 219
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 35 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 219

cuagcaaugu uaucugcuuc cucca 25

<210> 220

<211> 25

<212> ARN

5 <213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 220

uagcaauguu aucugcuucc uccaa 25

10 <210> 221

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>

15 <223> oligonucleótido

<400> 221

agcaauguua ucugcuuccu ccaac 25

<210> 222

<211> 25

20 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 222

25 gcaauguuau cugcuuccuc caacc 25

<210> 223

<211> 25

<212> ARN

<213> artificial

30 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 223

caauguuau ucugcuuccu aacca 25

<210> 224

35 <211> 25

<212> ARN

<213> artificial

<220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 224
 aauguuauucu gcuuccucca accau 25
 5 <210> 225
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 10 <223> oligonucleótido
 <400> 225
 auguuauucug cuuccuccaa ccaua 25
 <210> 226
 <211> 25
 15 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 226
 20 uguuauucugc uuccuccaac cauaa 25
 <210> 227
 <211> 25
 <212> ARN
 <213> artificial
 25 <220>
 <223> oligonucleótido
 <400> 227
 guuauucugcu uccuccaacc auaaa 25
 <210> 228
 30 <211> 19
 <212> ARN
 <213> artificial
 <220>
 <223> oligonucleótido
 35 <400> 228
 gcugccuuu uccaguuc 19
 <210> 229

<211> 20
<212> ARN
<213> artificial
<220>
5 <223> oligonucleótido
<400> 229
ucuuuuccag guucaagugg 20
<210> 230
<211> 19
10 <212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
<400> 230
15 agguucaagu gggauacua 19
<210> 231
<211> 21
<212> ARN
<213> artificial
20 <220>
<223> oligonucleótido
<400> 231
caauuuuucc cacucaguau u 21
<210> 232
25 <211> 19
<212> ARN
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido
30 <400> 232
uugaaguucc uggagucuu 19
<210> 233
<211> 22
<212> ARN
35 <213> artificial
<220>
<223> oligonucleótido

<400> 233

uccucaggag gcagcucuaa au 22

<210> 234

<211> 26

5 <212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

<400> 234

10 gcgcugguca caaaauuccug uugaac 26

<210> 235

<211> 27

<212> ARN

<213> artificial

15 <220>

<223> oligonucleótido

<400> 235

cacuugcuug aaaaggucua caaagga 27

<210> 236

20 <211> 26

<212> ARN

<213> artificial

<220>

<223> oligonucleótido

25 <400> 236


ggugaauaac uuacaaauuu ggaagc 26

REIVINDICACIONES

1. Un oligonucleótido antisentido que comprende la secuencia nucleotídica SEC ID N.º: 3.
2. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 1 que consiste en la secuencia nucleotídica antisentido SEC ID N.º: 3.
- 5 3. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que al menos uno de los nucleótidos es un análogo nucleotídico.
4. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que comprende un residuo de ARN, y/o un residuo de ADN.
- 10 5. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la secuencia del oligonucleótido antisentido comprende al menos un análogo nucleotídico, en el que un análogo nucleotídico se define como un residuo que tiene una base modificada, y/o un armazón modificado, y/o un enlace internucleosídico no natural, o una combinación de estas modificaciones.
6. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el análogo nucleotídico tiene una base modificada.
- 15 7. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el análogo nucleotídico tiene un armazón modificado.
8. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que el análogo nucleotídico comprende uno o más restos de azúcar que están mono- o disustituidos en la posición 2', 3' y/o 5'.
- 20 9. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende un oligonucleótido antisentido de fosforotioato 2'-O-alkil sustituido.
10. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende una ribosa 2'-O-metil-fosforotioato.
- 25 11. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, que comprende un oligonucleótido antisentido fosforotioato que comprende la secuencia de nucleótidos 5' uuugccgcug cccaugcca uccug 3' (SEC ID N.º: 3) en la que los restos de azúcar están cada uno 2'-O-metil sustituidos.
12. Un oligonucleótido antisentido que es un oligonucleótido antisentido fosforotioato que tiene la secuencia de nucleótidos 5' uuugccgcug cccaugcca uccug 3' (SEC ID N.º: 3) en la que los restos de azúcar están 2'-O-metil sustituidos.
- 30 13. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en el que el armazón modificado está seleccionado del grupo que consiste en un armazón morfolínico, un armazón de carbamato, un armazón de siloxano, un armazón de sulfuro, un armazón de sulfóxido, un armazón de sulfona, un armazón de formacetilo, un armazón de tioformacetilo, un armazón de metilenformacetilo, un armazón de riboacetilo, un armazón que contiene alquenos, un armazón de sulfamato, un armazón de sulfonato, un armazón de sulfonamida, un armazón de metilenimino, un armazón de metilenhidrazino y un armazón de amida.
- 35 14. Un oligonucleótido antisentido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-10 o 13, que comprende oligómero de morfolino fosforodiamidato (PMO), ácido nucleico peptídico y/o ácido nucleico bloqueado.
15. Un vector basado en virus, que comprende un casete de expresión que dirige la expresión del oligonucleótido antisentido según se define en la reivindicación 1 o 2.
- 40 16. Una composición farmacéutica que comprende un oligonucleótido antisentido según se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-14 y/o el vector de la reivindicación 15, un vehículo aceptable farmacéutico y opcionalmente combinado con un oligonucleótido antisentido que es capaz de inducir o promover el salto del exón 7, 44, 46, 51, 53, 59, 67 (como se representa en la tabla 2) del pre-ARNm de distrofina de un paciente.
- 45 17. El oligonucleótido antisentido según se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, el vector de la reivindicación 15, o la composición farmacéutica de la reivindicación 16, para inducir o promover el salto del exón 45, opcionalmente en combinación con el salto de uno de los exones 7, 44, 46, 51, 53, 59, 67, en el pre-ARNm de distrofina para usar en tratar a un paciente de DMD o a un paciente de BMD.
- 50 18. Un procedimiento in vitro para inducir o promover el salto del exón 45 de pre-ARNm de distrofina en un paciente, preferentemente en una célula aislada de dicho paciente, comprendiendo el procedimiento proveer a dicha célula con un oligonucleótido antisentido según se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, con el vector de la reivindicación 15, o con la composición farmacéutica de la reivindicación 16.


19. Un procedimiento in vitro de acuerdo con la reivindicación 18, en el que el paciente es provisto con una proteína distrofina funcional y/o en el que la producción de una proteína distrofina aberrante en dicho paciente está disminuida, en el que el nivel de dicha distrofina funcional es valorado por comparación con el nivel de dicha distrofina en dicho paciente en el comienzo del procedimiento.

Fig 1




Rastreo de AON PS220-225 específicos del Exón 5 en Miotubos Control Humanos

Fig. 2



Rastreo de PS220 específico de Exón 45 a Concentraciones Crecientes en Miotubos Control Humanos

Fig. 3



Comparación del 17-mero AON45-5 frente al 25-mero PS220 en Miotubos Control Humanos