19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 556 221**

51 Int. Cl.:

C12N 9/16 (2006.01)

C12P 7/02 (2006.01)

C12P 7/18 (2006.01)

C12N 15/52 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **26.01.2009 E 09706183 (2)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **14.10.2015 EP 2238256**

54 Título: **Procedimiento de producción de esclareol**

30 Prioridad:

29.01.2008 EP 08101075

17.03.2008 EP 08102661

20.03.2008 EP 08102811

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

14.01.2016

73 Titular/es:

**FIRMENICH S.A. (100.0%)
1, ROUTE DES JEUNES P.O. BOX 239
1211 GENEVA 8, CH**

72 Inventor/es:

SCHALK, MICHEL

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

ES 2 556 221 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de producción de esclareol

Campo técnico

5 La presente invención proporciona un procedimiento para producir esclareol, comprendiendo dicho procedimiento poner en contacto un polipéptido particular que tiene actividad de esclareol sintasa con difosfato de labdenodiol (LPP). En particular, dicho procedimiento se puede realizar *in vitro* o *in vivo* para producir esclareol, un compuesto muy útil en los campos de la perfumería y la condimentación. La presente invención también proporciona la secuencia de aminoácidos del polipéptido usado en el procedimiento. También son parte de la presente invención un ácido nucleico derivado de *Salvia sclarea* y que codifica el polipéptido de la invención, un vector de expresión que
10 contiene dicho ácido nucleico, así como un organismo no humano o una célula transformados para albergar el mismo ácido nucleico.

Técnica anterior

15 El esclareol es un miembro de la familia de los terpenoides o terpenos, que comprende un gran número de productos naturales. Los terpenos se encuentran en la mayoría de los organismos (microorganismos, animales y plantas). Estos compuestos están compuestos de cinco unidades de carbono denominadas unidades de isopreno y se clasifican por el número de estas unidades presentes en su estructura. De ese modo, los monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos son terpenos que contienen 10, 15 y 20 átomos de carbono, respectivamente. Los diterpenos, por ejemplo, se encuentran ampliamente en el reino vegetal y se han descrito más de 2500 estructuras de diterpeno (Connolly y Hill, Dictionary of terpenoids, 1991, Chapman & Hall, Londres). Las moléculas de terpeno
20 han sido de interés durante miles de años debido a sus propiedades de sabor y fragancia y sus efectos cosméticos, medicinales y antimicrobianos. Los extractos de plantas obtenidos mediante diferentes medios tales como destilación con vapor o extracción con disolventes se usan como fuente de terpenos. Las moléculas de terpeno se usan a menudo como tales, pero en algunos casos se usan reacciones químicas para transformar los terpenos en otras moléculas de alto valor.

25 La producción biosintética de terpenos implica enzimas denominadas terpeno sintasa. Estas enzimas convierten un precursor en uno o más productos de terpeno. En la mayoría de los casos, el precursor es un precursor de terpeno acíclico y, en particular, la mayoría de las diterpeno sintasas catalizan la ciclación del precursor acíclico pirofosfato de geranylgeranilo. No obstante, en algunos casos especiales, las terpeno sintasas catalizan la transformación de una molécula cíclica en uno o más productos de terpeno.

30 En la naturaleza se producen dos tipos de mecanismos de ciclación y están relacionados con dos tipos de diterpeno sintasas que se puede clasificar en la clase I y la clase II de diterpeno sintasas (Wendt y Schulz, 1998, Structure. 6(2):127-33). Para algunos diterpenos, el mecanismo de ciclación es similar al de los monoterpenos y sesquiterpenos ya que se inicia mediante la ionización de la función éster de difosfato de GGPP, seguido de la reacción del carbocatión el resultante con un doble enlace interno. Las diterpeno sintasas que catalizan este tipo de ciclación son diterpeno sintasas de clase I. El segundo modo de ciclación en la biosíntesis de los terpenos, catalizado por las diterpeno sintasas de clase II, se inicia mediante la protonación del doble enlace terminal de GGPP y conduce, después de transposición interna y eliminación de protón, a un compuesto intermedio de difosfato de diterpeno cíclico.
35

40 Se han clonado los genes y los ADNc que codifican las diterpeno sintasas de cada una de las dos clases y se han caracterizado las enzimas recombinantes. La disponibilidad de los genes que codifican los diferentes tipos de diterpeno sintasas proporciona información de las estructuras primarias de las enzimas. Algunos motivos de aminoácidos se conservan en las diterpeno sintasas y se relacionan con la ciclación dependiente de protonación o ionización. Se encuentra un motivo DDxxD en varias diterpeno sintasas de clase I. Dicho motivo está implicado probablemente en la unión y la ionización del resto de difosfato. En las sintasas de clase II, se encuentra un motivo DxDD conservado, en el que el segundo resto de aspartato está implicado como donador de protones.
45

El esclareol es una molécula de diterpeno de origen natural usada ampliamente como material de partida para la síntesis de moléculas de fragancia con notas de ámbar gris. Estas síntesis se desarrollaron para proporcionar una alternativa al ámbar gris, una sustancia cerosa secretada por el intestino del cachalote. El ámbar gris es muy apreciado por su olor agradable y se ha usado históricamente como ingrediente de perfume. Debido a su alto precio y a la demanda creciente del ámbar gris, y particularmente debido a la protección de las especies de ballenas, se han desarrollado síntesis químicas de constituyentes y moléculas de ámbar gris con carácter de ámbar gris. Entre estas moléculas, el sustituto más altamente apreciado para el ámbar gris es Ambrox® (marca registrada de Firmenich SA, Suiza). El material de partida usado con mayor frecuencia para la síntesis de Ambrox® es el diterpeno-diol esclareol.
50

55 Generalmente, el precio y la disponibilidad de los extractos naturales de plantas dependen de la abundancia, el rendimiento de aceite y el origen geográfico de las plantas. Además, la disponibilidad y la cantidad de extractos naturales depende en gran medida del clima y otras condiciones locales que conducen a una variabilidad anual, que algunos años hace muy difícil o incluso imposible el uso de tales ingredientes en la perfumería de alta calidad. Por lo

tanto, sería una ventaja proporcionar una fuente de esclareol, que se encuentre menos sometida a fluctuaciones de disponibilidad y calidad. La síntesis química parecería ser una opción evidente a la preparación del esclareol. Sin embargo, dada su estructura altamente compleja, un procedimiento sintético económico para la preparación de esclareol aún es difícil. Por lo tanto, una ruta bioquímica que conduzca a la síntesis del esclareol sería de gran interés.

La biosíntesis de terpenos en plantas y otros organismos se ha estudiado ampliamente y no se detalla adicionalmente en el presente documento, pero se hace referencia a Dewick, Nat. Prod. Rep., 2002, 19, 181-222, que revisa el estado de la técnica de las rutas biosintéticas de terpenos.

En la actualidad se han identificado varias diterpeno sintasas. En particular, el documento de Patente US 7.238.514 desde la cierto número de diterpeno sintasas, los ácidos nucleicos que las codifican, así como organismos unicelulares transformados para expresar cada una de estas sintasas junto con una GGPP sintasa, produciendo de ese modo diterpenos *in vivo*. No obstante, no se desvela específicamente en esa patente ningún procedimiento para la producción biosintética de esclareol que use un polipéptido que tenga una actividad de esclareol sintasa como se proporciona en el presente documento. Las secuencias de aminoácidos y nucleótidos desveladas en él son muy diferentes de las secuencias de la presente invención. Entre las diterpeno sintasas descritas en ese documento, lo más cercano a los polipéptidos de la presente invención son un ARNm de *Cucumis sativus* para una ent-kaureno sintasa designada mediante la SEC ID N°: 389 en el documento de Patente US 7.238.514 y un ARNm de *Cucurbita maxima* para una ent-kaureno sintasa B designada por la SEC ID N°: 395 en el documento de Patente US 7.238.514 y por el número de registro AAB39482.1. Estos polipéptidos y el de la invención solo comparten un 32 % de identidad. Además, no se hace ninguna sugerencia en este documento de la técnica anterior de que las diterpeno sintasas descritas sean útiles para la producción de esclareol.

También se han descubierto en las bases de datos de secuencias terpeno sintasas que tienen cierto porcentaje de identidad de secuencia con las secuencias de la presente invención. No obstante, el porcentaje de identidad entre las diterpeno sintasas conocidas y los polipéptidos de la invención es muy bajo. Las sintasas más próximas a las de la invención son una terpenoide ciclasa de función indefinida (número de registro NCBI AAS98912) que tiene un 36 % de identidad con el polipéptido de la invención, una ent-kaureno sintasa de *Cucumis sativus* (número de registro BAB 19275) que tiene un 32 % de identidad con el polipéptido de la invención, una ent-cassadieno sintasa de *Oryza sativa* (número de registro ABH10734 y publicada en Xu, Wilderman, Morrone, Xu, Roy, Margis-Pinheiro, Upadhyaya, Coates y Peters, Functional characterization of the rice kaureno synthase-like gene family, Phytochemistry, 68(3), 2007, 312-326) que tiene un 32 % de identidad con el polipéptido de la invención y una ent-kaureno sintasa de *Oryza sativa* (número de registro AAQ72559 y publicada en Margis-Pinheiro, Zhou, Zhu, Dennis y Upadhyaya, Isolation and characterization of a DS-tagged rice (*Oryza sativa* L.) GA-responsive dwarf mutant defective in an early step of the gibberellins biosynthesis pathway, Plant Cell Rep., 23(12), 2005, 819-833) que tiene un 32 % de identidad con el polipéptido de la invención. La capacidad potencial de cualquiera de estas secuencias para catalizar la producción de esclareol nunca se menciona en la técnica anterior.

Además de la diferencia entre las propias secuencias, también se ha de indicar que la estructura y las propiedades de ent-kaureno y ent-cassadieno son muy diferentes de las del esclareol. En particular, ent-kaureno es un diterpeno tricíclico que no contiene ningún grupo funcional alcohol, a diferencia del esclareol, que es un diol bicíclico. Además, ent-kaureno, que es un precursor de una hormona de planta reguladora del crecimiento, no tiene ningún uso en el campo de la perfumería ni de la condimentación, mientras que el esclareol tiene un gran interés en estos campos técnicos, como se ha explicado anteriormente.

Un documento de la técnica anterior se refiere específicamente a una esclareol sintasa (Banthorpe, Brown y Morris, Partial purification of farnesyl pyrophosphate: Drimenol cyclase and geranylgeranyl pyrophosphate: Sclareol cyclase, using cell culture as a source of material, Phytochemistry 31, 1992, 3391-3395). En esta referencia, se identifica una proteína parcialmente purificada de *Nicotiana glutinosa* como una esclareol sintasa, pero no se da ninguna indicación con respecto a la secuencia de aminoácidos de esa proteína, la secuencia de nucleótidos del ácido nucleico que la codifica o el uso de esa proteína en un procedimiento para la biosíntesis de esclareol *in vitro* o *in vivo*.

A pesar de los estudios exhaustivos de la ciclación de terpenos, el aislamiento y la caracterización de las enzimas es aún difícil, particularmente en plantas, debido a su baja abundancia, sus patrones de expresión a menudo transitorios, y la complejidad de la purificación de los mismos a partir de las mezclas de resinas y compuestos fenólicos en los tejidos donde se expresan.

Es un objetivo de la presente invención proporcionar procedimientos para fabricar esclareol de forma económica, como se ha indicado anteriormente. Por lo tanto, la presente invención tiene el objetivo de producir diterpenos mientras se producen pocos desperdicios, se usa un procedimiento más eficaz de energía y recursos y mientras se reduce la dependencia de combustibles fósiles. Es un objetivo adicional proporcionar enzimas capaces de sintetizar esclareol, que sean útiles como ingredientes de perfumería y/o aromas.

Abreviaturas usadas

	pb	pares de bases
	kb	kilo bases
	BSA	albúmina en suero bovino
5	ADN	ácido desoxirribonucleico
	ADNc	ADN complementario
	dT	desoxi timina
	dNTP	desoxi nucleótido trifosfato
10	DTT	ditiotreitól
	GC	cromatografía de gases
	GGPP	pirofosfato de geranilgeranilo
	IPTG	isopropil-D-tiogalacto-piranosido
	LB	caldo de lisogenia
	LPP	difosfato del labdenodiol
15	MOPSO	ácido 3-(N-morfolino)-2-hidroxiopropanosulfónico
	MS	espectrómetro de masas
	ORF	marco abierto de lectura
	PCR	reacción en cadena de la polimerasa
	RMCE	intercambio de casete mediado por recombinasa
20	RT-PCR	reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa
	3'-/5'-RACE	amplificación rápida 3' y 5' de los extremos de ADNc
	ARN	ácido ribonucleico
	ARNm	ácido ribonucleico mensajero
	nt	nucleótido
25	RNasa	ribonucleasa
	RuBisCO	ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa
	SDS-PAGE	electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida
	SsLPPs	difosfato de labdenodiol sintasa de <i>Salvia sclarea</i>
	UTR	región no traducida

30 Descripción de la invención

La presente invención proporciona un procedimiento para producir biosintéticamente esclareol de forma económica, fiable y reproducible.

Por lo tanto, un objeto de la presente invención es un procedimiento para producir esclareol que comprende

- 35 a) poner en contacto difosfato de labdenodiol (LPP) con al menos un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 70 % idéntica con SEC ID N°: 1; y
b) opcionalmente, aislar el esclareol producido en la etapa a).

El procedimiento se puede realizar *in vitro* así como *in vivo*, como se explicará con mayor detalle posteriormente.

El esclareol y el LPP se definen mediante sus fórmulas que se representan en la Figura 1.

- 40 La invención también proporciona un polipéptido aislado que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 70 % idéntica a la secuencia de aminoácidos completa de SEC ID N°: 1.

La invención también proporciona un ácido nucleico aislado que codifica un polipéptido de la invención.

- 45 Como una "esclareol sintasa" o como un "polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa", los inventores pretenden indicar un polipéptido capaz de catalizar la síntesis de esclareol partiendo de (LPP). La capacidad de un polipéptido para catalizar la síntesis de esclareol se puede confirmar mediante el rendimiento del ensayo enzimático que se detalla en los Ejemplos.

- 50 De acuerdo con la presente invención, los polipéptidos también pretenden incluir polipéptidos truncados con la condición de que mantengan su actividad de esclareol sintasa como se define en el presente documento y que comparten al menos el porcentaje definido de identidad con la secuencia de aminoácidos completa de SEC ID N°: 1.

- 55 De acuerdo con una realización preferente, el procedimiento para producir esclareol comprende poner en contacto LPP con un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 1. De acuerdo con una realización más preferente, dicho polipéptido comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID N°: 1. En una realización incluso más preferente, dicho polipéptido consiste en SEC ID N°:

1.

También se desvela en el presente documento una esclareol sintasa que es un polipéptido truncado que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 50 % idéntica a SEC ID N°: 102. Preferentemente, el polipéptido comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 55 %, preferentemente al menos un 60 %, preferentemente al menos un 65 %, preferentemente al menos un 70 %, preferentemente al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 96. También se desvela en el presente documento un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID N°: 96. También se desvela en el presente documento un polipéptido que consiste en SEC ID N°: 96.

El porcentaje de identidad entre dos secuencias peptídicas o nucleotídicas es función del número de restos de aminoácido o ácido nucleico que son idénticos en las dos secuencias cuando se ha generado una alineación de estas dos secuencias. Los residuos idénticos se definen como los residuos que son iguales en las dos secuencias en una posición dada de la alineación. El porcentaje de identidad de secuencia, como se usa en el presente documento, se calcula a partir de la alineación óptima tomando el número de residuos idénticos entre las dos secuencias dividido por el número total de residuos en la secuencia más corta y multiplicando por 100. La alineación óptima es la alineación en la que el porcentaje de identidad es el más alto posible. Se pueden introducir separaciones en una o ambas secuencias en una o más posiciones de la alineación para obtener la alineación óptima. En ese caso, estas separaciones se tienen en cuenta como restos no idénticos para el cálculo del porcentaje de la secuencia de identidad.

La alineación con fines de determinar el porcentaje de identidad de secuencia de aminoácidos o ácidos nucleicos se puede conseguir mediante diversas formas usando programas de ordenador y, por ejemplo, programas de ordenador disponibles públicamente disponibles en la *World Wide Web*. Preferentemente, se puede usar el programa BLAST (Tatiana y col., FEMS Microbiol Lett., 1999, 174:247-250, 1999) ajustado en sus parámetros por defecto, disponible en el Centro Nacional para Información Biotecnológica (NCBI) en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/b12seq/wblast2.cgi>, para obtener una alineación óptima de secuencias peptídicas o nucleotídicas y para calcular el porcentaje de identidad de secuencia.

El polipéptido que se va a poner en contacto con LPP *in vitro* se puede obtener por extracción de cualquier organismo que lo exprese, usando tecnologías convencionales de extracción de proteínas o enzimas. Si el organismo hospedador es un organismo unicelular o una célula que libera el polipéptido de la invención en el medio de cultivo, el polipéptido se puede recoger simplemente del medio de cultivo, por ejemplo por centrifugación, seguido opcionalmente por etapas de lavado y resuspensión en soluciones tampón adecuadas. Si el organismo o célula acumula el polipéptido dentro de sus células, el polipéptido se puede obtener por ruptura o lisis de las células y extracción adicional del polipéptido del lisato celular.

Los polipéptidos, en forma aislada o junto con otras proteínas, por ejemplo, en un extracto de proteína sin procesar obtenido de células o microorganismos cultivados, se pueden suspender a continuación en una solución tampón a un pH óptimo. Si fuera adecuado, se pueden añadir sales, DTT, BSA y otras clases de cofactores enzimáticos, con el fin de optimizar la actividad enzimática. Más adelante se describen condiciones apropiadas con mayor detalle en los Ejemplos.

A continuación se puede añadir LPP a la suspensión o solución, que a continuación se incuba a una temperatura óptima, por ejemplo entre 15 y 40 °C, preferentemente entre 25 y 35 °C, más preferentemente a 30 °C. Después de la incubación, el esclareol producido se puede aislar de la solución incubada mediante procedimientos de aislamiento convencionales, tales como extracción con disolventes y destilación, opcionalmente después de la retirada de polipéptidos de la solución.

Se puede obtener el LPP poniendo en contacto GGPP con una LPP sintasa aislada. Los Ejemplos 1 a 3 posteriores muestran un procedimiento para aislar un ADNc que codifica LPP sintasa de *Salvia sclarea*, un procedimiento para la expresión heteróloga de dicho ADNc en *E. coli*, un procedimiento para la purificación de la LPP sintasa producida de ese modo y un procedimiento para la producción *in vitro* de LPP que usa la LPP sintasa aislada.

De acuerdo con otra realización preferente, el procedimiento para producir esclareol se realiza *in vivo*. En este caso, la etapa a) del procedimiento descrito anteriormente comprende cultivar un organismo o célula no humano capaz de producir LPP y transformado para expresar un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 70 % idéntica a SEC ID N°: 1 en condiciones que conduzcan a la producción de esclareol.

De acuerdo con una realización más preferente, el procedimiento comprende además, antes de la etapa a), transformar un organismo o célula no humano capaz de producir LPP con al menos un ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 70 % idéntica a SEC ID N°: 1, de modo que dicho organismo exprese dicho polipéptido.

De acuerdo con una realización preferente, el ácido nucleico usado para transformar el organismo o célula hospedador comprende una secuencia de nucleótidos al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, de modo que dicho organismo exprese dicho polipéptido.

preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma. De acuerdo con otra realización preferente, el ácido nucleico comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma. De acuerdo con una realización más preferente, el ácido nucleico consiste en SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma.

En el presente documento también se desvela un ácido nucleico truncado que comprende una secuencia de nucleótidos al menos un 50 %, preferentemente al menos un 55 %, preferentemente al menos un 60 %, preferentemente al menos un 70 %, preferentemente al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma. En el presente documento también se desvela un ácido nucleico que comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma. En el presente documento también se desvela un ácido nucleico que consiste en SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma.

Estas realizaciones de la invención son particularmente ventajosas dado que es posible realizar el procedimiento *in vivo* sin aislar previamente el polipéptido. La reacción se produce directamente dentro del organismo o célula transformado para expresar dicho polipéptido.

Se pretende que el organismo o célula "expresen" un polipéptido, con la condición de que el organismo o célula se transforme para albergar el ácido nucleico que codifica dicho polipéptido, el ácido nucleico se transcriba a ARNm y el polipéptido se encuentre en el organismo o célula hospedador. El término "expresar" incluye "expresar heterológamente" y "sobreexpresar", refiriéndose el último a los niveles de ARNm, polipéptido y/o actividad enzimática sobre y por encima de lo que se mide en un organismo o célula no transformado. Una descripción más detallada de los procedimientos adecuados para transformar un organismo o célula no humano se describirá posteriormente en la parte de la memoria descriptiva que se dedica a tales organismos o células no humanos transformados como objetos específicos de la presente invención y en los Ejemplos.

Se pretende que el organismo o célula particular sea "capaz de producir LPP" cuando produce LPP de forma natural o cuando no produce LPP de forma natural pero produce GGPP (o se transforma de ese modo) y se transforme para expresar una LPP sintasa, antes de la transformación con un ácido nucleico que codifica una esclareol sintasa o junto con dicho ácido nucleico. Los organismos o células transformados para producir una mayor cantidad de LPP que la del organismo o célula de origen natural también se incluyen en los "organismos o células capaces de producir LPP". De acuerdo con una realización preferente, el organismo acumula LPP de forma natural o se transforma para acumular LPP.

Los procedimientos para transformar organismos de modo que expresen una LPP sintasa, pueden ser cualquier procedimiento conocido en la técnica para transformar un organismo hospedador. Tales procedimientos se exponen con mayor detalle posteriormente y se da un ejemplo específico de la expresión de una LPP sintasa en *E. coli* en el Ejemplo 2. También se conocen en la técnica procedimientos para transformar un organismo para producir GGPP. Tales procedimientos se pueden encontrar, por ejemplo, en Huang, Roessner, Croteau y Scott, Engineering *Escherichia coli* for the synthesis of taxadiene, a key intermediate in the biosynthesis of taxol, *Bioorg Med Chem.*, 9(9), 2001, 2237-2242.

Para realizar la invención *in vivo*, el organismo hospedador se cultiva en condiciones que conduzcan a la producción de esclareol. Por lo tanto, si el hospedador es una planta transgénica, se proporcionan condiciones de crecimiento óptimo, tales como condiciones de luz, agua y nutrientes óptimas, por ejemplo. Si el hospedador es un organismo unicelular, las condiciones que conduzcan a la producción de esclareol pueden comprender la adición de factores adecuados al medio de cultivo del hospedador. Además, se puede seleccionar el medio de cultivo de modo que maximice la síntesis de esclareol. Se describen condiciones de cultivo óptimas de una forma más detallada en los siguientes Ejemplos.

Algunos organismos no humanos adecuados para realizar el procedimiento de la invención *in vivo* pueden ser cualquier organismo multicelular o unicelular no humano. En una realización preferente, el organismo no humano usado para realizar la invención *in vivo* es una planta, un procarionte o un hongo.

Se puede usar cualquier planta, procarionte u hongo para realizar el procedimiento de la invención *in vivo*. Algunas plantas particularmente útiles son las que producen de forma natural grandes cantidades de terpenos. En una realización más preferente, la planta se selecciona entre la familia de *Solanaceae*, *Poaceae*, *Brassicaceae*, *Fabaceae*, *Malvaceae*, *Asteraceae* o *Lamiaceae*. Por ejemplo, la planta se selecciona entre los géneros *Nicotiana*, *Solanum*, *Sorghum*, *Arabidopsis*, *Brassica* (colza), *Medicago* (alfalfa), *Gossypium* (algodón), *Artemisia*, *Salvia* y *Mentha*. Preferentemente, la planta pertenece a la especie de *Nicotiana tabacum*.

En una realización más preferente, el organismo no humano es un microorganismo. De acuerdo con una realización incluso más preferente, dicho microorganismo es una bacteria o un hongo, y preferentemente dicho hongo es levadura. Más preferentemente, dicha bacteria es *E. coli* y dicha levadura es *Saccharomyces cerevisiae*.

La mayoría de estos organismos no producen LPP de forma natural. Para que sean adecuados para realizar el procedimiento de la invención, estos organismos se tienen que transformar para producir dicho precursor. Se pueden transformar de ese modo antes de la modificación con el ácido nucleico que codifica el polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa o simultáneamente, como se ha explicado anteriormente.

- 5 También se pueden usar células eucariotas superiores aisladas, en lugar de organismos completos, como hospedadores para realizar el procedimiento de la invención *in vivo*. Algunas células eucariotas adecuadas pueden ser cualquier célula no humana, pero son preferentemente células de plantas.

De acuerdo con otra realización preferente, el polipéptido o el ácido nucleico usado en el procedimiento de cualquiera de las realizaciones anteriores deriva de *Salvia sclarea*.

- 10 Una herramienta importante para realizar el procedimiento de la invención es el propio polipéptido. Por lo tanto, es otro objeto de la presente invención un polipéptido aislado que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 70 % idéntica a la secuencia de aminoácidos completa de SEC ID N°: 1.

- 15 De acuerdo con una realización preferente, la esclareol sintasa comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 1. De acuerdo con otra realización preferente, el polipéptido comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID N°: 1. De acuerdo con una realización más preferente, el polipéptido consiste en SEC ID N°: 1.

De acuerdo con otra realización preferente de la invención, el polipéptido deriva de *Salvia sclarea*.

- 20 Como se usa en el presente documento, las expresiones "esclareol sintasa" o "polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa" se refieren a un género de polipéptidos o fragmentos peptídicos que incluyen las secuencias de aminoácidos identificadas en el presente documento, así como polipéptidos truncados o variantes, con la condición de que mantengan su actividad de esclareol sintasa como se ha definido anteriormente y que compartan al menos el porcentaje definido de identidad con el correspondiente fragmento de SEC ID N°: 1.

- 25 En el presente documento también se desvela una esclareol sintasa que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 50 % idéntica a SEC ID N°: 96. Preferentemente, la esclareol sintasa comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 55 %, preferentemente al menos un 60 %, preferentemente al menos un 65 %, preferentemente al menos un 70 %, preferentemente al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 96. En el presente documento también se desvela un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID N°: 96. En el presente documento también se desvela un polipéptido que consiste en SEC ID N°: 96.

Algunos ejemplos de polipéptidos variantes son proteínas de origen natural que resultan de sucesos alternados de corte y empalme de ARNm o de la escisión proteolítica de los polipéptidos descritos en el presente documento.

- 35 Algunas variaciones atribuibles a la proteólisis incluyen, por ejemplo, diferencias en los extremos N- o C-terminal después de la expresión en diferentes tipos de células hospedadoras, debido a la retirada proteolítica de uno o más aminoácidos terminales de los polipéptidos de la invención. Los polipéptidos codificados por un ácido nucleico obtenido por mutación de un ácido nucleico de la invención, como se describe posteriormente, también se incluyen en la invención.

- 40 El ácido nucleico que codifica el polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa, como se ha definido anteriormente, es una herramienta necesaria para modificar organismos o células no humanos destinados a usarse cuando el procedimiento se realiza *in vivo*. Por lo tanto, es otro objeto de la invención un ácido nucleico que codifica un polipéptido como se define en cualquiera de las realizaciones anteriores.

- 45 De acuerdo con una realización preferente, el ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, más preferentemente al menos un 85 %, más preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma. De acuerdo con una realización más preferente, el ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos idéntica a SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma. De acuerdo con una realización incluso más preferente, el ácido nucleico consiste en SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma.

- 50 De acuerdo con otra realización preferente de la invención, el ácido nucleico deriva de *Salvia sclarea*.

- 55 Se puede definir que el ácido nucleico de la invención incluye polímeros de desoxirribonucleótido o ribonucleótido en forma mono o bicatenaria (ADN y/o ARN). Se debería entender que la expresión "secuencia de nucleótidos" comprende una molécula de polinucleótido o una molécula de oligonucleótido en forma de un fragmento separado o como un componente de un ácido nucleico mayor. Los ácidos nucleicos de la invención también incluyen ciertas secuencias de nucleótidos aisladas que incluyen las que están básicamente exentas de material endógeno contaminante. El ácido nucleico de la invención puede estar truncado, con la condición de que codifique un

polipéptido incluido por la presente invención, como se ha descrito anteriormente. Algunos ácidos nucleicos truncados particularmente útiles son los ácidos nucleicos al menos un 70 % idénticos a SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma.

5 Los ácidos nucleicos obtenidos por mutaciones de SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma también están incluidos en la invención, con la condición de que compartan al menos el porcentaje de identidad definido con el correspondiente fragmento de SEC ID N°: 2 y que codifiquen polipéptidos que tengan una actividad de esclareol sintasa, como se ha definido anteriormente. Las mutaciones pueden ser cualquier clase de mutación de estos ácidos nucleicos, tales como mutaciones puntuales, mutaciones por supresión, mutaciones por inserción y/o mutaciones de desplazamiento de marco. Se pueden preparar ácidos nucleicos variantes con el fin de adaptar su secuencia de nucleótidos a un sistema de expresión específico. Por ejemplo, se conoce que los sistemas de expresión bacterianos expresan de forma más eficaz los polipéptidos si los aminoácidos se codifican por un codón preferente. Debido a la degeneración del código genético, en el que más de un codón puede codificar el mismo aminoácido, múltiples secuencias de ADN pueden codificar el mismo polipéptido, estando incluidas en la invención todas estas secuencias de ADN.

15 En el presente documento también se desvela un ácido nucleico que es un ácido nucleico truncado que comprende una secuencia de nucleótidos al menos un 50 %, preferentemente al menos un 55 %, preferentemente al menos un 60 %, preferentemente al menos un 70 %, preferentemente al menos un 75 %, preferentemente al menos un 80 %, preferentemente al menos un 85 %, preferentemente al menos un 90 %, más preferentemente al menos un 95 % e incluso más preferentemente al menos un 98 % idéntica a SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma. En el presente documento también se desvela un ácido nucleico que comprende la secuencia de nucleótidos SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma. En el presente documento también se desvela un ácido nucleico que consiste en SEC ID N°: 93 o el complemento de la misma.

25 Hablando en términos generales, el ácido nucleico de la invención se puede aislar usando un enfoque de secuenciación masivo en paralelo, que se desarrolla ampliamente en los Ejemplos 5 y 6. La primera etapa de este procedimiento es la secuenciación global de la librería de ADNc. En primer lugar, la librería de ADNc se fragmenta por nebulización. A continuación, los fragmentos se amplifican mediante PCR y se realiza la reacción de secuenciación. Se obtienen secuencias cortas de 35 bases denominadas "lecturas". Las "lecturas" se reensamblan en secuencias contiguas ("*contigs*") usando un software con ajustes mínimos definidos de longitud y porcentaje de solapamiento. A continuación, se realiza una búsqueda en las "lecturas" y "*contigs*" para identidad de secuencia con enzimas conocidas del mismo tipo. En base a estas homologías, las "lecturas" y "*contigs*" se seleccionan y se usan para sintetizar cebadores con el fin de realizar la amplificación por PCR de la esclareol sintasa de longitud completa.

35 Otra herramienta importante para transformar organismos o células hospedadores adecuados para realizar el procedimiento de la invención *in vivo* es un vector de expresión que comprende al menos un ácido nucleico de acuerdo con cualquier realización de la invención. Por lo tanto, tal vector es también un objeto de la presente invención.

40 Un "vector de expresión", como se usa en el presente documento, incluye cualquier vector recombinante lineal o circular que incluye, pero no se limita a, vectores virales, bacteriófagos y plásmidos. El experto en la materia es capaz de seleccionar un vector adecuado de acuerdo con el sistema de expresión. En una realización, los vectores de expresión incluyen los ácidos nucleicos de la invención unidos operativamente al menos a una secuencia reguladora, que controla la transcripción, traducción, iniciación y terminación, tal como un promotor, operador o potenciador transcripcional, o un sitio de unión ribosomal de ARNm y, opcionalmente, que incluye al menos un marcador de selección. Las secuencias de nucleótidos se "unen operativamente" cuando la secuencia reguladora se relaciona funcionalmente con el ácido nucleico de la invención.

45 Los vectores de expresión de la presente invención se pueden usar en los procedimientos para preparar un organismo y/o célula hospedador genéticamente transformado, en organismos y/o células hospedadores que albergan los ácidos nucleicos de la invención y en los procedimientos para producir o fabricar polipéptidos que tienen una actividad de esclareol sintasa, como se desvela adicionalmente más adelante.

50 Los organismos y células no humanos recombinantes transformados para albergar al menos un ácido nucleico de la invención, de modo que expresen heterológicamente o sobreexpresen al menos un polipéptido de la invención, también son herramientas muy útiles para realizar el procedimiento de la invención. Por lo tanto, tales organismos y células no humanos son otro objeto de la presente invención.

55 Algunos organismos no humanos de la invención pueden ser cualquier organismo multicelular o unicelular no humano. En una realización preferente, el organismo no humano de la invención es una planta, un procariota o un hongo. Dicho organismo puede ser cualquier planta, procariota u hongo. Algunas plantas particularmente útiles son las que producen de forma natural grandes cantidades de terpenos. En una realización más preferente, la planta se selecciona entre la familia de *Solanaceae*, *Poaceae*, *Brassicaceae*, *Fabaceae*, *Malvaceae*, *Asteraceae* o *Lamiaceae*. Por ejemplo, la planta se selecciona entre los géneros *Nicotiana*, *Solanum*, *Sorghum*, *Arabidopsis*, *Brassica* (colza), *Medicago* (alfalfa), *Gossypium* (algodón), *Artemisia*, *Salvia* y *Mentha*. Preferentemente, la planta pertenece a la especie de *Nicotiana tabacum*.

En una realización más preferente, el organismo no humano es un microorganismo. De acuerdo con una realización incluso más preferente, dicho microorganismo es una bacteria o levadura y lo más preferentemente, dicha bacteria es *E. coli* y dicha levadura es *Saccharomyces cerevisiae*.

5 También se pueden transformar células eucariotas superiores aisladas, en lugar de organismos completos. Aquí, por células eucariotas superiores, se pretende indicar cualquier célula eucariota no humana excepto células de levadura. Algunas células eucariotas superiores preferentes son células de plantas o células fúngicas.

10 El término "transformado" se refiere al hecho de que el hospedador se somete a ingeniería genética para comprender una, dos o más copias de cualquiera de los ácidos nucleicos de la invención. Preferentemente, el término "transformado" se refiere a hospedadores que expresan heterológamente los polipéptidos de la invención, así como sobreexpresan los mismos. Por lo tanto, en una realización, la presente invención proporciona un organismo transformado, en el que el polipéptido de la invención se expresa en una cantidad mayor que en el mismo organismo no transformado de ese modo.

15 Existen varios procedimientos conocidos en la técnica para la creación de organismos o células hospedadores transgénicos tales como plantas, hongos, procariontes, o cultivos celulares de organismos eucariotas superiores. Se describen vectores de clonación y expresión apropiados para su uso con hospedadores bacterianos, fúngicos, de levaduras, de plantas y de mamíferos, por ejemplo, en Pouwels y col., Cloning Vectors: A Laboratory Manual, 1985, Elsevier, Nueva York, y en Sambrook y col., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2ª edición, 1989, Cold Spring Harbor Laboratory Press. Los vectores de clonación y expresión para plantas superiores y/o, en particular, células de plantas están disponibles para los expertos en la materia. Véase, por ejemplo, Schardl y col., Gene 61: 1-11, 1987.

20 Los procedimientos para transformar organismos o células hospedadores para albergar ácidos nucleicos transgénicos, tales como los de la presente invención, son familiares para los expertos en la materia. Para la creación de plantas transgénicas, por ejemplo, los procedimientos actuales incluyen: electroporación de protoplastos de plantas, transformación mediada por liposomas, transformación mediada por *Agrobacterium*, transformación mediada por polietilenglicol, bombardeo de partículas, microinyección de células de plantas, y transformación usando virus.

25 En una realización, el ADN transformado se integra en un cromosoma de un organismo y/o célula hospedador no humano de modo que dé como resultado un sistema recombinante estable. Se puede usar cualquier procedimiento de integración cromosómica conocido en la técnica en la práctica de la invención, que incluye, pero no se limita a, intercambio de casete mediado por recombinasa (RMCE), inserción cromosómica específica de sitio viral, adenovirus, e inyección pronuclear.

Con el fin de realizar el procedimiento para producir esclareol *in vitro*, como se ha expuesto anteriormente en el presente documento, es muy ventajoso proporcionar un procedimiento para fabricar al menos un polipéptido que tenga una actividad de esclareol sintasa. Por lo tanto, la invención proporciona un procedimiento para producir al menos un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa que comprende

35 a) cultivar un organismo o célula no humano transformado con el vector de expresión de la invención, de modo que albergue un ácido nucleico de acuerdo con la invención y exprese o sobreexprese un polipéptido codificado por dicho ácido nucleico y que tenga una actividad de esclareol sintasa;
b) aislar el polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa a partir del organismo o célula no humano cultivado en la etapa a).

40 De acuerdo con una realización preferente, dicho procedimiento comprende además, además de la etapa a), transformar un organismo o célula hospedador no humano con al menos un vector de expresión de la invención, de modo que albergue al menos un ácido nucleico de acuerdo con la invención y exprese o sobreexprese un polipéptido codificado por dicho ácido nucleico.

45 La transformación y el cultivo del organismo o célula no humano se puede realizar como se ha descrito anteriormente para el procedimiento para la fabricación del esclareol *in vivo*. La etapa b) se puede realizar usando cualquier técnica bien conocida en la técnica para aislar un polipéptido particular de un organismo o célula.

50 Una "variante de polipéptido", como se denomina en el presente documento, significa un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y es básicamente homólogo a un polipéptido nativo, pero que tiene una secuencia de aminoácidos diferente de la codificada por cualquiera de las secuencias de ácidos nucleicos de la invención debido a una o más supresiones, inserciones o sustituciones.

Las variantes pueden comprender secuencias sustituidas conservativamente, que significa que un resto de aminoácido dado se reemplaza por un resto que tiene características fisicoquímicas similares. Algunos ejemplos de sustituciones conservativas incluyen la sustitución de un resto alifático por otro, tal como Ile, Val, Leu, o Ala por otro, o sustituciones de un resto polar por otro, tal como entre Lys y Arg; Glu y Asp; o Gln y Asn. Véase Zubay, Biochemistry, Addison-Wesley Pub. Co., (1983). Los efectos de tales sustituciones se pueden calcular usando matrices de calificación de sustitución tales como PAM-120, PAM-200, y PAM-250 como se discute en Altschul, (J. Mol. Biol. 219:555-65, 1991). Se conocen bien otras de tales sustituciones conservativas, por ejemplo sustituciones

de regiones enteras que tienen características de hidrofobicidad similares.

También se incluyen en la invención variantes de péptidos de origen natural. Algunos ejemplos de tales variantes son proteínas que resultan de sucesos de corte y empalme de ARNm alternantes o de la escisión proteolítica de los polipéptidos descritos en el presente documento. Las variaciones atribuibles a la proteólisis incluyen, por ejemplo, diferencias en los extremos N-terminal o C-terminal tras la expresión de diferentes tipos de células hospedadoras, debido a la retirada proteolítica de uno o más aminoácidos terminales de los polipéptidos codificados por las secuencias de la invención.

Se pueden usar variantes de los polipéptidos de la invención para obtener una mejora o una reducción deseada de la actividad enzimática, una modificación de la regioquímica o estereoquímica modificada, o una alteración de la utilización de sustrato o la distribución del producto. Además, las variantes se pueden preparar para que tengan al menos una propiedad modificada, por ejemplo un aumento de afinidad por el sustrato, una mejora de la especificidad para la producción de uno o más compuestos deseados; una diferente distribución de producto, una diferente actividad enzimática, un aumento de la velocidad de la reacción de la enzima, una mayor actividad o estabilidad en un entorno específico (pH, temperatura, disolvente, etc.), o una mejora del nivel de expresión en un sistema de expresión deseado. Una variante o un mutante dirigido a sitio se puede preparar mediante cualquier procedimiento conocido en la técnica. Como se ha indicado anteriormente, la invención proporciona polipéptidos recombinantes y no recombinantes, aislados y purificados, tales como de *Salvia sclarea*. Las variantes y los derivados de polipéptidos nativos se pueden obtener por aislamiento de variantes de origen natural, o la secuencia de nucleótidos de las variantes, de líneas o especies de plantas diferentes o iguales, o mediante mutaciones de programación artificial de secuencias de nucleótidos que codifican las esclareol sintasas nativas. Las alteraciones de la secuencia de aminoácidos nativa se pueden conseguir mediante cualquiera de cierto número de procedimientos convencionales.

Las variantes de polipéptidos que resultan de una fusión de secuencias de péptidos adicionales en los extremos amino y carboxilo terminales de los polipéptidos de la invención se pueden usar para mejorar la expresión de los polipéptidos, y pueden ser útiles en la purificación de la proteína o la mejora de la actividad enzimática del polipéptido en un entorno o sistema de expresión deseado. Tales secuencias de péptidos adicionales pueden ser péptidos de señal, por ejemplo. Por lo tanto, la presente invención incluye variantes de los polipéptidos de la invención, tales como las obtenidas por fusión con otros oligo o polipéptidos y/o las que se unen a péptidos de señal.

Por lo tanto, en una realización, la presente invención proporciona un procedimiento para preparar un polipéptido variante que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende las etapas de:

- (a) seleccionar un ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las realizaciones expuestas anteriormente;
- (b) modificar el ácido nucleico seleccionado para obtener al menos un ácido nucleico mutante;
- (c) transformar células u organismos unicelulares hospedadores con la secuencia de ácido nucleico mutante para expresar un polipéptido codificado por la secuencia de ácido nucleico mutante;
- (d) analizar sistemáticamente el polipéptido para al menos una propiedad modificada; y,
- (e) opcionalmente, si el polipéptido no tiene ninguna actividad de esclareol sintasa variante deseada, repetir las etapas de procedimiento (a) a (d) hasta que se obtenga un polipéptido con una actividad de esclareol sintasa variante deseada;
- (f) opcionalmente, si se identificó un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa variante deseada en la etapa d), aislar el correspondiente ácido nucleico mutante obtenido en la etapa (c).

En la etapa (b), se pueden crear un gran número de secuencias de ácido nucleico mutantes, por ejemplo mediante mutagénesis aleatoria, mutagénesis específica de sitio, o barajado de ADN. Los procedimientos detallados del barajado génico se encuentran en Stemmer, DNA shuffling by random fragmentation and reassembly: *in vitro* recombination for molecular evolution. Proc Natl Acad Sci U S A., 1994, 91(22): 10747-1075. En resumen, el barajado de ADN se refiere a un procedimiento de recombinación aleatoria de secuencias conocidas *in vitro*, que implica al menos dos ácidos nucleicos seleccionados para recombinación. Por ejemplo, se pueden introducir mutaciones en sitios particulares mediante síntesis de oligonucleótidos que contienen una secuencia mutante, flanqueados por sitios de restricción que permiten la ligadura a fragmentos de la secuencia nativa. Después de la ligadura, la secuencia reconstruida resultante codifica un análogo que tiene la inserción, sustitución, o supresión de aminoácido deseada. Alternativamente, se pueden emplear procedimientos de mutagénesis específicos de sitio dirigidos por oligonucleótidos para proporcionar un gen alterado en el que se pueden alterar codones predeterminados por sustitución, supresión o inserción.

Por lo tanto, SEC ID N°: 2 o 93 se pueden combinar con cualquier otro aminoácido que codifique diterpeno sintasa, por ejemplo aislado de un organismo distinto de *Salvia sclarea*. De ese modo, se pueden obtener y separar ácidos nucleicos mutantes, que se pueden usar para transformar células hospedadoras de acuerdo con procedimientos convencionales, por ejemplo tales como los desvelados en los presentes Ejemplos.

En la etapa (d), el polipéptido obtenido en la etapa (c) se analiza sistemáticamente para al menos una propiedad modificada, por ejemplo una actividad enzimática modificada deseada. Algunos ejemplos de actividades enzimáticas deseadas, para las que se puede analizar sistemáticamente un polipéptido expresado, incluyen aumento o reducción de la actividad enzimática, según se mide mediante el valor de K_M o V_{max} , modificación de la regioquímica o

estereoquímica y alteración del uso de sustrato o la distribución de producto. El análisis sistemático de la actividad enzimática se puede realizar de acuerdo con procedimientos familiares para los expertos en la materia y los desvelados en los presentes Ejemplos.

5 La etapa (e) proporciona la repetición de las etapas de procedimiento (a)-(d), que se pueden realizar preferentemente en paralelo. Por lo tanto, mediante la creación de un número considerable de ácidos nucleicos mutantes, se pueden transformar numerosas células hospedadoras con diferentes ácidos nucleicos mutantes al mismo tiempo, permitiendo el análisis sistemático posterior de un elevado número de polipéptidos. De ese modo, se pueden aumentar las oportunidades de obtener un polipéptido variante deseado a discreción del experto en la materia.

10 **Descripción de las figuras**

Figura 1: estructuras de los diversos compuestos citados en la memoria descriptiva.

Figura 2: biosíntesis putativa de esclareol a partir de LPP, que está catalizada por SsTps1132 (SEC ID N°: 1).

Figura 3: alineación de secuencias de aminoácidos de fragmentos de tipo diterpeno sintasa de clase I con la secuencia del estemodeno sintasa de *Oriza sativa* (número de registro AAZ76733).

15 Figura 4: alineación de la secuencia de aminoácidos deducida de SsTps1132 (SEC ID N°: 1) y SsTps1137 (SEC ID N°: 86) con secuencias de aminoácidos de diterpeno sintasas seleccionadas de la base de datos.

Figura 5: alineación de secuencias de aminoácidos de SsTps1132 (SEC ID N°: 1) y 1132-2-5 (SEC ID N°: 96) que se expresaron heterológicamente en *E. coli*.

20 Figura 6: análisis por GC de los productos obtenidos después de la incubación de 1132 proteínas recombinantes diferentes con LPP. Los extractos de proteína sin procesar de *E. coli* que expresan las proteínas recombinantes SsTps1132 y 1132-2-5 (SEC ID N°: 1 y 96) se incubaron con LPP en un volumen final de 1 ml de MOPSO 50 mM a pH 7 complementado con MgCl₂ 15 mM y DTT 1 mM.

25 Figura 7: análisis por GC-MS de los productos generados a partir de LPP mediante la proteína recombinante 1132-2-5. (A) Cromatograma iónico total de los productos obtenidos a partir de la incubación de LPP con un extracto de proteínas sin procesar de *E. coli* transformado con pET101-1132-2-5 (SEC ID N°: 93). (B) Espectro de masas del pico para un tiempo de retención de 14,3. (C) Espectro de masas de un patrón de esclareol auténtico.

30 Figura 8: análisis por GC de los productos obtenidos después de incubación conjunta de las proteínas recombinantes SsTps1132 y 1132-2-5 (SEC ID N°: 1 y 96) con la proteína recombinante SsLPPs3 (SEC ID N°: 24) en presencia de GGPP.

Realizaciones específicas de la invención o Ejemplos

La invención se describirá a continuación con mayor detalle por medio de los siguientes Ejemplos.

Ejemplo 1

Aislamiento de los ADNc que codifican LPP sintasa de *Salvia sclarea* mediante un enfoque de PCR

35 **A. Material de planta y extracción de ADN**

Se recogieron las yemas florales (1,5 a 2 cm de longitud, 1-2 días de edad) que desarrolla la *Salvia sclarea* en los campos de Bassins (Suiza) y se congelaron directamente en nitrógeno líquido.

40 Se extrajo ARN total usando el Reactivo de ARN de Plantas Concert™ de Invitrogen (Carlsbad, CA) y el ARNm se purificó mediante cromatografía de afinidad oligodT-celulosa usando el Kit de aislamiento de ARNm FastTrack® 2.0 (Invitrogen, Carlsbad, CA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se construyó una librería de ADNc usando el Kit de Amplificación de ADNc Marathon™ (Clontech, Mountain View, CA).

B. Reacciones en cadena de la polimerasa para la amplificación de los ADNc de diterpeno sintasas

55 Se realizó la PCR usando el cebador directo PCR DT3F (5'-GAYRTNGAYGAYACNGCNATGG-3' (SEC ID N°: 3)) y el cebador inverso DT4R (5'-GTYTTNCCNAKCCANACRTCRYT-3' (SEC ID N°: 4)). La mezcla de PCR contenía 0,4 μM de cada cebador, 300 μM de cada dNTP, 5 μl de tampón de ADN polimerasa 10X HotStartTaq® (Qiagen), 2 μl de ADNc diluido 100 veces, y 0,5 μl de ADN polimerasa HotStartTaq® en un volumen final de 50 μl. Las condiciones de ciclación fueron: 35 ciclos de 45 s a 94 °C, 45 s a 50 °C y 2 min a 72 °C; y 10 min a 72 °C. Los tamaños de los productos de PCR se evaluaron en un gel de agarosa al 1 %. Las bandas correspondientes al tamaño esperado se extrajeron del gel, se purificaron usando el Kit de Extracción de Gel QIAquick® (Qiagen) y se clonaron en el vector pCR®2.1-TOPO usando el Kit de clonación TOPO TA (Invitrogen, Carlsbad, CA). Los fragmentos de ADNc insertados se sometieron a continuación a secuenciación de ADN y la secuencia se comparó frente a la base de datos de proteínas no redundante de GenBank (NCBI) usando el algoritmo BLASTX (Altschul y col., J. Mol. Biol. 215, 403-410, 1990). Se obtuvo una secuencia de 354 pb denominada FN23 (SEC ID N°: 5). Este fragmento de ADN poseía el tamaño esperado y mostró homología de secuencia con diterpeno sintasas.

55

C. Aislamiento de ADNc de longitud completa mediante amplificación rápida de los extremos del ADNc (RACE)

Se diseñaron los oligonucleótidos específicos para la secuencia FN23 (SEC ID N°: 5): FN23-F1 (3'-GCACGGATAC-GACGTCGATCCAAATGTAC-5' (SEC ID N°: 6)), FN23-F2 (3'-GGGCTGCTCAACTAAGATTTCCAGGAG-5' (SEC ID N°: 7)) y FN23-F3 (5'-GGGTGATATCCGACCACTTATTTGATGAG-5' (SEC ID N°: 8)). Estos cebadores se usaron en RT-PCR en combinación con cebadores de oligodT prolongados con una secuencia adaptadora (5'-AATTCGGTACCCGGGATCC(T)₁₇-3') (SEC ID N°: 9). La composición de la mezcla de reacción de RT-PCR fue la siguiente: 10 µl de tampón 5X Qiagen OneStep RT-PCR, 400 µM de cada dNTP, 400 nM de cada cebador, 2 µl de Mezcla Enzimática Qiagen OneStep RT-PCR, 1 µl de Inhibidor de Ribonucleasa RNasin® (Promega Co., Madison, WI) y 1250 ng de ARN total en un volumen final de 50 µl. Las condiciones del ciclado térmico fueron: 30 min a 50 °C (transcripción inversa); 15 min a 95 °C (activación de ADN polimerasa); 35 ciclos de 45 s a 94 °C, 45 s a 50 °C y 90 s a 72 °C; y 10 min a 72 °C. Se realizó una segunda ronda de PCR usando los productos de RT-PCR como plantilla con el cebador adapterP (5'-AATTCGGTACCCGGGATCC-3' (SEC ID N°: 10)) en combinación con cebadores específicos de FN23 iguales o anidados. Este enfoque de PCR proporcionó un fragmento de ADNc de 1271 pb (FN30 (SEC ID N°: 11)) que tenía una superposición perfecta de 192 pb con el fragmento FN23 (SEC ID N°: 5) y que contenía el extremo 3' incluyendo el codón de terminación y la secuencia no codificante 3' del ADNc correspondiente.

Para la amplificación del extremo 5' del ADNc, se diseñaron oligonucleótidos antisentido específicos para FN23: FN23-R1 (5'-CATGGCATCTTCAACCCAGCTTTATCTCATC-3' (SEC ID N°: 12)), FN23-R2 (5'-GTGGTCGGATATCACCCATCTT-TCTTGAAGTCG-3' (SEC ID N°: 13)), FN23-R3 (5'-CATTGGAGATGCAGACTCGACCGATTGACC-3' (SEC ID N°: 14)). Estos cebadores se usaron para 5'RACE usando la librería de ADNc de *S. sclarea* siguiendo el protocolo del Kit de Amplificación de ADNc Marathon™ (Clontech, Mountain View, CA). Las condiciones de ciclado térmico fueron las que siguen a continuación: 1 min a 94 °C, 5 ciclos de 30 s a 94 °C y 4 min a 72 °C, 5 ciclos de 30 s a 94 °C y 4 min a 70 °C, 20 ciclos de 30 s a 94 °C y 4 min a 68 °C. Esta 5'RACE proporcionó un fragmento de ADNc de 1449 pb (FN40 (SEC ID N°: 15)) que tenía una superposición perfecta de 227 pb con FN23 (SEC ID N°: 5). La comparación con secuencias de diterpeno sintasas conocidas reveló que el fragmento FN40 (SEC ID N°: 15) contenía el codón de iniciación de traducción y una región no codificante de 87 pb. El ensamblaje de los tres fragmentos de ADNc (FN23, FN30 y FN40 (SEC ID N°: 5, 11 y 15)) proporcionó una secuencia de ADNc de longitud completa (SaTps1) de 2655 pb (SEC ID N°: 16) con un marco abierto de lectura de 2355 pb que codifica una proteína de 785 restos (SEC ID N°: 17).

Ejemplo 2 Expresión heteróloga de la LPP sintasa de *S. sclarea* en *E. coli*

El pETDuet-1 (Novagen, Madison, WI), diseñado para la expresión con el control de un promotor T7, se usó para la expresión en células de *E. coli*. Para construir el plásmido de expresión, se amplificó el marco abierto de lectura de SaTps1 (SEC ID N°: 16) mediante PCR a partir de la librería de ADNc con los cebadores directo e inverso SaTps-Nde (3'-TACTGACAT-ATGACTTCTGTAAATTTGAGCAGAGCACC-5' (SEC ID N°: 18)) y SaTps-Kpn (3'-TTGGTACCTCATACAACCG-GTCGAAAGAGTACTTTG-5' (SEC ID N°: 19)) diseñados para introducir un sitio NdeI inmediatamente antes del codón de inicio y un sitio KpnI después del codón de terminación. Dado que el marco abierto de lectura contiene un sitio NdeI en la posición 1614 del marco abierto de lectura, esta amplificación se realizó en dos etapas por PCR de extensión superpuesta (Horton y col., Gene 77, 61-68, 1989), usando los cebadores SaTps-Nde (SEC ID N°: 18) y SaTps-Kpn (SEC ID N°: 19) en combinación con los cebadores Satps-mut1f (5'-GTTGGAGTGGATCCACATGCAGGAATGGTAC-3' (SEC ID N°: 20)) y Satps-mut1r (3'-GTACCAT-TCCTGCATCTGGATCCACTCCAAC-5' (SEC ID N°: 21)), diseñados para retirar el sitio NdeI sin alterar la secuencia de aminoácidos. El ADNc resultante se ligó en primer lugar en el plásmido PCR2.1-Topo usando el Kit de Clonación TOPO TA (Invitrogen, Carlsbad, CA) y las secuencias de los insertos se verificaron antes de la subclonación como fragmento NdeI-KpnI en el vector pETDuet-1.

El análisis de la secuencia de varios clones obtenidos mediante amplificación a partir de la librería de ADNc con los cebadores específicos SaTps1 mostró cierta variabilidad en varias posiciones de la secuencia de ADNc. Se identificaron siete posiciones, en las que se pueden encontrar dos aminoácidos diferentes. Se descubrió que una posición era la inserción de un resto de serina producido en algunos de los clones. Estas posiciones se enumeran en la siguiente tabla.

Posiciones (con respecto a la secuencia de aminoácidos)	Aminoácido
34	Ile o Thr
40	Phe o Leu
174	Gln o His
222	Gly o Asp
538	Gln o His

(continuación)

Posiciones (con respecto a la secuencia de aminoácidos)	Aminoácido
560	Arg o Leu
596	Asn o Lys
612	Inserción de una Ser

Estas variaciones parecieron producirse de una forma aleatoria en once clones diferentes secuenciados, lo que sugiere que están presentes al menos dos isoformas muy estrechamente relacionadas de una diterpeno sintasas en el genoma de *S. sclarea* y que el enfoque de amplificación de PCR condujo al barajado de las secuencias. Se seleccionaron dos clones, SsLPPs3 (SEC ID N°: 22) y SsLPPs9 (SEC ID N°: 23) representativos de la variabilidad de secuencias, para los experimentos de expresión heteróloga y de caracterización enzimática.

Los plásmidos pETDuet-SsLPPs3 y pETDuet-SsLPPs9 se transfirieron a células de *E. coli* B121(DE3) (Novagen, Madison, WI). Se usaron colonias individuales de células transformadas para inocular 5 ml de medio LB. Después de 5 a 6 horas de incubación a 37 °C, los cultivos se transfirieron a una incubadora a 20 °C y se dejaron 1 hora para equilibrado. La expresión de la proteína se indujo a continuación mediante la adición de IPTG 1 mM y el cultivo se incubó durante una noche a 20 °C. Al día siguiente, las células se recogieron por centrifugación, se suspendieron en 0,1 volúmenes de MOPSO 50 mM a pH 7, glicerol al 10 % y se lisaron por sonicación. Los extractos se aclararon por centrifugación (30 min a 20.000 g), y los sobrenadantes que contenían las proteínas solubles se usaron para experimentos adicionales.

Los extractos de proteína sin procesar de las células transformadas pETDuet-SsLPPs3 y pETDuet-SsLPPs9 se analizaron mediante SDS-PAGE y se compararon con los extractos de proteína obtenidos a partir de las células transformadas con el plásmido vacío pETDuet. Se detectaron claramente las proteínas recombinantes SsLPPs3 y SsLPPs9 (SEC ID N°: 24 y 25) y el peso molecular aparente se estimó en 90 kDa, un valor en concordancia con el peso molecular calculado de 83 kDa.

Ejemplo 3

Purificación de la LPP sintasa de *Salvia sclarea* y actividades enzimáticas

Los plásmidos PCR2.1-Topo que contienen el ADNc de SsLPPs3 y SsLPPs9 (SEC ID N°: 22 y 23) (Ejemplo 2) se digirieron con NdeI y SacI y los insertos se ligaron en el plásmido pET28a(+) (Novagen). Los plásmidos de expresión resultantes (pET28-SsLPPs3 y pET28-SsLPPs9) contienen los ADNc con una modificación en el extremo en la posición 5' diseñada para expresar las proteínas con una marca de hexa-histidina N-terminal (marca de His). La purificación se realizó en condiciones nativas usando el Sistema de Purificación ProBond™ (Invitrogen) siguiendo el protocolo del fabricante excepto en que, para la elución, el imidazol se sustituyó con L-histidina para minimizar la inhibición de la enzima. Usando este enfoque, las enzimas recombinantes con "marca de His" en SsLPPs3 y SsLPPs9 (SEC ID N°: 97 y 98) se pudieron purificar hasta una homogeneidad aparente.

Las enzimas purificadas por afinidad se incubaron 12 horas a 30 °C con GGPP 200 μM y DTT 1 mM en MOPSO a pH 7, glicerol al 10 %, DTT 1 mM. No se observó producto de diterpeno mediante la extracción del medio de incubación con pentano y análisis del extracto con GC o GC-MS. El tratamiento del mismo extracto con fosfatasa alcalina (Sigma, 6 unidades/ml), seguido por extracción con pentano y análisis de GC, mostró la formación de labdenodiol y demostró la formación enzimática de difosfato de labdenodiol (LPP) como único producto de GGPP mediante la diterpeno sintasa recombinante.

El análisis de GC se realizó en un sistema 6890 Series GC de Agilent equipado con un detector de ionización a la llama usando un diámetro interno de 0,25 mm con columna de capilaridad SPB-1 de 30 m (Supelco, Bellefonte, PA). El gas vehículo era He a un flujo constante de 1,5 ml/min. La temperatura inicial del horno era de 100 °C (mantenimiento de 1 min) seguido por un gradiente de 10 °C/min a 300 °C. El análisis de GC-MS se realizó en las mismas condiciones y los espectros se registraron en un detector de masas 5975 de Agilent.

Ejemplo 4

Enfoque de PCR para la clonación de homología de diterpeno sintasas de la clase I (esclareol sintasa) de *S. sclarea*.

La clonación y caracterización de SsLPPs3 (SEC ID N°: 24) y SsLPPs9 (SEC ID N°: 25), en los Ejemplos 1 a 3, sugieren que la biosíntesis del esclareol en *S. sclarea* implica a dos proteínas, la SsLPPs y una diterpeno sintasa de la clase I, la esclareol sintasa, que cataliza la conversión de LPP en esclareol.

Un enfoque de PCR se usó en un primer intento para el aislamiento de secuencias de ADNc de diterpeno sintasas de la clase I. Se diseñaron oligonucleótidos basados en secuencias conservadas en diterpeno sintasas de plantas y especialmente en diterpeno sintasas que catalizan el ciclado de ésteres de difosfato C₂₀ a través de un mecanismo

de ionización. Las secuencias con números de registro BAB19275, AAB39482, AAD30231, AAD34295, CAE05201, BAB12441, AAT49066, CAE05199, AAU05906, BAD17672, AAQ72565, AAL09965, AAK83563, AAS47691, AAS47690 y AAR13860, se seleccionaron a partir de las bases de datos de secuencias públicas (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>). Todas estas secuencias de proteínas corresponden a diterpeno sintasas de la clase I y contienen el motivo DDxxD (en el que x representa cualquier aminoácido) característico del mecanismo de ciclado dependiente de ionización en terpeno sintasas. A partir de la alineación de estas secuencias, en primer lugar se seleccionaron dos motivos conservados en la región N-terminal y se usaron para el diseño de oligonucleótidos sentido: YDT(A/S)WVA y (D/N)GSWG. En la secuencia de aminoácidos de la SsLPPs (SEC ID N°: 24 y 25, Ejemplos 1 a 3) estos dos motivos también estaban conservados, aunque con algunas diferencias para el primer motivo (YDTAVIA). Por lo tanto, la secuencia de SsLPPs también se tuvo en cuenta para el diseño de los oligonucleótidos sentido. A partir del primer motivo, se diseñaron tres oligonucleótidos para cubrir todas las variaciones de las secuencias: DiTpsTB_F1, 5'-TATGATACNGCNGT NATDGC-3' (SEC ID N°: 26); DiTpsTB_F2, 5'-TATGACACGGCAGTGATCGC-3' (SEC ID N°: 27); DiTpsTB_F3, 3'-TATGACACGGCAKKGRTNGC-5' (SEC ID N°: 28). A partir del segundo motivo, se diseñaron dos oligonucleótidos: DiTpsTB_F4, 5'-CAACTGGCTGATGGNTCNTGGGG-3' (SEC ID N°: 29); DiTpsTB_F5, 5'-CAACTGGC'TGATGGCTCATGGGG-3' (SEC ID N°: 30). El motivo DDxxD, localizado en la región C-terminal de las proteínas e implicado en la unión del resto de difosfato en el sitio activo, se usó para diseñar dos oligonucleótidos antisentido: DiTpsTB_R1, 5'-GATCCTCCAACRTCRWARARRTCRTC-3' (SEC ID N°: 31), DiTpsTB_R2, 5'-GATCCTCCACGTCGWAGAAAGTCGTC-3' (SEC ID N°: 32).

Estos cebadores se usaron para amplificación de PCR a partir de una biblioteca de ADNc de *Salvia sclarea* (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 1). Las PCR se realizaron usando la Mezcla de Polimerasa 2 Advantage® (Clontech). Cada mezcla de PCR contenía, en un volumen total de 50 µl, 5 µl de tampón de PCR 2 Advantage®, 200 µM de dNTPs, 200 nM de cada cebador de oligonucleótido, 5 µl de ADNc diluido 200 veces, 1 µl de Mezcla de Polimerasa 2 Advantage®. Para las amplificaciones se usaron las siguientes condiciones: 3 minutos de desnaturalización a 94 °C; 15 ciclos de 1 minuto de desnaturalización a 94 °C, 1 min de hibridación a 65 °C para el primer ciclo y menos un grado para cada ciclo siguiente, y 2 minutos de prolongación a 72 °C; 20 ciclos de 1 minuto de desnaturalización a 94 °C, 1 min de hibridación a 58 °C y 2 minutos de prolongación a 72 °C; y por último 10 minutos de prolongación a 72 °C. Se realizaron diferentes PCR con las posibles combinaciones de oligonucleótidos sentido y antisentido. Los amplicones se identificaron sistemáticamente para los tamaños esperados y para homología de secuencias con diterpeno sintasas. Desafortunadamente, usando este enfoque de PCR, no se pudo obtener ninguna secuencia relacionada con diterpeno.

Ejemplo 5

Secuenciación en paralelo de forma masiva de una biblioteca de ADNc de flor de *S. sclarea*.

Dado que el enfoque clásico de clonación basado en homología no tuvo éxito en la clonación de la diterpeno sintasa de la clase I de *S. sclarea*, los inventores se comprometieron a usar un enfoque basado en la secuenciación global de la biblioteca de ADNc. Los inventores usaron la tecnología de secuenciación en paralelo masiva de fragmentos pequeños de ADN desarrollada por Illumina (San Diego, California) para obtener información de secuencias de todos los transcritos (transcriptoma) presentes en las flores de *Salvia sclarea*. Esta técnica de secuenciación usa una química de secuenciación basada en terminador reversible y los aparatos de Estación de Agrupamiento y Secuenciador de Genoma desarrollados por Solexa e Illumina (www.illumina.com).

La tecnología y el equipo se ajustaron en Fasteris SA (Ginebra, Suiza) y la preparación de las muestras de ADN y la secuenciación se realizaron en Fasteris SA. Una alícuota (1 µg) de la biblioteca de ADNc generada a partir de flores en desarrollo de *S. sclarea* usando el Kit de Amplificación de ADNc Marathon™ (Clontech, Mountain View, CA) (Ejemplo 1), se trató usando el Kit de Preparación de Muestra Genómica (Illumina). En resumen, el ADN se fragmenta mediante nebulización, los extremos se preparan para generar extremos romos, los adaptadores se ligan a los extremos de los fragmentos de ADN y los fragmentos de ADN modificados con adaptador se amplifican con PCR. Después de controlar la calidad de la biblioteca mediante electroforesis en gel, la generación de los agrupamientos de ADN en la célula de flujo y la reacción de secuenciación se realiza en los equipos de Estación de Agrupamiento y Secuenciador de Genoma. Usando esta tecnología, se obtuvieron 1,9 millones de secuencias cortas (lecturas) de 35 bases.

El software Edena (Dr David Hernandez, Genomic Research Laboratory, University of Geneva Hospitals, Ginebra, Suiza) se usó para reensamblar secuencias contiguas. Las cinco últimas bases se retiraron primero de cada lectura debido a las posibles incorporaciones erróneas debido a la menor fidelidad en los últimos ciclos del procedimiento de secuenciación. Los parámetros del software se ajustaron de modo que se permitiera una longitud mínima de 15 bases para los solapamientos con identidad estricta (100 %). Se retuvieron las contigs (secuencias contiguas) con una longitud de al menos 50 bases. En estas condiciones, se pudieron reconstituir 2054 contigs de 50 a 1330 bases de longitud.

Para evaluar la calidad del ensamblaje, se buscaron las contigs para identidad de secuencias con la secuencia de ADN de SsLPPs, las diterpeno sintasas de la clase II aisladas primero a partir de la biblioteca de ADNc de *S. sclarea* (SsLPPs3 (SEC ID N°: 22), Ejemplo 2). Esta búsqueda se realizó usando el procedimiento BLASTn (Altschul y col.,

J. Mol. Biol. 215, 403-410, 1990). De forma sorprendente, solamente se encontraron 3 contigs con longitudes de 81, 73 y 52 bases y solamente se habían usado cuarenta lecturas con el software Eland para generar estos contigs. La alineación con la secuencia de referencia de SsLPPs3 mostraba que los 3 contigs (SEC ID N°: 33 a 35 cubrían solamente un 8,7 % de la secuencia de longitud completa aunque con una identidad de un 99 %).

5 En las bases de datos públicas se ha informado una información de secuencias limitadas para *Salvia sclarea*. La única secuencia genética disponible en la base de datos de NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) era la secuencia de la subunidad grande de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa (RuBisCO) de *Salvia sclarea* (N° de registro en NCBI Z37450). La búsqueda de las contigs para la identidad de ADN con esta secuencia de ADN de la RuBisCO de *S. sclarea* (Búsqueda con BLASTn) proporcionó dos contigs de 870 y 547 bases respectivamente (SEC ID N°: 36 y 37).
10 La alineación de las dos contigs con la secuencia de RuBisCO presentaba una cobertura de un 98 %: solamente 27 bases (entre las posiciones 858 y 884) de 1420 bases no estaban presentes en las contigs. Además esta cobertura casi completa, la identidad entre la secuencia de referencia y las contigs era de un 99,5 %, lo que representa una diferencia solamente de 7 nucleótidos.

15 A continuación, se buscaron todas las lecturas (datos no ensamblados) para identidad de secuencia con la secuencia de SsLPPs3 (SEC ID N°: 22). El software Eland (Illumina) se usó para realizar esta búsqueda permitiendo un máximo de 2 faltas de coincidencia con la secuencia de referencia. Se recuperó un total de 616 lecturas. La alineación de los fragmentos seleccionados con la secuencia de referencia revelaba que la secuencia de SsLPPs3 (SEC ID N°: 22) se cubría en la longitud completa con una cobertura ligeramente más elevada (más lecturas) hacia el extremo en la posición 3'. La misma manipulación con la secuencia de la RuBisCO mostraba que se obtenían
20 1650 lecturas para esta secuencia. La cobertura de la secuencia de referencia con la estructura era mucho más elevada para la RuBisCO que para SsLPPs3 (SEC ID N°: 22). Para SsLPPs3 (SEC ID N°: 22), se encontraron varias regiones pequeñas sin cobertura y regiones con ambigüedad de secuencia entre lecturas. Esta cobertura incompleta evita el reensamblaje completo y es ciertamente la razón para generar solamente unos pocos contigs muy pequeños.

25 El número de lecturas obtenido para un ADNc dado es proporcional a la abundancia de este ADNc. Por lo tanto, las abundancias relativas se pueden calcular dividiendo el número de lecturas obtenidas para los ADNc dados entre sus longitudes totales. Al realizar este cálculo para la RuBisCO y SsLPPs3 (SEC ID N°: 22) se proporcionaban valores de 1160 y 260 lecturas/kb respectivamente, lo que refleja una abundancia superior a 4,5 del ADNc de RuBisCO con respecto a los ADNc de SsLPPs. La RuBisCO es una enzima implicada en el metabolismo primario de plantas y que cataliza la fijación de carbono en el ciclo de Calvin. La abundancia relativamente más elevada de la RuBisCO refleja una representación elevada de genes implicados en metabolismo primarios en comparación con genes implicados en el metabolismo secundario tales como la síntesis de diterpeno. El análisis de búsqueda con BLAST con las contigs mostraba que otras enzimas de los ciclos de Calvin (por ejemplo, fosfoglicerato quinasa, gliceraldehído 3-
30 fosfato deshidrogenasa, triosafosfato isomerasa) y metabolismo primario también se representaban de forma abundante en la biblioteca de ADNc usada en el presente documento. Por lo tanto, la codificación del ADNc para las enzimas implicadas en el metabolismo secundario y en particular en la biosíntesis de diterpeno estaba en una abundancia demasiado baja para obtener una cobertura suficiente y un reensamblaje completo.

Ejemplo 6

Extracción de secuencias del tipo diterpeno sintasas de la clase I a partir de los datos de secuenciación.

40 El algoritmo Blast (Altschul y col., J. Mol. Biol. 215, 403-410, 1990) se usó para buscar homología de las secuencias de aminoácidos deducidas con secuencias de diterpeno sintasas de la clase I.

EN primer lugar se realizó una búsqueda de Blastx frente a una base de datos de proteínas con los 2054 contigs. Esta búsqueda proporcionó solamente un contig (contig1610, SEC ID N°: 38) que presentaba homología de secuencia con diterpeno sintasas de la clase I. La secuencia de aminoácidos deducida a partir de este contig
45 contenía el motivo DDxD característico de ciclación de difosfatos de prenilo iniciado mediante ionización.

A continuación se buscó una fracción de los datos sin procesar, que representa aproximadamente 3×10^5 lecturas para homología con diterpeno sintasas de la clase I. Las lecturas se buscaron usando el algoritmo tBlastn con cinco secuencias de aminoácidos seleccionadas de diterpeno sintasa de la clase I (números de registro en NCBI AAC39443, BAB19275, BAB12441, AAD34295, AAS98912). Esta búsqueda seleccionó 462 lecturas, que a
50 continuación se profesaron usando el programa CAP (Huang, Genomics 14 (1), 18-25, 1992) para identificar secuencias de solapamiento. Una pequeña porción de las lecturas se pudo ensamblar en contigs cortos de longitud máxima de 111 bases. Estos contigs, así como las lecturas aisladas restantes se usaron para búsqueda con Blastx frente a una base de datos de proteínas para confirmar su identidad con diterpeno sintasas de la clase I. Por último, se retuvieron 5 fragmentos de ADN (SEC ID N°: 39 a 43).

55 Las secuencias de aminoácidos se dedujeron a partir de los fragmentos seleccionados (SEC ID N°: 44 ha 48) y se alinearon con secuencias de diterpeno sintasas de referencia, permitiendo su colocación relativa. La Figura 3 muestra una alineación de estas secuencias con una secuencia de diterpeno sintasa de longitud completa, la estemodeno sintasa de *Oriza sativa* (Morrone y col., 2006; N° de registro en NCBI AAZ76733) tomará como

referencia.

Ejemplo 7

Amplificación de PCR de los ADNc de diterpeno sintasas de la clase I de longitud completa.

5 Un conjunto de oligonucleótidos directos e inversos se dedujo de las secuencias de ADN relacionadas con las diterpeno sintasas seleccionadas a partir de la secuenciación de la biblioteca de ADNc de *S. sclarea* (Ejemplo 6). Estos cebadores se usaron en combinación con cebadores adaptadores de ADNc en amplificaciones de PCR de tipo 3'/5'RACE. Las amplificaciones se realizaron usando la biblioteca de ADNc de *S. sclarea*, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 1, siguiendo el protocolo del Kit de amplificación de ADNc Marathon™ (Clontech, Mountain View, CA). Las condiciones de ciclado térmico fueron las que siguen a continuación: 1 min a 94 °C, 5 ciclos de 30 segundos a 94 °C y 4 min a 72 °C, 5 ciclos de 30 segundos a 94 °C y 4 min a 70 °C, 20 ciclos de 30 segundos a 94 °C y 4 min a 68 °C.

15 Usando el cebador Cont250-Fwd (SEC ID N°: 49) se obtuvo una secuencia de ADN de 547 pb (1130Cont250, SEC ID N°: 81). El análisis de la secuencia reveló que correspondía al extremo en la posición 5' de un ADNc de diterpeno sintasa y contenía 348 pb de la región de codificación. Con el cebador Cont147_fw1 (SEC ID N°: 51) y Cont147_fw2 (SEC ID N°: 52) los inventores obtuvieron una secuencia de 1473 pb (1132Cont147, SEC ID N°: 82) que contenía el extremo en la posición 3' y 1293 pb de la región de codificación de un ADNc de diterpeno sintasa. El cebador Cont224_fw (SEC ID N°: 57) proporcionó un fragmento de ADN de 207 pb (1137Cont224, SEC ID N°: 83) que codificaba los 43 aminoácidos C-terminales de una diterpeno sintasa con una secuencia distinta de la de 1132Cont147 (SEC ID N°: 82). Los cebadores Cont147_rev1 (SEC ID N°: 53) y Cont147_rev2 (SEC ID N°: 54) permitían la amplificación de un fragmento de ADN de 464 pb (1134Cont147, SEC ID N°: 84). El aminoácido deducido mostraba homología con diterpeno sintasas pero la alineación con otras secuencias de diterpeno sintasas sugería que aún faltaban de 200 a 300 codones para alcanzar el extremo en la posición 5'. Todas las secuencias obtenidas con estas series de amplificación diferían de forma significativa de las secuencias de la SsLPPs aisladas previamente (SEC ID N°: 22 y 23). La PCR con los otros cebadores deducidos de las secuencias de ADN relacionadas con diterpeno sintasas (cebadores cont224-rev (SEC ID N°: 58), cont250-rev (SEC ID N°: 50), cont33-fw1 (SEC ID N°: 55) y cont33-rev (SEC ID N°: 56)) no proporcionaba secuencias relacionadas con diterpeno sintasa.

30 A partir de la única secuencia que contenía una región de inicio de la traducción evidente de una diterpeno sintasa (1130count250, SEC ID N°: 81), se dedujeron oligonucleótidos sentido a partir de la región sin traducir en la posición 5' (UTR) (1130-fw1 (SEC ID N°: 59) y 1130-fw2 (SEC ID N°: 60) y a partir del extremo en la posición 5' del marco de lectura abierto (ORF) (1130-fw3, SEC ID N°: 61). A partir de las dos secuencias que contenían la región de codón de parada de dos diterpeno sintasas distintas (1132Cont147 (SEC ID N°: 82) y 1137Cont224 (SEC ID N°: 83)), se dedujeron cebadores de sentido inverso de cualquiera del UTR en la posición 3' (1132-rev1 (SEC ID N°: 65) y 1137-rev1 (SEC ID N°: 62)) o del extremo en la posición 3' del marco de lectura abierto (1132-rev2 (SEC ID N°: 64) y 1137-rev2 (SEC ID N°: 63)). La PCR se realizó con diferentes combinaciones de estos cebadores directos e inversos. La combinación de cebadores deducida de la secuencia de 1130Cont250 (SEC ID N°: 81) con los cebadores deducidos de la secuencia de 1137Cont224 (SEC ID N°: 83) produjo un fragmento de 2388 pb (SEC ID N°: 85) que codificaba una proteína de 795 aminoácidos (SsTps1137, SEC ID N°: 86). La comparación con secuencias publicadas presentaba homología es con diterpeno sintasas de la clase I y en particular con *ent*-kaureno sintasas B. La homología más elevada se produjo con una proteína sin caracterizar de *Vitis vinifera* (N° de registro en NCBI CAO64942, identidad de un 59 %), una *ent*-kaureno sintasa de *Cucumis sativus* (N° de registro en NCBI BAB19275, identidad de un 54 %) y una *ent*-kaureno sintasa de *Lactuca sativa* (N° de registro en NCBI BAB12441, identidad de un 54 %). La secuencia de aminoácidos de SsTps1137 (SEC ID N°: 86) contenía un motivo DDFFD habitual en terpeno sintasas dependientes de ionización (clase I) y no contenía el motivo característico de la clase II.

45 La combinación de los mismos cebadores directos con los cebadores inversos deducidos del 1132Cont147 (SEC ID N°: 82) no permitía la amplificación de ningún fragmento, lo que confirma que estas dos secuencias no surgen del mismo ADNc. A continuación, se usó un enfoque de 5'RACE para identificar el extremo en la posición 5' del ORF correspondiente a la secuencia de 1132Cont147 (SEC ID N°: 82). Usando los cebadores 1132_race1 (SEC ID N°: 67) y 1132_race2 (SEC ID N°: 68), se obtuvo una secuencia de 536 pb (1132RACE, SEC ID N°: 87) que tenía un solapamiento de 41 bases con el fragmento de 1132Cont147 (SEC ID N°: 82). Este producto de RACE era idéntico al de la secuencia de 1134Cont147 obtenida previamente (SEC ID N°: 84) y no se observaba extensión en el extremo en la posición 5'. Como se ha observado previamente, esta secuencia tenía homología con diterpeno sintasas, pero parecía más corta en al menos 200 codones que todas las otras secuencias de diterpeno sintasas publicadas. Se realizaron experimentos de 5'RACE, para intentar prolongar la secuencia hacia el extremo en la posición 5' de la secuencia de 1132Cont147 (SEC ID N°: 82) y para identificar el codón de inicio de la traducción verdadero. Se diseñaron varios conjuntos de oligonucleótidos (1132_race3 a 1132_race9, SEC ID N°: 69 a 75) pero no se obtuvo información de secuencia adicional. Esto condujo a los inventores a suponer que uno del codón de ATG en la secuencia de 1134Cont147 (SEC ID N°: 84) era realmente el codón de inicio del gen correspondiente de la diterpeno sintasa. La secuencia de nucleótidos de esta supuesta diterpeno sintasa (denominada SsTps1132, SEC ID N°: 2) se reconstituyó a partir de las secuencias de 1132Cont147 (SEC ID N°: 82) y 1132RACE (SEC ID N°: 87). Tomando el primer ATG, el ORF de 1728 pb de SsTps1132 (SEC ID N°: 2) codificaba una proteína de 575 aminoácidos (SEC ID N°: 1). Esta proteína contenía el motivo dependiente de ionización (DDFFD) y compartía

homología, aunque relativamente baja, con diterpeno sintasas publicadas; siendo la secuencia más cercana la de una terpeno sintasa de *Nicotiana tabacum* (Nº de registro en NCBI AAS98912), con una identidad de un 37 %.

De forma sorprendente, la identidad entre las proteínas SsTps1137 (SEC ID Nº: 86) y SsTps1132 (SEC ID Nº: 1) era solamente de un 30 % y estas secuencias compartían solamente de un 21 a un 23 % de identidad con las SsLPPs de la clase II aisladas primero a partir de *S. sclarea* (SEC ID Nº: 24 y 25, Ejemplos 1-3). Una alineación de estas dos proteínas con secuencias seleccionadas de diterpeno sintasas se presenta en la figura 4. La alineación muestra que SsTps1132 (SEC ID Nº: 1) se trunca en el extremo N-terminal con 150 a 240 aminoácidos en comparación con las otras diterpeno sintasas. El procedimiento de ChloroP (Emanuelsson y col., Protein Science 8, 978-984, 1999; <http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/>) se usó para predecir la presencia de un péptido de tránsito de cloroplasto en cada secuencia de proteínas. Para SsTps1137 (SEC ID Nº: 86) y SsTps1132 (SEC ID Nº: 1), se predijeron péptidos de tránsito de cloroplasto de 22 y 51 aminoácidos respectivamente, lo que argumenta una localización en el cloroplasto de ambas proteínas.

La búsqueda de todas las lecturas de secuencias idénticas a las secuencias de ADN de SsTps1137 (SEC ID Nº: 85) y SsTps1132 (SEC ID Nº: 2), proporciono solamente 24 lecturas para SsTps1137 y 425 lecturas para SsTps1132. Esta diferencia en el número de lecturas generado a partir de cada transcrito refleja una diferencia significativa en los niveles de expresión. Basándose en el número relativo de lecturas obtenidas para cada transcrito, se puede calcular que el nivel de expresión de SsTps1132 (220 lecturas/Kb) era similar al nivel de expresión de SsLPPs (260 lecturas/Kb) y que SsTps1137 se expresaba a un nivel mucho menor (10 lecturas/Kb). Con la suposición de que las enzimas que catalizan etapas en la misma ruta metabólica se expresan generalmente a un nivel similar, se puede especular que SsTps1132 (SEC ID Nº: 1) en lugar de SsTps1137 (SEC ID Nº: 86) está implicado en la misma ruta metabólica que las SsLPPs.

Los contigs generados con el software Edena (Ejemplo 5) que buscaron para secuencias de ADN idénticas a las secuencias de estas dos nuevas y supuestas diterpeno sintasas de la clase I, país de inicial para SsTps1137 (SEC ID Nº: 85) no se encontró ningún contig de acuerdo con el supuesto nivel de baja expresión de esta enzima. Para SsTps1132 (SEC ID Nº: 2), se encontraron 4 contigs. El contig1610 (SEC ID Nº: 38) identificado previamente y tres contigs adicionales (de longitud de 53 a 96 pb) (SEC ID Nº: 88 a 90) no se identificaron previamente como fragmento de una diterpeno sintasa. La búsqueda de Blastx con estas tres secuencias no presentaba homología con secuencias de proteínas conocidas. El fallo para encontrar homología para estos contigs se debe a las cortas longitudes de estos fragmentos y a la baja homología de SsTps1132 (SEC ID Nº: 1) con las diterpeno sintasas presentes en las bases de datos.

La observación de una supresión N-terminal de SsTps1132 (SEC ID Nº: 1) en comparación con las otras diterpeno sintasas también explica después por qué no tuvo éxito el enfoque de PCR usado en primer lugar. De hecho, los cebadores directos se diseñaron a partir de regiones conservadas presentes en los primeros 150 aminoácidos de diterpeno sintasas, una región ausente en SsTps1132 (SEC ID Nº: 1). La secuencia de SsTps1137 (SEC ID Nº: 86) contiene los motivos conservados usados para diseñar los cebadores y las secuencias de ADN correspondientes son complementarias con las secuencias del cebador. Supuestamente, la amplificación de SsTps1137 (SEC ID Nº: 85) no tuvo éxito en el enfoque de PCR debido a la baja abundancia de este transcrito.

Ejemplo 8

Expresión heteróloga de las diterpeno sintasas de la clase I de *S. Sclarea* en *E. coli*.

Para asignar una actividad enzimática a SsTps1137 (SEC ID Nº: 86) y SsTps1132 (SEC ID Nº: 1), las proteínas recombinantes se expresaron en *E. coli*. Los ADNc de longitud completa se insertaron en el vector pet101/D-TOPO usando el Kit de Expresión Champion pET101 Directional TOPO.

Para cada enzima, se prepararon dos constructos: uno para expresar la proteína de longitud completa y uno para expresar una proteína truncada basándose en la predicción de péptido de tránsito de cloroplasto. Los marcos de lectura abiertos SsTps1137 (SEC ID Nº: 85) y SsTps1132 (SEC ID Nº: 2) de longitud completa se amplificaron a partir de la biblioteca de ADNc usando los pares de cebadores 1137-start (SEC ID Nº: 78) con 1137-stop (SEC ID Nº: 80) y 1132-start1 (SEC ID Nº: 76) con 1132-stop (SEC ID Nº: 66) respectivamente. Los cebadores 1137_start2 (SEC ID Nº: 79) y 1137_stop (SEC ID Nº: 80) se usaron para amplificar una versión truncada de 72 pb de SsTps1137 diseñada para expresar la proteína con 24 aminoácidos suprimidos en el extremo N-terminal. De la misma manera, los cebadores 1132_start2 (SEC ID Nº: 77) y 1132-parada (SEC ID Nº: 66) se usaron para preparar una versión truncada de SsTps1132 diseñada para expresar la proteína con una supresión N-terminal de 50 aminoácidos. Todas las amplificaciones de ADNc para la expresión de los constructos de expresión se realizaron usando *Pfu* ADN polimerasa (Promega), en un volumen final de 50 µl que contenía 5 µl de *Pfu* ADN polimerasa, tampón 10X, cada dNTP a 200 µM, cada cebador directo e inverso a 0,4 µM, 2,9 unidades de *Pfu* ADN polimerasa y 5 µl de ADNc diluido 100 veces (preparado como se describe en el presente documento en el Ejemplo 1 usando el Kit de Amplificación de ADNc Marathon™ (Clontech)). Las condiciones de ciclado térmico fueron las que siguen a continuación: 1,5 min a 95 °C; 30 ciclos de 45 segundos a 95 °C, 30 segundos a 58 °C y 5 min a 72 °C; y 10 min a 72 °C.

Después de la ligadura en el vector pET101, se seleccionaron varios clones para cada constructo y se secuenciaron para asegurar que no se había introducido ninguna mutación durante la amplificación de PCR. Para SsTps1137, se seleccionaron los dos constructos 1137-B12 (SEC ID N°: 91) y 1137-2-B12 (SEC ID N°: 92) que contenían el ADNC de SsTps1137 respectivamente con y sin el péptido señal (que corresponde a secuencias de polipéptidos en las SEC ID N°: 94 y 95). Para SsTps1132, se seleccionaron dos constructos: uno con la secuencia completa de SsTps1132 (SEC ID N°: 2) y un constructo sin péptido señal (1132-2-5, SEC ID N°: 93). La alineación de las dos secuencias de aminoácidos (SEC ID N°: 1 y 96) deducida de estos constructos se muestra en la figura 5.

Los plásmidos pET101-1137-B12, pET101-1137-2-B12, pET101-SsTps1132, y pET101-1132-2-5 se transfirieron en células B121(DE3) de *E. Coli* (Novagene, Madison, WI). Para inocular 5 ml de medio LB se usaron colonias individuales de células transformadas. Después de 5 a 6 horas de incubación a 37 °C, los cultivos se transfirieron a una incubadora a 20 °C y se dejaron 1 hora para equilibrio. A continuación, la expresión de la proteína se indujo mediante la adición de IPTG 1 mM y el cultivo se incubó durante la noche a 20 °C. Al día siguiente, las células se recogieron para centrifugación, se volvieron a suspender en 0,1 volúmenes de MOPSO 50 mM a pH 7, glicerol al 10 % y se lisaron mediante sonicación. Los extractos se eliminaron mediante centrifugación (30 min a 20.000 g), y los sobrenadantes que contenían las proteínas solubles se usaron para experimentos adicionales. Los extractos de proteína sin procesar se analizaron con SDS-PAGE y se compararon con extractos de proteína obtenidos de células transformadas con el plásmido pET101 vacío.

Ejemplo 9

Actividad enzimática de las diterpeno sintasas de la clase I de *S. Sclarea* recombinante en *E. coli*.

Los extractos de proteína de *E. coli* sin procesar que contienen las proteínas recombinantes y se preparan como se ha descrito en el Ejemplo 8 se usaron para la caracterización de las actividades enzimáticas. Los ensayos enzimáticos se realizaron como se ha descrito en el Ejemplo 3. Todos los ensayos se realizaron en MOPSO 50 mM a pH 7, glicerol al 10 %, DTT 1 mM.

En primer lugar se evaluaron las actividades enzimáticas usando como sustrato cualquiera de GGPP o LPP, el producto de SsLPPs (SEC ID N°: 22) y el supuesto compuesto intermedio en la biosíntesis de esclareol (Ejemplos 1 a 3). El GGPP se sintetizó como se describe en Keller y Thompson (J. Chromatogr 645 (1), 1993, 161-167) y el LPP se preparó esquemáticamente como se ha descrito en el Ejemplo 3. Los ensayos se realizaron en presencia de 10 a 100 µM de sustrato, MgCl₂ 15 mM y de 0,1 a 0,5 mg de proteínas sin procesar en un volumen total de 1 ml. Los tubos se incubaron de 4 a 12 horas a 30 °C y se extrajeron dos veces con un volumen de pentano. Después de concentración con un flujo de nitrógeno, los extractos se analizaron con GC y GC-MS (usando las condiciones que se han descrito en el Ejemplo 3) y se compararon con los extractos del ensayo con proteínas de control (obtenidas de células transformadas con el plásmido vacío). Con el GGPP como sustrato, no se observó actividad con ninguna de las proteínas recombinantes (los datos no se muestran). Con el LPP como sustrato, no se observó actividad con los extractos de proteínas que contenían proteínas recombinantes de SsTps1137 pero con SsTps1132, la actividad se observó tanto con SsTps1132 como con 1132-2-5 (SEC ID N°: 1 y 96) (Figura 6). Las enzimas también eran activas en ausencia de MgCl₂ y se observaron los mismos perfiles de producto con una actividad global aproximadamente igual. La identidad del producto se confirmó mediante concordancia de los tiempos de retención (Figura 6) y con el emparejamiento del espectro de masas con el espectro de un patrón auténtico (Figura 7). En todos los ensayos, se observó un solo pico de esclareol sin traza de producto adicional.

A continuación se realizaron ensayos con coincubación de las diterpeno sintasas de la clase II (SsLPPs3, SEC ID N°: 24; Ejemplos 1-3) y las diterpeno sintasas de la clase I (serie 1132, SEC ID N°: 1 y 96). Los ensayos se realizaron en MOPSO 50 mM a pH 7, glicerol al 10 %, DTT 1 mM, GGPP 50 µM, con MgCl₂ 1 mM y en presencia de 50 µl de los extractos de proteína sin procesar de *E. coli* que expresan los diferentes constructos. Por lo tanto, los ensayos en presencia de 50 µl de extractos de proteína sin procesar que contenían el SsLPPs3 (SEC ID N°: 24) enzima recombinante y 50 µl de extractos que contenían SsTps1132 (SEC ID N°: 1) o 1132-2-5 (SEC ID N°: 96) Se evaluaron para la producción de productos de diterpeno. La Figura 8 muestra los perfiles de GC de extractos de tales incubaciones en presencia de MgCl₂. El esclareol se producía con ambos constructos de 1132 (SEC ID N°: 1 y 96) (Figura 8), un resultado coherente con el ensayo que se ha descrito anteriormente con LPP como sustrato. No se observó ninguna diferencia significativa cuando se omitía el MgCl₂ de las incubaciones (los datos no se muestran).

En conclusión, la SsTps1132 (SEC ID N°: 2) codifica la esclareol sintasa (SEC ID N°: 1) y cataliza la conversión de LPP en esclareol.

Listado de secuencias

<110> Firmenich SA

<120> Procedimiento para producir esclareol

<130> 7260

<160> 98

ES 2 556 221 T3

<170> PatentIn versión 3,5

<210> 1

<211> 575

<212> PRT

5

<213> *Salvia sclarea*

<400> 1

Met Ser Leu Ala Phe Asn Val Gly Val Thr Pro Phe Ser Gly Gln Arg
1 5 10 15

Val Gly Ser Arg Lys Glu Lys Phe Pro Val Gln Gly Phe Pro Val Thr
20 25 30

Thr Pro Asn Arg Ser Arg Leu Ile Val Asn Cys Ser Leu Thr Thr Ile
35 40 45

Asp Phe Met Ala Lys Met Lys Glu Asn Phe Lys Arg Glu Asp Asp Lys
50 55 60

Phe Pro Thr Thr Thr Thr Leu Arg Ser Glu Asp Ile Pro Ser Asn Leu
65 70 75 80

Cys Ile Ile Asp Thr Leu Gln Arg Leu Gly Val Asp Gln Phe Phe Gln
85 90 95

Tyr Glu Ile Asn Thr Ile Leu Asp Asn Thr Phe Arg Leu Trp Gln Glu
100 105 110

Lys His Lys Val Ile Tyr Gly Asn Val Thr Thr His Ala Met Ala Phe
115 120 125

Arg Leu Leu Arg Val Lys Gly Tyr Glu Val Ser Ser Glu Glu Leu Ala
130 135 140

Pro Tyr Gly Asn Gln Glu Ala Val Ser Gln Gln Thr Asn Asp Leu Pro
145 150 155 160

Met Ile Ile Glu Leu Tyr Arg Ala Ala Asn Glu Arg Ile Tyr Glu Glu
165 170 175

ES 2 556 221 T3

Glu Arg Ser Leu Glu Lys Ile Leu Ala Trp Thr Thr Ile Phe Leu Asn
 180 185 190
 Lys Gln Val Gln Asp Asn Ser Ile Pro Asp Lys Lys Leu His Lys Leu
 195 200 205
 Val Glu Phe Tyr Leu Arg Asn Tyr Lys Gly Ile Thr Ile Arg Leu Gly
 210 215 220
 Ala Arg Arg Asn Leu Glu Leu Tyr Asp Met Thr Tyr Tyr Gln Ala Leu
 225 230 235 240
 Lys Ser Thr Asn Arg Phe Ser Asn Leu Cys Asn Glu Asp Phe Leu Val
 245 250 255
 Phe Ala Lys Gln Asp Phe Asp Ile His Glu Ala Gln Asn Gln Lys Gly
 260 265 270
 Leu Gln Gln Leu Gln Arg Trp Tyr Ala Asp Cys Arg Leu Asp Thr Leu
 275 280 285
 Asn Phe Gly Arg Asp Val Val Ile Ile Ala Asn Tyr Leu Ala Ser Leu
 290 295 300
 Ile Ile Gly Asp His Ala Phe Asp Tyr Val Arg Leu Ala Phe Ala Lys
 305 310 315 320
 Thr Ser Val Leu Val Thr Ile Met Asp Asp Phe Phe Asp Cys His Gly
 325 330 335
 Ser Ser Gln Glu Cys Asp Lys Ile Ile Glu Leu Val Lys Glu Trp Lys
 340 345 350
 Glu Asn Pro Asp Ala Glu Tyr Gly Ser Glu Glu Leu Glu Ile Leu Phe
 355 360 365
 Met Ala Leu Tyr Asn Thr Val Asn Glu Leu Ala Glu Arg Ala Arg Val
 370 375 380
 Glu Gln Gly Arg Ser Val Lys Glu Phe Leu Val Lys Leu Trp Val Glu
 385 390 395 400
 Ile Leu Ser Ala Phe Lys Ile Glu Leu Asp Thr Trp Ser Asn Gly Thr
 405 410 415

ES 2 556 221 T3

Gln Gln Ser Phe Asp Glu Tyr Ile Ser Ser Ser Trp Leu Ser Asn Gly
 420 425 430

Ser Arg Leu Thr Gly Leu Leu Thr Met Gln Phe Val Gly Val Lys Leu
 435 440 445

Ser Asp Glu Met Leu Met Ser Glu Glu Cys Thr Asp Leu Ala Arg His
 450 455 460

Val Cys Met Val Gly Arg Leu Leu Asn Asp Val Cys Ser Ser Glu Arg
 465 470 475 480

Glu Arg Glu Glu Asn Ile Ala Gly Lys Ser Tyr Ser Ile Leu Leu Ala
 485 490 495

Thr Glu Lys Asp Gly Arg Lys Val Ser Glu Asp Glu Ala Ile Ala Glu
 500 505 510

Ile Asn Glu Met Val Glu Tyr His Trp Arg Lys Val Leu Gln Ile Val
 515 520 525

Tyr Lys Lys Glu Ser Ile Leu Pro Arg Arg Cys Lys Asp Val Phe Leu
 530 535 540

Glu Met Ala Lys Gly Thr Phe Tyr Ala Tyr Gly Ile Asn Asp Glu Leu
 545 550 555 560

Thr Ser Pro Gln Gln Ser Lys Glu Asp Met Lys Ser Phe Val Phe
 565 570 575

<210> 2
 <211> 1728
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 2

5

atgtcgctcg ccttcaacgt cggagttacg cctttctccg gccaaagagt tgggagcagg 60
 aaagaaaaat ttccagtcca aggatttccct gtgaccaccc ccaataggtc acgtctcatc 120
 gttaactgca gccttactac aatagatttc atggcgaaaa tgaaagagaa tttcaagagg 180
 gaagacgata aatttccaac gacaacgact cttcgatccg aagatatacc ctctaatttg 240
 tgtataatcg acacccttca aaggttgggg gtcgatcaat tcttccaata tgaatcaac 300
 actattctag ataacacatt caggttgtgg caagaaaaac acaaagttat atatggcaat 360
 gttactactc atgcaatggc atttaggctt ttgcgagtga aaggatacga agtttcatca 420

ES 2 556 221 T3

gaggagttgg ctccatatgg taaccaagag gctgtagcc agcaaacaaa tgacctgccg 480
atgattattg agctttatag agcagcaaat gagagaatat atgaagaaga gaggagtctt 540
gaaaaaattc ttgcttggac taccatcttt ctcaataagc aagtgcaaga taactcaatt 600
cccgacaaaa aactgcacaa actggtggaa ttctacttga ggaattacaa aggcataacc 660
ataagattgg gagctagacg aaacctcgag ctatatgaca tgacctacta tcaagctctg 720
aatctacaa acaggttctc taatttatgc aacgaagatt ttctagtttt cgcaaagcaa 780
gatttcgata tacatgaagc ccagaaccag aaaggacttc aacaactgca aaggtggtat 840
gcagattgta ggttggacac cttaaacttt ggaagagatg tagttattat tgctaattat 900
ttggcttcat taattattgg tgatcatgcg ttgactatg ttctgtctcg atttgccaaa 960
acatctgtgc ttgtaacaat tatggatgat tttttcgact gtcattggctc tagtcaagag 1020
tgtgacaaga tcattgaatt agtaaaagaa tggaaggaga atccggatgc agagtacgga 1080
tctgaggagc ttgagatcct ttttatggcg ttgtacaata cagtaaatga gttggcggag 1140
agggctcgtg ttgaacaggg gcgtagtgtc aaagagtttc tagtcaaact gtgggttgaa 1200
atactctcag ctttcaagat agaattagat acatggagca atggcacgca gcaaagcttc 1260
gatgaataca tttcttcgtc gtggttgtcg aacggttccc ggctgacagg tctcctgacg 1320
atgcaattcg tcggagtaaa attgtccgat gaaatgotta tgagtgaaga gtgcaactgat 1380
ttggctaggc atgtctgtat ggtcggccgg ctgctcaacg acgtgtgcag ttctgagagg 1440
gagcgcgagg aaaatattgc aggaaaaagt tatagcattc tactagcaac tgagaaagat 1500
ggaagaaaag ttagtgaaga tgaagccatt gcagagatca atgaaatggt tgaatatcac 1560
tgagaaaaag tgttgcagat tgtgtataaa aaagaaagca ttttgccaag aagatgcaaa 1620
gatgtatttt tggagatggc taagggtacg ttttatgctt atgggatcaa cgatgaattg 1680
acttctctc agcaatccaa ggaagatatg aaatcctttg tcttttga 1728

5 <210> 3
<211> 22
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Cebador directo

10 <220>
<221> misc_feature
<222> (6) .. (6)
<223> n es a, c, g, o t

15 <220>
<221> misc_feature
<222> (15) .. (15)
<223> n es a, c, g, o t

<220>
 <221> misc_feature
 <222> (18) .. (18)
 <223> n es a, c, g, o t
 5 <400> 3
     gayrtngayg ayacngcnat gg   22

 <210> 4
 <211> 24
 <212> ADN
 10 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador inverso

 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (6) .. (6)
 <223> n es a, c, g, o t
 15

 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (9) .. (9)
 <223> n es a, c, g, o t
 20

 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (15) .. (15)
 <223> n es a, c, g, o t
 25 <400> 4
     gtyttncna kccanacrtc ryyt   24

 <210> 5
 <211> 354
 <212> ADN
 30 <213> *Salvia sclarea*

 <400> 5

 gcgtaggct tctcaaatg cacggatcg acgtogatcc aatgtacta aacatttca   60
 agcaacaaga tggtaaattt tectgctaca ttggtaaatc ggtagagtct gcatctccaa   120
 tgtacaatct ttatagggct gctcaactaa gatttccagg agaagaagtt cttgaagaag   180
 ccactaaatt tgcctttaac ttcttgcaag aatgctagt caaagatcga cttcaagaaa   240
 gatgggtgat atccgaccac ttatttgatg agataaagct ggggttgaag atgccatggt   300
 acgccactct accccgagtc gaggctgcat attatctaga ccattatgct gggtt   354

 <210> 6
 <211> 29
 <212> ADN
 35 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador diseñado específicamente para FN23

ES 2 556 221 T3

<400> 6
gcacggatac gacgtcgatc caaatgtac 29

5 <210> 7
<211> 27
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Cebador diseñado específicamente para FN23

<400> 7
10 gggctgctca actaagattt ccaggag 27

<210> 8
<211> 29
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

15 <220>
<223> Cebador diseñado específicamente para FN23

<400> 8
gggtgatatc cgaccactta ttgatgag 29

20 <210> 9
<211> 36
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Secuencia adaptadora para prolongar los cebadores oligodT

25 <400> 9
aattcggatc ccgggatcct tttttttt ttttt 36

30 <210> 10
<211> 19
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Cebador

<400> 10
aattcggatc ccgggatcc 19

35 <210> 11
<211> 1271
<212> ADN
<213> *Salvia sclarea*

<400> 11

ES 2 556 221 T3

aagaagttct tgaagaagcc actaaatttg cctttaactt cttgcaagaa atgctagtca 60
aagatcgact tcaagaaaga tgggtgatat cggaccactt atttgatgag ataaagctgg 120
ggttgaagat gccatggtac gccactctac cccgagtcga ggctgcatat tatctagacc 180
attatgctgg ttctggatg gtatggattg gcaagagttt ctacaggatg ccagaaatca 240
gcaatgatac atacaaggag cttgcgatat tggatttcaa cagatgcaa acacaacatc 300
agttggagtg gatccatag caggaatggt acgacagatg cagccttagc gaattcggga 360
taagcaaaag agagttgctt cgtcttact ttctggccgc agcaaccata ttcgaaccgg 420
agagaactca agagaggctt ctgtgggcca aaaccagaat tctttctaag atgatcactt 480
catttgtcaa cattagtga acaacactat ctttggacta caatttcaat ggctcgtatg 540
aaataattag tagtgccaat gaagatcaag gactggctgg gactctgctg gcaaccttcc 600
atcaacttct agacggattc gatataata cctccatca actcaaact gtttggagcc 660
aatggttcat gaaagtgcag caaggagagg gaagcggcgg ggaagacgcg gtgctcctag 720
cgaacacgct caacatctgc gccggcctca acgaagacgt gttgtccaac aatgaatata 780
cggtctgtc caccctcaca aataaaatct gcaatcgct cgcctcaatt caagacaata 840
agattctcca agttgtggat gggagcataa aggataagga gctagaacag gatatgcagg 900
cgttggtgaa gttagtgctt caagaaaatg gcggcgccgt agacagaaac atcagacaca 960
cgtttttgtc ggtttccaag actttctact acgatgccta ccacgacgat gagacgaccg 1020
atcttcatat cttcaaagta ctctttcgac cggttgtatg aaaaatattt taagctcgtc 1080
tgcagtccac gtagataatt attttaaaat aaaggataaa ttaacgagaa acgacgccat 1140
tttaaaataa tatgttaaga atggacccta aataagagcg tcgaaacatg cattgggata 1200
taatttatta attgttacac catttcggaa taaaatgatg ttatttcttt ttcatatgta 1260
aaaaaaaaa a 1271

5 <210> 12
<211> 32
<212> ADN
<213> Secuencia artificial
<220>
<223> Cebador diseñado específicamente para FN23
<400> 12
catggcatct tcaaccccag ctttatctca tc 32

10 <210> 13
<211> 33
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

15 <220>
<223> Cebador diseñado específicamente para FN23

ES 2 556 221 T3

<400> 13
 ggggtcggat atcaccatc ttcttgaag tcg 33

<210> 14
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Cebador diseñado específicamente para FN23

<400> 14
 10 catggagat gcagactcga ccgattgacc 30

<210> 15
 <211> 1449
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

15 <400> 15

caaaattctc ttccattttt aagataatag taatattcta atttccctc caaaaactcg 60
 tgggaaattg aaaaatagaa aataaagatg acttctgtaa atttgagcag agcaccagca 120
 gcgattatcc ggcgcaggct gcagctacag ccggaatttc atgccgagtg ttcattggctg 180
 aaaagcagca gcaaacacgc gcccttgacc ttgagttgcc aaatccgtcc taagcaactc 240
 tcccaaatag ctgaattgag agtaacaagc ctggatgcgt cgcaagcgag tgaaaaagac 300
 atttcccttg ttcaaactcc gcataagggtt gaggttaatg aaaagatcga ggagtcaatc 360
 gagtacgtcc aaaatctggt gatgacgtcg ggcgacgggc gaataagcgt gtcaccctat 420
 gacacggcag tgatcgccct gatcaaggac ttgaaagggc gcgacgcccc gcagtttccg 480
 tcatgtctcg agtggatcgc gcaccaccaa ctggtgatg gctcatgggg cgacgaattc 540
 ttctgtatth atgatcggat tctaaataca ttggcatgtg tcgtagcctt gaaatcatgg 600
 aaccttcaact ctgatattat tgaaaaagga gtgacgtaca tcaaggagaa tgtgcataaa 660
 cttaaagggtg caaatgttga gcacaggaca gcggggttcg aacttgtggt tctactttt 720
 atgcaaatgg ccacagattt gggcatcaa gatctgccct atgatcatcc cctcatcaag 780
 gagattgctg acacaaaaca acaaagattg aaagagatac ccaaggattt ggtttaccaa 840
 atgccaacga atttactgta cagtttagaa gggttaggag atttggagtg ggaaaggcta 900
 ctgaaactgc agtcgggcaa tggctccttc ctacttcgc cgtcgtccac cgccgccgtc 960

ES 2 556 221 T3

ttgatgcata ccaaagatga aaaatgtttg aaatacatcg aaaacgccct caagaattgc	1020
gacggaggag caccacatac ttatccagtc gatatcttct caagactttg ggcaatcgat	1080
aggctacaac gcttaggaat ttctcgtttc ttccagcacg agatcaagta tttcttagat	1140
cacatcgaaa gcgtttggga ggagaccgga gttttcagtg gaagatatac gaaatttagc	1200
gatattgatg acacgtccat gggcgttagg cttctcaaaa tgcacggata cgacgtcgat	1260
ccaaatgtac taaaacattt caagcaaca gatggtaa at tttcctgcta cattgggtcaa	1320
teggtegagt ctgcatctcc aatgtacaat ctttataggg ctgctcaact aagatttcca	1380
ggagaagaag ttcttgaaga agccactaaa tttgccttta acttcttgca agaaatgcta	1440
gtcaaagat	1449

<210> 16
 <211> 2655
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 16

5

ES 2 556 221 T3

caaaattctc	ttccattttt	aagataatag	taatattcta	atthccctc	caaaaactcg	60
tgggaaattg	aaaaatagaa	aataaagatg	acttctgtaa	atthgagcag	agcaccagca	120
gcgattatcc	ggcgcaggct	gcagctacag	ccggaatttc	atgccgagtg	ttcatggctg	180
aaaagcagca	gcaaacacgc	gcccttgacc	ttgagttgcc	aatccgtcc	taagcaactc	240
tcccaaatag	ctgaattgag	agtaacaagc	ctggatgcgt	cgcaagcgag	tgaaaaagac	300
atthcccttg	ttcaaactcc	gcataagggt	gaggttaatg	aaaagatcga	ggagtcaatc	360
gagtaactcc	aaaatctggt	gatgacgtcg	ggcgacgggc	gaataagcgt	gtcaccctat	420
gacacggcag	tgatcgcctt	gatcaaggac	ttgaaagggc	gagcagcccc	gcagtttccg	480
tcattgtctg	agtggatcgc	gcaccaccaa	ctggctgatg	gctcatgggg	cgacgaattc	540
ttctgtattt	atgatcggat	tctaaataca	ttggcatgtg	tcgtagcctt	gaaatcatgg	600
aaccttact	ctgatattat	tgaaaaagga	gtgacgtaca	tcaaggagaa	tgtgcataaa	660
cttaaagggtg	caaatggtga	gcacaggaca	gcggggttcg	aacttgtggt	tcctactttt	720
atgcaaatgg	ccacagattt	gggcatccaa	gatctgcctt	atgatcatcc	cctcatcaag	780
gagattgctg	acacaaaaca	acaaagattg	aaagagatac	ccaaggattt	ggtttaccaa	840
atgccaacga	atthactgta	cagtttagaa	gggttaggag	atthggagtg	ggaaaggcta	900
ctgaaactgc	agtcgggcaa	tggtccttc	ctcacttcgc	cgtcgtccac	cgccgccgtc	960
ttgatgcata	ccaaagatga	aaaatgtttg	aaatacatcg	aaaacgccct	caagaattgc	1020
gacggaggag	caccacatac	ttatccagtc	gatattctct	caagactttg	ggcaatcgat	1080

ES 2 556 221 T3

aggetacaac gcctaggaat ttctcgtttc ttccagcagc agatcaagta tttcttagat 1140
 cacatcgaaa gcgtttgga ggagaccgga gttttcagtg gaagatatac gaaatttagc 1200
 gatattgatg acacgtccat gggcgttagg cttctcaaaa tgcacggata cgacgtcgat 1260
 ccaaatgtac taaaacattt caagcaacaa gatggtaaata tttcctgcta cattgggtcaa 1320
 tcggtcgagt ctgcatctcc aatgtacaat ctttataggg ctgctcaact aagatttcca 1380
 ggagaagaag ttcttgaaga agccactaaa tttgccttta acttcttgca agaaatgcta 1440
 gtcaaagatc gacttcaaga aagatgggtg atatccgacc acttatttga tgagataaag 1500
 ctggggttga agatgccatg gtacgccact ctaccccgag tcgaggctgc atattatcta 1560
 gaccattatg ctggttctgg tgatgatgg attggcaaga gtttctacag gatgccagaa 1620
 atcagcaatg atacatacaa ggagcttgcg atattggatt tcaacagatg ccaaacacaa 1680
 catcagttgg agtggatcca tatgcaggaa tggtaacgaca gatgcagcct tagcgaattc 1740
 gggataagca aaagagagtt gcttcgctct tactttctgg ccgacgcaac catattcgaa 1800
 ccggagagaa ctcaagagag gcttctgtgg gccaaaacca gaattctttc taagatgatc 1860
 acttcatttg tcaacattag tggacaaca ctatctttgg actacaattt caatggcttc 1920
 gatgaataa ttagtagtgc caatgaagat caaggactgg ctgggactct gctggcaacc 1980
 ttccatcaac ttctagacgg attcgatata tacactctcc atcaactcaa acatgtttgg 2040
 agccaatggt tcatgaaagt gcagcaagga gaggggaagcg gcggggaaga cgcggtgctc 2100
 ctacggaaca cgctcaacat ctgcgcgggc ctcaacgaag acgtggtgtc caacaatgaa 2160
 tacacggctc tgtccaccct cacaataaaa atctgcaatc gcctcgccca aattcaagac 2220
 aataagattc tccaagttgt ggatgggagc ataaaggata aggagctaga acaggatag 2280
 caggcgttgg tgaagttagt gcttcaagaa aatggcggcg ccgtagacag aaacatcaga 2340
 cacacgtttt tgtcggtttc caagactttc tactacgatg cctaccacga cgatgagacg 2400
 accgatcttc atatcttcaa agtactcttt cgaccggttg tatgaaaaat attttaagct 2460
 cgtctgcagt ccacgtagat aattatttta aaataaagga taaattaacg agaaacgacg 2520
 ccattttaa ataatatggt aagaatggac cctaaataag agcgtcgaaa catgcattgg 2580
 gatataattt attaattggt acaccatttc ggaataaaat gatgttattt ctttttcata 2640
 tgtaaaaaaa aaaaa 2655

<210> 17
 <211> 785
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*

5

<400> 17

ES 2 556 221 T3

Met Thr Ser Val Asn Leu Ser Arg Ala Pro Ala Ala Ile Ile Arg Arg
 1 5 10 15

Arg Leu Gln Leu Gln Pro Glu Phe His Ala Glu Cys Ser Trp Leu Lys
 20 25 30

Ser Ser Ser Lys His Ala Pro Leu Thr Leu Ser Cys Gln Ile Arg Pro
 35 40 45

Lys Gln Leu Ser Gln Ile Ala Glu Leu Arg Val Thr Ser Leu Asp Ala
 50 55 60

Ser Gln Ala Ser Glu Lys Asp Ile Ser Leu Val Gln Thr Pro His Lys
 65 70 75 80

Val Glu Val Asn Glu Lys Ile Glu Glu Ser Ile Glu Tyr Val Gln Asn
 85 90 95

Leu Leu Met Thr Ser Gly Asp Gly Arg Ile Ser Val Ser Pro Tyr Asp
 100 105 110

Thr Ala Val Ile Ala Leu Ile Lys Asp Leu Lys Gly Arg Asp Ala Pro
 115 120 125

Gln Phe Pro Ser Cys Leu Glu Trp Ile Ala His His Gln Leu Ala Asp
 130 135 140

Gly Ser Trp Gly Asp Glu Phe Phe Cys Ile Tyr Asp Arg Ile Leu Asn
 145 150 155 160

Thr Leu Ala Cys Val Val Ala Leu Lys Ser Trp Asn Leu His Ser Asp
 165 170 175

Ile Ile Glu Lys Gly Val Thr Tyr Ile Lys Glu Asn Val His Lys Leu
 180 185 190

Lys Gly Ala Asn Val Glu His Arg Thr Ala Gly Phe Glu Leu Val Val
 195 200 205

Pro Thr Phe Met Gln Met Ala Thr Asp Leu Gly Ile Gln Asp Leu Pro
 210 215 220

Tyr Asp His Pro Leu Ile Lys Glu Ile Ala Asp Thr Lys Gln Gln Arg
 225 230 235 240

ES 2 556 221 T3

Leu Lys Glu Ile Pro Lys Asp Leu Val Tyr Gln Met Pro Thr Asn Leu
 245 250 255
 Leu Tyr Ser Leu Glu Gly Leu Gly Asp Leu Glu Trp Glu Arg Leu Leu
 260 265 270
 Lys Leu Gln Ser Gly Asn Gly Ser Phe Leu Thr Ser Pro Ser Ser Thr
 275 280 285
 Ala Ala Val Leu Met His Thr Lys Asp Glu Lys Cys Leu Lys Tyr Ile
 290 295 300
 Glu Asn Ala Leu Lys Asn Cys Asp Gly Gly Ala Pro His Thr Tyr Pro
 305 310 315 320
 Val Asp Ile Phe Ser Arg Leu Trp Ala Ile Asp Arg Leu Gln Arg Leu
 325 330 335
 Gly Ile Ser Arg Phe Phe Gln His Glu Ile Lys Tyr Phe Leu Asp His
 340 345 350
 Ile Glu Ser Val Trp Glu Glu Thr Gly Val Phe Ser Gly Arg Tyr Thr
 355 360 365
 Lys Phe Ser Asp Ile Asp Asp Thr Ser Met Gly Val Arg Leu Leu Lys
 370 375 380
 Met His Gly Tyr Asp Val Asp Pro Asn Val Leu Lys His Phe Lys Gln
 385 390 395 400
 Gln Asp Gly Lys Phe Ser Cys Tyr Ile Gly Gln Ser Val Glu Ser Ala
 405 410 415
 Ser Pro Met Tyr Asn Leu Tyr Arg Ala Ala Gln Leu Arg Phe Pro Gly
 420 425 430
 Glu Glu Val Leu Glu Glu Ala Thr Lys Phe Ala Phe Asn Phe Leu Gln
 435 440 445
 Glu Met Leu Val Lys Asp Arg Leu Gln Glu Arg Trp Val Ile Ser Asp
 450 455 460
 His Leu Phe Asp Glu Ile Lys Leu Gly Leu Lys Met Pro Trp Tyr Ala
 465 470 475 480
 Thr Leu Pro Arg Val Glu Ala Ala Tyr Tyr Leu Asp His Tyr Ala Gly

ES 2 556 221 T3

			485						490						495
Ser	Gly	Asp	Val	Trp	Ile	Gly	Lys	Ser	Phe	Tyr	Arg	Met	Pro	Glu	Ile
			500					505					510		
Ser	Asn	Asp	Thr	Tyr	Lys	Glu	Leu	Ala	Ile	Leu	Asp	Phe	Asn	Arg	Cys
		515					520					525			
Gln	Thr	Gln	His	Gln	Leu	Glu	Trp	Ile	His	Met	Gln	Glu	Trp	Tyr	Asp
	530					535					540				
Arg	Cys	Ser	Leu	Ser	Glu	Phe	Gly	Ile	Ser	Lys	Arg	Glu	Leu	Leu	Arg
545					550					555					560
Ser	Tyr	Phe	Leu	Ala	Ala	Ala	Thr	Ile	Phe	Glu	Pro	Glu	Arg	Thr	Gln
				565					570					575	
Glu	Arg	Leu	Leu	Trp	Ala	Lys	Thr	Arg	Ile	Leu	Ser	Lys	Met	Ile	Thr
			580					585					590		
Ser	Phe	Val	Asn	Ile	Ser	Gly	Thr	Thr	Leu	Ser	Leu	Asp	Tyr	Asn	Phe
		595					600					605			
Asn	Gly	Leu	Asp	Glu	Ile	Ile	Ser	Ser	Ala	Asn	Glu	Asp	Gln	Gly	Leu
	610					615					620				
Ala	Gly	Thr	Leu	Leu	Ala	Thr	Phe	His	Gln	Leu	Leu	Asp	Gly	Phe	Asp
625					630					635					640
Ile	Tyr	Thr	Leu	His	Gln	Leu	Lys	His	Val	Trp	Ser	Gln	Trp	Phe	Met
				645					650					655	
Lys	Val	Gln	Gln	Gly	Glu	Gly	Ser	Gly	Gly	Glu	Asp	Ala	Val	Leu	Leu
			660					665					670		
Ala	Asn	Thr	Leu	Asn	Ile	Cys	Ala	Gly	Leu	Asn	Glu	Asp	Val	Leu	Ser
		675					680					685			
Asn	Asn	Glu	Tyr	Thr	Ala	Leu	Ser	Thr	Leu	Thr	Asn	Lys	Ile	Cys	Asn
	690					695					700				
Arg	Leu	Ala	Gln	Ile	Gln	Asp	Asn	Lys	Ile	Leu	Gln	Val	Val	Asp	Gly
705					710					715					720
Ser	Ile	Lys	Asp	Lys	Glu	Leu	Glu	Gln	Asp	Met	Gln	Ala	Leu	Val	Lys
				725					730					735	

ES 2 556 221 T3

Leu Val Leu Gln Glu Asn Gly Gly Ala Val Asp Arg Asn Ile Arg His
 740 745 750

Thr Phe Leu Ser Val Ser Lys Thr Phe Tyr Tyr Asp Ala Tyr His Asp
 755 760 765

Asp Glu Thr Thr Asp Leu His Ile Phe Lys Val Leu Phe Arg Pro Val
 770 775 780

Val
 785

5 <210> 18
 <211> 38
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 18
 tactgacata tgacttctgt aaatttgagc agagcacc 38

10 <210> 19
 <211> 36
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 15 <223> Cebador
 <400> 19
 ttggtacctc atacaaccgg tcgaaagagt actttg 36

20 <210> 20
 <211> 31
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 20
 gttggagtgg atccacatgc aggaatggta c 31

25 <210> 21
 <211> 31
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 30 <220>
 <223> Cebador
 <400> 21
 gtaccattcc tgcatctgga tccactccaa c 31

ES 2 556 221 T3

<210> 22
 <211> 2358
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

5 <400> 22

```

atgacttctg taaatttgag cagagcacca gcagcgatta cccggcgcag gctgcagcta      60
cagccggaat ttcattgccg gtgttcatgg ctgaaaagca gcagcaaaca cgcgcccttg      120
accttgagtt gccaaatccg tccaaagcaa ctctcccaaa tagctgaatt gagagtaaca      180
agcctggatg cgtcgcaagc gagtgaaaaa gacatttccc ttgttcaaac tccgcataag      240
gttgaggtta atgaaaagat cgaggagtca atcgagtacg tccaaaatct gttgatgacg      300
tcgggcgacg ggcgaataag cgtgtcacc c tatgacacgg cagtgatcgc cctgatcaag      360
gacttgaaag ggcgcgacgc cccgcagttt ccgtcatgtc tcgagtggat cgcgcaccac      420
caactggctg atggctcatg gggcgacgaa ttcttctgta tttatgatcg gattctaaat      480
acattggcat gtgtcgtagc cttgaaatca tggaaccttc actctgatat tattgaaaaa      540
ggagtgcagt acatcaagga gaatgtgcat aaacttaaag gtgcaaagt tgcagcacagg      600
acagcggggg tcgaacttgt ggttctact tttatgcaa tggccacaga tttgggcatc      660
caagatctgc cctatgatca tcccctcacc aaggagattg ctgacacaaa acaacaaaga      720
ttgaaagaga tacccaagga tttggtttac caaatgccaa cgaatttact gtacagttta      780
gaagggttag gagatttggg gtgggaaagg ctactgaaac tgcagtcggg caatggctcc      840
ttcctcactt cgcctcgtc caccgcgcgc gtcttgatgc ataccaaaga tgaaaaatgt      900
ttgaaataca tcgaaaacgc cctcaagaat tgcgacggag gagcaccaca tacttatcca      960
gtcgatatct tctcaagact ttgggcaatc gataggctac aacgcctagg aatttctcgt      1020
ttcttccagc acgagatcaa gtatttctta gatcacatcg aaagcgtttg ggaggagacc      1080
ggagttttca gtggaagata tacgaaattt agcgatattg atgacacgtc catgggcggt      1140
aggctttctc aatgcaacgg atacgacgtc gatccaaatg tactaaaaca tttcaagcaa      1200
caagatggta aattttctc ctacattggg caatcggtcg agtctgcacc tccaatgtac      1260
aatctttata gggctgctca actaagattt ccaggagaag aagtcttga agaagccact      1320
aaatttgctt ttaacttctt gcaagaaatg ctagtcaaag atcgacttca agaaagatgg      1380
gtgatatccg accacttatt tgatgagata aagctggggg tgaagatgcc atggtacgcc      1440
actctacccc gagtcgaggc tgcataattat ctagaccatt atgctgggtc tggatgatga      1500
    
```

ES 2 556 221 T3

tggattggca agagtttcta caggatgcca gaaatcagca atgatacata caaggagctt 1560
 gcgatattgg atttcaacag atgccaaaca caacatcagt tggagtggat ccacatgcag 1620
 gaatggtacg acagatgcag cottagcgaa ttcgggataa gcaaaagaga gttgcttcgc 1680
 tcttactttc tggccgcagc aaccatattc gaaccggaga gaactcaaga gaggcttctg 1740
 tgggccaaaa ccagaattct ttctaagatg atcacttcat ttgtcaacat tagtggaaaca 1800
 aactatctt tggactacaa tttcaatggc ctcgatgaaa taattagtag tgccaatgaa 1860
 gatcaaggac tggctgggac tctgctggca accttccatc aacttctaga cggattcgat 1920
 atatacactc tccatcaact caaacatggt tggagccaat ggttcatgaa agtgcagcaa 1980
 ggagagggaa gcggcgggga agacgcggtg ctctagcga acacgctcaa catctgcgcc 2040
 ggctcaacg aagacgtggt gtccaacaat gaatacacgg ctctgtccac cctcacaat 2100
 aaaatctgca atcgctcgc ccaaattcaa gacaataaga ttctccaagt tgtggatggg 2160
 agcataaagg ataaggagct agaacaggat atgcaggcgt tggatgaagt agtgcctcaa 2220
 gaaaatggcg gcgccgtaga cagaaacatc agacacacgt tttgtcggg ttccaagact 2280
 ttctactacg atgcctacca cgacgatgag acgaccgatc ttcatatctt caaagtactc 2340
 tttcgaccgg ttgtatga 2358

<210> 23
 <211> 2355
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

5

<400> 23

atgacttctg taaatttgag cagagcacca gcagcgatta tccggcgcag gctgcagcta 60
 cagccggaat ttcattgccga gtgttcattg ctgaaaagca gcagcaaca cgcgcccttc 120
 accttgagtt gccaaatccg tccaaagcaa ctctcccaaa tagctgaatt gagagtaaca 180
 agcctggatg cgtcgcaagc gaggtaaaaa gacatttccc ttgttcaaac tccgcataag 240
 gttgaggtta atgaaaagat cgaggagtca atcgagtacg tccaaaatct gttgatgacg 300
 tcgggcgacg ggcaataag cgtgtcacc cctgtacacgg cagtgatcgc cctgatcaag 360
 gacttgaaag ggcgcgacgc cccgcagttt ccgtcatgtc tcgagtggat cgcgcaccac 420
 caactggctg atggtcatg gggcgacgaa ttcttctgta tttatgatcg gattctaaat 480
 acattggcat gtgtcgtagc cttgaaatca tggaaacctc aatctgatat tattgaaaa 540
 ggtgtgacgt acatcaagga gaatgtgat aaacttaag gtgcaaatgt tgagcacagg 600
 acagcggggt tcgaacttgt ggttcctact tttatgcaaa tggccacaga tttgggcatc 660
 caaggtctgc cctatgatca tcccctcatc aaggagattg ctgacacaaa acaacaaga 720

ES 2 556 221 T3

ttgaaagaga tacccaagga tttggtttac caaatgccaa cgaattfact gtacagttta 780
 gaagggtag gagatttga gtgggaaagg ttactgaaac tgcagtcggg caatggctcc 840
 ttctcactt cgccgctcgc caccgcccgc gtcttgatgc ataccaaaga tgaaaaatgt 900
 ttgaaataca tcgaaaacgc cctcaagaat tgcgacggag gagcaccaca tacttatcca 960
 gtcgatatct tctcaagact ttgggcaatc gataggctac aacgcctagg aatttctcgt 1020
 ttcttccagc acgagatcaa gtatttctta gatcacatcg aaagcgtttg ggaggagacc 1080
 ggagttttca gtggaagata tacgaaattt agcgatattg atgacacgtc catgggcgtt 1140
 aggctttctca aatgcaagg atacgacgtc gatccaaatg tactaaaaca tttcaagcaa 1200
 caagatggta aattttctcgt ctacattggc caatcggtcg agtctgcatc tccaatgtac 1260
 aatctttata gggctgctca actaagattt ccaggagaag aagttcttga agaagccact 1320
 aaatttgctt ttaacttctt gcaagaaatg ctagtcaaag atcgacttca agaaagatgg 1380
 gtgatatccg accacttatt tgatgagata aagctggggg tgaagatgcc atggtacgcc 1440
 actctacccc gagtcgaggc tgcattatct ctagaccatt atgctgggtc tggatgatga 1500
 tggattggca agagtttcta caggatgcca gaaatcagca atgatacata caaggagctt 1560
 gcgatattgg atttcaacag atgccaaca caacatcagt tggagtggat ccagatgcag 1620
 gaatggtacg acagatgcag ccttagcgaa ttcgggataa gcaaaagaga gttgcttcgc 1680
 tcttactttc tggccgcagc aaccatattc gaaccggaga gaactcaaga gaggttctg 1740
 tgggcaaaa ccagaattct ttctaagatg atcacttcat ttgtcaacat tagtgaaca 1800
 acactatctt tggactacaa tttcaatggc ctcgatgaaa taattagtgc caatgaagat 1860
 caaggactgg ctgggactct gctggcaacc ttocatcaac ttctagacgg attcgatata 1920
 tacactctcc atcaactcaa acatgtttgg agccaatggt tcatgaaagt gcagcaagga 1980
 gaggaagcg gcggggaaga cgcggtgctc ctagcgaaca cgctcaacat ctgcgccggc 2040
 ctcaacgaag acgtgttgtc caacaatgaa tacacggctc tgtccaccct cacaataaa 2100
 atctgcaatc gcctcgccca aattcaagac aataagattc tccaagttgt ggatgggagc 2160
 ataaagata aggagctaga acaggatatg caggcgttgg tgaagttagt gcttcaagaa 2220
 aatggcggcg ccgtagacag aaacatcaga cacacgtttt tgcggtttc caagactttc 2280
 tactacgatg cctaccacga cgatgagacg accgatcttc atatcttcaa agtactcttt 2340
 cgaccggttg tatga 2355

<210> 24
 <211> 785
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 24

5

ES 2 556 221 T3

Met Thr Ser Val Asn Leu Ser Arg Ala Pro Ala Ala Ile Thr Arg Arg
1 5 10 15

Arg Leu Gln Leu Gln Pro Glu Phe His Ala Glu Cys Ser Trp Leu Lys
20 25 30

Ser Ser Ser Lys His Ala Pro Leu Thr Leu Ser Cys Gln Ile Arg Pro
35 40 45

Lys Gln Leu Ser Gln Ile Ala Glu Leu Arg Val Thr Ser Leu Asp Ala
50 55 60

Ser Gln Ala Ser Glu Lys Asp Ile Ser Leu Val Gln Thr Pro His Lys
65 70 75 80

Val Glu Val Asn Glu Lys Ile Glu Glu Ser Ile Glu Tyr Val Gln Asn
85 90 95

Leu Leu Met Thr Ser Gly Asp Gly Arg Ile Ser Val Ser Pro Tyr Asp
100 105 110

Thr Ala Val Ile Ala Leu Ile Lys Asp Leu Lys Gly Arg Asp Ala Pro
115 120 125

Gln Phe Pro Ser Cys Leu Glu Trp Ile Ala His His Gln Leu Ala Asp
130 135 140

Gly Ser Trp Gly Asp Glu Phe Phe Cys Ile Tyr Asp Arg Ile Leu Asn
145 150 155 160

Thr Leu Ala Cys Val Val Ala Leu Lys Ser Trp Asn Leu His Ser Asp
165 170 175

Ile Ile Glu Lys Gly Val Thr Tyr Ile Lys Glu Asn Val His Lys Leu
180 185 190

Lys Gly Ala Asn Val Glu His Arg Thr Ala Gly Phe Glu Leu Val Val
195 200 205

Pro Thr Phe Met Gln Met Ala Thr Asp Leu Gly Ile Gln Asp Leu Pro
210 215 220

Tyr Asp His Pro Leu Ile Lys Glu Ile Ala Asp Thr Lys Gln Gln Arg
225 230 235 240

ES 2 556 221 T3

Leu Lys Glu Ile Pro Lys Asp Leu Val Tyr Gln Met Pro Thr Asn Leu
 245 250 255

Leu Tyr Ser Leu Glu Gly Leu Gly Asp Leu Glu Trp Glu Arg Leu Leu
 260 265 270

Lys Leu Gln Ser Gly Asn Gly Ser Phe Leu Thr Ser Pro Ser Ser Thr
 275 280 285

Ala Ala Val Leu Met His Thr Lys Asp Glu Lys Cys Leu Lys Tyr Ile
 290 295 300

Glu Asn Ala Leu Lys Asn Cys Asp Gly Gly Ala Pro His Thr Tyr Pro
 305 310 315 320

Val Asp Ile Phe Ser Arg Leu Trp Ala Ile Asp Arg Leu Gln Arg Leu
 325 330 335

Gly Ile Ser Arg Phe Phe Gln His Glu Ile Lys Tyr Phe Leu Asp His
 340 345 350

Ile Glu Ser Val Trp Glu Glu Thr Gly Val Phe Ser Gly Arg Tyr Thr
 355 360 365

Lys Phe Ser Asp Ile Asp Asp Thr Ser Met Gly Val Arg Leu Leu Lys
 370 375 380

Met His Gly Tyr Asp Val Asp Pro Asn Val Leu Lys His Phe Lys Gln
 385 390 395 400

Gln Asp Gly Lys Phe Ser Cys Tyr Ile Gly Gln Ser Val Glu Ser Ala
 405 410 415

Ser Pro Met Tyr Asn Leu Tyr Arg Ala Ala Gln Leu Arg Phe Pro Gly
 420 425 430

Glu Glu Val Leu Glu Glu Ala Thr Lys Phe Ala Phe Asn Phe Leu Gln
 435 440 445

Glu Met Leu Val Lys Asp Arg Leu Gln Glu Arg Trp Val Ile Ser Asp
 450 455 460

His Leu Phe Asp Glu Ile Lys Leu Gly Leu Lys Met Pro Trp Tyr Ala
 465 470 475 480

ES 2 556 221 T3

Thr Leu Pro Arg Val Glu Ala Ala Tyr Tyr Leu Asp His Tyr Ala Gly
 485 490 495

Ser Gly Asp Val Trp Ile Gly Lys Ser Phe Tyr Arg Met Pro Glu Ile
 500 505 510

Ser Asn Asp Thr Tyr Lys Glu Leu Ala Ile Leu Asp Phe Asn Arg Cys
 515 520 525

Gln Thr Gln His Gln Leu Glu Trp Ile His Met Gln Glu Trp Tyr Asp
 530 535 540

Arg Cys Ser Leu Ser Glu Phe Gly Ile Ser Lys Arg Glu Leu Leu Arg
 545 550 555 560

Ser Tyr Phe Leu Ala Ala Ala Thr Ile Phe Glu Pro Glu Arg Thr Gln
 565 570 575

Glu Arg Leu Leu Trp Ala Lys Thr Arg Ile Leu Ser Lys Met Ile Thr
 580 585 590

Ser Phe Val Asn Ile Ser Gly Thr Thr Leu Ser Leu Asp Tyr Asn Phe
 595 600 605

Asn Gly Leu Asp Glu Ile Ile Ser Ser Ala Asn Glu Asp Gln Gly Leu
 610 615 620

Ala Gly Thr Leu Leu Ala Thr Phe His Gln Leu Leu Asp Gly Phe Asp
 625 630 635 640

Ile Tyr Thr Leu His Gln Leu Lys His Val Trp Ser Gln Trp Phe Met
 645 650 655

Lys Val Gln Gln Gly Glu Gly Ser Gly Gly Glu Asp Ala Val Leu Leu
 660 665 670

Ala Asn Thr Leu Asn Ile Cys Ala Gly Leu Asn Glu Asp Val Leu Ser
 675 680 685

Asn Asn Glu Tyr Thr Ala Leu Ser Thr Leu Thr Asn Lys Ile Cys Asn
 690 695 700

Arg Leu Ala Gln Ile Gln Asp Asn Lys Ile Leu Gln Val Val Asp Gly
 705 710 715 720

ES 2 556 221 T3

Ser Ile Lys Asp Lys Glu Leu Glu Gln Asp Met Gln Ala Leu Val Lys
725 730 735

Leu Val Leu Gln Glu Asn Gly Gly Ala Val Asp Arg Asn Ile Arg His
740 745 750

Thr Phe Leu Ser Val Ser Lys Thr Phe Tyr Tyr Asp Ala Tyr His Asp
755 760 765

Asp Glu Thr Thr Asp Leu His Ile Phe Lys Val Leu Phe Arg Pro Val
770 775 780

Val
785

- <210> 25
- <211> 784
- <212> PRT
- <213> *Salvia sclarea*
- <400> 25

5

ES 2 556 221 T3

Met Thr Ser Val Asn Leu Ser Arg Ala Pro Ala Ala Ile Ile Arg Arg
 1 5 10 15

Arg Leu Gln Leu Gln Pro Glu Phe His Ala Glu Cys Ser Trp Leu Lys
 20 25 30

Ser Ser Ser Lys His Ala Pro Phe Thr Leu Ser Cys Gln Ile Arg Pro
 35 40 45

Lys Gln Leu Ser Gln Ile Ala Glu Leu Arg Val Thr Ser Leu Asp Ala
 50 55 60

Ser Gln Ala Ser Glu Lys Asp Ile Ser Leu Val Gln Thr Pro His Lys
 65 70 75 80

Val Glu Val Asn Glu Lys Ile Glu Glu Ser Ile Glu Tyr Val Gln Asn
 85 90 95

Leu Leu Met Thr Ser Gly Asp Gly Arg Ile Ser Val Ser Pro Tyr Asp
 100 105 110

Thr Ala Val Ile Ala Leu Ile Lys Asp Leu Lys Gly Arg Asp Ala Pro
 115 120 125

Gln Phe Pro Ser Cys Leu Glu Trp Ile Ala His His Gln Leu Ala Asp
 130 135 140

ES 2 556 221 T3

Gly Ser Trp Gly Asp Glu Phe Phe Cys Ile Tyr Asp Arg Ile Leu Asn
 145 150 155 160

Thr Leu Ala Cys Val Val Ala Leu Lys Ser Trp Asn Leu Gln Ser Asp
 165 170 175

Ile Ile Glu Lys Gly Val Thr Tyr Ile Lys Glu Asn Val His Lys Leu
 180 185 190

Lys Gly Ala Asn Val Glu His Arg Thr Ala Gly Phe Glu Leu Val Val
 195 200 205

Pro Thr Phe Met Gln Met Ala Thr Asp Leu Gly Ile Gln Gly Leu Pro
 210 215 220

Tyr Asp His Pro Leu Ile Lys Glu Ile Ala Asp Thr Lys Gln Gln Arg
 225 230 235 240

Leu Lys Glu Ile Pro Lys Asp Leu Val Tyr Gln Met Pro Thr Asn Leu
 245 250 255

Leu Tyr Ser Leu Glu Gly Leu Gly Asp Leu Glu Trp Glu Arg Leu Leu
 260 265 270

Lys Leu Gln Ser Gly Asn Gly Ser Phe Leu Thr Ser Pro Ser Ser Thr
 275 280 285

Ala Ala Val Leu Met His Thr Lys Asp Glu Lys Cys Leu Lys Tyr Ile
 290 295 300

Glu Asn Ala Leu Lys Asn Cys Asp Gly Gly Ala Pro His Thr Tyr Pro
 305 310 315 320

Val Asp Ile Phe Ser Arg Leu Trp Ala Ile Asp Arg Leu Gln Arg Leu
 325 330 335

Gly Ile Ser Arg Phe Phe Gln His Glu Ile Lys Tyr Phe Leu Asp His
 340 345 350

Ile Glu Ser Val Trp Glu Glu Thr Gly Val Phe Ser Gly Arg Tyr Thr
 355 360 365

Lys Phe Ser Asp Ile Asp Asp Thr Ser Met Gly Val Arg Leu Leu Lys
 370 375 380

ES 2 556 221 T3

Met His Gly Tyr Asp Val Asp Pro Asn Val Leu Lys His Phe Lys Gln
385 390 395 400

Gln Asp Gly Lys Phe Ser Cys Tyr Ile Gly Gln Ser Val Glu Ser Ala
405 410 415

Ser Pro Met Tyr Asn Leu Tyr Arg Ala Ala Gln Leu Arg Phe Pro Gly
420 425 430

Glu Glu Val Leu Glu Glu Ala Thr Lys Phe Ala Phe Asn Phe Leu Gln
435 440 445

Glu Met Leu Val Lys Asp Arg Leu Gln Glu Arg Trp Val Ile Ser Asp
450 455 460

His Leu Phe Asp Glu Ile Lys Leu Gly Leu Lys Met Pro Trp Tyr Ala
465 470 475 480

Thr Leu Pro Arg Val Glu Ala Ala Tyr Tyr Leu Asp His Tyr Ala Gly
485 490 495

Ser Gly Asp Val Trp Ile Gly Lys Ser Phe Tyr Arg Met Pro Glu Ile
500 505 510

Ser Asn Asp Thr Tyr Lys Glu Leu Ala Ile Leu Asp Phe Asn Arg Cys
515 520 525

Gln Thr Gln His Gln Leu Glu Trp Ile Gln Met Gln Glu Trp Tyr Asp
530 535 540

Arg Cys Ser Leu Ser Glu Phe Gly Ile Ser Lys Arg Glu Leu Leu Arg
545 550 555 560

Ser Tyr Phe Leu Ala Ala Ala Thr Ile Phe Glu Pro Glu Arg Thr Gln
565 570 575

Glu Arg Leu Leu Trp Ala Lys Thr Arg Ile Leu Ser Lys Met Ile Thr
580 585 590

Ser Phe Val Asn Ile Ser Gly Thr Thr Leu Ser Leu Asp Tyr Asn Phe
595 600 605

Asn Gly Leu Asp Glu Ile Ile Ser Ala Asn Glu Asp Gln Gly Leu Ala
610 615 620

ES 2 556 221 T3

Gly Thr Leu Leu Ala Thr Phe His Gln Leu Leu Asp Gly Phe Asp Ile
625 630 635 640

Tyr Thr Leu His Gln Leu Lys His Val Trp Ser Gln Trp Phe Met Lys
645 650 655

Val Gln Gln Gly Glu Gly Ser Gly Gly Glu Asp Ala Val Leu Leu Ala
660 665 670

Asn Thr Leu Asn Ile Cys Ala Gly Leu Asn Glu Asp Val Leu Ser Asn
675 680 685

Asn Glu Tyr Thr Ala Leu Ser Thr Leu Thr Asn Lys Ile Cys Asn Arg
690 695 700

Leu Ala Gln Ile Gln Asp Asn Lys Ile Leu Gln Val Val Asp Gly Ser
705 710 715 720

Ile Lys Asp Lys Glu Leu Glu Gln Asp Met Gln Ala Leu Val Lys Leu
725 730 735

Val Leu Gln Glu Asn Gly Gly Ala Val Asp Arg Asn Ile Arg His Thr
740 745 750

Phe Leu Ser Val Ser Lys Thr Phe Tyr Tyr Asp Ala Tyr His Asp Asp
755 760 765

Glu Thr Thr Asp Leu His Ile Phe Lys Val Leu Phe Arg Pro Val Val
770 775 780

5 <210> 26
<211> 20
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Cebador

10 <220>
<221> misc_feature
<222> (9) .. (9)
<223> n es a, c, g, o t

15 <220>
<221> misc_feature
<222> (12) .. (12)
<223> n es a, c, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (15) .. (15)
<223> n es a, c, g, o t

<400> 26
 tatgatacng cngtnatdgc 20
 <210> 27
 <211> 20
 5 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 27
 10 tatgacacgg cagtgatogc 20
 <210> 28
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 15 <220>
 <223> Cebador
 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (18) .. (18)
 20 <223> n es a, c, g, o t
 <400> 28
 tatgacacgg cakkgrtngc 20
 <210> 29
 <211> 23
 25 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (15) .. (15)
 30 <223> n es a, c, g, o t
 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (18) .. (18)
 35 <223> n es a, c, g, o t
 <400> 29
 caactggctg atggntcntg ggg 23
 <210> 30
 <211> 23
 40 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 45 <400> 30
 caactggctg atggctcatg ggg 23
 <210> 31

ES 2 556 221 T3

<211> 26
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 5 <223> Cebador
 <400> 31
 gatcctccaa crcrwarar rtrtc 26
 <210> 32
 <211> 25
 10 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 32
 15 gatcctccac gtcgwagaag tcgtc 25
 <210> 33
 <211> 81
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 20 <400> 33
 ctgatgtttc tgtctacggc gccgccattt tcttgaagca ctaacttcac caacgcctgc 60
 atatcctggt ctagtctcctt a 81
 <210> 34
 <211> 73
 <212> ADN
 25 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 34
 attcctgcat atggatccac tccaactgat gttgtgtttg gcatctgttg aaatccaata 60
 tcgcaagctc ctt 73
 <210> 35
 <211> 52
 <212> ADN
 30 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 35
 tattattgaa aaaggagtga cgtacatcaa ggagaatgtg cataaactta aa 52
 <210> 36
 <211> 857
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 35 <400> 36

ES 2 556 221 T3

atgtcaccac aaacagagac taaagcaagt gttggattca aagcgggtgt taaagagtac 60
 aaattgactt attatactcc tgaatacгаа accaaagata ctgatatctt ggcagcattc 120
 cgagtaactc ctcaaccogg agttccgctt gaagaagcag gggccgagg agctgccгаа 180
 tcttctactg gtacatggac aactgtgtgg accgatggac ttaccagcct tgatcgttac 240
 aaagggcgat gctaccacat tgagccgctt cctggagaaa aagatcaata tatctgttat 300
 gtagcttacc ctttagacct ttttgaagaa ggttctgtta ctaacatggt tacttccatt 360
 gtaggaaatg tatttggatt caaagcccta cgtgctctac gtctggaaga tctgcgaatt 420
 cctgttgctt atgttaaaac tttccaaggc ccgcctcatg ggatccaagt tgagagagat 480
 aaattgaaca agtacggctg tctctgctg ggatgtacta ttaaacctaa attgggggta 540
 tctgctaaaa actatggtag agcggtttat gaatgtcttc gcggtggact tgattttacc 600
 aaagatgatg agaacgtгаа ctcccagcca tttatgcggt ggagagaccg cttcttattt 660
 tgtgccгаа caattataa agcacaggct gaaacagggt aatcaaagg gcattacttg 720
 aatgctactg cgggtacatg cgaagagatg atgaaaagag ctatatttgc tagagaattg 780
 ggagttccta tcgtaatgca cgactactta acaggaggat tcaccgcaa taccagtttg 840
 gctcattatt gccgaga 857

<210> 37
 <211> 540
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

5

<400> 37

aaagtatcca ctgctttaaа ttcaaaacttg atttctttcc atacctcaca agcggcagct 60
 agttcaggac tccatttgca agcttcacgg ataattgcat taccttcagc agcaagatca 120
 cgtccttcat tacgagcttt tacacacgct tctacagcta ctcggttagc tacagcacct 180
 ggtgcattac cccaaggggtg tcttaaagtt cctccaccga actgtagtac ggaatcgtct 240
 ccaaagatct cggtcagagc aggcataatgc caaacgtгаа taccctga agccacagga 300
 ataacaccgg gcagggagac ccaatcttga gtgaaataaa taccgagact tcggtctttt 360
 tcaataaaat catcacgag taaatcaaca aaacctaaag taatgtctct ctctccttca 420
 agtttaccta ctacgggtacc agagtgaata tgatctccac cggacagacg taacgcttta 480
 gctagtagac ggaagtgcac accgtgatcc ttctgtctat caataactgc atgcattgca 540

<210> 38
 <211> 60
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

10

ES 2 556 221 T3

<400> 38
 atgttgcctcgc cgcattgcc aaaacatctg tgcttgtaac aattatggat gatttttctg 60

5 <210> 39
 <211> 35
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 39
 ctctacctt ggctgcatt ctgctctta aaaaa 35

10 <210> 40
 <211> 35
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 40
 aaaaaaata tgatctaaaa aatggatcag tttaa 35

15 <210> 41
 <211> 72
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 41
 actactcatg caatggcatt taggcttttg cgagtгааag gatacgaagt ttcacagag 60
 gagttggcct ca 72

20 <210> 42
 <211> 35
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

25 <400> 42
 gcaactgatg atttgtgga tgttgggggc agctc 35

30 <210> 43
 <211> 35
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 43
 gccaaaaataa ttccttgcat gccttggaа ggaga 35

35 <210> 44
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 44

Ser Thr Leu Ala Cys Ile Leu Ala Leu Lys Lys
 1 5 10

ES 2 556 221 T3

<210> 45
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*

5 <400> 45

Lys Lys Tyr Asp Leu Lys Asn Gly Ser Val
 1 5 10

<210> 46
 <211> 24
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 46

10

Thr Thr His Ala Met Ala Phe Arg Leu Leu Arg Val Lys Gly Tyr Glu
 1 5 10 15

Val Ser Ser Glu Glu Leu Ala Ser
 20

<210> 47
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 47

15

Ala Thr Asp Asp Phe Val Asp Val Gly Gly Ser
 1 5 10

<210> 48
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 48

20

Leu Leu Pro Lys Pro Cys Lys Glu Leu Phe Trp
 1 5 10

<210> 49
 <211> 27
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

25

<220>
 <223> Cebador
 <400> 49

30

cttctacctt ggctgcatt ctgctc 27

<210> 50
 <211> 27
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

35

<220>
 <223> Cebador
 <400> 50
 gagcaagaat gcaggccaag gtagaag 27
 5 <210> 51
 <211> 31
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 10 <220>
 <223> Cebador
 <400> 51
 ctactcatgc aatggcattt aggctttgc g 31
 15 <210> 52
 <211> 33
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 52
 gtgaaaggat acgaagtffc atcagaggag ttg 33
 20 <210> 53
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 25 <400> 53
 gaggccaact cctctgatga aactcgtat cc 32
 30 <210> 54
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 54
 cactcgcaaa agcctaatag ccattgcatg 30
 35 <210> 55
 <211> 29
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 40 <220>
 <223> Cebador
 <400> 55
 ctgatgattt tgtggatgtt gggggcagc 29
 <210> 56

<211> 29
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 5 <223> Cebador

 <400> 56

 gctgccccca acatccacaa aatcatcag 29

 <210> 57
 <211> 33
 10 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador

 <400> 57

 15 ctcttccaa agccatgcaa ggaattatt tgg 33

 <210> 58
 <211> 33
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 20 <220>
 <223> Cebador

 <400> 58

 ccaaaataat tcctgcatg gcttgggaag gag 33

 <210> 59
 <211> 24
 25 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador

 30 <400> 59

 gcgtatctga ttctgcct tgc 24

 <210> 60
 <211> 28
 <212> ADN
 35 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador

 <400> 60

 gtttaattcc ataggggatt tcttcaag 28

 <210> 61
 <211> 24
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 45 <223> Cebador

<400> 61
 atgtcgcttc ctctctccac ttgc 24

5 <210> 62
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador

10 <400> 62
 cgaatgggtt tctctttat atagatac ag 32

15 <210> 63
 <211> 28
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 63

20 ttatatcctt gctcctgttt gttccttg 28

25 <210> 64
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 64

30 tcaaaagaca aaggattca tatcttcctt gg 32

35 <210> 65
 <211> 26
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 65

40 caccctaata tcaccogtac caaacg 26

45 <210> 66
 <211> 36
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 66

50 cctatagtgt caaaagacaa aggatttcat atcttc 36

<210> 67
 <211> 31
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 5 <220>
 <223> Cebador
 <400> 67
 gcttattgag aaagatggta gtccaagcaa g 31
 10 <210> 68
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 15 <400> 68
 gctctataaa gctcaataat catcggcagg tc 32
 20 <210> 69
 <211> 39
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 69
 ccacaacctg aatgtgttat ctagaatagt gttgatttc 39
 25 <210> 70
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 30 <223> Cebador
 <400> 70
 ggaagaattg atcgaccccc aaccttgaa gg 32
 35 <210> 71
 <211> 34
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 <220>
 <223> Cebador
 <400> 71
 40 ggcaatgta ctactcatgc aatggcattt aggc 34
 <210> 72
 <211> 34
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 45 <220>
 <223> Cebador

<400> 72
 gcctaaatgc cattgcatga gtagtaacat tgcc 34

 <210> 73
 <211> 28
 5 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador

 <400> 73
 10 ggtggtcaca ggaatcctt ggactgga 28

 <210> 74
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 15 <220>
 <223> Cebador

 <400> 74
 cctgctccca actcttggc cggag 25

 <210> 75
 <211> 28
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 20 <400> 75
 cgtaactcog acgttgaagg cgagcgac 28

 <210> 76
 <211> 23
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 25 <220>
 <223> Cebador
 30 <400> 76
 caccatgtcg ctgccttca acg 23

 <210> 77
 <211> 33
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 35 <220>
 <223> Cebador

 <400> 77
 40 caccatggcg aaaatgaaag agaatttcaa gag 33

 <210> 78
 <211> 24
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

ES 2 556 221 T3

<220>
 <223> Cebador

<400> 78

caccatgtog cttcctctct ccac 24

5 <210> 79
 <211> 27
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

10 <220>
 <223> Cebador

<400> 79

caccatggaa actgggcttc aaactgc 27

15 <210> 80
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Cebador

<400> 80

20 ttatatcctt gctcctgttt gttccttgag 30

<210> 81
 <211> 547
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

25 <400> 81

agcggccgct gaattctaga atttggatgt ggaatagaat tgacgaatgg cgtgcaagcg 60

cgcctctctc ctctctcctc tctctagaaa atatgattgt gcagttgagt tggcaaaagc 120

gtatctgatt cctgcccttt gctaactttc ccaaattttg tcccgtttaa ttccataggg 180

gatttcttca aggccgccat gtcgcttctt ctctccaact gcaatggatc acattttcgg 240

agataccgct tgtctcctgc ttcagcagct tctatggaaa ctgggcttca aactgctact 300

tcagcaaaaa tcgcctctat gccagcgtgc tttgaggaga cgagagggag gatagcaaag 360

ttgtttcata aggatgaact ttctgtgtcg acatatgata cagcatgggt tgccatggtc 420

ccttctccaa cttcgttaga ggaaccttgc ttccccgatt gtctaaactg gttgctogag 480

aaccagtgcc atgatggttc gtgggcccgt ccccaccatc actctttgct aatgaaagat 540

gtccttt 547

<210> 82
 <211> 1473
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

30 <400> 82

ES 2 556 221 T3

ctccatattg taaccaagag gctgttagcc agcaaacaaa tgacctgccg atgattattg 60
 agctttatag agcagcaaat gagagaatat atgaagaaga gaggagtctt gaaaaaattc 120
 ttgcttgac taccatcttt ctcaataagc aagtgcaaga taactcaatt cccgacaaaa 180
 aactgcacaa actggtggaa ttctacttga ggaattacaa aggcataacc ataagattgg 240
 gagctagacg aaacctcgag ctatatgaca tgacctacta tcaagctctg aaatctacaa 300
 acaggttctc taatttatgc aacgaagatt ttctagtttt cgcaaagcaa gatttcgata 360
 tacatgaagc ccagaaccag aaaggacttc aacaactgca aagggtggtat gcagattgta 420
 ggttgacac cttaaacttt ggaagagatg tagttattat tgctaattat ttggcttcat 480
 taattattgg tgatcatgcg tttgactatg ttcgtctcgc atttgccaaa acatctgtgc 540

 ttgtaacaat tatggatgat tttttcgact gtcattggctc tagtcaagag tgtgacaaga 600
 tcattgaatt agtaaaagaa tgggaaggaga atccggatgc agagtacgga tctgaggagc 660
 ttgagatcct ttttatggcg ttgtacaata cagtaaatga gttggcggag agggctcgtg 720
 ttgaacaggg gcgtagtgtc aaagagtttc tagtcaaact gtgggttgaa atactctcag 780
 ctccaagat agaattagat acatggagca atggcacgca gcaaagcttc gatgaataca 840
 tttcttcgtc gtggttgcg aacggtccc ggctgacag tctcctgacg atgcaattcg 900
 tcggagtaaa attgtccgat gaaatgctta tgagtgaaga gtgcaactgat ttggctagcc 960
 atgtctgtat ggtcggccgg ctgctcaacg acgtgtgcag ttctgagagg gagcgcgagg 1020
 aaaatattgc agaaaaagt tatagcattc tactagcaac tgagaaaagat ggaagaaaag 1080
 ttagtgaaga tgaagccatt gcagagatca atgaaatggt tgaatatcac tggagaaaag 1140
 tgttgacagat tgtgtataaa aaagaaagca ttttgccaag aagatgcaaa gatgtatttt 1200
 tggagatggc taagggtacg ttttatgctt atgggatcaa cgatgaattg acttctcctc 1260
 agcaatccaa ggaagatatg aaatcctttg tcttttgaca ctataggctc gtttggtagc 1320
 ggtgatatta ggggtgtgaa tacaattatg aactgtaat atttttattt gtacaaaaca 1380
 cgtggttctt tgcatatcaa aaatttgaaa atgttataag gatttgtatc cactataaga 1440
 aattggtgga taaaaaaaa aaaaaaaaa aaa 1473

<210> 83
 <211> 207
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*

5

<400> 83

ES 2 556 221 T3

cacatgtgct ccggtgtcca tctattctac agtaagacg acggattcac ctgcgaggat 60
 ttgattcaag ttgtaaatgc aattattcac aaacctattg tcctcaagga acaaacagga 120
 gcaaggatat aattttttta atctgtatct atatataaaa gagaaaccca ttcggttaaaa 180
 taaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa 207

5 <210> 84
 <211> 464
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 84

aaattaatta ggaataaaaa aaattggact ttatatttat tagaaacggc cgccgcccga 60
 aaaaaatgtc gctcgccttc aacgtcggag ttacgccttt ctccggccaa agagttggga 120
 gcaggaaaga aaaatttcca gtccaaggat ttctgtgac ccccccaat aggtcacgtc 180
 tcatcgtaa ctgcagcctt actacaatag atttcatggc gaaaatgaaa gagaatttca 240
 agagggaga cgataaattt ccaacgacaa cgactcttcg atccgaagat ataccctcta 300
 atttgtgtat aatcgacacc cttcaaagggt tgggggtcga tcaattcttc caatatgaaa 360
 tcaacactat tctagataac acattcaggt tgtggcaaga aaaacacaaa gttatatatg 420
 gcaatgttac tactcatgca atggcattta ggcttttgcg agtg 464

10 <210> 85
 <211> 2388
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 85

ES 2 556 221 T3

atgtcgccttc ctctctccac ttgcaatgga tcacattttc ggagataccg cttgtctcct	60
gcttcagctt ctatggaaac tgggcttcaa actgctactt cagcaaaaat cgcctctatg	120
ccagcgtgct ttgaggagac gagagggagg atagcaaagt tgtttcataa ggatgaactt	180
tctgtgtcga catatgatâc agcatggggtt gccatgggcc cttctccaac ttcgttagag	240
gaaccttgct tccccgattg tctaaactgg ttgctcgaga accagtgccâ tgatggttcg	300
tgggcccgtc cccaccatca ctctttgcta atgaaagatg tcctttcttc taccttggcc	360
tgatttcttg ctcttaaaaa atggggagtt ggtgaaaaac agattaacag gggcttgcâ	420
tttatggagt tgaattttgc ttcagctact gagaagtgtc agattactcc catgggattt	480
gatattgtat ttctgccat gcttgattat gccagagact tctctttgga catgcattta	540
gagccaacta cgttgaatga tttgatacat aagagggatt tggagcttaa aagcaagcca	600
gatttttcat cggatgggga agcctattgg gcâtatatag ctgaaggaat ggggaattta	660
cggaactggg aatcagttat gaaatatcaa agaaggaatg gatctctttt caactgtcct	720
tccacgacag cagctgcttt tgttgcaactg ggcaattctg actgcctcaa ctacctgcâ	780
tcagccttaa agaagtttgg gaatgcagtt cctgcagttt atcctctaga tatatattct	840
cacctgtgca tagttgacaa tcttgaaagg ttggggatca gccgttattt tttgactgag	900
attcaaagcg tgtagatga aacacacaga tgttggatgc agggcaatga agagatcttc	960
atggatgcct caacttgtgc tttagctttc cggatattgc gattgaacgg atâcgcâtgta	1020
acttcagatc cggttacaaa aattcaacac gagtgctttt cgagttcctt tcatggaaat	1080
gtgatggaca ttaacacgac tcttgaatta tatagggcat ctgaactcat actatatcca	1140
gatgaaagag atctagtgag acaaaattta aggcttaaac aaatactaga gcaagagcta	1200
tccaatggtt ttattcaatc atgtcaactt ggaagaagtg ttaatgcaga ggtgaaccag	1260
gctatcgagt atccatttta tgcaattatg gacagggttg caaacggaa aaatâtagag	1320

ES 2 556 221 T3

aactacaact ttgataatac aagaattctg aaaacttcat attgttcacc aaatthttggc 1380
aacaaggatt ttctthtttct gtccgtagag gacttcaatc tgtgtcaagc cacacatcgc 1440
gaagaactca gggaaactga aagatgggtc gtagagaata gattggacga gctgcagtht 1500
gcaaggagta agtctgcata ttgttatttt tctgcagcag caacctthtc tgctccagaa 1560
ctacgtgatg cacgcatgtc gtgggccaaa ggtggtgttc tgactacagt gattgatgac 1620
thttthtgacg tcggaggttc tatggaagaa ttgaagaact taattcattt ggttgaaaaa 1680
tgggatgtgg atgttagcac agaatgctct tcccataatg tccagataat atthtcagca 1740
cttaagagca caatccgtga aattggatac aaagggttga agctacaagg gcgthgtatt 1800
actaaccata taattggcat ttgthtagat ttgctgaatt ctatgatgaa agaaactgaa 1860
tgggctagag acaactatgt cccaacaatt gatgaatata tgagcaatgc atatgtgtca 1920
thtgctctgg ggccaattgt tctgccaaact ctatatcttg ttgggccgaa gctctcagaa 1980
gagatggcaa accaccccga gtactataaa ctattcaaat tgatgagcac atgcggacgc 2040
ctthtaaatg acatccgtgg ttatgagaga gaactcaaag atggtaaact gaacgcgcta 2100
tctthgtaca tggctaataca tgggtgtgaa gtaagtaaag aagcagccat thcagagatc 2160
aaaagthtga ttgagagcag taggagagaa ttactgagat tagththtga ggggaagaag 2220
agtgtccttc caaagccatg caaggaatta thttggcaca tgtgctctgt ggtccatcta 2280
thctacagta aagacgacgg attcacctcg caggatttga thcaagthgt aatgcaatt 2340
attcacaac ctattgtcct caaggaacaa acaggagcaa ggatataa 2388

<210> 86
<211> 795
<212> PRT
<213> *Salvia sclarea*
<400> 86

5

ES 2 556 221 T3

Met Ser Leu Pro Leu Ser Thr Cys Asn Gly Ser His Phe Arg Arg Tyr
1   5   10   15

Arg Leu Ser Pro Ala Ser Ala Ser Met Glu Thr Gly Leu Gln Thr Ala
          20   25   30

Thr Ser Ala Lys Ile Ala Ser Met Pro Ala Cys Phe Glu Glu Thr Arg
          35   40   45

Gly Arg Ile Ala Lys Leu Phe His Lys Asp Glu Leu Ser Val Ser Thr
          50   55   60

Tyr Asp Thr Ala Trp Val Ala Met Val Pro Ser Pro Thr Ser Leu Glu

ES 2 556 221 T3

Met Asp Ala Ser Thr Cys Ala Leu Ala Phe Arg Ile Leu Arg Leu Asn
 325 330 335

Gly Tyr Asp Val Thr Ser Asp Pro Val Thr Lys Ile Gln His Glu Cys
 340 345 350

Phe Ser Ser Ser Phe His Gly Asn Val Met Asp Ile Asn Thr Thr Leu
 355 360 365

Glu Leu Tyr Arg Ala Ser Glu Leu Ile Leu Tyr Pro Asp Glu Arg Asp
 370 375 380

Leu Val Arg Gln Asn Leu Arg Leu Lys Gln Ile Leu Glu Gln Glu Leu
 385 390 395 400

Ser Asn Gly Phe Ile Gln Ser Cys Gln Leu Gly Arg Ser Val Asn Ala
 405 410 415

Glu Val Asn Gln Ala Ile Glu Tyr Pro Phe Tyr Ala Ile Met Asp Arg
 420 425 430

Val Ala Lys Arg Lys Asn Ile Glu Asn Tyr Asn Phe Asp Asn Thr Arg
 435 440 445

Ile Leu Lys Thr Ser Tyr Cys Ser Pro Asn Phe Gly Asn Lys Asp Phe
 450 455 460

Leu Phe Leu Ser Val Glu Asp Phe Asn Leu Cys Gln Ala Thr His Arg
 465 470 475 480

Glu Glu Leu Arg Glu Leu Glu Arg Trp Val Val Glu Asn Arg Leu Asp
 485 490 495

Glu Leu Gln Phe Ala Arg Ser Lys Ser Ala Tyr Cys Tyr Phe Ser Ala
 500 505 510

Ala Ala Thr Phe Ser Ala Pro Glu Leu Arg Asp Ala Arg Met Ser Trp
 515 520 525

Ala Lys Gly Gly Val Leu Thr Thr Val Ile Asp Asp Phe Phe Asp Val
 530 535 540

Gly Gly Ser Met Glu Glu Leu Lys Asn Leu Ile His Leu Val Glu Lys
 545 550 555 560

ES 2 556 221 T3

Trp Asp Val Asp Val Ser Thr Glu Cys Ser Ser His Asn Val Gln Ile
 565 570 575

Ile Phe Ser Ala Leu Lys Ser Thr Ile Arg Glu Ile Gly Tyr Lys Gly
 580 585 590

Leu Lys Leu Gln Gly Arg Cys Ile Thr Asn His Ile Ile Gly Ile Trp
 595 600 605

Leu Asp Leu Leu Asn Ser Met Met Lys Glu Thr Glu Trp Ala Arg Asp
 610 615 620

Asn Tyr Val Pro Thr Ile Asp Glu Tyr Met Ser Asn Ala Tyr Val Ser
 625 630 635 640

Phe Ala Leu Gly Pro Ile Val Leu Pro Thr Leu Tyr Leu Val Gly Pro
 645 650 655

Lys Leu Ser Glu Glu Met Ala Asn His Pro Glu Tyr Tyr Lys Leu Phe
 660 665 670

Lys Leu Met Ser Thr Cys Gly Arg Leu Leu Asn Asp Ile Arg Gly Tyr
 675 680 685

Glu Arg Glu Leu Lys Asp Gly Lys Leu Asn Ala Leu Ser Leu Tyr Met
 690 695 700

Ala Asn His Gly Gly Glu Val Ser Lys Glu Ala Ala Ile Ser Glu Ile
 705 710 715 720

Lys Ser Trp Ile Glu Ser Ser Arg Arg Glu Leu Leu Arg Leu Val Leu
 725 730 735

Glu Gly Lys Lys Ser Val Leu Pro Lys Pro Cys Lys Glu Leu Phe Trp
 740 745 750

His Met Cys Ser Val Val His Leu Phe Tyr Ser Lys Asp Asp Gly Phe
 755 760 765

Thr Ser Gln Asp Leu Ile Gln Val Val Asn Ala Ile Ile His Lys Pro
 770 775 780

Ile Val Leu Lys Glu Gln Thr Gly Ala Arg Ile
 785 790 795

ES 2 556 221 T3

<210> 87
 <211> 536
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 5 <400> 87

 aaattaatta ggaataaaaa aaattggact ttatatattat tagaaacggc cgccgcccga 60
 aaaaaatgtc gctcgccttc aacgtcggag ttacgccttt ctccggccaa agagttggga 120
 gcaggaaaga aaaatttcca gtccaaggat ttctgtgac ccccccaat aggtcacgtc 180
 tcatcgtaa ctgcagcctt actacaatag atttcatggc gaaaatgaaa gagaatttca 240
 agaggggaaga cgataaattt ccaacgacaa cgactcttcg atccgaagat atacctcta 300
 atttgtgtat aatcgacacc cttcaaaggt tgggggtcga tcaattcttc caatatgaaa 360
 tcaacactat tctagataac acattcaggt tgtggcaaga aaaacacaaa gttatatatg 420
 gcaatgttac tactcatgca atggcattta ggcttttgcg agtgaaagga tacgaagttt 480
 catcagagga gttggctcca tatggtaacc aagaggctgt tagccagcaa acaaat 536

 <210> 88
 <211> 95
 <212> ADN
 10 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 88

 ttgcatcttc ttggcaaaaat gctttctttt ttatacaciaa tctgcaacac ttttctccag 60
 tgatattcaa ccatttcatt gatctctgca atggc 95

 <210> 89
 <211> 55
 <212> ADN
 15 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 89

 tgaagcccag aaccagaaag gactcaaca actgcaaagg tggatgcag attgt 55

 <210> 90
 <211> 53
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 90

 tactctgcat ccgattctc ctccattct ttactaatt caatgatct gtc 53

 <210> 91
 <211> 2391
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 91

 atgtcgttc ctctctccac ttgcaatgga tcacatttct ggagataccg cttgtctct 60
 30

ES 2 556 221 T3

gcttcagctt ctatggaaac tgggcttcaa actgctactt cagcaaaaat cgctctatg 120
ccagcgtgct ttgaggagac gagagggagg atagcaaagt tgtttcataa ggatgaactt 180
tctgtgtcga catatgatac agcatgggtt gccatggtcc cttctccaac ttcgttagag 240
gaaccttgct tccccgattg tctaaactgg ttgctcgaga accagtgcca tgatggttcg 300
tgggcccgtc cccaccatca ctctttgcta atgaaagatg tcctttcttc taccttggcc 360
tgcattcttg ctcttaaaaa atggggagtt ggtgaaaaac agattaacag gggcttgcatt 420
tttatggagt tgaattttgc ttcagctact gagaagtgtc agattactcc catgggattt 480
gatattgtat ttctgccat gcttgattat gccagagact tctctttgga catgcattta 540
gagccaacta cgttgaatga tttgatacat aagagggatt tggagcttaa aagcaagcca 600
gatttttcat cggatgggga agcctattgg gcatatatag ctgaaggaat ggggaattta 660
cggaaactggg aatcagttat gaaatatcaa agaaggaatg gatctctttt caactgtcct 720
tccacgacag cagctgcttt tgttgcactg ggcaattctg actgctcaa ctacctgcat 780
tcagccttaa agaagtttgg gaatgcagtt cctgcagttt atcctctaga tatatattct 840
cacctgtgca tagttgacaa tcttgaaagg ttggggatca gccgttattt tttgactgag 900
attcaaagcg tgttagatga aacacacaga tgttggatgc agggcaatga agagatcttc 960
atggatgcct caacttgtgc tttagcttcc cggatattgc gattgaacgg atacgatgta 1020
acttcagatc cggttacaaa aattcaacac gagtgccttt cgagttcctt tcatggaaat 1080
gtgatggaca ttaacacgac tcttgaatta tatagggcat ctgaactcat actatatcca 1140
gatgaaagag atctagttag acaaaattta aggcttaaac aaatactaga gcaagagcta 1200
tccaatgggtt ttattcaatc atgtcaactt ggaagaagtg ttaatgcaga ggtgaaccag 1260
gctatcgagt atccatttta tgcaattatg gacaggggtg caaacggaa aaatatagag 1320
aactacaact ttgataatac aagaattctg aaaacttcat attgttcacc aaattttggc 1380
aacaaggatt ttctttttct gtccgtagag gacttcaatc tgtgtcaagc cacacatcgc 1440
gaagaactca gggaacttga aagatgggtc gtagagaata gattggacga gctgcagttt 1500
gcaaggagta agtctgcata ttgttatttt tctgcagcag caaccttttc tgctccagaa 1560
ctacgtgatg cacgcatgtc gtgggcaaaa ggtggtgttc tgactacagt gattgatgac 1620
ttttttgacg tcggagggtc tatggaagaa ttgaagaact taattcattt ggttgaaaaa 1680
tgggatgtgg atgttagcac agaatgctct tcccataatg tccagataat attttcagca 1740
cttaagagca caatccgtga aattggatac aaagggttga agctacaagg gcgttgattt 1800
actaaccata taattggcat ttggttagat ttgctgaatt ctatgatgaa agaaactgaa 1860

ES 2 556 221 T3

tgggctagag acaactatgt cccaacaatt gatgaatata tgagcaatgc atatgtgtca 1920
 tttgctctgg ggccaattgt tctgccaact ctatatcttg ttgggccgaa gctctcagaa 1980
 gagatggcaa accacccccga gtactataaa ctattcaaat tgatgagcac atgcgggacgc 2040
 cttttaaatg acatccgtgg ttatgagaga gaactcaaag atggtaaact gaacgcgcta 2100
 tctttgtaca tggctaataca tgggtggtgaa gtaagtaaag aagcagccat ttcagagatc 2160
 aaaagttgga ttgagagcag taggagagaa ttactgagat tagttttgga ggggaagaag 2220
 agtgtccttc caaagccatg caaggaatta ttttggcaca tgtgctctgt ggtccatcta 2280
 ttctacagta aagacgacgg attcacctcg caggatttga ttcaagttgt aatgcaatt 2340
 attcacaac ctattgtcct caaggaacaa acaggagcaa ggatataaaa g 2391

<210> 92
 <211> 2316
 <212> ADN
 <213> *Salvia sclarea*
 <400> 92

5

atggaaactg ggcttcaaac tgetacttca gcaaaaatcg cctctatgcc agcgtgcttt 60
 gaggagacga gaggaggat agcaaagttg tttcataagg atgaactttc tgtgtcgaca 120
 tatgatacag catgggttgc catggtccct tctccaactt cgttagagga accttgcttc 180
 cccgattgtc taaactgggt gctcgagaac cagtgccatg atggttcgtg ggcccgtccc 240
 caccatcact ctttgctaata gaaagatgtc ctttcttcta cottggcctg cattcttctt 300
 cttaaaaaat ggggagttgg tgaaaaacag attaacaggg gottgcattt tatggagttg 360
 aattttgctt cagctactga gaagtgtcag attactecca tgggatttga tattgtattt 420
 cctgccatgc ttgattatgc cagagacttc tctttggaca tgcatttaga gccaactacg 480
 ttgaatgatt tgatacataa gagggatttg gagcttaaaa gcaagccaga tttttcatcg 540
 gatggggaag cctattgggc atatatagct gaaggaatgg ggaatttacg gaactgggaa 600
 tcagttatga aatatcaaag aaggaatgga tctcttttca actgtccttc cacgacagca 660
 gctgcttttg ttgcaactgg caattctgac tgcctcaact acctgcattc agccttaaag 720
 aagtttggga atgcagttcc tgcagtttat cctctagata tatattctca cctgtgcata 780
 gttgacaatc ttgaaagggt ggggatcagc cgttattttt tgactgagat tcaaagecgtg 840
 ttagatgaaa cacacagatg ttggatgcag ggcaatgaag agatcttcat ggatgcctca 900
 acttgtgctt tagctttccg gatattgca ttgaacggat acgatgtaac ttcagatccg 960
 gttacaaaaa ttcaacacga gtgcttttcg agttcctttc atggaaatgt gatggacatt 1020
 aacacgactc ttgaattata tagggcatct gaactcatac tatatccaga tgaaagagat 1080

ES 2 556 221 T3

ctagtgagac aaaatttaag gcttaaacia atactagagc aagagctatc caatggtttt 1140
attcaatcat gtcaacttgg aagaagtgtt aatgcagagg tgaaccaggc tatcgagtat 1200
ccattttatg caattatgga cagggttgca aaacggaaaa atatagagaa ctacaacttt 1260
gataatacaa gaattctgaa aacttcatat tgttcaccaa attttgcaa caaggatttt 1320
ctttttctgt cegtagagga cttcaatctg tgtcaagcca cacatcgcgga agaactcagg 1380
gaacttgaaa gatgggtcgt agagaaataga ttggacgagc tgcagtttgc aaggagtaag 1440
tctgcatatt gttatttttc tgcagcagca accttttctg ctccagaact acgtgatgca 1500
cgcatgctgt gggccaaagg tgggtgttctg actacagtga ttgatgactt ttttgacgtc 1560
ggaggttcta tggaagaatt gaagaactta attcatttgg ttgaaaaatg ggatgtggat 1620
gtagcacag aatgctcttc ccataatgtc cagataatat tttcagcact taagagcaca 1680
atccgtgaaa ttggatacaa agggttgaag ctacaagggc gttgtattac taaccatata 1740
attggcattt ggtagattt gctgaattct atgatgaaag aaactgaatg ggctagagac 1800
aactatgtcc caacaattga tgaatatatg agcaatgcat atgtgtcatt tgctctgggg 1860
ccaattgttc tgccaactct atatcttgtt gggccgaagc tctcagaaga gatggcaaac 1920
caccocgagt actataaact attcaaattg atgagcacat ggggacgcct tttaaatgac 1980
atccgtgggtt atgagagaga actcaaagat ggtaaactga acgcgctatc tttgtacatg 2040
gctaactcatg gtggtgaagt aagtaaagaa gcagccattt cagagatcaa aagttggatt 2100
gagagcagta ggagagaatt actgagatta gttttggagg ggaagaagag tgccttcca 2160
aagccatgca aggaattatt ttggcacatg tgctctgtgg tccatctatt ctacagtaaa 2220
gacgacggat tcacctcgca ggatttgatt caagttgtaa atgcaattat tcacaaacct 2280
attgtcctca aggaacaaac aggagcaagg atataa 2316

<210> 93
<211> 1578
<212> ADN
<213> *Salvia sclarea*
<400> 93

5

ES 2 556 221 T3

atggcgaaaa tgaaagagaa tttcaagagg gaagacgata aatttccaac gacaacgact 60
cttcgatccg aagatatacc ctctaatttg tgtataatcg acacccttca aagggtgggg 120
gtcgatcaat tcttccaata tgaaatcaac actattctag ataacacatt cagggtgtgg 180
caagaaaaac acaaagttat atatggcaat gttactactc atgcaatggc atttaggctt 240
ttgcgagtga aaggatacga agtttcatca gaggagttag ctccatattg taaccaagag 300
gctgttagcc agcaaacaaa tgacctgccg atgattattg agctttatag agcagcaaat 360
gagagaatat atgaagaaga gaggagtctt gaaaaaatc ttgcttggac taccatcttt 420
ctcaataagc aagtgaaga taactcaatt cccgacaaaa aactgcacaa actgggtggaa 480
ttctacttga ggaattacaa aggcataacc ataagattgg gagctagacg aaacctcgag 540
ctatatgaca tgacctacta tcaagctctg aaatctacaa acaggttctc taatttatgc 600
aacgaagatt ttctagtttt cgcaaagcaa gatttcgata tacatgaagc ccagaaccag 660
aaaggacttc aacaactgca aagggtggtat gcagattgta ggttggacac cttaaacttt 720
ggaagagatg tagttattat tgctaattat ttggcttcat taattattgg tgatcatgcg 780
tttgactatg ttcgtctcgc atttgccaaa acatctgtgc ttgtaacaat tatggatgat 840
tttttcgact gtcatggctc tagtcaagag tgtgacaaga tcattgaatt agtaaaagaa 900
tggaaggaga atccggatgc agagtacgga tctgaggagc ttgagatcct tttatggcg 960
ttgtacaata cagtaaatga gttggcggag agggctcgtg ttgaacaggg gcgtagtgtc 1020
aaagagtttc tagtcaaact gtgggttgaa atactctcag ctttcaagat agaattagat 1080
acatggagca atggcacgca gcaaagcttc gatgaataca tttcttcgtc gtggttgtcg 1140
aacggttccc ggctgacagg tctcctgacg atgcaattcg tcggagtaaa attgtccgat 1200
gaaatgctta tgagtgaaga gtgcactgat ttggctagge atgtctgtat ggtcggccgg 1260
ctgctcaacg acgtgtgcag ttctgagagg gagcgcgagg aaaatattgc aggaaaaagt 1320
tatagcattc tactagcaac tgagaaagat ggaagaaaag ttagtgaaga tgaagccatt 1380
gcagagatca atgaaatggt tgaatatcac tggagaaaag tgttgcagat tgtgtataaa 1440
aaagaaagca ttttgccaag aagatgcaaa gatgtatfff ttgagatggc taagggtacg 1500
ttttatgctt atgggatcaa cgatgaattg acttctcctc agcaatccaa ggaagatatg 1560
aaatcctttg tcttttga 1578

<210> 94
<211> 795
<212> PRT
<213> *Salvia sclarea*

ES 2 556 221 T3

<400> 94

Met Ser Leu Pro Leu Ser Thr Cys Asn Gly Ser His Phe Arg Arg Tyr
1   5   10   15

Arg Leu Ser Pro Ala Ser Ala Ser Met Glu Thr Gly Leu Gln Thr Ala
          20   25   30

Thr Ser Ala Lys Ile Ala Ser Met Pro Ala Cys Phe Glu Glu Thr Arg
          35   40   45

ES 2 556 221 T3

Gly Arg Ile Ala Lys Leu Phe His Lys Asp Glu Leu Ser Val Ser Thr
50 55 60

Tyr Asp Thr Ala Trp Val Ala Met Val Pro Ser Pro Thr Ser Leu Glu
65 70 75 80

Glu Pro Cys Phe Pro Asp Cys Leu Asn Trp Leu Leu Glu Asn Gln Cys
85 90 95

His Asp Gly Ser Trp Ala Arg Pro His His His Ser Leu Leu Met Lys
100 105 110

Asp Val Leu Ser Ser Thr Leu Ala Cys Ile Leu Ala Leu Lys Lys Trp
115 120 125

Gly Val Gly Glu Lys Gln Ile Asn Arg Gly Leu His Phe Met Glu Leu
130 135 140

Asn Phe Ala Ser Ala Thr Glu Lys Cys Gln Ile Thr Pro Met Gly Phe
145 150 155 160

Asp Ile Val Phe Pro Ala Met Leu Asp Tyr Ala Arg Asp Phe Ser Leu
165 170 175

Asp Met His Leu Glu Pro Thr Thr Leu Asn Asp Leu Ile His Lys Arg
180 185 190

Asp Leu Glu Leu Lys Ser Lys Pro Asp Phe Ser Ser Asp Gly Glu Ala
195 200 205

Tyr Trp Ala Tyr Ile Ala Glu Gly Met Gly Asn Leu Arg Asn Trp Glu
210 215 220

Ser Val Met Lys Tyr Gln Arg Arg Asn Gly Ser Leu Phe Asn Cys Pro
225 230 235 240

Ser Thr Thr Ala Ala Ala Phe Val Ala Leu Gly Asn Ser Asp Cys Leu
245 250 255

Asn Tyr Leu His Ser Ala Leu Lys Lys Phe Gly Asn Ala Val Pro Ala
260 265 270

Val Tyr Pro Leu Asp Ile Tyr Ser His Leu Cys Ile Val Asp Asn Leu
275 280 285

ES 2 556 221 T3

Glu Arg Leu Gly Ile Ser Arg Tyr Phe Leu Thr Glu Ile Gln Ser Val
 290 295 300
 Leu Asp Glu Thr His Arg Cys Trp Met Gln Gly Asn Glu Glu Ile Phe
 305 310 315 320
 Met Asp Ala Ser Thr Cys Ala Leu Ala Phe Arg Ile Leu Arg Leu Asn
 325 330 335
 Gly Tyr Asp Val Thr Ser Asp Pro Val Thr Lys Ile Gln His Glu Cys
 340 345 350
 Phe Ser Ser Ser Phe His Gly Asn Val Met Asp Ile Asn Thr Thr Leu
 355 360 365
 Glu Leu Tyr Arg Ala Ser Glu Leu Ile Leu Tyr Pro Asp Glu Arg Asp
 370 375 380
 Leu Val Arg Gln Asn Leu Arg Leu Lys Gln Ile Leu Glu Gln Glu Leu
 385 390 395 400
 Ser Asn Gly Phe Ile Gln Ser Cys Gln Leu Gly Arg Ser Val Asn Ala
 405 410 415
 Glu Val Asn Gln Ala Ile Glu Tyr Pro Phe Tyr Ala Ile Met Asp Arg
 420 425 430
 Val Ala Lys Arg Lys Asn Ile Glu Asn Tyr Asn Phe Asp Asn Thr Arg
 435 440 445
 Ile Leu Lys Thr Ser Tyr Cys Ser Pro Asn Phe Gly Asn Lys Asp Phe
 450 455 460
 Leu Phe Leu Ser Val Glu Asp Phe Asn Leu Cys Gln Ala Thr His Arg
 465 470 475 480
 Glu Glu Leu Arg Glu Leu Glu Arg Trp Val Val Glu Asn Arg Leu Asp
 485 490 495
 Glu Leu Gln Phe Ala Arg Ser Lys Ser Ala Tyr Cys Tyr Phe Ser Ala
 500 505 510
 Ala Ala Thr Phe Ser Ala Pro Glu Leu Arg Asp Ala Arg Met Ser Trp
 515 520 525
 Ala Lys Gly Gly Val Leu Thr Thr Val Ile Asp Asp Phe Phe Asp Val

ES 2 556 221 T3

530						535						540			
Gly	Gly	Ser	Met	Glu	Glu	Leu	Lys	Asn	Leu	Ile	His	Leu	Val	Glu	Lys
545					550					555					560
Trp	Asp	Val	Asp	Val	Ser	Thr	Glu	Cys	Ser	Ser	His	Asn	Val	Gln	Ile
				565					570					575	
Ile	Phe	Ser	Ala	Leu	Lys	Ser	Thr	Ile	Arg	Glu	Ile	Gly	Tyr	Lys	Gly
			580					585					590		
Leu	Lys	Leu	Gln	Gly	Arg	Cys	Ile	Thr	Asn	His	Ile	Ile	Gly	Ile	Trp
		595					600					605			
Leu	Asp	Leu	Leu	Asn	Ser	Met	Met	Lys	Glu	Thr	Glu	Trp	Ala	Arg	Asp
	610					615					620				
Asn	Tyr	Val	Pro	Thr	Ile	Asp	Glu	Tyr	Met	Ser	Asn	Ala	Tyr	Val	Ser
625					630					635					640
Phe	Ala	Leu	Gly	Pro	Ile	Val	Leu	Pro	Thr	Leu	Tyr	Leu	Val	Gly	Pro
				645					650					655	
Lys	Leu	Ser	Glu	Glu	Met	Ala	Asn	His	Pro	Glu	Tyr	Tyr	Lys	Leu	Phe
			660					665					670		
Lys	Leu	Met	Ser	Thr	Cys	Gly	Arg	Leu	Leu	Asn	Asp	Ile	Arg	Gly	Tyr
		675					680						685		
Glu	Arg	Glu	Leu	Lys	Asp	Gly	Lys	Leu	Asn	Ala	Leu	Ser	Leu	Tyr	Met
	690					695					700				
Ala	Asn	His	Gly	Gly	Glu	Val	Ser	Lys	Glu	Ala	Ala	Ile	Ser	Glu	Ile
705					710					715					720
Lys	Ser	Trp	Ile	Glu	Ser	Ser	Arg	Arg	Glu	Leu	Leu	Arg	Leu	Val	Leu
				725					730					735	
Glu	Gly	Lys	Lys	Ser	Val	Leu	Pro	Lys	Pro	Cys	Lys	Glu	Leu	Phe	Trp
			740					745					750		
His	Met	Cys	Ser	Val	Val	His	Leu	Phe	Tyr	Ser	Lys	Asp	Asp	Gly	Phe
		755					760					765			
Thr	Ser	Gln	Asp	Leu	Ile	Gln	Val	Val	Asn	Ala	Ile	Ile	His	Lys	Pro
	770					775					780				

ES 2 556 221 T3

Ile Val Leu Lys Glu Gln Thr Gly Ala Arg Ile
785 790 795

<210> 95
<211> 771
<212> PRT
5 <213> *Salvia sclarea*
<400> 95

Met Glu Thr Gly Leu Gln Thr Ala Thr Ser Ala Lys Ile Ala Ser Met
1 5 10 15

Pro Ala Cys Phe Glu Glu Thr Arg Gly Arg Ile Ala Lys Leu Phe His
20 25 30

Lys Asp Glu Leu Ser Val Ser Thr Tyr Asp Thr Ala Trp Val Ala Met
35 40 45

Val Pro Ser Pro Thr Ser Leu Glu Glu Pro Cys Phe Pro Asp Cys Leu
50 55 60

Asn Trp Leu Leu Glu Asn Gln Cys His Asp Gly Ser Trp Ala Arg Pro
65 70 75 80

His His His Ser Leu Leu Met Lys Asp Val Leu Ser Ser Thr Leu Ala
85 90 95

Cys Ile Leu Ala Leu Lys Lys Trp Gly Val Gly Glu Lys Gln Ile Asn
100 105 110

Arg Gly Leu His Phe Met Glu Leu Asn Phe Ala Ser Ala Thr Glu Lys
115 120 125

Cys Gln Ile Thr Pro Met Gly Phe Asp Ile Val Phe Pro Ala Met Leu
130 135 140

Asp Tyr Ala Arg Asp Phe Ser Leu Asp Met His Leu Glu Pro Thr Thr
145 150 155 160

Leu Asn Asp Leu Ile His Lys Arg Asp Leu Glu Leu Lys Ser Lys Pro
165 170 175

Asp Phe Ser Ser Asp Gly Glu Ala Tyr Trp Ala Tyr Ile Ala Glu Gly
180 185 190

ES 2 556 221 T3

Met Gly Asn Leu Arg Asn Trp Glu Ser Val Met Lys Tyr Gln Arg Arg
 195 200 205

Asn Gly Ser Leu Phe Asn Cys Pro Ser Thr Thr Ala Ala Ala Phe Val
 210 215 220

Ala Leu Gly Asn Ser Asp Cys Leu Asn Tyr Leu His Ser Ala Leu Lys
 225 230 235 240

Lys Phe Gly Asn Ala Val Pro Ala Val Tyr Pro Leu Asp Ile Tyr Ser
 245 250 255

His Leu Cys Ile Val Asp Asn Leu Glu Arg Leu Gly Ile Ser Arg Tyr
 260 265 270

Phe Leu Thr Glu Ile Gln Ser Val Leu Asp Glu Thr His Arg Cys Trp
 275 280 285

Met Gln Gly Asn Glu Glu Ile Phe Met Asp Ala Ser Thr Cys Ala Leu
 290 295 300

Ala Phe Arg Ile Leu Arg Leu Asn Gly Tyr Asp Val Thr Ser Asp Pro
 305 310 315 320

Val Thr Lys Ile Gln His Glu Cys Phe Ser Ser Ser Phe His Gly Asn
 325 330 335

Val Met Asp Ile Asn Thr Thr Leu Glu Leu Tyr Arg Ala Ser Glu Leu
 340 345 350

Ile Leu Tyr Pro Asp Glu Arg Asp Leu Val Arg Gln Asn Leu Arg Leu
 355 360 365

Lys Gln Ile Leu Glu Gln Glu Leu Ser Asn Gly Phe Ile Gln Ser Cys
 370 375 380

Gln Leu Gly Arg Ser Val Asn Ala Glu Val Asn Gln Ala Ile Glu Tyr
 385 390 395 400

Pro Phe Tyr Ala Ile Met Asp Arg Val Ala Lys Arg Lys Asn Ile Glu
 405 410 415

Asn Tyr Asn Phe Asp Asn Thr Arg Ile Leu Lys Thr Ser Tyr Cys Ser
 420 425 430

Pro Asn Phe Gly Asn Lys Asp Phe Leu Phe Leu Ser Val Glu Asp Phe

ES 2 556 221 T3

	435					440							445				
Asn	Leu	Cys	Gln	Ala	Thr	His	Arg	Glu	Glu	Leu	Arg	Glu	Leu	Glu	Arg		
	450					455					460						
Trp	Val	Val	Glu	Asn	Arg	Leu	Asp	Glu	Leu	Gln	Phe	Ala	Arg	Ser	Lys		
465					470					475					480		
Ser	Ala	Tyr	Cys	Tyr	Phe	Ser	Ala	Ala	Ala	Thr	Phe	Ser	Ala	Pro	Glu		
				485					490					495			
Leu	Arg	Asp	Ala	Arg	Met	Ser	Trp	Ala	Lys	Gly	Gly	Val	Leu	Thr	Thr		
			500					505					510				
Val	Ile	Asp	Asp	Phe	Phe	Asp	Val	Gly	Gly	Ser	Met	Glu	Glu	Leu	Lys		
		515					520					525					
Asn	Leu	Ile	His	Leu	Val	Glu	Lys	Trp	Asp	Val	Asp	Val	Ser	Thr	Glu		
	530					535					540						
Cys	Ser	Ser	His	Asn	Val	Gln	Ile	Ile	Phe	Ser	Ala	Leu	Lys	Ser	Thr		
545					550				555						560		
Ile	Arg	Glu	Ile	Gly	Tyr	Lys	Gly	Leu	Lys	Leu	Gln	Gly	Arg	Cys	Ile		
				565					570					575			
Thr	Asn	His	Ile	Ile	Gly	Ile	Trp	Leu	Asp	Leu	Leu	Asn	Ser	Met	Met		
			580					585					590				
Lys	Glu	Thr	Glu	Trp	Ala	Arg	Asp	Asn	Tyr	Val	Pro	Thr	Ile	Asp	Glu		
		595					600					605					
Tyr	Met	Ser	Asn	Ala	Tyr	Val	Ser	Phe	Ala	Leu	Gly	Pro	Ile	Val	Leu		
	610					615					620						
Pro	Thr	Leu	Tyr	Leu	Val	Gly	Pro	Lys	Leu	Ser	Glu	Glu	Met	Ala	Asn		
625					630					635					640		
His	Pro	Glu	Tyr	Tyr	Lys	Leu	Phe	Lys	Leu	Met	Ser	Thr	Cys	Gly	Arg		
				645					650					655			
Leu	Leu	Asn	Asp	Ile	Arg	Gly	Tyr	Glu	Arg	Glu	Leu	Lys	Asp	Gly	Lys		
			660					665					670				
Leu	Asn	Ala	Leu	Ser	Leu	Tyr	Met	Ala	Asn	His	Gly	Gly	Glu	Val	Ser		
		675					680					685					

ES 2 556 221 T3

Lys Glu Ala Ala Ile Ser Glu Ile Lys Ser Trp Ile Glu Ser Ser Arg
 690 695 700

Arg Glu Leu Leu Arg Leu Val Leu Glu Gly Lys Lys Ser Val Leu Pro
 705 710 715 720

Lys Pro Cys Lys Glu Leu Phe Trp His Met Cys Ser Val Val His Leu
 725 730 735

Phe Tyr Ser Lys Asp Asp Gly Phe Thr Ser Gln Asp Leu Ile Gln Val
 740 745 750

Val Asn Ala Ile Ile His Lys Pro Ile Val Leu Lys Glu Gln Thr Gly
 755 760 765

Ala Arg Ile
 770

<210> 96
 <211> 525
 <212> PRT
 <213> *Salvia sclarea*

5

<400> 96

Met Ala Lys Met Lys Glu Asn Phe Lys Arg Glu Asp Asp Lys Phe Pro
 1 5 10 15

Thr Thr Thr Thr Leu Arg Ser Glu Asp Ile Pro Ser Asn Leu Cys Ile
 20 25 30

Ile Asp Thr Leu Gln Arg Leu Gly Val Asp Gln Phe Phe Gln Tyr Glu
 35 40 45

Ile Asn Thr Ile Leu Asp Asn Thr Phe Arg Leu Trp Gln Glu Lys His
 50 55 60

Lys Val Ile Tyr Gly Asn Val Thr Thr His Ala Met Ala Phe Arg Leu
 65 70 75 80

Leu Arg Val Lys Gly Tyr Glu Val Ser Ser Glu Glu Leu Ala Pro Tyr
 85 90 95

Gly Asn Gln Glu Ala Val Ser Gln Gln Thr Asn Asp Leu Pro Met Ile
 100 105 110

ES 2 556 221 T3

Ile Glu Leu Tyr Arg Ala Ala Asn Glu Arg Ile Tyr Glu Glu Glu Arg
 115 120 125

Ser Leu Glu Lys Ile Leu Ala Trp Thr Thr Ile Phe Leu Asn Lys Gln
 130 135 140

Val Gln Asp Asn Ser Ile Pro Asp Lys Lys Leu His Lys Leu Val Glu
 145 150 155 160

Phe Tyr Leu Arg Asn Tyr Lys Gly Ile Thr Ile Arg Leu Gly Ala Arg
 165 170 175

Arg Asn Leu Glu Leu Tyr Asp Met Thr Tyr Tyr Gln Ala Leu Lys Ser
 180 185 190

Thr Asn Arg Phe Ser Asn Leu Cys Asn Glu Asp Phe Leu Val Phe Ala
 195 200 205

Lys Gln Asp Phe Asp Ile His Glu Ala Gln Asn Gln Lys Gly Leu Gln
 210 215 220

Gln Leu Gln Arg Trp Tyr Ala Asp Cys Arg Leu Asp Thr Leu Asn Phe
 225 230 235 240

Gly Arg Asp Val Val Ile Ile Ala Asn Tyr Leu Ala Ser Leu Ile Ile
 245 250 255

Gly Asp His Ala Phe Asp Tyr Val Arg Leu Ala Phe Ala Lys Thr Ser
 260 265 270

Val Leu Val Thr Ile Met Asp Asp Phe Phe Asp Cys His Gly Ser Ser
 275 280 285

Gln Glu Cys Asp Lys Ile Ile Glu Leu Val Lys Glu Trp Lys Glu Asn
 290 295 300

Pro Asp Ala Glu Tyr Gly Ser Glu Glu Leu Glu Ile Leu Phe Met Ala
 305 310 315 320

Leu Tyr Asn Thr Val Asn Glu Leu Ala Glu Arg Ala Arg Val Glu Gln
 325 330 335

Gly Arg Ser Val Lys Glu Phe Leu Val Lys Leu Trp Val Glu Ile Leu
 340 345 350

Ser Ala Phe Lys Ile Glu Leu Asp Thr Trp Ser Asn Gly Thr Gln Gln

ES 2 556 221 T3

Ser Trp Leu Lys Ser Ser Ser Lys His Ala Pro Leu Thr Leu Ser Cys
50 55 60

Gln Ile Arg Pro Lys Gln Leu Ser Gln Ile Ala Glu Leu Arg Val Thr
65 70 75 80

Ser Leu Asp Ala Ser Gln Ala Ser Glu Lys Asp Ile Ser Leu Val Gln
85 90 95

Thr Pro His Lys Val Glu Val Asn Glu Lys Ile Glu Glu Ser Ile Glu
100 105 110

Tyr Val Gln Asn Leu Leu Met Thr Ser Gly Asp Gly Arg Ile Ser Val
115 120 125

Ser Pro Tyr Asp Thr Ala Val Ile Ala Leu Ile Lys Asp Leu Lys Gly
130 135 140

Arg Asp Ala Pro Gln Phe Pro Ser Cys Leu Glu Trp Ile Ala His His
145 150 155 160

Gln Leu Ala Asp Gly Ser Trp Gly Asp Glu Phe Phe Cys Ile Tyr Asp
165 170 175

Arg Ile Leu Asn Thr Leu Ala Cys Val Val Ala Leu Lys Ser Trp Asn
180 185 190

Leu His Ser Asp Ile Ile Glu Lys Gly Val Thr Tyr Ile Lys Glu Asn
195 200 205

Val His Lys Leu Lys Gly Ala Asn Val Glu His Arg Thr Ala Gly Phe
210 215 220

Glu Leu Val Val Pro Thr Phe Met Gln Met Ala Thr Asp Leu Gly Ile
225 230 235 240

Gln Asp Leu Pro Tyr Asp His Pro Leu Ile Lys Glu Ile Ala Asp Thr
245 250 255

Lys Gln Gln Arg Leu Lys Glu Ile Pro Lys Asp Leu Val Tyr Gln Met
260 265 270

Pro Thr Asn Leu Leu Tyr Ser Leu Glu Gly Leu Gly Asp Leu Glu Trp
275 280 285

ES 2 556 221 T3

Glu Arg Leu Leu Lys Leu Gln Ser Gly Asn Gly Ser Phe Leu Thr Ser
 290 295 300

Pro Ser Ser Thr Ala Ala Val Leu Met His Thr Lys Asp Glu Lys Cys
 305 310 315 320

Leu Lys Tyr Ile Glu Asn Ala Leu Lys Asn Cys Asp Gly Gly Ala Pro
 325 330 335

His Thr Tyr Pro Val Asp Ile Phe Ser Arg Leu Trp Ala Ile Asp Arg
 340 345 350

Leu Gln Arg Leu Gly Ile Ser Arg Phe Phe Gln His Glu Ile Lys Tyr
 355 360 365

Phe Leu Asp His Ile Glu Ser Val Trp Glu Glu Thr Gly Val Phe Ser
 370 375 380

Gly Arg Tyr Thr Lys Phe Ser Asp Ile Asp Asp Thr Ser Met Gly Val
 385 390 395 400

Arg Leu Leu Lys Met His Gly Tyr Asp Val Asp Pro Asn Val Leu Lys
 405 410 415

His Phe Lys Gln Gln Asp Gly Lys Phe Ser Cys Tyr Ile Gly Gln Ser
 420 425 430

Val Glu Ser Ala Ser Pro Met Tyr Asn Leu Tyr Arg Ala Ala Gln Leu
 435 440 445

Arg Phe Pro Gly Glu Glu Val Leu Glu Glu Ala Thr Lys Phe Ala Phe
 450 455 460

Asn Phe Leu Gln Glu Met Leu Val Lys Asp Arg Leu Gln Glu Arg Trp
 465 470 475 480

Val Ile Ser Asp His Leu Phe Asp Glu Ile Lys Leu Gly Leu Lys Met
 485 490 495

Pro Trp Tyr Ala Thr Leu Pro Arg Val Glu Ala Ala Tyr Tyr Leu Asp
 500 505 510

His Tyr Ala Gly Ser Gly Asp Val Trp Ile Gly Lys Ser Phe Tyr Arg
 515 520 525

Met Pro Glu Ile Ser Asn Asp Thr Tyr Lys Glu Leu Ala Ile Leu Asp

ES 2 556 221 T3

530								535										540
Phe	Asn	Arg	Cys	Gln	Thr	Gln	His	Gln	Leu	Glu	Trp	Ile	His	Met	Gln			
545						550				555					560			
Glu	Trp	Tyr	Asp	Arg	Cys	Ser	Leu	Ser	Glu	Phe	Gly	Ile	Ser	Lys	Arg			
				565					570					575				
Glu	Leu	Leu	Arg	Ser	Tyr	Phe	Leu	Ala	Ala	Ala	Thr	Ile	Phe	Glu	Pro			
			580					585					590					
Glu	Arg	Thr	Gln	Glu	Arg	Leu	Leu	Trp	Ala	Lys	Thr	Arg	Ile	Leu	Ser			
		595					600					605						
Lys	Met	Ile	Thr	Ser	Phe	Val	Asn	Ile	Ser	Gly	Thr	Thr	Leu	Ser	Leu			
	610					615					620							
Asp	Tyr	Asn	Phe	Asn	Gly	Leu	Asp	Glu	Ile	Ile	Ser	Ser	Ala	Asn	Glu			
625					630					635					640			
Asp	Gln	Gly	Leu	Ala	Gly	Thr	Leu	Leu	Ala	Thr	Phe	His	Gln	Leu	Leu			
				645					650					655				
Asp	Gly	Phe	Asp	Ile	Tyr	Thr	Leu	His	Gln	Leu	Lys	His	Val	Trp	Ser			
			660					665					670					
Gln	Trp	Phe	Met	Lys	Val	Gln	Gln	Gly	Glu	Gly	Ser	Gly	Gly	Glu	Asp			
		675					680					685						
Ala	Val	Leu	Leu	Ala	Asn	Thr	Leu	Asn	Ile	Cys	Ala	Gly	Leu	Asn	Glu			
	690					695					700							
Asp	Val	Leu	Ser	Asn	Asn	Glu	Tyr	Thr	Ala	Leu	Ser	Thr	Leu	Thr	Asn			
705					710					715					720			
Lys	Ile	Cys	Asn	Arg	Leu	Ala	Gln	Ile	Gln	Asp	Asn	Lys	Ile	Leu	Gln			
				725					730					735				
Val	Val	Asp	Gly	Ser	Ile	Lys	Asp	Lys	Glu	Leu	Glu	Gln	Asp	Met	Gln			
			740					745					750					
Ala	Leu	Val	Lys	Leu	Val	Leu	Gln	Glu	Asn	Gly	Gly	Ala	Val	Asp	Arg			
		755					760					765						
Asn	Ile	Arg	His	Thr	Phe	Leu	Ser	Val	Ser	Lys	Thr	Phe	Tyr	Tyr	Asp			
	770					775					780							

ES 2 556 221 T3

Ala Tyr His Asp Asp Glu Thr Thr Asp Leu His Ile Phe Lys Val Leu
785 790 795 800

Phe Arg Pro Val Val
805

<210> 98
<211> 804
<212> PRT
<213> *Salvia sclarea*

<400> 98

5

Met Gly Ser Ser His His His His His His Ser Ser Gly Leu Val Pro
1 5 10 15

Arg Gly Ser His Met Thr Ser Val Asn Leu Ser Arg Ala Pro Ala Ala
20 25 30

Ile Ile Arg Arg Arg Leu Gln Leu Gln Pro Glu Phe His Ala Glu Cys
35 40 45

Ser Trp Leu Lys Ser Ser Ser Lys His Ala Pro Phe Thr Leu Ser Cys
50 55 60

Gln Ile Arg Pro Lys Gln Leu Ser Gln Ile Ala Glu Leu Arg Val Thr
65 70 75 80

Ser Leu Asp Ala Ser Gln Ala Ser Glu Lys Asp Ile Ser Leu Val Gln
85 90 95

Thr Pro His Lys Val Glu Val Asn Glu Lys Ile Glu Glu Ser Ile Glu
100 105 110

Tyr Val Gln Asn Leu Leu Met Thr Ser Gly Asp Gly Arg Ile Ser Val
115 120 125

Ser Pro Tyr Asp Thr Ala Val Ile Ala Leu Ile Lys Asp Leu Lys Gly
130 135 140

Arg Asp Ala Pro Gln Phe Pro Ser Cys Leu Glu Trp Ile Ala His His
145 150 155 160

Gln Leu Ala Asp Gly Ser Trp Gly Asp Glu Phe Phe Cys Ile Tyr Asp
165 170 175

ES 2 556 221 T3

Arg Ile Leu Asn Thr Leu Ala Cys Val Val Ala Leu Lys Ser Trp Asn
 180 185 190

Leu Gln Ser Asp Ile Ile Glu Lys Gly Val Thr Tyr Ile Lys Glu Asn
 195 200 205

Val His Lys Leu Lys Gly Ala Asn Val Glu His Arg Thr Ala Gly Phe
 210 215 220

Glu Leu Val Val Pro Thr Phe Met Gln Met Ala Thr Asp Leu Gly Ile
 225 230 235 240

Gln Gly Leu Pro Tyr Asp His Pro Leu Ile Lys Glu Ile Ala Asp Thr
 245 250 255

Lys Gln Gln Arg Leu Lys Glu Ile Pro Lys Asp Leu Val Tyr Gln Met
 260 265 270

Pro Thr Asn Leu Leu Tyr Ser Leu Glu Gly Leu Gly Asp Leu Glu Trp
 275 280 285

Glu Arg Leu Leu Lys Leu Gln Ser Gly Asn Gly Ser Phe Leu Thr Ser
 290 295 300

Pro Ser Ser Thr Ala Ala Val Leu Met His Thr Lys Asp Glu Lys Cys
 305 310 315 320

Leu Lys Tyr Ile Glu Asn Ala Leu Lys Asn Cys Asp Gly Gly Ala Pro
 325 330 335

His Thr Tyr Pro Val Asp Ile Phe Ser Arg Leu Trp Ala Ile Asp Arg
 340 345 350

Leu Gln Arg Leu Gly Ile Ser Arg Phe Phe Gln His Glu Ile Lys Tyr
 355 360 365

Phe Leu Asp His Ile Glu Ser Val Trp Glu Glu Thr Gly Val Phe Ser
 370 375 380

Gly Arg Tyr Thr Lys Phe Ser Asp Ile Asp Asp Thr Ser Met Gly Val
 385 390 395 400

Arg Leu Leu Lys Met His Gly Tyr Asp Val Asp Pro Asn Val Leu Lys
 405 410 415

His Phe Lys Gln Gln Asp Gly Lys Phe Ser Cys Tyr Ile Gly Gln Ser

ES 2 556 221 T3

			420					425					430			
Val	Glu	Ser	Ala	Ser	Pro	Met	Tyr	Asn	Leu	Tyr	Arg	Ala	Ala	Gln	Leu	
		435					440					445				
Arg	Phe	Pro	Gly	Glu	Glu	Val	Leu	Glu	Glu	Ala	Thr	Lys	Phe	Ala	Phe	
	450					455					460					
Asn	Phe	Leu	Gln	Glu	Met	Leu	Val	Lys	Asp	Arg	Leu	Gln	Glu	Arg	Trp	
465					470					475					480	
Val	Ile	Ser	Asp	His	Leu	Phe	Asp	Glu	Ile	Lys	Leu	Gly	Leu	Lys	Met	
				485					490					495		
Pro	Trp	Tyr	Ala	Thr	Leu	Pro	Arg	Val	Glu	Ala	Ala	Tyr	Tyr	Leu	Asp	
			500					505						510		
His	Tyr	Ala	Gly	Ser	Gly	Asp	Val	Trp	Ile	Gly	Lys	Ser	Phe	Tyr	Arg	
		515					520					525				
Met	Pro	Glu	Ile	Ser	Asn	Asp	Thr	Tyr	Lys	Glu	Leu	Ala	Ile	Leu	Asp	
		530				535						540				
Phe	Asn	Arg	Cys	Gln	Thr	Gln	His	Gln	Leu	Glu	Trp	Ile	Gln	Met	Gln	
545					550					555					560	
Glu	Trp	Tyr	Asp	Arg	Cys	Ser	Leu	Ser	Glu	Phe	Gly	Ile	Ser	Lys	Arg	
				565					570					575		
Glu	Leu	Leu	Arg	Ser	Tyr	Phe	Leu	Ala	Ala	Ala	Thr	Ile	Phe	Glu	Pro	
			580					585					590			
Glu	Arg	Thr	Gln	Glu	Arg	Leu	Leu	Trp	Ala	Lys	Thr	Arg	Ile	Leu	Ser	
		595					600					605				
Lys	Met	Ile	Thr	Ser	Phe	Val	Asn	Ile	Ser	Gly	Thr	Thr	Leu	Ser	Leu	
	610					615					620					
Asp	Tyr	Asn	Phe	Asn	Gly	Leu	Asp	Glu	Ile	Ile	Ser	Ala	Asn	Glu	Asp	
625					630					635					640	
Gln	Gly	Leu	Ala	Gly	Thr	Leu	Leu	Ala	Thr	Phe	His	Gln	Leu	Leu	Asp	
				645					650					655		
Gly	Phe	Asp	Ile	Tyr	Thr	Leu	His	Gln	Leu	Lys	His	Val	Trp	Ser	Gln	
			660					665					670			

ES 2 556 221 T3

Trp Phe Met Lys Val Gln Gln Gly Glu Gly Ser Gly Gly Glu Asp Ala
 675 680 685

Val Leu Leu Ala Asn Thr Leu Asn Ile Cys Ala Gly Leu Asn Glu Asp
 690 695 700

Val Leu Ser Asn Asn Glu Tyr Thr Ala Leu Ser Thr Leu Thr Asn Lys
 705 710 715 720

Ile Cys Asn Arg Leu Ala Gln Ile Gln Asp Asn Lys Ile Leu Gln Val
 725 730 735

Val Asp Gly Ser Ile Lys Asp Lys Glu Leu Glu Gln Asp Met Gln Ala
 740 745 750

Leu Val Lys Leu Val Leu Gln Glu Asn Gly Gly Ala Val Asp Arg Asn
 755 760 765

Ile Arg His Thr Phe Leu Ser Val Ser Lys Thr Phe Tyr Tyr Asp Ala
 770 775 780

Tyr His Asp Asp Glu Thr Thr Asp Leu His Ile Phe Lys Val Leu Phe
 785 790 795 800

Arg Pro Val Val

REIVINDICACIONES

1. Un polipéptido aislado que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos de al menos un 70 % de identidad con la secuencia de aminoácidos completa de SEC ID N°: 1.
- 5 2. El polipéptido aislado de la reivindicación 1, que comprende una secuencia de aminoácidos de al menos un 80 %, más preferentemente al menos un 90 %, de identidad con SEC ID N°: 1.
3. El polipéptido aislado de la reivindicación 2, que comprende la secuencia de aminoácidos definida en SEC ID N°: 1.
4. El polipéptido aislado de la reivindicación 3, que consiste en la secuencia de aminoácidos definida en SEC ID N°: 1.
- 10 5. El polipéptido aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, derivado de *Salvia Sclarea*.
6. Un ácido nucleico aislado que codifica el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
7. El ácido nucleico aislado de la reivindicación 6, que comprende una secuencia de nucleótidos de al menos un 70 % de identidad con SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma.
- 15 8. El ácido nucleico aislado de la reivindicación 7, que comprende una secuencia de nucleótidos de al menos un 80 %, preferentemente al menos un 90 %, de identidad con SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma.
9. El ácido nucleico aislado de la reivindicación 8, que comprende una secuencia de nucleótidos idéntica a SEC ID N°: 2 o el complemento de la misma.
10. El ácido nucleico aislado de la reivindicación 9, que consiste en la secuencia de nucleótidos definida en SEC ID N°: 2 o en el complemento de la misma.
- 20 11. El ácido nucleico aislado de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, derivado de *Salvia sclarea*.
12. Un vector de expresión que comprende el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11.
13. El vector de expresión de la reivindicación 12, en la forma de un vector viral, un bacteriófago o un plásmido.
14. El vector de expresión de la reivindicación 12 o 13, que incluye el ácido nucleico de la invención unido operativamente al menos a una secuencia reguladora que controla la transcripción, traducción, iniciación o terminación, tal como un promotor, operador o potenciador transcripcional o un sitio de unión ribosomal de ARNm y, opcionalmente, que incluye al menos un marcador de selección.
- 25 15. Un organismo no humano transformado con el vector de expresión de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, de modo que albergue el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 y exprese o sobreexpresa heterológicamente el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
- 30 16. El organismo no humano de la reivindicación 15, en el que dicho organismo no humano es una planta, un procarionta o un hongo.
17. El organismo no humano de la reivindicación 15, en el que dicho organismo no humano es un microorganismo.
18. El organismo no humano de la reivindicación 17, en el que dicho microorganismo es una bacteria o levadura.
- 35 19. El organismo no humano de la reivindicación 18, en el que dicha bacteria es *E. coli* y dicha levadura es *Saccharomyces cerevisiae*.
20. Una célula eucariota superior transformada con el vector de expresión de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, de modo que albergue el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 y exprese el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
- 40 21. La célula eucariota superior de la reivindicación 20, en la que dicha célula eucariota superior es una célula de planta o una célula fúngica.
22. Un procedimiento de producción de al menos un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa que comprende:
  - 45 a) cultivar un organismo o célula no humano transformado con el vector de expresión de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, de modo que albergue un ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 y exprese o sobreexpresa un polipéptido codificado por dicho ácido nucleico y que tenga una actividad de esclareol sintasa;
  - b) aislar los polipéptidos que tienen una actividad de esclareol sintasa del organismo o célula no humano

cultivado en la etapa a).

- 5 23. El procedimiento de la reivindicación 22, que comprende además, antes de la etapa a), transformar un organismo o célula hospedador no humano con el vector de expresión de cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, de modo que albergue un ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 y exprese o sobreexpresa el polipéptido codificado por dicho ácido nucleico.
24. Un procedimiento de producción de un polipéptido variante que tiene una actividad de esclareol sintasa que comprende las etapas de:
- 10 a) seleccionar un ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11;
 b) modificar el ácido nucleico seleccionado para obtener al menos un ácido nucleico mutante;
 c) transformar las células o los organismos unicelulares hospedadores con la secuencia de ácido nucleico mutante para expresar un polipéptido codificado por la secuencia de ácido nucleico mutante;
 d) cribar sistemáticamente el polipéptido para al menos una propiedad modificada; y,
 e) opcionalmente, si el polipéptido no tiene ninguna actividad de esclareol sintasa variante deseada, repetir las etapas de procedimiento (a) a (d) hasta que se obtenga un polipéptido con una actividad de esclareol sintasa variante deseada; opcionalmente, si se identificó un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa variante deseada en la etapa d), aislar el correspondiente ácido nucleico mutante obtenido en la etapa (c).
- 15 25. Un procedimiento de producción de esclareol que comprende
- a) poner en contacto difosfato de labdenodiol (LPP) con un polipéptido que tiene una actividad de esclareol sintasa y que comprende una secuencia de aminoácidos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4;
 y
 b) opcionalmente, aislar el esclareol producido en la etapa a).
- 20 26. El procedimiento de la reivindicación 25, en el que la etapa a) se realiza por cultivo de un organismo o célula no humano capaz de producir LPP y transformar para expresar dicho polipéptido en condiciones que conducen a la producción de esclareol.
- 25 27. El procedimiento de la reivindicación 26, que comprende además, antes de la etapa a), transformar el organismo o célula no humano capaz de producir LPP con un ácido nucleico que codifica dicho polipéptido, de modo que dicho organismo exprese dicho polipéptido.
28. El procedimiento de la reivindicación 26 a 27, en el que dicho organismo no humano es una planta, un procarionta o un hongo.
- 30 29. El procedimiento de la reivindicación 26 o 27, en el que dicho organismo no humano es un microorganismo.
30. El procedimiento de la reivindicación 29, en el que dicho microorganismo es una bacteria o levadura.
31. El procedimiento de la reivindicación 30, en el que dicha bacteria es *E. coli* y dicha levadura es *Saccharomyces cerevisiae*.
- 35 32. El procedimiento de la reivindicación 26 o 27, en el que dicha célula no humana es una célula eucariota superior seleccionada entre células de planta o células fúngicas.

Figura 1

difosfato de labdenodiol

esclareol
(-)-(13R)-14-labdeno-8,13-diol

(-)-Ambrox

difosfato de geranylgeranilo (GGPP)

ent-kaureno

ent-cassa-12,15-dieno

Figura 2

Figura 3 (1ª parte)

10	20	30	40	50	60	70	80	
....								

								Estemodeno sintasa
MMLSSSYGGQFP	PLGTRPKRST	TVVPLPVV	TRATAGGVRN	LEVVGNAGTL	QGMIDELR	VIVRKLQGV	ELSPS	
90	100	110	120	130	140	150	160	
....								

								Contig-250
SYDTAWAMVPV	QGSQSPCF	QCVWILQ	NQQEDG	SWGHSAG	PSGEV	NKDILL	STLAC	Estemodeno sintasa
170	180	190	200	210	220	230	240	
....								

								Estemodeno sintasa
GRNFVAIDG	QCAAPV	GFNITF	SGMLHL	AIGMGL	KFPV	METDID	SIFRLRE	Estemodeno sintasa
250	260	270	280	290	300	310	320	
....								

								Congig-231
KKYDLKNGSV	FNSPST	TAASAI	HSCNDR	ALDY	LVSL	TSKLG	GPVPAI	Estemodeno sintasa
330	340	350	360	370	380	390	400	
....								

								Contig-147
RDILD	MTYSCW	MQDEE	EIML	DMAT	CAKAF	RLLF	HGY	Estemodeno sintasa
410	420	430	440	450	460	470	480	
....								

								Estemodeno sintasa
EDLILE	NISSW	SAKLL	KQQL	SSNK	IMKSL	MEVEY	ALKY	Estemodeno sintasa

Figura 4 (1ª parte)

Figura 4 (3ª parte)

DTNEGRDV	LIIGDHAFDYV	AKT	VLT	DDFFD	CHGSS	ECDK	I	LV	WKE	P	A	GSE	I	F	AL	SsTps1132		
D I FARSKSA	YCYFSAATA	ESAPE	RDAP	SWAKGGVLT	DDFFD	GCSMEELKNLI	HVEKW	V	VST	CSSHNV	I	FSALK	T	SsTps1137				
D I FAROK	A-YCYFSAAT	TSEPE	CDAR	SWAKNGVLT	DDFFD	GGS	EELVNL	I	LVEKW	ASG	IG	CS	V	F	AL	BAB19275		
GT	Y-TSYFIIAA	FEPEYADAR	AKY	ITA	DDFFD	CFIC	EELON	I	LVE	W	GYSTVG	RSERVRIFF	AL	KM	AAS98912			
D I HFAROK	T-YCYLSGAAT	TERPE	GYARTSWA	T	MLTAV	DDFFD	GGL	EOENL	AL	EKW	EPG	D	YSE	V	I	FOAL	ABH10734	
D I FAROK	A-YCYFSAAT	FSEPOSDAR	SWAKN	VLT	DDFFD	GGS	EELLNLI	I	LVEKW	I	VAV	CCSE	V	I	FSAL	CAO64942		
D I FAROKTA	YCYFSAAT	ESSP	SDAR	SWAKS	LTTV	DDFFD	GGS	ELVNF	H	EKW	V	VN	CCSE	VG	F	ALKDA	BAB12441	
D I FERLH	G-YCYF	AAAT	TDPE	HDAR	WA	NGVLT	DDF	DCGGS	EELDNLI	LVEKW	P	G	VG	CS	V	I	Q39548	
VNEAF	ARVEQGR	VKEF	K	W	E	LS	FKIELDTS	GTQQ	F	EY	S	SNGSRLTGL	Q	FVGVKLS	E	M	ECTDIA	SsTps1132
REICKGLKQGR	TN	IG	MIDLLN	MM	ET	WAP	NY	P	EYMS	V	SFALGPVLP	LY	LVGPKLSEE	ANHPEYKLI	SsTps1137			
CEICKALPWQGR	VMR	I	WIALLE	MR	EA	MLK	KV	P	EYME	G	VSFALGPVLP	LY	FVGPKLPEE	G	CEYKLI	BAB19275		
VEEIAKAEKQGR	CVKD	I	M	D	L	CMVLELDL	MIKIKSTP	EY	SV	CV	IG	PCFVLT	LYT	GPKLS	P	SEVSALCN	AAS98912	
VNEIGAKASALQCHDVTK	MLH	CMKVEA	WQR	QH	P	F	EYME	GMVSLGOGATV	SAL	L	CEKLEPG	ELEFYD	ABH10734					
SEIGVRSASAWQAR	VTS	I	MLKLL	ML	EA	WVS	KSAP	EYMT	V	SFALGPVLP	LY	FVGPKLSEE	EGPECHKI	CAO64942				
VCWIGDRKFKIOER	TS	I	WLDL	ML	EA	IMAK	GS	P	EYME	G	VSFALGPVLP	LY	F	GVKLS	Q	SEYHKL	BAB12441	
VCEIGFALVWQGR	VMR	I	GWLALL	VMR	EA	WST	KV	P	GEYMEQ	V	SFALGPI	LPML	FVGPKLSEE	G	CEYOKL	Q39548		
H	CMVGRLLND	CS	RER	ENIAGK	YS	L	ATEKDGRK	EATAE	NEM	YHWR	L	VY	-KESI	PRRCKD	FL	WAKGTFY	SsTps1132	
LMSTCGRLLNDIRG	REL	G	KLN	SLYMAN	--	HGGE	EALISE	KSW	SRRELL	LVL	GKSV	P	PCK	LFMHCS	L	SsTps1137		
LMSTSGRLLNDIR	RESSEG	KLN	SLYMIS	--	AGCK	EEATEA	KGD	RTRELL	LVL	-	NST	PRACKDLEW	MSC	L	BAB19275			
CTAVARLNDIHS	REQAES	-STNM	S	L	TQ	--	SOGT	EEALF	KEM	KRELLG	VL	NKESO	P	VCKDLEWTTINAAY	AAS98912			
LMSTCGRLLNDIRGI	REES	GKMTNG	SLL	HA	--	SGGS	V	EAKTE	MKR	SRR	LISLV	GE	EGP	PRPCKOLFV	MCK	L	ABH10734	
LMSTCGRLLNDIHS	RES	EG	KAN	LHMIH	--	GNGVT	E	AIRE	KGL	ORRELO	LVL	EKST	PRICKDLEW	MSK	T	CAO64942		
MSTOGRLLNDIHS	REK	AG	KLN	LYMSD	--	GKSGSV	EEV	PE	KILT	OR	E	LVL	TKGSV	PRVCKD	FVNM	Q	BAB12441	
LMSTAGRLLNDIRS	REC	EG	KLN	SLWMI	--	GNGN	EEAIFA	KGDF	RAIRELLGLVL	-	N	T	PRACKDLEW	MS	L	Q39548		

Figura 5

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
SstTps1132 1132-2-5	....	MSLAFNVGVT PFSGQRVGS RKEKFFVQ GFFVTPNR SRLIVNCS LTTIDFMA KMKENFK REDDKFF TTTTLR SDDIPSN LCIIDTL QLRGV DQFFQ YEINT ILDNT FRLW QEKHK VIYGN	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	MAKMKENFK REDDKFF TTTTLR SDDIPSN LCIIDTL QLRGV DQFFQ YEINT ILDNT FRLW QEKHK VIYGN								
SstTps1132 1132-2-5	....	VTTHAMAF RLLRVK GYEVS SEELAF YGNQEA VSQOT NDLPM IILYRA ANER IYEEER SLEKIL AWTT IFLNK QVOD NSIP DKLH KLV EFL RNY KGIT IRL GAR RNLE LYD MT YYQAL	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	VTTHAMAF RLLRVK GYEVS SEELAF YGNQEA VSQOT NDLPM IILYRA ANER IYEEER SLEKIL AWTT IFLNK QVOD NSIP DKLH KLV EFL RNY KGIT IRL GAR RNLE LYD MT YYQAL								
SstTps1132 1132-2-5	....	KSTNRFS NLCNED FLVFA KQDF DIEHA QNK GLQ LOR WYAD CR LD TLN FGR D V V I I AN YLA S LI G D H A F D V V R L A F A K T S V L T M D D F F D C H G S S O E C D K I I E L V K E W K E N P D A E Y G	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	KSTNRFS NLCNED FLVFA KQDF DIEHA QNK GLQ LOR WYAD CR LD TLN FGR D V V I I AN YLA S LI G D H A F D V V R L A F A K T S V L T M D D F F D C H G S S O E C D K I I E L V K E W K E N P D A E Y G								
SstTps1132 1132-2-5	....	SEELEIL FMAL YNTV NELA ERAR VEQ GR SV KE FL V K L W E I L S A F K I E L D T W S N G T Q O S F D E Y I S S W L S N G S R L T G L T M Q F V G V K L S D E M L M S E C T D L A R H V C M V G R L L N D V C S S E R	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	SEELEIL FMAL YNTV NELA ERAR VEQ GR SV KE FL V K L W E I L S A F K I E L D T W S N G T Q O S F D E Y I S S W L S N G S R L T G L T M Q F V G V K L S D E M L M S E C T D L A R H V C M V G R L L N D V C S S E R								
SstTps1132 1132-2-5	....	EREENI AGK S Y S I L L A T E K D G R K V S E D E A I A E I N E M V E Y H R K V L Q I V Y K E S I L P R C K D V F L E M A K G T F Y A I G I N D E L T S P Q S K E D M K S F V E	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	EREENI AGK S Y S I L L A T E K D G R K V S E D E A I A E I N E M V E Y H R K V L Q I V Y K E S I L P R C K D V F L E M A K G T F Y A I G I N D E L T S P Q S K E D M K S F V E								

Figura 6

Figura 7

Figura 8