


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 598 034**

51 Int. Cl.:

C07K 16/28 (2006.01)

C07K 16/46 (2006.01)

C12N 15/13 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **10.05.2005 E 11150339 (7)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **13.07.2016 EP 2377889**

54 Título: **Anticuerpos anti-PSGL-1**

30 Prioridad:

10.05.2004 US 569892 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

24.01.2017

73 Titular/es:

**ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A. (100.0%)
Kingsfordweg 103
1043 GP Amsterdam, NL**

72 Inventor/es:

**LIN, RONG-HWA;
CHANG, CHUNG NAN;
CHEN, PEI-JIUN y
HUANG, CHIU-CHEN**

74 Agente/Representante:

LEHMANN NOVO, María Isabel

Observaciones:

Véase nota informativa (Remarks, Remarques o Bemerkungen) en el folleto original publicado por la Oficina Europea de Patentes

ES 2 598 034 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Anticuerpos anti-PSGL-1

5 **Solicitud relacionada**

Esta solicitud reclama la prioridad sobre la solicitud provisional de EE. UU. con N° de serie 60/569.892, presentada el 10 de mayo de 2004.

10 **ANTECEDENTES**

10 Células T excesivamente agresivas conducen a menudo a respuestas inmunes indeseadas, las cuales, a su vez, provocan diversos trastornos, p.ej., enfermedades autoinmunes, rechazos de trasplantes, enfermedades alérgicas y cánceres derivados de células T. Por lo tanto, el control de las células T agresivas es crítico para tratar este tipo de trastornos. La actividad de estas células puede ser contenida mediante inmunosupresión o mediante inducción de la tolerancia inmunológica. Una solución alternativa es la inducción de la apoptosis, que se piensa que está implicada en la eliminación de células indeseadas, incluidas células T excesivamente agresivas. Véase, p. ej., Kabelitz et al. (1993) Immunol Today 14, 338-340; y Raff (1992) Nature 356, 397-399.

20 El documento US20030049252 se refiere a compuestos que se unen a P-selectina glicoproteína ligando-1 (PSGL-1 – siglas en inglés) sobre la superficie de células T o células asesinas naturales (NK – siglas en inglés) que se pueden utilizar para inducir el agotamiento de células T o células NK y/o la apoptosis.

SUMARIO

25 Esta invención se refiere a anticuerpos que inducen la apoptosis tras la unión a P-selectina glicoproteína ligando-1 (PSGL-1) sobre células T activadas.

30 En un aspecto, la invención se refiere a un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1 que comprende una primera cadena de inmunoglobulina y una segunda cadena de inmunoglobulina, en donde la primera cadena, la cual es una cadena ligera, y la segunda cadena, la cual es una cadena pesada, contienen, respectivamente, las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12; o las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18, así como también las composiciones que comprenden dichos anticuerpos.

35 En otro aspecto, la presente invención se refiere al uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo cualquiera de la invención en la fabricación de un medicamento para modular una respuesta inmune mediada por células T en un sujeto que tiene o que está en riesgo de tener una afección relacionada con una respuesta inmune excesiva mediada por células T, en donde la afección es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica o un cáncer de células T.

40 En un aspecto adicional, la presente invención se refiere al uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de la invención en la fabricación de un medicamento para tratar o prevenir el rechazo del trasplante alogeneico o xenogeneico, opcionalmente en donde el anticuerpo es quimérico o está humanizado.

45 En otro aspecto, la presente invención se refiere al uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de la invención en la fabricación de un medicamento para tratar la enfermedad de injerto frente a hospedante (GVHD – siglas en inglés) en un sujeto, opcionalmente en donde el anticuerpo es quimérico o está humanizado.

50 En un aspecto adicional, la presente invención se refiere a un ácido nucleico aislado que comprende una secuencia que codifica un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1 que comprende

(i) las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12;

(ii) las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18;

o (iii) las SEQ ID NOs: 21 y 22 o 23 y 24;

así como también a un vector que comprende la secuencia de ácido nucleico

55 En otro aspecto, la presente invención se refiere a una célula hospedante que comprende un ácido nucleico que codifica un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1 que comprende

(i) las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12; o

(ii) las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18.

60 Una cadena de inmunoglobulina que tiene tres secuencias que (i) contienen, respectivamente, RSSQSIVHNDGNTYFE, KVSNRFS y FQGSYVPLT (SEQ ID Nos. 1-3); (ii) contienen, respectivamente, SFGMH, YINGGSSTIFYANAVKG y YASYGGGAMDY (SEQ ID NOs: 4-6); (iii) contienen, respectivamente,

ES 2 598 034 T3

RASSTVNSTYLH, GSSNLAS y QQYSGYPLT (SEQ ID NOs: 7-9); (iv) contienen, respectivamente, AYYIH, VNPNTGGTSYNPKFKG y SGSPYYRYDD (SEQ ID NOs: 10-12); (v) contienen, respectivamente, RSSQSIVNSNGNTYLE, KVSNRFS y FQGSHVPWT (SEQ ID NOs: 13-15); o (vi) contienen, respectivamente, TNAMNWVRQAPGKGLE, TYYADSVKD y GGSYWFYDV (SEQ ID NOs: 16-18) se divulga en esta memoria.

5 Cada uno de los seis conjuntos de secuencias recién descritos corresponde a las tres regiones determinantes de la complementariedad (CDRs – siglas en inglés) de cadena ligera o pesada de un anticuerpo que se une a PSGL-1, tales como las de los tres anticuerpos 15A7, 43B6 y 9F9 descritos en los ejemplos que figuran más adelante, En lo que sigue se muestran las regiones variables (V) de cadena ligera y cadena pesada de estos tres anticuerpos (SEQ ID NOs: 19-26, las CDRs están subrayadas y destacadas):

10 SEQ ID NO: 19 (región V de la cadena ligera de 15A7 de ratón):

```
1 ATGAAGTTGCCTGTTAGGCTGTTGGTGTGATGTTCTGGATTCCTGCTTCCAGCAGTGAT
1 M K L P V R L L V L M F W I P A S S S D

61 ATTTTGATGACCCAAACTCCACTGTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCAATA
21 I L M T Q T P L S L P V S L G D Q A S I

121 TCTTGCAGATCTAGTCAGAGCATTGTACATAATGATGGAAACACCTATTTTGAATGGTAC
41 S C R S S Q S I V H N D G N T Y F E W Y

181 CTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAACTCCTGATCTACAAAGTTTCCAATCGATTTTCT
61 L Q K P G Q S P K L L I Y K V S N R F S

241 GGGTCCCAGACAGGTTTCAGTGGCAGTGGATCAGGGACACATTTCACTCAACATCAGC
81 G V P D R F S G S G S G T H F T L N I S

301 AGAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGAATTTATTACTGCTTTCAAGGTTTCATATGTTCTCTC
101 R V E A E D L G I Y Y C F Q G S Y V P L

361 ACGTTCGGTGCTGGGACCAAGCTGGAGCTGAAA
121 T F G A G T K L E L K
```

15 SEQ ID NO: 20 (región V de la cadena pesada de 15A7 de ratón):

```
1 ATGGACTCCAGGCTCAATTTAGTTTTCCCTTGCCTTATTTTAAAAGGTGTCCAGTGTGAT
1 M D S R L N L V F L V L I L K G V Q C D

61 GTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTAGTGCAGCCTGGAGGGTCCCGGAACTCTCC
21 V Q L V E S G G G L V Q P G G S R K L S

121 TGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTCAGTAGCTTTGGAATGCACTGGGTTTCGTCAGGCTCCA
41 C A A S G F T F S S F G M H W V R Q A P

181 GAGAAGGGGCTGGAGTGGGTGCGATACATTAATGGTGGCAGTAGTACCATCTTCTATGCA
61 E K G L E W V A Y I N G G S S T I F Y A

241 AACGCAGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATCCCAAGAATACCCTGTTCCCTG
81 N A V K G R F T I S R D N P K N T L F L

301 CAAATGACCATTCTAAGGTCTGAGGACACGGCCATTTATTACTGTGGAAGGTATGCTAGT
101 Q M T I L R S E D T A I Y Y C G R Y A S

361 TACGGAGGGGGTGCTATGGACTATTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCA
121 Y G G G A M D Y W G Q G T S V T V S S
```

SEQ ID NO: 21 (región V de la cadena ligera de 43B6 de ratón):

ES 2 598 034 T3

1 ATGGATTTTCTGGTGCAGATTTTCAGCTTCTTGCTAATCAGTGCCTCAGTTGCAATGTCC
1 M D F L V Q I F S F L L I S A S V A M S
61 AGAGGAGAAAATGTGCTCACCCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCATCTCCAGGGGAAAAG
21 R G E N V L T Q S P A I M S A S P G E K
121 GTCACCATGACCTGCAGGGCCAGCTCAACTGTAAATTCCTTACTTGCCTGGTTCCAG
41 V T M T C R A S S T V N A T Y L H W F Q
181 CAGAAGTCAGGTGCCTCCCCAAACTCTGGATTTATGGCTCATCCAACCTGGCTTCTGGA
61 Q K S G A S P K L W I Y G S S N L A S G
241 GTCCCTGCTCGCTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACCTCTTACTCTCTCACAATCAGCAGT
81 V P A R F S G S G S G T S Y S L T I S S
301 GTGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAGTACAGTGGTTACCCACTCAG
101 V E A E D A A T Y Y C Q Q Y S G Y P L T
361 TTCGGTGCTGGGACCACGCTGGAGCTGAAA
121 F G A G T T L E L K

SEQ ID NO: 22 (región V de la cadena pesada de 43B6 de ratón):

1 ATGGAATGGAGCTGGGTCTTTCTCTTCCCTCCTGTGTCAGTCACTACAGGTGTCCACTCTGAG
1 M E W S W V F L F L L S V T T G V H S E
61 GTCCAGCTGCAGCAGTCTGGACCTGACCTGGTGAAGCCTGGGGCTTTAGTGAAGATATCC
21 V Q L Q Q S G P D L V K P G A L V K I S
121 TGCAAGGCTTCTGGTTACTCATTCACTGCCTACTACATTCACTGGGTGAAGCAGAGCCAT
41 C K A S G Y S F T A Y Y I H W V K Q S H
181 GGAAAGAGCCTTGAGTGGATTGGACGTGTTAATCCTAATACTGGTGGTACTAGCTACAAC
61 G K S L E W I G R V N P N T G G T S Y N
241 CCGAAGTTCAAGGGCAAGGCCATATTAATGTAGATAAGTCATCCAGCACAGCCTACATG
81 P K F G K K A I L N V D K S S S T A Y M
301 GAGCTCCGCAGCCTGACATCTGAGGACTCTGCGGTCTATTACTGTGCAAGATCGGGATCC
101 E L R S L T S E D S A V Y Y C A R S G S
361 CCCTACTATAGGTACGACGACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCA
121 P Y Y R Y D D W G Q G T T L T V S S

5 SEQ ID NO: 23 (región V de la cadena ligera de 9F9 de ratón):

ES 2 598 034 T3

```

1 ATGAAGTTGCCTGTTAGGCTGTTGGTGCTGATGTTCTGGATTCCCTGCTTCCAGCAGTGAT
1 M K L P V R L L V L M F W I P A S S S D

61 GTTTTGATGACCCAAACTCCACTCTCCCTGCCTGTCAGTCTTGGAGATCAAGCCTCCATC
21 V L M T Q T P L S L P V S L G D Q A S I

121 TCTTGCAGATCTAGTCAGAGCATTGTAAATAGTAATGGAAACACCTATTTAGAATGGTAC
41 S C R S S Q S I V N S N G N T Y L E W Y

181 CTGCAGAAACCAGGCCAGTCTCCAAAGCTCCTGATCTACAAAGTTTCCAACCGATTTTCT
61 L Q K P G Q S P K L L I Y K V S N R F S

241 GGGTCCCAGACAGGTTTTCAGTGGCAGTGGATCAGGGACAGATTTTCACTCAAGATCAGC
81 G V P D R F S G S G S G T D F T L K I S

301 AGAGTGGAGGCTGAGGATCTGGGAGTTTATTACTGCTTTCAAGGTTTACATGTTCCGTGG
101 R V E A E D L G V Y Y C F Q G S H V P W

361 ACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA
121 T F G G G T K L E I K

```

SEQ ID NO: 24 (región V de la cadena pesada de 9F9 de ratón):

```

1 ATGCTGTTGGGGCTGAAGTGGGTTTTCTTTGTTGTTTTTTATCAAGGTGTCATTGTGAG
1 M L L G L K W V F F V V F Y Q G V H C E

61 GTGCAGCTTGTGAGACTGGTGGAGGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTCTCA
21 V Q L V E T G G G L V Q P K G S L K L S

121 TGTGCAGCCTCTGGATTACCTTCAATACCAATGCCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCA
41 C A A S G F T F N T N A M N W V R Q A P

181 GGAAAGGGTTTGGAAATGGGTTGCTCGCATAAGAAGTAAAAGTAATAATTATGCAACATAT
61 G K G L E W V A R I R S K S N N Y A T Y

241 TATGCCGATTTCAGTGAAAGACAGGTTTACCATCTCCAGAGATGATACACAAAGCATGATC
81 Y A D S V K D R F T I S R D D T Q S M I

301 TATCTGCAAATGAACAACCTTGA AAACTGAGGACACAGGCATGTATTACTGTGTGAGAGGG
101 Y L Q M N N L K T E D T G M Y Y C V R G

361 GGAAGCTACTGGTACTTTCGATGTCTGGGGCGCAGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA
121 G S Y W Y F D V W G A G T T V T V S S

```

5 Dado que la especificidad de unión a antígeno de un anticuerpo viene determinada por sus CDRs de cadenas ligera y pesada, las CDRs anteriores se pueden utilizar para generar derivados de anticuerpos que conserven la especificidad de unión al antígeno. Ejemplos de derivados de anticuerpos incluyen anticuerpos quiméricos, anticuerpos humanizados y sus equivalentes funcionales. Se muestran a continuación la región V de la cadena ligera (SEQ ID NO: 25) y la región V de la cadena pesada (SEQ ID NO: 26) de un anticuerpo 15A7 humanizado, que incluye las SEQ ID NOs: 1-3 y las SEQ ID NOs: 4-6, respectivamente:

10 SEQ ID NO: 25 (región V de la cadena ligera de 15A7 humanizado):

```

DIQMTQSPSSLSASVGRVITTCRSSQSIVHNDGNTYFEWYQQKPGKAPKLLIYKVSNRFSGVPSRFSFGSG
SGTHFTLTISLQPEDFATYYCFQGSYVPLTFGQGTKVEIK

```

15 SEQ ID NO: 26 (región V de la cadena pesada de 15A7 humanizado):

```

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPGKGLEWVAYINGGSSTIFYANAVKGRFTIS
RDNAKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCYASYGGGAMDYWGQGTLTVTSS

```

Esta invención también recoge un ácido nucleico aislado que comprende una secuencia que codifica un anticuerpo

que se une específicamente a PSGL-1 que comprende

- (i) las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12;
- (ii) las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18;
- (iii) las SEQ ID NOs: 21 y 22 o 23 y 24.

5

El término “anticuerpo” o la expresión “cadena de inmunoglobulina” se refiere a un polipéptido aislado, es decir, un polipéptido que ha sido sustancialmente separado de otras proteínas, lípidos y ácidos nucleicos con los que está asociado de forma natural. El polipéptido puede constituir al menos el 50, 70 ó 95% en peso seco de la preparación purificada. Un “ácido nucleico aislado” se refiere a un ácido nucleico, cuya estructura no es idéntica a la de cualquier ácido nucleico que se produzca de forma natural o a la de cualquier fragmento de un ácido nucleico genómico que se produzca de forma natural. Por lo tanto, la expresión cubre, por ejemplo, (a) un ADN que tiene la secuencia de parte de una molécula de ADN genómico que se produce de forma natural, pero que no está flanqueada por las dos secuencias codificadoras que flanquean esa parte de la molécula en el genoma del organismo en el que se produce de forma natural; (b) un ácido nucleico incorporado en un vector o en el ADN genómico de un procarionte o eucariote de una manera tal que la molécula resultante no es idéntica a cualquier vector o ADN genómico que se produce de forma natural; (c) una molécula separada tal como un ADNc, un fragmento genómico, un fragmento producido por reacción en cadena de la polimerasa (PCR – siglas en inglés), o un fragmento de restricción; y (d) una secuencia de nucleótidos recombinantes que es parte de un gen híbrido, es decir, un gen que codifica una proteína de fusión. El ácido nucleico de esta invención se puede utilizar para expresar un polipéptido de esta invención. Para este fin, se puede enlazar operativamente el ácido nucleico a secuencias reguladoras adecuadas para generar un vector de expresión.

25

Un vector se refiere a una molécula de ácido nucleico capaz de transportar otro ácido nucleico al que está enlazado, y también capaz de replicación autónoma o integración en un ADN hospedante. Ejemplos incluyen un plásmido, cósmido y un vector viral. Un vector de esta invención incluye un ácido nucleico en una forma adecuada para la expresión del ácido nucleico en una célula hospedante. Preferiblemente, el vector incluye una o más secuencias reguladoras operativamente enlazadas a la secuencia del ácido nucleico a expresar. Ejemplos de una secuencia reguladora incluyen promotores, reforzadores y otros elementos para el control de la expresión (p. ej., señales de poliadenilación). Secuencias reguladoras también incluyen las que dirigen la expresión constitutiva de una secuencia de nucleótidos, así como secuencias reguladoras específicas para el tejido y/o inducibles. El diseño de un vector de expresión de este tipo se basa en consideraciones que incluyen la elección de la célula hospedante a transformar y del nivel de expresión deseado. Un vector de expresión se puede introducir en células hospedantes para producir un polipéptido de esta invención. La invención también incluye una célula hospedante que contiene el ácido nucleico arriba descrito. Una célula hospedante se refiere a una célula que contiene una secuencia codificadora o una secuencia no codificadora exógena. Una secuencia exógena se puede introducir en una célula mediante transfección con fosfato de calcio, transfección mediada por DEAE-dextrano o electroporación. Células hospedantes adecuadas incluyen células bacterianas (p. ej., *E. coli*, *Bacillus subtilis* y *Salmonella typhimurium*), células de levaduras (p. ej., *Saccharomyces cerevisiae* y *Schizosaccharomyces pombe*), células vegetales (p. ej., *Nicotiana tabacum* y *Gossypium hirsutum*) y células de mamíferos (p. ej., células de hibridoma murinas, células CHO y fibroblastos 3T3).

45

Para producir una cadena de inmunoglobulina, se puede disponer una célula hospedante en un cultivo bajo condiciones que permitan la expresión de un polipéptido codificado por un ácido nucleico arriba descrito y aislar el polipéptido a partir del cultivo. Alternativamente, un ácido nucleico de esta invención se puede transcribir y traducir *in vitro*, por ejemplo utilizando secuencias reguladoras del promotor T7 y T7 polimerasa.

50

En el alcance de esta invención está incluido un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1, que comprende una primera cadena de inmunoglobulina y una segunda cadena de inmunoglobulina, en donde la primera cadena, la cual es una cadena ligera, y la segunda cadena, la cual es una cadena pesada, contienen, respectivamente, las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12; o las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18. Éste se forma mediante una primera cadena de inmunoglobulina y una segunda cadena de inmunoglobulina que contienen, respectivamente, las CDRs de la cadena ligera y las CDRs de la cadena pesada del anticuerpo 15A7, 43B6 o 9F9 de ratón arriba mencionado. Preferiblemente, este anticuerpo se forma mediante las cadenas ligera y pesada de 15A7.

55

Un anticuerpo que (i) se une específicamente a P-selectina glicoproteína ligando-1 sin interferir en la unión entre P-selectina glicoproteína ligando-1 y P-selectina, y (ii) tras la unión a P-selectina glicoproteína ligando-1 sobre una célula T activada, induce la muerte de la célula T se divulga en esta memoria. En una realización, este anticuerpo se une específicamente a P-selectina glicoproteína ligando-1.

60

Además, otro anticuerpo que se une específicamente a los residuos aminoácidos 115-126 de P-selectina glicoproteína ligando-1 humano maduro se divulga en esta memoria. Preferiblemente, el anticuerpo se une

específicamente a los residuos aminoácidos 117-123. Más preferiblemente, se une específicamente a los residuos aminoácidos 119-121, una secuencia consenso entre todos los epítopos sometidos a ensayo. De hecho, la mutación de uno o más de estos tres residuos aminoácidos anula la unión del anticuerpo. En un ejemplo, este anticuerpo, tras la unión a P-selectina glicoproteína ligando-1 sobre una célula T activada, induce la muerte de la célula T.

En una realización, uno de los dos anticuerpos mencionados inmediatamente arriba se forma mediante una cadena ligera y una cadena pesada que contienen, respectivamente, SEQ ID NOs: 1-3 y SEQ ID NOs: 4-6 (p. ej., SEQ ID NOs: 19 y 20, o SEQ ID NOs: 25 y 26).

En un aspecto adicional, se divulga un método para inducir la muerte de una célula T activada. El método incluye poner en contacto uno de los tres anticuerpos arriba descritos con una célula T activada, en que la unión del anticuerpo a la célula T activada induce la muerte de la célula.

La invención también recoge el uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en la fabricación de un medicamento para modular una respuesta inmune mediada por células T en un sujeto que padece o está en riesgo de padecer una afección relacionada con una respuesta inmune excesiva mediada por células T, en donde la afección es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica o un cáncer de células T. Una "respuesta inmune excesiva mediada por células T" se refiere a una respuesta provocada por un nivel excesivo de células T activadas. Un nivel excesivo se refiere a (1) un nivel mayor que un nivel normal, y (2) un nivel mayor que el deseado en un individuo, incluso a pesar de que no sea mayor que un nivel normal. Ejemplos de la afección incluyen una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica, o un cáncer de células T, así como una situación en la que un sujeto ha recibido o se contempla que reciba un trasplante alogeneico o xenogeneico.

Los detalles de una o más realizaciones de la invención se recogen en la descripción que se acompaña a continuación. Otras características, objetos y ventajas de la invención resultarán evidentes a partir de la descripción detallada.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Esta invención se basa, al menos en parte, en un descubrimiento inesperado de que células T activadas pueden ser inducidas a sufrir una apoptosis y pueden ser agotadas mediante la unión de anticuerpos o sus derivados a PSGL-1 sobre las células activadas. Los anticuerpos y derivados son útiles para tratar afecciones asociadas con una respuesta inmune excesiva o indeseada mediada por células T o una proliferación de células T.

Por consiguiente, la invención recoge polipéptidos que contienen CDRs de la cadena ligera o pesada de inmunoglobulina de anticuerpos anti-PSGL-1, así como ácidos nucleicos que los codifican. Tanto las cadenas de inmunoglobulina como los ácidos nucleicos se pueden utilizar para producir los anticuerpos y derivados arriba mencionados.

Una cadena de inmunoglobulina se puede obtener como un polipéptido sintético o polipéptido recombinante. Para preparar un polipéptido recombinante, un ácido nucleico que lo codifica puede ser enlazado a otro ácido nucleico que codifica un participante en la fusión, p. ej. glutatión-S-transferasa (GST – siglas en inglés), 6x etiqueta de epítopo His, proteína gen 3 de M13, o una región constante la cadena pesada de inmunoglobulina. El ácido nucleico de fusión resultante se puede introducir en una célula para la expresión de proteínas. La proteína de fusión puede aislarse a partir de la célula hospedante por métodos bien conocidos en la técnica. La proteína de fusión aislada puede ser tratada adicionalmente, p. ej., mediante digestión enzimática para separar el participante en la fusión y obtener el polipéptido recombinante de interés. Alternativamente, se puede obtener una cadena de inmunoglobulina a partir de una célula hospedante adecuada, activando la expresión endógena de un ácido nucleico que codifica la cadena.

La composición de aminoácidos de una cadena de inmunoglobulina puede variar sin interrumpir la capacidad de formar un anticuerpo capaz de unirse a PSGL-1. Por ejemplo, una variante de este tipo puede contener una o más sustituciones de aminoácidos conservativas. Una "sustitución de aminoácidos conservativa" es una en la que el residuo aminoácido es reemplazado por un residuo aminoácido que tiene una cadena lateral similar. Familias de residuos aminoácidos que tienen cadenas laterales similares han sido definidas en la técnica. Estas familias incluyen aminoácidos con cadenas laterales de carácter básico (p. ej., lisina, arginina, histidina), cadenas laterales de carácter ácido (p. ej., ácido aspártico, ácido glutámico), cadenas laterales polares no cargadas (p. ej. glicina, asparagina, glutamina, serina, treonina, tirosina, cisteína), cadenas laterales no polares (p. ej., alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, metionina, triptófano), cadenas laterales beta-ramificadas (p. ej., treonina, valina, isoleucina) y cadenas laterales aromáticas (p. ej., tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina). Así, un residuo aminoácido no esencial predicho en un polipéptido es preferiblemente reemplazado por otro residuo aminoácido de la misma familia de las cadenas laterales. Alternativamente, se pueden introducir mutaciones al azar a lo largo de

la totalidad o parte de un polipéptido de esta invención, tal como mediante mutagénesis por saturación, y los mutantes resultantes se pueden rastrear en cuanto a la capacidad de formar un anticuerpo capaz de unirse a PSGL-1 para identificar variantes de esta invención según se describe más adelante en los ejemplos.

5 Las cadenas y variantes de inmunoglobulina arriba descritas pueden utilizarse para producir un anticuerpo. Un "anticuerpo" incluye moléculas intactas así como fragmentos de las mismas tales como Fab, F(ab')₂, Fv, scFv (anticuerpo de cadena sencilla), y dAb (anticuerpo de dominio; Ward, et. al. (1989) Nature, 341, 544). Un derivado de un anticuerpo se refiere a una proteína o a un complejo de proteínas que tiene una variante de polipéptido de esta invención. Un anticuerpo o derivado de esta invención se puede producir co-expresando polipéptidos que
10 contienen CDRs de las cadenas ligera y pesada correspondientes en una célula hospedante adecuada según se describe en los ejemplos que figuran más adelante. Alternativamente, se pueden producir por métodos conocidos en la técnica de preparar anticuerpos monoclonales y policlonales y fragmentos. Véase, p. ej., Harlow y Lane, (1988) Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Nueva York.

15 Para producir un anticuerpo, PSGL-1 o su fragmento antigénico se puede acoplar a una proteína soporte tal como KLH, mezclar con un adyuvante o inyectar en un animal hospedante. Anticuerpos producidos en ese animal pueden luego modificarse mediante cromatografía de afinidad de péptidos. Animales hospedantes comúnmente empleados incluyen conejos, ratones, cobayas y ratas. Se pueden utilizar diversos adyuvantes para aumentar la respuesta inmunológica dependiendo de la especie hospedante, e incluyen adyuvante de Freund (completo e
20 incompleto), geles minerales como hidróxido de aluminio, sustancias tensioactivas tales como lisolecitina, polioles pluronic, polianiones, péptidos, emulsiones en aceite, hemocianina de la lapa bocallave y dinitrofenol. Adyuvantes humanos útiles incluyen BCG (bacilos de Calmette-Guerin) y Corynebacterium parvum.

Anticuerpos policlonales, poblaciones heterogéneas de moléculas de anticuerpos, están presentes en los sueros de
25 los sujetos inmunizados. Anticuerpos monoclonales, poblaciones homogéneas de anticuerpos contra un antígeno particular, se pueden preparar utilizando la tecnología del hibridoma estándar. Véase, p. ej., Kohler et al. (1975) Nature 256, 495; Kohler et al. (1976) Eur. J. Immunol. 6, 511; Kohler et al. (1976) Eur. J. Immunol. 6, 292; y Hammerling et al. (1981) Monoclonal Antibodies and T Cell Hybridomas, Elsevier, N.Y. En particular, anticuerpos monoclonales se pueden obtener por cualquier técnica que proporcione la producción de moléculas de anticuerpos
30 por parte de líneas celulares continuas en cultivo tal como se describe en la patente de EE.UU. Nº 4.376.110; la técnica del hibridoma de células B humanas (Kosbor et al. (1983) Immunol Today 4, 72; Cole et al. (1983) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 2026) y la técnica del hibridoma de EBV (Cole et al. (1983) Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R. Liss, Inc., págs. 77-96). Anticuerpos de este tipo pueden ser de cualquier clase de inmunoglobulina, incluidas IgG, IgM, IgE, IgA, IgD y cualquier subclase de las mismas. El hibridoma que produce
35 los anticuerpos monoclonales de la invención se puede cultivar in vitro o in vivo. La capacidad de producir elevados títulos de anticuerpos monoclonales in vivo le hace un método particularmente útil de producción.

Además, se pueden utilizar técnicas desarrolladas para la producción de "anticuerpos quiméricos". Véase, p. ej., Morrison et al. (1984) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 6851; Neuberger et al. (1984) Nature 312, 604; y Takeda et
40 al. (1984) Nature 314, 452. Un anticuerpo quimérico es una molécula en la que diferentes partes se derivan de diferentes especies animales tales como las que tienen una región variable derivada de un anticuerpo monoclonal murino y una región constante de inmunoglobulina humana. Alternativamente, técnicas descritas para la producción de anticuerpos de cadena sencilla (patentes de EE.UU. Nº 4.946.778 y 4.704.692) se pueden adaptar para producir un banco de fagos de anticuerpos Fv de cadena sencilla. Los anticuerpos de cadena sencilla se
45 forman enlazando los fragmentos de las cadenas pesada y ligera de la región Fv a través de un puente aminoácido. Además de ello, se pueden generar fragmentos de anticuerpos por técnicas conocidas. Por ejemplo, fragmentos de este tipo incluyen, pero no se limitan a fragmentos F(ab')₂, los cuales se pueden producir mediante la digestión de pepsina de una molécula de anticuerpo y fragmentos Fab que se pueden generar reduciendo los puentes disulfuro de fragmentos F(ab')₂. Los anticuerpos también pueden ser humanizados por métodos descritos
50 en los ejemplos que figuran más adelante o conocidos en la técnica. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales con una especificidad de unión deseada pueden ser humanizados comercialmente (Scotgene, Escocia; y Oxford Molecular, Palo Alto, Calif.). Anticuerpos totalmente humanizados tales como los expresados en animales transgénicos se encuentran dentro del alcance de la invención (véase, p. ej., Green et al. (1994) Nature Genetics 7, 13; y patentes de EE.UU. Nºs 5.545.806 y 5.569.825).

55 También está comprendido en el alcance de esta invención el uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en la fabricación de un medicamento para modular una respuesta inmune mediada por células T en un sujeto que padece o está en riesgo de padecer una afección relacionada con una respuesta inmune excesiva mediada por células T, en donde la afección es una enfermedad inflamatoria, una
60 enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica o un cáncer de células T. Sujetos a tratar se pueden identificar como que tienen o que están en riesgo de tener una afección relacionada con una respuesta inmune excesiva o indeseada mediada por células T, p. ej. pacientes que padecen enfermedades autoinmunes, rechazo de trasplantes, enfermedades alérgicas o cánceres derivados de células T. Este uso se puede realizar solo o en unión con otros fármacos o terapia.

El término “tratar” se refiere a la administración de una composición a un sujeto con el fin de curar, aliviar, remediar, prevenir o mejorar un trastorno, el síntoma del trastorno, el estado patológico secundario al trastorno o la predisposición al trastorno. Una “cantidad eficaz” es una cantidad de la composición que es capaz de producir un resultado médicamente deseable en un sujeto tratado.

Enfermedades ilustrativas a tratar incluyen diabetes mellitus, artritis (incluida artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, osteoartritis y artritis psoriática), esclerosis múltiple, encefalomiелitis, miastenia grave, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis autoinmune, dermatitis (incluida dermatitis atópica y dermatitis eczematosa), psoriasis, síndrome de Sjögren, enfermedad de Crohn, úlcera aftosa, iritis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, diabetes de tipo I, enfermedades del intestino inflamatorio, colitis ulcerosa, asma, asma alérgica, lupus eritematoso cutáneo, escleroderma, vaginitis, proctitis, erupciones de fármacos, reacciones inversas leprosas, eritema nodoso leproso, uveítis autoinmune, encefalomiелitis alérgica, encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, pérdida de audición sensorineural progresiva bilateral idiopática, anemia aplásica, anemia de glóbulos rojos pura, trombocitopenia idiopática, policondritis, granulomatosis de Wegener, hepatitis activa crónica, síndrome de Stevens-Johnson, esteatorrea idiopática, liquen plano, enfermedad de Graves, sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, uveitis posterior, fibrosis pulmonar intersticial, enfermedad de injerto frente a hospedante, casos de trasplante (incluido trasplante utilizando tejidos alogeneicos o xenogeneicos) tal como trasplante de la médula ósea, trasplante de hígado o el trasplante de cualquier órgano o tejido, alergias tales como alergia atópica, SIDA y neoplasmas de células T tales como leucemias o linfomas.

En una estrategia in vivo, se administra al sujeto una composición terapéutica (p. ej., una composición que contiene a un anticuerpo de la invención). Generalmente, el anticuerpo se suspende en un soporte farmacéuticamente aceptable (p. ej., solución salina fisiológica) y se administra por vía oral o mediante infusión intravenosa, o se inyecta o implanta por vía subcutánea, intramuscular, intratecal, intraperitoneal, intrarrectal, intravaginal, intranasal, intragástrica, intratraqueal o intrapulmonar.

La dosificación requerida depende de la elección de la vía de administración; de la naturaleza de la formulación; de la naturaleza de la enfermedad del sujeto; del tamaño, peso, superficie específica, edad y sexo del sujeto; otros fármacos que estén siendo administrados; y el juicio del médico que le atienda. Dosificaciones adecuadas se encuentran en el intervalo de 0,01-100,0 mg/kg. Son de esperar variaciones en la dosificación necesaria a la vista de la diversidad de composiciones disponibles y de las diferentes eficacias de diversas vías de administración. Por ejemplo, sería de esperar que la administración oral requiriera dosificaciones mayores que la administración mediante inyección intravenosa. Pueden ajustarse variaciones en estos niveles de dosificación utilizando rutinas empíricas convencionales para la optimización, tal como se entiende bien en la técnica. La encapsulación de la composición en un vehículo de suministro adecuado (p. ej., micropartículas poliméricas o dispositivos implantables) pueden aumentar la eficacia del suministro, particularmente para el suministro por vía oral.

También dentro del alcance de esta invención se encuentra una composición farmacéutica que contiene un soporte farmacéuticamente aceptable y una cantidad eficaz de un anticuerpo de la invención. La composición farmacéutica se puede utilizar para tratar enfermedades descritas anteriormente. El soporte farmacéuticamente aceptable incluye un disolvente, un medio de dispersión, un revestimiento, un agente antibacteriano y antifúngico y un agente isotónico y retardador de la absorción.

La composición farmacéutica de la invención se puede formular en formas de dosificación para diferentes vías de administración utilizando métodos convencionales. Por ejemplo, se puede formular en una cápsula, un sello de gel o un comprimido para la administración oral. Las cápsulas pueden contener cualesquiera materiales farmacéuticamente aceptables estándares tales como gelatina o celulosa. Los comprimidos se pueden formular de acuerdo con procesos convencionales comprimiendo mezclas de la composición con un soporte sólido y un lubricante. Ejemplos de soportes sólidos incluyen almidón y azúcar bentonita. La composición también se puede administrar en una forma de un comprimido con envuelta dura o una cápsula que contiene un aglutinante, p. ej., lactosa o manitol, una carga convencional y un agente para la formación de comprimidos. La composición farmacéutica se puede administrar a través de la vía parenteral. Ejemplos de formas de dosificación parenterales incluyen disoluciones acuosas, solución salina isotónica o glucosa al 5% del agente activo, u otro excipiente farmacéuticamente aceptable, bien conocido. Ciclodextrinas u otros agentes solubilizantes bien conocidos para los que están familiarizados con la técnica se pueden utilizar como excipientes farmacéuticos para el suministro del agente terapéutico.

La eficacia de una composición de esta invención se puede probar tanto in vitro como in vivo. Véanse, p. ej., los ejemplos que figuran más adelante. En síntesis, la composición se puede someter a ensayo en cuanto a su capacidad para inducir la muerte de células T activadas in vitro. Para estudios in vivo, la composición se puede inyectar en un animal (p. ej., un modelo de ratón) y luego se puede acceder a sus efectos terapéuticos. En base a los resultados, se puede determinar un intervalo de dosificación y una vía de administración apropiados.

Los ejemplos específicos que figuran a continuación han de considerarse como meramente ilustrativos y no limitativos del resto de la descripción de modo alguno. Sin una elaboración ulterior, se piensa que un experto en la técnica puede, en base a la descripción en esta memoria, utilizar la presente invención en su mayor medida.

5 EJEMPLO 1: Anticuerpos monoclonales 15A7, 43B6 y 9F9 de ratón

Generación de anticuerpos anti-PSGL-1

10 Se utilizaron técnicas convencionales para generar anticuerpos monoclonales de ratón que se unen específicamente a PSGL-1 humano (hCD162). Más específicamente, ratones fueron inmunizados con la fracción de membrana de células T humanas activadas con PHA y fueron sacrificados para generar líneas celulares de hibridoma. Sobrenadantes procedentes de las líneas celulares de hibridoma resultantes se rastrearon en cuanto a la unión a células CHO que expresan establemente hCD162. Se identificaron, subclonaron y analizaron
15 ulteriormente, tal como se describe más adelante, aquellas líneas productoras de anticuerpos que se unían a células CHO que expresan hCD162 pero no a las células CHO parentales.

Entre las líneas identificadas se encontraban m152-15A7, m166-43B6 y m128-9F9. Éstas producían anticuerpos de IgG1 15A7, 43B6 y 9F9, respectivamente. El ensayo de la inmunotransferencia demostró que estos tres anticuerpos extraían de un lisado de células T activadas una proteína que podía ser detectada por un anticuerpo
20 anti-hCD162 (kpl-1, PharMingen, San Diego, CA).

Los tres anticuerpos recién descritos se sometieron a ensayo en cuanto a sus capacidades para inducir la apoptosis de células T activadas. Sobrenadantes del cultivo que contenían anticuerpos monoclonales secretados por las tres líneas celulares de hibridoma se incubaron respectivamente con células T humanas no activadas (día 0) o células T humanas activadas in vitro (día 7) durante 6 horas. Las células fueron luego teñidas con anexina V y fueron sometidas a análisis FACS. Células CD3-positivas fueron reguladas para asegurar el recuento de células T
25 humanas activadas in vitro o células T humanas en reposo. Las células apoptóticas eran anexina V tinción-positivas.

La Tabla 1 resume el porcentaje de células T apoptóticas entre la totalidad de las células T escaneadas.

30

Tabla 1 Porcentaje de células T apoptóticas

	No tratadas	Anti-myc	m128-9F9	No tratadas	Anti-myc	m152-15A7	M166-43136
Día 0	4,17	6,67	5,82	18,18	15,52	5,23	6,57
Día 7	12,63	13,36	28,71	24,18	23,08	51,66	49,44

35 Estos resultados indican que los anticuerpos 15A7, 43B6 y 9F9 de ratón (1) son específicos para hCD162 y (2) se pueden unir a células T activadas humanas y pueden inducir la apoptosis de células T activadas, pero no células T humanas en reposo.

El ensayo de la apoptosis también se realizó en células mononucleares de sangre periférica humana activadas con PHA (PBMC – siglas en inglés). Se encontró que los anticuerpos sólo inducían la apoptosis en células T activadas,
40 pero no en células T en reposo, en células B o en neutrófilos.

Es sabido que los anticuerpos que agotan células T, tales como anti-CD3, son capaces de inducir la producción de factores solubles. La terapia utilizando anticuerpos de este tipo resulta habitualmente en un síndrome de citocina deletéreo. Para someter a ensayo si un anticuerpo anti-PSGL-1 también provocaba efectos secundarios asociados a citocinas, PBMC humanas, aisladas recientemente, fueron cultivadas con 15A7 durante 24, 48 ó 72 horas.
45 Después se determinaron los niveles de citocinas en el sobrenadante. Cantidades considerables de IL-2, TNF- α e IFN- γ se produjeron en PBMC activadas con PHA (control positivo), mientras que niveles de estas citocinas procedentes de células tratadas con 15A7 no eran detectables. Estos resultados sustentaron que anti-PSGL-1 no tiene o tiene un efecto pequeño sobre los glóbulos rojos periféricos en reposo tanto en aspectos de la inducción
50 apoptótica como en la activación de células.

Dado que los anticuerpos arriba descritos inducen selectivamente la apoptosis de células T activadas sin provocar efectos adversos sobre células T en reposo u otras células inmunes, la administración de los mismos a un sujeto no es probable que dé cómo resultado una linfopenia o una inmunodeficiencia amplia tal como lo hace anti-CD3 o un agente inmunosupresor.
55

Representación en mapa de los epítomos de anticuerpos anti-CD162

60 Para representar en mapa los epítomos de unión de 15A7, 43B6 y 9179 de ratón sobre CD162 humano, se expresaron y purificaron una serie de proteínas de fusión que cubrían diversas regiones de CD162 humano. Las interacciones entre las proteínas de fusión y estos anticuerpos monoclonales se examinaron mediante el análisis

ES 2 598 034 T3

con enzima unida a inmutosorbente (ELISA) sándwich.

5 En síntesis, fragmentos que cubren diversas regiones del gen CD162 humano fueron expresados como proteínas de fusión con la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana en *E. coli*. ADNc que codifica la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana fue amplificada mediante PCR con cebadores que tienen un sitio *Bgl*II y un sitio *Bam*HI. El producto de la PCR se cortó mediante *Bgl*II y *Bam*HI y se subclonó en un vector pET-32a (Novagen) que había sido digerido por las mismas enzimas. Después se amplificaron mediante PCR ADNcs que codifican diversas regiones de hCD162 con cebadores que tienen un sitio *Nde*I en el extremo 5' y un sitio *Bgl*II en el extremo 3'. Los productos de la PCR se cortaron mediante las correspondientes enzimas y se fusionaron en marco a la secuencia que codifica la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana en el vector pET-32a. Los cebadores utilizados en cada una de las construcciones se listan en la Tabla 2, y las secuencias de los cebadores se listan en la Tabla 3.

10

Tabla 2 Nombres de cebadores utilizados en cada uno de los experimentos

Para secuencias amplificadoras que codifican:	Cebador directo	Cebador inverso
Fragmentos de hCD162 expresados en E. coli		
42-119	AB1001	AB1005
42-80	AB1001	AB1008
61-99	AB1003	AB1009
81-119	Ab1004	AB1005
42-70	AB1001	AB1007
42-60	AB1001	AB1006
50-80	AB1002	AB1008
50-70	AB1002	Ab1007
42-319	AB1001	Ab1010
115-126	AB1022	AB1023
115-126EtoR	AB1024	AB1025
Región V de ADNcs		
Cadena ligera	AB1058	AB1059
Cadena pesada	AB1058	AB1060
Fragmentos de hCD162 expresados en mamíferos		
1-119	AB1011	AB1013
1-319	AB1011	AB1012
110-319	AB1058	AB1059
94-148	AB1020	AB1021
119-222	AB1018	AB1019
174-269	AB1016	AB1017
214-317	AB1014	AB1015
Cadenas quiméricas		
Cadena ligera de 15A7	AB1030	AB1031
Cadena pesada de 15A7	AB1032	AB1033
Cadena ligera de 9F9	AB1026	A131027
Cadena pesada de 9F9	AB1028	AB1029
Cadena ligera de 43B6	AB1034	AB1035
Cadena pesada de 43B6	Ab1036	AB1037
Cadenas humanizadas		
Cadena ligera de 15A7		
Cadena ligera de 15A7 1º par	AB1048	AB1057
Cadena ligera de 15A7 2º par	AD1049	AB1050
Cadena ligera de 15A7 3º par	AB1051	AB1052
Cadena ligera de 15A7 4º par	AB1053	AB1054
Cadena pesada de 15A7	AB1055	Ab1056
Cadena pesada de 15A7 1º par	AB1038	AB1047
Cadena pesada de 15A7 2º par	AB1039	AB1040
Cadena pesada de 15A7 2º par	AB1041	AB1042

Cadena pesada de 15A7 3º par	AB1043	AB1044
Cadena pesada de 15A7 4º par	AB1045	AB1046

Tabla 3. Secuencias de cebadores

Nombre	Secuencia
AB1001	cccgggacCATATGcaggccaccgaatatgagtacc
AB1002	tatgagCATATGgattatgatttcctgccagaaacgg
AB1003	aaacggagCATATGgaaatgctgaggaacagcactgacacc
AB1004	aaccctCATATGaccactgtggagcctgctgcaaggcg
AB1005	gtggtcAGATCTtccatagctgctgaatcogtggacagg
AB1006	GTTCTCAGATCTTCTGGAGGCTCCGTTTCTGGCAGG
AB1007	AGGCCCAAGATCTGGAGTGGTGTGCTGCTGTTCCTC
AB1008	ggctccAGATCTgtagactcaggggttccaggccc
AB1009	gtggtcAGATCTgtgactgcccctcctgcatccaggcc
AB1010	GCCAGCAGATCTTGCTTCACAGAGATGTGGTCTGGGG
AB1011	cgcgatccatgcctctgcaactcctcctgttgc
AB1012	GCCAGCCTCGAGCTTACAGAGATGTGGTCTGGGG
AB1013	GGTCTGctogagCATAGCTGCTGAATCCGTGGACAGGTTCC
AB1058	agacaggccaccgaaggaacctgtccacg
AB1059	cgtggacaggttcccttcggtggcctgtct
AB1014	ccgctcgagcgccaagattaggatggc
AB1015	cgggatccactcaaaccacagccatgg
AB1016	ccgctcgagtggtagtaggttccatgg
AB1017	cgggatcaactcaaccacaggcctg
AB1018	ctgtgcctcgagggctgtggtttgagtg
AB1019	cgggatccatggagatacagaccactcaac
AB1020	cgggatccgatgcaggaggggcagtcac
AB1021	ggcctcactcgagtgtctgtgcctc
AB1022	TatgGATTTCAGCAGCTATGGAGATACAGACCACTCAACCAGcA
AB1023	GATCTgcTGGTTGAGTGGTCTGTATCTCCATAGCTGCTGAATCCA
AB1024	TatgGATTTCAGCAGCTATGCCGATACAGACCACTCAACCAGcA
AB1025	GATCTgcTGGTTGAGTGGTCTGTATCCGATAGCTGCTGAATCCA
AB1026	CTAGTCTAGATGACCCAAACTCCACTCTCCC
AB1027	CTAGTCTAGAATTAGGAAAGTGCACTTAGCATCAGCCCGTTGATTTC
AB1028	TAACATtctagATGCTGTTGGGGCTGAAGTGGG
AB1029	GGATAGTCTAGAGTTGTGAGGACTCACCTGAGGAGCGGTGACCGTGG
AB1030	CTAGTCTAGATGGAGACAGACACACTCCTGTTATGGG
AB1031	CTAGTCTAGAATTAGGAAAGTGCACTTTTCCAGCTTGGTCCCCCTCC
AB1032	CTAGTCTAGATGGACTCCAGGCTCAATTTAGTTTTC
AB1033	CTAGTCTAGAGTTGTGAGGACTCACCTGAGGAGACGGTGACTGAGGttcc
AB1034	CTAGTCTAGATGGATTTTCTGGTGCAGATTTTCAGC
AB1035	CTAGTCTAGAATTAGGAAAGTGCACTTAGCATCAGCCCGTTTCAGCTCC
AB1036	CTAGTCTAGATGGAAATGGAGCTGGGTCTTTCTC
AB1037	CTAGTCTAGAGTTGTGAGGACTCACCTGAGTGGATAGACTGATGG
AB1038	TCTATCTAGATGAACCTCGGGTCCAGCTTGATTTTCTTGTCTTGTTTTAAAAGGTGCCAGTG
AB1039	CCTTGTTTTAAAAGGTGTCCAGTGTGAAGTGCAACTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTAGTGCAGCCTGG
AB1040	CTGAAAGTGAATCCAGAGGCTGCACAGGAGTCTCAAGCTTCTCCAGGCTGCACTAAGCCTCC
AB1041	GCCTCTGGATTCACTTTTCAGTACTTTGGAATGCACCTGGTTCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGACTCGAG

```

AB1042 GCATAGAAGATGGTACTACTGCCACCATTAATGTATGCGACCCACTCGAGTCCCTTCCCTGGAGCC
AB1043 GTAGTACCATCTTCTATGCAAACGCAGTGAAGGGCCGATTACCACATCTCCAGAGATAATGCC
AB1044 CCTCAGCCCTCAGAGAATTCATTTGCAGGTACAGGGTGTCTTGGCATTATCTCTGGAGATGG
AB1045 GAATTCTCTGAGGGCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCAAGATATGCTAGTTACGGAGG
AB1046 CTGTGACCAGGGTGCCTTGGCCCCAATAGTCCATAGCACCCCTCCGTAACCTAGCATATC
AB1047 ACCCTCTAGAGGTTGTGAGGACTCACCTGAGGAGACTGTGACCAGGGTGCCTTGGCC
AB1048 TCTATCTAGATGGAGACAGACACAATCCTGCTATGGGTGCTGCTGCTCTGGGTTCCAGGC
AB1049 GCTGCTCTGGGTTCCAGGCTCCACTGGTGACATTCAGATGACCCAATCTCCGAGCTCTTTG
AB1050 GATCTGCAGGTGATAGTGACCCATATCCCCTACAGACGCAGACAAAGAGCTCGGAGATTGG
AB1051 CACTATCACCTGCAGATCTAGTCAGAGCATTGTACATAATGATGGAAACACCTATTTTGAATG
AB1052 GATGAGAAGCTTGGGTGCCTTTCCTGGTTTTCTGTTGGTACCATTCAAATAGGTGTTTT
AB1053 GCACCAAGCTTCTCATCTATAAAGTTTTCCAATCGATTTTCTGGTGTCCCATCCAGGTTTAGTGGC
AB1054 GCAGAGAAGAGATGGTGAGGGTGAAGTGTGTCCCAGACCCACTGCCACTAAACCTGGATGG
AB1055 CTCACCATCTCTTCTCTGCAGCCGGAGGATTTTCGCAACCTATTACTGTTTTTCAAG
AB1056 CCTTGGTGCCTTGACCGAACGTGAGAGGAACATATGAACCTTGAAAACAGTAATAGG
AB1057 ACCCTCTAGAATTAGGAAAGTGCACTTACGTTTGATTTCCACCTTGGTGCCTTGACCG
AB1058 TATATCTAGAATTCACCCCCCCCCCCCCCCC
AB1059 TATAGAGCTCAAGCTTGGATGGTGGGAAGATGGATACAGTTGGTGC
AB1060 TATAGAGCTCAAGCTTCCAGTGGATAGAC (C/A/T) GATGGG (C/G) TGT (C/T) GTTTTGGC

```

Las construcciones de expresión arriba descritas fueron transformadas en la cepa BL21 de *Escherichia coli* (DE3). Las células transformadas se recolectaron después de 6 horas de inducción con IPTG (2 mM) y se resuspendieron en PBS. Después de tratar mediante ultrasonidos las células y de centrifugar a 14.000 g durante 10 minutos, los sobrenadantes resultantes se recogieron para la purificación de las proteínas de fusión. Más específicamente, los sobrenadantes se incubaron primero con perlas de proteína G o de proteína A durante 3 horas a 4°C. Las perlas se centrifugaron después a 3.000 g y se lavaron con tampón de lavado I (Triton X-100 al 0,05%, Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, NaCl 400 mM, CaCl₂ 1 mM y 1 mg/ml de OVA) y tampón de lavado II (Triton X-100 al 0,05%, Tris-HCl 50 mM, pH 8,5 y 150 mM de NaCl), cada vez durante 5 veces. Las proteínas ligadas se eluyeron luego con un tampón de elución que contenía 0,1 M de glicina-HCl, pH 2,7 y se neutralizaron con Tris-HCl 1 M, pH 8,6. Todas las proteínas de fusión purificadas se cuantificaron mediante el ensayo de proteínas Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, N° de cat. 500-0006) y se verificaron mediante SDS-PAGE.

Se realizó un ELISA sándwich para estudiar la interacción entre los fragmentos de hCD162 y cada uno de 15A7, 9F9 y 43B6. Placas de microtitulación de 96 pocillos se revistieron con anticuerpo de IgG anti-humano de cabra (Southern Biotechnology, N° de cat. 2040-01) (2 µg/ml, 50 µl/pocillo) durante una noche a 4°C. Las placas se bloquearon mediante incubación con 0,25% de BSA en PBS (150 µl/pocillo) durante 1 hora a 37°C. Las placas bloqueadas se incubaron luego con proteínas de fusión que contenían diversos fragmentos de CD162 humano (2 µg/ml) durante 2 horas a la temperatura ambiente. Después de lavar 4 veces con PBS que contenía 0,05% de Tween 20 (PBST), las placas se incubaron con anticuerpos de ensayo (2 µg/ml) durante 1,5 horas a la temperatura ambiente. Después de la incubación, las placas se lavaron 4 veces con PBST, después se añadieron a cada uno de los pocillos 50 µl de IgG anti-ratón de cabra diluida a razón a de 1 a 3000 con fosfatasa alcalina (Southern Biotechnology, N° cat. 1031-04), y las placas se incubaron durante 1 hora a 37°C. La reacción enzimática se llevó a cabo añadiendo 50 µl de una disolución de sustrato de fosfatasa alcalina (1 comprimido de sustrato de fosfatasa alcalina disuelto en 5 ml de tampón sustrato que contiene 0,012 M de Na₂CO₃, 0,16 M de NaHCO₃ y 1 mM de MgCl₂ a pH 8,6), y se determinó la absorbancia a 405 nm.

Se encontró que 43B6 y 9F9 eran capaces de interactuar con todas las proteínas de fusión que contenían residuos 50 a 60 de CD162 humano maduro, indicando que los epítomos de 43B6 y 9179 estaban situados entre los residuos 50-60. A diferencia de 9179 y 43136, 15A7 solamente se unía a la proteína de fusión que cubre los residuos 42 a 319, pero no a la proteína de fusión que cubre los residuos 42-119, indicando que el epítomo de 15A7 estaba situado entre los residuos 119 y 319. La localización del epítomo de 15A7 se estrechó luego a los residuos 115 a 126. El cambio de un aminoácido en la posición 120 (Glu → Arg) disminuía la interacción entre 15A7 y la proteína de fusión, indicando que el dominio de contacto primario de 15A7 sobre CD162 humano está situado en o junto a la posición 120, y el residuo Glu es esencial para la interacción.

Proteínas de fusión que cubren diversas regiones de CD162 humano también se expresaron en células de mamíferos y se sometieron a ensayo en cuanto a su interacción con 15A7. Fragmentos que cubren estas regiones fueron expresados como proteínas de fusión con la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana en células de mamíferos. Primeramente, la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana que codifica ADNc se insertó en un vector pcDNA3 (Invitrogen). En segundo lugar, ADNcs que codifican diversas regiones de hCD162 fueron amplificados mediante PCR con cebadores que introducen un sitio *Bam*HI en el extremo 5' y un sitio *Xho*I en el extremo 3'. Estos productos de la PCR fueron

cortados mediante las enzimas correspondientes y fueron subclonados en el vector pcDNA3 que contenía la región constante de la cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 humana. El nombre y la secuencia para cada uno de los cebadores están listados en las Tablas 2 y 3 anteriores.

- 5 Los vectores de expresión en mamíferos recién descritos fueron transfectados transitoriamente en células COS-7 mediante Lipofectamine 2000 (Invitrogen, N° de cat. 11668-027) siguiendo las directrices del fabricante. Las células transfectadas se hicieron crecer en medio de Ig ultra-bajo (Invitrogen, N° de cat. 16250-078). Las proteínas expresadas fueron purificadas y sometidas a ELISA sándwich de la misma manera que la descrita anteriormente.
- 10 Los resultados del ELISA demuestran que sólo las proteínas de fusión que contienen residuos 94 a 148 eran capaces de interactuar con 15A7. Estos resultados son consistentes con la idea de que el epítipo de 15A7 está situado entre los residuos 115 y 126.

15 La totalidad de los resultados anteriores indica que los epítopos de 9F9, 43B6 y 15A7 son dependientes de proteínas, en lugar de dependientes de la modificación de hidratos de carbono, dado que los tres anticuerpos se unen a proteínas de fusión expresadas en bacterias. También indican que, a pesar de que 15A7, 9F9 y 43B6 muestran propiedades similares en términos de especificidad de unión y funcionan para inducir la apoptosis en células T activadas, actúan a través de diferentes dominios de CD162 humano y se comportan de manera diferente.

20 **EJEMPLO 2: Anticuerpos quiméricos 15A7, 43B6 y 9F9**

Clonación de las regiones variables de las cadenas ligera y pesada de anticuerpos anti-CD162

25 ADNcs que codifican las regiones variables de las cadenas ligera y pesada (V_L y V_H) de anticuerpos 15A7, 43B6 y 9F9 fueron amplificados mediante un método de PCR anclado. Los cebadores 3' se hibridaban a las regiones C, y los cebadores 5' se hibridaban a colas G fijadas al ADNc utilizando desoxittransferasa terminal. Los fragmentos de PCR se clonaron en un vector pCRII (Invitrogen). Se secuenciaron y compararon varios clones independientes para cada una de las cadenas. Se cogió una secuencia representada por la mayoría de los clones independientes. La

30 secuencia de aminoácidos traducida se analizó luego para confirmar que la secuencia elegida poseía las características de la región V típica de la cadena ligera o pesada de ratón, y que pertenecía a un subtipo específico. Las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs) se identificaron luego comparando las secuencias de aminoácidos traducidas con la secuencia consenso de cada uno de los subtipos. El nombre y la secuencia para cada uno de los cebadores utilizados se listan en las Tablas 2 y 3 anteriores. Las secuencias de

35 aminoácidos deducidas de las regiones V de las cadenas ligera y pesada de 15A7, 43B6 y 9F9 (SEQ ID NOs: 19-24) se muestran en el Sumario.

Anticuerpos quiméricos

40 Para generar vectores para la expresión de anticuerpos quiméricos, ADNcs que codifican las regiones V_L y V_H de 15A7, 43B6 y 9F9 fueron amplificados mediante PCR utilizando cebadores para incluir la secuencia del péptido señal 5' y la señal de donante de corte y empalme 3'. Los cebadores también introducían sitios XbaI en los dos extremos de los productos de la PCR, que luego fueron cortados mediante la enzima XbaI y ligados en el vector pVk, pVg1, pVg2 o pVg4 digerido con XbaI. Más específicamente, los ADNcs de la región de V_L de 15A7, 43136 y

45 9F9 se subclonaron en el plásmido pVk. Este plásmido contenía un promotor de CMV y una secuencia que codifica la región constante de la cadena ligera humana. Los ADNcs de la región V_H de 15A7, 43B6 y 9179 se subclonaron en los plásmidos pVg1, pVg2 o pVg4. Cada uno de los tres plásmidos tenía un promotor de CMV. También contenían, respectivamente, las regiones constantes de la cadena pesada humana de IgG1, IgG2 e IgG4.

50 Cada uno de los plásmidos que codifican la cadena ligera arriba descritos fue co-transfectado con un plásmido que codifica la cadena pesada en células COS-7. Se recogieron los sobrenadantes de las células transfectadas. Anticuerpos quiméricos en los sobrenadantes fueron analizados en cuanto a su capacidad para unirse a CD162 humano y para inducir la apoptosis de células T activadas.

55 Se encontró que todos los anticuerpos quiméricos preparados a partir de 15A7, 43B6 y 9F9 se unían a transfectantes Sp2/0 que expresan establemente CD162 humano, pero no a células Sp2/0 parentales, indicando que conservaban la especificidad de la capacidad de unión a CD162 humano. Además de ello, se encontró que los anticuerpos quiméricos inducían la apoptosis en células T que habían sido activadas durante 7 días, indicando que conservaban asimismo esta función de sus homólogos de ratón.

60 Anticuerpos humanizados

Se utilizó 15A7 de ratón para producir anticuerpos humanizados injertando sus CDRs sobre un armazón humano. Para conservar la afinidad de unión y la especificidad, es esencial conservar la conformación de la región V cuando

ES 2 598 034 T3

se injertan las CDRs en el armazón humano. Para seleccionar un donante de armazón apropiado, se compararon las secuencias de aminoácidos de las regiones V de las cadenas ligera y pesada de 15A7 de ratón con las de 50 anticuerpos de ratón que habían sido humanizados.

- 5 Se encontró que un anticuerpo de ratón, mDREG-55, tenía una homología de la secuencia elevada con la región V de 15A7 de ratón, tanto en la cadena ligera como en la pesada. Se lista a continuación, una alineación de la secuencia de 15A7 de ratón frente a este anticuerpo mDREG-55 (las CDRs están destacadas):

Alineamiento de la cadena ligera

```
mDREG-55      DIVLTQSPASLSVSLGERASISCKASQSVVDY-DGDSYMNWYQQKPGQPPKLLIYAASNLES
              DI++TQ+P SL VSLG++ASISC++SQS+ + DG++Y WY QKPGQ PKLLIY SN S
m15A7         DILMTQTPLSLPVSLGDOASISCRSSOSIVHNDGNTYFEWYLQKPGQSPKLLIYKVCNRES

mDREG-55      GIPARFSGSGSGTDFTLNIHPVEEEDAATYYCQQSNEDPWTFGGGTKLEIK
              G+P RFGSGSGGT FTLNI VE ED YYC Q + P TF GGTKLE+K
m15A7         GVPDRFSGSGSGTHFTLNISRVEAEDLGIYYCFQGSYVPLTFGAGTKLELK
```

10

Alineamiento de la cadena pesada:

```
MDREG-55      EVKLVESSGGGLVKPGGSLKLSCAASGFTFSTYAMSWVRQTPEKRLEWVASISTGGST-YYPDSVKG
              +V+LVESGGGLV+PGGS KLSCAASGFTFS++ M WVRQ PEK LEWVA I+ G ST +Y ++VKG
m15A7         DVQLVESGGGLVQPGGSRKLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPEKGLEWVAYINGGSSTIFYANAVKG

MDREG-55      RFTISRDNARNILYLQMSSLRSEDTAMYYCAR--DY-DGYFDYWGQGTTLTVSS
              RFTISRDN +N L+LQM+ LRSEDTA+YYC R Y G DYWGQGT++TVSS
m15A7         RFTISRDNPKNTLFLQMTILRSEDTAIYYCGRYASYGGGAMDYWGQGTSVTVSS
```

15

DREG-55 de ratón es un anticuerpo IgG1 monoclonal contra L-selectina. Las secuencias de las regiones V_L y V_H de 15A7 de ratón eran respectivamente un 64,3% (armazón solo: 73,8%) y 70% (armazón solo: 81,6%) homólogas con las de DREG55 de ratón. DREG-55 humanizado (HuDREG-55) había sido construido utilizando secuencias de armazón de regiones V_L y V_H de un Gal de anticuerpo humano. Por lo tanto, para humanizar 15A7 de ratón, las secuencias del armazón de las cadenas ligera y pesada de Gal humano se utilizaron para reemplazar los homólogos de 15A7 de ratón.

20

Las regiones variables ligera y pesada de 15A7 humanizadas fueron cada una de ellas ensambladas mediante 4 pares de oligonucleótidos sintéticos (~ 80 bases de longitud). Los oligonucleótidos de cada uno de los pares fueron solapados alrededor de 20 nucleótidos. Las secuencias de nucleótidos se seleccionaron y sintetizaron para codificar las secuencias de proteínas de las regiones variables humanizadas que incluían péptidos señal. El ensamblaje y la amplificación de los genes se realizaron en cuatro etapas: (1) los cuatro pares de oligonucleótidos complementarios se re-asociaron y se extendieron con fragmento de Klenow en 4 reacciones separadas; (2) los 4 fragmentos de ADNds resultantes se mezclaron por pares, se desnaturalizaron, se re-asociaron y se extendieron en dos reacciones separadas; (3) los dos fragmentos de ADNds resultantes se mezclaron, desnaturalizaron, re-asociaron y se extendieron para crear el ADNds de longitud completa final; y (4) el ADN resultante se amplificó mediante PCR con cebadores para introducir un sitio XbaI en ambos extremos. El fragmento de PCR se cortó luego mediante XbaI y se insertó en los vectores pVK y pVg4 digeridos con XbaI respectivos. Después, en las posiciones en donde se consideraban importantes las interacciones entre CDR y el armazón, los residuos de Gal se cambiaron de nuevo por los de 15A7 de ratón (es decir, I62V y D74H). En lo que sigue se listan alineamientos de 15A7 de ratón y 15A7 humanizado (Hu15A7) frente a mDREG-55, en que V62 y H74 están subrayados.

35

Alineamiento de la cadena ligera:

ES 2 598 034 T3

```
hdREG-55      DIQMTQSPSSLSASVGDRTVITCKASQSVDY-DGDSYMNWYQKPGKAPKLLIYAASNLES
mouse 15A7    DILMTQTPLSLPVSLGDAQASISCRSSQSIIVHNDGNTYFEWYLQKPGQSPKLLIYKVCNRFQ
Hu15A7       DIQMTQSPSSLSASVGDRTVITCRSSQSIIVHNDGNTYFEWYQKPGKAPKLLIYKVCNRFQ

hdREG-55      GIPSRFSGSGSGTDFLTITISLQPEDFATYYCQOSNEDPWFQGGTKVEIK
m15A7        GVPDRFSGSGSGTHFTLNISRVEAEDLGIYYCFQGSYVPLTFGAGTKLELK
Hu15A7       GVPDRFSGSGSGTHFTLNISRVEAEDLGIYYCFQGSYVPLTFGAGTKVEIK
```

Alineamiento de la cadena pesada:

```
hdREG-55      EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSTYAMSWVRQAPGKGLEWVASISTGGST-YYPDSVKG
m15A7        DVQLVESGGGLVQPGGSRKLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPEKLEWVAIINGGSSITFYANAVKG
Hu15A7       EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSFGMHWVRQAPGKLEWVAIINGGSSITFYANAVKG

hdREG-55      RFTISRDNKNTLYLQMNLSRAEDTAVYYCAR--DY-DGYFDYWGQGLVTVSS
m15A7        RFTISRDNPKNTLFLQMTILRSEDTAIYYCGRYASYGGGAMDYWGQGSTVTVSS
Hu15A7       RFTISRDNKNTLYLQMNLSRAEDTAVYYCARYASYGGGAMDYWGQGLVTVSS
```

5 Plásmidos así obtenidos codificaban las cadenas pesada y ligera de 15A7 humanizado. Estos plásmidos se co-transfectaron luego en células COS-7. Los sobrenadantes agotados procedentes de células cultivadas se recogieron después. 15A7 humanizado en los sobrenadantes se sometió a ensayo en cuanto a su capacidad de unirse a transfectantes de CHO de manera estable que expresan hCD162 y para inducir la apoptosis en células T activadas durante 7 días. Los resultados demuestran que conserva estas capacidades.

Preparación de anticuerpos quiméricos y humanizados

15 Se generaron células que producían anticuerpos humanizados y quiméricos. Más específicamente, células Sp2/0 (Sp2/0-Ag14; ATCC CRL 1581) se transfectaron de manera estable con los plásmidos apropiados mediante electroporación utilizando un aparato Gene Pulser (Bio-Rad Laboratories) a 360 V y una capacitancia de 25 μ F de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Antes de la transfección, los plásmidos se linearizaron mediante digestión con la enzima *Bam*HI. Todas las transfecciones se realizaron utilizando 10^7 células en PBS y 20 μ g de cada uno de los ADNs del plásmido. Las células procedentes de cada una de las transfecciones se extendieron en dos placas de cultivo tisular de 96 pocillos. Al cabo de 48 horas, se aplicó un medio selectivo (suplemento de DMEM medio FBS al 10%/hipoxantina/timidina) y 1 μ g/ml de ácido micofenólico. Células productoras de anticuerpos se rastrearon y aislaron examinando la presencia de anticuerpos en el sobrenadante del cultivo mediante ELISA.

25 Las células aisladas se cultivaron en medio exento de suero, o con bajo contenido en Ig, y el sobrenadante cultivado se recogió. Los anticuerpos se purificaron mediante el paso sobre una columna de proteína estafilocócica A-Sepharose CL-4B. Después de lavar 5 veces cada vez con tampón de lavado 1 (Triton X-100 al 0,05%, Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, NaCl 400 mM, CaCl_2 1 mM y 1 mg/ml de OVA) y tampón de lavado II (Triton X-100 al 0,05%, Tris-HCl 50 mM, pH 8,5 y NaCl 150 mM), los anticuerpos ligados se eluyeron con un tampón de elución que contenía 30 0,1 M de glicina-HCl, pH 2,7 y se neutralizaron con Tris-HCl 1 M, pH 8,6.

Mediciones de afinidad

35 Las afinidades de unión de los anticuerpos 15A7 de ratón, quiméricos y humanizados arriba descritos se determinaron mediante unión competitiva.

40 15A7 de ratón se biotiniló mediante un sistema Sulfo-NHS-biotina EZ-Link (Pierce Biotechnology, N° de cat. 21217). En síntesis, 0,5 mg ($3,3 \times 10^{-6}$ nmoles) de 15A7 de ratón se disolvieron en 187 μ l de PBS y se mezclaron con $6,8 \times 10^{-5}$ nmoles de Sulfo-NHS-biotina. La mezcla se incubó luego en hielo durante 2 horas antes de separar las biotinas libres dializando a 4°C durante una noche frente a PBS. El 15A7 de ratón marcado con biotina, así obtenido, se almacenó a 4°C hasta su uso.

45 Como fuente de antígeno CD162 humano se utilizaron transfectantes Sp2/0 que expresan establemente CD162 humano. Como trazador se utilizó 15A7 de ratón marcado con biotina. Cantidades crecientes de anticuerpos competidores (15A7 de ratón, quimérico o humanizado) se mezclaron con 35 ng de 15A7 de ratón marcado con biotina y se incubaron con 1×10^5 células Sp2/0 que expresan CD162 durante 1,5 horas a 4°C con agitación constante. Después del lavado, se añadieron a la mezcla anticuerpo secundario, estreptavidina-PE (Becton

Dickinson Immunocytometry System Inc. N° de cat. 349023). Después de incubar durante 45 minutos a 4°C, las células se lavaron de nuevo, se resuspendieron en 300 µl de PBS-1% de FBS y se sometieron análisis FACS.

5 Se encontró que la concentración competitiva semi-máxima de 15A7 de ratón era 3,72 µg/ml, mientras las de 15A7 quimérico y humanizado se encontraban alrededor de 5,71 µg/ml y 4,51 µg/ml, respectivamente. Estos resultados indican que las afinidades de 15A7 de ratón, quimérico y humanizado son equiparables. En otras palabras, la afinidad de unión (Ka) para 15A7 de ratón es $4,03 \times 10^7 \text{ M}^{-1}$, mientras que las de 15A7 quimérico y humanizado son $2,62 \times 10^7 \text{ M}^{-1}$ y $3,33 \times 10^7 \text{ M}^{-1}$, respectivamente.

10 Análisis de competición

Se realizó un análisis de competición para estudiar la interacción entre los tres anticuerpos de ratón arriba descritos, PSGL-1 y P-selectina.

15 P-selectina es un ligando de alta afinidad principal para PSGL-1 en la mayoría de leucocitos. Con el fin de investigar si los tres anticuerpos previenen la unión de P-selectina a PSGL-1, se midió la unión de P-selectina humana purificada a células T activadas en presencia de los tres anticuerpos. Como un control positivo se utilizó KPL-1, que se sabe que bloquea la interacción de P-selectina y PSGL-1.

20 PBMC humanas se activaron con PHA al 1% durante 2 días y se mantuvieron en medio con contenido en IL-2 durante 3 días. Las células se incubaron con 9F9 titulada, 15A7, 43B6, KPL-1 (un antagonista de PSGL-1) o un anticuerpo control (9E10) durante 30 minutos, seguido de la adición de P-selectina humana recombinante (1,25 µg/ml). La unión de P-selectina a células T activadas se midió mediante FITC anti-P-selectina analizada sobre FRCS.

25 Consistente con los informes previos, KPL-1 abolía casi por completo la unión de P-selectina a células T activadas a una baja concentración (0,31 µg/ml). 43B6 bloqueaba la unión de P-selectina a células T activadas con la misma eficacia que lo hacía KPL-1, mientras que se requería una mayor concentración de 9F9 para conseguir este mismo efecto. De hecho, se necesitaban 0,08 µg/ml de KPL o 43B6 para suprimir el 50% de la unión. En contraposición, se requerían 5 µg/ml de 9F9. Además de ello, 15A7 no tiene efecto inhibitorio alguno sobre la unión de P-selectina, incluso a 20 µg/ml. Sorprendentemente, potenciaba la unión de P-selectina a PSGL-1. Estos resultados indican que 15A7 y P-selectina se unen a diferentes motivos de PSGL-1 en células T activadas.

35 El hecho de que 15A7 no compitiera con P-selectina por PSGL-1 indica que la administración in vivo de 15A7 no se supone que afecte a la inmunidad innata, interfiriendo en el reclutamiento de leucocitos dependiente de P-selectina.

40 Se informó que PSGL-1 se expresa a bajos niveles en plaquetas. Se examinaron los efectos de anticuerpos 15A7 en plaquetas. Se encontró que los anticuerpos no potenciaban ni inhibían la agregación de plaquetas humanas.

EJEMPLO 3: Anticuerpo monoclonal de hámster TAB4 contra PSGL-1 de ratón

45 Un anticuerpo monoclonal contra PSGL-1 de ratón, TAB4, se preparó de manera similar al método descrito en el Ejemplo 1. Inducía la apoptosis de células T in vitro y agotaba células T in vivo. Para determinar si interfería en la unión entre PSGL-1 de ratón y P-selectina de ratón, se realizó un análisis de competición de una manera similar al método descrito en el Ejemplo 2. Se encontró que TAB4 no inhibía la unión de P-selectina de ratón a PSGL-1 de ratón, incluso a una concentración tan elevada como de 20 µg/ml.

EJEMPLO 4: Anticuerpos monoclonales de ratón 4B7, 5C4, 12E7, 14B3, 17E5 y 18D12

50 Se caracterizaron anticuerpos monoclonales adicionales contra PSGL-1 humano, 4137, 5C4, 12E7, 14133, 17E5 y 18D12. Tras la unión a una célula T activada, todos ellos inducían la muerte de las células T activadas. El análisis de competición se realizó de la manera descrita en el Ejemplo 2 para determinar si bloqueaban la interacción entre PSGL-1 y P-selectina. Se encontró que estos anticuerpos tienen, en todo caso, un pequeño efecto inhibitorio sobre la unión de P-selectina humana a PSGL-1 humano, incluso a la concentración más elevada sometida a ensayo (5 µg/ml).

LISTADO DE SECUENCIAS

60 **[0080]**

<110> AbGenomics Corporation

<120> ANTICUERPOS

<130> A0871.70002WO00

<140> PCT/US2005/016357

< 141> 10-05-2005

5 <150> US 60/569.892

< 151> 10-05-2004

<160> 100

<170> FastSEQ para Windows Versión 4.0

<210> 1

10 < 211> 16

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 1

Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Asn Asp Gly Asn Thr Tyr Phe Glu
1 5 10 15

15 <210> 2

< 211> 7

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 2

20 Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
1 5

<210> 3

< 211> 9

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

25 <400> 3

Phe Gln Gly Ser Tyr Val Pro Leu Thr
1 5

<210> 4

< 211> 5

< 212> PRT

30 < 213> Mus musculus

<400> 4

Ser Phe Gly Met His
1 5

<210> 5

< 211> 17

35 < 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 5

ES 2 598 034 T3

Tyr Ile Asn Gly Gly Ser Ser Thr Ile Phe Tyr Ala Asn Ala Val Lys
 1 5 10 15
 Gly

<210> 6

< 211> 11

< 212> PRT

5 < 213> Mus musculus

<400> 6

Tyr Ala Ser Tyr Gly Gly Gly Ala Met Asp Tyr
 1 5 10

<210> 7

< 211> 12

< 212> PRT

10 < 213> Mus musculus

<400> 7

Arg Ala Ser Ser Thr Val Asn Ser Thr Tyr Leu His
 1 5 10

<210> 8

< 211> 7

< 212> PRT

15 < 213> Mus musculus

<400> 8

Gly Ser Ser Asn Leu Ala Ser
 1 5

<210> 9

< 211> 9

< 212> PRT

20 < 213> Mus musculus

<400> 9

Gln Gln Tyr Ser Gly Tyr Pro Leu Thr
 1 5

<210> 10

< 211> 5

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

25

<400> 10

Ala Tyr Tyr Ile His
 1 5

<210> 11

< 211> 16

< 212> PRT

30 < 213> Mus musculus

<400> 11

Val Asn Pro Asn Thr Gly Gly Thr Ser Tyr Asn Pro Lys Phe Lys Gly
 1 5 10 15

<210> 12

< 211> 10
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

5 <400> 12
 Ser Gly Ser Pro Tyr Tyr Arg Tyr Asp Asp
 1 5 10

<210> 13
 < 211> 16
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

10 <400> 13
 Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val Asn Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Glu
 1 5 10 15

15 <210> 14
 < 211> 7
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

<400> 14
 Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
 1 5

20 <210> 15
 < 211> 9
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

<400> 15
 Phe Gln Gly Ser His Val Pro Trp Thr
 1 5

25 <210> 16
 < 211> 16
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

<400> 16
 Thr Asn Ala Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu
 1 5 10 15

30 <210> 17
 < 211> 9
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

35 <400> 17
 Thr Tyr Tyr Ala Asp Ser Val Lys Asp
 1 5

<210> 18
 < 211> 9
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

ES 2 598 034 T3

<400> 18
 Gly Gly Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val
 1 5

<210> 19
 < 211> 131
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

5

<400> 19
 Met Lys Leu Pro Val Arg Leu Leu Val Leu Met Phe Trp Ile Pro Ala
 1 5 10 15
 Ser Ser Ser Asp Ile Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val
 20 25 30
 Ser Leu Gly Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile
 35 40 45
 Val His Asn Asp Gly Asn Thr Phe Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro
 50 55 60
 Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
 65 70 75 80
 Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr His Phe Thr
 85 90 95
 Leu Asn Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Ile Tyr Tyr Cys
 100 105 110
 Phe Gln Gly Ser Tyr Val Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu
 115 120 125
 Glu Leu Lys
 130

<210> 20
 < 211> 139
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

10

<400> 20
 Met Asp Ser Arg Leu Asn Leu Val Phe Leu Val Leu Ile Leu Lys Gly
 1 5 10 15
 Val Gln Cys Asp Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln
 20 25 30
 Pro Gly Gly Ser Arg Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe
 35 40 45
 Ser Ser Phe Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Glu Lys Gly Leu
 50 55 60
 Glu Trp Val Ala Tyr Ile Asn Gly Gly Ser Ser Thr Ile Phe Tyr Ala
 65 70 75 80
 Asn Ala Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Pro Lys Asn
 85 90 95
 Thr Leu Phe Leu Gln Met Thr Ile Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Ile
 100 105 110
 Tyr Tyr Cys Gly Arg Tyr Ala Ser Tyr Gly Gly Gly Ala Met Asp Tyr
 115 120 125
 Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
 130 135

<210> 21
 < 211> 130
 < 212> PRT
 < 213> Mus musculus

15

<400> 21

ES 2 598 034 T3

Met Asp Phe Leu Val Gln Ile Phe Ser Phe Leu Leu Ile Ser Ala Ser
 1 5 10 15
 Val Ala Met Ser Arg Gly Glu Asn Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile
 20 25 30
 Met Ser Ala Ser Pro Gly Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Arg Ala Ser
 35 40 45
 Ser Thr Val Asn Ser Thr Tyr Leu His Trp Phe Gln Gln Lys Ser Gly
 50 55 60
 Ala Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr Gly Ser Ser Asn Leu Ala Ser Gly
 65 70 75 80
 Val Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu
 85 90 95
 Thr Ile Ser Ser Val Glu Ala Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln
 100 105 110
 Gln Tyr Ser Gly Tyr Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Thr Leu Glu
 115 120 125

Leu Lys
 130

<210> 22

5

< 211> 138

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 22

Met Glu Trp Ser Trp Val Phe Leu Phe Leu Leu Ser Val Thr Thr Gly
 1 5 10 15
 Val His Ser Glu Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Asp Leu Val Lys
 20 25 30
 Pro Gly Ala Leu Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe
 35 40 45
 Thr Ala Tyr Tyr Ile His Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu
 50 55 60
 Glu Trp Ile Gly Arg Val Asn Pro Asn Thr Gly Gly Thr Ser Tyr Asn
 65 70 75 80
 Pro Lys Phe Lys Gly Lys Ala Ile Leu Asn Val Asp Lys Ser Ser Ser
 85 90 95
 Thr Ala Tyr Met Glu Leu Arg Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val
 100 105 110
 Tyr Tyr Cys Ala Arg Ser Gly Ser Pro Tyr Tyr Arg Tyr Asp Asp Trp
 115 120 125
 Gly Gln Gly Thr Thr Leu Thr Val Ser Ser
 130 135

10

<210> 23

< 211> 131

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 23

Met Lys Leu Pro Val Arg Leu Leu Val Leu Met Phe Trp Ile Pro Ala
 1 5 10 15
 Ser Ser Ser Asp Val Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val
 20 25 30
 Ser Leu Gly Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile
 35 40 45
 Val Asn Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro
 50 55 60
 Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
 65 70 75 80
 Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr
 85 90 95
 Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys
 100 105 110
 Phe Gln Gly Ser His Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu
 115 120 125
 Glu Ile Lys
 130

15

<210> 24

< 211> 139

ES 2 598 034 T3

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

<400> 24

Met Leu Leu Gly Leu Lys Trp Val Phe Phe Val Val Phe Tyr Gln Gly
 1 5 10 15
 Val His Cys Glu Val Gln Leu Val Glu Thr Gly Gly Gly Leu Val Gln
 20 25 30
 Pro Lys Gly Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe
 35 40 45
 Asn Thr Asn Ala Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu

5

50 55 60
 Glu Trp Val Ala Arg Ile Arg Ser Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr Tyr
 65 70 75 80
 Tyr Ala Asp Ser Val Lys Asp Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Thr
 85 90 95
 Gln Ser Met Ile Tyr Leu Gln Met Asn Asn Leu Lys Thr Glu Asp Thr
 100 105 110
 Gly Met Tyr Tyr Cys Val Arg Gly Gly Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val
 115 120 125
 Trp Gly Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
 130 135

<210> 25

< 211> 112

< 212> PRT

10

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Péptido generado sintéticamente

<400> 25

Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1 5 10 15
 Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Asn
 20 25 30
 Asp Gly Asn Thr Tyr Phe Glu Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala
 35 40 45
 Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
 50 55 60
 Ser Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr His Phe Thr Leu Thr Ile
 65 70 75 80
 Ser Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly
 85 90 95
 Ser Tyr Val Pro Leu Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
 100 105 110

15

<210> 26

< 211> 120

< 212> PRT

< 213> Secuencia artificial

<220>

20

< 223> Péptido generado sintéticamente

<400> 26

ES 2 598 034 T3

Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1 Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
 20 Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
 35 Ala Tyr Ile Asn Gly Gly Ser Ser Thr Ile Phe Tyr Ala Asn Ala Val
 50 Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr
 65 Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
 85 Ala Arg Tyr Ala Ser Tyr Gly Gly Gly Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
 100 Gly Thr Leu Val Thr Val ser Ser
 115 120

<210> 27

< 211> 393

< 212> AND

5

< 213> Mus musculus

<220>

< 221> CDS

< 222> (1)...(393)

<400> 27

atg aag ttg cct gtt agg ctg ttg gtg ctg atg ttc tgg att cct gct	48
Met Lys Leu Pro Val Arg Leu Leu Val Leu Met Phe Trp Ile Pro Ala	
1 5 10 15	
tcc agc agt gat att ttg atg acc caa act cca ctg tcc ctg cct gtc	96
Ser Ser Ser Asp Ile Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val	
20 25 30	
agt ctt gga gat caa gcc tca ata tct tgc aga tct agt cag agc att	144
Ser Leu Gly Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile	
35 40 45	
gta cat aat gat gga aac acc tat ttt gaa tgg tac ctg cag aaa cca	192
Val His Asn Asp Gly Asn Thr Tyr Phe Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro	
50 55 60	
ggc cag tct cca aaa ctc ctg atc tac aaa gtt tcc aat cga ttt tct	240
Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser	
65 70 75 80	
ggg gtc cca gac agg ttc agt ggc agt gga tca ggg aca cat ttc aca	288
Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr His Phe Thr	
85 90 95	
ctc aac atc agc aga gtg gag gct gag gat ctg gga att tat tac tgc	336
Leu Asn Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Ile Tyr Tyr Cys	
100 105 110	
ttt caa ggt tca tat gtt cct ctc acg ttc ggt gct ggg acc aag ctg	384
Phe Gln Gly Ser Tyr Val Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu	
115 120 125	
gag ctg aaa	393
Glu Leu Lys	
130	

10

<210> 28

< 211> 417

< 212> AND

< 213> Mus musculus

15

<220>

< 221> CDS

< 222> (1)...(417)

ES 2 598 034 T3

<400> 28

atg gac tcc agg ctc aat tta gtt ttc ctt gtc ctt att tta aaa ggt	48
Met Asp Ser Arg Leu Asn Leu Val Phe Leu Val Leu Ile Leu Lys Gly	
1 5 10 15	
gtc cag tgt gat gtg cag ctg gtg gag tct ggg gga ggc tta gtg cag	96
Val Gln Cys Asp Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln	
20 25 30	
cct gga ggg tcc cgg aaa ctc tcc tgt gca gcc tct gga ttc act ttc	144
Pro Gly Gly Ser Arg Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe	
35 40 45	
agt agc ttt gga atg cac tgg gtt cgt cag gct cca gag aag ggg ctg	192
Ser Ser Phe Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Glu Lys Gly Leu	
50 55 60	
gag tgg gtc gca tac att aat ggt ggc agt agt acc atc ttc tat gca	240
Glu Trp Val Ala Tyr Ile Asn Gly Gly Ser Ser Thr Ile Phe Tyr Ala	
65 70 75 80	
aac gca gtg aag ggc cga ttc acc atc tcc aga gac aat ccc aag aat	288
Asn Ala Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Pro Lys Asn	
85 90 95	
acc ctg ttc ctg caa atg acc att cta agg tct gag gac acg gcc att	336
Thr Leu Phe Leu Gln Met Thr Ile Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Ile	
100 105 110	
tat tac tgt gga agg tat gct agt tac gga ggg ggt gct atg gac tat	384
Tyr Tyr Cys Gly Arg Tyr Ala Ser Tyr Gly Gly Gly Ala Met Asp Tyr	
115 120 125	
tgg ggt caa gga acc tca gtc acc gtc tcc tca	417
Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser	
130 135	

5

<210> 29

< 211> 390

< 212> AND

< 213> Mus musculus

<220>

10

< 221> CDS

< 222> (1)...(390)

<400> 29

ES 2 598 034 T3

atg gat ttt ctg gtg cag att ttc agc ttc ttg cta atc agt gcc tca	48
Met Asp Phe Leu Val 5 Gln Ile Phe Ser Phe Leu Leu Ile Ser Ala Ser	
1 10 15	
gtt gca atg tcc aga gga gaa aat gtg ctc acc cag tct cca gca atc	96
Val Ala Met Ser 20 Arg Gly Glu Asn Val 25 Leu Thr Gln Ser 30 Pro Ala Ile	
atg tct gca tct cca ggg gaa aag gtc acc atg acc tgc agg gcc agc	144
Met Ser Ala Ser 35 Pro Gly Glu Lys Val 40 Thr Met Thr Cys Arg Ala Ser	
tca act gta aat tcc act tac ttg cac tgg ttc cag cag aag tca ggt	192
Ser Thr Val Asn Ser Thr Tyr 55 Leu His Trp Phe Gln Gln Lys Ser Gly	
50 55 60	
gcc tcc ccc aaa ctc tgg att tat ggc tca tcc aac ttg gct tct gga	240
Ala Ser Pro Lys Leu Trp 70 Ile Tyr Gly Ser Ser 75 Asn Leu Ala Ser Gly	
65 70 75 80	
gtc cct gct cgc ttc agt ggc agt ggg tct ggg acc tct tac tct ctc	288
Val Pro Ala Arg Phe 85 Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu	
90 95	
aca atc agc agt gtg gag gct gaa gat gct gcc act tat tac tgc cag	336
Thr Ile Ser Ser Val 100 Glu Ala Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln	
105 110	
cag tac agt ggt tac cca ctc acg ttc ggt gct ggg acc acg ctg gag	384
Gln Tyr Ser Gly Tyr Pro Leu Thr 120 Phe Gly Ala Gly Thr Thr Leu Glu	
115 125	
ctg aaa	390
Leu Lys	
130	

<210> 30

< 211> 414

< 212> AND

5 < 213> Mus musculus

<220>

< 221> CDS

< 222> (1)...(414)

<400> 30

ES 2 598 034 T3

atg gaa tgg agc tgg gtc ttt ctc ttc ctc ctg tca gtc act aca ggt 48 Met Glu Trp Ser Trp Val Phe Leu Phe Leu Ser Val Thr Thr Gly 1 5 10 15
gtc cac tct gag gtc cag ctg cag cag tct gga cct gac ctg gtg aag 96 Val His Ser Glu Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Asp Leu Val Lys 20 25 30
cct ggg gct tta gtg aag ata tcc tgc aag gct tct ggt tac tca ttc 144 Pro Gly Ala Leu Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe 35 40 45
act gcc tac tac att cac tgg gtg aag cag agc cat gga aag agc ctt 192 Thr Ala Tyr Tyr Ile His Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu 50 55 60
gag tgg att gga cgt gtt aat cct aat act ggt ggt act agc tac aac 240 Glu Trp Ile Gly Arg Val Asn Pro Asn Thr Gly Gly Thr Ser Tyr Asn 65 70 75 80
ccg aag ttc aag ggc aag gcc ata tta aat gta gat aag tca tcc agc 288 Pro Lys Phe Lys Gly Lys Ala Ile Leu Asn Val Asp Lys Ser Ser Ser 85 90 95
aca gcc tac atg gag ctc cgc agc ctg aca tct gag gac tct gcg gtc 336 Thr Ala Tyr Met Glu Leu Arg Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val 100 105 110
tat tac tgt gca aga tcg gga tcc ccc tac tat agg tac gac gac tgg 384 Tyr Tyr Cys Ala Arg Ser Gly Ser Pro Tyr Tyr Arg Tyr Asp Asp Trp 115 120 125
ggc caa ggc acc act ctc aca gtc tcc tca 414 Gly Gln Gly Thr Thr Leu Thr Val Ser Ser 130 135

<210> 31

< 211> 393

< 212> AND

5 < 213> Mus musculus

<220>

< 221> CDS

< 222> (1)...(393)

<400> 31

atg aag ttg cct gtt agg ctg ttg gtg ctg atg ttc tgg att cct gct 48 Met Lys Leu Pro Val Arg Leu Leu Val Leu Met Phe Trp Ile Pro Ala 1 5 10 15
tcc agc agt gat gtt ttg atg acc caa act cca ctc tcc ctg cct gtc 96 Ser Ser Ser Asp Val Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val 20 25 30
agt ctt gga gat caa gcc tcc atc tct tgc aga tct agt cag agc att 144 Ser Leu Gly Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile 35 40 45
gta aat agt aat gga aac acc tat tta gaa tgg tac ctg cag aaa cca 192

10

ES 2 598 034 T3

Val Asn Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro
 50 55 60
 ggc cag tct cca aag ctc ctg atc tac aaa gtt tcc aac cga ttt tct 240
 Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
 65 70 75 80
 ggg gtc cca gac agg ttc agt ggc agt gga tca ggg aca gat ttc aca 288
 Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr
 85 90 95
 ctc aag atc agc aga gtg gag gct gag gat ctg gga gtt tat tac tgc 336
 Leu Lys Ile Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys
 100 105 110
 ttt caa ggt tca cat gtt ccg tgg acg ttc ggt gga ggc acc aag ctg 384
 Phe Gln Gly Ser His Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu
 115 120 125
 gaa atc aaa 393
 Glu Ile Lys
 130

<210> 32

< 211> 417

< 212> AND

5

< 213> Mus musculus

<220>

< 221> CDS

< 222> (1)...(417)

<400> 32

atg ctg ttg ggg ctg aag tgg gtt ttc ttt gtt gtt ttt tat caa ggt 48
 Met Leu Leu Gly Leu Lys Trp Val Phe Phe Val Val Phe Tyr Gln Gly
 1 5 10 15
 gtg cat tgt gag gtg cag ctt gtt gag act ggt gga gga ttg gtg cag 96
 Val His Cys Glu Val Gln Leu Val Glu Thr Gly Gly Gly Leu Val Gln
 20 25 30
 cct aaa ggg tca ttg aaa ctc tca tgt gca gcc tct gga ttc acc ttc 144
 Pro Lys Gly Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe
 35 40 45
 aat acc aat gcc atg aac tgg gtc cgc cag gct cca gga aag ggt ttg 192
 Asn Thr Asn Ala Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu
 50 55 60
 gaa tgg gtt gct cgc ata aga agt aaa agt aat aat tat gca aca tat 240
 Glu Trp Val Ala Arg Ile Arg Ser Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr Tyr
 65 70 75 80
 tat gcc gat tca gtg aaa gac agg ttc acc atc tcc aga gat gat aca 288
 Tyr Ala Asp Ser Val Lys Asp Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Thr
 85 90 95
 caa agc atg atc tat ctg caa atg aac aac ttg aaa act gag gac aca 336
 Gln Ser Met Ile Tyr Leu Gln Met Asn Asn Leu Lys Thr Glu Asp Thr
 100 105 110
 ggc atg tat tac tgt gtg aga ggg gga agc tac tgg tac ttc gat gtc 384
 Gly Met Tyr Tyr Cys Val Arg Gly Gly Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val
 115 120 125
 tgg ggc gca ggg acc acg gtc acc gtc tcc tca 417
 Trp Gly Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
 130 135

10

<210> 33

< 211> 111

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

ES 2 598 034 T3

<400> 33

Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ser Val Ser Leu Gly
 1 5 10 15
 Glu Arg Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Tyr Asp
 20 25 30
 Gly Asp Ser Tyr Met Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro
 35 40 45
 Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Ile Pro Ala
 50 55 60
 Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His
 65 70 75 80
 Pro Val Glu Glu Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn
 85 90 95
 Glu Asp Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 34

< 211> 112

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

5

<400> 34

Asp Ile Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly
 1 5 10 15
 Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Asn
 20 25 30
 Asp Gly Asn Thr Tyr Phe Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
 35 40 45
 Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
 50 55 60
 Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr His Phe Thr Leu Asn Ile
 65 70 75 80
 Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Ile Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly
 85 90 95
 Ser Tyr Val Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys
 100 105 110

<210> 35

< 211> 116

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

10

<400> 35

Glu Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly
 1 5 10 15
 Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Thr Tyr
 20 25 30
 Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Glu Lys Arg Leu Glu Trp Val
 35 40 45
 Ala Ser Ile Ser Thr Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys
 50 55 60
 Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Arg Asn Ile Leu Tyr Leu
 65 70 75 80
 Gln Met Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys Ala
 85 90 95
 Arg Asp Tyr Asp Gly Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr Leu
 100 105 110
 Thr Val Ser Ser
 115

<210> 36

< 211> 120

< 212> PRT

< 213> Mus musculus

15

<400> 36

ES 2 598 034 T3

Asp Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1 5 10 15
 Ser Arg Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe
 20 25 30
 Gly Met His Trp Val Arg Gln Ala Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val
 35 40 45
 Ala Tyr Ile Asn Gly Gly Ser Ser Thr Ile Phe Tyr Ala Asn Ala Val
 50 55 60
 Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Pro Lys Asn Thr Leu Phe
 65 70 75 80
 Leu Gln Met Thr Ile Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Ile Tyr Tyr Cys
 85 90 95
 Gly Arg Tyr Ala Ser Tyr Gly Gly Gly Ala Met Asp Tyr Trp Gly Gln
 100 105 110
 Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
 115 120

<210> 37
 < 211> 111
 < 212> PRT
 < 213> Homo sapiens

5

<400> 37
 Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
 1 5 10 15
 Asp Arg Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Tyr Asp
 20 25 30
 Gly Asp Ser Tyr Met Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Lys Ala Pro
 35 40 45
 Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Ile Pro Ser
 50 55 60
 Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser
 65 70 75 80
 Ser Leu Gln Pro Glu Asp Phe Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn
 85 90 95
 Glu Asp Pro Trp Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Val Glu Ile Lys
 100 105 110

<210> 38
 < 211> 116
 < 212> PRT
 < 213> Homo sapiens

10

<400> 38
 Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1 5 10 15
 Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Thr Tyr
 20 25 30
 Ala Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
 35 40 45
 Ala Ser Ile Ser Thr Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys
 50 55 60
 Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr Leu
 65 70 75 80
 Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys Ala
 85 90 95
 Arg Asp Tyr Asp Gly Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val
 100 105 110
 Thr Val Ser Ser
 115

<210> 39
 < 211> 36
 < 212> AND
 < 213> Secuencia artificial

15

<220>
 < 223> Cebador

20

<400> 39

cccgggacca tatgcaggcc accgaatatg agtacc 36

<210> 40

< 211> 37

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 40

tatgagcata tggattatga tttcctgccca gaaacgg 37

10 <210> 41

< 211> 41

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 41

aaacggagca tatggaaatg ctgaggaaca gcactgacac c 41

<210> 42

< 211> 39

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 42

25 aaccctcat atgaccactg tggagcctgc tgcaaggcg 39

<210> 43

< 211> 39

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 43

gtggtcagat cttccatagc tgctgaatcc gtggacagg 39

<210> 44

35 < 211> 37

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 44

gttctcaga tcttctggag gctccgttc tggcagg 37

<210> 45

< 211> 37

< 212> AND

5

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 45

aggcccaaga tctggagtgg tgtcagtgc gttctc 37

10

<210> 46

< 211> 35

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15

< 223> Cebador

<400> 46

ggctccagat ctgtagactc aggggtcca ggccc 35

20

<210> 47

< 211> 38

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 47

25

gtggtcagat ctgtgactgc ccctctgca tccaggcc 38

<210> 48

< 211> 37

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30

<220>

< 223> Cebador

<400> 48

gccagcagat cttgctcac agagatgtgg tctgggg 37

35

<210> 49

< 211> 34

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40

<400> 49

cgcggatcca tgctctgca actcctcctg ttgc 34

<210> 50

< 211> 35

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 50

gccagcctcg agcttcacag agatgtggtc tgggg 35

10 <210> 51

< 211> 40

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 51

ggtctgctcg agcatagctg ctgaatccgt ggacaggctc 40

<210> 52

< 211> 30

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 52

25 agacaggcca ccgaagggaa cctgtccacg 30

<210> 53

< 211> 30

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 53

cgtaggacagg ttcccttcgg tggcctgtct 30

<210> 54

35 < 211> 27

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 54

ccgctcgagc gccaagatta ggatggc 27

<210> 55

< 211> 27

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 55

cgggatccac tcaaaccaca gccatgg 27

10 <210> 56

< 211> 27

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 56

ccgctcgagt ggtagtaggt tccatgg 27

<210> 57

< 211> 26

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 57

25 cgggatcaac tcaaccaca ggcctg 26

<210> 58

< 211> 28

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 58

ctgtgcctcg agggctgtgg ttgagtg 28

<210> 59

35 < 211> 30

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 59

cgggatccat ggagatacag accactcaac 30

<210> 60

< 211> 28

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 60

cgggatccga tgcaggaggg gcagtcac 28

10 <210> 61

< 211> 27

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 61

ggccgtcact cgagttgtct gtgcctc 27

<210> 62

< 211> 43

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 62

25 tatggattca gcagctatgg agatacagac cactcaacca gca 43

<210> 63

< 211> 45

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 63

gatctgctgg ttgagtggtc tgtatctcca tagctgctga atcca 45

<210> 64

35 < 211> 43

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 64

tatggattca gcagctatgc ggatacagac cactcaacca gca 43

<210> 65

< 211> 45

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 65

gatctgctgg ttgagtggtc tgtatccgca tagctgctga atcca 45

10 <210> 66

< 211> 31

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 66

ctagtctaga tgaccxaaac tccactctcc c 31

<210> 67

< 211> 49

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 67

25 ctagtctaga attaggaaag tgcacttagc atcagcccgt ttgattcc 49

<210> 68

< 211> 33

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 68

taacattcta gatgctgttg gggctgaagt ggg 33

<210> 69

35 < 211> 49

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 69

ggatagtcta gaggttgga ggactcacct gaggagacgg tgaccgtgg 49

<210> 70

< 211> 37

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 70

ctagtctaga tggagacaga cacactcctg ttatggg 37

10 <210> 71

< 211> 49

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 71

ctagtctaga attaggaaag tgcactttt ccagcttgg cccccctcc 49

<210> 72

< 211> 37

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 72

25 ctagtctaga tggactccag gctcaattta gtttcc 37

<210> 73

< 211> 51

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 73

ctagtctaga ggttgtagg actcacctga ggagacggtg actgaggttc c 51

<210> 74

35 < 211> 36

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

40 <400> 74

ctagtctaga tggatttct ggtgcagatt ttcagc 36

<210> 75

< 211> 49

< 212> AND

5 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 75

ctagtctaga attaggaaag tgcacttagc atcagcccgt ttcagctcc 49

10 <210> 76

< 211> 33

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

15 < 223> Cebador

<400> 76

ctagtctaga tggatggag ctgggtcttt ctc 33

<210> 77

< 211> 51

20 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 77

25 ctagtctaga ggtgtgagg actcaccagc ttccagtgga tagactgatg g 51

<210> 78

< 211> 65

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

30 <220>

< 223> Cebador

<400> 78

tctatctaga tgaacttcgg gtccagcttg attttccttg tccttgttt aaaaggtgtc 60
cagtg 65

<210> 79

35 < 211> 69

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

ES 2 598 034 T3

<400> 79
ccttgtttta aaaggtgtcc agtgtgaagt gcaactggtg gagtctgggg gaggcttagt 60
gcagcctgg 69

5
<210> 80
< 211> 65
< 212> AND
< 213> Secuencia artificial

<220>
< 223> Cebador

10
<400> 80
ctgaaagtga atccagaggc tgacacaggag agtctcaagc ttctccagg ctgactaag 60
cctcc 65

<210> 81
< 211> 69
< 212> AND
< 213> Secuencia artificial

15
<220>
< 223> Cebador

<400> 81
gcctctggat tcactttcag tagctttgga atgcactggg ttcgccaggc tccaggaag 60
ggactcgag 69

20
<210> 82
< 211> 66
< 212> AND
< 213> Secuencia artificial

<220>
< 223> Cebador

25
<400> 82
gcatagaaga tggactact gccaccatta atgtatgca cccactcgag tcccttcct 60
ggagcc 66

30
<210> 83
< 211> 62
< 212> AND
< 213> Secuencia artificial

<220>
< 223> Cebador

35
<400> 83
gtagtaccat ctctatgca aacgcagtga agggccgatt caccatctcc agagataatg 60
cc 62

<210> 84
< 211> 63
< 212> AND
< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 84

cctcagccct cagagaattc atttgcaggt acaggggtgtt cttggcatta tctctggaga 60
tgg 63

<210> 85

5

< 211> 63

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

10

<400> 85

gaatttctctg agggctgagg acacggccgt gtattactgt gcaagatatg ctagttagcg 60
agg 63

<210> 86

< 211> 60

< 212> AND

15

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 86

ctgtgaccag ggtgccttgg cccaatagt ccatagcacc ccctccgtaa ctagcatatc 60

20

<210> 87

< 211> 57

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

25

< 223> Cebador

<400> 87

accctctaga ggttgtgagg actcacctga ggagactgtg accaggggtgc cttggcc 57

<210> 88

< 211> 60

30

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 88

35

tctatctaga tggagacaga cacaatcctg ctatgggtgc tgctgctctg ggttccaggc 60

<210> 89

< 211> 61

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>
 < 223> Cebador

 <400> 89
 gctgctctgg gttccaggct cactggtga cattcagatg acccaatctc cgagctcttt 60
 g 61

 5 <210> 90
 < 211> 60
 < 212> AND
 < 213> Secuencia artificial

 <220>
 10 < 223> Cebador

 <400> 90
 gatctgcagg tgatagtgac cctatcccct acagacgcag acaaagagct cggagattgg 60

 <210> 91
 < 211> 63
 15 < 212> AND
 < 213> Secuencia artificial

 <220>
 < 223> Cebador

 <400> 91
 cactatcacc tgcagatcta gtcagagcat tgtacataat gatggaaca cctatcttga 60
 atg 63
 20

 <210> 92
 < 211> 59
 < 212> AND
 < 213> Secuencia artificial

 25 <220>
 < 223> Cebador

 <400> 92
 gatgagaagc ttgggtgcct ttctggttt ctgttggtac cattcaaat aggtgtttc 59

 <210> 93
 < 211> 66
 30 < 212> AND
 < 213> Secuencia artificial

 <220>
 < 223> Cebador

 <400> 93
 gcacccaagc ttctcatcta taaagtttcc aatcgatttt ctggtgtccc atccaggttt 60
 agtggc 66
 35

 <210> 94
 < 211> 61
 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 94

5 gcagagaaga gatggtgagg gtgaagtgtg tcccagaccc actgccacta aacctggatg 60
g 61

<210> 95

< 211> 55

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

10 <220>

< 223> Cebador

<400> 95

ctcacatct cttctctgca gccggaggat ttcgcaacct attactgttt tcaag 55

<210> 96

15 < 211> 57

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

20 <400> 96

ccttggtgcc ttgaccgaac gtgagaggaa catatgaacc ttgaaaacag taatagg 57

<210> 97

< 211> 58

< 212> AND

25 < 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 97

accctctaga attaggaaag tgcacttacg tttgatttcc accttggtgc cttgaccg 58

30 <210> 98

< 211> 30

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

35 < 223> Cebador

<400> 98

tatatctaga attcccccc ccccccccc 30

<210> 99

< 211> 46

40 < 212> AND

< 213> Secuencia artificial

<220>

< 223> Cebador

<400> 99

5 tatagagctc aagcttggat ggtgggaaga tggatacagt tgggtgc 46

<210> 100

< 211> 50

< 212> AND

< 213> Secuencia artificial

10

<220>

< 223> Cebador

<220>

< 221> misc_feature

< 222> 30

15

< 223> n = c, a o t

<220>

< 221> misc_feature

< 222> 38

< 223> n = c o g

20

<220>

< 221> misc_feature

< 222> 42

< 223> n = c o t

<400> 100

25

tatagagctc aagcttccag tggatagacn gatggggntg tngtttggc 50

REIVINDICACIONES

- 5 1. Un anticuerpo que se une específicamente a PGSL-1 que comprende una primera cadena de inmunoglobulina y una segunda cadena de inmunoglobulina, en donde la primera cadena, la cual es una cadena ligera, y la segunda cadena, la cual es una cadena pesada, contienen, respectivamente, las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12; o las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18.
- 10 2. El anticuerpo de la reivindicación 1, en donde el anticuerpo comprende:
(i) la región variable de la cadena ligera de la SEQ ID NO: 21 y la región variable de la cadena pesada de la SEQ ID NO: 22, o
(ii) la región variable de la cadena ligera de la SEQ ID NO: 23 y la región variable de la cadena pesada de la SEQ ID NO: 24.
- 15 3. Una composición que comprende un anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2.
- 20 4. Uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en la fabricación de un medicamento para modular una respuesta inmune mediada por células T en un sujeto que tiene o que está en riesgo de tener una afección relacionada con una respuesta inmune excesiva mediada por células T, en donde la afección es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica o un cáncer de células T.
- 25 5. Uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en la fabricación de un medicamento para tratar o prevenir el rechazo del trasplante alogéneo o xenogéneo, opcionalmente en donde el anticuerpo es quimérico o está humanizado.
- 30 6. Un ácido nucleico aislado que comprende una secuencia que codifica un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1 que comprende
(i) las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12;
(ii) las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18;
o (iii) las SEQ ID NOs: 21 y 22 o 23 y 24.
- 35 7. Un vector que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 6.
- 40 8. Una célula hospedante que comprende un ácido nucleico que codifica un anticuerpo que se une específicamente a PSGL-1 que comprende
(i) las SEQ ID NOs: 7-9 y las SEQ ID NOs: 10-12; o
(ii) las SEQ ID NOs: 13-15 y las SEQ ID NOs: 16-18.
- 45 9. Una célula hospedante que comprende un ácido nucleico que codifica las SEQ ID NO: 21 y 22 o 23 y 24.
- 50 10. La célula hospedante de la reivindicación 8 o la reivindicación 9, en donde la célula es una célula bacteriana, una célula de levadura, una célula vegetal, una célula de insectos o una célula de mamíferos.
11. La célula hospedante de la reivindicación 10, en donde la célula de mamíferos es una célula de hibridoma.
12. El uso de una cantidad eficaz de un anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en la fabricación de un medicamento para tratar la enfermedad de injerto frente a hospedante (GVHD) en un sujeto, opcionalmente en donde el anticuerpo es quimérico o está humanizado.
13. El uso de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el sujeto ha recibido o se ha contemplado que reciba un trasplante alogéneo o xenogéneo, opcionalmente en donde el trasplante comprende médula ósea, hígado, un órgano o tejido.
14. El uso de la reivindicación 5, en donde el trasplante comprende médula ósea, hígado, un órgano o tejido.