19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 618 490**

51 Int. Cl.:

C12N 5/071 (2010.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **02.07.2008 PCT/EP2008/058472**

87 Fecha y número de publicación internacional: **08.01.2009 WO09004016**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **02.07.2008 E 08785896 (5)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **28.12.2016 EP 2176398**

54 Título: **Estirpes celulares aviares inmortalizadas**

30 Prioridad:

03.07.2007 EP 07360030

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

21.06.2017

73 Titular/es:

**TRANSGENE SA (100.0%)
Parc d'Innovation Boulevard Gonthier
d'Andernach
67400 Illkirch Graffenstaden, FR**

72 Inventor/es:

**ERBS, PHILIPPE;
KAPFER, MARINA y
SILVESTRE, NATHALIE**

74 Agente/Representante:

CURELL AGUILÁ, Mireia

Observaciones :

**Véase nota informativa (Remarks, Remarques
o Bemerkungen) en el folleto original publicado
por la Oficina Europea de Patentes**

ES 2 618 490 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Estirpes celulares aviares inmortalizadas.

- 5 La presente invención se refiere a células aviares inmortalizadas, y a la utilización de estas células para la producción de virus. Las células según la invención son particularmente útiles para la producción de vectores virales recombinantes que se pueden utilizar para la preparación de composiciones terapéuticas y/o profilácticas para el tratamiento de animales, y más particularmente seres humanos.
- 10 Las estirpes celulares eucarióticas son fundamentales para la fabricación de vacunas virales y muchos productos de biotecnología. Los productos biológicos producidos en cultivos celulares incluyen enzimas, hormonas, productos inmunobiológicos (anticuerpos monoclonales, interleucinas, linfocinas), y agentes contra el cáncer. Aunque muchas proteínas más simples se pueden producir usando células bacterianas, actualmente muchas proteínas complejas que están glicosiladas deben realizarse en células eucarióticas.
- 15 Las células aviares se han usado durante años para la producción de vectores virales. Por ejemplo, el virus vaccinia usado para preparar una composición profiláctica para el tratamiento de la viruela se cultivó en fibroblastos embionarios de pollo (CEF). Las células aviares son particularmente útiles puesto que muchos virus usados en una composición farmacéutica pueden replicarse en las mismas. De forma más evidente, diversos virus pueden únicamente crecer en células aviares. Este es, por ejemplo, el caso del virus Ankara (MVA) de mamíferos, que no puede crecer en células de mamífero. Este poxvirus, que procede de un virus vaccinia mediante más de 500 pases sobre CEF, se usó a principios de los setenta para vacunar a personas inmunodeficientes contra la viruela. Actualmente, el MVA se usa principalmente como un vector en el contexto de la terapia génica. Por ejemplo, el MVA se usa como un vector para el gen MUC1 para vacunar a pacientes contra un tumor que expresa este antígeno
- 20 (Scholl *et al.*, 2003, J Biomed Biotechnol., 2003, 3, 194-201). Los MVA portadores del gen que codifica antígenos del HPV también se usan como un vector para el tratamiento terapéutico del carcinoma ovárico. Más recientemente, el MVA ha sido el vector de elección para preparar un tratamiento profiláctico contra nuevas enfermedades emergentes o probables armas biológicas tales como el virus del Nilo Occidental y el ántrax.
- 25 A este respecto, existe una necesidad creciente para la producción de virus. Por ahora, el procedimiento de producción de MVA más utilizado comprende una etapa de replicación del virus en CEF. Sin embargo, la utilización de CEF está relacionada con diversas dificultades. En primer lugar, la preparación de CEF comprendió muchas etapas que se han realizado manualmente.
- 30 Además, este procedimiento de producción del virus depende de la disponibilidad de huevos, que se pueden destruir totalmente en caso de contaminación de las crías. Este problema cada vez más relevante con la diseminación de la gripe aviar.
- 35 Además, muchos CEF presentan una actividad de transcriptasa inversa (RT). La RT es una enzima necesaria para que los retrovirus se reproduzcan. Los retrovirus se encuentran en muchas especies diferentes. La RT no es infecciosa en seres humanos ni en animales, y no se ha demostrado que provoque efectos adversos sobre la salud en personas. Usando un ensayo basado en una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) altamente sensible, la actividad de RT se ha detectado en cantidades mínimas en vacunas fabricadas con fibroblastos de embrión de pollo. La fuente de la enzima es probablemente un genoma viral parcial que codifica RT, que se cree que está integrado en las células del pollo hace cientos o miles de años. No se conoce que los retrovirus aviares que producen esta RT afecten a seres humanos. Aunque el virus de inmunodeficiencia humana (VIH, el virus que conduce al SIDA) es un retrovirus, la actividad de RT detectada en vacunas no deriva definitivamente del VIH. Además, la presencia de RT no confirma la presencia de un retrovirus. No obstante, sería interesante una estirpe celular sin ninguna actividad de RT endógena.
- 40 Para emancipar el procedimiento de producción de virus de la utilización de CEF, existe una necesidad creciente de una estirpe celular aviar que permita la replicación y la reproducción del virus. Las estirpes celulares inmortalizadas se pueden mantener o congelar de lote a lote en el sitio de producción, y siempre están disponibles para un nuevo procedimiento de producción. Además, puesto que están confinadas en la planta de producción, están menos expuestas a la contaminación por contaminantes exógenos. Su utilización permite una reducción drástica de la manipulación manual necesaria para el procedimiento de producción. Todas estas propiedades conducen a una reducción del precio y de la duración del procedimiento de producción, así como a una disminución de la contaminación potencial.
- 45 Finalmente, las estirpes celulares se pueden caracterizar completamente y de este modo cumplen totalmente con la buena práctica de laboratorio y los requisitos de las diferentes agencias médicas.
- 50 Ya se han descrito diferentes estirpes celulares aviares. Por ejemplo, DF1 (patente US nº 5.879.924) es una estirpe celular de pollo inmortalizada espontáneamente derivada de huevos de la estirpe East Lansing (ELL-0) de 10 días de edad. Las células son útiles como sustratos para la propagación del virus, la expresión de proteínas recombinantes y la producción de virus recombinantes. Sin embargo, esta estirpe celular es susceptible a diversos
- 55
- 60
- 65

virus tales como el herpesvirus 1 de meleágridos (virus del herpes del pavo), virus de la viruela aviar, reovirus, el virus del sarcoma y la leucemia aviar, y el virus del sarcoma de Rous.

5 Las células aviares inmortales también pueden derivar de células madre embrionarias mediante separación progresiva de factores de crecimiento y de la capa alimentadora, manteniendo así los rasgos de crecimiento y una característica de tiempo de vida infinito de la célula madre no diferenciada. La única estirpe celular aviar disponible derivada mediante este procedimiento es la estirpe celular de pollo Ebx (documento WO 2005007840) que ha estado en contacto con capas alimentadoras de origen murino, provocando cuestiones reguladoras adicionales como la contaminación con virus de murino y la presencia de secuencias retrovirales endógenas en células de pollo.
10 Además, estas estirpes celulares se han descrito en algunas condiciones como inestables y tendentes a la diferenciación.

También se ha establecido una estirpe celular permanente de embrión de pato, libre de retrovirus aviares endógenos. La estirpe celular, denominada DEC 99 (Ivanov *et al.* Experimental Pathology And Parasitology, 4/2000 Bulgarian Academy of Sciences) se ha cultivado a lo largo de 140 pases consecutivos, y no es tumorigena para las aves. La estirpe celular DEC 99 es un sistema de cultivo celular estándar que se ha usado para investigación, y se puede aplicar para las necesidades de biotecnología. Esta estirpe celular es un modelo adecuado para estudios en el campo de la biología celular, virología, inmunología, toxicología y para la producción de diagnósticos y vacunas. Se ha estudiado la susceptibilidad de la estirpe celular (CL) permanente de embrión de pato DEC 99 a la infección con cepas de vacuna del poxvirus aviar (APV) adaptadas a embriones (Ivanov *et al.* Experimental Pathology And Parasitology, 4/6 2001 Bulgarian Academy of Sciences). Se han usado las cepas de vacuna FK y Dessau procedentes de aves de corral y de paloma. Las cepas virales se hicieron pasar (13 pases) consecutivamente sobre cultivos celulares (CC) primarios de embrión de pato. Las cepas virales adaptadas se hicieron pasar (12 pases) adicionalmente en los CC de la estirpe celular DEC 99, en la que se observó un efecto citopático (CPE) típico. La producción de viriones infecciosos se comprobó mediante inoculación de embriones de gallinas Leghorn blancas de 11 días, en los que se formaron proliferaciones pustulosas típicas en las membranas corioalantoideas (CAM). En las células DEC 99, la cepa FK provocó un CPE temprano, en comparación con la cepa Dessau, y alcanzó un título de 106,25 CCID50/ml. Las cepas virales adaptadas en DEC 99 indujeron "tomas" cutáneas tras la vacunación de pollos de dos meses. De este modo, parece que DEC 99, como un sistema de CC estándar, es adecuada para la producción de vacunas frente a la viruela aviar. No obstante, esta estirpe celular particular crece lentamente después del pase 40, y es incapaz de crecer en suspensión.

Ya se han usado secuencias de ácido nucleico a partir de la región temprana del adenovirus 5 de humano para transformar *in vitro* algunas células humanas específicas (estirpes celulares 293 y PER. C6; Fallaux, F. J. *et al.*, Hum. Gene Ther. 9: 1909-17 (1998); Graham, F. L. *et al.*, J. Gen. Virol. 36: 59-74 (1977)).

En términos generales, el genoma adenoviral consiste en una molécula de ADN lineal de cadena doble de aproximadamente 36 kb de longitud, que contiene las secuencias que codifican más de 30 proteínas. En cada uno de sus extremos se encuentra una secuencia invertida corta de 100 a 150 nucleótidos, dependiendo de los serotipos, denominada ITR (repetición terminal invertida). Las ITR están implicadas en la replicación del genoma adenoviral. La región de encapsidación de aproximadamente 300 nucleótidos está localizada en el extremo 5' del genoma, inmediatamente después de la ITR 5'.

Los genes tempranos se distribuyen en 4 regiones que están dispersas en el genoma adenoviral, denominadas E1 a E4 (E denotando "temprana"). Las regiones tempranas comprenden por lo menos seis unidades de transcripción que presentan sus propios promotores. La expresión de los genes tempranos está regulada por sí misma, expresándose algunos genes antes que otros. Tres regiones, E1, E2 y E4, respectivamente, son esenciales para la replicación viral. De este modo, si un adenovirus es defectuoso para una de estas funciones, es decir, si no puede producir por lo menos una proteína codificada por una de estas regiones, esta proteína se deberá suministrar *in trans*.

La región temprana E1 está situada en el extremo 5' del genoma adenoviral, y contiene 2 unidades de transcripción virales, E1A y E1B, respectivamente. Esta región codifica proteínas que participan de forma muy temprana en el ciclo viral y son esenciales para la expresión de casi todos los otros genes del adenovirus. En particular, la unidad de transcripción E1A codifica una proteína que activa *in trans* la transcripción de los otros genes virales, induciendo la transcripción a partir de los promotores de las regiones E1B, E2A, E2B y E4.

Guilhot *et al.* (Guilhot, C. *et al.*, Oncogene 8: 619-24(1993)) demostraron que la transducción retroviral de la proteína 12S de E1A a partir de Ad5 puede conducir a la immortalización de células de codorniz. Sin embargo, el documento WO200504272 describió que es imposible immortalizar células aviares cuando el gen E1A se introduce mediante transfección de ADN desnudo en lugar de mediante infección retroviral. El documento WO2005042728 afirma además: "que la transducción extremadamente eficiente y estable vía infección retroviral crea un conjunto celular suficientemente grande para contener células individuales con cambios genómicos espontáneos que tienen apoptosis bloqueada, que normalmente es inducida después de la inactivación retinoblastómica" (página 10).

La presencia de secuencias retrovirales en las células obtenidas por Guilhot *et al.* impide la utilización de dichas células para la producción del producto biológico, y más particularmente para compuestos terapéuticos.

Sorprendentemente, los inventores han descubierto que las células aviares, y más particularmente las células de *Cairina moschata*, se pueden immortalizar eficientemente mediante transfección de E1A con un vector no viral.

5 Para resolver los diferentes problemas relacionados con la utilización de CEF y/o con la utilización de estirpes celulares previamente disponibles, la presente invención proporciona una célula aviar immortalizada que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A caracterizada por que dicha célula se obtiene mediante un procedimiento que comprende la etapa de transfectar la célula con un vector no viral que comprende dicha secuencia de ácido nucleico de E1A, y en la que dicha célula no comprende una secuencia de ácido nucleico de E1B.

10 La presente invención se refiere asimismo a un procedimiento para immortalizar una célula aviar, que comprende la etapa de transfectar dicha célula con un vector no viral que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A, y en el que dicho procedimiento no comprende una etapa de transfectar dicha célula con una secuencia de ácido nucleico de E1B.

15 Una célula immortalizada, como se utiliza en la presente memoria, se refiere a una célula que puede crecer en cultivo durante más de 35 pases.

20 El término número de pases se refiere al número de veces que se ha retirado una población celular a partir del recipiente de cultivo y se ha sometido a un procedimiento de subcultivo (pase) a fin de mantener las células a una densidad suficientemente baja para estimular el crecimiento adicional.

25 Como se usa a lo largo de la presente solicitud, los términos “un” y “uno” se usan en el sentido de que significan “por lo menos uno”, “por lo menos un primer”, “uno o más” o “una pluralidad” de los componentes o etapas mencionados, a menos que el contexto dicte claramente otra cosa. Por ejemplo, el término “una célula” incluye una pluralidad de células, incluyendo las mezclas de las mismas.

30 El término “y/o”, siempre que se use en la presente memoria, incluye el significado de “y”, “o” y “todos o cualquier otra combinación de los elementos conectados mediante dicho término”.

35 Como se usa en la presente memoria, el término “que comprende” pretende referirse a que los productos, las composiciones y los métodos incluyen los componentes o etapas mencionados, pero sin excluir otros. “Que consiste esencialmente en”, cuando se usa para definir productos, composiciones y métodos, debe significar que excluye otros componentes o etapas de cualquier importancia esencial. De este modo, una composición que consiste en los componentes mencionados no excluiría contaminantes traza y vehículos farmacéuticamente aceptables. “Que consiste en” debe significar que excluye más que los elementos traza de los otros componentes o etapas.

40 Como se usa en la presente memoria, el término “secuencia de ácido nucleico de E1A” se refiere a la secuencia de ácido nucleico de todos los productos génicos de la región E1A del adenovirus, incluyendo la secuencia de ácido nucleico que codifica los dos ARN principales: 13S y 12S.

45 Preferentemente, el término “secuencia de ácido nucleico de E1A” se refiere a una secuencia de ácido nucleico que comprende una secuencia de ácido nucleico que presenta por lo menos 60% de identidad de secuencia de aminoácidos con SEC ID n°: 1. En una forma de realización más preferida de la invención, E1A se refiere a una secuencia de ácido nucleico que comprende una secuencia de ácido nucleico que presenta por lo menos 70%, preferentemente por lo menos 80% e incluso más preferentemente por lo menos 90% de identidad de secuencia de ácido nucleico con SEC ID n°: 1. En una forma de realización más preferida, E1A se refiere a la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 1.

50 Como se usa en la presente memoria, el término “secuencia de ácido nucleico de E1B” se refiere a toda secuencia de ácido nucleico de la región E1B del adenovirus, incluyendo la secuencia de ácido nucleico que codifica los 3 polipéptidos principales, de 19 kd y 55 kd.

55 Como se utiliza en la presente memoria, el término “sustancialmente la misma secuencia de ácido nucleico” se refiere a una molécula de ácido nucleico que presenta una identidad suficiente con el polinucleótido de referencia, de forma que hibridará con el nucleótido de referencia bajo unas condiciones de hibridación moderadamente severas. En una forma de realización, la molécula de ácido nucleico presenta sustancialmente la misma secuencia nucleotídica que la secuencia nucleotídica de referencia establecida en SEC ID n°: 1.

60 Hibridación se refiere a la unión de cadenas complementarias de ácido nucleico (es decir, cadenas sentido:antisentido o sonda:ADN diana) entre sí mediante enlaces de hidrógeno similares a los enlaces que se producen de forma natural en el ADN cromosómico. Los niveles de severidad usados para hibridar una sonda dada con un ADN blanco se pueden modificar fácilmente por el experto en la materia.

65 La frase “hibridación severa” se usa en la presente memoria para referirse a unas condiciones bajo las cuales los híbridos de ácidos polinucleicos son estables. Como resulta conocido por el experto en la materia, la estabilidad de

los híbridos se refleja en la temperatura de fusión (Tm) de los híbridos. En general, la estabilidad de un híbrido es una función de la concentración del ión de sodio y de la temperatura. Típicamente, la reacción de hibridación se lleva a cabo bajo unas condiciones de baja severidad, seguido de lavados de severidad variable pero más elevada. La referencia a la severidad de la hibridación se refiere a dichas condiciones de lavado.

5 Como se usa en la presente memoria, la frase "hibridación moderadamente severa" se refiere a unas condiciones que permiten que el ADN blanco se una a un ácido nucleico complementario que presenta una identidad de aproximadamente 60%, preferentemente una identidad de aproximadamente 75%, más preferentemente una identidad de aproximadamente 85% con el ADN diana, siendo especialmente preferida una identidad superior a 10 aproximadamente 90% con el ADN diana. Preferentemente, las condiciones moderadamente severas son condiciones equivalentes a la hibridación en formamida al 50%, disolución 5* de Denhart, SSPE 5*, SDS al 0.2% a 42°C, seguido del lavado en SSPE 0.2*, SDS al 0.2%, a 65 grados C.

15 Como se utiliza en la presente memoria, la expresión "vector no viral" se refiere de forma evidente a un vector de origen plasmídico, y opcionalmente a un vector tal combinado con una o más sustancias que mejoran la eficiencia transfeccional y/o la estabilidad de dicho vector y/o la protección de dicho vector *in vivo* con respecto al sistema inmunitario del organismo hospedador. Estas sustancias están ampliamente documentadas en la bibliografía, que resulta accesible para el experto en la materia (véase, por ejemplo, Feigner *et al.*, 1987, Proc. West. Pharmacol. Soc. 32, 115-121; Hodgson y Solaiman, 1996, Nature Biotechnology 14, 339-342; Remy *et al.*, 1994, Bioconjugate Chemistry 5, 647-654). De manera ilustrativa y no limitativa, éstos pueden ser polímeros, lípidos, en particular lípidos catiónicos, liposomas, proteínas nucleares o lípidos neutros. Estas sustancias se pueden usar solas o en combinación. Los ejemplos de dichos compuestos están disponibles en particular en las solicitudes de patente WO 20 98/08489, WO 98/17693, WO 98/34910, WO 98/37916, WO 98/53853, EP 890362 o WO 99/05183. Una combinación que se puede prever es un vector recombinante plasmídico combinado con lípidos catiónicos (DOGS, DC-COL, espermina-col, espermidina-col y similares) y lípidos neutros (DOPE).

La elección de los plásmidos que se pueden usar en el contexto de la presente invención es amplia. Pueden ser vectores de clonación y/o de expresión. En general, son conocidos por el experto en la materia, y un número de ellos están comercialmente disponibles, pero también es posible construirlos o modificarlos mediante técnicas de ingeniería genética. Se pueden mencionar, a manera de ejemplos, los plásmidos derivados de pBR322 (Gibco BRL), pUC (Gibco BRL), pBluescript (Stratagene), pREP4, pCEP4 (Invitrogene) o p Poly (Lathé *et al.*, 1987, Gene 57, 193-201). Preferentemente, un plásmido usado en el contexto de la presente invención contiene un origen de replicación que asegura el inicio de la replicación en una célula productora y/o una célula hospedadora (por ejemplo, se puede seleccionar el origen ColE1 para un plásmido destinado a ser producido en *E. coli*, y se puede seleccionar el sistema oriP/EBNA1 si se desea que se autorreplice en una célula hospedadora de mamífero, Lupton y Levine, 1985, Mol. Cell. Biol. 5, 2533-2542; Yates *et al.*, Nature 313, 812-815). Puede comprender elementos adicionales que mejoran su mantenimiento y/o su estabilidad en una célula dada (secuencia *cer* que promueve el mantenimiento monomérico de un plásmido (Summers y Sherrat, 1984, Cell 36, 1097-1103, secuencias para la integración dentro del genoma celular).

40 El término "vector no viral" excluye vectores virales, tales como, por ejemplo, vectores que derivan de un poxvirus (virus vaccinia, en particular MVA, virus de la viruela del canario, y similares), de un adenovirus, de un retrovirus, de un herpesvirus, de un alfavirus, de un espumavirus o de un virus asociado a adenovirus.

45 La presente invención se refiere asimismo a células que derivan de la célula según la invención. Como se utiliza en la presente memoria, el término "derivada" se refiere a células que se desarrollan o se diferencian a partir de, o tienen como ancestro a una célula según la invención.

50 El término número de pases se refiere al número de veces que una población celular se ha retirado del recipiente de cultivo y se ha sometido a un procedimiento de subcultivo (pase), a fin de mantener las células a una densidad suficientemente baja para estimular el crecimiento adicional.

Como se utiliza en la presente memoria, el término "transfectada" se refiere a la transfección estable o a la transfección transitoria de la célula de la invención.

55 El término "transfección estable" o "transfectado de forma estable" se refiere a la introducción e integración de una secuencia de ácido nucleico externo en el genoma de la célula transfectada. El término "transfectante estable" se refiere a una célula que presenta integrado de manera estable ADN externo en el ADN genómico.

60 Según una forma de realización preferida de la invención, la célula aviar de la invención deriva de una célula de la familia *Anatidae* o de la familia *Phasianidae*. Entre las *Anatidae*, se prefieren particularmente las células que pertenecen al género *Cairina* o *Anas*. Incluso más preferentemente, las células según la invención pertenecen a la especie *Cairina moschata* o a la especie *Anas platyrhynchos*.

65 Preferentemente, la célula según la invención se toma de un organismo embionario. Los métodos que permiten el aislamiento de células a partir de un organismo vivo son bien conocidos por el experto en la materia. Por ejemplo, se

pueden usar los métodos descritos en el ejemplo 2. Según una forma de realización preferida de la invención, la célula primaria se aísla de un embrión que pertenece a la familia de *Anatidae* que tiene entre 0 y 20 días de edad, más preferentemente entre 5 y 15 días de edad, e incluso más preferentemente entre 11 y 14 días de edad.

5 Según una forma de realización preferida de la invención, la secuencia de ácido nucleico de E1A se inserta dentro de una secuencia de ADN diana de la célula según la invención.

10 Como se usa en la presente memoria, una "secuencia de ADN diana" es una región predeterminada dentro del genoma de una célula que es dianizada ("targeted") para la modificación mediante recombinación homóloga con el vector. Las secuencias de ADN diana incluyen genes estructurales (es decir, secuencias de ADN que codifican polipéptidos que incluyen, en el caso de eucariontes, intrones y exones), secuencias reguladoras tales como secuencias potenciadoras, promotores y similares, y otras regiones en el genoma de interés. Una secuencia de ADN diana también puede ser una secuencia que, cuando es dianizada por un vector, no tiene efecto sobre la función del genoma hospedador.

15 Como se utiliza en la presente memoria, "insertado en una secuencia de ADN diana" significa ampliamente que el procedimiento de recombinación homóloga que conduce a la inserción del gen inmortalizante introduce una delección o una interrupción en la secuencia de ADN dianizada.

20 Para producir una célula aviar inmortalizada en la que la secuencia de ácido nucleico de E1A se inserta en una secuencia de ADN diana, el vector usado en el procedimiento según la invención puede comprender además dos secuencias homólogas capaces de una recombinación homóloga con una región de una secuencia de ADN diana natural al genoma de dicho genoma celular.

25 La presencia de dichas secuencias homólogas permite la inserción, específica del sitio, de la molécula de ácido nucleico de la invención en la secuencia de ADN diana mediante recombinación homóloga.

30 El término "recombinación homóloga" se refiere al intercambio de fragmentos de ADN entre dos moléculas de ADN en el sitio de secuencias nucleotídicas esencialmente idénticas. Según esta forma de realización particular de la invención, en el vector se encuentran unas secuencias que son homólogas con porciones de secuencias contenidas en la secuencia de ADN diana. En una forma de realización preferida de la invención, las secuencias homólogas en el vector de transferencia son cien por ciento homólogas con la región de la secuencia diana. Sin embargo, se puede usar una menor homología de secuencias. De este modo, se puede usar una homología de secuencias tan baja como aproximadamente 80%.

35 Las secuencias homólogas en el vector de transferencia comprenden por lo menos 25 pb. Se prefieren regiones más largas, de por lo menos 500 pb, y más preferentemente de por lo menos 5000 pb.

40 Según una forma de realización más preferida de la invención, la molécula de ácido nucleico está rodeada por las secuencias homólogas en el vector.

45 Como se utiliza en la presente memoria, "rodeada" significa que una de las secuencias homólogas está situada en dirección 5' de la molécula de ácido nucleico de la invención, y que una de las secuencias homólogas está situada en dirección 3' de la molécula de ácido nucleico de la invención. Como se usa en la presente memoria, "rodeada" no significa necesariamente que las dos secuencias homólogas están enlazadas directamente al extremo 3' o al extremo 5' del gen inmortalizante; el gen inmortalizante y las secuencias homólogas pueden estar separados por un número ilimitado de nucleótidos.

50 El experto en la materia puede seleccionar las secuencias homólogas apropiadas a fin de dianizar una secuencia de ADN específica en el genoma de la célula que debe ser inmortalizada. Por ejemplo, una secuencia homóloga puede ser homóloga a una parte de la secuencia dianizada, en donde la otra secuencia homóloga es homóloga a una secuencia de ADN localizada en dirección 5' o en dirección 3' de la secuencia dianizada. Según otro ejemplo, una de las secuencias homólogas puede ser homóloga a una secuencia de ADN situada en dirección 5' de la secuencia de ADN dianizada, en donde la otra secuencia homóloga es homóloga a una secuencia de ADN situada en dirección 3' de la secuencia de ADN diana. En otro ejemplo, ambas secuencias homólogas son homólogas a las secuencias situadas en la secuencia de ADN diana.

55 Según una forma de realización preferida de la invención, la secuencia de ADN diana es el gen de HPRT (hipoxantina fosforribosil transferasa).

60 La secuencia genómica que comprende el promotor de HPRT y el gen de HPRT de *Cairina moschata* se establece en SEC ID n°: 2. La secuencia que codifica la HPRT comienza en el codón ATG en la posición 8695 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2, la secuencia en dirección 5' de este codón ATG es la secuencia del promotor de HPRT.

65 El experto en la materia puede seleccionar las secuencias homólogas necesarias para la integración de la secuencia

de ácido nucleico de E1A en el gen de HPRT. Al igual que entre los diversos miembros de una familia, las secuencias genómicas que codifican HPRT son muy homólogas, el experto en la materia puede asimismo diseñar las secuencias homólogas necesarias para dianizar el gen de HPRT de cada una de las células aviares.

5 Según una forma de realización más preferida de la invención, las secuencias homólogas se personalizan a fin de insertar la secuencia de ácido nucleico de E1A en dirección 3' del promotor de HPRT de la célula. En esta forma de realización particular, la molécula de ácido nucleico de la invención está enlazada funcionalmente al promotor de HPRT endógeno de la célula. "Enlaza funcionalmente" hace referencia a que la secuencia de ácido nucleico de E1A está enlazada al promotor de una manera que permite su expresión en la célula.

10 Según esta forma de realización particular, la secuencia homóloga, en dirección 5' de la molécula de ácido nucleico de la invención, presenta preferentemente una secuencia de ácido nucleico que es homóloga con por lo menos 500 pb contiguas, y más preferentemente con por lo menos 5000 pb contiguas, de la secuencia de ácido nucleico que empieza desde el nucleótido en la posición 1 y que finaliza con el nucleótido en la posición 8694 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2, con la condición de que dicha secuencia homóloga no sea homóloga con la secuencia de ácido nucleico que empieza con el nucleótido en la posición 8695 y que finaliza con el nucleótido en la posición 26916 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2. Además, esta secuencia homóloga en dirección 5' está preferentemente enlazada directamente al codón de partida de la secuencia de ácido nucleico de E1A. Según una forma de realización incluso más preferida de la invención, la secuencia homóloga en dirección 5' de la molécula de ácido nucleico de la invención consiste en la secuencia de ácido nucleico que empieza desde el nucleótido en la posición 1 y que termina con el nucleótido en la posición 8694 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2. La secuencia homóloga, en dirección 3' de la secuencia de ácido nucleico de E1A, presenta preferentemente una secuencia de ácido nucleico que es homóloga con por lo menos 500 pb contiguas, y más preferentemente con por lo menos 5000 pb contiguas, de la secuencia de ácido nucleico que empieza desde el nucleótido en la posición 10580 y que termina con el nucleótido en la posición 18009 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2. Y más preferentemente, dicha secuencia homóloga, en dirección 3' de la secuencia de ácido nucleico de E1A, consiste en la secuencia de ácido nucleico que empieza desde el nucleótido en la posición 10580 y que termina con el nucleótido en la posición 18009 de la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2.

30 En consecuencia, la presente invención se refiere asimismo a una célula aviar que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A caracterizada por que dicha célula se obtiene mediante un procedimiento que comprende la etapa de transfectar la célula con un vector no vírico que comprende dicha secuencia de ácido nucleico de E1A, en la que dicha célula no comprende una secuencia de ácido nucleico de E1B, y en la que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A está enlazada funcionalmente al promotor de HPRT endógeno de la célula.

35 Según una forma de realización preferida, el vector usado en el procedimiento según la invención comprende un primer marcador de selección, en el que este primer marcador de selección es un marcador de selección positivo, y en el que dicho primer marcador de selección está rodeado por las secuencias homólogas comprendidas en el vector. A este respecto, el procedimiento de recombinación homóloga que se produce entre el vector y el genoma de la célula conduce a la integración de la secuencia de ácido nucleico de E1A y del primer marcador de selección. Cuando el vector de transferencia es circular, "rodeado" significa que el primer marcador de selección y la secuencia de ácido nucleico de E1A están situados en la misma sección del vector, estando dicha sección delimitada por las secuencias homólogas.

40 Como se utiliza en la presente memoria, la expresión marcador de selección positivo se refiere de forma evidente a un gen que codifica un producto que permite que únicamente las células que presentan el gen sobrevivan y/o crezcan en ciertas condiciones. Los marcadores de selección típicos codifican proteínas que confieren resistencia a antibióticos o a otras toxinas, por ejemplo ampicilina, neomicina, metotrexano, o tetraciclina, complementan deficiencias auxotróficas, o suministran nutrientes críticos no disponibles a partir de un medio complejo. En una forma de realización preferida según la invención, el primer marcador de selección codifica una proteína que confiere resistencia a antibióticos.

45 La integración del primer marcador de selección permite la selección de las células que han incorporado la secuencia de ácido nucleico de E1A. En consecuencia, el procedimiento según la invención puede comprender además una etapa en la que dichas células se cultivan en un medio que únicamente permite el crecimiento de las células que han incorporado el primer marcador de selección. Por ejemplo, en un medio que comprende un antibiótico.

50 Según una forma de realización más preferida de la invención, el primer marcador de selección, en el vector, está rodeado por secuencias que permiten su supresión. Dichas secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección no rodean a la secuencia de ácido nucleico de E1A. Cuando el vector es circular, las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección, el primer marcador de selección y la secuencia de ácido nucleico de E1A están situados en la misma sección del vector de transferencia, estando dicha sección delimitada por las secuencias homólogas.

Las secuencias que permiten la supresión de un fragmento de ácido nucleico son bien conocidas por el experto en la materia (Nunes-Duby, S. *et al* (1998) *Nucleic Acids Res.* 26: 391-406). Estas secuencias pueden ser reconocidas por una o más enzimas específicas que inducen la supresión del ácido nucleico comprendido entre dichas secuencias, denominándose estas enzimas "recombinasas". Por ejemplo, tres recombinasas bien conocidas, que permiten la supresión de un fragmento de ácido nucleico, son las recombinasas FLP, ISCE1 y Cre.

Una recombinasa típica específica del sitio es la Cre recombinasa. Cre es un producto de 38 kDa del gen *cre* (recombinación por ciclación) del bacteriófago P1, y es una ADN recombinasa específica del sitio de la familia Int. Sternberg, N. *et al.* (1986) *J. Mol. Biol.* 187: 197-212. Cre reconoce un sitio de 34 pb en el genoma de P1 denominado loxP (locus de cruzamiento de P1), y cataliza eficientemente la recombinación recíproca conservadora de ADN entre pares de sitios loxP. El sitio loxP consiste en dos repeticiones invertidas de 13 pb que flanquean una región central no palindrómica de 8 pb. La recombinación mediada por Cre entre dos sitios de loxP directamente repetidos da como resultado la escisión de ADN entre ellos como un círculo cerrado covalentemente. La recombinación mediada por Cre entre pares de sitios de loxP en orientación invertida dará como resultado la inversión del ADN que interviene, en lugar de la escisión. La ruptura y unión de ADN están confinadas a posiciones discretas en la región central, y transcurre en una cadena cada vez mediante enlace fosfotirosínico transitorio entre la proteína y ADN con la enzima.

Otra recombinasa específica del sitio es la I-SceI. También se puede sustituir I-SceI en el procedimiento según la invención por otra endonucleasa dirigida por intrones, por ejemplo I-TliI, I-CeuI, I-CreI, I-PpoI y PI-PspI. Muchas están enumeradas por Belfort y Roberts ((1997) *Nucleic Acids Research* 25: 3379-3388). Muchas de estas endonucleasas derivan de genomas de organelos en los que la utilización del codón difiere del uso del codón nuclear estándar. Para usar dichos genes para la expresión nuclear de sus endonucleasas, puede ser necesario alterar la secuencia codificante para que concuerde con la de los genes nucleares. I-SceI es una endonucleasa de doble cadena que escinde el ADN en su sitio de reconocimiento. I-SceI genera un corte escalonado de 4pb con salientes de 3'OH.

La enzima I-SceI presenta un sitio de reconocimiento conocido. El sitio de reconocimiento de I-SceI es una secuencia no simétrica que se extiende a lo largo de 18 pb.

5' TAGGGATAACAGGGTAAT3'
3' ATCCCTATTGTCCCATA5'

Otra recombinasa específica del sitio es la recombinasa FLP. La recombinasa Flp reconoce un sitio mínimo de 34 pb bien diferenciado que tolera únicamente una degeneración limitada de su secuencia de reconocimiento (Jayaram, 1985; Senecoff *et al.*, 1988). Se ha examinado la interacción entre la recombinasa Flp y una secuencia FRT (Panigrahi *et al.*, 1992). Los ejemplos de secuencias FRT variantes se proporcionan en Jayaram (1985) y Senecoff *et al.* (1988), y en Snaith *et al.* (1996) se describe un ensayo para la recombinación, mediada por Flp, en diferentes sustratos.

En consecuencia, el procedimiento según la invención puede comprender además una etapa que consiste en suprimir el primer marcador de selección del genoma de dicha célula primaria. Para suprimir dicho primer marcador de selección, la célula se transfecta mediante el gen que codifica la recombinasa específica para las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección. Los métodos y el vector que pueden transferir dicho gen a la célula son bien conocidos por un experto en la materia, por ejemplo se puede utilizar el método descrito en el ejemplo 4 de la presente solicitud. También se pueden utilizar los vectores descritos anteriormente.

Según una forma de realización preferida, el vector utilizado en el procedimiento según la invención comprende un segundo marcador de selección que no está rodeado por dichas secuencias homólogas, en el que dicho segundo marcador de selección es un marcador de selección negativo. Dicho segundo marcador de selección es particularmente útil cuando el vector, utilizado en el procedimiento según la invención, es circular. La presencia de dicho segundo marcador de selección permite la destrucción de las células en las que el procedimiento de recombinación homóloga ha conducido a la introducción de la sección del vector de transferencia que no comprende la secuencia de ácido nucleico de E1A. Cuando el vector es circular, el hecho de que el segundo marcador de selección no esté rodeado por dichas secuencias homólogas significa que el segundo marcador de selección y la secuencia de ácido nucleico de E1A no están situados en la misma posición del vector de transferencia, estando dicha sección delimitada por las secuencias homólogas.

Por lo tanto, el procedimiento según la invención puede comprender además una etapa en la que las células se cultivan en un medio que únicamente permite el crecimiento de las células que no han incorporado el segundo marcador de selección. Dicha etapa se puede realizar simultáneamente con o por separado de la etapa en la que dichas células primarias se cultivan en un medio que únicamente permite el crecimiento de las células que han incorporado el primer marcador de selección.

Según una forma de realización preferida de la invención, el vector comprende un tercer marcador de selección, en el que dicho tercer marcador de selección es un marcador de selección negativo, y en el que dicho tercer marcador de selección está situado entre las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección. Esto

significa que la etapa que consiste en suprimir el primer marcador de selección también conducirá a la supresión del tercer marcador de selección. La presencia del tercer marcador de selección permite la destrucción de las células en las que está presente el primer marcador de selección. Cuando el vector es circular, el hecho de que el tercer marcador de selección esté situado entre las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección significa que el tercer marcador de selección y el primer marcador de selección están situados en la misma sección del vector de transferencia, estando dicha sección delimitada por las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección.

Como se utiliza en la presente memoria, la expresión marcador de selección negativo se refiere de forma evidente a un gen que codifica un producto que elimina las células que poseen el gen bajo ciertas condiciones. Estos genes comprenden de forma evidente un "gen suicida". Los productos codificados por estos genes pueden transformar un profármaco en un compuesto citotóxico. Actualmente están disponibles numerosos pares de genes suicidas/profármacos. Más particularmente, se pueden mencionar los pares:

- timidina cinasa del virus del herpes simple tipo I (HSV-1 TK) y aciclovir o ganciclovir (GCV) (Caruso *et al.*, 1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 7024-7028; Culver *et al.*, 1992, Science 256, 1550-1552; Ram *et al.*, 1997, Nat. Med. 3, 1354-1361);
- citocromo p450 y ciclofosfamida (Wei *et al.*, 1994, Human Gene Therapy 5, 969-978);
- purina nucleósido fosforilasa de *Escherichia coli* (E. coli) y 6-metilpurina desoxirribonucleósido (Sorscher *et al.*, 1994, Gene Therapy 1, 233-238);
- guanina fosforribosil transferasa de E. coli y 6-tioxantina (Mzoz y Moolten, 1993, Human Gene Therapy 4, 589-595) y
- citosina desaminasa (CDasa) y 5-fluorocitosina (5FC).
- FCU1 y 5-fluoro-citosina (5FC) (documento WO9954481).
- FCU1-8 y 5-fluoro-citosina (5FC) (documento WO2005007857).

Dicho tercer marcador de selección permite la selección de las células en la que se ha producido la supresión del primer marcador de selección. Por lo tanto, el procedimiento según la invención puede comprender además una etapa en la que dicha célula se cultiva en un medio que no permite el crecimiento de la célula que comprende el tercer marcador de selección. Por ejemplo, un medio, que no permite el crecimiento de las células que comprenden FCU1 como un tercer marcador de selección, comprende 5-fluorocitosina.

Los primer, segundo y tercer marcadores de selección se pueden utilizar por separado. Por ejemplo, el vector usado en el procedimiento según la invención puede comprender el primer y el tercer marcador de selección, pero no el segundo, o el segundo y el tercer marcador de selección, pero no el primero.

Según una forma de realización preferida de la invención, la secuencia de ácido nucleico de E1A, el primer, el segundo y/o el tercer marcador de selección se colocan bajo el control de los elementos necesarios para su expresión en la célula que debe inmortalizarse.

Los elementos necesarios para la expresión consisten en el conjunto de elementos que permiten la transcripción de la secuencia nucleotídica a ARN y la traducción del ARNm a un polipéptido, en particular las secuencias promotoras y/o secuencias reguladoras que son eficaces en dicha célula, y opcionalmente las secuencias requeridas para permitir la excreción o la expresión de dicho polipéptido en la superficie de las células blancas. Estos elementos pueden ser regulables o constitutivos. Por supuesto, el promotor está adaptado al vector seleccionado y a la célula hospedadora. A título de ejemplo, se pueden mencionar los promotores eucarióticos de los genes MGP (fosfoglicerato cinasa), MT (metalotioneína; Mclvor *et al.*, 1987, Mol. Cell Biol. 7, 838-848), α -1 antitripsina, CFTR, los promotores del gen que codifica creatina cinasa muscular, el agente tensoactivo pulmonar de actina, inmunoglobulina o β -actina (Tabin *et al.*, 1982, Mol. Cell Biol. 2, 416-436), SR α (Takebe *et al.*, 1988, Mol. Cell. 8, 466-472), el promotor temprano del virus SV40 (virus del simio), la LTR del RSV (virus del sarcoma de Rous), el promotor de MPSV, el promotor de TK-HSV-1, el promotor temprano del virus CMV (citomegalovirus). Se prefiere muy particularmente el promotor temprano del citomegalovirus (CMV).

La presente invención se refiere más particularmente, pero no se limita a, un procedimiento para inmortalizar una célula, que comprende las etapas:

- transferir a una célula aviar un vector que comprende:
 - Una secuencia de ácido nucleico de E1A rodeada por secuencias homólogas.

- Un primer marcador de selección en el que dicho primer marcador de selección es un marcador de selección positivo, y en el que dicho primer marcador de selección está rodeado por dichas secuencias homólogas.
- 5
- Unas secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección.
 - Un segundo marcador de selección que no está rodeado por dichas secuencias homólogas, en el que dicho marcador de selección es un marcador de selección negativo.
- 10
- Un tercer marcador de selección, en el que dicho tercer marcador de selección es un marcador de selección negativo, y en el que dicho tercer marcador de selección está situado entre las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección.
- 15
- cultivar dichas células en un medio que sólo permite el crecimiento de las células que han incorporado el primer marcador de selección.
 - cultivar dichas células en un medio que no permite el crecimiento de las células que han incorporado el segundo marcador de selección.
- 20
- excluir el primer marcador de selección del genoma de dicha célula.
 - cultivar dicha célula en un medio que no permite el crecimiento de las células que comprenden el tercer marcador de selección.
- 25
- La célula según la invención puede comprender además una o más secuencias de ácido nucleico que permiten la propagación de un virus defectuoso. "Virus defectuoso" se refiere a un virus en el que uno o más genes virales necesarios para su replicación están eliminados o se han convertido en no funcionales. La expresión "secuencia de ácido nucleico que permite la propagación de un virus defectuoso" se refiere a una secuencia de ácido nucleico que suministra in trans la función o las funciones que permiten la replicación del virus defectuoso. Es decir, dichas
- 30
- secuencia o secuencias de ácido nucleico codifican la proteína o proteínas necesarias para la replicación y la encapsidación de dicho virus defectuoso.
- La célula según la invención también puede comprender una secuencia de ácido nucleico que codifica una sustancia de interés. Como se utiliza en la presente memoria, una sustancia de interés puede incluir, de manera no limitativa,
- 35
- una proteína farmacéuticamente activa, por ejemplo factores de crecimiento, reguladores del crecimiento, anticuerpos, antígenos, sus derivados útiles para inmunización o vacunación y similares, interleucinas, insulina, G-CSF, GM-CSF, hPG-CSF, M-CSF o sus combinaciones, interferones, por ejemplo interferón- α , interferón- β , interferón- γ , factores de coagulación de la sangre, por ejemplo Factor VIII, Factor IX, o tPA o sus combinaciones. "Sustancia de interés" también se refiere a enzimas industriales, por ejemplo para la utilización en pasta de papel y
- 40
- papel, modificación textil, o producción de etanol. Finalmente, "sustancia de interés" también se refiere a un suplemento proteínico o a un producto de valor añadido para la alimentación de animales.
- Según una forma de realización preferida de la invención, la célula según la invención comprende asimismo una
- 45
- secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante, y más preferentemente la transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante descrita en el documento EP 06360047.2. En una forma de realización preferida de la invención descrita en el documento EP 06360047.2, la secuencia de ácido nucleico que codifica la transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante presenta por lo menos 70%, más preferentemente por lo menos 90%, y más preferentemente por lo menos 95% de identidad de secuencia de ácido nucleico con la secuencia de ácido nucleico establecida en SEC ID n°: 2 del documento EP 06360047.2. La
- 50
- secuencia de ácido nucleico preferida que codifica la transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante descrita en el documento EP 06360047.2 es como se expone en SEC ID n°: 2 del documento EP 06360047.2. La secuencia de ácido nucleico SEC ID n°: 2 de la transcriptasa inversa de la telomerasa descrita en el documento EP 06360047.2 corresponde a la secuencia de ácido nucleico SEC ID n°: 3 de la transcriptasa inversa de la telomerasa en la presente invención. Por lo tanto, según una forma de realización preferida de la invención, la célula según la
- 55
- invención comprende asimismo una secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante, y más preferentemente una secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante que presenta por lo menos 70%, más preferentemente por lo menos 90%, y más preferentemente por lo menos 95% de identidad de secuencia de ácido nucleico con SEC ID n°: 3. Más preferentemente, la secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante es como se establece en SEC ID n°: 3 (dTERT).
- 60
- Las células obtenidas mediante el procedimiento según la invención, la célula de la invención y las células derivadas de la misma, son útiles de forma evidente para la replicación de un virus. Dichos virus pueden estar vivos, atenuados, recombinantes o no. Más preferentemente, dichas células son particularmente útiles para la replicación
- 65
- de poxvirus (virus vaccinia, en particular MVA, virus de la viruela del canario, etc.), un adenovirus, un retrovirus, un

herpesvirus, un alfavirus, un espumavirus, o un virus asociado a un adenovirus.

Los retrovirus presentan la propiedad de infectar, y en la mayoría de los casos de integrarse dentro de, células en división, y a este respecto son particularmente apropiados para uso en relación con el cáncer. Un retrovirus recombinante contiene generalmente las secuencias de la LTR, una región de encapsidación y la secuencia nucleotídica según la invención, que se coloca bajo el control de la LTR retroviral o de un promotor interno tal como los descritos a continuación. Un vector retroviral puede contener modificaciones, en particular en las LTR (sustitución de la región promotora por un promotor eucariótico) o la región de encapsidación (sustitución con una región de encapsidación heteróloga, por ejemplo el tipo VL30) (ver las solicitudes francesas 94 08300 y 97 05203).

El vector adenoviral puede carecer de toda o de parte de por lo menos una región que es esencial para la replicación y que se selecciona de entre las regiones E1, E2, E4 y L1 L5. Resulta preferida una supresión de la región E1. Sin embargo, se puede combinar con otra u otras modificaciones/supresiones que afectan, en particular, a todas o a parte de las regiones E2, E4 y/o L1 L5. A título ilustrativo, la supresión de la parte principal de la región E1 y de la unidad de transcripción de E4 es particularmente muy ventajosa. Con el fin de incrementar las capacidades de clonación, el vector adenoviral puede carecer adicionalmente de toda o de parte de la región E3 no esencial. Según otra alternativa, es posible utilizar un vector adenoviral mínimo que retiene las secuencias que son esenciales para el encapsidación, es decir, las 5' y 3' ITR (repeticiones terminales invertidas), y la región de encapsidación. Los diversos vectores adenovirales, y las técnicas para prepararlos, son conocidos (véase, por ejemplo, Graham y Preveet, 1991, en *Methods in Molecular Biology*, Vol 7, p 109 128; Ed: E. J. Murey, The Human Press Inc).

La familia de poxvirus comprende virus de las subfamilias Chordopoxvirus y Entomopoxvirus. Entre éstas, el poxvirus según la invención se selecciona preferentemente de entre el grupo que comprende Orthopoxvirus, Parapoxvirus, Avipoxvirus, Capripoxvirus, Leporipoxvirus, Suipoxvirus, Molluscipoxvirus, Yatapoxvirus. Según una forma de realización más preferida, el poxvirus de la invención es un orthopoxvirus.

El Orthopoxvirus es preferentemente un virus vaccinia, y más preferentemente un virus vaccinia modificado de Ankara (MVA), en particular MVA 575 (ECACC V00120707) y MVA-BN (ECACC V00083008).

El término "virus recombinante" se refiere a un virus que comprende una secuencia exógena insertada en su genoma. Como se utiliza en la presente memoria, una secuencia exógena se refiere a un ácido nucleico que no está presente de manera natural en el virus progenitor.

En una forma de realización, la secuencia exógena codifica una molécula que presenta una función directa o indirectamente citotóxica. Mediante "directa o indirectamente" citotóxica, se quiere hacer referencia a que la molécula codificada por la secuencia exógena puede ser tóxica por sí misma (por ejemplo ricina, factor de necrosis tumoral, interleucina-2, interferón-gamma, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, exotoxina A de *Pseudomonas*), o se puede metabolizar para formar un producto tóxico, o puede actuar sobre algo para formar un producto tóxico. La secuencia del ADNc de la ricina se describe en Lamb *et al* (Eur. J. Biochem., 1985, 148, 265-270), incorporado a la presente memoria como referencia.

En una forma de realización preferida de la invención, la secuencia exógena es un gen suicida. Un gen suicida codifica una proteína que puede convertir un profármaco relativamente no tóxico en un fármaco tóxico. Por ejemplo, la enzima citosina desaminasa convierte 5-fluorocitosina (5FC) en 5-fluorouracilo (5FU) (Mullen *et al* (1922) PNAS 89, 33); la enzima timidina cinasa del herpes simple sensibiliza a las células para el tratamiento con el agente antiviral ganciclovir (GCV) o aciclovir (Moolten (1986) Cancer Res. 46, 5276; Ezzedine *et al* (1991) New Biol 3, 608). Se puede usar la citosina desaminasa de cualquier organismo, por ejemplo *E. coli* o *Saccharomyces cerevisiae*.

Así, en una forma de realización más preferida de la invención, el gen codifica una proteína que presenta una actividad de citosina desaminasa, e incluso más preferentemente una proteína como se describe en las solicitudes de patente WO 2005007857 y WO 9954481.

En una forma de realización adicional, el gen exógeno codifica una ribozima que puede escindir ARN o ADN dianizado. El ARN o ADN dianizado que se debe escindir puede ser ARN o ADN que es esencial para la función de la célula, y su escisión da como resultado la muerte de la célula, o el ARN o ADN que se debe escindir puede ser ARN o ADN que codifica una proteína indeseable, por ejemplo un producto oncógeno, y la escisión de este ARN o ADN puede evitar que la célula sea cancerosa.

En aún una forma de realización adicional, el gen exógeno codifica un ARN antisentido.

Mediante "ARN antisentido" se quiere hacer referencia a una molécula de ARN que se hibrida a, e interfiere con la expresión de una molécula de ARNm que codifica una proteína, o a otra molécula de ARN en la célula, tal como pre-ARNm o ARNt o ARNr, o se hibrida a, e interfiere con la expresión de un gen.

En otra forma de realización de la invención, la secuencia exógena sustituye la función de un gen defectuoso en una célula diana. Existen varios miles de enfermedades genéticas heredadas de mamíferos, incluyendo seres humanos,

que son provocadas por genes defectuosos. Los ejemplos de dichas enfermedades genéticas incluyen la fibrosis quística, en la que es conocido que existe una mutación en el gen de CFTR; la distrofia muscular de Duchenne, en la que es conocido que existe una mutación en el gen de la distrofina; anemia drepanocítica, en la que es conocido que existe una mutación en el gen de HbA. Muchos tipos de cáncer son provocados por genes defectuosos, especialmente protooncogenes, y genes supresores de tumores que han sufrido una mutación.

Los ejemplos de protooncogenes son ras, src, bcl, etc.; los ejemplos de genes supresores de tumores son p53 y Rb.

En una forma de realización adicional de la invención, la secuencia exógena codifica un antígeno asociado a tumor (TAA). TAA se refiere a una molécula que es detectada a una frecuencia o densidad en células tumorales mayor que en células no tumorales del mismo tipo de tejido. Los ejemplos de TAA incluyen de manera no limitativa CEA, MART-1, MAGE-1, MAGE-3, GP-100, MUC-1, MUC-2, el oncogén ras mutado puntualmente, p53 mutado normal o puntual, p53 sobreexpresado, CA-125, PSA, Cerb/B2, BRCA I, BRCA II, PSMA, tirosinasa, TRP-1, TRP-2, NY-ESO-1, TAG72, KSA, HER-2/neu, bcr-abl, pax3-fkhr, ews-fli-1, superviviente y LRP. Según una forma de realización más preferida, el TAA es MUC1.

El virus recombinante puede comprender más de una secuencia exógena, y cada secuencia exógena puede codificar más de una molécula. Por ejemplo, puede ser útil asociar, en un mismo poxvirus recombinante, una secuencia exógena que codifica un TAA con una secuencia exógena que codifica una citocina.

En otra forma de realización de la invención, el gen exógeno codifica un antígeno. Como se utiliza en la presente memoria, "antígeno" se refiere a un ligando que se puede unir mediante un anticuerpo; un antígeno no necesita ser inmunógeno por sí mismo.

Preferentemente, el antígeno deriva de un virus tal como, por ejemplo, HIV-1, (tal como gp 120 o gp 160), cualquiera de un virus de la inmunodeficiencia felina, virus del herpes humanos o animales, tales como gD o sus derivados o la proteína temprana inmediata tal como ICP27 de HSV1 o HSV2, citomegalovirus (tal como gB o sus derivados), el virus zóster de la varicela (tal como gpl, II o III), o de un virus de la hepatitis tal como el virus de la hepatitis B, por ejemplo el antígeno de superficie de la hepatitis B o un derivado del mismo, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis C (preferentemente una proteína no estructural de la cepa ja de genotipo 1b) y el virus de la hepatitis E, o de otros patógenos virales, tales como el virus sincitial respiratorio, el virus del papiloma humano (preferentemente la proteína E6 y E7 procedente de la cepa HPV16) o el virus de la gripe, o deriva de patógenos bacterianos tales como *Salmonella*, *Neisseria*, *Borrelia* (por ejemplo OspA u OspB o sus derivados), o *Chlamydia*, o *Bordetella*, por ejemplo P.69, PT y FHA, o deriva de parásitos tales como plasmodium o toxoplasma.

Figura 1: vector que comprende un gen que codifica la secuencia de ácido nucleico de E1A.

Figura 2: representación esquemática de la inserción, específica del sitio, de la secuencia de ácido nucleico de E1A en el gen de HPRT.

Figura 3: representación esquemática de la eliminación de los primer y tercer marcadores de selección a partir del genoma de la célula inmortalizada obtenida mediante el procedimiento de la invención.

Figura 4: vector que comprende un gen que codifica el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa de *Cairina moschata* y la secuencia de ácido nucleico de E1A.

Ejemplos

Ejemplo 1: Establecimiento de una estirpe celular aviar inmortalizada que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A

A. Construcciones plasmídicas.

A-1. Construcciones plasmídicas para la inserción aleatoria.

Para este fin, se ha usado un plásmido que no comparte ninguna secuencia específica de homología con el genoma de *Cairina moschata* (E1A plasmídico) (figura 1).

A-2. Construcciones plasmídicas para la inserción dirigida.

Se construyó un plásmido que comprende dos fragmentos de 5 kb homólogos al gen de HPRT de *Cairina moschata* que rodean a la secuencia de ácido nucleico de E1A (SEC ID No:1) y dos marcadores de selección. El gen de HPRT que codifica la hipoxantina guaninafosforil transferasa se seleccionó como un sitio adecuado para la expresión constitutiva de la secuencia de ácido nucleico de E1A.

Estos dos marcadores de selección son el gen de FCU1 (Erbs *et al.* Cancer Res. 2000. 15. 60.: 3813-22) bajo el

control de un promotor de CMV (Thomsen *et al.* P.N.A.S. 1984. 81. 3: 659-63) y el gen de resistencia a neomicina (o puromicina) colocado bajo el control de un promotor de SV40. El casete de resistencia a neomicina (o puromicina) y de expresión de FCU-1 están rodeados por sitios de escisión de Sce1 que permiten la eliminación de los casetes de selección de la estirpe celular final. Fuera de los brazos del gen de HPRT se inserta un marcador de selección que codifica la HSVTK dirigida por un promotor de RSV (figura 2).

B. Preparación del lote de CEC a partir de huevos de *Cairina moschata* y descripción de las subpoblaciones.

B.1 Preparación del lote de CEC a partir de huevos de *Cairina moschata* de 12 días y descripción de las subpoblaciones.

Se incubaron 25 huevos SPF fertilizados a 37,5°C. Los huevos se abrieron después de 12 días de incubación siguiendo el protocolo disponible.

Los 23 embriones se trituraron, se lavaron una vez en disolución salina con pH regulado con fosfato-Dulbecco (PBS) y se disociaron en TrypLE Select (Invitrogen) 5 horas a temperatura ambiente.

Después de la centrifugación a baja velocidad, las células se resuspendieron en medio Eagle basal (MBE) suplementado con 10% de suero fetal de ternera (FCS), gentamicina 0,04 g/l, se sembraron en matraces triples de 500 cm², y se incubaron a 37°C y 5% de CO₂.

Después de 24 horas, las células confluentes se retiraron de los matraces usando TrypLE Select (5 ml/matraz triple), parte de las células se volvieron a sembrar en matraces de 175 cm² para un segundo pase. Las células remanentes se concentraron a 10⁷ células/ml en medio apropiado (60% de BME, 30% de FCS y 10% de DMSO), y se congelaron en un recipiente regulado con alcohol isopropílico (recipiente NALGENE® "Mr. Frosty" que congela a 1°C) a -80°C antes de transferir en nitrógeno líquido para el almacenamiento a largo plazo, constituyendo el banco inicial de células (5 x 1,5.10⁷ células/vial, 44 x 1.10⁷ células/vial).

Las células que permanecieron en el cultivo se hicieron pasar clásicamente por hasta 18 pases; durante los 3 primeros pases, las células no adheridas se recogieron centrifugando a baja velocidad el medio acondicionado, se volvieron a sembrar y se hicieron pasar adicionalmente de la misma manera como el cultivo inicial.

Las subpoblaciones, que presentan unos rasgos morfológicos diferentes característicos, se han aislado de forma reproducible durante el tiempo de vida del cultivo.

B.2. Preparación del lote de CEC a partir de huevos de *Cairina moschata* de 19 días y descripción de las subpoblaciones.

29 huevos de *Cairina moschata* SPF fertilizados, obtenidos de AFFSSA Ploufragan, se incubaron a 37,5°C en atmósfera húmeda.

Los huevos se abrieron después de 19 días, y los embriones se extrajeron de forma estéril. Se decapitaron 20 embriones, las extremidades se retiraron así como el hígado se usó para otra preparación celular. Los torsos embrionarios se trituraron, se lavaron una vez en PBS Dulbecco (Sigma, Ref. D8537, Lote 46K2428) y se disociaron en 500 ml de TrypLE Select (Gibco, Ref. 12563, Lotes 1319986 y 1339844) 2 horas a 37°C.

Después de una centrifugación a 2000 rpm durante 5 minutos, las células se resuspendieron en BME (medio de Eagle basal, Gibco, Ref. 41010, Lote 8270) suplementado con 10% de suero fetal de ternera (JRH, Ref. 12003-1000M, Lote 5A0102, Código TG P4001 Q), gentamicina 0.04 g/l y L-glutamina 4 mM. Un volumen final de suspensión de 1,5 l (1,9.10⁶ células/ml) se sembró en 10 matraces triples (500 cm²), y se incubó a 37°C y 5% de CO₂.

Después de 24 h, las células confluentes se lavaron con PBS y se retiraron de los matraces usando TrypLE Select. Las células se contaron y se centrifugaron 4-5 minutos a 2000 rpm. El concentrado se concentró a 5.10⁶ o 10⁷ células/ml en medio apropiado (60% de BME, 30% de FCS y 10% de DMSO). La suspensión se introdujo en crioviales (Nunc) y se congeló a -80°C con una etapa de 2 h a -20°C, antes de transferir a nitrógeno líquido para el almacenamiento a largo plazo, constituyendo el banco de células primarias (110 crioviales, 10⁷ células/vial) de CETC19p1 (células embrionarias de torso de pato, embriones de 19 días, 1 pase).

En una forma de realización preferida de la presente invención, la preparación del lote de CEC a partir de huevos de *Cairina moschata* se llevó a cabo según el apartado B.2. alternativo (a partir de huevos de *Cairina moschata* de 19 días).

C. Métodos de transfección.

En la técnica se conoce un gran número de métodos de transfección para introducir un vector que puede dirigir la

expresión de una secuencia nucleotídica de interés. A continuación se enumera una lista no limitativa de estos métodos: precipitación mediante CaPO_4 , electroporación, método de transfección con lipofectina. Un ejemplo dado se basa en el procedimiento de precipitación con CaPO_4 .

- 5 Las células deberían de tener una confluencia de aproximadamente 80-50%. El medio se modifica dos horas antes de la adición de CaPO_4/ADN . Se resuspenden 30 μg de ADN en 31 μl de CaCl_2 2 M – Tris 161.3 mM pH 7.6. Se añade H_2O hasta un volumen final de 0,5 ml.

A continuación, 2 alternativas:

- 10 a) por transfección, se distribuyen 0,5 ml de 2X HEBS en un tubo Falcon estéril de 15 ml, y se añade gota a gota una disolución de ADN mientras se hace girar suavemente en vórtex, o burbujeando la disolución de ADN en aquél. La disolución debería resultar lechosa. La mezcla se deja reposar a temperatura ambiente durante 10-30 min. Después se pipetea hacia dentro y hacia fuera una vez con una pipeta estéril en una campana para cultivo de tejidos, para romper los copos y aplicarlos gota a gota a las células. Las células se incuban entonces entre 6 horas hasta toda la noche a 37°C . Un precipitado fino debería de cubrir la superficie celular. Para completar el procedimiento de transfección, calentar hasta 37°C la disolución de choque de glicerol. El medio se separa por aspiración, se añaden 5 ml de BME para lavar la capa celular, el medio se separa entonces por aspiración y se añade 1 ml de disolución de choque de glicerol durante 2 min. o menos. A continuación, se añaden suavemente 10 ml de BME para diluir el glicerol, y el BME-glicerol se elimina completamente. Entonces se añaden 10 ml de medio deseado, y las placas se incuban a la temperatura apropiada, o
- 15
- 20
- 25 b) por transfección, se distribuyen 0,5 ml de 2X HEBS en un tubo Falcon estéril de 15 ml y la disolución de ADN se añade gota a gota mientras se hace girar suavemente, o burbujeando la disolución de ADN en aquél. La disolución debería resultar lechosa. La mezcla se deja reposar a temperatura ambiente durante 10-30 min. Después se pipeteó hacia dentro y hacia fuera una vez con una pipeta estéril en una campana para cultivo de tejidos, para romper los copos y aplicarlos gota a gota a las células. Un precipitado fino debería de cubrir la superficie celular. Las células se incubaron entonces entre 6 horas hasta toda la noche a 37°C .
- 30

En una forma de realización preferida de la presente invención, la transfección (precipitación mediante CaPO_4) se lleva a cabo según la alternativa b).

D. Métodos de selección

- 35 D-1. Método de selección para la inserción aleatoria:

Se aplicó presión de selección 48 a 72 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en BME con FCS al 10% y G418 800 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 500 $\mu\text{g}/\text{ml}$ (y opcionalmente ganciclovir 25 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$).

40

Las células se sometieron a pase en serie hasta que se pudieron aislar clones en crecimiento individuales.

- 45 D-2. Método de selección para la inserción dirigida:

Se aplicó presión de selección 48 a 72 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en BME con FCS al 10%; ganciclovir 25 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$; y G418 800 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 500 $\mu\text{g}/\text{ml}$ (o puromicina 0,5 $\mu\text{g}/\text{ml}$).

- 50 Las células se hicieron pasar en serie hasta que se pudieron aislar clones en crecimiento individuales.

Los clones celulares se transfectaron a continuación con un plásmido de expresión de la meganucleasa I-SceI, siguiendo el método descrito a continuación.

- 55 Para seleccionar la eliminación de los marcadores de selección, se aplicó 5-fluorocitosina (5-FC) 48 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en medio con una concentración de 5-FC que oscila desde 10^{-3} hasta 10^{-7} M y se mantuvieron con selección de G418 (o puromicina)/ganciclovir (BME con FCS al 10%; 5-FC ganciclovir 25 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$; y G418 800 $\mu\text{g}/\text{ml}$, preferentemente 500 $\mu\text{g}/\text{ml}$ (o puromicina 0.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$) (figura 3).
- 60

Ejemplo 2: Establecimiento de una estirpe celular aviar inmortalizada que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A y una secuencia de ácido nucleico de transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante

5 A. Construcciones plasmídicas.

A-1. Construcciones plasmídicas para inserción aleatoria.

10 Para este fin se utiliza un plásmido que no comparte secuencia específica de homología con el genoma de *Cairina moschata*.

A-2. Construcciones plasmídicas para inserción dirigida.

15 Se construyó un plásmido (plásmido dTERT-E1A) que comprende dos fragmentos de 5 kb homólogos al gen de HPRT de *Cairina moschata* que rodean al gen de transcriptasa inversa de la telomerasa de *Cairina moschata* (SEC ID nº: 3), la secuencia de ácido nucleico de E1A (SEC ID nº: 1) y dos marcadores de selección. El gen de HPRT que codifica la hipoxantina guaninafosforiltransferasa se seleccionó como un sitio adecuado para la expresión constitutiva de la secuencia de ácido nucleico de E1A.

20 Estos dos marcadores de selección son el gen de FCU1 (Erbs *et al.* Cancer Res. 2000. 15. 60: 3813-22) bajo el control de un promotor de CMV (Thomsen *et al.* P.N.A.S. 1984. 81. 3: 659-63) y el gen de resistencia a puromicina, colocado bajo el control de un promotor de SV40. El casete de resistencia a puromicina y el casete de expresión de FCU-1 están rodeados por sitios de escisión de Sce1 que permiten la eliminación de los casetes de selección de la estirpe celular final. Fuera de los brazos del gen de HPRT se inserta un marcador de selección que codifica la HSVTK dirigido por un promotor de RSV (figura 4).

25 B. Preparación del lote de CEC a partir de huevos de *Cairina moschata* de 19 días y descripción de las subpoblaciones.

30 Se incuban 29 huevos de *Cairina moschata* SPF fertilizados, obtenidos de AFFSSA Ploufragan, a 37,5°C en atmósfera húmeda.

35 Los huevos se abrieron después de 19 días, y los embriones se extrajeron de forma estéril. Se decapitaron 20 embriones, se retiraron las extremidades mientras que el hígado se usó para otra preparación celular. Los torsos embionarios se trituraron, se lavaron una vez en PBS Dulbecco (Sigma, Ref. D8537, Lote 46K2428) y se disociaron en 500 ml de TrypLE Select (Gibco, Ref. 12563, Lotes 1319986 y 1339844) 2 horas a 37°C.

40 Después de la centrifugación a 2000 rpm durante 5 minutos, las células se resuspendieron en BME medio de Eagle basal, Gibco, Ref. 41010, Lote 8270) suplementado con 10% de suero fetal de ternera (JRH, Ref. 12003-1000M, Lote 5A0102, Código TG P4001Q), gentamicina 0.04 g/l y L-glutamina 4 mM. Se sembró un volumen final de suspensión de 1,5 l ($1,9 \cdot 10^6$ células/ml) en 10 matraces triples (500 cm²), y se incubó a 37°C 5% de CO₂.

45 Después de 24 h, las células confluentes se lavaron con PBS y se retiraron de los matraces usando TrypLE Select. Las células se contaron y se centrifugaron 4-5 minutos a 2000 rpm. El concentrado se concentró a $5 \cdot 10^6$ o 10^7 células/ml en medio apropiado (60% de BME, 30% de FCS y 10% de DMSO). La suspensión se introdujo en crioviales (Nunc) y se congeló a -80°C con una etapa de 2 h entre medias a -20°C, antes de transferir a nitrógeno líquido para un almacenamiento a largo plazo, constituyendo el banco de células primarias (110 crioviales, 10^7 células/vial) de CETC19p1 (células embrionarias de torso de pato, embriones de 19 días, 1 pase).

50 C. Métodos de transfección.

55 En la técnica se conoce un gran número de métodos de transfección para introducir un vector que puede dirigir la expresión de una secuencia nucleotídica de interés. A continuación se enumera una lista no limitativa de estos métodos: precipitación mediante CaPO₄, electroporación, método de transfección mediante lipofectina. Un ejemplo dado se basa en la electroporación.

60 La transfección se lleva a cabo usando un dispositivo Amaxa's Nucleofector y el kit de fibroblastos básico (Amaxa, No. de catálogo VPI-1002). Las células se centrifugaron 10 min. a 700 rpm (100 g) y se resuspendieron en la disolución básica Nucleofector (100 µl por 10^6 células); se mezclan 100 µl de suspensión con 3 a 6 µg de ADN, y se transfieren a una cubeta colocada en el Nucleofector (programa U-12). Después de la electroporación, la muestra se transfirió a una cápsula de cultivo de 6 cm, se llenó con 5 ml de medio de cultivo, se preequilibró en el incubador a 37°C/5% de CO₂. Tras la incubación toda la noche a 37°C y 5% de CO₂, el medio de cultivo se renovó y se llevó a cabo la incubación.

D. Métodos de selección.

D-1. Método de selección para la inserción aleatoria:

5 Se aplicó una presión de selección 48 a 72 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en BME con FCS al 10%, ganciclovir 25 µg/ml, preferentemente 10 µg/ml; y G418 800 µg/ml, preferentemente 500 µg/ml.

Las células se sometieron a pase en serie hasta que se pudieron aislar unos clones en crecimiento individuales.

10

D-2. Método de selección para la inserción dirigida:

Se aplicó una presión de selección 48 a 72 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en BME con FCS al 10%; ganciclovir 25 µg/ml, preferentemente 10 µg/ml; y puromicina 0.5 µg/ml.

15

Las células se sometieron a pase en serie hasta que se pudieron aislar unos clones en crecimiento individuales.

Los clones celulares se transfectaron a continuación con un plásmido de expresión de la meganucleasa I-SceI, siguiendo el método descrito a continuación.

20

Para seleccionar la eliminación de los marcadores de selección, se aplicó 5-fluorocitosina (5-FC) 48 horas después de la transfección: las células se disociaron con TrypLE Select, se centrifugaron a baja velocidad y se volvieron a sembrar en medio con concentración de 5-FC con un intervalo de 10^{-3} a 10^{-7} M y se mantuvieron en selección con puromicina/ganciclovir (BME con FCS al 10%; 5-FC ganciclovir 25 µg/ml, preferentemente 10 µg/ml; y puromicina 0.5 µg/ml).

25

Bibliografía

30

Scholl *et al.*, 2003, J Biomed Biotechnol., 2003, 3, 194-201
US 5.879.924
WO 2005007840

Ivanov *et al.* Experimental Pathology And Parasitology, 4/2000 Bulgarian Academy of Sciences
Ivanov *et al.* Experimental Pathology And Parasitology, 4/6 2001 Bulgarian Academy of Sciences

35

Fallaux, F. J. *et al.*, Hum. Gene Ther. 9: 1909-17 (1998);
Graham, F. L. *et al.*, J. Gen. Virol. 36: 59-74 (1977)
Guilhot, C. *et al.*, Oncogene 8: 619-24(1993)

WO 98/08489,
WO 98/17693,
40 WO 98/34910,
WO 98/37916,
WO 98/53853,
EP 890362,
WO 99/05183

45

Lathe *et al.*, 1987, Gene 57, 193-201
Lupton y Levine, 1985, Mol. Cell. Biol. 5, 2533-2542;
Yates *et al.*, Nature 313, 812-815
Summers y Sherrat, 1984, Cell 36, 1097-1103

50

Nunes-Duby, S. *et al.* (1998) Nucleic Acids Res. 26: 391-406
Sternberg, N. *et al.* (1986) J. Mol. Biol. 187: 197-212
Belfort y Roberts (1997) Nucleic Acids Research 25: 3379-3388
Jayaram, Proc Natl Acad Sci U S A. Sep. 1985; 82(17): 5875-9;
Senecoff *et al.*, J Mol Biol. Mayo 20 1988; 201(2): 405-21
Panigrahi *et al.*, Nucleic Acids Res. Nov. 25 1992; 20(22): 5927-35

55

Snaith *et al.* Gene. Nov. 21 1996; 180(1-2): 225-7
Caruso *et al.*, 1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 7024-7028;
Culver *et al.*, 1992, Science 256, 1550-1552;
Ram *et al.*, 1997, Nat. Med. 3, 1354-1361;
Wei *et al.*, 1994, Human Gene Therapy 5, 969-978

60

Sorscher *et al.*, 1994, Gene Therapy 1, 233-238
Mzoz y Moolten, 1993, Human Gene Therapy 4, 589-595
WO9954481,
WO2005007857,

65

Mclvor *et al.*, 1987, Mol. Cell Biol. 7, 838-848
Tabin *et al.*, 1982, Mol. Cell Biol. 2, 416-436

Takebe *et al.*, 1988, Mol. Cell. 8, 466-472
 EP 06360047.2,

Solicitudes Francesas 94 08300 y 97 05203, publicadas bajo el No. FR2722208 y FR2762615, respectivamente,
 Graham y Prevect, 1991, en Methods in Molecular Biology, Vol. 7, p. 109 128; Ed.: E. J. Murey, The Human
 Press Inc

5

Lamb *et al.*, Eur. J. Biochem., 1985, 148, 265-270

Mullen *et al.* (1922) PNAS 89, 33

Moolten (1986) Cancer Res. 46, 5276;

Ezzedine *et al.* (1991) New Biol. 3, 608

10

Erbs *et al.* Cancer Res. 2000. 15. 60: 3813-22

Thomsen *et al.* P.N.A.S. 1984. 81. 3: 659-63

Listado de secuencias

15

<110> TRANSGENE SA
 ERBS, PHILIPPE
 KAPFER, MARINA
 SILVESTRE, NATHALIE

20

<120> Estirpes celulares aviares inmortalizadas

<130> 353142 D26692

<150> EP07360030

25

<151> 2007-07-03

<160> 3

<170> PatentIn versión 3.3

30

<210> 1

<211> 1027

<212> ADN

<213> adenovirus

35

<400> 1

ES 2 618 490 T3

ccgggactga	aatgagaca	tattatctgc	cacggaggtg	ttattaccga	agaaatggcc	60
gccagtcttt	tggaccagct	gatcgaagag	gtactggctg	ataatcttcc	acctcctagc	120
cattttgaac	cacctaccct	tcacgaactg	tatgatttag	acgtgacggc	ccccgaagat	180
cccaacgagg	aggcggtttc	gcagattttt	cccgactctg	taatgttggc	ggtgcaggaa	240
gggattgact	tactcacttt	tccgccggcg	cccggttctc	cggagccgcc	tcacctttcc	300
cggcagcccg	agcagccgga	gcagagagcc	ttgggtccgg	tttctatgcc	aaaccttgta	360
ccggaggtga	tcgatcttac	ctgccacgag	gctggctttc	caccagtgga	cgacgaggat	420
gaagaggggtg	aggagtgtgt	gtagattat	gtggagcacc	ccgggcacgg	ttgcaggtct	480
tgtcattatc	accggaggaa	tacgggggac	ccagatatta	tgtgttcgct	ttgctatatg	540
aggacctgtg	gcatgtttgt	ctacagtaag	tgaaaattat	gggcagtggg	tgatagagtg	600
gtgggtttgg	tgtggtaatt	tttttttaa	tttttacagt	tttgtggttt	aaagaatttt	660
gtattgtgat	tttttataaa	ggcctgtgt	ctgaacctga	gcctgagccc	gagcagaacc	720
ggagcctgca	agacctacc	gccgtcctaa	aatgggcgct	gctatcctga	gacgcccgac	780
atcacctgtg	tctagagaat	gcaatagtag	tacggatagc	tgtgactccg	gtccttctaa	840
cacacctcct	gagatacacc	cggtgggtccc	gctgtgcccc	attaaaccag	ttgccgtgag	900
agttggtggg	cgtcgccagg	ctgtggaatg	tatcaggagc	ttgcttaacg	agcctgggca	960
acctttggac	ttgagctgta	aacgccccag	gccataaggt	gtaaacctgt	gattgcgtgt	1020
gtggtta						1027

<210> 2
 <211> 26916
 <212> ADN
 <213> Cairina moschata

5

<400> 2

ES 2 618 490 T3

aagtaggatg aaatagatta ggtgaccaa atactctgctt attcagcagg tgttgatcca 120
caggagggtc tacgataaag ctccagtagg agttgtacca gcgtaattcc tggagggcag 180
caataagtcc accatctaca ctccacaaag tctgatcttt aggtacaaag agctgtgctg 240
atctagaatg atgtggttag actgaatctg gctctaaatt tctgttatta gagtattatg 300
tattattaag taagaggcct tgcttcttac tgctgcctaa atgaagatta actttacagt 360
gaagcagagt gagagatgaa ggggtgataa tgtgtttgaa atatcagact taatctggca 420
ggtgataatc agttcattcc aaaaacgtta atgtgctgaa tcagattgac aagaaaatga 480
atcctaatta gttgaaatta atctgaagag aactgaaagt acatcatagc aaatagtaac 540
tcttcttcca catcacaagg aacagattcc actgtgttag tgatggagggt ttatacaaaa 600
aaaaaaaaaa aagaaaaacc agaacagctc ttaatttata tacttattga agcagattct 660
atatatgcat atgtatgcac attcattaat cagcagtaca tctcaaccct taaaagatcc 720
tggagaactg ttgcttgca aaaagcactc aggttaggct aacatttgca gcttttgctc 780
tagcatacat ttacattagg tgtaaagaca aggaatgtgt aaaagagggt aaatgcattc 840
ctatctacaa tgttatgtat attttgctcc tgttatattg gctttacttc caaagttgta 900
gtttgcagta ttagtctctt tttattggta tccttgcata tatatatatt caataaatga 960
gttatgaatt tcatatttgc atatctgtcc ttttctgaa agtagaactt taaaactgac 1020
acttcagtgc ataaaagcag tgttcctat tgatgttaaa gtacctcgaa agttttacca 1080
gaagacaagt gagtgcatac ttaaagtatg ctacttactt ggtggtaact gcgtatttgt 1140
gcattgttcc tgactttgtg taatgggtaa gttgctttgt atttaccact tgctaataat 1200
gtgaagtggc tggctcacta aagggtgcca ttctcacctt tcaaggactt cttgaaggct 1260
gtgtcataat aatttagagt aagacagata ctgagagcgc agagtgtaat atagtattgt 1320
tgcagaagag cggatagaca caggatgcat gttagaacca tataaatgtg gtgtaaaaga 1380
tcagcaaac gaagaattgc ttggaagatg cttggttttg tccaaataaa tagctgctga 1440
gagtgagaga gtgagtgagt aatattcagt atttttaaag tgtcgagaaa tgtaatgggg 1500
aaaaatttaa aataaatgtt ttttgtttgt tttaaagga gctgtgtgct tttatgttga 1560
catgttgatt taattactgc ggtaggatatt tactgtgccc tgggaaacgg tatccccagt 1620
caacacagac ttatttgtca ggaaaaaaat tgtcatagat catcttcaaa taagagttga 1680
caaataatca aatcttgatg gagtataatt attaatactg tgattacata tccatctttg 1740
caagggttcc ctgaaaaggc cagttttaag tcttctattg tcaaatctga tgtttggagt 1800
agttcgctac atggtgtttg atgccatgta aatagttacc agatagacgt tttattttat 1860
gtgctgtatg tttttgtttt tcattcagtc agctggaatc attgaaacag agaaggtttc 1920
tcaagaaata tcctgaacct gttttgtgga tgtcttcatt gcaatagctg gtcactgaaa 1980
tcttggaaata acgacagagg aatccatagg cacaggacca aacaccttcc attgtcctca 2040
tatagcgtga tgttagggca gagtggtgag tacttcagtg gctcctgtgt ccatgcttta 2100
atgaactcta cttaatctac catatgtaag agacttgcag cacaggcaaa acaaggggaag 2160

ES 2 618 490 T3

ttatctttgt gcctagataa tgtaccacat atggtaaaca attttcaagc ctcagagaca 2220
 aaagaaggat gctgtaaagt ctcaagtctc agcttgtgtc tctgtttcca cctttctggt 2280
 ctttctgttc agacctctgg gccagtaatt taaactggaa aattaatgga acagagaaac 2340
 tgtttgtgag cctatagaaa gatcaaattg tgtcagagta atgttgctcc ttctacaccc 2400
 agataaactt tttgagcaga ggagaagcag tgaacagagc tttactttca tgactttgca 2460
 taagaaaaca tgggaatgtg gtccgagacc aatttaaaaa tagaggtttt gaaaacttgt 2520
 ttgaaaaca aaacttgctt ggaaaaccct attcagagct gtgaatcatt cacagacaac 2580
 ctcttagggt tntagccact catcagctga atatgattca acgatatgct gaaaaaaaaa 2640
 aacacaaca ttgttgtgga atgtatgaac aggaatgtag tctgtaagat gcgtgtcttg 2700
 gtccttcttc tttaggtaat agtagaacac ctttctggga aaatggatc cagctgttgt 2760
 aggactgca ctccatggaa aatgtgaaga aagtggaaat aatccagaga aaagcaatga 2820
 gagggatgac aggataaaaa atgagccttg ctttaagggtg atgagagaaa agtgtttttc 2880
 aaatctgtaa gagagccaca gagaagaaag aaagaaacag ttctcatcat tgcaggtagg 2940
 acaagaaaa taggtttaag ttgctgcagg aagcctttag cttagacatc agaatgggta 3000
 attgtccttg acagtaggaa gaattaagct gtagcatgca cttcctggag aggtcgtgga 3060
 atctcaggaa ttaggtttta aagggaatat ttgtaggcat cttttggggc tggtgcaatt 3120
 gtaggttggg ggtgctgggg ataaggctaa tggaaatccc taccagccac tctaaggcct 3180
 tctgcaagga gtcagaacca cttttcggaa gtaaaactct gtactggcag aggtcctgtg 3240
 cttgacctta aggctcagag ccatgcattt ccgttttcat cttttcactt aaaatagcac 3300
 ttgtggtagt aataacatgc tcttgcggag tggcacaggt ctgcatggtt atgaactttc 3360
 tgtcaccacc cagcaaatgg cattttccac tcttctgttt cagattttcg ggagtacttc 3420
 ctactccca aattcctgat tgaatacgac tgaaaacttc aacacgtttt tagtgcacga 3480
 agtgacttt atacaaatgt gtgggactat tgcacacaac ttactgattt tcttactgt 3540
 gtgcacatgt gctctgtgat gatacagagt ttgggggtgac tgaactgta cccagtcttt 3600
 accgaattag ggcagcgatc ttaaaccctc atctgaactt ttgctagaga tgatcttcta 3660
 ttttgtttag acagggttct ctgcttgctt gcatttgctc taaaacgaca gtctggatga 3720
 gaagaaacca accagggctg gcactgccct accttttatt ccctggatac tttacttggc 3780
 acatcacttg gcacacatgc aatacccttt tttcaccctg gtacccaaag aaaagacgtg 3840
 ctctgcaca gactcagcca aattcctgcc tgccagtgga gggcgttaca gaggcttggg 3900
 gcagagggag gaaactcact cccaaagcat atactaaaaa taggccaatg cattgcaaac 3960
 agctttgctg tgagagcttc cttctggcat gtagccatgc agctgcctta tagttttgag 4020
 cctagatacc tccaaaacaa aacaaaaagt cgctaaagtt aaatgcagcc agcagtgctt 4080
 atagtcttga taatccctac agtgatcaa ttttagtttc ttccagagtg caggtagttt 4140
 actcaattta acttcaaag tctgagttac accattgaca ccattgtcaa gactagtgtc 4200

ggcaatccct gaagtctgcc aagttcaaag cagggaggag gcctttaaag ttgaaatact 4260
 cgggtgacgt gtccaaaaag ttttctctgt gctttcctgt ggagtaggaa ctgcagtagc 4320
 taggttgcaa aaagttttta aactctccaa attgctgcta actaaacatc cttaaactct 4380
 gacatgagag tatgaaatga gaaagtcagt tccttgattt agactagctt gaaaagaata 4440
 aactttttgc acaggactcc ctggacagtt gggctggata atagaagtga ttcattcagg 4500
 tcttgatgcc tacaagtttc ttgggttttg ccatattttc cagtgatttg tgacatcatt 4560
 tttgccctaa aataaatcgc atcatgtcct gccgatggt ttgactatga aaatggaggt 4620
 ttcggtttga ataccaaact tcgttgttac ttctttcaga ggctgttgat aaaggaaaac 4680
 gtgaagcttt tatgtaaag atcatgattt ctcatttgca tcaagaatat tttccaaaat 4740
 agtagttaa tccctccaat gattttcagc tatgtcacat aaatcaccga aaacacggta 4800
 attttgcacg ggtgtttttt ctccctttt ttattgtcta atactcagct tatatttgag 4860
 tcttctgtat ccaattacct gatttgtgtg gcaattaaac agaagatcag cgtcattgta 4920
 cttcacattc tttttaaact catcagtagt atgaccacac tagttggctc tgtaagtttg 4980
 taatttaaga tgtgcctgga aggggttcaa agagacagga gcagtagtgt gtctcacttc 5040
 cctttgaaa gcctttctga tactgtcaag caatatttac atcaaaagg aactgaattc 5100
 tggtaaactt ttccagactc caagtaaacc gaacaacctg agatttagat aaaccttgg 5160
 ggatttaaaa acttgatggt atcactgtct aagacttgtg ttagcccatc agatattgca 5220
 gacgtatatt ttgaggaaag gctttcagtt aattgataaa attaagagca gagttttggc 5280
 aaaaaaacc gccatctctg ctccagactt catggcatct tgaatttctg cagttagagg 5340
 tacaggtgct ctgttctgca attaaccctg gctgttaatt aaaatgtact gtttgctaaa 5400
 tatgattagt gtctggagcc aggtagcttg aaaaagcttc aagattattt ctttttacca 5460
 ggaccatcaa gtttttagcc ctcccttag aggaaggttc agaggaggtc ctatttaatc 5520
 tgtcccagaa gaaaggctat ttctcccctt agaatggggc ttggcagtc tttcagagc 5580
 acttttcac cttgtctcat agggattttt aaggacagat ttctgaaagg attttccacc 5640
 gggtaaagcg ggatcctgaa tgggtgacag ataatacgta ggaattctgg ctctcactg 5700
 ccaggttggt tatcttgaga tcttaaaaat ggacttattt ccttttttaa gtgtaaactg 5760
 agttcttgag gcacctttc cactgaagta tctgactttg ccttactgc ccatctcagt 5820
 cttgcacatt taaccctaat tcagatccag ggtgtggtgt tactcctaga acagctctta 5880
 ctgtttgagg atctgaatga ctattttgcc agcttctgcc atacaactcg agaggacctg 5940
 caaaggggag gggagtcctg atgggcagtt cctcccagc ctggcatgc cttcgtgtct 6000
 ccgcttccct tataatctgc ccagaaaaga tttctgaaat acttgagcag ctgccacaat 6060
 ctgcatggga ggcagcagcc ttggcatgtg agctctgcca cctgatgcc ggtctgtact 6120
 gaggcagtc cagctggatc tgcaagctc agcgaataca gccttcgtca gcgagttctc 6180
 tgatcagatt gctgccttg agccttttgc tggctctcct cagctcttct cctgttactc 6240
 agatagcctt accacctcct ctcatcatct tttgagttc tatcctcacg ttacagccag 6300

ES 2 618 490 T3

gtaagcccat ttacccatgc tgatatcaac aggttccaga ttttttaaaa aacaatcctg 6360
 tctggctcac agctagggag cctctagtga cacagctaag tcccctgcag ccatttagaa 6420
 atgtttctgg agggatgcag gtacgtcttg cactcaggtg cctaatagaa gcagattgac 6480
 ctgttcattc cttcgaaagc aactaagcaa agtggggaat cccatgtctc tgccccactt 6540
 ctgtgttcct gacggcaaga cctcctgcca gcaccaaccg cctgtgtttg gagtcagcca 6600
 gccttccggt ctgactgaag ttgaaggtac agtacaaaact gctggctaaa agaagctgct 6660
 tgacttgctt ttttaggagg cttgtcttgt ggggaaaaaa aaaaaaagta cagataaatt 6720
 ctgctgattc cttctgagtc acccagcagc gatggcaaag ctaggagaaa aaatgggatc 6780
 acagagggat tgatgaatgg acagtgagtg acctgaagat ctaactcaaa ggacgttact 6840
 tcaagtgcaa gtgtcaacat ataaatgctg agttgttgtc tccaagtacc ccactgttgg 6900
 ggtatcctgg ttaccaagca aggttttagt aagtctgttc gaaaagtac atacagctga 6960
 cattcatgca ggccatgatt tgccaggcct gagctctgag gtattcctgg acggttagag 7020
 aggataaaat aatttagaag tcaggaaacc actcagagac aaaccattat ttataaaatt 7080
 attttgcctt ctaaaagatg tgcgttccag agaaatcaca acgttggctc caaccttttt 7140
 gcatcatcta gctagaaaat gtgcagcttc cagataccgc cagatcacct cccttgacct 7200
 tgccctggaa acatcaatgg ctcccatacc agtaagaaca aaactggtca tctactaaat 7260
 ccgttgctga tctcagctaa ccaacttctt gtaatatcag caaatatttc tgcttttgta 7320
 aatctgttct tccttccata atgggggtgc agcaggaatg cttgggatcc agaaatgcgc 7380
 tggttggcag gaagaacaaa gaaattgttc acccagaagg gcaaaaaagg actaatgctt 7440
 tcgtccgctt gggagaagtt gcacagaact tatgccaaca acttttgcac gcaatcagaa 7500
 agatgccgct ggatgttact tttaatagca gacgttaata tcagttatta attagaaatg 7560
 tcttcagtaa ccagactaaa agcagatcct gaaacactcc tgtggttgaa cagtctcttg 7620
 acagacactg cccactgtcc agtaatgtca ggcgctctct gaacttgaca gggcagctgc 7680
 tgtttttccc agccttctgg aataggcca gctctgacat gtttctgata ttagctgggt 7740
 gtatttcatt ctgctgccct aggcagtttg ataaaggctc cttcctcctg ctccagagct 7800
 aaccacca aactgtagcc gagcacctcg ctgcaacaaa actgcactcg ctagggttct 7860
 gcctgtttgc ttcattaaga tctgcttaaa ttgtttcgta caaaggaaca ctcaaactga 7920
 tttctgagcc caaagtagca gtgctaggtg tacatcagga gttgtttggc atgaagaaac 7980
 attgccatgg cactgtatga ataaagttat ttttaagaat cattatccct tccttgatac 8040
 caagtcttta tgcggcagaa aatcaaactt ggtctccacc cttacagaaa gcagaggaat 8100
 gctttcagct gatagttgct taagctagaa tataagaac catgaatttc tgtgtgcaact 8160
 gcggcattgc ctttcattcc agacctacag aaaaaaacga cacttttggt actatttttt 8220
 tccttcccat atgagaccag gggagctacc caggcatttc cattcttata attttacctc 8280
 aagatcaaat tttctccagg cagttaaagg cagctgcacc cggagacctc gctcagcctc 8340

ES 2 618 490 T3

cccttgcac ccacggagct gcgttttagtg agaaacctcc cccgaggtga cgggctgcag 8400
 gggacccctt cccacacgcg tccccgtccc ttttctcagt gcaaacgcag ccaccgcccc 8460
 ttgaaccctc ctccgggctc tctcggttcg gcggaggcag gagggggccg tgcccgcgcg 8520
 ccgggagctc ctcacagggc ccgggccccg gggcggagcg gccgcggcca tgttgagggc 8580
 ggggagcgcg gaaggcggcg ccggggccgc tgcggggcgc ggcgcctccc cgctccccgc 8640
 cgctcctcgc cgccccgagc cgcaacaccg gccccggccc cggcgggccc cgccatggcg 8700
 acccccagcc cctgcatcgt ggtgagtgcg ggcccggcgc tgcctcctcg gcctccccgt 8760
 gggcccggcg tgcggtgaac ggggagggg gaggcggctg cggggagccg gcgggggccc 8820
 cccgtccccg tggggcgccc cgcgtggcgt ggagtcacct tgaggggctc gggctccccg 8880
 tgccctgcac ggccccgccc ggccccagc gccccctcctc ggctgccggc tcggtctcgc 8940
 ctctgccccg gtgtcctgcc atggggccgg cggggtgttg gcaatttcgg ggcgctgctt 9000
 gggcggctcg cggttgggag agccgcgggt gctgcctcag aaggcggcca gaaataactt 9060
 ccaccagaaa taacttccac caggcaccga cccggcgtgg cacaacttcc tattcctggt 9120
 gctcctcaca gcgcgctcgg gaggtcgtgc tccgtgtacc aaaacctgcg agctcagcac 9180
 ccgaactggg atgccttttg gaggaagacc ccgctgaggg tgtatttttc atcatcagtg 9240
 tgctctgcta agaatecttt ttttttaat tattattttt tttaaaccca gccccgggtg 9300
 ccgtgagcgg tagcgtgaca cgcatgtggc gcctcgcggc ccacggccat gcctgccgtc 9360
 aggctgtgcc cgcgcgcctg cctgtacttt ctgcgtaaaa atccatctgt aaaaccacc 9420
 gaacagcccg ctcagtagca aacgtagcct gcaaggctta gtggatgtgc tagatgtagt 9480
 tatggggctg aaccgtagga aatttccgta gctgctgaga gggaccagc tctgacacg 9540
 cagcaggtca cgggctcggg gcctggcctg ctgcgagcag gggttgtgca ggggctgctg 9600
 tggctgggag ggcaggcctg gctcccggcc aaaatcctca ttaccgcttg cgcaaccaa 9660
 aaacatgtaa acagctggct gatcacaggc aaggtaagt cttccttggg cactgaaatg 9720
 gaagcgtgat ctgcaccggc agcggagctg aggtggatgc ttaccatgcc tgccccgctg 9780
 cattgccagc agcaggcttc agtgttcccc acaaacttct ttttacctg agcagccttc 9840
 agctgcgtaa ccaacaagtg aagcgattca aaatatattg tcattttcaa gtggcagcgg 9900
 ggctaagggt caggggaagt ttttcttgg tgcttttggg acaatatgcc ctgaaccaca 9960
 gcagtgggtg tataattacg tacataggca aacccttgt cctaattaat acactcctgc 10020
 taatgttgca agctgtttca tgtggaaaat ctgcccgtgc ggaacagggt gctgaaacag 10080
 ggctttaatt tctgattcta aagatcttga acctccactg tttccagatg gtggtcagag 10140
 aaggcttggt tcataggcac ataactgtc ccgttaatat agctgtcttg tcttgattg 10200
 acagctggct tgtatgtttt gttgtgattc ggtgttggg agatttgga gatgtccctg 10260
 ttacaaggct tgcttactta gttgcaaagg caggttttgc attacactgc tgaaatcaga 10320
 gatgttgaaa agctgaaagc tgcttgatcc ttgtttattt atttattttt aaatgaaata 10380
 agattatttg aggtgtagta atttcatttt ccccgctctc caatgggggg aaatgttgtt 10440

aggcttgaa atcatttccc ctccacatcg tgctgagcga cagctcatgt agcatttcag 10500
 acaactcttg tgaactgtgg gttgtgcaag cttccacttt gtgctctggt cagaagggaaa 10560
 ataaggtgat cccaactagt gtaatggatt tggtagttta ttgagtaaag caaaggattg 10620
 gcagtttctc actacaggct ttctataaga cttttagaaa atctcacctt atttcctttt 10680
 cagattgacg atgatgaaca aggttacgac ctggacttgt tctgcatacc taaacattat 10740
 gcagatgatt tggaaaaagt ctatatctct catgggctca tcatggacag gtttgtttga 10800
 cttcagacag tacactgctc cagctgattc catgacactg gaaaaaaca tcttccagtg 10860
 atagttttgc tgcctagtga ctgtctaaac agattacatt taattagaga ctaagaaata 10920
 cacatgttaa ttaactctct cttgtttggc ttcaaagagt ttgtacattt gcagttacgc 10980
 tattgtttgg aaatttgtca attctcaaag aaatttgtgg tacgtagcag tctgtgactt 11040
 tctttacagt gtttctttga tgttttactt aaagtaatta gaacacatta cttgtttgtc 11100
 tagttcaatc taaaaacagt tatagtctct caaacatctt taggatatta ataagagtag 11160
 attattaatc acattatgat aagacttttt catgttcatg tggtagataa ctaacaccca 11220
 atttcccct actgtctgcg aaagacatta gcctttgcaa ataccaatct gtcacttgtg 11280
 gttgctgaaa tgtatgattt tctctggaag ttttatctcg tgatgagaaa tgggtacatg 11340
 aacctataag gtgtttttgt tttactttgt gtaagtaaag tggaggagtt gctggagaca 11400
 cagaaccact gaagagcggg tctgagtaga tcttgtgaat aggaatgctt ctagattttg 11460
 catggtgctg tttgatcaga ttattacagt atttataata aaatgttttt taactttaca 11520
 ctgaaagacc ctatatagga aagcattgga caaagtacag gtcattaagt agctgatgta 11580
 aagtttghaa tggcaggcat tctctgagaa acctgctgtc agctgctata ctgtaaatac 11640
 ataccatgct ttctgaatta aattgcaaga taaatttaga aacaatgatc actgaaaaac 11700
 tgttcagtgt tctcttgctc tgctttattg gcattatatt ttgcagtcag gacaaattta 11760
 ttcagcaaaa cataacgcta tagttgataa tttgagagtt ttcttgctcc tcagtttagtg 11820
 agagctgttg tctttttggt tgtgctgatt tattttgctc tctgcatgga agctgaacct 11880
 atctttggaa gaagaaaaca cccttatgtc tcttatctga cagtaaaaca attcagggtg 11940
 ttcagatttg ctttggctga gtatgatgta tgaaaacaaa gaagtttggc agtgttactg 12000
 ttagattaac cttggaacgc aaaactttgt tgaccaatag tgggttaaag tgactgaagc 12060
 attaggcaaa tatttctgag caaaatatgc ttccgagttt gcatgtgttt gctgtttgtg 12120
 tttgcaatac aaaatactgc tgccatagta agcaaaactaa atgtgttaca acagctaact 12180
 ctcttttttt tttttttgta taggacagag agactggcac gagaaattat gaagggcatg 12240
 ggaggacatc acattgtagc tctctgtgta ctcaaggggtg gctataaatt ttttgcctgat 12300
 ttattagact acatcaaagc actgaacaga aacagtgaca aatcaatccc catgactgta 12360
 gacttcatta gggtgaagag ttactgtgta agtatctctg caataccatg caatttttct 12420
 gtaaatttga ctaacttcaa attaacaaca gggatgattg agaattgccca acaaatgttg 12480

ES 2 618 490 T3

caaaagcttt gcctaagtac tgcctaaatt gtgctaattt tatacaaata gttaagacaa 12540
ttaaggggaa aaaagcagtc acaagctaac ttgttctttg tctatcttat atgatctggt 12600
ttctttcaga ctttatctcc tgggccagt aaaatccaga gcaaagagac ctttccatg 12660
tcctttactt cttaacaat ttctctctg cccctgtcc cacctctaaa actgtggttc 12720
tagaataata cagaggatag tcctacaaat cttattacaa aaacttaact ctaggaattt 12780
tcatgtggct tagacatcac tcaccagata ggaaaacttg aaaactgtga gcatggttat 12840
atttgggttc cctacctcat cttttgtttg gctcaactga acaatgaatg gaatgaattg 12900
catttggcca tgaggaaata ctagattcat aaaaacagat ttatggttag cggccactga 12960
atatggtgct accttttaa gcctaggtct aggttgcctt ggctttatgc ttttgaaaa 13020
gaatttattt tcattttgca cacaagtatt taactttaca gggaaatgga gcatgaggta 13080
gtatgtaaga tttttataag ggaagcatta gattacattg tgcaggtaaa aggaggaagc 13140
agatgtatgt tagtactgta tgcttctga ctcagcaaca gcctagtcta gtgttttcaa 13200
gacagtattt gtgggtaatt tagatttttt ccataagatc acctgtagtg tggaaataat 13260
taagtttttt gatttcaatt tacggtgtca aaataaattg cttcttaagg tcatgctggt 13320
agttctgtgt ctgatgact gtgtttcca gtcagtagta taagctactt gtcatggttg 13380
tggagtagtg cctgctgcag tagaaaaaaa tagattacta agttggaaac tcaactgcat 13440
tgttcattta attaaaccag agataggggt acttgcagat ttaggttggga ctgtagaaga 13500
gcttcaaaaa tgcgctgctg ctgttgagcg atctgtaaaa atttcacctc gttgagtggc 13560
aaagctcaga ccagtcagag tttggccagg cctgtttgca gaaaagctgt gccagctccc 13620
aagggtgtgt tgcagtgatg tcctggggct acctggaac caccgtcatg tctgcagagc 13680
gtgctgcagt gactcagctg cactctttaa agagaaggca aggccaggca gaaagggaca 13740
tgccagcctt tcgttacatc ttgcaagggg agagctgctt gacacacttt gtttctgctc 13800
cccacaaaag attcaggctc cctctaccag tccattcaac cacaaagcca ctacgtgccc 13860
acatacgctg tctgtaaaaag ccacaacaga aagggtgaatg tctctattag aggataatat 13920
ttgaaagaat aggaaataac tcccaccttt tttggcgagg aaatttgtat tttctgcttt 13980
cttcaaggaa cacatccaat aactttggtt tattttaaata ataaggacta cacccttctg 14040
ctctctccac cttccgagta acttggaca agctatggga taagtgttgt gaaacacctg 14100
gaaaaaatac tacattgcaa agcaaggctt attgtacagc atgtttttat tgttcatctt 14160
tatgcattag gcatgtattg gttctgctgc ttttattttt tacaccgccc ccccaaacta 14220
tagtgctttt atattaatag gaaactgaac agcaaaataa ttacggaagt ttaattctc 14280
ttttttagt aagaaggagt aaacaaagag aaaagcagag aaatttacac agaaaggagt 14340
gtaagcagaa tgttttccat gaggtgttgg cttcagggtt ttggttttgt cagccaattc 14400
tgtaaaggaa tgttttcttg ttctatatga ccgaggagct ccagttactt gatggcccca 14460
ctagcagatt attacgagca tttcatttct gtcaactctc taaggtagtt attaatatcc 14520
agacttacgt tcttttagatt gcataacttg atagactggg taagactgtc ctaacacaaa 14580

catgcbgtgta attgattcac ttagttttcc attattaatg gtgctggaat gttaaatctg 14640
ctctgtagtt ttcattcgtg ctttactaaa cggaggagtc agcattctta atgatgggaa 14700
aaccatcaca aaccgtaatg gacagttgaa agtagagcta gctctcttgt gattggttgtt 14760
ggatgcaatt actagatcac gctgcctgcc tttacagact gggtgaaaga tgttaaaaat 14820
accgtcgttg cataaacaaa gcagctgaac tcgtataatg gttctaaaat tgatgcbgatt 14880
gatgttctat tcctatttga aattgatcat ttaatatttt caagcttatg ggttatttgt 14940
ttcataatgc aaagttcata ctatgattgc acccaaaaat aattctctaa gaatactgag 15000
atgatgaagc tgtgattaaa tgttgcttat aattcctgct ttcggagtc ttacaaatga 15060
gttttaatga tctggcaagc tgttaagaaa ttgaaagata gtgtttgtga acagaaccag 15120
atctctgtat tcttgacaaa tagtttattt tcttctgtct agaagaatgg cttttcacca 15180
gtttcctgca tgtaaagtta gagttaagca aaagttgctt atgtagtcac aaagggcagc 15240
caaacacaaa tggacgtgtt gcattgtcac tcagggaaat agggcttttc ggaggagtac 15300
tgcagcttta aggcaaaatc tagttaggct gggtgagaca gtattctgaa agatctcatg 15360
ttaactgagc cttatagcaa ataccatgag gaacttaaaa tgccttgca ggggttacga 15420
tcttgagca tgttattatt ttccagcaat gacaatgagg cagtgaaaac agatctaaac 15480
agtaaacttc taatgtgtta aatcacaag cattaaagtc ttaccagtac tgaatcaga 15540
aataatgctc ctgaagataa ttaaagtgtt gcttaattat taaacaaagt tctttccaat 15600
ggaaatctgg ttaaaaccag tgttggaat ttgttaacca tttttgatcc ttttaattgct 15660
cagaaactca gtacctgcat aggcgtgtag gtttatatgc cagcgaaggt ttatgttttg 15720
tgtaaaaaa tgtagcaatt tgcagggcgc ttgggtggaa gaagaagggc agattttgtt 15780
ggttagattg tttttctctg ctgatcagtg tacttgagta tgcataacc acagggttct 15840
gtagtgatct gtagttctgt gttgttattg tttgattata gtgtgttgc ttgtagccag 15900
agagatcacc aggaaactga tctgcatgca tgtactgaga ggactggtct atcatctgtg 15960
catggtgttt taatggaaca aatatctgta acatctttct ccatcttct tctgtaagaa 16020
atggtgcttt ttacatcctt ccatggaaaa aggacgaaat tcttattagt gtaggaatag 16080
ataagagaga atcctgcaac ataaacaggg aaaagcttaa agctgtcatt taagataatt 16140
ttaagatatg atgaacgcag gaaatgcccc tcagcattac aaacacgggt cttactgaa 16200
tcccattttc gtgattaatc taaccagtat ctctggcatt cagtagcagt ctgctgttta 16260
ctgggtcaag cagcagacat tttggacatc ctatttttgg actttttcaa cacagtggta 16320
ttggttctgt tcaactatagt tttctttaa acatggggta aaactgtaaa ggcgcttttt 16380
ctaagtgtgt gtgcttgctt tttttttaat gttttgtcat gggaaatctaa aatagaaagt 16440
atctgttagt ctcgttatct gcttttacat acctagagct gtcagcactt ctttatccta 16500
gagcattgac gtcactgtcc aagggatttt aatacatttt ctctttactg taatcccagt 16560
gtcacttatg gtgtgctcag tgtgtgtttc tctctaaacc atttaccct tttttgcatg 16620

tgataacact	tctacttttt	gtctgcaact	ggtacagtat	gaatatgtgt	gtcagtgaaa	16680
acaggaagct	gtatgtggcc	gtctgttccc	ctgtggtctc	ctctctattg	tatctgccat	16740
tttggggcgt	ggggaaggaa	ctgctctttt	gctgcttgtc	tgcatgggtca	tgcaagtaagg	16800
ttgggcttca	gactgaagcg	gcaaaataat	aaaggttttc	taaaggggaag	atatgaagtg	16860
aagagctgtg	agaatgaagt	ttgaaaagtg	gtatgaccct	tcaataaat	gattaaattg	16920
taggataatg	acatcatctg	taagtagcac	agtaatgagt	atagcacaat	taataagaac	16980
taggagacaa	tgcaagggtt	taaagtcagc	tgaatgactt	taaataaact	gcagagatct	17040
ggaggtaccc	caggagtgtg	ttttaacttt	cttatataac	aaacagttca	ctgatgctta	17100
catcaaagcc	tagttttact	aaagcaaaat	gctgtacttc	agtgatagga	ttgtgtagct	17160
gtgtcgtgtg	ttaattacca	caatgagtaa	tttatcacta	tttgtaaaat	aggcaaacc	17220
aagcttttct	ggctattctt	gtagcttata	tttcttgttc	ttaatctgtg	ccttgtttgc	17280
tggtatttc	attgttgta	tgattgctta	ttttattca	gagtaaggct	ttctaaggca	17340
tcaaagttta	aatgtaaat	taccagctat	atagcagcgt	acagcttggg	aacttttttt	17400
ttttcctggt	ttccatacct	ttaatgaata	tgtaggaaat	aatatttttt	taatatacat	17460
gtgtgtatat	ataatggtga	cagatgagaa	gtggtgcctg	tatttatgta	aatatttttt	17520
caaacaatct	tttatctgaa	ataccatctt	tcagtttgat	tacttgtaat	ttcttagtta	17580
atagatgttg	ctggtgcaat	gcttctgaaa	gctttggtat	ttgtgggtta	tgtactttgc	17640
agttttgata	tttattagaa	gaaaaattac	tttaattctg	gtaatactaa	tgcttaccct	17700
gctcttttct	gctagaatga	tcagtcact	ggagatataa	aagtcattgg	tggggatgac	17760
ctttcaacct	tgactggaaa	ggtatggcat	gtcatatggt	taaagcaacc	ccctcccccg	17820
cagaaaaaaaa	aatcctaaaa	aatcctaaaa	aaaaacaaaa	caaaacaaa	aaaaacaaaa	17880
caaaacaaaa	caaaaaaaaa	aaaaaacacc	aaagaaccaa	ataattagag	ttttagaaag	17940
gaaaaaaaaa	aaaaaagaaa	gaaaactgta	gtgtttcatt	taaaatttag	gttagagggt	18000
ggacttgatg	atcttgaggt	ctcttccaac	ctagaaattc	tgtgattctg	tgattctgta	18060
aatattcac	cattgtagag	tggtgggggtg	cataagcccc	accagagcca	tcagtttagt	18120
ttgaacttca	taacatatgt	atgtatattc	actgtcttca	gtatcaggaa	gtgttagagt	18180
tgtttttctg	cattgcctaa	gaatagtctt	gtcttggttg	ttgttaacaa	agtaccttta	18240
aaagagagta	gcgttactta	ttactgtggt	ggtgtttcat	tgcaatagtg	aacagagttg	18300
gtactgtcta	gacatataac	ttgcaggtta	gggaataagg	gtcctgttac	aggcaatgaa	18360
gagacagaaa	tgcaagagaat	gtaaattggg	aatctgcttt	tcttcagtg	ctgtgtagag	18420
atcattgagc	tagatatctg	tgggtaaaac	atggatgcct	cctgttctgt	cagaacacat	18480
ggctttcccc	ttctgattac	acataaacag	tctctgtccc	atttcagtg	aagtgatgta	18540
ggtgtgacaa	gacagtacat	aactttatag	tatgacattc	tctgcattat	agaatttaa	18600
aggccacttt	gtactcagca	tgagatggtg	aggcaagtct	cattgtcaac	taattgtcat	18660
tagagcatca	gaaatgttaa	ctaaatagaa	ttcactgtta	tgtgtcctaa	catacataaa	18720

ES 2 618 490 T3

ccatggtaca aatatttaac tgcattgaaa aataaattat taagttatag gagacaatat 18780
 atgtaagaaa tgctgtattc tttaaatgct aatggattct tctttttttt tttttctttc 18840
 caccagaatg ttttaattgt agaagtaagt attatgtttc actttgaagt tctaactgtg 18900
 gactggcaaa agaccttaaa cagaagttgg ttttaagtca gaaatcctac agtttctggt 18960
 ttcaaggttt ttagtttctg actctaggcc tgaattatgc aagtggctct tgaatttgaa 19020
 attacctgtg ttttgaattc tcacatagca ttcaactata ccaaatttaa caaggaaaat 19080
 atctgtgtaa aattgcttgc tgtttgcatt tgatttcagt tttctgtgat tctgtcaatt 19140
 cttaaagtgc tttttttttt ttttaataat tcttattaag aagtagcctg agcaaagtgg 19200
 tactaagtgt gttattgttc tgagtttata acagcaaact aggaaattaa actggagggg 19260
 tagaaagaag ttcctagtag gaatateccta aaatacatgg gaaaacagag ctaaggccaa 19320
 catctctgtg tacagtttct ttacaggcat ggagaatggt gattcctaata ttgcattttg 19380
 ataatgctta attcccattt ctctatcttg tctgtggtct ttgatactag gtacaataca 19440
 cttcagtctg atttcctagt agctactgtt gcttaaactc tgcttcata cctctttgat 19500
 gaacgatggt gcttacattc agtaagtatg acttttacia aggatgatct agaataagat 19560
 cgctaacttg aggttggcaa agcagaagta ctaaacagga aaaatgaatg tatagaagta 19620
 ataatgtctt cagactccaa atagtggaaa tggctttgtc cataagctat ggcaactgat 19680
 tcagacacca aatgaaagga tgtttccttc tgtcattaa tgtgtttttt ttatgtacgt 19740
 ctttttttaa tttgagaagg ttatattatt ccataggaaa cacttttgac ctaaactggt 19800
 ttagttcagt tctaaaactc ctaccaaact agtatgtata cagcagtcac ctgtgtgacc 19860
 ggtggcgtcc tttgaagtgt atttgcttca gataggcaga tgcatttaat tacgtatctg 19920
 ctccatttca gatgaatgta tgtcttcaaa gtcccaggca gctaagtagg ttagtttctc 19980
 atctgttcag tgaatcatct ctccagtgcc ttatatataa ttatacattg tcaaataatga 20040
 accctttgac cagtcaccgt ttttaactgtc aaacaatggg ggaaaacaaa caaacaaaac 20100
 caaaaaacat tattataggc accagagcac ttaggttttc catacagaat ccctttgatg 20160
 tataaaaaca aacaaacgaa aaagaagaaa agaatcccat ccctttctgt gcaggggatg 20220
 ggattaagat ggtgtgtcaa acatcatttt agtgtatata aatagaaact ttagaactgc 20280
 accagatat tgccagtgca gcttctttgt ctttggattt ttttgggtct gtaatgtaag 20340
 ttgcacttct ttttccttta attgcattga tgggttgttc tgaatgtttt cccgtcttat 20400
 tttctttctg ttgtatacat ctctctctga gttcaactgc aagactaatg ttccatttat 20460
 aacttgtaa ttaaacaatg tttgtcaaat agctacaagg aacacaagcc ataaactctt 20520
 cagagggagc ctagaaggtc atagttcagt aactgctttc aaagtagtag ttatctacag 20580
 ttttgactgt tgtgatcact ttactgagca taattgctta agcacaatat agcgttatgt 20640
 atcacctgta tttgattatg aacattattt tgtcatattt ttgtgctatt acggatgagc 20700
 aatttctgca gtaaaaactt gaaaatgcta ctctgaaaat tttaatattc tcacttacat 20760

gacactttta ttttcaggat ataattgata ctggtaaaac aatgaaaaca ttgctgtctc 20820
tactcaagca gtacaatcca aagatggtga aagtagccag gtaaacttct aaatgtgatt 20880
atgtgtgctg tatttcaact tcagaatgac acacagtgga ataaaaatat aatatagaat 20940
atattcccat agaagagaaa caggaaggaa catttctgca ggaatcatac atgatggagt 21000
tagagtccag tatttgttta aactcaactt ctgcttggtg tgggagcata tgttcattaa 21060
ggctaacaga aatgctcttc tttccagtcc tattgcttga aaaatatcag tgccttatat 21120
tctagtaata tttgtggggt tttaccactg atctttaact taggtttaa agcatatgga 21180
agaatttaa tattttgggc ataaaaaac acaacaacct ctcaagggtg caggggtatt 21240
ttcaacacaa atttagttca taaatataaa ctttataaat ataaagtta actagagatt 21300
gggattaaaa aaaaaagtca gtggttgacg tctatggaca tacagtatct gaacatgttt 21360
cagtttgcaa cttcattttt tttcagtggg gtatctgcaa tggagacctt tggctgcca 21420
gctttacttg tagaattaa ttagtttgca ctaaacatta ccgtttatat agagtatata 21480
gtgtagctga gcctcagagg tcattctgtg agtcaccag ccatatgctc ttttaggctt 21540
ttctacttag ttgcatctt aatcagttag ttatgaaacg ttttctaatt aaataactta 21600
cagttagtaa gaaatgttga gggtaatatt aaccaatatc aacattcctc ctacttcttt 21660
ttaaattgca tcttttatgc tcctatgctg tgattgtgta ttttacaata aaagcataat 21720
gattgctggg gattagagat aaaccagaac tgtgtgtaa atctaactcag ttgtgttgcc 21780
ataacaatgt caaggcagtt gttagatgta ctagagcagc tcttcttgat gataatgtgg 21840
ggatgacctg ctgaagggtga ggtttttggt ttttttttct ccgtggcctg cttaaagtga 21900
ccagatttta aatatttgtc actgaatagt acctaacgc tacagtgtac atcacaagta 21960
gaatgcagca tgaacaaagc ctagcttccg attgtttaa cctgttgagc tttgggtctg 22020
ccgaagacct gagcaagtaa gcgtgatcgt gctggatagc ttaagtgtc atgctcttag 22080
ttcacttgcc tttcttttct taattttggt ttctttctct ctgacaatta agcagttgta 22140
gcaggagat gtgaattaat gctaagtga ttttggggtg gtttgatcaa gttttatgcc 22200
actactcaa ttaagactct caactagaag tttcagaaac tgaatgtcta aagacagaca 22260
aatgtcagga tgatggggtc atcttctgaa agtgtgcaac tgaataatga gtgagtcaaa 22320
ttaaactaga aaggatattc attctgctac agtaccacca actctgcatg tctatgcttt 22380
ttacacctct gactattaat tctgtgaaag tggagctggt ttatatcagc ttatgatcat 22440
caaaaccaat tacattttct gtatgggggt aattagtact accagtggaa aaacagctga 22500
ggacatgttg cacaagtgca attgaggtta catttaacca gctgaacttt tgcttcataa 22560
cactaacgct tttgaaaaga cctcagctgg tctggctaga tccaagtgtg tcacctcttt 22620
acctgagc taaactgatt gcacctgagg tttctaaaa cacataaac ctaattaagt 22680
cacttctggc aatgaaaatc cttccagtaa agtatctcac agcctctttg ctgcaaacat 22740
tttgtttatc ctttaggctg taaaccattc atgattctag gaagttttga gtttgtctat 22800
atgatcagct gcacctgcaa atgaataata tgtttaaat gtatatagtt atgctgtcaa 22860

ES 2 618 490 T3

ttatacacat gtagtctcac tgaagtggaa ttcagctaata cttcgtgttt catataagtg 22920
 aacctggtgt ttttccacgt ttcagtttta cattgttttt atttgacagt ttgttggtaa 22980
 aaagaactcc tcgaagcgtg ggatatacggc cagactgtaa gtgacttttt gacacccatt 23040
 atcagttttt aaaaatatgt tgtatatatg ttgatgtatt gtgtactctt tgggtcaaagt 23100
 ccaaggggtg tccaagtaag ttttcatgaa tggtttttga tttattttgc tcttatttgg 23160
 gaagtttaaa tatttggaaat gtattttgac agagttaata cagatttggg ctagtccttt 23220
 ttttcttaac tttttgtggc attttattat acaaaaagga aactttgata ttttagtcca 23280
 agttaatccc tcttcatatg gaaattctcc tagcttgac gttaatcaaa tggtttggtc 23340
 agcagaagtg tcacttttga cacttttggg agtgttccag gtgcctaaac atagccaccc 23400
 agtgccactc ggatgtcccc agaaatgtaa tgggaccaca cagggttaaca gatctgatca 23460
 aagtttacag tggtaagatg ttcaaagtag cacaaacccc atcttgttta agcatctgga 23520
 ttactcctgt catgtcttct tgtctgtccc aagaccataa aggaaggaag agcatccaaa 23580
 gcacacgggg gtgtcagtga tagcccctct tggcttggaaggggctacgt gtgctatccc 23640
 tgtgccagag gttatttctt gttcatgtgg actgtgcgct ttcacaatgg aagtttaaca 23700
 gaattgcatc ttctttcccc tcctttccaa gtttgacag tattcttaaa ttgaaatttc 23760
 tcagtgcctt gaaagcttaa ttcaggtgtt tccctcactc gaggatgcct ctctttcctg 23820
 agatcttatt atgggttttag ctgggttaac agtctgcctt tctgagcatc ttgcagcaga 23880
 tgacttgttt tgccatctgt ccagagacga cctgttcagt gcagaacccg tgagctctga 23940
 aggcaagaga caacgcagca gcagagcttg ggcctgcctt ctgtccttgt atcatgaggc 24000
 caagtagact ctaaacattg ccttattttt tccagaagcg tacacagtct ttcactggaa 24060
 ttgtgtgatt tatctccgtt tttttcatta ctgagcctcg ctgtaaccag ggagagagaa 24120
 acagcacagc tcgggagtct ttcattgtta gcataagggg agaaagcctt ctggaaacgt 24180
 ccttaggttg tcttacagtg tgtgtggatg gcttggactg atacttcttg actatccaag 24240
 gactgttctg ctagagccat gtccacttgg actatctgtg gaacagctga tgtgtttttt 24300
 ttaggcagct tctatgggaa aaaaaaaaaa cgaaacaaaa cacaacaaaa aaccgcccg 24360
 tttctgaaaa gtgcaagtga caccgtaaat aagagagcgc cttttaccct gtggtcttca 24420
 ctattctcta taccaagggc ttggcactta cagcgtgttg ctctgcagag ctgtcccgca 24480
 gtcagagtat gtcctggtac accaggttgt tgtccacgag cagccagagg ggagtgaatt 24540
 ttgtttggca ctgcctcaaa gacaaaggac tggttcccct gcggtaactc tggttcctcc 24600
 tgggtttgac gtgttccatg cttactctcc cagctcttca caaagagccc agttgggctt 24660
 gcacacctgt agttttgagg gagctgagag ctgaacctat ctgctcgta tcccagaggt 24720
 gaccttactt atagctgtgc ccaaggcgag ggcacactca cacaggtgcc accttttgaa 24780
 taatactgtg agggtgacaa ctaaaacaaa ataaaatgct actgcttggg aaccagtaag 24840
 taaatctatt tcattttgtt ttagttgaaat taaatcaaca aatagagtta gaccattaac 24900

ES 2 618 490 T3

tagcttgaat attaatctcg ggatacttga atggaagaaa tgaaatgta tgcttatatg 24960
tctataaaat tctagattct ctctgtaaaa aggtctagtg aactctagga agttcttttc 25020
taacatactg atgacttatg ttctttttca gttgttggat ttgaagtgcc agacaaaattt 25080
gttggtgggat acgccctaga ttacaatgaa tacttcagag atttgaatgt aagtaacttt 25140
tcccgtatgt ttttgtccat ttaaaactag ggaggaggaa ggaaggggaag tctcctcgca 25200
tcactctttc tcttctgtgt aaatcacagc tcatgtgcaa gcctgttcca ttagtgatgc 25260
aacgacgaga gcaaaggcta gaccagcaca acagtgtttt ggagctcata tgaaactaac 25320
ttttgttttg cttcatgcag aatggaggta ttctgcatga agctgtcagc tttgaaatac 25380
tgtggcagtc tgtatgaagt ttcttatctt accagacata tctgcaagaa acaagtgcac 25440
ttccttagtt acatcaaaat tagagaggag agaccttggg tgttgagatg tttgcatttt 25500
atgctaggtc attattaatt tttcatctgg gtctcactaa ccttataaca gacatagggc 25560
aggagagaga gagaaagtcc agtgttgaga tctgtagaca aaaaaaaaaa gaagctaaag 25620
tttttctgca taaacaatat cacaaggctc ttcggtactg aaatgtgtat agcatgcttt 25680
tatttttttc agaagtgcac tattgaatac atctgtaaac atcatcctac attactttct 25740
aacaggagct ttttattttg ttttgttaca gcatatctgt gtgatcagtg agacggggaa 25800
gcagaaatac aaagcatgaa agcatagttc aagtgtcttg atagcagagc tttgaaatgt 25860
tttgtttact gagtcctatc tttcacaggc ttcaactctg gtacaccagc taaaattgta 25920
gaattatcca ccccccttgt catatgctta ctataactta ttgcatgtac aatatacaaa 25980
tcttgtcttg ttcatttata ttttagaaat gtaaacaatt agtgcaattc tgcactcctt 26040
attttgattt gcactatgac tctaccgact attgctgccc ctggttgggt tgtgctgttt 26100
gtgagctccg gagtctaact cttgcagtg gtaaattgctt aaacctcatc aaccagaaac 26160
tgaaatagtt caagtactgt aaatgtaaaa cactttatga tagggaagtc tattagtaat 26220
atttttaaaa tctgtaattt aagttttata ttttcatgaa caagtgtgat tgtgattaat 26280
ggatagttgc acctttgggt gttataaaac atgaggagca gccagttaca gtatctgtaa 26340
tcaccaagga gctgattcaa gcctcctgga gttgccttat cgctgtaaaa gtccgggtaa 26400
aaaaaatctt tttttttta atttttttta ttttttgagc taaaaggaga tggaatgaca 26460
aagcagaatg tttaaaatct agtttaagtt gagctattca tttcttttgg attttttctt 26520
taaaaatacc catcagacag tgaaattgcc ttttaaattt aaacaatttt aatatatttt 26580
tgaagaagta ttgtaatgtt tactttataa gatctaaaaa acaaaaagta ctttaaataa 26640
aggctgtctc tttaaaataa gccccataca tctatgccac tcattctgta tattaaagtg 26700
ctcttgaaat tttcttagta atatttttca taagtgtttc tgacagtgaa ggcagactct 26760
acgtttgtta tctttgtaga gccttttagtc agtattgtgc catctacaag agatgataaa 26820
ggcctgaggg aaagctatcg aaatacttgc gtattctata accaaactgg atttcagaga 26880
aaatgcacta agtagtgtcc cgtattctgt tttggc 26916

ES 2 618 490 T3

<210> 3
 <211> 3915
 <212> ADN
 <213> Cairina moschata

5

<400> 3
 atggcgggcg cggagccctt cggcgccgtg ctgggcccgc tgcgggactg ctacgcgcag 60
 gcggccccgc tggagacctt cctccggggg ctgggggaga gcggcgccga ggaagccgag 120
 gtggtgctgg acgacgacgc cgcctgctac cgcaccttcg tgtcccagtg cgtggtgtgt 180
 gtccccacg gcgcccgcga catcccccg ccttcagct tggagcagtt atctagtcag 240
 agcgaagtca tctcaagagt catgcagagg ctgtgtggga aaaagaagaa gaacatcctc 300
 acatatggat actccttgct ggatgaaaac agttctcact tccaaatcat gccgctctca 360
 aacgtgtaca gctacctgcc caacaccgca acagaaacca tgcgtatcag tggcctctgg 420
 gaaacgctgc tgagcaggat aggggatgac gtgatgatgt atttattgga gcaactgtgca 480
 atctttatgc tggttcccc tagtaactgt taccaagtct gtgggcaacc aatttatgaa 540
 cttatttcgc aaaatgtaga atcagcccca gcgtttgtta aacaacggct ttcaaagcac 600
 aaacgtagta gcttgcttaa gtatacgag aaaaggctaa cgtttcacag acagtatcct 660
 tcaaagtcac gtcagtcgaa acgcaggcaa agacttgaag ctaatgtctc cagcatgaga 720
 aataaaacca gcaataatat acaaagccta gggctccgctg ctctggaaaa acagagtagc 780
 tccaatgcag gtttgcagc tacagcacca tccttaaaaa ggaagcttgc tagggaacaa 840
 ctggaagtca cggctaagag agcaagatta gaagagaaag agagggagga acaggcttgt 900
 aatactgctc ctaatgtaaa ccagagtatt cccaagaggt atggaaccag ctgtgtagca 960
 tcacgttctg taagtcttat taaagaaaaa tacatttctc aaagaagtaa cagtgatatg 1020
 tctcgtcctt ctttagttca caattctcat catgggaaga agtctgtggc agacaaaagc 1080
 tctttcctgc aaggagctga gagtaacaga catttaaagc ccagcattga aatgcaagca 1140
 ggatccagca ggaagagagt agagatacac aggcctatac ctcggttggga ttggatacca 1200
 atcgaaccgg cggaaagtag ttcttcagga cacaaaaagc aggaaagtcc cctagctcat 1260
 ctggcagagg agttaccaa tagggttttg ccatctacaa tatacattga caggaagttt 1320
 cttctgtatt ctcgcaggta ctggggggaa cgtttcccaa aatccttcct attgaatcgc 1380
 ctgaagggtg gtgaggcagg tgtaaagcga ctaatagaaa cgatattctt aagccaaaat 1440
 ccgtttgggc aaaagcgcaa ccaaggtctg ccacagaaaa aatggagaaa gaagaagctt 1500
 cccaaacgct tctggagaat gagaagtacg tttcaaaaac tcttaaagaa tcatggaaag 1560
 ttcccttacg tagctttctt gagacaaaat tgccctcttc ggatatctga aaccattttg 1620
 ggaaaagcca agctgctcag tcgggcacct ttgcctgggc aagcagaggc tcacaagcaa 1680
 gcagaacagc ttgggaagga gcctgctaag cgtgtggcaa gcagcagatg cgaatctggt 1740
 cacaccaacg tgcccagcag cgtacgcgct cctctcgcag catctgcgtg cgtggagcca 1800
 gggggggagg agcagatccc tgcagaggcg tctgattcag tcctcagga gcttctcaag 1860
 gagcactgca gccacttcca ggtgtacctc tttgtgaggg agtgcggtga gcgggtgatc 1920

ES 2 618 490 T3

cccgccgagc tctgggggttc aaaccataac aagcgccggt tcttcaagaa cgtgaaagca 1980
 ttcattttcca tggggaagta cgctaagctt tccttgacagg tgttgatgtg gaagatgaga 2040
 gtaaatgact gcatgtggct tcgtctggcc aaaggtaatc actttgttcc tgcctctgaa 2100
 caccgttacc gtgaagaaat tttggctaaa ttcctatact ggctgatgga tacgtatgtt 2160
 gttgagttgc tcagatcatt tttctatact accgagacca tgttccagaa aaatatgctt 2220
 ttctactacc gaaagtgtat ttgggccaag ttacaggaca ttggaattag aaagcatttt 2280
 gccaaagtac agctacgtcc tttaactgca gaggagatgg aagcgatcca tcagaaaaaa 2340
 taccttccta tggcatcaaa gctccgtttc attcccaaag tcagtggact aagacccatc 2400
 gtcagaatga gcggtgttgt tgaagcacia acggtgagca aggaaagcag agcaaagaag 2460
 atgaatcact acaacatgca actgaaaaat ctatttagtg tgttaaatta tgaacgaact 2520
 ataaacacca gttacatcgg ctcttcagtg tttgggagag atgatatcta caagaagtgg 2580
 aagacatttg ttaaaaagggt tcttaaatca gatggtgaaa ttcctcattt ctactatgta 2640
 aaggccgatg tgtccagggc ttttgatagc attcctcacg ataaacttgt ggaagtgatt 2700
 tcacaggtct taaaacctga gaaaaaaact gtctactgca tacggcgcta tgcagtggtt 2760
 atgatcactg gaagtggaaa aaccaggaag ttatacagga gacatgtttc tactttcaag 2820
 gattttatgc cagacatgaa gcagtttgtg tcccggcttc atgagagtac ctattgca 2880
 gatgcaataa tagttgaaca gagcttaact ttcaatgaga caagtgccag tctatttaat 2940
 ttttttcttc aaatgctaaa taataacatc ctggaaattg agcgcagcta ctacttacag 3000
 tgctctggaa ttccacaggg ctcccttttg tcaaccttgc tttgcagctt gtgctatgga 3060
 gacatggaaa acaaattatt cagtggggtg cagaaggatg gagtcctgat ccgtctcatt 3120
 gatgactttt tgcttgttac accacactta acgcatgcaa gaactttcct aaggactcta 3180
 gcaatgggca ttctgagta tggctttttg ataaacccca aaaagacggg ggtgaatttt 3240
 tctgttgacg atatcccaga gtgttccgaa tttaaacagc tgccaaactg tcgtttgatc 3300
 ccatgggtgtg gcttattatt ggatacacag acacttgagg tttactgtga ttactccagc 3360
 tattcctgta cttctatcag atcaagtctt tccttcaatt caaacagaac agctgggaaa 3420
 aacatgaaac acaaattggt tgcagtcctt aaactgaaat gccatggctt gtttcttgat 3480
 ttacagatca atagcgttaa aacagttttc attaatgtct acaagatatt tttacttcag 3540
 gcttacaggt tccatgcctg tgttattcaa cttccattca accagaaagt taggaacaat 3600
 cctgatttct tcctcagagt catcgctgag aatgcatcgt gctgctattc tatgctgaaa 3660
 gctaaaaatc cagggtttac tttaggtaac agaggtgcat ctggcatggt cccttctgag 3720
 gcagcagagt ggctctgcta tcatgccttc actgtcaaac tgtcaaacca caaagttggt 3780
 taaaaatgct tgcttaagcc cctgaagttc tgtatgacac agctattccg gaagatccca 3840
 aaggatacta aggactact gaagacagtg acagaacat ctatttgtca agatttcaaa 3900
 gctatcctgg actga 3915

REIVINDICACIONES

- 5 1. Célula aviar immortalizada y células que derivan de dicha célula, caracterizadas por que dicha célula es obtenida mediante una transfección estable con un vector no vírico que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A y una secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante, en las que dicha célula no comprende una secuencia de ácido nucleico de E1B.
- 10 2. Célula immortalizada según la reivindicación 1, en la que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A se inserta en el gen de HPRT endógena de dicha célula aviar.
- 15 3. Célula immortalizada según la reivindicación 2 en la que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A está unida funcionalmente al promotor de dicha HPRT endógena de la célula.
- 20 4. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A incluye la secuencia que codifica los dos ARN principales 13S y 12S.
- 25 5. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en la que dicha célula deriva de un animal que pertenece a la familia Anatidae, preferentemente dicho animal pertenece a la especie *Cairina moschata* o la especie *Anas platyrhynchos*.
- 30 6. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A presenta una identidad de secuencia de ácido nucleico de por lo menos 60%, preferentemente por lo menos 70%, por lo menos 80%, por lo menos 90% respecto a SEC ID nº: 1, todavía más preferentemente dicha secuencia de ácido nucleico de E1A es como se expone en SEC ID nº: 1.
- 35 7. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que dicha secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante presenta una identidad de secuencia de ácido nucleico de por lo menos 70%, más preferentemente por lo menos 90%, y más preferentemente por lo menos 95% respecto a SEC ID nº: 3, todavía más preferentemente dicha secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa recombinante es como se expone en SEC ID nº: 3.
- 40 8. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que comprende además una secuencia de ácido nucleico que codifica una sustancia de interés.
- 45 9. Célula immortalizada según la reivindicación 8, en la que dicha sustancia de interés es una proteína farmacéuticamente activa.
- 50 10. Célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que comprende además un casete de complementación que permite la propagación de un virus defectuoso.
- 55 11. Utilización de una célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para la replicación de un virus, preferentemente para la replicación de un poxvirus, un adenovirus, un retrovirus, un herpesvirus, un alfavirus, un espumavirus o a partir de un virus asociado a adenovirus.
- 60 12. Utilización según la reivindicación 11, en la que dicho virus es seleccionado de entre el grupo que consiste en virus de viruela vacuna, virus de la ectromelia, virus de la viruela de los simios, virus vaccinia, virus de la viruela y MVA.
- 65 13. Utilización de una célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para la producción de una sustancia de interés.
14. Utilización de una célula immortalizada según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para la producción de un virus.
15. Utilización según la reivindicación 14, en la que dicho virus es un poxvirus o un virus vaccinia, preferentemente un MVA.
16. Utilización según la reivindicación 14 o 15, en la que dicho virus es un virus recombinante que comprende una secuencia exógena insertada en su genoma, en la que dicha secuencia exógena es seleccionada preferentemente de entre un gen suicida, un gen que codifica una ribozima, un gen que codifica un ARN antisentido, un gen que codifica un antígeno asociado a tumor (TAA), y un gen que codifica un antígeno.
17. Procedimiento para immortalizar una célula aviar que comprende la etapa de transfectar de manera estable dicha célula con un vector no vírico que comprende una secuencia de ácido nucleico de E1A y una secuencia de ácido nucleico que codifica una transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) recombinante, en el que dicho procedimiento no comprende una etapa de transfectar dicha célula con una secuencia de ácido nucleico de E1B.

- 5 18. Procedimiento según la reivindicación 17, en el que dicho vector comprende dos secuencias homólogas a las secuencias presentes en dicho genoma celular, estando dichas secuencia de ácido nucleico de E1A y secuencia de TERT recombinante rodeadas preferentemente por dichas secuencias homólogas.
- 10 19. Procedimiento según la reivindicación 18, en el que dicho vector comprende además un primer marcador de selección en el que dicho primer marcador de selección es un marcador de selección positivo y en el que dicho primer marcador de selección está rodeado por dichas secuencias homólogas, estando dicho primer marcador de selección rodeado preferentemente por las secuencias que permiten su supresión.
- 15 20. Procedimiento según la reivindicación 18 o 19, en el que dicho vector comprende un segundo marcador de selección que no está rodeado por dichas secuencias homólogas, en el que dicho marcador de selección es un marcador de selección negativo.
- 20 21. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 20, en el que dicho vector comprende un tercer marcador de selección en el que dicho tercer marcador de selección es un marcador de selección negativo y en el que dicho tercer marcador de selección está ubicado entre las secuencias que permiten la supresión del primer marcador de selección.
- 25 22. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, caracterizado por que comprende además una etapa en la que dichas células son cultivadas en un medio que permite únicamente el crecimiento de las células que han incorporado el primer marcador de selección.
- 30 23. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 20 a 22 caracterizado por que comprende además una etapa en la que dichas células son cultivadas en un medio que no permite el crecimiento de las células que han incorporado el segundo marcador de selección.
- 35 24. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 23, en el que dicho procedimiento comprende además una etapa que consiste en excluir el primer marcador de selección del genoma de dicha célula.
- 40 25. Procedimiento según la reivindicación 24, en el que las células, obtenidas tras dicha etapa que consiste en excluir el primer marcador de selección del genoma de dichas células, son cultivadas en un medio que no permite el crecimiento de las células que comprenden el tercer marcador de selección.
26. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 25, en el que dicha célula es tomada de un organismo que pertenece a la familia Anatidae, preferentemente a la especie *Cairina moschata* o la especie *Anas platyrhynchos*.
27. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 17 a 26, en el que dicha secuencia de ácido nucleico de E1A es insertada en el gen de HPRT de dicha célula.

FIGURA 1

Inserción aleatoria

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

Inserción dirigida