19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 619 407**

51 Int. Cl.:

C12N 15/85 (2006.01)

C07K 16/28 (2006.01)

C12P 21/00 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **29.10.2012 PCT/FR2012/052496**

87 Fecha y número de publicación internacional: **02.05.2013 WO2013061010**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **29.10.2012 E 12794398 (3)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **28.12.2016 EP 2771470**

54 Título: **Unidades de transcripción y su utilización en vectores de expresión**

30 Prioridad:

28.10.2011 FR 1159864

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
26.06.2017

73 Titular/es:

**LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES
(100.0%)
3, avenue des Tropiques BP 305
91958 Courtaboeuf Cedex, FR**

72 Inventor/es:

**FONTAYNE, ALEXANDRE y
COUTARD, FRANÇOIS**

74 Agente/Representante:

LEHMANN NOVO, María Isabel

ES 2 619 407 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Unidades de transcripción y su utilización en vectores de expresión

5 La presente invención se refiere a nuevas unidades de transcripción susceptibles de ser utilizadas en vectores de expresión.

En la actualidad, la expresión de proteínas recombinantes es siempre uno de los métodos principales para la producción de las proteínas terapéuticas, tales como unos anticuerpos farmacológicos.

10 Los ácidos nucleicos que codifican para las proteínas recombinantes se introducen generalmente en un vector de expresión que contiene unos elementos génicos que permiten la transcripción y la traducción de estas moléculas de interés.

15 Uno de los objetivos de la invención es proporcionar una unidad de transcripción que permite producir una proteína recombinante cuya ganancia de productividad no está relacionada con un anticuerpo de diana antigénica particular y por lo tanto con una proteína recombinante dada, ni relacionada con el medio de cultivo.

20 Uno de los objetivos de la invención es poner a disposición una unidad de transcripción universal que permita proporcionar una mejor capacidad de transcripción y de traducción de una proteína de interés con respecto a los vectores de expresión tradicionales para las células de mamíferos tales como la línea celular de rata YB2/0 y la emparentada, o la línea celular CHO y las emparentadas.

25 Uno de los otros objetivos de la invención es proporcionar una unidad de transcripción que permita limitar el tamaño del vector de expresión, a fin de limitar los problemas de clonación, de eficacia de transfección en las líneas de expresión o también de interferencia entre el vector de expresión y el genoma de la línea receptora que puede conducir a una inestabilidad genética y a la extinción del gen de interés.

30 Finalmente, otro de los objetivos es proporcionar una unidad de transcripción desprovista de los promotores virales, a fin de limitar los riesgos sanitarios potenciales.

La presente invención se refiere a unidades de transcripción para construir los vectores de expresión.

35 La invención se ilustra mediante una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) - el potenciador del virus hCMVie (E2), teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o

40 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

(ii) - la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o

45 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora de la transcripción.

Según un aspecto general, la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

50 (i) - el potenciador del virus hCMVie (E2), teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

55 (ii) - la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2.

Se entiende por “**elementos reguladores**” en el sentido de la presente invención, unos elementos génicos que no codifican que permiten controlar la transcripción y/o la traducción de un ácido nucleico que codifica para una proteína de interés.

60 Se entiende por “**unidad de transcripción**” un polinucleótido que contiene los elementos reguladores necesarios para la transcripción de un ácido nucleico de interés en ARN. Una ARN polimerasa, que permite sintetizar un ARNm a partir de un gen de interés unido a dicha unidad de transcripción, así como unos factores de transcripción activadores o inhibidores que modularán en + o en - la transcripción en ARNm, pueden fijarse sobre tal unidad de transcripción.

65

Se entiende por “**región promotora**”, una región de ADN que contiene una secuencia de ADN particular que permite inhibir la transcripción de un gen de interés particular.

5 En el sentido de la presente invención, los términos “región promotora” y “promotor” pueden ser sustituidos el uno por el otro.

La región promotora contiene la zona del ADN sobre la cual se fija inicialmente la ARN polimerasa, antes de iniciar la síntesis del ARN.

10 Un promotor está en general cerca (de una veintena a un centenar de nucleótidos) del ácido nucleico de interés a controlar y está situado secuencia arriba del sitio de inicio de la transcripción de un gen. La presencia de un promotor es esencial para la transcripción de un gen particular.

15 El promotor del gen CDK9 representado por la secuencia SEC ID NO: 2 es un promotor rico en GC y desprovisto de TATA box.

20 Un “ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora” contenido en una unidad de transcripción según la presente divulgación, es un ácido nucleotídico que posee esencialmente la misma capacidad para iniciar la transcripción de gen que la de la región promotora del gen CDK9, representada por la secuencia SEC ID NO: 2.

La capacidad de la región promotora del gen CDK9 para iniciar la transcripción de un gen se puede determinar según el método descrito por Liu y *al.* (Gene 252, 51-59 (2000)).

25 Se entiende por “**potenciador**”, un segmento de ADN que puede fijar unas proteínas como los factores de transcripción para estimular la transcripción de un gen. Un potenciador no está necesariamente cerca del gen de interés a controlar, y puede estar situado en 5' o en 3', o incluso en el centro del gen a controlar o en un intrón.

30 La presencia de un potenciador en un vector de expresión permite aumentar el nivel de transcripción de un gen.

Un “ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción” es un ácido nucleotídico que posee esencialmente la misma capacidad para estimular la transcripción de gen que el del potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1, designado a continuación también E2.

35 Las propiedades de activación de la transcripción de un gen pueden ser determinadas por la utilización de genes indicadores como la luciferasa.

40 Varios potenciadores pueden coexistir en una unidad de transcripción según la presente invención; esto permite estimular más la transcripción de un gen.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender:

45 - el potenciador del virus hCMVie, teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1 (E2), o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

- al menos otro potenciador seleccionado entre un potenciador SV40 y un potenciador Eμ.

50 Una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender:

- el potenciador del virus hCMVie, teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1 (E2), y

55 - al menos otro potenciador seleccionado entre un potenciador SV40 y un potenciador Eμ.

En lo anterior y en los siguiente, el porcentaje de identidad entre dos secuencias de ácidos nucleicos se puede calcular según la fórmula siguiente:

60
$$\frac{\text{el número de restos idénticos} \times 100}{\text{el número de residuos de la secuencia más corta}}$$

En un modo de realización particular de la invención, el potenciador se sitúa secuencia arriba de la región promotora. Dicho de otra manera, el potenciador está situado en el extremo 5' del ADN de la región promotora, para facilitar la clonación de las secuencias que codifican en el vector de expresión. El potenciador es un elemento génico no posicional.

65

Una unidad de transcripción según la presente divulgación está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

5 (i) - el potenciador del virus hCMVie (E2), teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o
- un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

10 (ii) - la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o

15 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, estando el potenciador situado secuencia arriba de la región promotora.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

20 (i) - el potenciador del virus hCMVie (E2), teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) - la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, estando el potenciador situado secuencia arriba de la región promotora.

25 Una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender también un ácido nucleotídico situado secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, comprendiendo dicho ácido nucleotídico al menos una de las regiones 5' no traducidas (5' UTR) seleccionada entre las siguientes:

30 (i) - la región reguladora R del 5' "Repetición terminal larga" (LTR) (RU-5') del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3 (U1), o

- un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

35 (ii) - la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4 (U2), o

- un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

40 (iii) - la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5 (U3), o

- un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

45 Teniendo susodichos ácidos nucleotídicos al menos un 70% de identidad de secuencia con una de las secuencias representadas por las secuencias SEC ID NO: 3, SEC ID NO: 4 o SEC ID NO: 5 y teniendo esencialmente unas propiedades de estabilización de los ARNm y de un facilitador de la traducción.

50 Las propiedades de estabilización de los ARNm y de un facilitador de la traducción se pueden medir por Fritz *et al.* (Sci. STKE, 5 diciembre de 2000. Vol. 2000, Issue 61, p. p11) y Ross *et al.* (Microbiol Rev. Septiembre de 1995; 59(3):423-50).

La facilitación de la traducción se puede realizar comparando la cantidad de ARNm que permanece constante analizada por q-RT-PCR mostrando al mismo tiempo un aumento del porcentaje de proteína.

55 La región 5' no traducida en un gen corresponde a la porción del ARN mensajero (ARNm) colocado secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción. Esta región permite la fijación del ribosoma y puede estar implicada en la regulación de la expresión del gen en cuestión.

60 El sitio de inicio de la traducción es un triplete de nucleótidos que dirige el inicio de la traducción proteica. Este triplete es frecuentemente el triplete ATG.

Los "ácidos nucleotídicos que tienen al menos un 70% de identidad de secuencia con una de las secuencias representadas por las secuencias SEC ID NO: 3, SEC ID NO: 4 o SEC ID NO: 5" contenidos en las unidades de transcripción según la presente invención permiten la fijación de ribosoma y la estabilización de los ARNm.

65 Susodicho ácido nucleotídico situado secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción puede comprender una única región 5'UTR seleccionada entre:

(i) - la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3 (U1), o

5 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

(ii) - la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4 (U2), o

10 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

(iii) - la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5 (U3), o

15 - un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5.

Se entiende por una región 5'UTR "situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción" una región 5'UTR situada después del extremo 3' del ADN de la región promotora y antes del extremo 5' del ADN del sitio de inicio de la traducción.

20 El susodicho ácido nucleotídico situado secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción puede comprender dos regiones 5'UTR.

La presencia de dos o más regiones 5'UTR en una unidad de transcripción según la invención permite acumular o sinergizar los efectos positivos sobre la estabilidad de los ARNm y la eficacia de traducción.

25 Un susodicho ácido nucleotídico utilizado en una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 y la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF), estando dicho ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 6, o siendo un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6.

30 Un susodicho ácido nucleotídico utilizado en una unidad de transcripción según la presente invención puede también comprender la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 y la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI), estando dicho ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 7, o siendo un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7.

35 Un susodicho ácido nucleotídico utilizado en una unidad de transcripción según la presente invención puede también comprender la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) y la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI), estando dicho ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 8 o siendo un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8.

40 Susodicho ácido nucleotídico situado secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción puede también comprender tres regiones 5'UTR, a saber la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1, la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) y la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI), estando dicho ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 9 o siendo un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9.

45 Una unidad de transcripción según la presente divulgación está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

55 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

60 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

65

En un modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

10 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

15 Las ventajas de los elementos combinados son aportadas con una potencial sinérgica entre la región 5'UTR y los otros elementos en una unidad de transcripción.

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 14 y constituido de:

20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,

25 (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5'UTR du LTR del virus HTLV-1, representada por la secuencia SEC ID NO:3,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 14.

30 Una unidad de transcripción según la presente divulgación está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

40 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

45 (iii) la región 5' UTR del gen factor represor NF-κB (NRF) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

55 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

60 estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 15 y constituido de:

65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR del gen NRF, representada por la secuencia SEC ID NO: 4,

o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 15.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando dicha región 5' UTR situada secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 16 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR del gen eIF4GI representada por la secuencia SEC ID NO: 5,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 16.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

(iv) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

5 estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

20

(iv) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

25 estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 17 y constituido de:

30

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

35 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 17.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

45

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

50 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

55 (iv) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

60

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

5 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

10 (iv) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

15 En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 18 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,

20 (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 18.

25 Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

30 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

35 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

40 (iv) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

45 estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender dos regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

55 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

60 (iv) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

65

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 19 y constituido de:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y
- (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 19.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender tres regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,
- (iv) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y
- (v) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En otro modo de realización particular de la invención, una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender tres regiones 5'UTR. Tal unidad de transcripción está constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,
- (iv) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y
- (v) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,

estando las regiones 5' UTR situadas secuencia abajo de la región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción.

En un modo de realización más particular, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 20 y constituido de:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia SEC ID NO: 2, y

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 20.

5 Una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender también uno o varios intrones situados secuencia abajo de dicha región promotora.

Se entiende por "intrón", una parte no codificante de un gen. Un intrón está situado frecuentemente entre dos exones. Después de la transcripción, esta parte se escinde del ARN pre-mensajero (empalme de los intrones) para dar el ARN mensajero. La presencia de un intrón heterólogo permite optimizar la expresión de los genes exógenos en una construcción de ADN. En efecto, este último puede contener unos elementos de regulación que pueden estabilizar el ARNm o favorecer su transcripción.

15 En la construcción de una unidad de transcripción según la presente invención, uno o varios intrones pueden estar situados:

(i) secuencia abajo de la región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, y/o

20 (ii) secuencia abajo del promotor y secuencia arriba de la región 5'UTR, y/o

(iii) después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de una secuencia codificante, y/o

(iv) entre el codón stop de la secuencia codificante y la señal de poliadenilación.

25 Cuando un intrón está situado después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de una secuencia codificante, es importante no cambiar el marco de lectura del ARNm durante la traducción y conservar los sitios donantes y aceptores, así como la caja de conexión de la secuencia (UUAUAC) que permite el empalme por el espliceosoma.

30 Se entiende por "un intrón situado secuencia abajo de dicha región promotora" un intrón situado en 3' del ADN de la región promotora.

Dicho intrón se puede seleccionar entre los siguientes:

35 - el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10, tal como la secuencia SEC ID NO: 71.

40 - el intrón ROSA murino que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,

45 - el intrón 5'-repetición terminal larga (5'-LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,

- el intrón quimérico pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,

50 - el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,

- el intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

55 **[0073]** El ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 10 se designa en la presente solicitud mediante « EF1 α » o « EFss ».

60 El ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 71 se designa en la presente solicitud mediante "EF1 α con exón" o «EF». Este ácido nucleotídico contiene el intrón EF1 α de la secuencia SEC ID NO: 10 y una secuencia exónica en región 5'.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender:

65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) una región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

5

(iii) un intrón seleccionado entre:

- el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,

10

- el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,

15

- el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,

20

- el intrón quimérico pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,

25

- el intrón del gen ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,

30

- intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54,

estando dicho potenciador situado en 5' o en 3' de la unidad de transcripción, o en el interior de la secuencia codificante a nivel de un intrón;

estando dicho intrón situado:

35

(i) secuencia abajo de la región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, o

(ii) secuencia abajo del promotor y secuencia arriba de la región 5'UTR, o

40

(iii) después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de la secuencia codificante, o

(iv) entre el codón stop de la secuencia codificante y la señal de poliadenilación.

Una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender:

45

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) una región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

50

(iii) un intrón seleccionado entre:

- el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,

55

- el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,

60

- el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,

65

- el intrón quimérico pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,

- el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,

5 - el intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54,

10 estando dicho potenciador situado en 5' o en 3' de la unidad de transcripción, o en el interior de la secuencia codificante a nivel de un intrón;

estando dicho intrón situado:

15 (i) secuencia abajo de la región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, o

(ii) secuencia abajo del promotor y secuencia arriba de la región 5'UTR, o

20 (iii) después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de la secuencia codificante, o

(iv) entre el codón stop de la secuencia codificante y la señal de poliadenilación.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

35 (iii) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

45 (iii) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 21 y constituido de:

50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

55 (iii) el intrón del gen EF1 α representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 21.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

65

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

5 (iii) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

15 (iii) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 22 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

25 (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 22.

30 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

40 (iii) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

50 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

55 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 23 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

60 (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

65 o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 23.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

10 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

(iii) el intrón pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

15 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

20 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

(iii) el intrón pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

25 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 24 y constituido de:

30 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

35 (iii) el intrón quimérico pCI-neo representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 24.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y

50 (iii) el intrón del gen ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y

60 (iii) el intrón del gen ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

65 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 55 y constituido de:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y
- (iii) el intrón del gen ubiquitina representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 55.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID: NO 2 y que posee esencialmente una actividad promotora, y
- (iii) el intrón humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y
- (iii) el intrón humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 56 y constituido de:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora del gen CDK9 representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, y
- (iii) el intrón humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 56.

Una unidad de transcripción según la presente divulgación puede comprender:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- (ii) una región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- (iii) al menos una de las regiones 5' no traducida (5' UTR) seleccionada entre:

- la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

- la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

- la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

5 (iv) al menos un intrón seleccionado entre:

- el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,

10 - el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,

15 - el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,

20 - el intrón quimérico pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,

25 - el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,

- el intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54,

30 estando dicho potenciador situado en 5' o en 3' de la unidad de transcripción, entre el promotor y la región 5'UTR o en un intrón;

estando dicha región promotora situada secuencia arriba de la región 5'UTR;

35 estando dichos intrones situados:

(i) secuencia abajo de la región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, y/o

40 (ii) secuencia abajo del promotor y secuencia arriba de la región 5'UTR, y/o

(iii) después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de la secuencia codificante, y/o

(iv) entre el codón stop de la secuencia codificante y la señal de poliadenilación.

45 Una unidad de transcripción según la presente invención puede comprender:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

50 (ii) una región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) al menos una de las regiones 5' no traducida (5' UTR) seleccionada entre:

55 - la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,

60 - la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,

- la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

65 (iv) al menos un intrón seleccionado entre:

- 5 - el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,
- 10 - el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,
- 15 - intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,
- 20 - el intrón quimérico pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,
- 25 - intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,
- 30 - intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54,
- estando dicho potenciador situado en 5' o en 3' de la unidad de transcripción, entre el promotor y la región 5'UTR o en un intrón;
- estando dicha región promotora situada secuencia arriba de la región 5'UTR;
- estando dichos intrones situados:
- (i) secuencia abajo de la región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, y/o
  - (ii) secuencia abajo del promotor y secuencia arriba de la región 5'UTR, y/o
  - (iii) después del sitio de inicio de la traducción y en el interior de la secuencia codificante, y/o
  - (iv) entre el codón stop de la secuencia codificante y la señal de poliadenilación.
- La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:
- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
  - (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
  - (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y
  - (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.
- Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:
- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
  - (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

5 (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

10 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 25 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y

20 (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 25.

25 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

35 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

40 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

55 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 26 y constituido de:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 26.

5 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

20 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

35 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 27 y constituido de:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y

50 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 27.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

60 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

65 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

(iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

5 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

10 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

15 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

(iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

20 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 28 y constituido de:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

30 (iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y

(iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 28.

35 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

40 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

45 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

50 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

60 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y

65 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 57 y constituido de:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y
- (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 57.

15 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y
- 20 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 25 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y
- 30 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 40 (iii) la región R del Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3, y
- 45 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 64 y constituido de:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- 55 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- (iii) la región R del LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, y
- 60 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54,
- o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 64.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

65

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

5 (ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

10 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

15 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

20 (ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

25 (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

30 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 29 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

35 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y

40 (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 29.

45 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

50 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

55 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

60 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

5 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

10 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 30 y constituido de:

15 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

20 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 30.

25 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

30 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

35 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

40 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

55 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 31 y constituido de:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y

(iv) el intrón del gen 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 31.

5 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

15 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

20 (iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

30 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

(iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

35 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 32 y constituido de:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

45 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y

(iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 32.

50 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

60 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y

65 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y
- (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

15 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 58 y constituido de:

- 20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 25 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y
- (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 58.

30 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 40 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y
- 45 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 55 (iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4, y
- (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

60 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 65 y constituido de:

- 65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen Factor represor NF- κ B (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, y

(iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 65.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 33 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO:1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 33.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

5 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

10 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

20 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

25 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 34 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

35 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 34.

40 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

50 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

55 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

5 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 35 y constituido de:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

20 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 35.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

35 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

40 (iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

55 (iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 36 y constituido de:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

5 (iv) intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 36.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

20 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

25 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

35 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

40 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 59 y constituido de:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 59.

55 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y

65 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

5 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

15 (iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5, y

20 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 66 y constituido de:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR del gen del factor de iniciación eucariota 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 5, y

35 (iv) intrón del gen humano ROSA representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 66.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

50 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6,

55 (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6,

(iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

5 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 37 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

10 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

15 (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 37.

20 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

25 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

30 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

35 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

40 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

45 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

50 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 38 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

55 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

60 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 38.

65 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

5 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

10 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

15 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

25 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

30 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 39 y constituido de:

35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

40 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 39.

45 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

55 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

60 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

5 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

10 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 40 y constituido de:

15 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

20 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

(iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 40.

25 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

35 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

40 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

55 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 60 y constituido de:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 60.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 6, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 6, y

(iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 67 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 6, y

(iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 67.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y
- (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

15 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 41 y constituido de:

- 20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 25 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y
- (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 41.

30 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 40 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y
- 45 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 55 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y
- (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

60 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 42 y constituido de:

- 65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 42.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 43 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de la ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 43.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

5 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

15 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

20 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 44 y constituido de:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

30 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y

(iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 44.

35 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

50 (iv) el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

60 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y

65 (iv) el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 61 y constituido de:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y
- (iv) el intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 61.

15 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- 20 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 25 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y
- (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.
- 30

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 40 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 7, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 7, y
- (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.
- 45

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 68 y constituido de:

- 50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 55 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 7, y
- (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 68.

60 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción, y
- 65

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

5 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

10 Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

20 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

(iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

25 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 45 y constituido de:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y

35 (iv) el intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 45.

40 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

50 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8,

55 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

(i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

60 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8,

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

5 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 46 y constituido de:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

15 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y

(iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 46.

20 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

30 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

35 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

45 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

50 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 47 y constituido de:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

60 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 47.

65

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- 10 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y
- 15 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 25 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y
- 30 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 48 y constituido de:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 40 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y
- (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 48.
- 45

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 55 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y
- 60 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

5 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

10 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 62 y constituido de:

15 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

20 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 62.

25 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

30 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

35 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

40 (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 8, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 8, y

55 (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 69 y constituido de:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

65 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 8, y

(iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 69.

5 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

15 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

20 (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

30 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

35 (iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 49 y constituido de:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

45 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y

(iv) el intrón del gen factor 1α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10,

50 o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 49.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

60 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

65 (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y
- (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11.

15 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 50 y constituido de:

- 20 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 25 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y
- (iv) el intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 11,

o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 50.

30 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 35 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,
- 40 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y
- 45 (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 50 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 55 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y
- (iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12.

60 En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 51 y constituido de:

- 65 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

5 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y

(iv) el intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12,

10 o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 51.

La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

15 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

20 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

25 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

30 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

35 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

40 (iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 52 y constituido de:

45 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

50 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y

(iv) el intrón quimérico del pCI-neo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 52.

55 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

60 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

65

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

5 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

10 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

15 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

20 (iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 63 y constituido de:

25 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

30 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y

(iv) intrón del gen de la ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 63.

35 La presente divulgación describe una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

40 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 1 y que posee esencialmente unas propiedades de activación de la transcripción,

45 (ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2, o un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 2 y que posee esencialmente una actividad promotora,

(iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

50 (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

Un modo de realización particular de la invención se refiere a una unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

55 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,

(ii) la región promotora de la Quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,

60 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia SEC ID NO: 9, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 9, y

65 (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

En un modo de realización más particular de la invención, una unidad de transcripción según la invención está constituida de un polinucleótido que comprende un ácido nucleotídico representado por la secuencia SEC ID NO: 70 y constituido de:

- 5 (i) el potenciador del virus hCMVie representado por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1,
- (ii) la región promotora de la quinasa 9 dependiente de ciclina (CDK9) representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2,
- 10 (iii) la región 5' UTR representada por la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 9, y
- (iv) intrón del gen humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o de un ácido nucleotídico que tiene al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 70.

15 En un modo de realización ventajoso, la presente invención se refiere a una unidad de transcripción, en la que la región promotora es la de CDK9, la región 5' UTR es la del gen eIF4GI (U3) y el intrón es el del gen EF1 α , dicha unidad de transcripción que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 33, o una secuencia nucleotídica que presenta al menos un 70% de identidad con la secuencia SEC ID NO: 33 y que permite una producción volúmica de una proteína de interés superior a la obtenida con la combinación del potenciador CMV asociado a la región promotora de CDK9.

Se entiende por una "producción volúmica", una cantidad de proteína expresada en masa por unidad de volumen (g/l) también denominada título de proteína o concentración de la proteína de interés.

25 La presente invención se refiere también un vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción tal como se ha definido anteriormente, y al menos un sitio de clonación que permite la integración de un ácido nucleico que codifica para una proteína de interés.

30 Dicho ácido nucleico puede ser un ADN genómico, un ADN complementario (ADNc), un ácido nucleico sintético o un ácido nucleico quimérico.

Mediante la expresión "sitio de clonación", se entiende un segmento corto de ADN que comprende uno o varios sitios de restricción, reconocidos respectivamente por una o varias enzimas de restricción y que permite la inserción de una secuencia nucleotídica de interés.

35 La presente invención se refiere también un vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción tal como se ha definido anteriormente y al menos un sitio para la recombinación del sitio específico que permite la integración de un ácido nucleotídico que codifica para una proteína de interés.

40 Dicho ácido nucleotídico puede ser un ADN genómico o un ADN complementario (ADNc).

Mediante la expresión "sitio para la recombinación del sitio específico", se entiende un segmento corto de ADN que es reconocido por una recombinasa, tal como el sitio *loxP* que es reconocido por la recombinasa Cre, el sitio *xis* que es reconocido por la integrasa Int, el sitio FRT que es reconocido por la recombinasa FLP.

45 Un vector de expresión según la presente invención puede comprender además un gen de resistencia eucariota, un gen de resistencia bacteriana, un origen de replicación bacteriana y una unidad dedicada a la amplificación génica.

50 Un gen de resistencia eucariota puede ser un gen de resistencia a la Geneticina (G418), Blastidina, Zeocina.

Un gen de resistencia bacteriana puede ser un gen de resistencia a la ampicilina, Kanamicina, Puromicina, Blastidina, Zeocina.

55 Un origen de replicación (Ori) bacteriana es una secuencia de ADN particular de origen bacteriano que permite el inicio de la replicación del material genético como un vector de expresión y condicionar en la bacteria el número de copias de vector por bacteria. Tal origen de replicación se puede seleccionar entre Ori-P, Ori-C, Ori-f1, ColE1, pSC101 Ori, p15A Ori, pACYC Ori, SV40 Ori, pMB1 Ori, pUC ori.

60 Mediante la expresión "una unidad dedicada a la amplificación génica", se entiende cualquier unidad que permite realizar una amplificación génica y/o un enriquecimiento fuerte en células fuertemente productoras. Lo más frecuentemente, esta unidad permite la expresión de un gen de resistencia a un inhibidor que actúa de manera dependiente de la dosis; mediante el aumento de la dosis del inhibidor, se seleccionan variantes celulares que expresan más fuertemente el gen de resistencia, en particular tras una amplificación génica o integración en un sitio de fuerte expresión. Lo más frecuentemente, los genes próximos de esta unidad son también amplificados genéticamente y/o tienen una expresión aumentada. Tal unidad puede ser el gen dhfr (dihidrofolato reductasa) cuyo inhibidor es el metotrexato o el gen glutamina sintasa cuyo inhibidor es la metionilsulfoximina, un sistema de

65

amplificación de fragmentos génicos que se basa en la selección de transformantes que resisten al metotrexato (MTX). Necesita la introducción previa de una unidad de transcripción que comprende el ácido nucleico que codifica para la enzima DHFR (dihidrofolato reductasa) en el vector de expresión para la producción de la molécula recombinante de interés (SHITARI *et al.*, 1994).

5 Una proteína recombinante de interés susceptible de ser producida por un vector según la invención es una proteína natural o modificada en su secuencia primaria y seleccionada entre el grupo constituido de las proteínas implicadas en la cascada de la coagulación o una inmunoglobulina, unas enzimas metabólicas, unas citoquinas, quimioquinas, unas hormonas, unos factores de crecimiento o factores del complemento y de cualquier proteína de fusión

10 La presente invención tiene también como objetivo proporcionar las células hospedantes que comprenden un vector de expresión tal como se describe en la presente invención.

15 Dichas células hospedantes pueden ser una línea celular de mamífero tal como una línea celular YB2/0 (N° ATCC: **CRL-1662**), o una línea celular CHO.

La presente invención se refiere también a la utilización de un vector de expresión descrito anteriormente, para transfectar una célula hospedante.

20 Otro objetivo de la presente invención es poner a disposición un sistema de expresión que comprende un vector de expresión según la presente invención y una célula hospedante tal como se ha descrito anteriormente, que permite la expresión de una proteína de interés codificada por un ácido nucleotídico.

25 La presente invención se refiere también a la utilización de un vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción según la presente invención, en una célula hospedante tal como se ha descrito anteriormente, para producir una proteína codificada por un ácido nucleotídico, estando dicha proteína producida con un título más elevado que en el vector de expresión de referencia que comprende al menos un promotor RSV, un intrón quimérico que proviene del vector pCI-neo, una secuencia de poliadenilación, un gen de resistencia eucariota, un gen de resistencia bacteriana, un origen de replicación bacteriana y una unidad dedicada a la
30 amplificación génica, comprendiendo dicho vector de referencia la misma secuencia nucleotídica.

La presente invención tiene también por objeto un procedimiento de producción *in vitro* de una proteína recombinante de interés que comprende las etapas de:

35 - introducir el vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción según la presente invención y una secuencia nucleotídica en forma genómica o de ADNc que codifica para una proteína de interés en una célula hospedante,

40 - seleccionar e identificar unas células hospedantes obtenidas en la etapa anterior que expresa de manera estable dicha proteína de interés,

- extraer y purificar dicha proteína de interés.

45 En otro modo de realización particular, el procedimiento de producción según la presente invención comprende las etapas de:

50 - introducir el vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción según la presente invención y una secuencia nucleotídica en forma genómica o de ADNc que codifica para una proteína de interés en una célula hospedante por transfección transitoria,

- extraer y purificar dicha proteína de interés.

55 Tal proteína recombinante puede ser una proteína implicada en la cascada de la coagulación o una inmunoglobulina, unas enzimas metabólicas, unas citoquinas, quimioquinas, unas hormonas, unos factores de crecimiento o factores del complemento y de cualquier proteína de fusión.

Un procedimiento según la presente invención puede comprender además una etapa de selección y de identificación de las células hospedantes obtenidas que expresan de manera estable dicha proteína de interés.

60 La presente invención se ilustra mediante las figuras y los ejemplos siguientes. No obstante, la presente invención no está limitada en ningún caso a las figuras y ejemplos siguientes.

Figuras

La figura 1 ilustra el vector E2-CDK9-U1U2U3 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie (E2), la región promotora del gen CDK9, la región R del LTR del virus HTLV-1 (U1), la región 5'UTR del gen NRF (U2) y la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3).

5 La figura 2 ilustra el vector E2- CDK9-U2U3 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región 5'UTR del gen NRF y la región 5'UTR del gen eIF4G1.

10 La figura 3 ilustra el vector E2-CDK9-U2 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9 y la región 5'UTR del gen NRF.

La figura 4 ilustra el vector E2-CDK9-U1 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9 y la región R del LTR del virus HTLV-1.

15 La figura 5 ilustra el vector E2- CDK9-U3 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, y la región 5'UTR del gen eIF4G1.

20 La figura 6 ilustra el vector E2-CDK9-U1U3 que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región R del LTR del virus HTLV-1 y la región 5'UTR del gen eIF4G1.

La figura 7 ilustra el vector E2-CDK9-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9 y el primer intrón del gen EF1 α .

25 La figura 8 ilustra el vector E2-CDK9-U1U2U3-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región R del LTR del virus HTLV-1, la región 5'UTR del gen NRF, la región 5'UTR del gen eIF4G1 y el primer intrón del gen EF1 α .

30 La figura 9 ilustra el vector E2-CDK9-U1U3-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región R del LTR del virus HTLV-1, la región 5'UTR del gen eIF4G1 y el primer intrón del gen EF1 α .

35 La figura 10 ilustra el vector E2-CDK9-U2U3-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región 5'UTR del gen NRF, la región 5'UTR del gen eIF4G1 y el primer intrón del gen EF1 α .

40 La figura 11 ilustra el vector E2-CDK9-U2-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región 5'UTR del gen NRF y el primer intrón del gen EF1 α .

La figura 12A ilustra el vector E2-CDK9-U1-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región R del LTR del virus HTLV-1 y el primer intrón del gen EF1 α .

45 La figura 12B ilustra el vector E2-CDK9-U3-EF1 α , que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 y el primer intrón del gen EF1 α .

50 La figura 13 ilustra el vector E2-CDK9-U1U2-EF1 α que comprende una unidad de transcripción que comprende el potenciador de hCMVie, la región promotora del gen CDK9, el primer intrón del gen EF1 α , la región R del LTR del virus HTLV-1 y la región 5'UTR del gen NRF.

55 La figura 14 ilustra el vector bicistrónico CHK622-21 para expresar una IgG1/K. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del promotor LTR RSV en asociación con el intrón quimérico pCI-neo.

La figura 15 ilustra el vector HK622-21_138H11B que comprende la cadena ligera y la cadena pesada del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del promotor LTR RSV en asociación con el intrón quimérico pCI-neo.

60 La figura 16 ilustra el vector HK622-21_138H11B_MB7 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del promotor LTR RSV en asociación con el intrón quimérico pCIneo.

65 La figura 17 ilustra el vector bicistrónico E2-CDK9-U3-Gen para expresar una IgG1/K. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9 y la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3).

5 La figura 18 ilustra el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B_MB7 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9 y la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3)

10 La figura 19 ilustra el vector HK1358-4 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón quimérico pCI-neo.

15 La figura 20 ilustra el vector HK1358-5 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón EF1 α .

20 La figura 21 ilustra el vector HK1358-8 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón mROSA.

25 La figura 22 ilustra el vector HK1358-11 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón 5'LTR HTLV1.

30 La figura 23 ilustra el vector HK1358-10 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón pEF con exón.

35 La figura 24 ilustra el vector HK1358-6 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón humano ROSA.

40 La figura 25 ilustra el vector HK1358-9 que comprende la cadena ligera con el péptido señal MB7 y la cadena pesada el péptido señal MB7 del anticuerpo anti-GGT 138H11B. Las unidades de transcripción de interés están bajo la dependencia del potenciador E2 (hCMVie) del promotor CDK9, la región 5'UTR del gen eIF4G1 (U3) y el intrón del gen ubiquitina.

45 La figura 26 ilustra la productividad del anticuerpo anti-GGT (138H11B) en el contexto E2CDK9U3 con diferentes intrones, en pools estables en medio con suero, en comparación con la referencia LTR RSV + intrón pCI neo."EF" corresponde al intrón representado por la secuencia SEC ID NO: 71. "EFss" corresponde al intrón representado por la secuencia SEC ID NO: 10.

50 La figura 27 ilustra la productividad del anticuerpo anti-AMHR11 (3C23K) en el contexto E2CDK9U3 con diferentes intrones, en pool en medio sin suero, en comparación con la referencia LTR RSV + intrón pCI neo. "EF" corresponde al intrón representado por la secuencia SEC ID NO: 71. "EFss" corresponde al intrón representado por la secuencia SEC ID NO: 10.

55 La figura 28 ilustra la productividad de los 3 anticuerpos anti-GGT (138H11B), anti-AMHR11 (3C23K) y anti-CD20 (R603) en el contexto E2CDK9U3 y intrón EFss, en comparación con la referencia LTR RSV + intrón pCI neo.

60 La figura 29 ilustra la comparación del efecto de los diferentes intrones en asociación con LTR RSV sobre la expresión en transfección transitoria de la cadena kappa libre del anticuerpo anti-Rh(D) T125 en la línea CHO-S evaluada en transfección transitoria. Las columnas de puntos, de izquierda a derecha, representan respectivamente el porcentaje de expresión de la cadena kappa libre bajo el control de los intrones: β -actina (Bact), EF1 α , mROSA, hROSA, 5'-LTR HTLV1, ubiquitina (ubc), pCI neo. El vector de referencia es RSV_T125_K2. El eje de las ordenadas representa la concentración en cadenas kappa libres en el medio de cultivo.

65 La figura 30 ilustra la comparación del efecto de los diferentes intrones en asociación con la unidad de transcripción E2-CDK9-U3 o el LTR RSV sobre la expresión de la cadena kappa libre del anticuerpo anti-Rh(D) T125 en la línea CHO-S evaluada en transfección transitoria. Las columnas de puntos, de izquierda a derecha, representan el porcentaje de expresión de la cadena kappa libre bajo el control de las asociaciones: E2-CDK9-U3 sin intrón, E2-

CDK9-U3 con intrón hROSA, E2-CDK9-U3 con intrón mROSA, LTR RSV con intrón EF1 α , LTR RSV con intrón mROSA, E2-CDK9-U3 con intrón EF1 α , LTR RSV con intrón hROSA. Los vectores de referencia son RSV_T125_K2 y pRep4KT125. El eje de las ordenadas representa la concentración en cadenas kappa libres en el medio de cultivo. E2 representa el potenciador hCMVie. U3 corresponde a la región 5'UTR del gen eIF4G1.

La figura 31 ilustra la comparación de la expresión en pools estables de transfectantes que expresan IgG anti-Rh(D) en la línea CHO-S en función del vector (E2CDK9U3 / LTR RSV intrón pCIneo) y más precisamente la productividad en pools estables del anticuerpo entero anti-Rh(D) T125 con el vector que contiene la unidad de transcripción E2-CDK9-U3 (HK E2 CDK9 U3) en comparación con la referencia con LTR RSV intrón pCIneo (HK463-18). E2 representa el potenciador hCMVie. U3 corresponde a la región 5'UTR del gen eIF4G1.

La figura 32 es un diagrama de distribución de los transfectantes que expresan IgG anti-Rh(D) en la línea CHO-S en función del vector (E2CDK9U3 / LTR RSV intrón pCIneo). Este diagrama ilustra la productividad de clones que producen el anticuerpo entero anti-Rh(D) T125 con el vector que contiene la unidad de transcripción E2-CDK9-U3 (HK E2 CDK9 U3) en comparación con la referencia con LTR RSV intrón pCIneo (HK463-18).

La figura 33 ilustra la comparación de los títulos medios de cadenas kappa T125 obtenidos en la línea YB2/0 a partir de los vectores que contienen diferentes unidades de transcripción según la invención, a saber E2-CDK9-U1, E2-CDK9-U2, E2-CDK9-U3, E2-CDK9-U2U3, E2-CDK9-U1U2U3. Los 6 medios obtenidos son comparados a fin de determinar cuales son significativamente diferentes los unos de los otros (ensayos de extensiones múltiples).

La figura 34 ilustra la comparación de los títulos medios en inmunoglobulina entera anti-Rh(D) obtenidas en la línea YB2/0 a partir del vector E2-CDK9-U3 y del vector de referencia HK463-18 que contiene RSV + intrón pCIneo. Se comparan los medios obtenidos a fin de determinar si son significativamente diferentes el uno del otro (ensayo de extensiones múltiple).

La figura 35 ilustra la comparación de los títulos medios de la inmunoglobulina anti-CD71 (H7) obtenida en la línea YB2/0 a partir del vector E2-CDK9-U3 que contiene el intrón EF1 α con la obtenida a partir del vector de referencia RSV_pCIneo que contiene también el intrón EF. Los medios obtenidos son comparados a fin de determinar cuales son significativamente diferentes los unos de los otros (ensayos de extensiones múltiples).

Ejemplos:

1. Materiales y métodos

1.1. Transfección transitoria

En YB2/0, las células parentales son sembradas el día anterior de la transfección (D-1) a 2×10^5 cv/ml en EMS (Invitrogen, medio por encargo) + 5% SVF (Invitrogen) en Flask. El día de la electroporación (D0), centrifugación de 4×10^6 células por pila (Biorad) de 4 mm recogidos en 100 μ l de tampón V (Cell line nucleofector kitV, Lonza) que son nucleofectadas por AMAXA con 4 μ g de ADN plasmídico utilizando el programa T020 del aparato. Las células son cultivadas en pocillos placa P6 a 37°C, 7% de CO₂ en 3 ml de medio EMS + 5% de SVF. Los sobrenadantes son recogidos para la determinación ELISA a D+5.

En CHO-S, las secuencias a expresar son evaluadas en transfección transitoria según el protocolo del kit FreeStyle (Invitrogen). Las células parentales son inoculadas 24h antes de la transfección (D-1) en Erlenmeyer (VWR) a 6×10^5 cv/ml en FreeStyle CHO EM (Fisher Bioblock scientific) e incubadas bajo agitación a 120 rpm, 37°C, 8% de CO₂. El día de la transfección, se forma un complejo FreeStyle MAX Reagent (Fisher Bioblock Scientific) /ADN, en la relación 1:1, en Opti Pro SFM (Invitrogen). El complejo se deposita después sobre las células en suspensión previamente centrifugadas y recogidas a 1×10^6 cv/ml en FreeStyle CHO EM en un cultiflask (Sartorius) (5ml) e incubado a 200 rpm a 37°C, 8% de CO₂. Los sobrenadantes son recogidos D+5 para la evaluación del porcentaje de moléculas segregadas en el medio.

1.2. Transfección estable

1.2.1 Transfección estable de la línea YB2/0 en medio con suero

Las células deben tener un crecimiento estabilizado y estar descongeladas desde al menos 4 semanas en medio EMS (LFB) + 5% SVF en unos flask F150 (80 ml). Las células se trasplantan el día anterior a 2×10^5 cv/ml en medio EMS + 5% SVF.

El día de la electroporación, las células son electroporadas por Gene Pulser Xcell (BioRad) con un voltaje de 230 V y una capacitancia de 960 μ F en cubetas (Biorad) de 4 mm con 5×10^6 cv (csp 500 μ l de tampón de electroporación del kit electrobuffer (Ozyme) que contiene el ADN plasmídico linealizado). Después de la electroporación, se realiza el esparcimiento en placas de 24 pocillos (P24) (25000 células/pocillo) en medio EMS + 5% SVF.

A D+3: Puesta en medio selectivo para obtener las concentraciones finales siguientes: EMS + 5%SVF + G418 1 mg/ml + rojo de fenol 1%.

A D+7: Renovación de las placas con el medio correspondiente.

A D+10: Cuando las células están próximas a la confluencia, se realizan 3 pools de 8 pocillos P24, se transplantan las células a 2E5 cv/ml en F25 y se realiza una producción máxima (Prod max a D+7), estando el sobrenadante recogido y determinado en el kit Fast ELYSA (RD-biotech).

1.2.2 Transfección estable de la línea YB2/0 en medio sin suero

Las células deben tener un crecimiento estabilizado, y estar descongeladas desde por lo menos 3 semanas, en medio EMABPRO1 (LFB) en cultiflask bajo una agitación de 250 rpm. Las células se transplantan el día anterior a 3E5 cv/ml en medio EMABPRO1.

El día de la electroporación, las células son electroporadas por Gene Pulser Xcell (BioRad) con un voltaje de 230 V y una capacitancia de 950 µF en cubetas (Biorad) de 4 mm con 5E6 cv (csp 500 µl de tampón de electroporación del kit electrobuffer (Ozyme) que contiene el ADN plasmídico linealizado). Después de la electroporación las células son recogidas a 3E5 cv/ml en medio EMABPRO1 en frasco de cultivo F75.

A D+3: Puesta en medio selectivo para obtener las concentraciones finales siguientes: EMABPRO1+aditivo LFB para la clonación celular de baja densidad LDCC + G418 1 mg/ml.

A D+10: si la densidad celular es superior a 6E5 cv/ml, trasplantar las células a 3E5 cv/ml EMABPRO1+G418 1 mg/ml en F25, sino diluirlos de mitad en EMABPRO1 +aditivo LFB para LDCC + G418 1 mg/ml.

A partir de D+12 y 3 veces por semana: si la densidad celular es superior a 6E5 cv/ml, trasplantar las células a 3E5 cv/ml en F25.

A partir de D+17 y si la viabilidad es superior al 80%, realizar una producción en modo fed batch simplificado: inocular unos cultiflasks a 3E5 cv/ml, cultivar bajo agitación a 250rpm, añadir un feed de glucosa y glutamina a D+3, D+5 y D+7.

El sobrenadante se recoge a D+10 y determinado con el kit Fast ELYSA (RD-biotech).

1.2.3 Transfección estable de la línea CHO-S

Las evaluaciones son realizadas en pools de transfectantes ("transfección en pool estable") a fin de comparar las diferentes construcciones en la base de un nivel de expresión medio en un gran número de transfectantes (varios miles) así como los mejores clones seleccionados por ClonePixFL sobre estos pools.

1.2.3.1. Obtención de pools y evaluaciones en pools

La línea CHO-S se cultiva en medio Freestyle CHO EM + 8 mM de glutamina, en flask a 37°C, 8% CO2, bajo agitación a 135 rpm.

Las células se trasplantan el día anterior a 6x10⁵ cel./ml.

El día de la electroporación, las células son electroporadas por Gene Pulser Xcell (BioRad) con un voltaje de 300 V y una capacitancia de 500 µF en cubetas (Biorad) de 4 mm con 5E6 cv (csp 500 µl de tampón de electroporación del kit electrobuffer (Ozyme) que contiene el ADN plasmídico linealizado). Después de la electroporación las células son recogidas a 3E5 cv/ml en frasco de cultivo F75.

A D+3: Puesta en medio selectivo para obtener las concentraciones finales siguientes: Freestyle CHO EM + aditivos LFB para la clonación celular de baja densidad LDCC + G418 1 mg/ml.

A D+10: Dilución de mitad en Freestyle CHO EM + aditivos LFB para la clonación celular de baja densidad LDCC + G418 1 mg/ml.

A partir de D+12 y 3 veces por semana: si la densidad celular es superior a 6E5 cv/ml, trasplantar las células a 3E5 cv/ml en F25.

A partir de D+17 trasplante en frasco F25 o F75 en Freestyle CHO EM + G418 1 mg/ml.

A partir de D+25, realizar una producción en modo discontinuo: inocular F25 a 3^{E5} cv/ml en Freestyle CHO EM + G418 1 mg/ml (producción en pool).

Se recoge el sobrenadante a D+12 y se determina con el kit Fast ELYSA (RD-biotech).

1.2.3.2. Obtención de clones y evaluaciones de los clones

Los pools de células obtenidos anteriormente son esparcidos en medio semi-sólido (CloneMedia CHO - Molecular Devices) en presencia de anticuerpos fluorescentes de detección.

Los clones más fuertes productores de cada pool se seleccionan en primer lugar en función de su intensidad de fluorescencia ("cribado" y "picking" por ClonePix^{FL}) después en función de su título de saturación en P24.

Los mejores clones son entonces evaluados en producción en modo discontinuo por inoculación de cultiflasks a 3^{E5} cv/ml en Freestyle CHO EM + G418 1 mg/ml y cultivo bajo agitación a 250rpm.

Se recoge el sobrenadante cuando la viabilidad es inferior al 50% y determinado con el kit Fast ELYSA (RD-biotech).

1.3. Evaluación del porcentaje de proteína recombinante segregada

La evaluación del porcentaje de cadena kappa libre del anticuerpo anti-Rh(D) T125 así como la producción de IgG1 de anti-CD20, anti-AMHR11 o de anti-GGT son determinados por la técnica Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

La cadena kappa libre presente en el sobrenadante de cultivo está capturada durante 2h por un anticuerpo de cabra anti-kappa humano (Caltag Lab) que está absorbido en placas de 96 pocillos. El anticuerpo capturado se revela después por un anti-kappa humano de cabra biotinilado (Pierce) después se añade estreptavidina acoplada con peroxidasa (Pierce). Entre cada etapa, se efectúan 4 lavados para eliminar las proteínas y reactivos que no entran en la formación del complejo. La revelación se realiza mediante adición del sustrato de la enzima, el OPD (Sigma) y detención de la reacción por HCl 1N. La lectura se realiza con espectrofotómetro a 492nm. La concentración de anticuerpos se determina en comparación de una gama patrón.

Las IgG1 producidas en transfecciones transitorias y estables son evaluadas por el kit Fast ELYSA (RD-biotech) según las instrucciones del proveedor. La lectura de la densidad óptica se realiza en espectrofotómetro a 450 nm. La concentración de anticuerpos se determina en comparación de una gama patrón contenida en el kit.

1.4. Análisis estadísticas

Los resultados de producción de cadena Kappa libre o de las inmunoglobulinas enteras se comparan en valores normalizados por las medianas de un experimento con otro. Los análisis estadísticos se realizan con la ayuda del programa STATGRAPHICS Centurion XV. Se aplican unos ensayos extendidos múltiples a los datos con el método 95,0% LSD. Los pares de datos tienen unas diferencias estadísticamente significativas a nivel de confianza del 95,0%.

Ejemplo 1: Construcción del vector E2-CDK9-U1U2U3 (Figura 1)

- Digestión del vector E2-CDK9 por BamHI y NheI
- Recuperación del fragmento de 5630 bases, eliminación del fragmento de 204 bases
- Digestión del inserto sintético por BamHI y NheI
- Recuperación sobre gel del inserto de 1271 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9-U1U2U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

Ejemplo 2: Construcción del vector E2-CDK9-U2U3 (Figura 2)

- Digestión PmeI sobre E2- CDK9-U1U2U3
- Recuperación del fragmento 6620 bases eliminación del fragmento de 281 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9-U2U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

Ejemplo 3: Construcción del vector E2-CDK9-U2 (Figura 3)

- Digestión SpeI+NheI de E2- CDK9-U2U3
- Recuperación sobre gel del fragmento a 6296 bases, eliminación del fragmento a 324 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9-U2
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

5

Ejemplo 4: Construcción del vector E2-CDK9-U1 (Figura 4)

- Digestión SpeI+NheI E2-CDK9-U1U2U3
- Recuperación sobre gel del fragmento a 5911 bases, eliminación del fragmento a 990 bases
- Ligación y obtención de E2- CDK9-U1
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

10

Ejemplo 5: Construcción del vector E2-CDK9-U3 (Figura 5)

- Digestión HpaI+PmeI sobre E2- CDK9-U1U2U3
- Recuperación sobre gel del fragmento a 5957 bases, eliminación del fragmento a 944 bases
- Ligación y obtención de E2- CDK9-U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

20

Ejemplo 6: Construcción del vector E2-CDK9-U1U3 (Figura 6)

- Digestión SpeI sobre E2-CDK9-U1U2U3 para liberar la región 5'UTR U2
- Recuperación sobre gel del fragmento a 6235 bases, eliminación del fragmento a 666 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9-U1U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

25

30

Ejemplo 7: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α (figura 7)

- Digestión SpeI+NheI de E2- CDK9
- Recuperación sobre gel del fragmento a 5636 bases, eliminación del fragmento a 198 bases
- Digestión del inserto sintético por SpeI y NheI
- Recuperación sobre gel del inserto de 1001 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9- EF1 α
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

35

40

Ejemplo 8: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U1U2U3 (figura 8)

- Digestión SpeI+BamHI de E2- CDK9-EF1 α
- Recuperación sobre gel del fragmento a ??? bases, eliminación del fragmento a ??? bases
- Digestión del inserto sintético por BamHI y NheI
- Recuperación sobre gel del inserto de 1271 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9- EF1 α -U1U2U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

45

50

Ejemplo 9: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U1U3 (figura 9)

- Digestión SpeI sobre E2- CDK9-EF1 α -U1U2U3
- Recuperación del fragmento 7236 bases y eliminación del fragmento de 666 bases
- Ligación y obtención de E2- CDK9-EF1 α -U1U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

55

Ejemplo 10: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U2U3 (figura 10)

- Digestión HpaI/PmeI sobre E2- CDK9-EF1 α -U1U2U3

60

- Recuperación del fragmento 7230 bases eliminación del fragmento de 672 bases
- Ligación y obtención de E2- CDK9-EF1 α -U2U3
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

5

Ejemplo 11: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U2 (figura 11)

- Digestión SpeI de E2- CDK9-EF1 α
- Recuperación sobre gel del fragmento a 6637 bases,
- Digestión del inserto sintético por SpeI
- Recuperación sobre gel del inserto de 666 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9- EF1 α -U2
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

10

15

Ejemplo 12: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U1 (figura 12A)

- Digestión BamI+SpeI de E2- CDK9-EF1 α
- Recuperación sobre gel
- Digestión del inserto sintético por BamI+SpeI
- Recuperación sobre gel del inserto de 947 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9- EF1 α -U1
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

20

25

Ejemplo 13: Construcción del vector E2-CDK9-EF1 α -U1U2 (figura 13)

- Digestión SpeI de E2-CDK9-EF1 α -U1
- Recuperación sobre gel del fragmento a 9612 bases
- Digestión del inserto sintético por SpeI
- Recuperación sobre gel del inserto de 947 bases
- Ligación y obtención de E2-CDK9- EF1 α -U1U2
- Cribado de los clones bacterianos mediante una técnica adaptada como la PCR, con la ayuda de cebadores apropiados

30

35

Ejemplo 14: Construcción del vector E2-CDK9-U3-HK138H11B para la expresión del anticuerpo anti-GGT en YB2/0

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0 teniendo en cuenta los resultados de secuenciación por 5' RACE del hibridoma fuente.

40

El ácido nucleotídico de la cadena pesada del anticuerpo 138H11 y el ácido nucleotídico de la cadena ligera de dicho anticuerpos son clonados en el vector CHK622-21.

45

Clonación de las cadenas ligeras del anticuerpo 138H11 sin péptido señal

- Digestión del vector CHK622-21 (figura 14) por DraIII y SpeI,
- Recuperación de un fragmento de 9917 pb por extracto nucleoespinoso,
- 1^a PCR de 15 ciclos de dímeros con TAQ Proof Reading utilizando los cebadores GGT-KP1 (acagctcttactagtgccgccaccatggacatgagggtgccagctcagctgctggac) y GGT-KP2 (ctggatgtcgcacatcagcgcctggcagccacagcagcagcagctccagcagctgag) para obtener un fragmento de 99 pb,
- 2^o PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-KP3 (gcgctagatgcgacatccagatgacacaatctagctcctctttcagtgtag) y GGT-KD3 (CAAAGTCCAGGGTGTGGACAGATAC) para obtener un fragmento de 306 pb,
- 3^o PCR de 15 ciclos en dímeros utilizando los cebadores GGT-KD1 (CACCTGGACTTTTGGCGGAGGGACCAAGCTGGAAATCAAAG) y GGT-KD2 (GAAAGATGAAGACTTGGTGCAGCCACGGTTCTTTTGATTTCC) para obtener un fragmento de 75 pb,
- Purificación sobre gel y extracto nucleoespinoso del producto obtenido por la 2^o PCR,
- Purificación y extracto nucleoespinoso de los productos obtenidos por la 1^{er} PCR1 y la 3^o PCR3,

50

55

60

- Ensamblaje de los 3 fragmentos por PCR con los cebadores GGT-KP1 y GGT-KD2 para obtener un fragmento de 445 pb,
- Digestión del fragmento de 445 pb por DralIII+SpeI y recuperación de un fragmento de 420 pb por purificación y extracto nucleoespinoso,
- Ligación de dicho fragmento digerido en el vector CHK622-21 digerido para obtener el vector CHK622-21_138H11B de 10337 pb,
- Cribado por PCR con los cebadores 5'1PLC y GGT-KP2 que da un amplicón de 143pb.

Clonación de las cadenas ligeras del anticuerpo 138H11 con péptido señal MB7

- Digestión del vector CHK622-21 por DralIII y SpeI,
- Recuperación de un fragmento de 9917 pb por extracto nucleoespinoso,
- 1° PCR de 15 ciclos en dímeros con TAQ Proof Reading utilizando los cebadores GGT-KP1MB7 (tacagctcttactagtgccgccaccatgcatggagctggatcttctctg) y GGT-KP2MB7 (atctggatgtcggcgttggcgtggtgatgctcagcagcagcaggaagatc) para obtener un fragmento de 90 pb,
- 2° PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-KP3MB7 (gccaacgcccacatccagatgacacaatctagctctctttcagtgtag) y GGT-KD3 para obtener un fragmento de 304 pb,
- 3° PCR de 15 ciclos en dímeros utilizando los cebadores GGT-KD1 y GGT-KD2 para obtener un fragmento de 75 pb,
- Purificación sobre gel y extracto nucleoespinoso del producto obtenido por la 2° PCR,
- Purificación y extracto nucleoespinoso de los productos obtenidos por la 1er PCR1 y la 3° PCR3,
- Ensamblaje de los 3 fragmentos por PCR con los cebadores GGT-KP1MB7 y GGT-KD2 para obtener un fragmento de 434 pb,
- Digestión del fragmento de 434 pb por DralIII+SpeI y recuperación de un fragmento de 408 pb por purificación y extracto nucleoespinoso,
- Ligación de dicho fragmento digerido en el vector CHK622-21 digerido para obtener el vector CHK622-21_138H11B_MB7 de 10325 pb,
- Cribado por PCR con los cebadores 5'1PLC y GGT-KP2 que da un amplicón de 133pb.

Clonación de las cadenas pesadas del anticuerpo 138H11 sin péptido señal

- Digestión del vector CHK622-21_138H11B por NheI y ApaI,
- Recuperación de un fragmento de 10316 pb por extracto nucleoespinoso,
- 1° PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-GP1 (tacagctcttgtagcgcgccaccatg) y GGT-GP2 (caccagctgcacttggcactgcacccctccaggatg) para obtener un fragmento de 97 pb,
- 2° PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-GP3 (caagtgcagctggtggagagcggcggaaccctggtgaag) y GGT-GApaI (gggggaacacggatgggcccttagtg) para obtener un fragmento de 400 pb,
- Purificación y extracto nucleoespinoso de los productos obtenidos por las dos PCR,
- Ensamblaje de los 3 fragmentos por PCR con los cebadores GGT-GP1 y GGT-GApaI para obtener un fragmento de 482 pb,
- Digestión del fragmento de 482 pb por NheI y ApaI y recuperación de un fragmento de 456 pb por purificación y extracto nucleoespinoso,
- Ligación de dicho fragmento digerido en el vector CHK622-21 digerido para obtener el vector HK622-21_138H11B de 10772 pb (figura 15),
- Cribado por PCR con los cebadores apropiados que da un amplicón de 604 pb.

Clonación de las cadenas pesadas del anticuerpo 138H11 con péptido señal MB7

- Digestión del vector CHK622-21_138H11B_MB7 por NheI y ApaI,
- Recuperación de un fragmento de 10304 pb por extracto nucleoespinoso,
- 1ª PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-GP1MB7 (tacagctcttgtagcgcgccaccatgcatggagctggatcttctctgctgctgtag) y GGT-GP2MB7 (caccagctgcacttggcgttggcgtggtgatgctcagcagcagcaggaagatc) para obtener un fragmento de 94 pb,
- 2° PCR de 15 ciclos utilizando los cebadores GGT-GP3 y GGT-GApaI para obtener un fragmento de 400 pb,
- Purificación y extracto nucleoespinoso de los productos obtenidos por la dos PCR,
- Ensamblaje de los 3 fragmentos por PCR con los cebadores GGT-GP1 y GGT-GApaI para obtener un fragmento de 479 pb,
- Digestión del fragmento de 479 pb por NheI y ApaI y recuperación de un fragmento de 453 pb por purificación y extracto nucleoespinoso,

- Ligación de dicho fragmento digerido en el vector CHK622-21 digerido para obtener el vector HK622-21_138H11B_MB7 de 10757 pb (figura 16),
- Cribado por PCR con los cebadores apropiados que da un amplicón de 601 pb.

5 **Clonación de las cadenas pesadas del anticuerpo 138H11 con péptido señal MB7 en el vector genérico E2-CDK9-U3-Gen**

- Digestión del vector E2-CDK9-U3-Gen (figura 17) por NheI y AseI
- Recuperación de un fragmento de 8928 pb por extracto nucleoespinoso
- 10 ➤ Digestión del vector HK622-21_138H11B_MB7 por NheI y AseI
- Recuperación de un fragmento de 1435 pb por extracto nucleoespinoso
- Ligación de dicho fragmento digerido en el vector E2-CDK9-U3-Gen digerido para obtener el vector E2-CDK9-U3-H138H11B_MB7
- Cribado por PCR con los cebadores apropiados que da un amplicón de 512 pb

15 **Clonación de las cadenas ligeras del anticuerpo 138H11 con péptido señal MB7 en el vector genérico E2-CDK9-U3-Gen**

- Digestión del vector E2-CDK9-U3-H138H11B_MB7 por SpeI y XbaI
- 20 ➤ Desfosforilación del vector digerido y recuperación de un fragmento de 10347 pb por extracto nucleoespinoso
- Digestión del vector HK622-21_138H11B_MB7 por SpeI y XbaI
- Recuperación de un fragmento de 709 pb por extracto nucleoespinoso
- 25 ➤ Ligación de dicho fragmento digerido en el vector E2-CDK9-U3-Gen digerido para obtener el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B_MB7 (figura 18)
- Cribado por PCR con los cebadores apropiados que da un amplicón de 407 pb

Ejemplo 15: Construcción del vector E2-CDK9-U3-pCI-neo-HK138H11B

30 El vector HK1358-4 (figura 19), en el que el intrón quimérico del pCI-neo está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

Clonación del intrón quimérico del pCI-neo en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7

35 El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Se obtienen 2 fragmentos de 7978 pb y 3088 pb por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón quimérico pCI-neo está amplificado a partir del vector CHK622-21 utilizando los cebadores P1pCiNeo-NheI (acagaggagagctaggaagatcaaggtacaagac) y P2p-pCI-neo-NheI (tacgcattgagctagctgtggagagaaaggcaaatg) que da un amplicón de 163 pb y los cebadores P1pCiNeo-SpeI (acagaggagaactaggaagatcaaggtacaagac) y P2p-pCI-neo-SpeI (cagccacagtactagctgtggagagaaaggcaaatg) que da un amplicón de 164 pb.

45 Las PCR son realizadas con la enzima KAPAHIIFI. Cada cebador está compuesto de 15 bases complementarias a la secuencia del vector E2-CDK9-U3-HK138H11B_MB7 a nivel del sitio de inserción y de una veintena de bases que pertenecen a la secuencia del intrón a reinsertar.

Se ha añadido una base suplementaria a fin de recrear el sitio de inserción.

50 El intrón quimérico pCI-neo se inserta en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido mediante el método IN-FUSION. El método IN-FUSION es un método descrito en el kit comercial de Ozyme (ref 639690).

55 Los dos fragmentos de 163 pb y 164 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-4. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores 5'1PLC/CHoptiREV que da un amplicón de 570 pb y los cebadores 5'PLC/GGT KD3 que da un amplicón de 387 pb.

Ejemplo 16: Construcción del vector E2-CDK9-U3-pEF

60 El vector HK1358-5 (figura 20), en el que el intrón EF1 α está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón EF1 α está amplificado a partir del vector K622-37EF utilizando los cebadores P1EF-NheI (ACAGAGGAGAGCTAGGTAAGTGCCGTGTGTGGTCC) y P2-

pEF-NheI (tggtggcggcgtactgctgaaatggaagaaaaaactttgaac) que da un amplicón de 969 pb y los cebadores P1pEF-SpeI (ACAGAGGAGAACTAGGTAAGTGCCGTGTGTGGTTCC) y P22-pEF-SpeI (tggtggcggcactagtctgaaatggaagaaaaaactttgaac) que da un amplicón de 970 pb.

5 El intrón EF1 α está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 969 pb y 970 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-5. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores eIF4g1-1/CHoptiREV que da un amplicón de 1534 pb y los cebadores eIF4g1-1/GGT KD3 que da un amplicón de 1351 pb.

Ejemplo 17: Construcción del vector E2-CDK9-U3-mROSA

15 El vector HK1358-8 (figura 21), en el que el intrón mROSA está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón mROSA está amplificado a partir del vector K622-37 mROSA utilizando los cebadores P1p-mROSA-NheI (acagaggagagctaggtaggggatcgggactctgg) y P22-hROSA-NheI (tggtggcggcgtactgctcaggagagaaagagaag) que da un amplicón de 381 pb y los cebadores P1pmROSA-SpeI (acagaggagaactaggtaggggatcgggactctgg) y P22-hROSA-SpeI (tggtggcggcactagtctcaggagagaaagagaag) que da un amplicón de 382 pb.

25 El intrón mROSA está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 381 pb y 382 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-8. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores eIF4g1-1/CHoptiREV que da un amplicón de 949 pb y los cebadores eIF4g1-1/GGT KD3 que da un amplicón de 765 pb.

Ejemplo 18: Construcción del vector E2-CDK9-U3-HTLV1

35 El vector HK1358-11 (figura 22), en el que el intrón 5'-LTR HTLV1 está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón HCLV-1 está amplificado a partir del vector K622-37 HTLV utilizando los cebadores P1htlv-NheI (acagaggagagctagggctcgcctctctctcac) y P22-htlv-NheI (tggtggcggcgtactgtaggtagggctcgcctctctcac) que da un amplicón de 318 pb y los cebadores P1htlv-SpeI (acagaggagaactaggtcgcctctctctcac) y P22-htlv-SpeI (tggtggcggcactagttaggtagggctcgcctctctcac) que da un amplicón de 318 pb.

45 El intrón 5'-LTR HTLV1 está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 318 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-11. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores 5'HTLV/CHoptiREV que da un amplicón de 519 pb y los cebadores 5'HTLV/GGT KD3 que da un amplicón de 702 pb.

Ejemplo 19: Construcción del vector E2-CDK9-U3-pEF-exon

55 El vector HK1358-10 (figura 23), en el que el intrón EF1 α con unas bases exónicas está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón EF1 α -exón está amplificado a partir del vector K622-37 EF utilizando los cebadores P12EF-NheI (ACAGAGGAGAGCTAGCGGGTTTGGCCGACAGAACACAG) y P22-pEF-NheI (TGGTGGCGGCGCTAGCTGAAATGGAAGAAAAAACTTTGAAC) que da un amplicón de 991 pb y los cebadores P12EF-SpeI (ACAGAGGAGAACTAGCGGGTTTGGCCGACAGAACACAG) y P22-pEF-SpeI (TGGTGGCGGCACTAGTCTGAAATGGAAGAAAAAACTTTGAAC) que da un amplicón de 992 pb.

65 El intrón EF1 α -exón está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 991 pb y 992 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-10. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores 5'EF/CHoptiREV que da un amplicón de 843 pb y los cebadores 5'EF1/GGT KD3 que da un amplicón de 1023 pb.

Ejemplo 20: Construcción del vector E2-CDK9-U3-hROSA

El vector HK1358-6 (figura 24), en el que el intrón hROSA está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón hROSA está amplificado a partir del vector K622-37hROSA utilizando P1hROSA-NheI (acagaggagagctaggtaggggagcggaactctggtg) y P22-hROSA-NheI (tggtggcggcgctagctgtcaggagagaaagagaag) que da un amplicón de 1247 pb y los cebadores P1hROSA-SpeI (acagaggagaactaggtaggggagcggaactctggtg) y P22-hROSA-SpeI (tggtggcggcgactagctgtcaggagagaaagagaag) que da un amplicón de 1248 pb.

El intrón hROSA está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 1247 pb y 1248 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-6. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores apropiados que da un amplicón de 1812 pb y los cebadores eIF4g1-1/GGT KD3 que da un amplicón de 1629 pb.

Ejemplo 21: Construcción del vector E2-CDK9-U3-UBC

El vector HK1358-9 (figura 25), en el que el intrón del gen ubiquitina está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7, se construye para la expresión en pools estable del anticuerpo quimérico anti-GGT 138H11_B en la línea YB2/0.

El vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 está digerido por NheI y SpeI. Dos fragmentos de 7978 pb y 3088 pb son obtenidos por extracto nucleoespinoso. El ácido nucleotídico del intrón UBC está amplificado a partir del vector K622-37UBC utilizando los cebadores P12UBC-NheI (ACAGAGGAGAGCTAGAGTTCCGTCCGACGCCGGGATTTG) y P22-UBC-NheI (tggtggcggcgctagCTAACAAAAAGCCAAAAACGGC) que da un amplicón de 906 pb y los cebadores P1UBC-SpeI (acagaggagaactaGTGAGTAGCGGGCTGCTGG) y P22-UBC-SpeI (tggtggcggcgactagCTAACAAAAAGCCAAAAACGGC) que da un amplicón de 906 pb.

El intrón ubiquitina está insertado en el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido por el método IN-FUSION.

Los dos fragmentos de 906 pb y 906 pb obtenidos por PCR, así como el vector E2-CDK9-U3-HK138H11B MB7 digerido son reunidos en una sola etapa para obtener el vector HK1358-6. La inserción del intrón en el vector se verifica por los cebadores apropiados que da un amplicón de 830 pb y los cebadores 5'UBC/GGT KD3 que da un amplicón de 1629 pb.

Ejemplo 22: Producción de 2 anticuerpos enteros, anti-GGT y anti-AMHR11, por los vectores que contienen la unidad de transcripción E2CDK9U3 con diferentes intrones

Los anticuerpos enteros anti-GGT (138H11B MB7) y anti-AMHR11 (3C23K) se han producido a partir de pools estables en YB2/0, respectivamente en medio con suero y sin suero, por los vectores en el contexto E2CDK9U3 respectivamente con el intrón EF1α con exón (EF), el intrón EF1α sin exón (EFss), el intrón ubiquitina, el intrón hROSA, el intrón mROSA, el intrón 5'LTR HTLV1, el intrón quimérico pCI-neo, el intrón β-actina o sin intrón. Los títulos en anticuerpos obtenidos con estos vectores son mostrados en las figuras 26 y 27.

La ganancia aportada por la estructura E2CDK9U3+intrón se estima por comparación con un vector de referencia que codifica para la misma IgG pero con una estructura de UT que comprende el LTR RSV + intrón pCIneo en lugar de la estructura E2CDK9U3+intrón.

La figura 26 ilustra la productividad del anticuerpo anti-GGT (138H11B) en el contexto E2CDK9U3 con diferentes intrones, en pool en medio con suero, en comparación con la referencia LTR RSV + intrón pCI neo. Muestra en particular que:

- la combinación E2CDK9U3 sin intrón adicional aporta ya una ganancia sustancial (x2,2) con respecto a LTR RSV + intrón pCI neo.

➤ todos los intrones ensayados aportan una ganancia suplementaria a la combinación E2CDK9U3: más modesta para los intrones beta-actina, pCIneo y HTLV, bastante importante para los intrones murino y humano ROSA, muy importantes para los intrones ubiquitina y EF (con o sin el pequeño exón en 5') que permite unas ganancias máximas de aproximadamente 6x con respecto a la referencia LTR RSV + intrón pCI neo.

La figura 27 muestra en particular que:

➤ La jerarquía global de los intrones en combinación con E2CDK9U3 está mantenida con respecto al ensayo con el anticuerpo anti-GGT. En particular, los intrones EF (con y sin exón) y ubiquitina son los más fuertes (aproximadamente x2 con respecto a la referencia LTR RSV + intrón pCI neo), el intrón mROSA guarda un efecto importante (x1,6). El intrón hROSA no se ha ensayado en este ensayo.

➤ Las ganancias con respecto a la referencia LTR RSV + intrón pCI neo son menos importantes en este ensayo sin causa identificada. La jerarquía de los intrones no está, no obstante, cuestionada y unos ensayos ulteriores, con el mismo anticuerpo a expresar y el mismo procedimiento en medio sin suero, han mostrado unas ganancias más elevadas y similares a las obtenidas en medio con suero (x5 para el intrón EFss; véase la figura 28).

Ejemplo 23: Producción de 3 anticuerpos diferentes en YB2/0, con y sin suero, por un vector que contiene la unidad de transcripción E2CDK9U3+EFss (o EF).

Las secuencias que codifican para 3 anticuerpos: anti-CD20 (R603), anti-GGT (138H11B MB7) y anti-AMHRII (3C23K) se han integrado en un vector que contienen la unidad de transcripción E2CDK9U3+EFss. Estos vectores, así como sus vectores homologos salvo que la unidad de transcripción está bajo el control del LTR RSV+intrón pCI neo (control de referencia) en lugar de E2CDK9U3+EFss, se han expresado en pool, con y sin suero para anti-CD20 y anti-AMHRII, con suero para anti-GGT, en transfecciones independientes.

La ganancia aportado por la estructura E2CDK9U3+intrón EF se estima por comparación con el vector de referencia que codifica para la misma IgG pero con una estructura de UT que comprende el LTR RSV + intrón pCIneo en lugar de la estructura E2CDK9U3+intrón EF.

La figura 28 ilustra la productividad de los 3 anticuerpos anti-GGT (138H11B), anti-AMHRII (3C23K) y anti-CD20 (R603) en el contexto E2CDK9U3 + intrón EFss, en comparación con la referencia LTR RSV + intrón pCI neo.

Muestra en particular que la combinación E2CDK9U3+intrón EFss aporta siempre una ganancia significativa con respecto a LTR RSV + intrón pCI neo: de 4,6 a 6,1x para los 3 anticuerpos en medio con suero. En medio sin suero, para los 2 anticuerpos ensayados, los resultados son más variables pero muestran también un efecto importante de la combinación E2CDK9U3+intrón EFss (la ganancia más baja de 2x es la ya mostrada en la figura 27).

Ejemplo 24: Comparación de los intrones en asociación con el LTR RSV

Los intrones a ensayar (Bact (β-actina), EF1α, mROSA, hROSA, 5'-LTR HTLV1, ubc (ubiquitina) son insertados en el vector de expresión K622_37, que comprende el LTR RSV, para producir la cadena ligera kappa del anticuerpo T125. La ganancia de productividad de los vectores así construidos se compara con la de los vectores de referencia RSV_int_KT125_2STP y RSV_T125_K2.

Los resultados obtenidos a partir de 3 transfecciones realizadas sobre 3 semanas diferentes son ilustrados en la figura 29 y permiten observar unas diferencias significativas entre los intrones.

Una comparación múltiple se realiza para las medias (ng/ml) de producción de cadena ligera de Ig obtenidas con los diferentes intrones en la línea CHO-S (Tabla 1). El método actualmente utilizado para discriminar entre las medias es el procedimiento de las diferencias significativas mínimas de Fisher (LSD). Se efectúan unos ensayos de las extensiones múltiples con el método 95,0% LSD. Estos pares tienen diferencias estadísticamente significativas a nivel de confianza del 95,0%.

Tabla 1

	<i>Efectivo</i>	<i>Media</i>	<i>Grupo homogéneo</i>
RSV_int_KT125_2STP	18	25506,3	X
K622_37_HTLV	18	26511,3	X
K622_37_Ubc	18	28790,0	XX
K622_37_Bact	17	31992,3	XX
K622_37_hROSA	18	33561,0	X
RSV_T125_K2	16	34362,8	X
K622_37_mROSA	15	38874,8	X

K622_37_EF	14	44104,4	X

Se identifican cinco grupos homogéneos utilizando unas columnas de X. El intrón EF1 α es significativamente el más eficaz. En segunda posición se sitúa el intrón mROSA. Los otros intrones no tienen efecto positivo en asociación con el LTR RSV.

5 **Ejemplo 25: Comparación de las unidades de transcripción en los contextos E2-CDK9-U3 y LTR RSV**

10 Las diferentes unidades de transcripción a ensayar son ensayadas para la producción de la cadena ligera kappa del anticuerpo T125. La ganancia de productividad de los vectores así construidos se compara con la de los vectores de referencia pRep4KT125 y RSV_T125_K2.

Los resultados obtenidos a partir de 3 transfecciones realizadas en 3 semanas diferentes son ilustrados en la figura 30 y permiten observar unas diferencias significativas entre las asociaciones ensayadas.

15 Se realiza una comparación múltiple para las medias (ng/ml) de producción de cadena ligera obtenidas con las diferentes asociaciones en la línea CHO-S (Tabla 2). El método actualmente utilizado para discriminar entre los medios es el procedimiento de las diferencias significativas mínimas de Fisher (LSD). Se efectúan unos ensayos de extensiones múltiples con el método 95,0% LSD. Estos pares tienen diferencias estadísticamente significativas a nivel de confianza del 95,0%.

20

Tabla 2

	<i>Efectivo</i>	<i>Media</i>	<i>Grupo homogéneo</i>
RSVT125K2	12	10940,2	X
E2CDK9U3 hRosa	12	15847,6	X
K622_37 hRosa	12	23340,0	X
pRep4KT125	12	23843,2	X
E2CDK9U3	12	31903,9	X
K622_37 mRosa	12	35041,1	X
E2CDK9U3 mRosa	12	40688,4	X
K622_37 EF	12	41708,2	X
E2CDK9U3 EF	12	51907,2	X

Se identifican cinco grupos que utilizan unas columnas de X.

25 La asociación de E2-CDK9-U3 con el intrón EF1 α es significativamente la más eficaz. En el contexto E2-CDK9-U3, el intrón EF1 α aporta así una ganancia del 63%.

Las asociaciones LTR RSV con intrón EF y E2-CDK9-U3 con intrón mROSA son también significativamente muy eficaces.

30 En una menor medida, las otras asociaciones ensayadas son más eficaces que la referencia RSV T125 K2.

35 **Ejemplo 26: Producción del anticuerpo anti-Rh(D) entero (HK) por unos vectores que contienen E2CDK9U3 en las células CHO-S**

Los anticuerpos anti-Rh(D) enteros (HK) son producidos respectivamente en las células CHO-S transfectadas por los vectores que contienen una unidad de transcripción de estructura E2-CDK9-U3 y en las células CHO-S transfectadas por los vectores que contienen una unidad de transcripción de estructura RSV-intrón pCineo (vector de referencia).

40 La tabla 3 siguiente muestra los resultados de determinación de los anticuerpos anti-Rh(D) enteros producidos por unos pools de células transfectadas por el vector HK463-18 o por el vector HK E2-CDK9-U3. La figura 31 ilustra estos resultados.

45 Tabla 3: F6-2= pool procedente de transfección con HK463-18, F11-2 = pool procedente de transfección con HK E2-CDK9-U3

Pool	Medio	Tipo de producción discontinuo	Análisis IgG ELISA en ng/ml	Ganancia E2CDK9U3 / RSV+intrónpCI
F6-2	Freestyle + G418	D+12 F25	2324	
F11-2	Freestyle + G418	D+12 F25	14 193	6,1

La unidad de transcripción E2CDK9U3 permite obtener una ganancia de productividad del orden de 6 veces más elevada que la obtenida con el vector de referencia.

- 5 La tabla 4 siguiente muestra los resultados de determinación de los anticuerpos anti-Rh(D) enteros producidos por los mejores clones (procedentes del procedimiento de cribado descrito en materiales y métodos, sobre un número limitado de colonias) procedente de los pools anteriormente descritos, transfectados por el vector HK463-18 o por el vector HK E2-CDK9-U3. La figura 32 ilustra estos resultados.

Tabla 4

Nombre del vector	cultiflask	
	Prod. Max D-1 ELISA IgG en ng/ml	Prod. max ELISA IgG en ng/ml
HK 463-18	NA	<min
HK 463-18	NA	2071
H K 463-18	NA	2732
HK 463-18	NA	4110
HK 463-18	NA	16 937
HK-E2-CDK9-U3	NA	4061
HK-E2-CDK9-U3	NA	10 585
HK-E2-CDK9-U3	6863	13 235
HK-E2-CDK9-U3	13389	14221
HK-E2-CDK9-U3	21 318	20 203
HK-E2-CDK9-U3	29 860	33 069
HK-E2-CDK9-U3	37611	33 402
HK-E2-CDK9-U3	NA	36 830
HK-E2-CDK9-U3	NA	43 851
HK-E2-CDK9-U3	NA	47 315
HK-E2-CDK9-U3	58 007	58 007
HK-E2-CDK9-U3	47 056	60 304
HK-E2-CDK9-U3	61 902	74233

- 10 **Ejemplo 27: Producción de la cadena kappa T125 en las células YB2/0**

Se ha expresado la cadena kappa T125 en la línea YB2/0 transfectada transitoriamente por diferentes vectores que contienen diferentes construcciones de unidad de transcripción según la presente invención. Las construcciones de unidad de transcripción ensayadas, así como los resultados de expresión obtenidos son mostrados en la figura 33.

- 15 **Ejemplo 28: Producción del anticuerpo anti-Rh(D) entero (HK) por unos vectores que contienen E2CDK9U3 en las células YB2/0**

20 Los anticuerpos anti-Rh(D) enteros (HK) son producidos respectivamente en las células YB2/0 en transfección estable por los vectores que contienen una unidad de transcripción de estructura E2-CDK9-U3 o por los vectores que contienen una unidad de transcripción de estructura RSV-intrón pCineo (vector de referencia). El resultado de expresión del anticuerpo anti-Rh(D) en µg/ml se muestra en la figura 34.

- 25 **Ejemplo 29: Producción del anticuerpo anti-CD71 entero (H7) en las células YB2/0 por unos vectores que contienen E2CDK9U3**

30 Los anticuerpos anti-CD71 son producidos respectivamente en las células YB2/0 transfectadas por un vector que contiene la unidad de transcripción E2-CDK9-U3 y el intrón EF o por el vector de referencia que contiene RSV-intrón pCineo. El resultado de expresión del anticuerpo anti-CD71 en µg/ml se muestra en la figura 35.

LISTADO DE SECUENCIAS

<110> LFB BIOTECHNOLOGIES

- 35 <120> UNIDADES DE TRANSCRIPCIÓN Y SU UTILIZACIÓN EN VECTORES DE EXPRESIÓN

<130> WOB 11 CO LFB UTRA

<150> FR1159864

<151> 2011-10-28

ES 2 619 407 T3

<160> 71

<170> PatentIn version 3.5

5 <210> 1

<211> 306

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

10 <223> CMV

<400> 1

```
gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgccagtc      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgcctatta      300
ccatgg                                           306
```

<210> 2

15 <211> 352

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> CDK9

20 <400> 2

```
catgcagcgg gacgcgccac cccgagcccc agctccggcg ccccggtccc ccgcgcccc      60
gatcggggcc gccgctagta gtggcggcgg cggaggcggg ggcagcggcg gcggcggcgg      120
aggcgctctt gcagctccgg ctccccctgg cctctcggga actacaagtc ccagggggcc      180
tggcgttggg cggcgggcgg aagaggcggg gtcggcgccg cgaggccgga agtggccgtg      240
gaggcggaa gggcgcggcc ggggagggc ctggagtgcg gcggcggcgg gaccgggagc      300
aggagcggcg gcagcagcga ctgggggcgg cggcggcgcg ttggaggcgg cc           352
```

<210> 3

<211> 267

25 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<220>

<223> U1

<400> 3

```

ggctcgcatc tctccttcac gcgcccgcgc ccctacctga ggccgcatc cagcccggtt      60
gagtcgcggt ctgcgcctc cgcctgtgg tgctcctga actgcgtccg ccgtctaggt      120
aagtttaaag ctcaggctga gaccgggcct ttgtccggcg ctcccttga gcctacctag      180
actcagccgg ctctccacgc tttgcctgac cctgcttgct caactctacg tctttgtttc      240
gttttctggt ctgcgcctt acagatc      267
    
```

5

<210> 4

<211> 653

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

10

<220>

<223> U2

<400> 4

```

cagagtaatg acatggttcc ttccatcctc caaagggtgac caataatagt ttgtaagtat      60
cattatgaac taatgaattt tcaacatatt tgatatatct caatccattg ccctcattgt      120
tcttatcgat atttgagttg gctcactttg ccagtaagag tctattcaaa ttggcttctg      180
agtccatttg acacaacacc tttgatcttt gacagtttcc ttggttttag gtgctagatg      240
atctctcagg ctcaccttag acatttctct ccacagactt agaatcagcc atttctctaa      300
ggaccctgat tccatttcat gagaaatgat agagaccaca atcaaaacaa gtcctgaatt      360
tatactgata ttttcaattc aaattaaaga tgagggtttt gctaaatttt tttgagttta      420
tatttgatg tcttatgctg aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa ttattcattt      480
gatgggtaaa tattttaggg cagattcttt ggttttatag ccaagatacc ctgctgataa      540
agtcttctgg gagcaattat aagactggct tattttgaag ctttttaaaa aagacatcct      600
tacctgtttt aactgtagat tatattaact taaataggta cagcccacgc ttg      653
    
```

15

<210> 5

<211> 314

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

20

<223> U3

<400> 5

ES 2 619 407 T3

gctggtgggt agggatgagg gagggagggg cattgtgatg tacagggctg ctctgtgaga 60
 tcaaggtct ctaaggggtg ggagctgggg caggactac gagagcagcc agatgggctg 120
 aaagtggaac tcaaggggtt tctggcacct acctacctgc ttcccgtgg ggggtgggga 180

 gttggcccag agtcttaaga ttggggcagg gtggagaggt gggctcttcc tgcttcccac 240
 tcatcttata gctttctttc ccagatccg aattcgagat ccaaaccaag gaggaaagga 300
 tatcacagag gaga 314

- 5 <210> 6
- <211> 933
- <212> ADN
- <213> Secuencia artificial
- <220>

10 <223> U1U2

<400> 6
 ggctcgcac tctccttcac gggcccgcg ccctacctga ggccgccac cagcccggtt 60
 gagtgcggt ctgccgcctc ccgcctgtgg tgctcctga actgcgtccg ccgtctaggt 120
 aagtttaaag ctcaggtcga gaccgggctt ttgtccggcg ctcccttga gcctacctag 180
 actcagccgg ctctccacgc ttgacctgac cctgcttgc caactctacg tctttgtttc 240
 gttttctggt ctgcgccgtt acagatcact agtgtttaa cagagtaatg acatggttcc 300
 ttccatcctc caaaggtgac caataatagt ttgtaagtat cattatgaac taatgaattt 360
 tcaacatatt tgatatatt caatccattg ccacattgt tcttatcgat atttgagttg 420
 gctcactttg ccagtaagag tctattcaa ttggctctg agtccattg acacaacacc 480
 tttgatcttt gacagtttcc ttggttttag gtgctagatg atttctcagg ctcaccttag 540
 acatttctg ccacagactt agaatcagcc atttctctaa ggacctgat tccatttcat 600
 gagaaatgat agagaccaca atcaaaaca gtcatgaatt tatactgata ttttcaattc 660
 aaattaaaga tgaggttttt gctaaatttt ttgagttta tatttgatg tcttatgctg 720
 aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa ttattcattt gatgggtaaa tattttaggg 780
 ccgattcttt ggttttatag ccaagatacc ctgttgataa agtcttggg gagcaattat 840
 aagactggct tattttgaag ctttttaaaa aagacatcct tacctgtttt aactgtagat 900
 tatattaact taaatagga cagcccacgc ttg 933

- <210> 7
- 15 <211> 591
- <212> ADN
- <213> Secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<220>

<223> U1U3

<400> 7

```
ggctcgcatc tctccttcac gcgcccgcgc ccctacctga ggccgccatc cacgccggtt      60
gagtcgcggtt ctgcgcgcctc ccgcctgtgg tgcctcctga actgcgtccg ccgtctaggt      120
aagtttaaag ctcaggtcga gaccgggcct ttgtccggcg ctcccttgga gcctacctag      180

actcagccgg ctctccacgc ttgcctgac cctgcttgct caactctacg tctttgtttc      240
gttttctggt ctgcgcgcgtt acagatcact agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag      300
ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc tgtgagatca aggtctctt aagggtggga      360
gctggggcag ggactacgag agcagccaga tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct      420
ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg gtggggagtt ggcccagagt cttaagattg      480
gggcagggtg gagagggtgg ctcttcctgc ttcccactca tcttatagct ttctttcccc      540
agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag gaaaggatat cacagaggag a                591
```

<210> 8

<211> 977

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> U2U3

<400> 8

ES 2 619 407 T3

cagagtaatg acatggttcc ttccatcctc caaagggtgac caataatagt ttgtaagtat 60
cattatgaac taatgaattt tcaacatatt tgatatattt caatccattg ccatcattgt 120
tcttatogat atttgagttg gctcactttg ccagtaagag tctattcaaa ttggcttctg 180
agtccatttg acacaacacc tttgatcttt gacagtttcc ttggtttttag gtgctagatg 240
atctctcagg ctcaccttag acatttcctg ccacagactt agaatcagcc atctctctaa 300
ggaccctgat tccatttcat gagaaatgat agagaccaca atcaaaacaa gtcattgaatt 360
tatactgata ttttcaattc aaattaaaga tgaggttttt gctaaatttt tttgagttta 420
tatttgatg tcttatgctg aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa ttattcattt 480
gatgggtaaa tatttttaggg ccgattcttt ggttttatag ccaagatacc ctggtgataa 540
agtcttggtg gagcaattat aagactggct tattttgaag ctttttaaaa aagacatcct 600
tacctgtttt aactgtagat tatattaact taaataggta cagcccacgc ttgactagtt 660
aacgctggtg ggtagggatg agggagggag gggcattgtg atgtacaggg ctgctctgtg 720
agatcaaggg tctcttaagg gtgggagctg gggcagggac tacgagagca gccagatggg 780
ctgaaagtgg aactcaaggg gtttctggca cctacctacc tgcttcccgc tggggggtgg 840
ggagttggcc cagagtctta agattggggc aggggtggaga ggtgggctct tcctgcttcc 900
cactcatctt atagctttct tccccagat ccgaattcga gatccaaacc aaggaggaaa 960
ggatatcaca gaggaga 977

<210> 9

<211> 1257

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> U1U2U3

<400> 9

ES 2 619 407 T3

ggctcgcac tctccttcac gcgcccgcg ccctacctga ggccgccac caccgcggtt 60
gagtcgcggt ctgcgcctc ccgcctgtgg tgcctcctga actgcgtccg ccgtctaggt 120
aagtttaaag ctcaggtcga gaccgggcct ttgtccggcg ctcccttggg gcctacctag 180
actcagccgg ctctccacgc tttgcctgac cctgcttgct caactctacg tctttgtttc 240
gttttctggt ctgcgccgtt acagatcact agtgtttaaa cagagtaatg acatggttcc 300
ttccatcctc caaagggtgac caataatagt ttgtaagtat cattatgaac taatgaattt 360
tcaacatatt tgatatatt caatccattg ccatcattgt tcttatcgat atttgagttg 420
gctcactttg ccagtaagag tctattcaaa ttggcttctg agtccatttg acacaacacc 480
tttgatcttt gacagtttcc ttggttttag gtgctagatg atttctcagg ctcaccttag 540
acatttctg ccacagactt agaatcagcc atttctctaa ggaccctgat tccatttcat 600
gagaaatgat agagaccaca atcaaaacaa gtcatgaatt tatactgata ttttcaattc 660
aaattaaaga tgaggttttt gctaaatttt tttgagttta tatttgatg tcttatgctg 720
aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa ttattcattt gatgggtaaa tattttaggg 780
ccgattcttt ggttttatag ccaagatacc ctgttgataa agtcttggg gagcaattat 840
aagactggct tattttgaag ctttttaaaa aagacatcct tacctgtttt aactgtagat 900
tatattaact taaataggta cagcccacgc ttgactagtt aacgctggtg ggtagggatg 960
agggagggag gggcattgtg atgtacaggg ctgctctgtg agatcaaggg tctcttaagg 1020
gtgggagctg gggcagggac tacgagagca gccagatggg ctgaaagtgg aactcaaggg 1080
gtttctggca cctacctacc tgcttcccgc tggggggtgg ggagttggcc cagagtctta 1140
agattggggc aggggtggaga ggtgggctct tccctgcttcc cactcatctt atagctttct 1200
ttcccagat ccgaattcga gatccaaacc aaggaggaaa ggatatcaca gaggaga 1257

<210> 10

<211> 939

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> EF1A

<400> 10

gtaagtgccg tgtgtggttc ccgcccgcct ggctcttcta cgggttatgg cccttgcgtg 60
ccttgaatta ctccacctg gctgcagtac gtgattcttg atcccagct tcgggttggg 120
10 agtgggtggg agagttcgag gccttgcgct taaggagccc cttegcctcg tgcttgagtt 180

ES 2 619 407 T3

gaggcctggc ctgggcgctg gggccgccc gtgcgaatct ggtggcacct tcgcgcctgt 240
 ctgcctgctt tcgataagtc tctagccatt taaaattttt gatgacctgc tgcgacgctt 300
 tttttctggc aagatagtct tgtaaatgcg ggccaagatc tgcacactgg tatttcggtt 360
 tttggggccg cgggcggcga cggggcccgt gcgtcccagc gcacatgttc ggcgaggcgg 420
 ggcctgcgag cgcggccacc gagaatcggg cgggggtagt ctcaagctgg ccggcctgct 480
 ctggtgcctg gcctcgcgcc gccgtgtatc gcccgcctt gggcggcaag gctggcccgg 540
 tcggcaccag ttgcgtgagc ggaaagatgg ccgcttcccg gccctgctgc agggagctca 600
 aatggagga cgcggcgcctc gggagagcgg gcgggtgagt caccacaca aaggaaaagg 660
 gcctttccgt cctcagccgt cgcttcatgt gactccacgg agtaccgggc gccgtccagg 720
 cacctcgatt agttctcgag cttttggagt acgtcgtctt taggttgggg ggaggggttt 780
 tatgcgatgg agtttcccca cactgagtgg gtggagactg aagttaggcc agcttggcac 840
 ttgatgtaat tctccttggg atttgccctt tttgagttg gatcttggtt cattctcaag 900
 cctcagacag tggttcaaag ttttttctt ccatttcag 939

<210> 11

<211> 351

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> MROSA

<400> 11

gtaggggatc gggactctgg cgggagggcg gcttggtgcg tttgcgggga tgggcggccg 60
 cggcagggcc tccgagcgtg gtggagccgt tctgtgagac agccgggtac gagtcgtgac 120
 gctggaaggg gcaagcgggt ggtgggcagg aatgcgggtcc gccctgcagc aaccggaggg 180
 ggagggagaa gggagcggaa aagtctccac cggacgcggc catggctcgg gggggggggg 240
 gcagcggagg agcgttccg gccgacgtct cgtcgtgat tggcttcttt tcctcccgcc 300
 10 gtgtgtgaaa acacaattgt actaaccttc ttctctttcc tctcctgaca g 351

<210> 12

<211> 288

<212> ADN

15 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> HTLV-1

<400> 12

ES 2 619 407 T3

ggctcgcata tctccttcac ggcgccgccg ccctacctga ggcggccatc cacgcccgtt 60
 gagtcgcggt ctgccgcctc ccgcctgtgg tgcctcctga actgcgtccg ccgtctaggt 120

aagtttaaag ctcaggtcga gaccgggcct ttgtccggcg ctcccttgga gcctacctag 180
 actcagccgg ctctccacgc ttgacctgac cctgcttgct caactctacg tctttgttcc 240
 gttttctggt ctgcgccgtt acagatccaa gctgtgaccg gcgcctac 288

- 5 <210> 13
- <211> 133
- <212> ADN
- <213> Secuencia artificial
- <220>

10 <223> PCINEO

<400> 13

gtaagtatca aggttacaag acaggtttaa ggagaccaat agaaactggg cttgtcgaga 60
 cagagaagac tcttgcggtt ctgataggca cctattggtc ttactgacat ccactttgcc 120
 tttctctoca cag 133

- <210> 14
- 15 <211> 951
- <212> ADN
- <213> Secuencia artificial
- <220>
- <223> secuencia artificial

20 <400> 14

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggetgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc cctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcttggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggtctccc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtcttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat c 951

<210> 15

<211> 1336

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 15

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc cctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcttggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcagact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacagagta atgacatggt tccttccatc ctccaaaggt 720
 gaccaataat agtttgtaag tatcattatg aactaatgaa ttttcaacat atttgatata 780
 tttcaatcca ttgccatcat tgttcttacc gatatttgag ttggctcact ttgccagtaa 840
 gagtctatcc aaattggcct ctgagtccat ttgacacaac acctttgatc tttgacagtt 900
 tccttggttt taggtgctag atgatttctc aggtcacct tagacatttc ctgccacaga 960
 cttagaatca gccatttctc taaggaccct gattccattt catgagaaat gatagagacc 1020
 acaatcaaaa caagtcatga atttatactg atattttcaa ttcaaattaa agatgaggtt 1080
 tttgctaaat ttttttgagt ttatatttgt atgtcttatg ctgaaaaatc ttgtttccta 1140
 attagtaaca taattattca tttgatgggt aaatatttta gggccgattc tttggtttta 1200
 tagccaagat accctgttga taaagtcttg tgggagcaat tataagactg gcttattttg 1260
 aagcttttta aaaaagacat ccttacctgt tttaactgta gattatatta acttaaatag 1320
 gtacagccca cgcttg 1336

<210> 16

<211> 997

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 16

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtaagcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctcggct ccccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcgggcggaa gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tgcccggtga ggcggaagtg gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcagct gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aacgctggtg ggtagggatg agggaggag gggcattgtg 720
 atgtacaggc ctgctctgtg agatcaaggg tctcttaagg gtgggagctg gggcagggac 780
 tacgagagca gccagatggg ctgaaagtgg aactcaaggg gtttctggca cctacctacc 840
 tgcttcccgc tgggggtggt ggagttggcc cagagtctta agattggggc aggggtggaga 900
 ggtggctct tctgcttcc cactcatctt atagctttct ttcccagat ccgaattcga 960
 gatccaaacc aaggaggaaa ggatatacaca gaggaga 997

<210> 17

<211> 1617

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 17

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtaagcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctcggct ccccctggcc tctcggaac 480

10

ES 2 619 407 T3

tacaagtccc agggggcctg gcggtgggcg gcgggaggaa gaggcggggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcgcgggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg gcggcgcggt 660
 ggagcgggcc ggtaccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac 720
 ctgagggcgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggttaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgtttcc tgttctgccc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020
 gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccctgggt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag 1320
 aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatcc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttg 1617

<210> 18

<211> 1275

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 18

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 10 ccggtccccc gcgccccga tcggggccgc cgetagtagt ggcggcgcg gaggcggggg 420

ES 2 619 407 T3

cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccoctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgcc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgag tccgcctct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgt 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagttaa 960
 cgctggtggg tagggatgag ggagggagg gcattgtgat gtacaggct gctctgtgag 1020
 atcaagggtc tcttaagggt gggagctgg gcagggacta cgagagcagc cagatggct 1080
 gaaagtggaa ctcaaggggt ttctggcacc tacctacctg cttcccctg gggggtgggg 1140
 agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc ctgcttccca 1200
 ctcatcttat agctttcttt cccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa ggagaaagg 1260
 atatcacaga ggaga 1275

<210> 19

<211> 1660

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 19

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggtgacc gcccacgac cccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttcc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatctacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg gtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cgagcccag ctccgcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tggggccgc cgtagtagt ggcggcggcg gaggcgggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccoctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacagagta atgacatggt tccttccatc ctccaaagg 720

10

ES 2 619 407 T3

gaccaataat agtttgtaag taccattatg aactaatgaa ttttcaacat atttgatata 780
 tttcaatcca ttgccatcat tgttcttata gatatttgag ttggctcact ttgccagtaa 840
 gagtctattc aaattggcct ctgagtccat ttgacacaac acctttgatc tttgacagtt 900
 tccttggttt taggtgctag atgatttctc aggctcacct tagacatttc ctgccacaga 960
 cttagaatca gccatttctc taaggaccct gattccattt catgagaaat gatagagacc 1020
 acaatcaaaa caagtcacga atttatactg atattttcaa ttcaaattaa agatgaggtt 1080
 tttgctaaat ttttttgagt ttatatttgt atgtcttatg ctgaaaaatc ttgtttccta 1140
 attagtaaca taattattca tttgatgggt aaatatttta gggccgattc tttggtttta 1200
 tagccaagat acctgttga taaagtcttg tgggagcaat tataagactg gcttattttg 1260
 aagcttttta aaaaagacat ccttacctgt tttaactgta gattatatta acttaaatag 1320
 gtacagccca cgcttgacta gttaacgctg gtgggtaggg atgagggagg gaggggcatt 1380
 gtgatgtaca gggctgctct gtgagatcaa gggctctotta aggggtgggag ctggggcagg 1440
 gactacgaga gcagccagat gggctgaaag tggaaactca ggggtttctg gcacctacct 1500
 acctgcttcc cgctgggggg tggggagtgt gccacagatc ttaagattgg ggcaggggtg 1560
 agaggtgggc tcttctgct tccactcat cttatagctt tctttccca gatccgaatt 1620
 cgagatccaa accaaggagg aaaggatata acagaggaga 1660

<210> 20

<211> 1941

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 20

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgccagc 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgccgcg 540
 10 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600

ES 2 619 407 T3

ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgccc gccgccctac 720
 ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccg cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttghaa 1020
 gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca ttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcatg 1320
 aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctggtg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc 1680
 tgtgagatca agggctctctt aaggggtgga gctggggcag ggactacgag agcagccaga 1740
 tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg 1800
 gtggggagtt ggcccagagt cttaagattg gggcagggtg gagaggtggg ctcttcctgc 1860
 ttcccactca tcttatagct ttctttcccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag 1920
 gaaaggatat cacagaggag a 1941

<210> 21

<211> 1643

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 21

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 10 caagtaacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgccctg 240

ES 2 619 407 T3

acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggccggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggccggcgag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtgggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcccg 540
 aggccggaag tggcctgga ggccggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcgggg cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg gcggcgcggt 660
 ggagcgggcc ggatccacta gtcgggtttg ccgccagaac acaggtaatg gccgtgtgtg 720
 gttcccgcgg gcctggcctc tttacgggtt atggcccttg cgtgccttga attacttcca 780
 cctggctgca gtacgtgatt cttgatcccg agctccgggt tggagtggg tgggagagtt 840
 cgaggccttg cgcttaagga gcccttcgc ctctgcttg agttgagcc tggcctgggc 900
 gctggggccg ccgcgtgcga atctgggtggc accttcgcg ctgtctcgt gctttcgata 960
 agtctctagc catttaaaat ttttgatgac ctgtcgcgac gctttttttc tggcaagata 1020
 gtcttgtaa tgcgggcca gatctgcaca ctggtatttc ggtttttgg gccgcggcg 1080
 gcgacggggc ccgtgcgtcc cagcgcacat gttcggcgag gcggggcctg cgagcgcggc 1140
 caccgagaat cggacggggg tagtctcaag ctggccggcc tgctctggtg cctggcctcg 1200
 cgccgccgtg tatcgcctcg ccctgggcgg caaggctggc ccggtcggca ccagttgcgt 1260
 gagcgaaag atggccgctt cccggccctg ctgcaggag ctcaaatgg aggacgcggc 1320
 gctcgggaga gcgggggggt gagtcacca cacaaaggaa aagggcctt ccgtcctcag 1380
 ccgtcgttc atgtgactcc acggagtacc gggcgcgtc caggcacctc gattagtct 1440
 cgagcttttg gagtacgtcg tcttaggtt ggggggagg gttttatgcg atggagtctc 1500
 cccacactga gtgggtggag actgaagta ggccagcttg gcaactgatg taattctct 1560
 tggaatattg cctttttgag tttgatctt ggttcattct caagcctcag acagtggctc 1620
 aaagtttttt tcttccattt cag 1643

<210> 22

<211> 1051

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 22

gcgttacata acttacggta aatggccccg ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 10 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120

ES 2 619 407 T3

aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagc 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcgggg 420
 cagcggcggc ggcgggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcgga cccggagcag gagcggcgc agcagcagc gggggcgcg gcggcgctt 660
 ggagcgggc ggatccacta gtccagagag cctcggctag gtaggggatc gggactctgg 720
 cgggagggcg gcttggcg tttgcggga tggcgccgc cggcagccc tccgagcgtg 780
 gtggagccgt tctgtgagac agccgggtac gactcgtgac gctggaagg gcaagcgggt 840
 ggtggcagc aatgcggtcc gccctgcagc aaccggagg ggagggagaa gggagcggaa 900
 aagtctccac cggacgcggc catggctcgg ggggggggg gcagcggag agcgcttccg 960
 gccgacgtct cgtcgtgat tggcttctt tcctcccgcc gtgtgtgaaa acacaattgt 1020
 actaaccttc ttctcttcc tctcctgaca g 1051

<210> 23

<211> 978

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 23

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagc 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcgggg 420
 cagcggcggc ggcgggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 10 ggcggcgga cccggagcag gagcggcgc agcagcagc gggggcgcg gcggcgctt 660

ES 2 619 407 T3

ggaggcggcc ggatccacta gtcttcgagg ggctcgcata tctccttcac gcgcccgcg 720
 ccctacctga ggccgccatc cacgccgggtt gaggcgcggt ctgccgcctc ccgcctgtgg 780
 tgcctcctga actgcgtccg ccgtctaggt aagtttaaag ctccaggcga gaccgggctt 840
 ttgtccggcg ctcccttgga gcctacctag actcagccgg ctctccacgc tttgcctgac 900
 cctgcttgcct caactctacg tctttgtttc gttttctggt ctggcccggt acagatccaa 960
 gctgtgaccg gcgcctac 978

<210> 24

<211> 844

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 24

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcggc 360
 ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggccggcggc gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggccggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggccggaagt gcgcggccgc ggaggggctt ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggaggcggcc ggatccacta gtgcagaagt tggctcgtgag gcaactggca ggtaagtatc 720
 aaggttacia gacaggttta aggagaccaa tagaaactgg gcttctcgag acagagaaga 780
 ctcttgcgtt tctgataggc acctattggt cttactgaca tccactttgc ctttctctcc 840
 10 acag 844

<210> 25

<211> 1918

<212> ADN

15 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<400> 25

gcgttacata	acttacggta	aatggcccgc	ctggetgacc	gcccacacgac	ccccgcccat	60
tgacgtcaat	aatgacgtat	gttcccatag	taacgccaat	agggactttc	cattgacgtc	120
aatgggtgga	gtatttacgg	taaactgccc	acttggcagt	acatcaagtg	tatcatatgc	180
caagtacgcc	ccctattgac	gtcaatgacg	gtaaattggcc	cgcttgccat	tatgcccaagt	240
acatgacctt	atgggacttt	cctacttggc	agtacatcta	cgtattagtc	atcgctatta	300
ccatggcccc	ggtcgcgaca	tgcagcggga	cgcgccaccc	cgagccccag	ctccggcgcc	360
ccggctcccc	gcgccccca	tggggccgc	cgctagtagt	ggcggcggcg	gaggcggggg	420
cagcggcggc	ggcggcggag	gcgcctctgc	agctccggct	ccccctggcc	tctcggaac	480
tacaagtccc	agggggcctg	gcggtgggcg	gcgggcggaa	gaggcggggt	cggcgcgcgc	540
aggccggaag	tggccgtgga	ggcggaaagt	gcgcggccgc	ggagggccct	ggagtgcggc	600
ggcggcggga	cccggagcag	gagcggcggc	agcagcagct	gggggcggcg	gcggcgcggt	660
ggagggcgcc	ggatccggtt	aaacggctcg	catctctcct	tcacgcgccc	gccgcctac	720
ctgaggccgc	catccacgcc	ggttgagtcg	cgttctgccg	cctcccgcct	gtggtgcctc	780
ctgaactgcg	tccgcgctct	aggtaagttt	aaagctcagg	tcgagaccgg	gcctttgtcc	840
ggcgctccct	tggagcctac	ctagactcag	ccggctctcc	acgctttgcc	tgaccctgct	900
tgctcaactc	tacgtctttg	tttcgttttc	tgttctgcgc	cgttacagat	cactagtcgg	960
gtttgccgcc	agaacacagg	taagtccgt	gtgtggttcc	cgcgggcctg	gcctctttac	1020
gggttatggc	ccttgctgtc	cttgaattac	ttccacctgg	ctgcagtagc	tgattcttga	1080
tcccagactt	cggttgga	gtgggtggga	gagttcgagg	ccttgcgctt	aaggagcccc	1140
ttcgctcgt	gcttgagttg	aggcctggcc	tgggcgctgg	ggccgcgcgc	tcggaatctg	1200
gtggcacctt	cgcgctgtc	tcgctgcttt	cgataagtct	ctagccatth	aaaatthttg	1260
atgacctgct	gcgacgcttt	ttttctggca	agatagtctt	gtaaattcgg	gccaagatct	1320
gcacactggt	atthcggttt	ttggggccgc	gggcggcgc	ggggccccgt	cgthccagcg	1380
cacatgttcg	gcgaggcggg	gcctgcgagc	gcggccaccg	agaatcggac	gggggtagtc	1440
tcaagctggc	cgccctgctc	tgggtgctgg	cctcgcgcgc	ccgtgtatcg	ccccgccctg	1500
ggcggcaagg	ctggccccgt	cggcaccagt	tgcgtgagcg	gaaagatggc	cgcttccccg	1560
ccctgctgca	gggagctcaa	aatggaggac	gcggcgcctc	ggagagcggg	cggtgagtc	1620
accacacaaa	agggaaaagg	cctthccgtc	ctcagccgtc	gcttcatgtg	actccacgga	1680
gtaccggggc	ccgtccaggc	acctcgatta	gttctcgagc	ttttggagta	cgctgctttt	1740
aggttggggg	gagggttttt	atgcgatgga	gtttccccac	actgagtggg	tgagactga	1800
agttaggcca	gcttggcaact	tgatgtaatt	ctccttggaa	tttgcctttt	ttgagtttgg	1860
atcttggttc	attctcaagc	ctcagacagt	ggttcaaagt	ttttttcttc	catttcag	1918

<210> 26

5 <211> 1326

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 26

```

gcggttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcctggcat tatgccagt      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta      300
ccatggcccg gtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc      360
ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg      420
cagcggcggc ggcggcgag gcgcctctgc agctccggct cccoctggcc tctcggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcggggt cggcgccgcg      540
aggccggaag tggcctgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc      600
ggcggcgga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg gcgcgcggtt      660
ggagcgggcc ggtaccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac      720
ctgagccgc catccacgcc ggttgagtc cgttctgcc cctcccgcct gtggtgectc      780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc      840
ggcgtccct tggagcctac ctagactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct      900
tgctcaactc tacgtctttt tttcgtttc tgttctgccc cgttacagat cactagtcca      960
gagagcctcg gctaggtagg ggatcgggac tctggcggga gggcggttg gtgcgtttgc     1020
gggatgggg gcgcgggca ggccctccga gcgtggtgga gccgttctgt gagacagccg     1080
ggtacgagtc gtgacgctgg aaggggcaag cgggtggtgg gcaggaatgc ggtccgccct     1140
gcagcaaccg gagggggagg gagaaggag cggaaaagtc tccaccggac gcggccatgg     1200
ctcggggggg ggggggcagc ggaggagcgc ttccggccga cgtctcgtcg ctgattggct     1260
tcttttctc ccgccgtgtg tgaaaacaca attgtactaa ccttctctc tttctctcc     1320
tgacag                                           1326
    
```

5

<210> 27

<211> 1263

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

10

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 27

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaagtggc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tggggccgc cgtagtagt ggccggcg gaggcgggg 420
 cagcggcg gcggcgagg ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggcgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcagc gggggcggc gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccacta ggatccgtt aaacggctc catctctct tcacgcgcc 720
 gccgccctac ctgagggcgc catccacgcc ggttgagtc cgttctgcc cctcccgcct 780
 gtggtgcctc ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagtt aaagctcagg tcgagaccgg 840
 gcctttgtcc ggcgtccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc 900
 tgaccctgct tgctcaactc tacgtctttg tttcgtttc tgttctggc cgttacagat 960
 cactagtctt cgaggggctc gcatctctcc ttcacgcgcc cgcgcccta cctgagggcc 1020
 ccatccacgc cggttgagtc gcgttctgcc gcctccgcc tgtggtgcct cctgaactgc 1080
 gtccgccgtc taggtaagtt taaagctcag gtcgagacc ggccctttgc cggcgtccc 1140
 ttggagccta cctagactca gccggctctc cacgctttgc ctgaccctgc ttgctcaact 1200
 ctacgtcttt gtttggtttt ctggtctgcg ccgttacaga tccaagctgt gaccggcgcc 1260
 tac 1263

<210> 28

<211> 1119

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 28

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 10 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180

ES 2 619 407 T3

caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcttggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccca tggggccgc cgctagtagt ggccggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcagact gggggcggcg gcggcgctt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttagtcg cgttctgcg cctccgcct gtggtgctc 780
 ctgaactgag tccgcctct aggttaagtt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtcttt tttcgtttc tgttctgcg cgttacagat cactagtga 960
 gaagtggtc gtgaggcact ggcaggtaa gtatcaagg tacaagacag gtttaaggag 1020
 accaatagaa actgggcttg tcgagacaga gaagactctt gcgtttctga taggcaccta 1080
 ttggtcttac tgacatccac tttgccttc tctccacag 1119

<210> 29

<211> 2309

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 29

gcgttacata acttacggt aatggcccgc ctggtgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgct 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcttggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccca tggggccgc cgctagtagt ggccggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgccgcg 540
 10 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600

ES 2 619 407 T3

ggcgggcgga cccggagcag gagcgggcgc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatocacta gtgtttaaac agagtaatga catggttcct tccatcctcc 720
 aaagtgacc aataatagtt tgtaagtatc attatgaact aatgaatttt caacatattt 780
 gatataattc aatccattgc catcattgtt cttatcgata tttgagttgg ctcactttgc 840
 cagtaagagt ctattcaaat tggcttctga gtccatttga cacaacacct ttgatctttg 900
 acagtttctt tggttttagg tgctagatga tttctcaggc tcaccttaga catttctgc 960
 cacagactta gaatcagcca tttctctaag gacctgatt ccatttcatg agaaatgata 1020
 gagaccacaa tcaaaacaag tcatgaattt atactgatat tttcaattca aattaaagat 1080
 gaggtttttg ctaaattttt ttgagtttat atttgtatgt cttatgctga aaaatcttgt 1140
 ttctaatta gtaacataat tattcatttg atgggtaa attttagggc cgattctttg 1200
 gttttatagc caagatacc tggtgataaa gtcttgggg agcaattata agactggctt 1260
 attttgaagc tttttaaaaa agacatcctt acctgtttta actgtagatt atattaactt 1320
 aataggtac agcccagct tgactagtcg ggtttgccg cagaacacag gtaagtgcg 1380
 tgtgtggttc ccgcgggcct ggcctcttta cgggttatgg cccttgctg ccttgaatta 1440
 cttccacctg gctgcagtac gtgattcttg atcccagct tcgggttga agtgggtggg 1500
 agagttcgag gccttgctc taaggagccc ctgcgctc tgcttgagtt gaggcctggc 1560
 ctgggcgctg gggccgccgc gtgcgaatct ggtggcacct tcgcccctgt ctgctgctt 1620
 tcgataagtc tctagccatt taaaattttt gatgacctgc tcgacgctt tttttctggc 1680
 aagatagtct tgtaaagtc ggccaagatc tgcacactgg tatttcggtt tttggggccg 1740
 cggcgggcga cggggcccgt gcgtcccagc gcacatgttc ggcgaggcgg ggccctgcgag 1800
 cgcggccacc gagaatcggc cgggggtagt ctcaagctgg ccggcctgct ctggtgcctg 1860
 gcctcgcgcc gccgtgtatc gccccgccct gggcggaag gctggcccgg tcggcaccag 1920
 ttgctgagc gaaagatgg ccgcttccc gacctgctgc agggagctca aatggagga 1980
 cgcggcgctc gggagagcgg ggggtgagt caccacaca aaggaaaagg gcctttccgt 2040
 cctcagcgt cgttcatgt gactccacgg agtaccggc gcctccagg cacctcgatt 2100
 agttctcgag cttttggagt acgtcgtct taggttgggg ggaggggtt tatgcatgg 2160
 agtttccca cactgagtg gtggagactg aagttaggcc agcttggcac ttgatgtaat 2220
 tctccttga atttgccctt tttgagttg gatcttggtt cattctcaag cctcagacag 2280
 tggttcaaag ttttttctt ccatttcag 2309

<210> 30

<211> 1717

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<400> 30

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgcccagt      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta      300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc      360
ccggtcccc cgcccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg      420
cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctcggct cccctggcc tctcgggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg      540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc      600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt      660
ggaggcggcc ggatccacta gtgtttaaac agagtaatga catggttctt tccatcctcc      720
aaaggtgacc aataatagtt tgtaagtatc attatgaact aatgaattht caacatattht      780
gatataattht aatccattgc catcattgtht cttatcgata thtgagthtg ctcactthtg      840
cagtaagagt ctattcaaat tggttctga gtccattga cacaacacct thgatctthg      900
acagthtctt tggththtag tgctagatga thtctcaggc tcacctaga cthtctctgc      960
cacagactta gaatcagcca thtctctaag gacctgatt ccatttcatg agaatgata      1020
gagaccacaa tcaaaacaag tcatgaattht atactgatat thtcaattca aatthaaagt      1080
gaggtththt cthaaattht thgagththt atthgtatgt cthtgctga aaatctthg      1140
thcctaatta gthaacataat thttcatttg atgggthaat atthtagggc cgattctthg      1200
gththttagc caagataccc tgttgataaa gtcttgthgg agcaattata agactgthctt      1260
atththgaagc thththaaaa agacatcctt acctgththt actgtagatt atthtaactt      1320
aataggtac agcccacgct tgactagthc agagagcctc ggctaggtag gggatcggga      1380
ctctgcggg agggcggctt ggtgcgthtg cgggtaggg cggccgcggc aggcctccg      1440
agcgtgthtg agccgthctg tgagacagcc ggtacgagt cgtgacgctg gaaggggcaa      1500
gcggtgthtg ggcaggaatg cgtccgccc tgcagcaacc ggagggggag ggagaagga      1560
gcggaaaagt ctccaccgga cgcggccatg gctcggggg gggggggcag cggagagcg      1620
cttccggccg acgtctcgtc gctgattggc thtthtctt cccgccgtgt gtgaaaacac      1680
aattgacta accttcttct cthtctctc ctgacag      1717

```

<210> 31

5 <211> 1625

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

ES 2 619 407 T3

<223> secuencia artificial

<400> 31

gCGttacata acttacggta aatggcccgc ctggetgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc cctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgctggcat tatgccagtc 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcgga gaggcgggt cggcgcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcagct gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc cagagtaatg acatggttcc ttccatctc caaaggtag caataatagt 720
 ttgtaagtat cattatgaac taatgaattt tcaacatatt tgatatattt caatccattg 780
 ccatcattgt tcttatcgat atttgagttg gctcactttg ccagtaagag tctattcaaa 840
 ttggcttctg agtccatttg acacaacacc tttgatcttt gacagtttcc ttggttttag 900
 gtgctagatg atttctcagc ctcaccttag acatttctctg ccacagactt agaatcagcc 960
 atttctctaa ggaccctgat tccatttcat gagaaatgat agagaccaca atcaaaacaa 1020
 gtcataaatt tatactgata ttttcaattc aaattaaaga tgaggttttt gctaaatttt 1080
 tttgagttta tatttgtatg tcttatgctg aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa 1140
 ttattcattt gatgggtaaa tatttttagg ccgattcttt ggttttatag ccaagatacc 1200
 ctggtgataa agtcttgtgg gagcaattat aagactggct tattttgaag ctttttaaaa 1260
 aagacatcct tacctgtttt aactgtagat tatattaact taaataggta cagcccacgc 1320
 ttgactagtc ttcgaggggc tcgcatctct ccttcacgcg cccgccgcc tacctgaggc 1380
 cgccatccac gccggttag tcgcttctg ccgcctccc cctgtggtgc ctctgaact 1440
 gcgtccgccg tctaggtaag tttaaagctc aggtcgagac cgggcctttg tccggcgcctc 1500
 ccttgagacc tacctagaact cagccggctc tccacgcttt gcctgacct gcttgcctca 1560
 ctctacgtct ttgtttcgtt ttctgttctg cgccttaca gatccaagct gtgaccggcg 1620

5

cctac

1625

<210> 32

<211> 1491

<212> ADN

10

<213> Secuencia artificial

ES 2 619 407 T3

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 32

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac cccgcccac      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagtc      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta      300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc      360
ccggctcccc gcgccccga toggggccgc cgetagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg      420
cagcggcggc ggcggcgagg ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggggaa gaggcggggt cggcgcgcgcg      540
aggccggaag tgcccggtga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc      600
ggcggcgggg cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg gcggcgcgct      660
ggagcgggcc cagagtaat acatggttc ttccatctc caaaggtag caataatagt      720
ttgtaagtat cattatgaac taatgaattt tcaacatatt tgatatattt caatccattg      780
ccatcattgt tcttatcgat atttgagttg gctcactttg ccagtaagag tctattcaaa      840
ttggctcttg agtccatttg acacaacacc tttgatctt gacagtttcc ttggttttag      900
gtgctagatg atttctcagg ctcaccttag acatttctc ccacagactt agaatcagcc      960
atctctctaa ggaccctgat tccatttcat gagaaatgat agagaccaca atcaaaacaa     1020
gtcatgaatt tatactgata ttttcaattc aaattaaaga tgaggttttt gctaaatttt     1080
tttgagttta ttttgtatg tcttatgctg aaaaatcttg tttcctaatt agtaacataa     1140
ttattcattt gatgggtaaa tatttttagg ccgattcttt ggttttatag ccaagatacc     1200
ctggtgataa agtcttgtgg gagcaattat aagactggct tattttgaag ctttttaaaa     1260
aagacatcct tacctgtttt aactgtagat tatattaact taaataggta cagcccacgc     1320
ttgactagtg cagaagttgg tcgtgaggca ctgggcaggt aagtatcaag gttacaagac     1380
aggtttaagg agaccaatag aaactgggct tgtcagagaca gagaagactc ttgcgtttct     1440
gataggcacc tattggtcct actgacatcc actttgcctt tctctccaca g             1491

```

5

<210> 33

<211> 1964

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

10

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 33

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagt c atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcgggcgag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tgcccggtg ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg gcggcgctt 660
 ggagcgggcc ggtaccgttt aacgctggtg ggtagggatg agggaggag gggcattgtg 720
 atgtacagg ctgctctgtg agatcaagg tctcttaagg gtgggagctg gggcaggac 780
 tacgagagca gccagatggg ctgaaagtgg aactcaagg gtttctggca cctacctacc 840
 tgcttccccg tcgggggtg ggagttggcc cagagtctta agattggggc aggggtggaga 900
 ggtgggctct tcctgcttcc cactcatctt atagctttct tccccagat ccgaattcga 960
 gatccaaacc aaggaggaaa ggatatcaca gaggagagct agtcgggttt gccgccagaa 1020
 cacaggtaa tgccgtgtgt ggttccccgc ggcctggcct ctttacgggt tatggccctt 1080
 gcgtgccttg aattacttcc acctggctgc agtacgtgat tcttgatccc gagcttcggg 1140
 ttggaagtgg gtgggagagt tcgaggcctt gcgcttaagg agccccttcg cctcgtgctt 1200
 gagttgaggc ctggcctggg cgctggggcc gccgcgtgcg aatctggtgg caccttcggg 1260
 cctgtctcgc tgctttcgat aagtctctag ccatttaaaa tttttgatga cctgctcga 1320
 cgctttttt ctggcaagat agtctttaa atgcggcca agatctgcac actggtattt 1380
 cggtttttg ggccgcgggc ggcgacgggg cccgtgcgtc ccagcgaca tgttcggcga 1440
 ggcggggcct cgcagcgcg ccaccgagaa tcgagcggg gtagtctcaa gctggccggc 1500
 ctgctctggt gcctggcctc gcgccccgt gtatcgcccc gccctggcg gcaagctgg 1560
 cccggtcggc accagttgcg tgagcggaaa gatggcogct tccggccct gctgcagga 1620

 gctcaaaatg gaggacgcg cgctcgggag agcgggggg tgagtcaccc acacaaagga 1680
 aaaggcctt tccgtcctca gccgtcgtt catgtgactc cacggagtac cgggcgccgt 1740
 ccaggcacct cgattagtcc tcgagctttt ggagtacgtc gtctttaggt tggggggagg 1800
 ggttttatgc gatggagttt cccacactg agtgggtgga gactgaagt aggccagctt 1860
 ggcactgat gtaattctcc ttggaattg cccttttga gtttgatct tggttcattc 1920
 tcaagcctca gacagtgggt caaagtttt ttcttccatt tcag 1964

ES 2 619 407 T3

<211> 1372

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

5 <223> secuencia artificial

<400> 34

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgccagt      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagt c atcgtatta      300
ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc      360
ccggtcccc  gcgccccga tccggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg      420
cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccoctggcc tctcgggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcgcgcg      540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc      600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt      660
ggagggcggc ggatccgttt aacgctggtg ggtagggatg agggaggag gggcattgtg      720
atgtacaggg ctgctctgtg agatcaaggg tctcttaagg gtgggagctg gggcagggac      780
tacgagagca gccagatggg ctgaaagtgg aactcaaggg gtttctggca cctacctacc      840
tgcttccgc tgggggtg ggagttggcc cagagtctta agattggggc aggggtggaga      900
ggtgggctct tctgcttcc cactcatctt atagcttctt tccccagat ccgaattoga      960
gatccaaacc aaggaggaaa ggatatcaca gaggagagct agttcagaga gcctcggcta      1020
ggtaggggat cgggactctg gcgggagggc ggcttgggtg gtttgcgggg atggcggcc      1080
gcggcagggc ctccgagcgt ggtggagccg ttctgtgaga cagccgggta cgagtcgtga      1140
cgctggaagg ggcaagcggg tgggtggcag gaatgcggtc cgccctgcag caaccggagg      1200

gggagggaga agggagcggg aaagtctcca ccggacgcgg ccatggctcg gggggggggg      1260
ggcagcggag gagcgttcc gcccgacgtc tcgtcgctga ttggcttctt ttcctccgc      1320
cgtgtgtgaa aacacaattg tactaacctt cttctcttcc ctctcctgac ag          1372

```

10

<210> 35

<211> 1302

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

15 <220>

ES 2 619 407 T3

<223> secuencia artificial

<400> 35

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaagtggc cgcctggcat tatgccagtc      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgtatta      300
ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgc      360
ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcgccggcg gaggcgggg      420
cagcggcggc ggcgccggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaa      480
tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgccgcg      540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc      600
ggcgccggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt      660
ggagcgggcc ggatccacta gttaacgctg gtggtagggg atgagggagg gagggcatt      720
gtgatgtaca gggctgctct gtgagatcaa ggtctctta aggtgggag ctggggcagg      780
gactacgaga gcagccagat gggctgaaag tggaactcaa ggggtttctg gcacctacct      840
acctgcttcc cgctgggggg tggggagttg gccagagtc ttaagattgg ggcagggtgg      900
agaggtgggc tcttctgct tccactcat cttatagctt tctttccca gatccgaatt      960
cgagatccaa accaaggagg aaaggatata acagaggaga gctagtcttc gaggggctcg     1020
catctctcct tcacgcgccc gccgccctac ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg     1080
cgttctgccg cctcccgcct gtggtgcctc ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt     1140
aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc ggcgctccct tggagcctac ctagactcag     1200
ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc     1260
tggtctgccc cgttacagat ccaagctgtg accggcgcct ac                          1302

```

5 <210> 36

<211> 1168

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

10 <223> secuencia artificial

<400> 36

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagt c atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggccggcggc gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggccggcggg gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaa 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcgcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcgact gggggcggc gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggtaccacta gttaacgctg gtggtaggg atgaggagg gagggcatt 720
 gtgatgtaca ggcctgctct gtgagatcaa ggcctctta agggtaggag ctggggcagg 780
 gactacgaga gcagccagat gggctgaaag tggaactcaa ggggtttctg gcacctacct 840
 acctgcttc cgtgggggg tggggagttg gccagagtc ttaagattg ggcagggtg 900
 agaggtggc tcttcctgct tcccactcat cttatagctt tctttccca gatccgaatt 960
 cgagatccaa accaaggag aaaggatc acagaggaga gctagtgcag aagttggtc 1020
 tgaggcactg ggcaggtaag tatcaaggtt acaagacagg ttaaggaga ccaatagaaa 1080
 ctgggcttgc cgagacagag aagactctg cgtttctgat aggcacctat tggcttact 1140
 gacatccact ttgcctttct ctccacag 1168

<210> 37

<211> 2584

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 37

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 10 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180

ES 2 619 407 T3

caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacott atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccattggccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccca tggggccgc cgttagtagt ggcggcgcg gaggcgggg 420
 cagcggcgcc ggcggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcgggt cggcgcccg 540
 aggcgggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcgc 600
 ggcggcgga cccggagcag gagcggcgcc agcagcgact gggggcgcg gcggcgctt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctct tcaagcggcc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgcctct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagttttaa 1020
 gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttgctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaato agccatttct 1260
 ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaa acaagtcatg 1320
 aattatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttggttct aattagtaac ataattatc 1440
 attgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggttt atagccaaga taccctgttg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agtcgggtt gccgccagaa cacaggaag tgccgtgtgt ggttcccgcg gcctggcct 1680
 cttacgggt tatggcctt gcgtgccttg aattacttcc acctggctgc agtacgtgat 1740
 tcttgatccc gagcttcggg ttggaagtgg gtgggagagt tcgagccct gcgcttaagg 1800
 agcccttcg cctcgtgctt gagttgagc ctggcctggg cgtggggcc gcgcgtgcg 1860
 aatctggtg caccttcgcg cctgtctcgc tgctttcgat aagtctctag ccatttaaaa 1920
 ttttgatga cctgctgcga cgcttttttt ctggcaagat agtctttaa atgcgggcca 1980
 agatctgcac actggtatctt cggtttttgg ggcgcgggc ggcgacggg cccgtgctc 2040
 ccagcgcaca tgttcggcga ggcggggcct gcgagcggc ccaccgagaa tcggacgggg 2100

ES 2 619 407 T3

gtagtctcaa gctggccggc ctgctctggt gcctggcctc gcgccgccgt gtatcgcccc 2160
 gccctgggcg gcaaggctgg cccggtcggc accagttgcg tgagcggaaa gatggccgct 2220
 tcccggccct gctgcaggga gctcaaaatg gaggacgcgg cgctcgggag agcgggaggg 2280
 tgagtcaacc acacaaagga aaagggcctt tccgtcctca gccgtcgctt catgtgactc 2340
 cacggagtac cgggcgccgt ccaggcacct cgattagttc tcgagctttt ggagtacgtc 2400
 gtcttttagt tggggggagg ggttttatgc gatggagttt cccacactg agtgggtgga 2460
 gactgaagtt aggccagctt ggcacttgat gtaattctcc ttggaattg cccttttga 2520
 gtttgatct tggttcattc tcaagcctca gacagtgggt caaagttttt ttcttccatt 2580
 tcag 2584

<210> 38

<211> 1992

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 38

gcgttacata acttacggta aatggccccg ctggetgacc gcccacacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctcggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcagact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcaagcgcgc gccgcccctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccgctctccc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagtgtt 960
 10 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020

ES 2 619 407 T3

gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcatg 1320
 aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattattc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctggtg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttcagaga gcctcggcta ggtaggggat cgggactctg gcgggagggc ggcttgggac 1680
 gtttgcgggg atggggggcc gcggcaggcc ctccgagcgt ggtggagccg ttctgtgaga 1740
 cagccgggta cgagtcgtga cgctggaagg ggcaagcggg tgggaggcag gaatcgggc 1800
 cgccctgcag caaccggagg gggagggaga agggagcggg aaagtctcca ccggacgagg 1860
 ccatggctcg gggggggggg ggcagcggag gagcgttcc gcccgacgtc tcgtcgtga 1920
 ttggttctt ttctccgc cgtgtgtgaa aacacaattg tactaacctt cttctctttc 1980
 ctctcctgac ag 1992

<210> 39

<211> 1929

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 39

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgtatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgccgag 540
 10 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600

ES 2 619 407 T3

ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgcact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatccacta ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgccc 720
 gccgccctac ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccg cctcccgcct 780
 gtggtgcctc ctgaactcgc tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg 840
 gcctttgtcc ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc 900
 tgaccctgct tgcacaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat 960
 cactagtgtt taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa 1020
 tagtttgtaa gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc 1080
 attgccatca ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt 1140
 caaattggct tctgagtcga tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt 1200
 ttagtgcta gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc 1260
 agccatttct ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa 1320
 acaagtcatg aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa 1380
 ttttttgag tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac 1440
 ataattatc atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga 1500
 taccctgttg ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt 1560
 aaaaagaca tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc 1620
 acgcttgact agtcttcgag gggctcgcct ctctccttca cggcggccgc gccctacctg 1680
 aggccgccat ccacggcggg tgagtcgcgt tctgccgcct cccgcctgtg gtgcctcctg 1740
 aactgcgtcc gccgtctagg taagtttaaa gctcaggtcg agaccgggcc tttgtcgggc 1800
 gctcccttgg agcctaccta gactcagccg gctctccacg ctttgccctga ccctgcttgc 1860
 tcaactctac gtctttggtt cgttttctgt tctgcgccgt tacagatcca agctgtgacc 1920
 ggcgcctac 1929

<210> 40

<211> 1785

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 40

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggetgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 10 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180

ES 2 619 407 T3

caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcttggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgc 360
 ccggctcccc gcgccccca tggggccgc cgctagtagt ggccggcggc gaggcgggg 420
 cagcggcggc ggccggcggc gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gagcgggggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggcctgga ggcggaagt gcgcggcgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcagact gggggcggc gcggcgcgtt 660
 ggagcggc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgagcgc catccacgcc ggttgagtc cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgcctct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccgctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttghaa 1020
 gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttagtgctca 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag 1320
 aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctggtg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agtgacagaag ttggtcgtga ggcactgggc aggtaagtat caaggttaca agacaggttt 1680
 aaggagacca atagaaactg ggcttgcga gacagagaag actcttgcgt ttctgatagg 1740
 cacctattgg tcttactgac atccactttg cctttctctc cacag 1785

<210> 41

<211> 2242

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 41

ES 2 619 407 T3

gcgttacata acttacgta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtaogcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcgag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggcctgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gacggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctct tcaacgcccc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagttaa 960
 cgctggtggg tagggatgag ggagggaggg gcattgtgat gtacagggct gctctgtgag 1020
 atcaagggtc tcttaagggt gggagctggg gcagggacta cgagagcagc cagatgggct 1080
 gaaagtggaa ctcaagggtt ttctggcacc tacctacctg cttcccgcct gggggtgggg 1140
 agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc ctgcttccca 1200
 ctcatcttat agctttcttt ccccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa ggaggaaagg 1260
 atatcacaga ggagagctag tcgggtttgc cgccagaaca caggtaagtg ccgtgtgtgg 1320
 ttcccgcggg cctggcctct ttacgggtta tggcccttgc gtgccttgaa ttacttccac 1380
 ctggctgcag tacgtgattc ttgatcccga gcttcgggtt ggaagtgggt gggagagttc 1440
 gaggccttgc gcttaaggag ccccttcgcc tcgtgcttga gttgaggcct ggcctggcg 1500
 ctggggccgc cgcgtgcgaa tctggtggca ccttcgcgcc tgtctcgctg ctttcgataa 1560
 gtctctagcc atttaaaatt tttgatgacc tgctgcgacg cttttttctt ggcaagatag 1620
 tcttgtaaat gcgggccaaag atctgcacac tggatattcg gtttttgggg ccgcggcggg 1680
 cgacggggcc cgtgcgtccc agcgcacatg ttccggcagg cggggcctgc gagcgcggcc 1740
 accgagaatc ggacgggggt agtctcaagc tggccggcct gctctggtgc ctggcctcgc 1800
 gccgccgtgt atcgccccgc cctgggcggc aaggctggcc cggtcggcac cagttgcgtg 1860

ES 2 619 407 T3

agcggaaaga tggccgcttc ccggccctgc tgcagggagc tcaaaatgga ggacgcggcg 1920
ctcgggagag cgggcggggtg agtcacccac acaaaggaaa agggcctttc cgtcctcagc 1980
cgtcgcttca tgtgactcca cggagtaccg ggcgccgtcc aggcacctcg attagtctc 2040
gagcttttgg agtacgtcgt ctttaggttg gggggagggg ttttatgcga tggagtttcc 2100
ccacactgag tgggtggaga ctgaagttag gccagcttgg cacttgatgt aattctcctt 2160
ggaatttgcc ctttttgagt ttggatcttg gttcattctc aagcctcaga cagtggttca 2220
aagttttttt cttccatttc ag 2242

<210> 42

<211> 1650

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 42

gcgttacata acttacggt aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcggc 360
ccggctcccc gcgccccga tggggcccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcggcg 540
aggccggaag tggcctgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggctt ggagtgcggc 600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
ggagcgggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
ctgagccgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
ggcgtccct tggagcctac ctagactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagttaa 960
cgctggtggg tagggatgag ggagggaggg gcattgtgat gtacagggct gctctgtgag 1020
atcaagggtc tcttaagggt gggagctggg gcagggacta cgagagcagc cagatgggct 1080
gaaagtggaa ctcaagggtt ttctggcacc tacctacctg cttcccctg gggggtgggg 1140
10 agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc ctgcttccca 1200

ES 2 619 407 T3

ctcatcttat agctttcttt cccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa ggaggaag 1260
 atatcacaga ggagagctag ttcagagagc ctcggttagg taggggatcg ggactctggc 1320
 gggagggcgg cttggtgcgt ttgcgggat gggcgccgc ggcaggccct ccgagcgtgg 1380
 tggagccgtt ctgtgagaca gccgggtacg agtcgtgacg ctggaagggg caagcgggtg 1440
 gtgggcagga atgcgggtccg ccctgcagca accggagggg gagggagaag ggagcggaaa 1500
 agtctccacc ggacgcggcc atggctcggg gggggggggg cagcggagga gcgcttccgg 1560
 ccgacgtctc gtcgctgatt ggcttctttt cctcccgccg tgtgtgaaaa cacaattgta 1620
 ctaaccttct tctctttcct ctctgacag 1650

<210> 43

<211> 1587

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 43

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggtgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttcc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagat 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cgcagcccag ctccgcgccc 360
 ccggtcccc cgcccccga tggggcgcgc cgtagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcggcggaa gaggcggggt cggcgcgcgg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggccc ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggagggggcc ggatccacta ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc 720
 gccgccctac ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgcc cctccgcct 780
 gtggtgcctc ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg 840
 gcctttgtcc ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc 900
 tgaccctgct tgcctcaact tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat 960
 cactagttaa cgtcgggtgg tagggatgag ggagggaggg gcattgtgat gtacagggct 1020
 10 gctctgtgag atcaagggtc tottaagggt gggagctggg gcagggacta cgagagcagc 1080

ES 2 619 407 T3

cagatgggct gaaagtggaa ctcaaggggt ttctggcacc tacctacctg ottcccgctg 1140
 ggggggtgggg agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc 1200
 ctgcttccca ctcatcttat agctttcttt ccccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa 1260
 ggagaaagg atatcacaga ggagagctag tcttcgaggg gctcgcatct ctccttcacg 1320
 cgcccgccg cctacctgag gccgccatcc acgccggtg agtcgcttc tgccgcctcc 1380
 cgcctgtggt gcctcctgaa ctgcgctccg cgtctaggta agtttaaagc tcaggtcgag 1440
 accgggcctt tgtccggcgc tcccttgag cctacctaga ctcagccggc tctccacgct 1500
 ttgcctgacc ctgcttgctc aactctacgt ctttgtttcg ttttctgttc tgcgccgta 1560
 cagatccaag ctgtgaccgg cgcctac 1587

<210> 44

<211> 1443

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 44

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggetgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgcacccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gagcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcgc gcggycgaa gagcgggggt cgcgcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcgcccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgaact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgaggcgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgcctct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagttaa 960
 cgctggtggg tagggatgag ggagggaggg gcattgtgat gtacagggct gctctgtgag 1020
 10 atcaagggtc tcttaagggg gggagctggg gcagggacta cgagagcagc caatgggct 1080

ES 2 619 407 T3

gaaagtggaa ctcaaggggt ttctggcacc tacctacctg cttcccgtg gggggtggg 1140
 agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc ctgcttccca 1200
 ctcatcttat agctttcttt cccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa ggagaaagg 1260
 atatcacaga ggagagctag tgcagaagtt ggtcgtgagg cactgggcag gtaagtatca 1320
 aggttacaag acaggtttaa ggagaccaat agaaactggg cttgtcgaga cagagaagac 1380
 tcttgcgttt ctgataggca cctattggtc ttactgacat ccactttgcc tttctctcca 1440
 cag 1443

<210> 45

<211> 2627

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 45

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagtt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc gcgccccga tggggccgc cgtagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggagggccct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacagagta atgacatggt tccttccatc ctccaaaggt 720
 gaccaataat agtttgtaag tatcattatg aactaatgaa ttttcaacat atttgatata 780
 tttcaatcca ttgccatcat tgttcttate gatatttgag ttggctcact ttgccagtaa 840
 gagtctatcc aaattggctt ctgagtccat ttgacacaac acctttgatc tttgacagtt 900
 tccttggttt taggtgctag atgatttctc aggtcacct tagacatttc ctgccacaga 960
 cttagaatca gccatttctc taaggaccct gattccattt catgagaaat gatagagacc 1020
 acaatcaaaa caagtcatga atttatactg atattttcaa ttcaaattaa agatgaggtt 1080
 10 tttgctaaat ttttttgagt ttatatttgt atgtcttatg ctgaaaaatc ttgtttccta 1140

ES 2 619 407 T3

attagtaaca taattattca tttgatgggt aaatatTTTA gggccgattc tttggTTTTA 1200
 tagccaagat accctgttga taaagtcttg tgggagcaat tataagactg gcttattttg 1260
 aagctTTTTa aaaaagacat ccttacctgt tttaaactgta gattatatta acttaaatag 1320
 gtacagccca cgcttgacta gttaacgctg gtgggtaggg atgagggagg gaggggcatt 1380
 gtgatgtaca gggctgctct gtgagatcaa gggctcttta agggTgggag ctggggcagg 1440
 gactacgaga gcagccagat gggctgaaag tggaaactcaa ggggtttctg gcacctacct 1500
 acctgcttcc cgctgggggg tggggagtTg gccagagtc ttaagattgTg ggcagggTgg 1560
 agagTggggc tcttctgct tccactcat cttatagctt tctttcccca gatccgaatt 1620
 cgagatccaa accaaggagg aaaggatTc acagaggaga gctagTcggg tttgcccCa 1680
 gaacacaggt aagtgccgtg tgtggTtccc gcgggectgg cctctttacg ggTtatggcc 1740
 cttgcgtgcc ttgaattact tccacctggc TgcagTcgt gattcttgat cccgagcttc 1800
 gggTtggaaG tgggtgggag agTtcgaggc cttgcgctta aggagcccct tgcctcgtg 1860
 cttgagTtga ggccTggcct gggcgctggg gccgcgcgt gcgaatctgTg tggcaccttc 1920
 gcgcctgtct cgctgctttc gataagtctc tagccattta aaatTTTTga Tgacctgctg 1980
 cgacgctttt tttctggcaa gatagtcttg taaatgcggg ccaagatctg cacactggta 2040
 tttcgTttt tggggccgcg gggggcagc gggcccgtgc gtcccagcgc acatgttcgg 2100
 cgaggcgggg cctgcgagcg cggccaccga gaatcggagc ggggtagtct caagctggcc 2160
 ggcctgctct gTgcctggc ctgcgcgcgc cgtgtatcgc cccgccctgg gcggcaaggc 2220
 tggcccggTc ggcaaccagTt gcgtgagcgg aaagatggcc gcttcccggc cctgctgcag 2280
 ggagctcaaa atggaggagc cggcgctcgg gagagcgggc gggTgagTca cccacacaaa 2340
 ggaaaagggc ctttccgtcc tcagccgtcg cttcatgtga ctccacggag taccgggcgc 2400
 cgtccaggca cctcgattag ttctcgagct tttggagTc gtctcttta ggTtgggggg 2460
 aggggtTTTa Tcgatggag tttcccaca ctgagTgggt ggagactgaa gTtagccag 2520
 cttggcactt gatgtaattc tccttggaaT ttgccTTTT tgagTttgga tcttggTtca 2580
 ttctcaagcc tcagacagTg gttcaaagTt tttttcttcc atttcag 2627

<210> 46

<211> 1946

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 46

gtaacgcaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc 60

10 cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac 120

ES 2 619 407 T3

ggtaaatggc ccgcctggca ttatgccag tacatgacct tatgggactt tctacttgg 180
 cagtacatct acgtattagt catcgctatt accatggccc gggtcgcgac atgcagcggg 240
 acgcgccacc ccgagcccca gctccggcgc cccggctccc cgcgcccccg atcggggccg 300
 ccgctagtag tggcggcggc ggagcggggg gcagcggcgg cggcggcgga ggcgcctctg 360
 cagctccggc tccccctggc ctctcgggaa ctacaagtcc cagggggcct ggcggtgggc 420
 ggcggcggga agagggcggg tcggcggcgc gaggcgggaa gtggccgtgg aggcggaagt 480
 ggcgcggccg cggaggggccc tggagtgcgg cggcggcggg acccggagca ggagcggcgg 540
 cagcagcgac tggggggcgc ggcggcggc tggagggcgc cggatccgtt taaacagagt 600
 aatgacatgg ttcccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa gtatcattat 660
 gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca ttgttcttat 720
 cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct tctgagtcca 780
 tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta gatgatttct 840
 caggctcacc ttagacatth cctgccacag acttagaatc agccatttct ctaaggaccc 900
 tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaataaaa acaagtcag aatttatact 960
 gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag tttatatttg 1020
 tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattattc atttgatggg 1080
 taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg ataaagtctt 1140
 gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca tccttacctg 1200
 ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc acgcttgact agttaacgct 1260
 ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc tgtgagatca 1320
 agggctctct aagggtggga gctggggcag ggactacgag agcagccaga tgggctgaaa 1380
 gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg gtggggagtt 1440
 ggcccagagt cttaagattg ggcaggggtg gagaggtggg ctcttcctgc ttcccactca 1500
 tcttatagct ttctttcccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag gaaaggatat 1560
 cacagaggag agctagttca gagagcctcg gctaggtagg ggatcgggac tctggcggga 1620
 gggcggcttg gtgcgtttgc ggggatgggc ggccgcggca ggcctccga gcgtggtgga 1680
 gccgttctgt gagacagccg ggtacgagtc gtgacgctgg aaggggcaag cgggtggtgg 1740
 gcaggaatgc ggtccgcctc gcagcaaccg gagggggagg gagaaggag cggaaaagtc 1800
 tccaccggac gcggccatgg ctcggggggg ggggggcagc ggaggagcgc ttccggccga 1860
 cgtctcgtcg ctgattggct tcttttctc ccgccgtgtg tgaaaacaca attgtactaa 1920
 ccttctctc tttctctcc tgacag 1946

<210> 47

<211> 1968

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

ES 2 619 407 T3

<223> secuencia artificial

<400> 47

gcgttacata	acttacggta	aatggcccgc	ctggctgacc	gcccacgac	ccccgccat	60
tgacgtcaat	aatgacgtat	gttcccatag	taacgccaat	agggactttc	cattgacgtc	120
aatgggtgga	gtatttacgg	taaactgccc	acttggcagt	acatcaagtg	tatcatatgc	180
caagtacgcc	ccctattgac	gtcaatgacg	gtaaatggcc	cgcttggcat	tatgcccagt	240
acatgacctt	atgggacttt	cctacttggc	agtacatcta	cgtattagtc	atcgctatta	300
ccatggcccc	ggtcgcgaca	tgcagcggga	cgcgccaccc	cgagccccag	ctccggcgcc	360
ccggctcccc	gcgccccga	tggggccgc	cgctagtagt	ggcgggcgcg	gaggcggggg	420
cagcggcggc	ggcggcggag	gcgcctctgc	agctccggct	ccccctggcc	tctcgggaac	480
tacaagtccc	agggggcctg	gcgggtggcg	gcgggcggaa	gaggcggggt	cggcgccgcg	540
aggccggaag	tggccgtgga	ggcggaaagt	gcgcggccgc	ggaggggcct	ggagtgcggc	600
ggcggcggga	cccggagcag	gagcggcgcc	agcagcgact	gggggcggcg	gcggcgcggt	660
ggagcgggcc	ggatccacta	gtgtttaaac	agagtaatga	catggttcct	tccatcctcc	720
aaagtgacc	aataatagtt	tgtaagtatc	attatgaact	aatgaatttt	caacatattt	780
gatataattc	aatccattgc	catcattgtt	cttatcgata	tttgagttgg	ctcactttgc	840
cagtaagagt	ctattcaaat	tggcttctga	gtccatttga	cacaacacct	ttgatctttg	900
acagtttctt	tgttttagg	tgctagatga	tttctcaggc	tcaccttaga	catttctctgc	960
cacagactta	gaatcagcca	tttctctaag	gacctgatt	ccatttcatg	agaaatgata	1020
gagaccacaa	tcaaaacaag	tcatgaatth	atactgatat	tttcaattca	aattaaagat	1080
gaggtttttg	ctaaatthtt	ttgagtttat	atthgtatgt	cttatgctga	aaaatcttgt	1140
ttcctaatta	gtaacataat	tattcatttg	atgggtaaat	atthtagggc	cgattctttg	1200
gttttatagc	caagatacc	tgttgataaa	gtcttgtggg	agcaattata	agactggctt	1260
atthtgaagc	thtttaaaaa	agacatcctt	acctgtthta	actgtagatt	atattaactt	1320
aaataggtac	agcccacgct	tgactagtta	acgctggtgg	gtagggatga	gggagggagg	1380
ggcattgtga	tgtacagggc	tgctctgtga	gatcaaggg	ctcttaagg	tgggagctgg	1440
ggcagggact	acgagagcag	ccagatgggc	tgaagtggga	actcaaggg	tttctggcac	1500
ctacctacct	gcttcccgct	ggggggtggg	gagttggccc	agagtcttaa	gattggggca	1560
gggtggagag	gtgggctctt	cctgcttccc	actcatotta	tagctthctt	tcccagatc	1620
cgaaatcgag	atccaaacca	aggagaaaag	gatatcacag	aggagagcta	gtcttcgagg	1680
ggctcgcata	tctccttcac	gcgcccgcg	ccctacctga	ggcggccatc	cacgcccgtt	1740
gagtcgcggt	ctgccgcctc	ccgcctgtgg	tgcctcctga	actgcgtccg	ccgtctaggt	1800
aagthtaaa	ctcaggtcga	gaccgggcct	ttgtcggcg	ctcccttgg	gcctacctag	1860
actcagccgg	ctctccacgc	tttgcctgac	cctgcttgg	caactctacg	tctthgtttc	1920
5 gthttctggt	ctgcgcggtt	acagatccaa	gctgtgaccg	gcgcctac		1968

ES 2 619 407 T3

<210> 48

<211> 1834

<212> ADN

5 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 48

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctgggtgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc cttggcagc acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgcctggcat tatgccagc      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgtatta      300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc      360
ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcgggg      420
cagcgcgggc ggcgggcgag gcgcctctgc agctccggct cccoctggcc tctcgggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggggaa gaggcggggt cggcgccgcg      540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc      600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt      660
ggaggcggcc ggatccacta gtgtttaaac agagtaatga catggttcct tccatcctcc      720
aaagtgacc aataatagtt tgtaagtatc attatgaact aatgaatatt caacatattt      780
gatataattc aatccattgc catcattggt cttatcgata tttgagttgg ctcactttgc      840
cagtaagagt ctattcaaat tggcttctga gtccatttga cacaacacct ttgatctttg      900
acagtttcct tggttttagg tgctagatga tttctcaggc tcaccttaga catttcctgc      960
cacagactta gaatcagcca tttctctaag gaccctgatt ccatttcatg agaaatgata     1020
gagaccacaa tcaaaacaag tcatgaatct atactgatat tttcaattca aattaaagat     1080
gagggttttg ctaaattttt ttgagtttat atttgatgt cttatgctga aaaatcttgt     1140
ttcctaatta gtaacataat tattcatttg atgggtaaatt attttagggc cgattctttg     1200

```

10

ES 2 619 407 T3

gttttatagc caagataccc tgttgataaa gtcttgtggg agcaattata agactggctt 1260
atthtgaagc tttttaaaaa agacatcctt acctgtttta actgtagatt atattaactt 1320
aataggtac agcccacgct tgactagtta acgctggtgg gtagggatga gggaggagg 1380
ggcattgtga tgtacagggc tgctctgtga gatcaagggt ctcttaaggg tgggagctgg 1440
ggcagggact acgagagcag ccagatgggc tgaaagtgga actcaagggg tttctggcac 1500
ctacctacct gcttcccgct ggggggtggg gagttggccc agagtcttaa gattggggca 1560
gggtggagag gtgggctctt cctgcttccc actcatctta tagctttctt tcccagatc 1620
cgaattcgag atccaaacca aggaggaaag gatatacacag aggagagcta gtgcagaagt 1680
tggctgtgag gcaactggca ggtaagtatc aaggttacia gacaggttta aggagaccaa 1740
tagaaactgg gcttgtcgag acagagaaga ctcttgcggt tctgataggc acctattggt 1800
cttactgaca tccactttgc ctttctctcc acag 1834

<210> 49

<211> 2908

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 49

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgctggcat tatgccagct 240
acatgacott atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
ccggctcccc gcgccccga tggggcccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
cagcggcggc ggcggcgag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
aggccggaag tggcctgga ggcggaagt gcgcgccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
ggcgcgggga cccggagcag gagcgcggc agcagcgact gggggcgcg gcggcgctt 660
ggagcgggc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac 720
ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
ggcgtccct tggagcctac ctgactcag ccgctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
10 tgetcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960

ES 2 619 407 T3

taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020
 gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaa acaagtcatg 1320
 aattatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattattc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg 1500
 ataaagtctt tggggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc 1680
 tgtgagatca agggctctctt aagggtggga gctggggcag ggactacgag agcagccaga 1740
 tgggctgaaa gtggaactca aggggttctt ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg 1800
 gtggggagtt gcccagagt cttaagattg gggcaggtg gagaggtggg ctcttcctgc 1860
 ttcccactca tcttatagct ttctttcccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag 1920
 gaaaggatat cacagaggag agctagtcgg gtttgccgcc agaacacagg taagtgccgt 1980
 gtgtggttcc cgcgggcctg gcctctttac gggttatggc ccttgcgctc cttgaattac 2040
 ttccacctgg ctgcagtagc tgattcttga tcccagactt cgggttgga gtgggtggga 2100
 gagttcgagg ccttgcgctt aaggagcccc ttgcctcgt gcttgagttg aggcctggcc 2160
 tgggcgctgg ggcgcgcg tgccaatctg gtggcacctt cgcgcctgtc tcgetgcttt 2220
 cgataagtct ctagccattt aaaatttttg atgacctgct gcgacgcttt ttttctggca 2280
 agatagtctt gtaaatgcgg gccaaatct gcacactggt atttoggttt ttggggccgc 2340
 gggcgcgac ggggcccgtg cgtcccagcg cacatgttcg gcgaggggg gcctgcgagc 2400
 gcggccaccg agaatcggac ggggtagtc tcaagctggc cggcctgctc tgggctcctg 2460
 cctcgcgccg ccgtgtatcg ccccgcctg ggcggcaagg ctggcccgt cggcaccagt 2520
 tgcgtgagcg gaaagatggc cgcttcccgg ccctgctgca gggagctcaa aatggaggac 2580
 gcggcgctcg ggagagcggg cgggtgagtc acccacacaa aggaaaagg cctttccgtc 2640
 ctcagccgtc gttcatgtg actccacgga gtaccgggcg ccgtccagge acctcgatta 2700
 gttctcgagc ttttgagta cgtcgtcttt aggttggggg gaggggtttt atgcgatgga 2760
 gtttccccac actgagtggtg tggagactga agttaggcca gcttggcact tgatgtaatt 2820

 ctccctggaa tttgcccttt ttgagtttgg atcttggttc attctcaagc ctcagacagt 2880
 ggttcaaagt tttttcttc catttcag 2908

5 <210> 50

<211> 2316

ES 2 619 407 T3

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

5 <400> 50

```

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat      60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc      120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc      180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt      240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta      300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccs cgagcccag ctccggcgcc      360
ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg      420
cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac      480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg      540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc      600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt      660
ggagcggcc gatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac      720
ctgagccgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgcg cctccgcct gtggtgcctc      780
ctgaactggg tccgcctct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc      840
ggcgtccct tggagcctac ctagactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct      900
tgctcaactc tacgtctttg tttcgtttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt      960
taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa     1020
gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca     1080
ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct     1140
tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta     1200
gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct     1260
ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag     1320
aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag     1380
tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc     1440
atrtgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg     1500

```

ES 2 619 407 T3

ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatattt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc 1680
 tgtgagatca agggctctctt aaggggtggga gctggggcag ggactacgag agcagccaga 1740
 tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg 1800
 gtggggagtt ggcccagagt ctttaagattg gggcaggggtg gagaggtggg ctcttcctgc 1860
 ttcccactca tcttatagct ttctttcccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag 1920
 gaaaggatat cacagaggag agctagtca gagagcctcg gctaggtagg ggatcgggac 1980
 tctggcggga gggcggttg gtgcgtttgc ggggatgggc ggcccgggca ggccctccga 2040
 gcgtggtgga gccgttctgt gagacagccg ggtacgagtc gtgacgctgg aaggggcaag 2100
 cgggtggtgg gcaggaatgc ggtccgccct gcagcaaccg gagggggagg gagaaggag 2160
 cggaaaagtc tccaccggac gcggccatgg ctcggggggg ggggggcagc ggaggagcgc 2220
 ttccggccga cgtctcgtcg ctgattggct tcttttctc ccgccgtgtg tgaaaacaca 2280
 attgtaacta ccttcttctc tttcctctcc tgacag 2316

<210> 51

<211> 2253

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 51

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctgggtgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcggggt cggcgcgcgc 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcgcgggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 10 ggagcgggcc ggatccacta ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc 720

ES 2 619 407 T3

gcccgcctac ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccg cctcccgcct 780
 gtggtgcctc ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg 840
 gcctttgtcc ggcgctccct tggagcctac ctgacctcag ccggctctcc acgctttgcc 900
 tgaccctgct tgatcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat 960
 cactagtgtt taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa 1020
 tagtttgtaa gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc 1080
 attgccatca ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt 1140
 caaattggct tetgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt 1200
 ttagtgctta gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc 1260
 agccatttct ctaaggaccg tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa 1320
 acaagtcag aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa 1380
 ttttttgag tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac 1440
 ataattattc atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga 1500
 taccctgttg ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt 1560
 aaaaaagaca tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc 1620
 acgcttgact agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac 1680
 agggctgctc tgtgagatca agggctctct aagggtggga gctggggcag ggactacgag 1740
 agcagccaga tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc 1800
 ccgctggggg gtggggagtt gggccagagt cttaagattg gggcagggtg gagaggtggg 1860
 ctcttctgc tcccactca tcttatagct tcttttccc agatccgaat tcgagatcca 1920
 aaccaaggag gaaaggatat cacagaggag agctagtctt cgaggggctc gcatctctcc 1980
 ttcacgcgcc cgcgcccta cctgaggccg ccatccacgc cggttgagtc gcgttctgcc 2040
 gcctcccgcc tgtggtgcct cctgaactgc gtccgcgctc taggtaagtt taaagctcag 2100
 gtcgagaccg ggcctttgtc cggcgctccc ttggagccta cctagactca gccggtctc 2160
 cacgctttgc ctgacctgc ttgctcaact ctacgtcttt gtttcgtttt ctgttctgcg 2220
 ccgttacaga tccaagctgt gaccggcgcc tac 2253

<210> 52

<211> 2109

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> UBC

<400> 52

10 gcgttacata acttacggta aatggccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60

ES 2 619 407 T3

tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc	120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc	180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcttgcat tatgccagt	240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta	300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagcccag ctccggcgcc	360
ccggctcccc gcgccccga tgcggggcgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg	420
cagcggggc ggcgcgag ggcctctgc agctccggt cccctggcc tctcgggaac	480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gagcgggggt cggcgccgcg	540
aggccggaag tggcctgga ggcggaagt ggcggcgcg ggagggcct ggagtgcgc	600
ggcgcgcca cccggagcag gacggcggc agcagcagc gggggcggcg gcgcgcgctt	660
ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctct tcacgcgcc gccgcctac	720
ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccc cctccgcct gtggtgcctc	780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc	840
ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct	900
tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgccc cgttacagat cactagtgtt	960
taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagttttaa	1020
gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca	1080
ttgttcttat cgatatttga gttggtcac tttgccagta agagtctatt caaattggct	1140
tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggt ttaggtgcta	1200
gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct	1260
ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaa acaagtcatg	1320
aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag	1380
tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc	1440
atgtgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg	1500
ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca	1560
tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact	1620
agttaacgct ggtggtagg gatgaggag ggagggcat tgtgatgtac agggctgctc	1680
tgtgagatca aggtctctt aagggtgga gctggggcag ggactacgag agcagccaga	1740
tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg	1800
gtggggagt ggcccagagt cttaagattg gggcaggtg gagaggtgg ctcttctgc	1860
ttccactca tcttatagct ttctttccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag	1920
gaaaggatat cacagaggag agctagtgca gaagttggtc gtgaggcact gggcaggtaa	1980
gtatcaaggt tacaagacag gtttaaggag accaatagaa actgggcttg tcgagacaga	2040
gaagactctt cgtttctga taggcaccta ttggtcttac tgacatccac tttgcctttc	2100
tctccacag	2109

ES 2 619 407 T3

<210> 53

<211> 812

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

5 <220>

<223> secuencia artificial

<400> 53

```

gtgagtagcg ggctgctggg ctggccgggg ctttcgtggc cgcggggccg ctcggtggga      60
cggaaagcgtg tggagagacc gccaaaggct gtagtctggg tccgcgagca aggttgcctt      120
gaactggggg ttggggggag cgcagcaaaa tggcggctgt tcccgagtct tgaatggaag      180
acgcttgtga ggcgggctgt gaggtcgttg aaacaagggt gggggcatgg tgggcggcaa      240
gaaccaagg tcttgaggcc ttcgctaata cgggaaagct cttattcggg tgagatgggc      300
tggggcacca tctggggacc ctgacgtgaa gtttgcact gactggagaa ctcggtttgt      360
cgtctgttgc gggggcggca gttatggcgg tgccgttggg cagtgcaccg gtacctttgg      420
gagcgcgcgc cctcgtcgtg tcgtgacgtc acccgttctg ttggcttata atgcagggtg      480
gggccacctg ccggtagggt tgcggtaggc tttctcctg cgcaggacgc agggttcggg      540
cctagggtag gctctcctga atcgacaggc gccggacctc tggtgagggg agggataagt      600
gaggcgtcag tttctttggt cggttttatg tacctatctt ctttaagtagc tgaagctccg      660
gttttgaact atgcgctcgg ggttggcgag tgtgttttgt gaagttttt aggcaccttt      720
tgaaatgtaa tcatttgggt caatatgtaa ttttcagtgt tagactagta aattgtccgc      780
taaattctgg ccgtttttgg cttttttggt ag                                     812
    
```

10 <210> 54

<211> 1217

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

15 <223> secuencia artificial

<400> 54

```

gtaggggagc ggaactctgg tgggagggga ggtgcgggtgc actgggggga tgggtggcta      60
ggggggccgt ctggtggcct gcgggggttg cctttccctg gggaaagtcgg gaacataatg      120
tttgttactg tgggagggaa aggggtggct ggatgcaggc gggagggagg cccgccctgc      180
ggcaaccgga gggggagggg gaagggagcg gaaaatgctc gaaaccggac ggagccattg      240
    
```

ES 2 619 407 T3

ctctcgcaga gggaggagcg cttccggcta gcctcttgtc gccgattggc cgtttctcct 300
cccgccgtgt gtgaaaacac aaatggcgta ttctggttgg agtaaagctc ctgtcagtta 360
caccgtcggg agtacgcagc cgcttagcga ctctcgcggt gccccctggg tggggcgggt 420
aggtaggtgg ggtgtagaga tgctgggtgt gcgggcgcgg ccggcctcct gcggcgggag 480
gggaggggtca gtgaaattgg ctctggcgcg ggcgtcctcc caccctcccc ttccttcggg 540
ggagtcggtt taccgcgcgc ctgcttgtct tcgacacctg attggctgtc gaagctgtgg 600
gaccgggccc ttgctactgg ctcgagtctc acatgagcga aaccactgcg cggggcgcgg 660
gggtggcggg gaggcgggcg ttggtacggt cctccccgag gccgagcgcc gcagtgtctg 720
gccccgcgcc cctgcgcaac gtggcaggaa gcgcgcgctg gaggcggggg cgggctgccg 780
gccgagactt ctggatggcg gcggccgcgg ctccgccccg ggttcccacc gcctgaaggg 840
cgagacaagc ccgacctgct acaggcactc gtgggggtgg gggaggagcg ggggtcggtc 900
cggctggttt gtgggtggga ggcgcttgtt ctccaaaaac cggcgcgagc tgcaatcctg 960
agggagctgc ggtggaggag gtggagagaa ggccgcaccc ttctgggcag ggggagggga 1020
gtgcccaat acctttatgg gagttctttg ctgcctcccg tcttgaagc accgccctgg 1080
gcctggaaga agccctccct cctttcctcc tcgcgtgatc tcgtcatcgc ctccatgtcg 1140
agtcgcttct cgattatggg cgggattctt ttgcctagac aattgtacta accttcttct 1200
ctttcctctc ctgacag 1217

<210> 55

<211> 1494

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 55

gcgttacata acttacggta aatggccccg ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgcccagt 240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgtatta 300
ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
cagcgcgggc ggcggcgag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
10 tacaagtccc agggggcctg gcgggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcgcgg 540

ES 2 619 407 T3

aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
ggagggggcc ggatccacta gcgtgagtag cgggctgctg ggctggcccg ggctttcgtg 720
gccgcggggc cgtcgggtgg gacggaagcg tgtggagaga ccgccaaggg ctgtagtctg 780
ggtccgcgag caaggttgcc ctgaactggg ggttgggggg agcgcagcaa aatggcggct 840
gttcccagat ctggaatgga agacgcttgt gaggcgggct gtgaggtcgt tgaacaagg 900
tggggggcat ggtggcggc aagaacccaa ggtcttgagg ccttcgctaa tgcgggaaag 960
ctcttattcg ggtgagatgg gctggggcac catctgggga ccctgacgtg aagtttgtca 1020
ctgactggag aactcggttt gtcgtctgtt gcggggcggc cagttatggc ggtgcgctt 1080
ggcagtgcac ccgtaccctt gggagcgcgc gccctcgtcg tgcgtgacg tcaccgctt 1140
tggtggctta taatgcaggg tggggccacc tgccggtagg tgtgcggtag gcttttctcc 1200
gtcgcaggac gcagggttcg ggcctagggg aggtctcct gaatcgacag gcgccggacc 1260
tctggtgagg ggagggataa gtgaggcgtc agtttctttg gtcggtttta tgtacctatc 1320
ttcttaagta gctgaagctc cggttttgaa ctatgcgctc ggggttggcg agtgtgtttt 1380
gtgaagtttt ttaggcacct tttgaaatgt aatcatttgg gtcaatatgt aattttcagt 1440
gtagactag taaattgtcc gctaaattct ggccgttttt ggcttttttg ttag 1494

<210> 56

<211> 1918

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 56

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgccagt 240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
cagcgcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctcggct cccctggcc tctcgggaac 480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
agcccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
10 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660

ES 2 619 407 T3

ggagggcgcc ggatccacta gtctcagaga gcctcggcta ggtaggggag cggaactctg 720
 gtgggagggg aggtgcggtg cactgggggg atgggtggct aggggggccc tctggtggct 780
 tgcgggggtt gcctttcccg tgggaagtgc ggaacataat gtttgttacg ttgggagggg 840
 aaggggtggc tggatgcagg cgggagggag gcccgcctcg cggcaaccgg agggggaggg 900
 agaagggagc ggaaaatgct cgaaaccgga cggagccatt gctctcgag agggaggagc 960
 gcttccggct agcctcttgt cgccgattgg ccgtttctcc tcccgccgtg tgtgaaaaca 1020
 caaatggcgt attctgggtg gagtaaagct cctgtcagtt acaccgtcgg gagtacgcag 1080
 ccgcttagcg actctcgcgt tgccccctgg gtggggcggg taggtaggtg ggggtgtagag 1140
 atgctgggtg tgcgggcgcg gccggcctcc tgcggcggga ggggaggtc agtgaattg 1200
 gctctggcgc gggcgtcctc ccaccctccc ctctctcgg gggagtccgt ttaccgcgcg 1260
 cctgcttgtc ttgcacacct gattggctgt cgaagctgtg ggaccgggcc cttgctactg 1320
 gctcgagtct cacatgagcg aaaccactgc gcggggcgcg ggggtggcgg ggaggcgggc 1380
 gttggtacgg tcctccccga ggccgagcgc cgcagtgtct ggccccgcgc ccctgcgcaa 1440
 cgtggcagga agcgcgcgct ggaggcgggg gcgggctgcc ggccgagact tctggatggc 1500
 ggcggccgcg gctccgcccc gggttccca cgcctgaagg gcgagacaag cccgacctgc 1560
 tacaggcact cgtgggggtg ggggagagc gggggtcggc ccggctggtt tgtgggtggg 1620
 aggcgcttgt tctccaaaaa ccggcgcgag ctgcaatcct gagggagctg cgggtggagga 1680
 ggtggagaga aggccgcacc cttctgggca gggggagggg agtgccgcaa tacctttatg 1740
 ggagttcttt gctgcctccc gtcttgaag gaccgccctg ggcctggaag aagccctccc 1800
 tcctttcctc ctgcgctgat ctcgatcatg cctccatgtc gagtcgcttc tcgattatgg 1860
 gcgggattct tttgcctaga caattgtact aaccttcttc tctttcctct cctgacag 1918

<210> 57

<211> 1779

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 57

gcgttacata acttacggta aatggccgcg ctggctgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgcccagt 240
 10 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300

ES 2 619 407 T3

ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tgggggcgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcgggcgag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcccg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcgcg cgggcgcggt 660
 ggaggcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgcg cctccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggtctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgtttc tgttctgcg cgttacagat cactaggatc 960
 cactagcgtg agtagcggc tgctggctg gccgggctt tcgtggccgc cgggcccgtc 1020
 ggtgggacgg aagcgtgtg agagaccgcc aaggctgta gtctgggtcc gcgagcaagg 1080
 ttgccctgaa ctgggggtg gggggagcgc agcaaatg cggtgttcc cgagtctga 1140
 atggaagacg cttgtgaggc gggctgtgag gtcgttga aaaggtggg ggcattgtgg 1200
 gcgcaagaa cccaaggtct tgaggcctc gctaagcgg gaaagctctt attcgggtga 1260
 gatgggctgg ggcaccatct ggggaccctg acgtgaagtt tgtcactgac tggagaactc 1320
 ggtttgtcgt ctgttgccgg ggcggcagtt atggcggtc cgttgggcag tgcaccgta 1380
 cctttgggag cgcgcgccct cgtcgtgtcg tgacgtcacc cgttctgttg gcttataatg 1440
 cagggtgggg ccacctgcc gtaggtgtgc ggtaggctt tctccgtcgc aggacgcagg 1500
 gttcgggctt agggtaggct ctccgaatc gacagggccc ggacctctg tgaggggagg 1560
 gataagtgag gcgtcagttt ctttggtcgg tttatgtac ctatctctt aagtagctga 1620
 agctccggtt ttgaactat gcctcggggt tggcaggtg gttttgtgaa gtttttagg 1680
 cacctttga aatgtaatca tttgggtcaa tatgtaatt tcagtgtag actagtaaat 1740
 tgccgctaa attctggccg tttttgctt tttgttag 1779

<210> 58

<211> 2168

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 58

gcgttacata acttacggta aatggccccg ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60

10 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttcc cattgacgtc 120

ES 2 619 407 T3

aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc	180
caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccagat	240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta	300
ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc	360
ccggctcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg	420
cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac	480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggg cggcgcgcg	540
aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc	600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt	660
ggagcggccc ggatcctagt gtttaaacag agtaatgaca tggttccttc catcctccaa	720
aggtgaccaa taatagttt taagtatcat tatgaactaa tgaatcttca acatatttga	780
tatatttcaa tccattgcca tcattgttct tatcgtatatt tgagttggct cactttgcca	840
gtaagagtct attcaaattg gcttctgagt ccatttgaca caacacctt gatccttgac	900
agtttccttg gttttagtg ctagatgatt tctcaggctc accttagaca tttcctgcca	960
cagacttaga atcagccatt tctctaagga ccctgattcc atttcatgag aatgataga	1020
gaccacaatc aaaacaagtc atgaatttat actgatattt tcaattcaaa ttaaagatga	1080
ggtttttgct aaatctttt gagtttata ttgtatgtct tatgctgaaa aatcttgttt	1140
cctaattagt aacataatta ttcatttgat gggtaaatat tttagggccg attccttggg	1200
tttatagcca agataccctg ttgataaagt cttgtgggag caattataag actggcttat	1260
tttgaagctt tttaaaaaag acatccttac ctgttttaac tgtagattat attaacttaa	1320
ataggtacag cccacgctt actaggatcc actagcgtga gtagcgggct gctgggctgg	1380
ccggggcttt cgtggccgcc gggccgctcg gtgggacgga agcgtgtgga gagaccgcca	1440
agggctgtag tctgggtccg cgagcaaggt tgcctgaac tgggggttg ggggagcgc	1500
gcaaaatggc ggctgttccc gagtctttaa tgggaagcgc ttgtgaggcg ggctgtgagg	1560
tcgttgaaac aaggtgggg gcattggtgg cggcaagaac ccaaggtcct gaggccttcg	1620
ctaagcggg aaagctctta ttcgggtgag atgggctggg gcaccatctg gggaccctga	1680
cgtgaagttt gtcactgact ggagaactcg gtttgcgctc tgttgcgggg gcggcagtta	1740
tggcggtgcc gttgggcagt gcacccgtac ctttgggagc gcgcgcctc gtcgtgctg	1800
gacgtcacc gttctgttg cttataatgc aggggtgggg cacctgccg taggtgtgcg	1860
gtaggctttt ctccgtcgca ggacgcaggg ttcgggccta gggtaggctc tctgaatcg	1920
acagggcggc gacctctggt gaggggaggg ataagtgagg cgtcagtttc tttggtcgg	1980
tttatgtacc tatcttctta agtagctgaa gctccggtt tgaactatgc gctcgggggt	2040
ggcagtggtg ttttgtgaag ttttttaggc acctttttaa atgtaatcat ttgggtcaat	2100
atgtaatttt cagtgttaga ctagtaaatt gtccgctaaa tctggccgt ttttggcttt	2160
tttgttag	2168

ES 2 619 407 T3

<210> 59

<211> 1825

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

5 <220>

<223> secuencia artificial

<400> 59

gcgttacata	acttacggta	aatggcccgc	ctggctgacc	gcccacgac	ccccgccat	60
tgacgtcaat	aatgacgtat	gttcccatag	taacgccaat	agggactttc	cattgacgtc	120
aatgggtgga	gtatttacgg	taaactgccc	acttggcagt	acatcaagtg	tatcatatgc	180
caagtacgcc	ccctattgac	gtcaatgacg	gtaaatggcc	cgctggcat	tatgcccagt	240
acatgacctt	atgggacttt	cctacttggc	agtacatcta	cgtattagtc	atcgctatta	300
ccatggcccc	ggtcgcgaca	tgcagcggga	cgccaccacc	cgagccccag	ctccggcgcc	360
ccggctcccc	gcgccccca	tggggccgc	cgctagtagt	ggcggcgcg	gaggcgggg	420
cagcggcggc	ggcggcggag	gcccctctgc	agctccggct	ccccctggcc	tctcgggaac	480
tacaagtccc	agggggcctg	gcgggtggcg	gcgggcggaa	gaggcggggt	cggcgccgog	540
aggccggaag	tggccgtgga	ggcggaaagt	gcgcggccgc	ggaggggcct	ggagtgcggc	600
ggcggcggga	cccggagcag	gagcggcggc	agcagcgact	gggggcggcg	gcggcgcggt	660
ggagcgggcc	ggatccgttt	aacgctggtg	ggtagggatg	agggaggag	gggcattgtg	720
atgtacaggg	ctgctctgtg	agatcaaggg	tctcttaagg	gtgggagctg	gggcagggac	780
tacgagagca	gccagatggg	ctgaaagtgg	aactcaaggg	gtttctggca	cctacctacc	840
tgcttcccgc	tgggggtg	ggagttggcc	cagagtctta	agattggggc	agggtgagaga	900
ggtgggctct	tctgcttcc	cactcatctt	atagctttct	ttcccagat	ccgaattcga	960
gatccaaacc	aaggaggaaa	ggatatcaca	gaggagagct	aggatccact	agcgtgagta	1020
gcgggctgct	gggctggccg	gggctttcgt	ggccgccggg	ccgctcggtg	ggacggaagc	1080
gtgtggagag	accgccaagg	gctgtagtct	gggtccgcga	gcaaggttgc	cctgaactgg	1140
gggttggggg	gagcgcagca	aatggcggc	tgttcccag	tcttgaatgg	aagacgcttg	1200
tgaggcgggc	tgtgaggtcg	ttgaaacaag	gtggggggca	tgggtggcgg	caagaaccca	1260
aggtcttgag	gccttcgcta	atgcgggaaa	gctcttattc	gggtgagatg	ggctggggca	1320
ccatctgggg	accctgacgt	gaagtttgtc	actgactgga	gaactcggtt	tgctctctgt	1380

ES 2 619 407 T3

tgcgggggcg gcagttatgg cggtgccggt gggcagtgca cccgtacctt tgggagcgcg 1440
 cgccctcgtc gtgtcgtgac gtcacccggt ctgttggtt ataatgcagg gtggggccac 1500
 ctgccggtag gtgtgcggtg ggcttttctc cgtcgcagga cgcagggttc gggcctaggg 1560
 taggctctcc tgaatcgaca ggcgcgggac ctctggtgag gggagggata agtgaggcgt 1620
 cagtttcttt ggtcggtttt atgtacctat cttcttaagt agctgaagct cgggttttga 1680
 actatgcgct cggggttggc gagtgtgttt tgtgaagttt tttaggcacc ttttgaaatg 1740
 taatcatttg ggtcaatatg taattttcag tgttagacta gtaaattgtc cgctaaattc 1800
 tggccgtttt tggttttttt gttag 1825

<210> 60

<211> 2447

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 60

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggtgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cgcagcccag ctccgcgccc 360
 cgggtctccc cgcccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtgggcg gcggcgggaa gaggcggggt cggcgcgcgcg 540
 aggccggaag tggcogtggg ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggagggcggc ggatccggtt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac 720
 ctgagggcgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgcc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgcgctct aggttaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggtctctc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960
 taacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020
 10 gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080

ES 2 619 407 T3

ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag 1320
aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag 1380
tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattattc 1440
atgtgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg 1500
ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact 1620
agttgatcca ctagcgtgag tagcgggctg ctgggctggc cggggctttc gtggccgccg 1680
ggccgctcgg tgggacggaa gcgtgtggag agaccgcaa gggctgtagt ctgggtccgc 1740
gagcaaggtt gccctgaact gggggttggg gggagcgcag caaaatggcg gctgttcccg 1800
agtcttgaat ggaagacgct tgtgagggcg gctgtgaggt cggtgaaaca aggtgggggg 1860
catggtgggc ggcaagaacc caaggtcttg aggccttcgc taatgcggga aagctcttat 1920
tcgggtgaga tgggctgggg caccatctgg ggaccctgac gtgaagtttg tcaactgactg 1980
gagaactcgg tttgtcgtct gttgcggggg cggcagttat ggcggtgccg ttgggcagtg 2040
caccctacc tttgggagcg cgcgcctcgc tcgtgtcgtg acgtcaccg ttctgttggc 2100
ttataatgca ggttggggcc acctgccggt aggtgtgcgg taggcttttc tccgtcgcag 2160
gacgcagggg tcgggcctag ggtaggtctt cctgaatcga caggcgcgg acctctggtg 2220
aggggagggg taagtgaggg gtcagtttct ttggtcgggtt ttatgtacct atcttcttaa 2280
gtagctgaag ctccggtttt gaactatcgc ctccggggtt gcgagtgtgt tttgtgaagt 2340
tttttaggca ctttttgaat tgtaatcatt tgggtcaata tgtaattttc agtgtagac 2400
tagtaaattg tccgctaaat tctggccggt tttggctttt ttgttag 2447

<210> 61

<211> 2447

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 61

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acctggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
10 caagtaacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgcccagt 240

ES 2 619 407 T3

acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgcctatta 300
 ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcggc 360
 ccggctcccc gcgccccca tccggggcgc cgctagtagt ggccggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggccggcggg gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gagcgggggt cggcgcgcgcg 540
 aggcgcgaag tggccgtgga ggccgaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggccggcggg cccggagcag gagcggcggc agcagcagct gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggagcggccc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgccc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccg cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020
 gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggtcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttgggt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct 1260
 ctaaggaccc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag 1320
 aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa ttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattattc 1440
 atttgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttgatcca ctagcgtgag tagcgggctg ctgggctggc cggggctttc gtggcccgcc 1680
 ggccgctcgg tgggacggaa gcgtgtggag agaccgcaa gggctgtagt ctgggtccgc 1740
 gagcaaggtt gccctgaact gggggttggg gggagcgcag caaaatggcg gctgttcccg 1800
 agtcttgaat ggaagacgct tgtgaggcg gctgtgaggt cgttgaaca aggtggggg 1860
 catggtgggc ggcaagaacc caaggtcttg aggccttcgc taatgcggga aagctcttat 1920
 tcgggtgaga tgggctggg caccatctgg ggacctgac gtgaagtttg tcaactgactg 1980
 gagaactcgg tttgtcgtct gttgcggggg cggcagttat ggcggtgccg ttgggcagtg 2040
 caccctacc tttgggagcg cgcgcctcgc tcgtgtcgtg acgtcaccgc ttctgttggc 2100

ES 2 619 407 T3

ttataatgca gggtagggcc acctgcccgt aggtgtgagg taggcttttc tccgtcgcag 2160
gacgcagggg tggggcctag ggtaggctct cctgaatcga caggcggccg acctctgggtg 2220
aggggagggg taagtgaggc gtcagtttct ttggtcgggt ttatgtacct atcttcttaa 2280
gtagctgaag ctccggtttt gaactatgcg ctccggggtg gcgagtgtgt tttgtgaagt 2340
tttttaggca ccttttgaaa tgtaatcatt tgggtcaata tgtaattttc agtggttagac 2400
tagtaaatg tccgctaata tctggccggt tttggctttt ttggttag 2447

<210> 62

<211> 2483

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 62

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
caagtacgcc cctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgccaggt 240
acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggccggcggc gaggcggggg 420
cagcggcggc ggcggcggag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
tacaagtccc agggggcctg gcggtggcgc gcggcgggaa gaggcggggt cggcgcggcg 540
aggccggaag tggcctgga ggcggaagt gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
ggagcggcc ggatcaaaca gagtaatgac atggttctct ccatcctcca aaggtgacca 720
ataatagttt gtaagtatca ttatgaacta atgaattttc aacatatttg atatatttca 780
atccattgcc atcattgttc ttatcgatat ttgagttggc tcactttgcc agtaagagtc 840
tattcaaatt ggcttctgag tccattgac acaacacctt tgatctttga cagtttctct 900
ggttttaggt gctagatgat ttctcaggct caccttagac atttctgcc acagacttag 960
aatcagccat ttctctaagg accctgattc catttcatga gaaatgatag agaccacaat 1020
caaaacaagt catgaattta tactgatatt ttcaattcaa attaaagatg aggtttttgc 1080
taaatttttt tgagtttata tttgtatgtc ttatgctgaa aaatcttgtt tcctaattag 1140
taacataatt attcatttga tgggtaaata ttttagggcc gattctttgg ttttatagcc 1200
10 aagataccct gttgataaag tottgtggga gcaattataa gactggctta ttttgaagct 1260

ES 2 619 407 T3

ttttaaaaaa gacatcctta cctgttttaa ctgtagatta tattaactta aataggtaca 1320
 gccacgcctt gactagttaa cgctggtggg tagggatgag ggagggaggg gcattgtgat 1380
 gtacagggct gctctgtgag atcaagggtc tcttaagggt gggagctggg gcagggacta 1440
 cgagagcagc cagatgggct gaaagtggaa ctcaagggtt ttctggcacc tacctacctg 1500
 cttcccgtg gggggtggg agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg 1560
 tgggctcttc ctgcttccca ctcatcttat agctttcttt ccccagatcc gaattcgaga 1620
 tccaaaccaa ggaggaaagg atatcacaga ggagagctag gatccactag cgtgagtagc 1680
 gggctgctgg gctggccggg gctttcgtgg ccgcccggcc gctcgggtgg acggaagcgt 1740
 gtggagagac cgccaagggc tgtagtctgg gtcccgagc aaggttgcc tgaactgggg 1800
 gttgggggga gcgcagcaaa atggcggctg ttcccagtc ttgaatggaa gacgcttggtg 1860
 aggcgggctg tgaggctgtt gaaacaagggt ggggggcatg gtgggcgga agaaccacaag 1920
 gtcttgagge cttcgctaata ggggaaagc tcttattcgg gtgagatggg ctggggcacc 1980
 atctggggac cctgacgtga agtttgtcac tgactggaga actcggtttg tctctgttg 2040
 cggggcgccg agttatggcg gtgccgttgg gcagtgcacc cgtaccttg ggagcgcgcg 2100
 ccctcgtcgt gtcgtgacgt caccggttct gttggttat aatgcagggt ggggccacct 2160
 gccgtaggt gtgcggtagg cttttctccg tcgcaggacg cagggttcgg gcctagggta 2220
 ggctctcctg aatcgacagg cgccggacct ctggtgaggg gagggataag tgaggcgtca 2280
 gtttcttttg tcggttttat gtacctatct tcttaagtag ctgaagctcc ggttttgaac 2340
 tatgcgctcg gggttggcga gtgtgttttg tgaagtttt taggcacct ttgaaatgta 2400
 atcatttggg tcaatatgta attttcagtg ttagactagt aaattgtccg ctaaattctg 2460
 gccgtttttg gcttttttgt tag 2483

<210> 63

<211> 2769

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 63

gcgttacata acttacggta aatggccgc ctggtgacc gccaacgac cccgcccac 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgccagtc 240
 10 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300

ES 2 619 407 T3

ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccca tggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gagcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct ccccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggcggcg gcgggcggaa gagcggggt cggcgcgcg 540
 aggcgggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggcgc ggaggggcct ggagtgcgc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
 ctgagccgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgccc cctcccgcct gtggtgctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctgactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960
 taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagttttaa 1020
 gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
 ttgttcttat cgatatttga gttggctcac ttggccagta agagtctatt caaattggct 1140
 tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
 gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaato agccatttct 1260
 ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcatg 1320
 aattatact gatattttca attcaaatta aagatgagg ttttgctaaa ttttttgag 1380
 tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc 1440
 attgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgtt 1500
 ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggctattttt gaagcttttt aaaaaagaca 1560
 tccttaoctg ttttaactgt agattatatt aacttaata ggtacagccc acgcttgact 1620
 agttaacgct ggtgggtagg gatgaggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc 1680
 tgtgagatca agggctctctt aagggtggga gctggggcag ggactacgag agcagccaga 1740
 tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg 1800
 gtggggagt ggcccagagt cttagattg ggcagggg gagaggtggg ctcttcctgc 1860
 tcccactca tcttatagct ttctttccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag 1920
 gaaaggatat cacagaggag agctaggatc cactagcgtg agtagcggc tgetgggctg 1980
 gccgggctt tcgtggccgc cgggcccctc ggtgggacgg aagcgtgtgg agagaccgcc 2040
 aaggctgta gtctgggtcc gcgagcaagg ttgccctgaa ctgggggttg gggggagcgc 2100
 agcaaatag cggctgttcc cgagtctga atggaagacg cttgtgaggc gggctgtgag 2160
 gtcgttgaaa caagtgggg ggcattgggg gcggcaagaa cccaaggtct tgaggcctc 2220

ES 2 619 407 T3

gctaatacgcg gaaagctctt attcgggtga gatgggctgg ggcaccatct ggggaccctg 2280
 acgtgaagtt tgtcactgac tggagaactc ggtttgtcgt ctggtgcggg ggcggcagtt 2340
 atggcgggtgc cgttgggcag tgcacccgta cctttgggag cgcgcgccct cgtcgtgtcg 2400
 tgacgtcacc cgttctgttg gcttataatg cagggtgggg ccacctgccg gtaggtgtgc 2460
 ggtaggcttt tctccgtcgc aggacgcagg gttcgggcct agggtaggct ctctgaatc 2520
 gacaggcgcg ggacctctgg tgaggggagg gataagtgag gcgtcagttt ctttggtcgg 2580
 ttttatgtac ctatcttctt aagtagctga agctccggtt ttgaactatg cgctcggggt 2640
 tggcgagtgt gttttgtgaa gtttttagg caccttttga aatgtaatca tttgggtcaa 2700
 tatgtaattt tcagtgtag actagtaaat tgtccgctaa attctggccg tttttgctt 2760
 ttttgtag 2769

<210> 64

<211> 2193

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 64

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgtatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
 ccggtcccc cgcccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcgggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggt cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcggaa gaggcgggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagcggcc ggatccgttt aaacggctcg catctctct tcacgcgcc gccgccctac 720
 ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggtctctc acgctttgcc tgaccctgct 900
 10 tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtctc 960

ES 2 619 407 T3

agagagcctc ggctaggtag gggagcggaa ctctggtggg aggggaggtg cgggtgactg 1020
 ggggatggg tggctagggg ggccgtctgg tggcttgcgg gggttgcctt tcccgtggga 1080
 agtcgggaac ataatgtttg ttacgttggg agggaaaggg gtggctggat gcagcggga 1140
 gggagccccg ccctgcccga accggagggg gagggagaag ggagcggaaa atgctcgaaa 1200
 ccggacggag ccattgctct cgcagaggga ggagcgttc cggctagcct cttgtcggcg 1260
 attggccgtt tctcctcccg ccgtgtgtga aaacacaaat ggcgtattct ggttggagta 1320
 aagctcctgt cagttacacc gtcgggagta cgcagccgct tagcgactct cgcgttggcc 1380
 cctgggtggg gcgggtaggt aggtggggtg tagagatgct ggggtgtcgg gcgcggccgg 1440
 cctcctcggg cgggagggga gggtcagtga aattggctct ggcgcggggc tcctcccacc 1500
 ctccccttc ttccggggag tcggtttacc cgcgcctgc ttgtcttga cacctgattg 1560
 gctgtcgaag ctgtgggacc gggccctgc tactggctcg agtctcacat gagcgaacc 1620
 actgcgcggg gcgcgggggt ggcggggagg cgggcgttgg tacggtcctc cccgaggccg 1680
 agcgcgccag tgtctggccc cgcgccctg cgcaacgtgg caggaagcgc gcgctggagg 1740
 cggggcggg ctgccggccg agacttctgg atggcggcgg ccgcggctcc gccccgggtt 1800
 cccaccgct gaagggcgag acaagcccga cctgctacag gcaactcgtg ggggtgggga 1860
 ggagcggggg tcggtccggc tggtttgtgg gtgggaggcg cttgttctcc aaaaaccggc 1920
 gcgagctgca atcctgaggg agctgcggtg gaggaggtg agagaaggcc gcacccttct 1980
 gggcaggggg aggggagtgc cgcaatacct ttatgggagt tctttgctgc ctcccgtctt 2040
 gtaaggaccg ccctgggctt ggaagaagcc ctccctcctt tcctcctcgc gtgatctgt 2100
 catcgcctcc atgtcagtc gcttctcgat tatggcggg attcttttgc ctagacaatt 2160
 gtactaacct tcttctctt cctctcctga cag 2193

<210> 65

<211> 2584

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 65

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggtgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 10 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cgagcccag ctccggcgcc 360

ES 2 619 407 T3

ccggtcccc gcgccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcggggt cggcgcgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcgcgggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcggt 660
 ggagcggcc ggatccacta gtgtttaaac agagtaatga catggttcct tccatcctcc 720
 aaagtgacc aataatagtt tgtaagtatc attatgaact aatgaatttt caacatattt 780
 gatataattc aatccattgc catcattggt cttatcgata tttgagttgg ctcactttgc 840
 cagtaagagt ctattcaaat tggcttctga gtccattga cacaacacct ttgatctttg 900
 acagtttctc tggtttttag tgctagatga tttctcaggc tcaccttaga catttcctgc 960
 cacagactta gaatcagcca tttctctaag gaccctgatt ccatttcatg agaaatgata 1020
 gagaccacaa tcaaaacaag tcatgaattt atactgatat tttcaattca aattaaagat 1080
 gaggtttttg ctaaattttt ttgagtttat atttgtatgt cttatgctga aaaatcttgt 1140
 ttcctaatta gtaacataat tattcatttg atgggtaa attttagggc cgattctttg 1200
 gttttatagc caagataccc tgttgataaa gtcttgtggg agcaattata agactggctt 1260
 attttgaagc tttttaaaaa agacatcctt acctgtttta actgtagatt atattaactt 1320
 aaataggtac agcccacgct tgactagtct cagagagcct cggctaggtg ggggagcggg 1380
 actctggtgg gaggggaggt gcggtgcact ggggggatgg gtggctaggg gggccgtctg 1440
 gtggcttgcg ggggttgcc ttcctggtgg aagtcgggaa cataatgttt gttacgttgg 1500
 gagggaaagg ggtggctgga tgcagggggg agggagggcc gccctgcggc aaccggaggg 1560
 ggagggagaa gggagcggaa aatgctcga accggacgga gccattgctc tcgcagaggg 1620
 aggagcgtt ccggctagcc tcttgcgcc gattggcgtt ttctcctccc gccgtgtgtg 1680
 aaaacacaaa tggcgtattc tggttggagt aaagctcctg tcagttacac cgtcgggagt 1740
 acgcagccgc ttagcgaactc tcgcgttgcc ccctgggtgg ggcgggtagg taggtgggg 1800
 gtagagatgc tgggtgtgcg ggcgcggccg gcctcctgcg gcgggagggg agggtcagtg 1860
 aaattggctc tggcgcgggc gtcctcccac cctccccttc cttcggggga gtcggtttac 1920
 ccgccgctg cttgtcttcg acacctgatt ggctgtcgaa gctgtgggac cgggcccttg 1980
 ctactggctc gagtctcaca tgagcgaaac cactgcgcgg ggcgcggggg tggcggggag 2040
 gcgggcgttg gtacggctct ccccgaggcc gagcgcgca gtgtctggcc ccgcgccct 2100
 gcgcaacgtg gcaggaagcg cgcctggag gcggggggcg gctgcggcc gagacttctg 2160
 gatggcggcg gccgcggctc cgcgggggt tcccaccgcc tgaagggcga gacaagccc 2220

ES 2 619 407 T3

acctgctaca ggcactcgtg ggggtggggg aggagcgggg gtcggtccgg ctggtttggt 2280
 ggtgggaggc gcttggtctc caaaaaccgg cgcgagctgc aatcctgagg gagctgcggt 2340
 ggaggaggtg gagagaaggc cgcacccttc tgggcagggg gaggggagtg ccgcaatacc 2400
 tttatgggag ttctttgctg cctcccgtct tgtaaggacc gccctgggcc tggaagaagc 2460
 cctccctcct ttctcctcgg cgtgatctcg tcatcgctc catgtcgagt cgcttctcga 2520
 ttatggcggg gattcttttg cctagacaat tgtactaacc ttcttctctt tcctctcctg 2580
 acag 2584

<210> 66

<211> 2239

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 66

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttct cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccga tggggccgc cgctagtagt ggcgggcgcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
 ggagggcgcc ggatccgttt aacgctggtg ggtagggatg agggaggag gggcattgtg 720
 atgtacaggg ctgctctgtg agatcaagg tctcttaagg gtgggagctg gggcagggac 780
 tacgagagca gccagatggg ctgaaagtgg aactcaagg gtttctggca cctacctacc 840
 tgcttcccgc tggggggtg ggagttggcc cagagtctta agattggggc aggggtggaga 900
 ggtgggctct tcctgcttcc cactcatctt atagctttct ttcccagat ccgaattcga 960
 gatccaaacc aaggagaaa ggatatcaca gaggagagct agtctcagag agcctcggct 1020
 aggtagggga gcggaactct ggtgggagg gagtgcggt gcaactgggg gatgggtggc 1080
 taggggggcc gtctggtggc ttgcgggggt tgctttccc gtgggaagtc gggaacataa 1140
 10 tgtttgttac gttgggaggg aaaggggtgg ctggatgcag gcgggagga ggcccgcct 1200

ES 2 619 407 T3

gcggcaaccg gaggggag gagaaaggag cggaaaatgc tcgaaaccgg acggagccat 1260
 tgctctcgca gagggaggag cgcttccggc tagcctcttg tcgccgattg gccgtttctc 1320
 ctcccgcgt gtgtgaaaac acaaatggcg tattctgggt ggagtaaagc tcctgtcagt 1380
 tacaccgtcg ggagtacgca gccgcttagc gactctcgcg ttgccccctg ggtggggcgg 1440
 gtaggtaggt ggggtgtaga gatgctgggt gtgcgggcgc ggccggcctc ctgcggcggg 1500
 aggggagggc cagtgaaatt ggctctggcg cgggcgtcct cccaccctcc ccttccttgc 1560
 ggggagtcgg tttaccgcc gcctgcttgt cttcgacacc tgattggctg tcgaagctgt 1620
 gggaccgggc ccttgctact ggctcgagtc tcacatgagc gaaaccactg cgcggggcgc 1680
 gggggtgggc gggaggcggc cgttggtagc gtctccccg aggcggagcg ccgcagtgtc 1740
 tggccccgcg ccctgcgca acgtggcagg aagcgcgcgc tggaggcggg ggcgggctgc 1800
 cggccgagac tctggatgg cggcgcccgc ggctccgcc cgggttccca ccgcctgaag 1860
 ggcgagacaa gcccacactg ctacaggcac tcgtgggggt gggggaggag cgggggtcgg 1920
 tccggctggt ttgtgggtgg gaggcgctt tctccaaaa accggcgcga gctgcaatcc 1980
 tgagggagct gcggtggagg aggtggagag aaggccgcac ccttctgggc agggggaggg 2040
 gagtgccga atacctttat gggagttctt tgctgcctcc cgtcttgtaa ggaccgccct 2100
 gggcctggaa gaagccctcc ctctttcct cctcgcgtga tctcgtcac gcctccatgt 2160
 cgagtcgctt ctcgattatg ggcgggattc tttgcctag acaattgtac taaccttctt 2220
 ctctttcctc tcctgacag 2239

<210> 67

<211> 2859

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 67

gcggttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggc cgctggcat tatgccagtc 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatgccccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacce cgagccccag ctccggcgc 360
 ccggctcccc gcgccccca tggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 10 cagcgcgggc ggcggcggag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcggaac 480

ES 2 619 407 T3

tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcgggcggaa gaggcgggt cggcgcccg 540
agcccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcggccgc ggagggcct ggagtgcgc 600
ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcact gggggcggcg gcggcgcgtt 660
ggagggggcc ggatccggtt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720
ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgcg cctcccgcct gtggtgcctc 780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc 840
ggcgcctcct tggagcctac ctagactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct 900
tgctcaactc tacgtctttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt 960
taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttgtaa 1020
gtatcattat gaactaatga attttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca 1080
ttgttcttat cgatatttga gttgctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct 1140
tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta 1200
gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaato agccatttct 1260
ctaaggacc tgattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcag 1320
aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag 1380
tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc 1440
attgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg 1500
ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaagaca 1560
tccttaoctg ttttaactgt agattatatt aaottaata ggtacagccc acgcttgact 1620
agtctcagag agcctcggct aggtagggga gcggaactct ggtgggaggg gaggtgcggt 1680
gcactggggg gatgggtggc tagggggggc gtctggtggc ttgcgggggt tgcctttccc 1740
gtgggaagtc gggaaacataa tgtttgttac gttgggaggg aaaggggtgg ctggatgcag 1800
gcgggagggg ggccccccct gcggcaaccg gagggggagg gagaaggag cggaatatgc 1860
tcgaaaccgg acggagccat tgctctcgca gagggaggag cgcttccggc tagcctcttg 1920
tcgccgattg gccgtttctc ctcccgcctg gtgtgaaaac acaaatggcg tattctggtt 1980
ggagtaaagc tcctgtcagt tacaccgtcg ggagtacgca gccgcttagc gactctcgcg 2040
ttgccccctg ggtggggcgg gtaggtaggt ggggtgtaga gatgctgggt gtgcgggcgc 2100
ggccggcctc ctgcggcggg aggggagggg cagtgaaatt ggctctggcg cgggcgtcct 2160
cccaccctcc ccttctctcg ggggagtcgg tttaccgcc ccctgcttgt cttcgacacc 2220
tgattggctg tcgaagctgt gggaccgggc ccttgcact ggctcgagtc tcacatgagc 2280
gaaaccactg cgcggggcgc ggggggtggc gggaggcggg cgttggtacg gtctccccg 2340
agcccgagcg ccgcagtgtc tggccccgcg cccctgcgca acgtggcagg aagcgcgcgc 2400

ES 2 619 407 T3

tggagcgggg ggcgggctgc cggccgagac ttctggatgg cggcggccgc ggctccgccc 2460
 cgggttccca ccgcctgaag ggcgagacaa gcccgacctg ctacaggcac tcgtgggggt 2520
 gggggaggag cgggggtcgg tccggctggt ttgtgggtgg gaggcgcttg ttctccaaaa 2580
 accggcgoga gctgcaatcc tgaggagct gcggtggagg aggtggagag aaggccgcac 2640
 ccttctgggc agggggaggg gagtgccgca atacctttat gggagttctt tgctgcctcc 2700
 cgtcttgtaa ggaccgccct gggcctggaa gaagccctcc ctctttcct cctcgcgtga 2760
 tctcgtcacc gcctccatgt cgagtcgctt ctcgattatg ggcgggattc ttttgcctag 2820
 acaattgtac taaccttctt ctctttcctc tcctgacag 2859

<210> 68

<211> 2517

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 68

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgcccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacccaat agggactttc cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg gtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccgcgccc 360
 cggctcccc cgcccccga tcggggccgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcggag gcgcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcgc gcggcggaa gaggcgggggt cggcgcgcgcg 540
 aggccggaag tggcogtga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgcgctt 660
 ggagggcggc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgccctac 720
 ctgagggcgc catccacgcc ggttgagtgc cgttctgccc cctcccgcct gtggtgcctc 780
 ctgaactgcg tccgcgtct aggttaagttt aaagctcagg tcgagaccgc gcctttgtcc 840
 ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggtctccc acgctttgcc tgaccctgct 900
 tgctcaactc tacgtctttg ttctgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagttaa 960
 cgctggtggg tagggatgag ggagggagg gcatgtgat gtacagggct gctctgtgag 1020
 10 atcaagggtc tcttaagggt gggagctggg gcagggacta cgagagcagc cagatgggct 1080

ES 2 619 407 T3

gaaagtggaa ctcaaggggt ttctggcacc tacctacctg cttcccctg gggggtggg 1140
 agttggccca gagtcttaag attggggcag ggtggagagg tgggctcttc ctgcttccca 1200
 ctcatcttat agctttcttt cccagatcc gaattcgaga tccaaaccaa ggaggaaagg 1260
 atatcacaga ggagagctag tctcagagag cctcggctag gtaggggagc ggaactctgg 1320
 tgggagggga ggtgcggtgc actgggggga tgggtggcta gggggccgt ctggtggctt 1380
 gcgggggttg cctttcccg tgggaagtcgg gaacataatg tttgttacgt tgggaggaa 1440
 aggggtggct ggatgcaggc gggaggagg cccgccctgc ggcaaccgga gggggaggga 1500
 gaagggagcg gaaaaatgctc gaaaccggac ggagccattg ctctcgaga gggaggagcg 1560
 cttccgcta gcctctgtc gccgattggc cgtttctcct cccgccgtgt gtgaaaacac 1620
 aatggcgta ttctggttg agtaaagctc ctgtcagtta caccgtcggg agtacgcagc 1680
 cgcttagcga ctctcgctt gccccctggg tggggcgggt aggtaggagg ggtgtagaga 1740
 tgctgggtgt gcgggcgcg ccggcctcct gcggcgggag gggagggtca gtgaaattgg 1800
 ctctgcgcg ggcgtcctc caccctccc ttcctcggg ggagtcggtt taccgccgc 1860
 ctgctgtct tcgacacctg attggctgtc gaagctgtgg gaccgggcc ttgctactgg 1920
 ctcgagtctc acatgagcga aaccactgcg cgggcgcg gggggcggg gaggcggcg 1980
 ttggtacggt cctccccgag gccgagccc gcagtgtctg gcccgcgcc cctgcgcaac 2040
 gtggcaggaa gcgcgcgctg gaggcgggg cggctgccg gccgagactt ctggatggcg 2100
 gcggcccgcg ctcgccccc ggttcccacc gcctgaagg cgagacaagc ccgacctgct 2160
 acaggcactc gtgggggttg gggaggagcg ggggtcggtc cggctggtt gtgggtggga 2220
 ggcgctgtt ctccaaaaac cggcgcgagc tgcaatctg agggagctgc ggtggaggag 2280
 gtggagagaa ggccgcaccc ttctggcag ggggaggga gtgccgcaat accttatgg 2340
 gagttcttg ctgcctccc tcttgtaagg accgccctg gcctggaaga agccctcct 2400
 ccttcctcc tcgctgatc tcgtcatgc ctccatgtc agtcgcttct cgattatgg 2460
 cgggattctt ttgcctagac aattgtacta accttctct ctttcctctc ctgacag 2517

<210> 69

<211> 2902

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 69

gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc gcccaacgac ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttct cattgacgtc 120
 10 aatgggtgga gtatttacgg taaactgcc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180

ES 2 619 407 T3

caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaattggcc cgcctggcat tatgcccagt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccc ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccaccc cgagccccag ctccggcgcc 360
 ccggctcccc gcgccccca tccggggcgc cgctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcgggggc ggggcgag ggcctctgc agctccggct cccctggcc tctcgggaac 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtggcg gcggcgga gaggcgggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagt gcgcgccgc ggaggggcct ggagtgcgcg 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcgc agcagcagct gggggcggcg gcggcgctt 660
 ggagcggcc ggatccgtt aaacagagta atgacatgt tccttccatc ctccaaagg 720
 gaccaataat agtttgtaag tatcattatg aactaatgaa tttcaacat atttgatata 780
 tttcaatcca ttgccatcat tgttcttctc gatatttgag ttggctcact ttgccagtaa 840
 gagtctatcc aaattggctt ctgagtccat ttgacacaac acctttgatc tttgacagtt 900
 tccttggttt taggtgctag atgatttctc aggcctacct tagacatttc ctgccacaga 960
 cttagaatca gccatttctc taaggaccct gattccattt catgagaaat gatagagacc 1020
 acaatcaaaa caagtcatga atttatactg atattttcaa ttcaaattaa agatgaggtt 1080
 tttgctaaat ttttttgagt ttatatttgt atgtcttatg ctgaaaaatc ttgtttccta 1140
 attagtaaca taattattca tttgatgggt aatatattta gggccgattc tttggtttta 1200
 tagccaagat accctgttga taaagtcttg tgggagcaat tataagactg gcttattttg 1260
 aagcttttta aaaagacat ccttacctgt tttaactgta gattatatta acttaaatag 1320
 gtacagccca cgcttgacta gttaacgctg gtgggtaggg atgagggagg gaggggcatt 1380
 gtgatgtaca gggctgctct gtgagatcaa gggctctcta agggtagggag ctggggcagg 1440
 gactacgaga gcagccagat gggctgaaag tggaaactcaa ggggtttctg gcacctacct 1500
 acctgcttcc cgctgggggg tggggagttg gccagagtc ttaagattgg ggcagggtgg 1560
 agaggtgggc tcttctgct tcccactcat cttatagctt tctttccca gatccgaatt 1620
 cgagatccaa accaaggagg aaaggatctc acagaggaga gctagtctca gagagcctcg 1680
 gctaggtagg ggagcggaac tctggtggga ggggaggtgc ggtgcactgg ggggatgggt 1740
 ggctaggggg gccgtctggt ggcttgcggg ggttgccttt cccgtggga gtcggaaca 1800
 taatgtttgt tacgttggga gggaaagggg tggctggatg caggcgggag ggagcccg 1860
 cctgcggcaa ccggaggggg agggagaagg gagcggaaa tgctcgaaac cggacggagc 1920
 cattgctctc gcagagggag gagcgttcc ggctagcctc ttgtcgcca ttggccgttt 1980
 ctctccccg cgtgtgtgaa aacacaaatg gcgtattctg gttggagtaa agctcctg 2040

ES 2 619 407 T3

agttacaccg tccgggagtagc gcagccgctt agcgactctc gcgttgcccc ctgggtgggg 2100
 cgggtaggta ggtgggggtgt agagatgctg ggtgtgcggg cgcggccggc ctccctgcggc 2160
 gggaggggag ggtcagtgaa attggctctg gcgcgggctt cctcccacc cccccttctt 2220
 tccggggaggt cggtttaccg gccgcctgct tgtctctgac acctgattgg ctgtcgaagc 2280
 tgtgggaccg ggccttctgt actggctcga gtctcacatg agcgaacca ctgcgcgggg 2340
 cgcgggggtg gcggggaggg gggcggttgt acggtcctcc ccgaggccga gcgccgcagt 2400
 gtctggcccc gcgccctgc gcaacgtggc aggaagcgcg cgctggaggc gggggcgggc 2460
 tgccggccga gacttctgga tggcgccggc cgcgctccg ccccggttc ccaccgctg 2520
 aaggcgagaa caagcccagc ctgctacagg cactcgtggg ggtgggggag gagcgggggt 2580
 cggtcgggct ggtttgtggg tgggagcgcg ttgttctcca aaaaccggcg cgagctgcaa 2640
 tcctgagggg gctgcgggtg aggaggtgga gagaaggccg cacccttctg ggcaggggga 2700
 ggggagtgcc gcaatacctt tatgggagtt ctttctgccc tccgctcttg taaggaccgc 2760
 cctgggcctg gaagaagccc tcctccttt cctcctcggc tgatctcgtc atcgcctcca 2820
 tgtcagagtc cttctcgatt atggcgggga ttcttttggc tagacaattg tactaacctt 2880
 cttctctttc ctctcctgac ag 2902

<210> 70

<211> 3183

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia artificial

<400> 70

gcgttacata acttacggta aatggccccg ctggctgacc gcccacagc ccccgccat 60
 tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag taacgccaat agggacttct cattgacgtc 120
 aatgggtgga gtatttacgg taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc 180
 caagtacgcc ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcctggcat tatgccaggt 240
 acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc atcgctatta 300
 ccatggcccg ggtcgcgaca tgcagcggga cgcgccacc cagagcccag ctccgcgcc 360
 ccggtcctcc cgcccccga tccggggcgc cgtctagtagt ggcggcggcg gaggcggggg 420
 cagcggcggc ggcggcgagg gcgcctctgc agctccggct cccctgccc tctcgggaa 480
 tacaagtccc agggggcctg gcggtgggcg gcggcgggaa gaggcgggggt cggcgccgcg 540
 aggccggaag tggccgtgga ggcggaagtg gcgcggccgc ggaggggcct ggagtgcggc 600
 ggcggcggga cccggagcag gagcggcggc agcagcgact gggggcggcg gcggcgctt 660
 ggagggcggc ggatccgttt aaacggctcg catctctcct tcacgcgcc gccgcctac 720

10

ES 2 619 407 T3

ctgaggccgc catccacgcc ggttgagtcg cgttctgccg cctcccgcct gtggtgcctc	780
ctgaactgcg tccgccgtct aggtaagttt aaagctcagg tcgagaccgg gcctttgtcc	840
ggcgctccct tggagcctac ctagactcag ccggctctcc acgctttgcc tgaccctgct	900
tgctcaactc tacgtccttg tttcgttttc tgttctgcgc cgttacagat cactagtgtt	960
taaacagagt aatgacatgg ttccttccat cctccaaagg tgaccaataa tagtttghta	1020
gtatcattat gaactaatga atttcaaca tatttgatat atttcaatcc attgccatca	1080
ttgttcttat cgatatttga gttggctcac tttgccagta agagtctatt caaattggct	1140
tctgagtcca tttgacacaa cacctttgat ctttgacagt ttccttggtt ttaggtgcta	1200
gatgatttct caggctcacc ttagacattt cctgccacag acttagaatc agccatttct	1260
ctaaggacc tgaattccatt tcatgagaaa tgatagagac cacaatcaaa acaagtcatg	1320
aatttatact gatattttca attcaaatta aagatgaggt ttttgctaaa tttttttgag	1380
tttatatttg tatgtcttat gctgaaaaat cttgtttcct aattagtaac ataattatc	1440
atthgatggg taaatatttt agggccgatt ctttggtttt atagccaaga taccctgttg	1500
ataaagtctt gtgggagcaa ttataagact ggcttatttt gaagcttttt aaaaaagaca	1560
tccttacctg ttttaactgt agattatatt aacttaaata ggtacagccc acgcttgact	1620
agttaacgct ggtgggtagg gatgagggag ggaggggcat tgtgatgtac agggctgctc	1680
tgtgagatca agggctctctt aagggtggga gctggggcag ggactacgag agcagccaga	1740
tgggctgaaa gtggaactca aggggtttct ggcacctacc tacctgcttc ccgctggggg	1800
gtggggagtt ggcccagagt cttaagattg gggcagggtg gagaggtggg ctcttcctgc	1860
ttcccactca tcttatagct ttctttcccc agatccgaat tcgagatcca aaccaaggag	1920
gaaaggatat cacagaggag agctagtctc agagagcctc ggctaggtag gggagcggaa	1980
ctctggtggg aggggaggtg cggtgcaactg gggggatggg tggctagggg ggccgtctgg	2040
tggcttgccg gggttgcctt tcccgtggga agtcgggaac ataatgtttg ttacgttggg	2100
agggaaaggg gtggctggat gcagggggga gggaggcccg ccctgcccga accggagggg	2160
gagggagaag ggagcggaaa atgctcgaaa ccggacggag ccattgctct cgcagagggg	2220
ggagcgttc cggctagcct cttgtgccg attggccgtt tctcctccc ccgtgtgtga	2280
aaacacaaat ggcgtattct ggttgagta aagctcctgt cagttacacc gtcgggagta	2340
cgcagccgct tagcgaactc cgcgttgccc cctgggtggg gcgggtaggt aggtggggtg	2400
tagagatgct ggggtgtcgg gcgcggccgg cctcctgcgg cgggagggga gggtcagtga	2460
aattggtctt ggcggggggc tctcccacc ctcccctcc ttcgggggag tcggtttacc	2520
cgccgcctgc ttgtcttcca cacctgattg gctgtcgaag ctgtgggacc gggcccttgc	2580

ES 2 619 407 T3

tactggctcg agtctcacat gagcgaacc actgcgggg gcgcgggggt ggcggggagg 2640
 cgggcgttgg tacggtcctc cccgaggccg agcgcgcag tgtctggccc cgcgcccctg 2700
 cgcaactggg caggaagcgc gcgctggagg cgggggcggg ctgccggccg agacttctgg 2760
 atggcggcgg ccgcggctcc gccccgggtt cccaccgct gaagggcgag acaagcccga 2820
 cctgctacag gcactcgtgg ggggtgggga ggagcggggg tcggtccggc tggtttgtgg 2880
 gtgggaggcg cttgttctcc aaaaaccggc gcgagctgca atcctgaggg agctgcggtg 2940
 gaggaggtgg agagaaggcc gcacccttct gggcaggggg aggggagtgc cgcaatacct 3000
 ttatgggagt tctttgctgc ctcccgtctt gtaaggaccg ccctgggcct ggaagaagcc 3060
 ctccctcctt tctcctcgc gtgatctcgt catgcctcc atgtcgagtc gcttctcgat 3120
 tatggcggg attcttttgc ctagacaatt gtactaacct tcttctctt cctctcctga 3180
 cag 3183

<210> 71

<211> 961

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Intrón EF+exón

<400> 71

cgggtttgcc gccagaacac aggtaagtgc cgtgtgtggt tcccgcgggc ctggcctctt 60
 tacgggttat ggccttgcg tgccttgaat tacttccacc tggctgcagt acgtgattct 120
 tgatcccag cttcgggttg gaagtgggtg ggagagtctg aggccttgcg ctttaaggagc 180
 cccttcgct cgtgcttgag ttgaggcctg gcctgggcgc tggggccgcc gcgtgcgaat 240
 ctggtggcac cttcgcgct gtctcgtgc tttcgataag tctctagcca tttaaaattt 300
 ttgatgacct gctgcgacgc ttttttctg gcaagatagt cttgtaaatg cgggccaaga 360
 tctgcacact ggtatttcgg tttttgggc cgcgggcggc gacggggccc gtgcgtcccc 420
 gcgcacatgt tcggcgaggc gggcctgcg agcgcggcca ccgagaatcg gacgggggta 480
 gtctcaagct ggcggcctg ctctggtgcc tggcctcgcg ccgccgtgta tcgccccgcc 540
 ctgggcggca aggctggccc ggtcggcacc agttgcgtga gcggaaagat ggccgcttcc 600
 cggccctgct gcagggagct caaaatggag gacgcggcgc tcgggagagc gggcgggtga 660
 gtcaccaca caaaggaaaa gggccttcc gtctcagcc gtcgcttcat gtgactccac 720
 ggagtaccgg gcgccgtcca ggcacctcga ttagttctcg agcttttga gtacgtcgtc 780
 tttaggttg ggggaggggt tttatgcgat ggagtttccc cacactgagt ggggtgagac 840
 tgaagttagg ccagcttggc acttgatgta attctccttg gaatttggcc tttttgagtt 900
 10 tggatcttgg ttcattctca agcctcagac agtggttcaa agtttttttc ttccatttca 960
 g 961

REIVINDICACIONES

1. Unidad de transcripción constituida de un polinucleótido que comprende los elementos reguladores siguientes:

- 5   - el potenciador del virus hCMVe, teniendo dicho potenciador la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 1, y
- la región promotora de las quinasas 9 dependiente de ciclina (CDK9), teniendo dicha región promotora la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 2.

10   2. Unidad de transcripción según la reivindicación 1, comprendiendo dicho polinucleótido también una secuencia nucleotídica situada secuencia abajo de dicha región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, comprendiendo dicha secuencia nucleotídica al menos una de las regiones 5' no traducida (5' UTR) seleccionada entre las siguientes:

- 15   - región R de Repetición terminal larga (LTR) del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 3, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 3,
- 20   - región 5' UTR del gen Factor represor NF-κB (NRF) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 4, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 4,
- región 5' UTR del gen eukaryotic Initiation Factor 4GI (eIF4GI) que tiene la secuencia nucleotídica SEQ IDNO: 5, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 5,
- 25

poseyendo dichos ácidos nucleotídicos al menos un 70% de identidad de secuencia con dichas secuencias SEC ID NO: 3, 4, 5 que tienen esencialmente unas propiedades de estabilización de los ARNm y de un facilitador de traducción.

30   3. Unidad de transcripción según la reivindicación 1, comprendiendo dicho polinucleótido también un intrón situado secuencia abajo de dicha región promotora y secuencia arriba del sitio de inicio de la traducción, estando dicho intrón seleccionado entre los siguientes:

- 35   - intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,
- 40   - intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEQ IDNO: 11, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,
- intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,
- 45   - intrón pcinéo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,
- intrón del gen ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,
- 50   - intrón humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.

55   4. Unidad de transcripción según la reivindicación 2, comprendiendo dicho polinucleótido también un intrón, estando dicho intrón seleccionado entre los siguientes:

- intrón del gen factor 1 α de elongación (EF1 α) que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 10, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 10,
- 60   - intrón murino ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEQ IDNO: 11, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 11,
- intrón 5'LTR del virus HTLV-1 que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 12, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 12,
- 65

- intrón pcinéo que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 13, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 13,
- 5 - intrón ubiquitina que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 53, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 53,
- intrón humano ROSA que tiene la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 54, o un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 54.
- 10 estando dicho intrón situado secuencia abajo de dicha región 5' UTR y secuencia arriba del sitio de inicio de la transcripción.
- 5. Unidad de transcripción según la reivindicación 4, en la que la región promotora es
- 15 - la de CDK9, la región 5' UTR es la del gen eIF4GI y el intrón es el del gen EF1 α , teniendo dicha unidad transcripción la secuencia nucleotídica SEC ID NO: 33, o
- un ácido nucleotídico que presenta al menos un 70% de identidad de secuencia con la secuencia SEC ID NO: 33 y que permite una producción volumétrica de una proteína de interés superior a la obtenida con la combinación del potenciador CMV asociado a la región promotora de CDK9.
- 20
- 6. Vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción tal como se define según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y al menos un sitio de clonación que permite la integración de un ácido nucleotídico que codifica para una proteína de interés.
- 25
- 7. Vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción tal como se define según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y al menos un sitio para la recombinación, sitio específico que permite la integración de un ácido nucleotídico que codifica para una proteína de interés.
- 30
- 8. Vector de expresión según la reivindicación 6 o 7, que comprende además un gen de resistencia eucariota, un gen de resistencia bacteriana, un origen de replicación bacteriano y una unidad dedicada a la amplificación génica.
- 9. Vector de expresión según la reivindicación 6 o 7, en el que dicha proteína de interés se selecciona entre el grupo constituido de las proteínas que participan en la coagulación o una inmunoglobulina, unas citoquinas, unas hormonas, unos factores de crecimiento o factores del complemento y de cualquier proteína de fusión.
- 35
- 10. Célula hospedante que comprende un vector de expresión tal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, siendo dicha célula hospedante en particular la línea celular YB2/O.
- 40
- 11. Utilización de un vector de expresión según la reivindicación 6 para transfectar una célula hospedante.
- 12. Sistema de expresión que comprende un vector de expresión tal como se define según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9 y una célula hospedante tal como se define según la reivindicación 10 que permite la expresión de una proteína de interés codificada por un ácido nucleotídico.
- 45
- 13. Utilización de un vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en una célula hospedante según la reivindicación 10 para producir una proteína de interés codificada por un ácido nucleotídico, siendo dicha proteína de interés producida con un título más elevado que en el vector de expresión de referencia que comprende al menos un promotor RSV, un intrón pCInéo, una secuencia de poliadenilación, un gen de resistencia eucariota, un gen de resistencia bacteriana, un origen de replicación bacteriana y una unidad dedicada a la amplificación génica, comprendiendo dicho vector de referencia la misma secuencia nucleotídica.
- 50
- 14. Procedimiento de producción *in vitro* de una proteína recombinante que comprende las etapas de:
- 55 - introducir el vector de expresión que comprende al menos una unidad de transcripción según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y un ADNc que codifica para una proteína de interés en una célula hospedante,
- 60 - seleccionar e identificar unas células hospedantes obtenidas en la etapa anterior que expresan de manera estable dicha proteína de interés,
- extraer y purificar dicha proteína de interés.
- 65
- 15. Procedimiento según la reivindicación 14 que comprende además una etapa de selección y de identificación de las células hospedantes obtenidas que expresan de manera estable dicha proteína de interés.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12A

Figura 12B

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Efecto de la unidad de transcripción sobre la expresión del anticuerpo anti-gammaGT 138H11B en medio con suero: título en IgG a D7 y ganancia con respecto a la referencia LTR RSV + intrón Pcl neo.

Figura 27

Efecto de la unidad de transcripción sobre la expresión del anticuerpo anti-AMHR11 3C23K en medio sin suero: título en IgG a D10 y ganancia con respecto a la referencia LTR RSV + intrón Pcl neo.

Efecto de la unidad de transcripción E2CDK9U3+EFss sobre la expresión en pool de 3 anticuerpos: título en IgG y ganancia con respecto a la referencia LTR RSV + intrón pCI neo.

Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34

Figura 35