19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 640 567**

51 Int. Cl.:

A61K 45/00	(2006.01)	G01N 33/53	(2006.01)
A61K 38/00	(2006.01)	C12N 15/09	(2006.01)
A61K 39/395	(2006.01)		
A61P 19/00	(2006.01)		
A61P 19/02	(2006.01)		
A61P 19/08	(2006.01)		
A61P 19/10	(2006.01)		
A61P 29/00	(2006.01)		
A61P 43/00	(2006.01)		
G01N 33/15	(2006.01)		

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

- 86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **11.05.2012 PCT/JP2012/003113**
- 87 Fecha y número de publicación internacional: **22.11.2012 WO12157237**
- 96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **11.05.2012 E 12785073 (3)**
- 97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **12.07.2017 EP 2711023**

54 Título: **Promotor de la osteogénesis**

30 Prioridad:

13.05.2011 JP 2011108642

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

03.11.2017

73 Titular/es:

**NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOKYO
MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY (100.0%)
5-45 Yushima 1-chome Bunkyo-ku
Tokyo 113-8510, JP**

72 Inventor/es:

**TAKAYANAGI, HIROSHI y
NEGISHI, TAKAKO**

74 Agente/Representante:

ISERN JARA, Jorge

ES 2 640 567 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Promotor de la osteogénesis

5 Campo técnico

La presente invención se refiere a un acelerador de la osteogénesis y a un agente preventivo y terapéutico. Más particularmente, se refiere a un acelerador de la osteogénesis y a un agente preventivo y terapéutico que tiene como principio activo una sustancia que inhibe la unión de la semaforina 4D y de la plexina B1.

10

Antecedentes de la invención

Según envejece la población de Japón, se ha producido un aumento en los pacientes que padecen fracturas óseas, osteoporosis, reumatismo articular, dolor lumbar y otras enfermedades óseas. La función de tejido en el tejido óseo es mantenida mediante la combinación de los osteoblastos, que favorecen la osteogénesis, y de los osteoclastos, que favorecen la resorción ósea, y mediante el mantenimiento de un equilibrio entre la osteogénesis y la resorción ósea. El equilibrio del metabolismo óseo es destruido por el envejecimiento, por una disminución en la función ovárica, así como por otros factores. Cuando disminuye la osteogénesis o cuando existe una resorción ósea anormal, la cantidad de hueso (la densidad ósea) disminuye y aparecen diversas enfermedades óseas. Algunas enfermedades óseas incluyen fracturas óseas, insuficiencia ósea, osteoporosis, osteomalacia, osteopenia, dolor lumbar, enfermedad ósea de Paget, mielitis tónica, reumatismo articular, artrosis deformante y similares. En particular, cuando una persona anciana padece una enfermedad ósea, es difícil que esa persona se desarrolle en un nivel necesario para la vida diaria, y dependiendo del caso, existe el riesgo de que el paciente quede encamado. Como resultado, esto es extremadamente significativo en la prevención y el tratamiento de las enfermedades óseas en la sociedad moderna, en la que un número creciente de personas son ancianos.

La vitamina D3 activada, el bifosfonato, la calcitonina, las preparaciones hormonales que contienen estradiol, las preparaciones de vitamina K2 y similares se usan generalmente como agentes terapéuticos para las enfermedades óseas. Se están desarrollando derivados del estradiol, derivados de la vitamina D3 activada, derivados del bifosfonato y similares como agentes terapéuticos más eficaces, ya que tienen menos efectos secundarios (véase el Documento Patente 1). Sin embargo, la vitamina D3 tiene una acción que aumenta la concentración de calcio en la sangre, y el estradiol y el bifosfonato tienen un efecto inhibitorio de la resorción ósea. Sin embargo, ninguno de estos tiene un efecto que acelere directamente la osteogénesis a través de los osteoblastos. El tratamiento de elección es una terapia multifarmacológica en este caso, por lo que existe una necesidad de desarrollar un nuevo agente preventivo y terapéutico que tenga una acción diferente a la de los agentes preventivos y terapéuticos convencionales.

El hueso es creado de forma continua en unas etapas conocidas como remodelado óseo, en las que se repiten la fase de resorción y la siguiente fase de osteogénesis. La forma de transición de una fase a otra debe estar controlada de forma precisa mediante una secreción desde la célula ósea, ya que contribuye a la comunicación entre el osteoclasto y el osteoblasto, o por factores de reconstrucción ósea liberados desde la matriz ósea. Es bien conocido que el TGF- β y el IGF-1 liberados durante la resorción ósea estimulan la osteogénesis, de forma que es un conocido factor de acoplamiento. Aunque existe una abundancia de datos *in vitro* sobre moléculas candidatas que son extremadamente importantes para el factor de acoplamiento, todavía no hay ninguna prueba *in vitro* de esto.

Las moléculas de guiado axónico se manifiestan ampliamente fuera del sistema nervioso. Por lo tanto, las células errantes, la respuesta inmunitaria, el desarrollo tisular y la angiogénesis y similares están controladas (véanse los Documentos no Patente 1 y 2). Tomando como base la investigación llevada a cabo en los últimos años, se sugiere que las moléculas de guiado axónico como semaforina y efrina y similares contribuyen a la comunicación intercelular entre los osteoclastos y los osteoblastos (véanse los Documentos no Patente 3 hasta 5).

Es bien conocido que la Semaforina 4D es secretada desde los oligodendrocitos y que induce la destrucción del crecimiento del cono medular en el sistema nervioso central. También está claro que la semaforina 4D es extremadamente importante en el mantenimiento de la respuesta inmunitaria y de la homeostasis del sistema inmunitario. Un receptor bien conocido de la semaforina 4D es la plexina B1 (véase el Documento no Patente 6). Adicionalmente, el Documento no Patente 7 sugiere que la formación de osteoclastos puede ser acelerada a través de una acción de inhibición de la diferenciación de los osteoblastos, así como los osteoblastos. El Documento no Patente 8 desvela que la semaforina 4D no es detectada en los osteoblastos, que está presente en la superficie de los osteoclastos, y se ha confirmado que la cantidad de hueso aumenta en comparación con ratones naturales en ratones hembra sema4D^{-/-} en los que la Semaforina 4D (Sema 4D) es deficiente en los homocigotos.

Documentos de la técnica anterior

Documentos Patente

65

Tabla especial en la Publicación JP2005-509629 correspondiente al documento WO 03/034987.

El documento WO2008/100995 enseña composiciones y métodos para el tratamiento de enfermedades con CD10.

[Documento no Patente 1] B. J. Dickson, Science 298, 1959 (6 de diciembre de 2002)

5 [Documento no Patente 2] A. B. Huber, A. L. Kolodkin, D. D. Ginty, J. F. Cloutier, Annual Review Neuroscience 26, 509 (2003)

[Documento no Patente 3] N. Takagahara et al., Nat. Cell Biol 8, 615 (junio de 2006)

10 [Documento no Patente 4] N. Irie et al., Cell Metab 4, 111 (agosto de 2006)

[Documento no Patente 5] C. Zhao et al., Cell Metab 4, 111 (agosto de 2006)

15 [Documento no Patente 6] I. Oinuma et al., Science, Vol. 305, nº 5685, páginas 862-865 (agosto de 2004)

[Documento no Patente 7] Ishida Masanari, Kaneda Toshio, Muto Akihiro, Yoshida Masashi, Meeting Program Abstracts of the Japan Society of Bone Metabolism, vol. 25, página 266, publicado en junio de 2007, [Analysis of Bioaction in Bone Metabolism in Osteoclast-derived Semaphorin 4D]

20 [Documento no Patente 8] Romain Dacquin, Chantal Domenget, Pierre Jurdic, Irma Machuca-Gayet, ASBMR 2010 Annual Meeting Abstracts, Presentation Abstracts, Presentation Number MOO152, "Physiological Control of Bone Resorption by Semaphorin 4D is Dependent on Ovarian Function"

25 [Documento no Patente 9] Conrotto et al Blood 1 junio de 2005, Vol. 105, nº 11 enseña que la Sema4D induce la angiogénesis a través del reclutamiento de Met por parte de la Plexina B1.

[Documento no Patente 10] Suzuki et al Nature Immunology Vol. 9, nº 1 enero de 2008 enseña las semaforinas y sus receptores en las interacciones entre las células inmunitarias.

30 [Documento no Patente 11] Roth et al Cellular and Molecular Life Sciences, Vol. 66, 2009 enseña las muchas caras de las semaforinas – desde el desarrollo hasta la patología.

[Documento no Patente 12] Dacquin et al PLoS ONE octubre de 2011, Vol. 6, publicación 10, enseña que el control de la resorción ósea por parte de la semaforina 4D es dependiente de la función ovárica.

35 [Documento no Patente 13] Negishi-Koga et al Nature Medicine Vol. 17, nº 11 noviembre de 2011 págs. 1473-1481 enseña la supresión de la formación de hueso por la expresión osteoclástica de la semaforina 4D.

Resumen de la invención

40 Problemas que pretende resolver la presente invención

45 Es un objeto de la presente invención proporcionar un agente de aceleración de la osteogénesis y un agente preventivo y terapéutico para enfermedades óseas que implica la promoción directa de la osteogénesis usando osteoblastos.

Medios usados para resolver los problemas

50 Después de una gran cantidad de duro trabajo de investigación en las condiciones descritas en los antecedentes de tecnología mencionados anteriormente, los inventores averiguaron que (a) cuando la semaforina 4D que deriva de los osteoclastos se une al receptor de la plexina B en el osteoblasto, activa la pequeña proteína G RhoA que inhibe la diferenciación de los osteoblastos, disminuye las señales del IRS (señales que promueven la diferenciación de los osteoblastos) e inhiben la diferenciación de los osteoblastos, de forma que se inhibe la osteogénesis; y que (b) los anticuerpos anti-semaforina 4D y los anticuerpos anti-plexina B1 aceleran directamente la osteogénesis usando los osteoblastos.

55 Esto significa que la presente invención se refiere a un anticuerpo anti-semaforina 4D o a un fragmento funcional del mismo, o a un anticuerpo anti-plexina B1 o a un fragmento funcional del mismo, para su uso en la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas en un sujeto.

60 En el presente documento también se describen: un agente para la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas que tiene como principio activo una sustancia que inhibe la unión de la semaforina 4D y de la plexina B1; un agente para la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas como se ha descrito anteriormente característico porque la sustancia de inhibición de la unión es un anticuerpo anti-semaforina 4D; un agente para la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas como se ha descrito anteriormente característico porque la sustancia de inhibición de la unión es un anticuerpo anti-plexina B1 o una proteína que contiene regiones extracelulares de la

plexina B1; y un agente para la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas como se ha descrito anteriormente característico porque las enfermedades óseas se seleccionan entre fractura ósea, insuficiencia ósea, osteoporosis, osteomalacia, osteopenia, dolor lumbar, enfermedad ósea de Paget, mielitis tónica, reumatismo articular y artrosis deformante.

5 En el presente documento también se describe un método usado para la determinación de un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis en el que se determina si una sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1, y si la sustancia mencionada anteriormente en estudio es la sustancia mencionada anteriormente que inhibe la unión, se determina que la sustancia mencionada anteriormente en estudio es un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis; en el presente documento también se describe un método como se ha descrito anteriormente característico porque el método usado para la determinación de si una sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1 consiste en las siguientes etapas (A) hasta (D): (A) una etapa en la que la semaforina 4D y la plexina B1 se ponen en contacto entre sí en presencia de la sustancia en estudio, (B) una etapa en la que se mide el grado de unión entre la semaforina 4D y la plexina B1, (C) una etapa en la que se compara el grado medido en la etapa (B) anterior con el grado cuando no están en presencia de la sustancia en estudio, y (D) una etapa en la que se determina que la sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1 cuando el grado medido en la etapa (B) anterior es menor que cuando no están en presencia de la sustancia en estudio; y en el presente documento también se describe un método de cribado de un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis característico porque se usan los métodos descritos anteriormente para buscar sustancias que se están estudiando como candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis.

La presente invención puede usarse para promover directamente la osteogénesis usando osteoblastos y para prevenir y/o tratar enfermedades óseas.

Breve descripción de las figuras

[Figura 1] Un diagrama que indica la cantidad de hueso en ratones naturales (WT) medida usando una tomografía microcomputarizada (μ CT) y en ratones inactivados para la semaforina 4D (Sema 4d^{-/-}).

[Figura 2] Un diagrama que indica el ancho trabecular en ratones WT medido usando una μ CT y en ratones Sema4d^{-/-}.

[Figura 3] Un diagrama que indica la osteogénesis [el área superficial del osteoblasto (izquierda); el área superficial del hueso calcificado (centro); y el índice de osteogénesis (derecha)] medido usando un análisis de osteomorfogénesis en ratones WT y en ratones Sema4d^{-/-} con un doble marcador de calceína cada 4 días.

[Figura 4] Un diagrama que indica el área superficial del osteoclasto y el recuento de células (a la izquierda y en el centro), así como los parámetros (a la derecha) de la resorción ósea medidos usando un análisis de osteomorfogénesis en ratones WT y en ratones Sema4d^{-/-}.

[Figura 5] Un diagrama que indica la cantidad de hueso en ratones en los que se ha llevado a cabo un injerto de células inmunitarias adoptadas usando las células de médula ósea de ratones WT y de ratones Sema4d^{-/-}. El segundo injerto desde la izquierda indica la cantidad de hueso de los ratones cuando se injertó en los ratones WT, y el segundo injerto desde la derecha indica la cantidad de hueso de los ratones cuando se injertó en los ratones Sema4d^{-/-}.

[Figura 6] Un diagrama que indica el número de nódulos óseos cuando se añade Fc-sema4D (Semaforina 4D recombinada, fusionada con el área Fc de la IgG1) a las células de la bóveda craneal cultivadas en condiciones de osteogénesis.

[Figura 7] Un diagrama que indica la manifestación del tipo de Plexina B y el ARNm del agrupamiento de la diferenciación 72 (CD72) durante la diferenciación del osteoblasto.

[Figura 8] Un diagrama que indica los resultados del análisis de la precipitación usando Fc-sema4D. El panel de la derecha indica los resultados del análisis de la toma de muestras antes de la precipitación, y el panel de la izquierda indica los resultados del análisis de la toma de muestras después de la precipitación.

[Figura 9] Un diagrama que indica la cantidad de hueso en ratones WT medido usando un análisis de μ CT y en ratones inactivados para la Plexina B1 (Plxnb1^{-/-}).

[Figura 10] Un diagrama que indica el ancho de la trabécula en ratones WT medido usando ratones μ CT y ratones Plxnb1^{-/-}.

- [Figura 11] Un diagrama que indica el área superficial de los osteoblastos en ratones WT medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- 5 [Figura 12] Un diagrama que indica el área superficial de hueso que ha quedado calcificado en ratones WT medida usando un análisis de osteomorfogénesis y ratones Plxnb1-/-.
- [Figura 13] Un diagrama que indica el índice de osteogénesis en ratones WT medido usando un análisis de osteomorfogénesis y ratones Plxnb1-/-.
- 10 [Figura 14] Un diagrama que indica los mutantes RA (R1661 / 1662 / 1968A) de la Plexina B1 y la Plexina B1 con mutaciones en el dominio GAP, así como el corte de mutante de la Plexina B1 en el que el dominio de unión PDZ está ausente (Δ PDZ).
- 15 [Figura 15] Un diagrama que indica la cantidad de hueso en ratones WT (ratones de control) medida usando un análisis de μ CT y ratones dominantes negativos RhoA (RhoA DNOB).
- [Figura 16] Un diagrama que indica la trabécula en ratones WT medida usando un análisis de μ CT y RhoA DNOB.
- 20 [Figura 17] Un diagrama que indica la formación [área superficial del osteoblasto] en ratones WT y en ratones RhoA DNOB medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- [Figura 18] Un diagrama que indica la formación [área superficial de hueso calcificado] en ratones WT y en ratones RhoADNOB.
- 25 [Figura 19] Un diagrama que indica la formación [índice de osteogénesis] en ratones WT y en ratones RhoA DNOB medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- [Figura 20] Un diagrama que indica el área superficial de osteoblastos de ratones ovariectomizados (OVX) y de ratones OVX tratados con anticuerpos-Sema4D medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- 30 [Figura 21] Un diagrama que indica la cantidad de hueso de los ratones OVX y de los ratones OVX tratados con anticuerpos anti-semaforina 4D (anticuerpos anti-Sema4D) medida usando un análisis de μ CT.
- 35 [Figura 22] Un diagrama que indica la osteogénesis [índice de osteogénesis] en ratones OVX y en ratones OVX tratados con anticuerpos anti-Sema4D medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- [Figura 23] Un diagrama que indica los intervalos trabeculares en ratones OVX y en ratones OVX tratados con anticuerpos anti-Sema4D medidos usando un análisis de μ CT.
- 40 [Figura 24] El panel superior de la Figura 24 es un diagrama que indica los resultados del estudio de la formación de calcificación en osteoblastos de ratón cultivados usando osteoclastos de ratones WT de ratones Sema4D-/- y cuando se cultivan en presencia de anticuerpos anti-Sema4D. El panel inferior de la Figura 24 es un diagrama que indica los resultados del estudio de la calcificación de osteoblastos de ratón cuando se cultivan en presencia de Fc-sema4d y / o de anticuerpos anti-plexina Ba.
- 45 [Figura 25] Un diagrama que indica los resultados del estudio de la formación de calcificación en osteoblastos humanos (HOS) cultivados en presencia de osteoclastos o del sobrenadante y / o de anticuerpos anti-Sema4D y similares.
- 50 [Figura 26] Un diagrama que indica el área superficial de osteoblastos de ratones ovariectomizados (OVX) y de ratones OVX tratados con anticuerpos anti-semaforina 4D (anticuerpos anti-Sema4D) 6 semanas después del tratamiento OVX medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- 55 [Figura 27] Un diagrama que indica la cantidad de hueso en ratones OVX y en ratones OVX tratados con anticuerpos anti-Sema4D 6 semanas después del tratamiento OVX medida usando un análisis de μ CT.
- [Figura 28] Un diagrama que indica la osteogénesis [índice de osteogénesis] en ratones OVX y en ratones OVX tratados con anticuerpos anti-Sema4D 6 semanas después del tratamiento OVX medida usando un análisis de osteomorfogénesis.
- 60 [Figura 29] Un diagrama que indica los intervalos trabeculares en ratones OVX y en ratones OVX tratados con anticuerpos anti-Sema4D 6 semanas después del tratamiento OVX medidos usando un análisis de μ CT.
- 65

Modo de trabajo preferido de la invención

La proteína que comprende las regiones extracelulares de los anticuerpos anti-semaforina 4D, de los anticuerpos anti-plexina B1 y de la plexina B1 son aceleradores adecuados de la osteogénesis. El inhibidor de la unión en la presente invención inhibe la unión de la semaforina 4D derivada de los osteoclastos y de los receptores de la plexina B1 en los osteoblastos y mediante la inhibición de la supresión de la diferenciación de los osteoblastos a través de la inhibición de la activación de la RhoA y a través de la inhibición de la reducción de las señales del IRS, de forma que se cree que se acelera la osteogénesis usando osteoblastos. Adicionalmente, en esta Memoria descriptiva, los términos [inhibición] y [supresión] se usan de forma intercambiable.

Los anteriormente mencionados anticuerpos anti-semaforina 4D y los anticuerpos anti-plexina B1 (denominados en lo sucesivo en el presente documento como los [anticuerpos en esta invención] pueden ser anticuerpos policlonales y pueden ser monoclonales y cualquier fragmento funcional de estos. Sin embargo, se prefieren los anticuerpos monoclonales dada su elevada especificidad. Los anteriormente mencionados anticuerpos anti-semaforina 4D y anticuerpos anti-plexina B1 pueden ser producidos usando un método convencional bien conocido usando semaforina 4D y plexina B1. Los fragmentos funcionales que son los anticuerpos en la presente invención indican fragmentos de los anticuerpos que se unen específicamente con respecto a (a) la semaforina 4D, que es un antígeno al que se unen específicamente los anticuerpos en la presente invención, y a (b) la plexina B. Algunos ejemplos específicos son F (ab')₂, Fab', Fab, Fv, FV unidos por disulfuro, FV de cadena única (scFV) y los polímeros de estos (D. J. King, Applications and Engineering of Monoclonal Antibodies, 1998 T.J. International Ltd.). Estos fragmentos de anticuerpos pueden ser obtenidos usando un método convencional tal como una digestión de las moléculas de anticuerpos usando papaína, pepsina y otras proteasas, o usando un método de ingeniería genética bien conocido.

Los anticuerpos de la presente invención también incluyen anticuerpos humanos. Aquí, [anticuerpos humanos], según se relacionan estos con la presente invención, indica anticuerpos que son los productos manifestados de genes de anticuerpos derivados de seres humanos. Los anticuerpos humanos pueden ser obtenidos introduciendo un locus de un gen de un anticuerpo humano y administrando semaforina 4D y plexina B1 en animales transgénicos que son capaces de producir anticuerpos derivados de seres humanos. Un ratón es un ejemplo de dicho animal transgénico. Los ratones que son capaces de producir anticuerpos humanos, por ejemplo, son deficientes en las cadenas pesadas endógenas de la inmunoglobulina de ratón (Ig) y las cadenas ligeras de ratón κ , y los ratones pueden usarse de forma que conserven simultáneamente un fragmento del cromosoma 14 (SC20) que comprende los genes de la cadena pesada de la Ig humana, así como los transgenes de la cadena Ig κ humana (KCo5). Estos ratones son producidos cruzando ratones de la raza A que tienen un locus de un gen de una cadena pesada de una Ig humana, con ratones de la raza B que tienen un transgen de la cadena Ig κ humana. Los ratones de la raza A son homocigóticos para ambas destrucciones endógenas de la cadena pesada de la Ig y la cadena ligera κ y son una raza de ratones (Tomizuka, et al., Proc Natl Acad Sci USA, 200 Vol. 97: 722) que conserva un fragmento del cromosoma 14 (SC20) que es capaz de una transmisión apomórfica. La raza B también es homocigótica para ambas deficiencias en las cadenas pesadas de la Ig de ratón y cadena ligera κ y es una raza de ratones (Nat Biotechnol., 1996 Vol. 14: 845) que conserva un transgen de la cadena de la Ig κ humana (KCo5).

Los anticuerpos policlonales de la presente invención pueden ser producidos usando el método indicado a continuación. Pueden obtenerse usando semaforina 4D y plexina B1 y, si fuera necesario, un agente de inmunoactivación (adyuvante de Freund y similares) en ratones, conejos, cabras, caballos y otros mamíferos no humanos. Los anticuerpos monoclonales de la presente invención se usan para producir un hibridoma a partir de células productoras de anticuerpos procedentes de animales inmunosensibilizados y de células de mieloma que no pueden producir sus propios anticuerpos. El hibridoma es clonado y se seleccionan los clones que producen anticuerpos monoclonales, lo que indica su afinidad específica hacia los antígenos usados para la inmunización. Dicho hibridoma puede ser producido basándose en el método de Keller y Millstein (Nature, 1975 Vol. 256: 495-497). El cribado del clon del hibridoma que produce los anticuerpos monoclonales se lleva a cabo cultivando el hibridoma en una placa de microtitulación. La sensibilidad de respuesta de los inmunoantígenos en el sobrenadante de cultivo en los pocillos que se observa que ha proliferado puede llevarse a cabo midiendo usando un ELISA y otros métodos de enzimoimmunoensayo, radioimmunoensayo, el método del anticuerpo fluorescente y otros métodos inmunológicos.

La producción de anticuerpos monoclonales a partir de hibridomas puede llevarse a cabo cultivando el hibridoma *in vitro* y aislándolo a partir del sobrenadante. También puede ser cultivado *in vivo* en el líquido pleural de ratones, ratas, cobayas, hámsteres o conejos y similares, y aislarse a partir del líquido pleural. Los genes que codifican los anticuerpos monoclonales procedentes del hibridoma y otras células productoras de anticuerpos son clonados, recombinados en un vector adecuado, y éstos son introducidos en el hospedador (por ejemplo, células de ovario de hámster chino (CHO), otras reservas de células de mamífero, *Escherichia coli*, células de levadura, células de insecto, células vegetales, y similares), y los anticuerpos recombinantes son producidos usando la tecnología de recombinación génica (P. J. Delves, Antibody Production Essential Techniques, 1997, Wiley, P. Sheferd y C. Dean, Monoclonal Antibodies, 2000, Oxford University Press, J. W. Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, 1993, Academic Press).

Se producen vacas, cabras, ovejas o cerdos transgénicos en los que los genes de los anticuerpos deseados son recombinados en genes endógenos usando la tecnología de producción de animales transgénicos, y se obtienen grandes cantidades de anticuerpos derivados de los genes de anticuerpos a partir de la leche de estos animales transgénicos.

Los anticuerpos producidos pueden ser refinados usando un método bien conocido en el campo tal como una combinación de cromatografía en columna de la proteína A, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía hidrófoba, el método analítico del sulfato, filtración en gel, cromatografía de afinidad, y similares.

La proteína que comprende la región extracelular de la anteriormente mencionada plexina B1 puede inhibir la unión de la semaforina 4D y de la plexina B1 mediante el atrapamiento de la semaforina 4D. No hay ninguna restricción en particular sobre la proteína que comprende la región extracelular de la plexina B1, sin embargo, una proteína que fusiona la región constante de los anticuerpos (preferentemente cualquier fragmento Fc de una inmunoglobulina) es un ejemplo adecuado.

La proteína que comprende las anteriormente mencionadas semaforina 4D, plexina B1 y regiones extracelulares de la plexina B1, puede producir un vector de manifestación que comprende esa secuencia basada en la información de la secuencia de estas proteínas. El vector de manifestación se somete a una transformación fenotípica en unas células hospedadoras adecuadas, la proteína objetivo es producida en el interior de las células y la proteína objetivo puede ser introducida usando un método de aislamiento u otro método bien conocido. Por ejemplo, la secuencia 3 de ADN (número de secuencia 1) de la semaforina 4D humana y la secuencia de aminoácidos (número de secuencia 2) se divulgan con el número de registro del GenBank NM_001142287, y la secuencia de ADN (número de secuencia 3) de la plexina B1 humana y la secuencia de aminoácidos (número de secuencia 4) se divulgan con el número de registro del GenBank NM_001130082. Adicionalmente, la región extracelular de la plexina B1 humana se corresponde con los números de aminoácidos 1 hasta 1490 de la secuencia de aminoácidos del anteriormente mencionado número de registro NM_001130082.

Hemos medido mediante un análisis de inmunotransferencia la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1 tanto en presencia como en ausencia de la sustancia, para ver si una cierta sustancia es una sustancia que inhibe la unión de la semaforina 4D y de la plexina B1, y estudiamos si el enlace entre estas disminuye en presencia de esa sustancia, de forma que pudiera confirmarse con facilidad.

El efecto de aceleración de la osteogénesis mencionado en la presente invención indica el efecto de aceleración de la osteogénesis, de forma más precisa incluye el efecto de acelerar la osteogénesis por parte de los osteoblastos mediante la inhibición de la supresión de la diferenciación de los osteoblastos. Si una cierta sustancia tiene o no un efecto de aceleración de la osteogénesis puede ser confirmado mediante la administración de la sustancia a vertebrados que tengan una menor cantidad de hueso de la habitual (preferentemente a pacientes con osteoporosis y a modelos de vertebrados de osteoporosis) y averiguar si aumenta o no la cantidad de hueso.

El efecto de prevención y tratamiento de la enfermedad ósea de la presente invención indica el efecto de prevención y / o de tratamiento de cualquiera de las enfermedades óseas, o el efecto de mejorar los síntomas de la presente invención. Si una cierta sustancia tiene o no un efecto terapéutico óseo puede ser confirmado mediante la administración de la sustancia a un paciente o a un vertebrado con una enfermedad ósea (preferentemente un paciente con osteoporosis o un modelo de vertebrado de osteoporosis) y estudiando después si la enfermedad ósea se cura o mejora.

La formulación de la presente invención puede contener únicamente la sustancia de inhibición de la unión de la presente invención, sin embargo, puede añadirse un habitualmente permitido farmacológicamente portador, agente de unión, estabilizante, excipiente, diluyente, tampón de pH, disgregante, agentes solubilizante, adyuvante de solubilización, isotónico y otros componentes de combinación de agentes de ajustes. La formulación del agente reductor de la presente invención puede ser una formulación en polvo, una formulación granulada, un agente en cápsula u otra preparación sólida. También puede ser una preparación en solución, una emulsión, una suspensión u otra formulación líquida. Estas preparaciones pueden usarse según sea adecuado para la sustancia de inhibición de la unión de la presente invención mediante un tratamiento usando el método habitual.

No hay ninguna restricción en particular sobre el método usado para la administración del agente de la presente invención, siempre que tenga el efecto preventivo o terapéutico de la enfermedad ósea deseado, y pueda ser administrado por vía oral o no oral. El método no oral usado para su administración incluye una administración vascular, una administración muscular, una administración hipodérmica, una administración transdérmica, una administración nasal, una administración transpulmonar. De éstas, pueden usarse la administración vascular y la intravenosa con una ventaja particular. La dosis de la preparación de la presente invención, así como el número de veces administrada y la concentración, pueden ser ajustadas según el peso corporal del sujeto, el tipo de enfermedad ósea y los síntomas de la enfermedad ósea.

El sujeto para la presente invención pueden ser vertebrados, tales como mamíferos y animales pertenecientes a la familia de las aves. Estos pueden incluir seres humanos, monos, ratones, ratas, hámsteres, cobayas, vacas, cerdos, caballos, conejos, ovejas, cabras, gatos, perros, pollos, codornices y otros animales adecuados. De éstos, son particularmente adecuados los seres humanos y los animales domésticos y las aves. La sustancia de inhibición de la unión contenida en el agente de la presente invención es adecuada desde el punto de vista de obtener un sorprendente efecto de aceleración de la osteogénesis y un efecto de prevención y tratamiento de una enfermedad ósea cualquiera que sea el tipo de vertebrado derivado de la semaforina 4D y de la plexina B1 que provoque que la acción de inhibición de la unión coincida con el tipo de vertebrado que es un candidato para la administración del agente de la presente invención. Adicionalmente, un vertebrado derivado de la semaforina 4D y el tipo de vertebrado derivado de la plexina B1 pueden ser iguales o diferentes.

No hay ninguna restricción en particular sobre el tipo de enfermedad ósea que puede ser tratada usando la presente invención, siempre que sea una enfermedad ósea que tenga un factor que provoque una disminución en la osteogénesis o en una enfermedad ósea relacionada con una disminución en la osteogénesis. Sin embargo, las fracturas óseas, la insuficiencia ósea, la osteoporosis, la osteomalacia, la insuficiencia ósea, el dolor lumbar, la enfermedad ósea de Paget, la mielitis tónica, el reumatismo articular, la disosteogénesis y la artrosis deformante son, todas, unas candidatas adecuadas. De éstas, son particularmente adecuadas la osteoporosis, la osteomalacia, la osteopenia y la disosteogénesis.

El método de la presente invención es un método usado para la determinación de un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis en el que se determina si una sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1, y si la sustancia mencionada anteriormente en estudio es la sustancia mencionada anteriormente que inhibe la unión, se determina que la sustancia mencionada anteriormente en estudio es un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis. En el anteriormente mencionado método de determinación, las siguientes etapas (A) hasta (D) son un ejemplo adecuado del método usado para determinar si una sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1:

- (A) una etapa en la que se ponen en contacto entre sí la semaforina 4D y la plexina B1 en presencia de la sustancia en estudio;
- (B) una etapa en la que se mide el grado de unión entre la semaforina 4D y la plexina B1;
- (C) una etapa en la que se compara el grado medido en la etapa (B) anterior con el grado cuando no está en presencia de la sustancia en estudio;
- (D) una etapa en la que se determina que la sustancia en estudio es una sustancia que inhibe la unión entre la semaforina 4D y la plexina B1 cuando el grado medido en la etapa (B) anterior es menor que el grado cuando no está en presencia de la sustancia en estudio.

En el anteriormente mencionado método de determinación, puede usarse lo siguiente para medir el grado de unión: para la semaforina 4D, la región extracelular de la semaforina 4D marcada o la proteína de fusión de la región extracelular de la semaforina 4D y la región Fc de una inmunoglobulina, etc., y para la plexina B1, una célula que expresa la plexina B1 en su superficie. También puede usarse lo siguiente para medir el grado de unión: para la plexina B1, la región extracelular de la plexina B1 marcada o la proteína de fusión de la región extracelular de la plexina B1 y la región Fc de una inmunoglobulina, etc., y para la semaforina 4D, una célula que expresa la 4D en su superficie.

No hay ninguna restricción en particular sobre la sustancia en estudio en el método de determinación de la presente invención, y puede ser una sustancia que se ha predeterminado que tiene una actividad que inhibe la unión de la semaforina 4D y la plexina B1, y puede ser cualquier sustancia cuya actividad sea desconocida. También es posible usar simultáneamente múltiples sustancias en estudio. Cuando se usan simultáneamente múltiples sustancias en estudio, es posible usar simultáneamente sustancias individuales en estudio, cada una en una muestra individual, usar simultáneamente múltiples sustancias en estudio en una muestra individual, o usar simultáneamente múltiples muestras preparadas individualmente con múltiples sustancias en estudio. Cuando se usan simultáneamente múltiples sustancias en estudio en una única muestra, puede no ser posible determinar en una única prueba cuál de las sustancias en estudio inhibe la unión de la semaforina 4D y la plexina B1, pero es posible determinar cuál de las sustancias en estudio es un inhibidor de la unión realizando la prueba múltiples veces y estrechando las sustancias en estudio por etapas. El método de determinación de la presente invención está caracterizado por la búsqueda de sustancias en estudio para un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis, y el método puede usarse para cribar un candidato a principio activo para un agente de aceleración de la osteogénesis.

En el presente documento también se enseña (a) el uso de una sustancia de inhibición de la unión en la producción del agente preventivo y terapéutico del anteriormente mencionado agente de aceleración de la osteogénesis y enfermedades óseas; (b) una sustancia de inhibición de la unión para su uso como un agente de aceleración de la osteogénesis y en la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas; (c) un método de uso de la sustancia de inhibición de la unión para la aceleración de la osteogénesis y la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas; (d) un método para promover la osteogénesis mediante la administración de la sustancia de inhibición de la

unión; y (e) un método para la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas mediante la administración de la sustancia de inhibición de la unión.

5 A continuación describiremos la presente invención con detalle con referencia a los ejemplos prácticos de la misma, sin embargo, no debe interpretarse en modo alguno que la presente invención está restringida a estos ejemplos prácticos.

Ejemplos prácticos 1

10 Análisis de los fenotipos de ratón y óseo

15 Produjimos los ratones Sema4d^{-/-}, Plxnb1^{-/-}, inactivados para la plexina B2 (Plxnb2^{-/-}), CAT-RhoA DN y α 1 (I)-Cre según el método descrito en la bibliografía (W. Shi et al., Immunity 13, 633 (noviembre de 2000); R. H. Friedel et al., J Neurosci 27, 3921 (4 de abril de 2007); R. H. Friedel et al., Proc Natl Acad Sci USA 102, 13188 (13 de septiembre de 2006); K. Kobayashi et al., J. Neurosci 24, 3480 (7 de abril de 2004); R. Dacquin, M. Starbuck, T. Schinke; G. Karsenty, Dev Dyn 224, 245 (junio de 2002)). Todos los ratones se retrocruzaron 8 veces o más con ratones C57BL/6. Todos los ratones se mantuvieron en un estado en el que no había hongos patógenos específicos. Todos los experimentos con animales fueron autorizados por el Animal Experiment Committee of the Tokyo Medical and Dental University, y cumplían con las directrices y las leyes relacionadas. El análisis del fenotipo óseo implicó el control respectivamente de los ratones alterados genéticamente de los ratones de la misma camada, y analizamos al menos 8 machos y 8 hembras. El análisis de micro CT tridimensional (μ CT) y los análisis de medición histomorfométricos se llevaron a cabo según los métodos descritos en la bibliografía (K. Nishikawa et al., J Clin Invest 120, 3455 (1 de octubre de 2010); T. Koga et al., Nature 428, 758 (15 de abril de 2004).

25 Ratones con una médula ósea quimérica

30 Produjimos ratones con una médula ósea quimérica modificando en parte el método descrito en la bibliografía (B. Zhao et al., Nat Med 15, 1066 (septiembre de 2009). Esto significa que recogimos células de médula ósea de donante (C57BL6-Ly5, 2 acervos genéticos) de ratones naturales Sema 4d^{-/-} de la misma camada. Inyectamos por vía intravenosa 2 x 10⁶ células obtenidas a partir de cada donante en la vena caudal del ratón receptor natural (3 semanas de edad, C57BL/6-Ly5, 1 acervo genético) expuesto a una radiación letal, o de ratones Sema4d^{-/-}. Ocho semanas después del trasplante de médula ósea, se alcanzó un elevado nivel de quimerismo de tipo donante (> 95 %).

35 Análisis en genochip

40 Llevamos a cabo un análisis en genochip según el método descrito en la bibliografía (K. Nishikawa et al., J Clin Invest 120, 3455 (1 de octubre de 2010)). Esto significa que después de llevar a cabo una síntesis de ADNc usando una transcripción inversa usando todo el ARN, sintetizamos el ARNc que había sido sometido a un marcaje biotinizado mediante una transcripción *in vitro*. Después de fragmentar el ARNc, llevamos a cabo una hibridación usando el A430 GeneChip de ratón (fabricado por Affymetrix) según el método descrito en la bibliografía (T. Koga et al., Nat Med 11, 880 (agosto de 2005); H. Takayanagi et al., Dev Cell 3, 889 (diciembre de 2002).

45 Inducción de la diferenciación de los osteoblastos *in vitro*

50 La inducción de la diferenciación de los osteoblastos y de los osteoclastos *in vitro* se llevó a cabo según el método descrito en el documento (T. Koga et al., Nat Med 11, 880 (agosto de 2005); y H. Takayanagi et al., Dev Cell 3, 889 (diciembre de 2002). Esto significa que llevamos a cabo una inducción de la diferenciación llevando a cabo el cultivo de células derivadas de la bóveda craneal en un medio de cultivo de osteogénesis (50 μ M de ácido ascórbico, 10 nM de dextrasona y 10 mM de β -glicerofosfato) y la inducción de la diferenciación se confirmó mediante un ensayo de fosfatasa alcalina (ALP) (después de 7 días) y un análisis de la osteonodosidad (21 días después, tinción con rojo de alizarina). Se añadieron Fc-sema4D, anticuerpos anti-Semar4D y anticuerpos anti-plexina BA (anticuerpos anti-Plexina B1) cada 3 días. Se recuperó el sobrenadante de los osteoclastos a partir de cada solución de cultivo de las células naturales y de las Sema4d^{-/-} después de estimular el ligando activado por el receptor del factor intranuclear κ B (RANKL; fabricado por Peprotech). Cultivamos los osteoclastos cultivados en una placa de código de colágeno (fabricada por IWAKI) y los recuperamos usando tripsina dos días después de la estimulación con el RANKL. El sobrenadante de los osteoclastos se usó como un medio de cultivo de osteogénesis que contiene el reactivo mencionado anteriormente, y lo añadimos a los osteoclastos cultivados (1 x 150 células/pocillo, placa de 24 pocillos) cada 3 días.

60 Análisis de RT-PCR cuantitativa en tiempo real

65 Se llevó a cabo una RR-PCR cuantitativa en tiempo real según los protocolos del producto usando un dispositivo ciclador ligero (fabricado por Roche) y SYBR Green (fabricado por Toyobo). Usamos con los siguientes cebadores.

Plxnb1 sentido: 5'-tgggcatgtgcagtacgat-3' (número de secuencia 5),

Plxnb1 antisentido: 5'-cactgctctccagggttctcc-3' (número de secuencia 6),
 Plxnb2 sentido: 5'-aggggagcctctctacaagc-3' (número de secuencia 7),
 Plxnb2 antisentido: 5'-tcgatccctctcatctgaac-3' (número de secuencia 8),
 Plxnb3 sentido: 5'-atatgctgagcgtgctctct-3' (número de secuencia 9),
 Plxnb3 antisentido: 5'-tgctgttgagcaattggag-3' (número de secuencia 10),
 CD72 sentido: 5'-gcctctcctgtcctgtctg-3' (número de secuencia 11),
 CD72 antisentido: 5'-cctcctggaactgctgagac-3' (número de secuencia 12),
 Alpl sentido: 5'-aacccagacacaagcattcc-3' (número de secuencia 13)
 Alpl antisentido: 5'-gccttgaggttttgtca-3' (número de secuencia 14)
 Bglap sentido: 5'-gcgctctgtctctgacct-3' (número de secuencia 15),
 Bglap antisentido: 5'-accttattgccctcctgctt-3' (número de secuencia 16),
 Colla1 sentido: 5'-gagcggagagtactggatcg-3' (número de secuencia 17),
 Coll11 antisentido: 5'-gttcgggctgatgtaccagt-3' (número de secuencia 18)
 Gapdh sentido: 5'-accagaaagactgtggatgg-3' (número de secuencia 19),

Introducción genética de adenovirus y retrovirus

El método de producción del vector adenovirico portador del tipo de configuración activo (CA) de RhoA (Myc-V14Rho) y Rac1 (hRac1 V12) y el tipo negativo dominante (DN) de RhoA (Myc-N19Rho) y Rac1 (hRac1 V12), y el método de introducción de estos, se llevaron a cabo según el método descrito en la bibliografía (Bito, H. et al. A Critical Role for a Rho-Associated Kinase, p160ROCK, in Determining Axon Outgrowth in Mammalian CNS Neurons, *Neuron* 26, 431-441 (2000). La producción del vector retrovirico (pMXs-Plexin-B1-EGFP, pMXs-Plexin-B1 RA-EGFP y pMXs-Plexin-B1 DPDS-EGFP en el que se manifestaba el mutante [Plexin-B1 DPDZ-EGFP]) en el que no pudo activarse la activación de la [Plexin-B1 RA] y de la RhoA, se llevó a cabo insertando el fragmento de ADNc respectivamente de la Plexina B1, la Plexina B1 RA (I. Oinuma, Y. Ishikawa, H. Katoh, M. Negishi, *Science* 305, 862 (6 de agosto de 2004) y la Plexina B1 DPDZ (V. Perrot, J. Vazquez-Prado, J. S. Gutkind, *J Biol Chem* 277, 43115 (8 de noviembre de 2002)) en pMXs-IRES-EGFP. La producción de un retrovirus recombinante se llevó a cabo según el método descrito en la bibliografía (S. Morita, T. Kojima, T. Kitamura, *Gene Ther* 7, 1063 (junio de 2000). Esto significa que llevamos a cabo un empaquetamiento del retrovirus mediante la introducción del vector retrovirico producido en las células Plat-E.

Procesado de los anticuerpos anti-Sema4D para la disminución en la cantidad de hueso inducida por la OVX

La producción de un modelo de ratón de osteoporosis inducida por una OVX (ovariotomía) se llevó a cabo según el método descrito en la bibliografía (M. Shinohara et al., *J. Bio Chem* 282, 17640 (15 de junio de 2007). Esto significa que llevamos a cabo una operación de extracción de los ovarios o una pseudooperación en ratones hembra de 7 semanas de edad. Con este modelo de ratón llevamos a cabo pruebas con más de 6 ratones en cada grupo. Validamos esto usando el método indicado a continuación para averiguar si había o no un efecto preventivo sobre la disminución en la cantidad de hueso. Esto significa que inyectamos por vía intravenosa 20 µg de los anticuerpos Sema4D (fabricados por MBL) o una solución salina en la vena caudal una vez por semana. Sacrificamos todos los ratones 8 semanas después de la cirugía y realizamos un análisis de µCT y un análisis de osteomorfogénesis. También llevamos a cabo la validación usando el siguiente método, para estudiar si había o no un efecto de aceleración sobre la cantidad de hueso que había disminuido. Esto significa que después de 6 semanas inyectamos por vía intravenosa 20 µg de los anticuerpos anti-Sema4D (fabricados por MBL) en la vena caudal durante 3 semanas cada 3 días en ratones OVX. Sacrificamos todos los ratones 9 semanas después de la operación y los usamos para un análisis de µCT.

Análisis de inmunotransferencia, análisis de precipitación y tinción inmunofluorescente

Cultivamos células de la bóveda craneal durante dos días en un medio de cultivo de osteogénesis (50 µM de ácido ascórbico, 10 nM de dexametasona y 10 mM de β-glicerofosfato) y después las estimulamos con Fc-Sema4D. Usamos IgG humana purificada (parte Fc) (fabricada por Beckman Coulter) para el control nativo para el análisis de la precipitación (tiempo 0). Recogimos las células en el punto indicado y llevamos a cabo un análisis de inmunotransferencia o un análisis de precipitación usando anticuerpos anti-Plexina B1 (clon A-8, fabricado por Santa Cruz); anticuerpos anti-PDZ-RhoGEF (policlonales, fabricados por Protein Express); anticuerpos anti-LARG (policlonales, fabricados por Lifespan Biosciences); anticuerpos anti-fosfo-Akt (Thr308) (policlonales, fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-Akt (policlonales, fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-fosfor ERK (Thr202/Tyr204) (policlonales, fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-ERK (policlonal, fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-Met (clon 25H2) (fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-ErbB2 (clon 29D8) (fabricados por Cell Signaling); anticuerpos anti-Rac1 (clon 102/Rac1) (fabricados por BD Transduction Laboratories); anticuerpos anti-RhoA (clon 55/Rho) (fabricados por BD Transduction Laboratories); anticuerpos anti-cadherina-11 (policlonales, fabricados por Invitrogen); anticuerpos anti-IRS1 (clon 53-10C-31) (fabricados por Millipore); y anticuerpos anti-b-actina (clon AC40) (fabricados por Sigma-Aldrich). La fosforilación de la plexina B1, la Met, la ErbB2 y el IRS1 fueron detectados con anticuerpos anti-fosfotirosina (4G10, fabricados por Upstate) después de una inmunoprecipitación usando respectivamente anticuerpos específicos para estos. Incubamos el producto celular disuelto con Fc-sema4D (500 ng) que se unió a microesferas de proteína A-agarosa con objeto de detectar la

plexina B1 que se unía a la semaforina 4D, y se llevó a cabo un análisis de inmunotransferencia usando anticuerpos anti-Plexina B1. La detección de la activación de la GTPasa se llevó a cabo según la descripción de la bibliografía (M. Shinohara et al., J Bio Chem 282, 17640 (15 de junio de 2007)). Esto significa que tratamos las células de la bóveda craneal con Fc-sema4D y las recogimos en el punto en el que se mostraron. Incubamos el producto celular disuelto con GST-RBD (usando RhoA) o GST-PAK1 (usando Rac1) (2 µg) que se unían a la sefarsa de glutatión, y llevamos a cabo un análisis de inmunotransferencia usando respectivamente anticuerpos anti-RhoA o anticuerpos anti-Rac1. Fijamos las células con paraformaldehído al 4 % para la tinción inmunofluorescente, llevamos a cabo un procesado de penetración y después las teñimos usando anticuerpos secundarios marcados con Alex Fluor 488 y faloidina conjugada con rodamina (fabricada por Molecular Probes).

Citometría de flujo

Teñimos una única solución de células flotantes usando anticuerpos monoclonales conjugados con 8 tipos de pigmentos fluorescentes [anticuerpos anti-CD45. 2 conjugados con PerCP.Cy5.5; anticuerpos anti-CD45.2 (clon 104) conjugados con FITC; anticuerpos anti-CD11b (clon M1/70) conjugados con eFLuor450; anticuerpos anti-CD105 (clon MJ7/18) conjugados con PE; anticuerpos anti-CD10 (clon 4.29E+02) conjugados con Alex Fluor 647; (anticuerpos anti-CD44 conjugados con APC-Alexa Fluor 750; anticuerpos anti-Cd 44 (clon IM7) conjugados con AC-Cy7; y anticuerpos anti-Sca-1 (clon D7) (fabricados por eBioscience) conjugados con APC con objeto de analizar las células derivadas de médula ósea y las células de la bóveda craneal. Después llevamos a cabo una citometría de flujo usando FACSCant II usando el programa informático Diva (fabricado por BD Biosciences).

Análisis de la proliferación celular

Cultivamos células intersticiales derivadas de médula ósea en un medio de cultivo en condiciones de osteogénesis y analizamos el índice de proliferación celular antes de la diferenciación de los osteoblastos (Día 0) o en el proceso de diferenciación de los osteoblastos (Día 14) usando una estimulación con semaforina 4D usando Fc de IgG humana parcial o usando un kit de proliferación celular ELISA (fabricado por Roche) en presencia de Fc-Sema4D y detectamos la incorporación de 5-bromo-2' desoxiuridina (BrdU).

Análisis de la unidad formadora de colonias (UFC)

Colocamos en placas células de médula ósea a 3 x 10⁶ células por pocillo individual en una placa de 24 pocillos. Después cultivamos esto durante 3 días usando un medio de cultivo α-MEM que contiene un 10 % de suero bovino fetal y después los sustituimos por medio de cultivo en condiciones de osteogénesis. La unidad formadora de colonias-fosfatasa alcalina (UFC-ALP) fue detectada en forma de una colonia positiva para la ALP el día 7, y la UFC-osteoblasto (UFC-Ob) fue detectada en forma de una colonia positiva para el rojo de alizarina el día 21. El número de colonias agregadas (UFC-fibroblastos (UFC-F)) fue detectado mediante una tinción con azul de toluidina el día 7 y el día 21.

Análisis estadístico

Todos los datos se indican como la media ± EEM (n = 15). El análisis estadístico se llevó a cabo usando la prueba de Student ANOVA, y cuando fue posible, la prueba de Bonferroni (*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,005; n. s., no significativo). Los resultados están indicados en el ejemplo representativo de 4 o más experimentos individuales.

Resultados

Llevamos a cabo un cribado amplio del genoma del ARNm en los osteoclastos y los osteoblastos usando un análisis con GeneChip para estudiar si la semaforina, la efrina, la slits y la netrina, que son moléculas de guiado axónico, contribuyen o no al remodelado del hueso. Esto significa que después de analizar 20 tipos de semaforina, 16 tipos de efrina, 6 tipos de slits y 6 tipos de netrina, se confirmó una manifestación extremadamente alta de la semaforina 4D en los osteoclastos. Sin embargo, esta manifestación no fue confirmada en los osteoblastos. Estos resultados indican que la semaforina 4D tenía una manifestación inducida selectivamente en el proceso de formación de los osteoclastos.

Llevamos a cabo un análisis funcional del sistema esquelético usando ratones Sema4d^{-/-} para estudiar la función de la semaforina 4D con una manifestación inducida selectivamente en el proceso de formación de los osteoclastos. Se demostró que la cantidad de hueso (Figura 1) y el ancho trabecular (Figura 2) en los ratones Sema4d^{-/-} había aumentado significativamente en comparación con los ratones naturales (ratones WT) usando un µCT y un análisis de osteomorfogénesis. El área superficial de la osteogénesis en los ratones Sema4d^{-/-} (Figura 3, a la izquierda), el área superficial del hueso calcificado (Figura 3, en el centro) y el índice de osteogénesis (Figura 3, a la derecha) aumentó notablemente en comparación con los ratones naturales. Sin embargo, no se produjeron cambios en los parámetros (las áreas superficiales de los osteoclastos (Figura 4, a la izquierda), el número de osteoclastos (Figura 4, en el centro) y el área superficial del hueso corroído (Figura 4, a la derecha), lo que indica una resorción ósea de los osteoclastos. También observamos que la formación de los osteoclastos *in vitro* en las células Sema4d^{-/-} era normal. A pesar del hecho de que la semaforina 4D se manifestaba específicamente en los osteoclastos, estos

resultados sugieren que el fenotipo de una elevada densidad ósea en los ratones Sema4d^{-/-} aumentó debido a la osteogénesis a través de los osteoblastos.

Llevamos a cabo un injerto de células inmunitarias adoptadas usando células de médula ósea que incluían células precursoras de osteoclastos, para averiguar si el fenotipo óseo de los ratones Sema4d^{-/-} se basaba o no en anomalías en el sistema de células de la médula ósea. Como resultado, la cantidad de hueso aumentó cuando se injertaron las células de médula ósea deficientes en Sema4d en los ratones naturales en comparación con cuando se injertaron las células de médula ósea naturales (véanse las dos gráficas de la izquierda de la Figura 5). Sin embargo, cuando se injertaron células de médula ósea del tipo normal en ratones Sema4d^{-/-}, la cantidad de hueso disminuyó y volvió a la normalidad en comparación con cuando se injertaron células de médula ósea deficientes en Sema4d (véanse las dos gráficas de la derecha de la Figura 5). Tomando como base estos resultados, se indicaba que el fenotipo óseo en los ratones Sema4d^{-/-} era tal que era la causa de las anomalías en las células del sistema hematopoyético que comprenden los osteoclastos. Adicionalmente, no se confirmó un aumento definido en los osteonodos de las células de la bóveda craneal Sema4d^{-/-} en la osteonodosis de las células de la bóveda craneal Sema4d^{-/-}. Estos resultados sugieren que la semaforina 4D que se manifiesta en los osteoclastos funciona como un factor de remodelado óseo que inhibe la osteogénesis a través de los osteoblastos.

Produjimos Fc-sema4D (I. Ishida et al., *Int Immunol* 15, 1027 (agosto de 2003) para estudiar con detalle el efecto de inhibición de la semaforina 4D sobre los osteoblastos. Después añadimos la Fc-sema4D a las células de la bóveda craneal que habían sido cultivadas en condiciones de osteogénesis. La adición de la Fc-sema4D inhibió la activación dependiente de la concentración de la ALP y la manifestación de la osteocalcina [Bglap] y del colágeno de tipo I [Colla1]). Estos resultados indican que la osteonodosis está inhibida como resultado de la inducción por parte de la Sema4D de la diferenciación de los osteoblastos. También cultivamos las células de la bóveda craneal en presencia del sobrenadante del cultivo de los osteoclastos o en presencia de los osteoblastos para ver si la semaforina 4D derivada de los osteoclastos contribuía o no a la regulación de la osteogénesis. En el cultivo conjunto con el sobrenadante del cultivo de los osteoclastos de tipo natural o con los osteoclastos, no se produjo ningún efecto sobre la osteonodosis, mientras que en el cultivo conjunto con el sobrenadante del cultivo de los osteoclastos Sema4d^{-/-} o en el cultivo conjunto con los osteoclastos, la osteonodosis estaba claramente acelerada. Tomando como base estos resultados, indican que los osteoclastos son inhibidores de la osteogénesis a través de la semaforina 4D producida en forma de soluble, al menos parcialmente. También debe destacarse que uno o más factores están contenidos en el sobrenadante de los osteoclastos. Se cree que el efecto de aceleración de la osteogénesis provocado por estos factores es revelado en su totalidad cuando no está presente la semaforina 4D.

Analizamos (a) la manifestación de la plexina de tipo B, que es bien conocida como el receptor de la semaforina D, en células no linfáticas y en células linfáticas, y (b) el ARN de CD72 (K. Suzuki, A. Kumanogoh, H. Kikutani, *Nat Immunol* 9, 17 (enero de 2008) usando una RT-PCR cuantitativa en tiempo real, con objeto de especificar el receptor de la semaforina 4D en el que se manifiestan los osteoblastos. Como resultado, la cantidad de plexina B1 manifestada aumentó notablemente durante la diferenciación de los osteoblastos (Figura 7). Sin embargo, la cantidad de plexina B2 manifestada era más bien baja, y no había prácticamente ninguna manifestación de plexina B3 y CD 72 (Figura 7). Después de llevar a cabo un análisis de precipitación usando Fc-sema 4D, se indicó que la semaforina 4D interactuaba con la plexina B1 (Figura 8). También se indicó que la Fc-sema 4D induce la fosforilación de la plexina B1. Es bien conocido que cuando la semaforina 4D se une a la plexina B1, se forma un conjugado con la cinasa de tirosina ErbB2 y la ErbB2 se autofosforila y la plexina B1 es dependiente de la semaforina B4. En la osteogénesis, después de la inhibición de la activación de la cinasa ErbB2, la fosforilación disminuye dependiente de la estimulación por parte de la semaforina 4D de la plexina B1. Tomando como base estos resultados, se sugiere que la plexina B1 actúa como el principal receptor para la semaforina 4D en los osteoblastos. Entonces analizamos el fenotipo óseo de los ratones Plxb1^{-/-}. Al igual que en los ratones Sema4d^{-/-}, la cantidad de hueso (Figura 9) y el ancho de la trabécula (Figura 10) de los ratones Plxb1^{-/-} aumentó notablemente en comparación con los ratones naturales debido a un aumento en la osteogénesis de los osteoblastos. El área superficial de los osteoblastos en los ratones Plxb1^{-/-} (Figura 11), el área superficial de hueso calcificado (Figura 12) y el índice de osteogénesis (Figura 13) también aumentaron respectivamente en comparación con los ratones naturales. Sin embargo, no se produjo ningún cambio en los parámetros (área superficial de los osteoclastos, y recuento de las células de osteoclastos y corrosión del área de la superficie ósea), lo que indica una resorción ósea en los osteoclastos. Tomando como base estos resultados, se sugiere que el fenotipo de elevada densidad ósea de los ratones Plxb1^{-/-}, al igual que el fenotipo de elevada densidad ósea de los ratones Sema4d^{-/-}, está causado por un aumento en la osteogénesis provocado por los osteoblastos. No se confirmó ningún efecto de estimulación sobre la osteonodosis por parte de los osteoblastos por los osteoclastos Sema4d^{-/-} naturales con los osteoclastos Sema4d^{-/-}. Por lo tanto, esto sugiere que la plexina B1 reconoce la osteogénesis fundamentalmente a través de la semaforina 4D.

¿Cómo se transforma la semaforina 4D-plexina B1 en las señales de inhibición en los osteoblastos? Es bien conocido que el sistema semaforina-plexina regula la osteomorfogénesis y las células errantes mediante la regulación de la reordenación de la actina de la célula ósea. También es bien conocido que cuando la semaforina 4D se combina con la plexina B2, la actividad de la RhoA es estimulada en presencia de la cinasa de tirosina ErbB2, mientras que la semaforina 4D tiene un acción contraria en presencia de otra cinasa de tirosina Met (J. M. Swiercz,

T. Worzfeld, S. Offermanns, J Bio Chem 283, 1893 (25 de enero de 2008). Por lo tanto, estudiamos la posibilidad de que la semaforina 4D activara la RhoA. Cuando analizamos la cantidad de ErbB2 y de Met manifestada en la osteogénesis, se sugirió que la ErbB2 se manifestaba en unas cantidades considerablemente mayores que la Met. Aunque la estimulación por parte de la semaforina 4D inducía la fosforilación de la ErbB2, no se inducía la fosforilación de la Met. Adicionalmente, basándonos en un análisis de inmunotransferencia y en un análisis de la precipitación, la semaforina 4D aumentó el tipo de activación de combinación de la GTP para la RhoA y está indicado que esta actividad es inhibida particularmente por parte de las células P1xnb1-0. Sin embargo, la actividad de la Racl, que es otra familia de Rho, no afectó a la estimulación de la semaforina 4D. Coincidiendo con estos resultados, cuando introdujimos la RhoA de tipo activación estructurada usando un adenovirus, la osteonodosis en las células de la bóveda craneal fue inhibida, mientras que cuando se introdujo una RhoA negativa dominante, la osteonodosis se aceleró. Sin embargo, la Racl de tipo activación estructurada y la Rac1 negativa dominante no afectaron a la osteogénesis. Tomando como base estos resultados, se sugiere que la RhoA media selectivamente en el efecto de inhibición de la osteogénesis por parte de la semaforina 4D plexina B1. La plexina B1 tiene dos dominios de regulación de la RhoGTPasa, es decir, un dominio de proteína activada por GTPasa (GAP) y un dominio de unión a PDZ que se une a RhoGEF (I. Oinuma, Y. Ishikawa, H. Katoh, M. Negishi, Science 305, 862 (6 de agosto de 2004), J. M. Swiercz, R. Kuner, J. Behrens, S. Offermanns, Neuron 35, 51 (3 de julio de, 2002), V. Perrot, J. Vázquez-Prado, J. S. Gutkind, J Bio Chem 277, 43115 (8 de noviembre de 2002), M. H. Driessens, C. Olivo, K. Nagata, M. Inagaki, J. G. Collard, FEBS Lett 529, 168 (9 de octubre de 2002). Tomando como base el análisis de precipitación y el análisis de inmunotransferencia, se indicó que PDZ-RhoGEF y LARG (la RhoGEF asociada a la leucemia), que se conocen como RhoGEG, se unían a la plexina B1 incluso en los osteoblastos. Por lo tanto, el anteriormente mencionado dominio GAP y el dominio de unión a PDZ produjeron dos tipos de mutantes de la plexina B1 (la Plexina B1- Δ PDZ y la Plexina B1 $\cdot$ RA) para determinar si la osteoporosis era inhibida significativamente (I. Oinuma, Y. Ishikawa, H. Katoh, M. Negishi, Science 305, 862 (6 de agosto de 2004) (Figura 14). Después de usar los dos tipos de mutantes de la plexina B1 y la plexina B1 natural (WT Plexina B1) respectivamente, para producir células de la bóveda craneal P1xnb1-/- con un exceso de manifestación, estimulamos éstas usando Fc-sema 4D y evaluamos el efecto de inhibición de la diferenciación de los osteoblastos. El efecto de inhibición de la Fc-Sema4d, indicado en la manifestación del ARNm de los marcadores de los osteoblastos (Alpl, Bglap y Col1a1), se recuperó en el exceso de manifestación de la WT-Plexina B1 y de la Plexina B1-RA, sin embargo, no se recuperó en el exceso de manifestación de la Plexina B1- Δ PDZ. Estos resultados sugieren que la RhoA media en la inhibición de la osteogénesis específicamente por parte de la semaforina 4D.

Cruzamos ratones transgénicos CAT-RHoA DN (K. Kobayashi et al., J. Neurosci 24, 3480 (7 de abril de 2004) y ratones transgénicos colágeno α 1 (I)-Cre (R. Dacquin, M. Starbuck, T. Schinke, G. Karsenty, Dev. Dyn 224, 245 (junio de 2002)) y produjimos ratones en los que se manifestaba específicamente la RhoA negativa dominante (RhoA DNOB) en los osteoblastos, para estudiar el papel de la RhoA en los osteoblastos *in vivo*. La cantidad de hueso (Figura 15) y el ancho de la trabécula (Figura 16) de los ratones RhoA DNOB aumentaron en comparación con los ratones naturales cuando la osteogénesis era acelerada por parte de los osteoblastos. Además, el área superficial de los osteoblastos (Figura 17) de los ratones RhoA DNOB, el área superficial del hueso (Figura 18) que se había calcificado y el índice de osteogénesis (Figura 19) aumentaron notablemente en comparación con los ratones naturales, sin embargo, no había ningún cambio en los parámetros que indicaban la resorción ósea de los osteoclastos (área superficial de los osteoclastos, número de osteoclastos y área superficial de hueso corroído). El fenotipo óseo era el mismo que el fenotipo óseo de los ratones Sema4d-/- y P1xbl-/. Dado que la manifestación de la RhoA DNOB aumentó durante la diferenciación de los osteoblastos, la manifestación de la osteonodosis y de los genes marcadores de los osteoblastos (Alpa, Bglap y Col1a1) aumentaron de forma notable en las células de la bóveda craneal procedentes de los ratones RhoA DNOB. La osteonodosis que aumentó en las células RhoA DNOB no fue inhibida por la Fc-sema4d, por lo que se sugiere que la RhoA media en las señales de inhibición cascada abajo de la semaforina 4D-plexina B1.

Con objeto de estudiar si la inhibición de la función de la Sema4D era eficaz o no para la osteoporosis, llevamos a cabo una validación usando un modelo de ratón con osteoporosis postmenopáusico tratado con una OVX (ovariotomía). Esto significa que administramos por vía intravenosa los anticuerpos anti-Sema4D a ratones sobre una base semanal después del tratamiento de OVX y estudiamos si había un efecto preventivo sobre la disminución en la cantidad de hueso. Después de analizar el tejido óseo, la cantidad de hueso disminuyó cuando no se administraban los anticuerpos anti-Sema4d, mientras que cuando se administraban los anticuerpos anti-Sema4d, se confirmó una aceleración en la osteogénesis (un aumento en el área superficial del osteoblasto [Figura 20], en la cantidad de hueso [Figura 21] y en el índice de osteogénesis [Figura 22] y una disminución en los intervalos trabeculares [Figura 23]). Sin embargo, no se produjeron cambios a los parámetros que indican la resorción ósea de los osteoclastos (el número de osteoclastos y el área superficial de hueso corroído). Tomando como base estos resultados, cuando la función de la semaforina 4D era inhibida por el tratamiento con los anticuerpos anti-Sema 4D, se indicaba un efecto preventivo sobre la disminución en la cantidad de hueso en la osteoporosis. También estudiamos si la inhibición funcional de la semaforina 4D era eficaz o no incluso para el tratamiento de la cantidad de hueso que ya había disminuido. Esto significa que después del tratamiento de OVX, administramos los anticuerpos anti-Sema4d en la vena caudal durante tres semanas, tres veces por semana, 6 semanas después de que la cantidad de hueso hubiera disminuido. Los resultados del análisis de los parámetros que indican una osteogénesis (área superficial de osteoblastos, aumento en la cantidad de hueso, aumento en el índice de osteogénesis y disminución en los intervalos trabeculares) confirmó la aceleración de la osteogénesis (aumento en el área

superficial del osteoblasto [Figura 26], en la cantidad de hueso [Figura 27] y aumento en el índice de osteogénesis [Figura 28] y una reducción en los intervalos trabeculares [Figura 29]). Por lo tanto, resultó evidente que una vez que la cantidad de hueso había disminuido, volvía al mismo nivel que cuando se administraban los anticuerpos Sema4D sobre una base semanal después del anteriormente mencionado tratamiento de OVX. Esto significa que se volvió al mismo nivel que cuando se previno la disminución en la cantidad de hueso. Sin embargo, no se produjeron cambios en los parámetros que indican la resorción ósea de los osteoclastos (área superficial de hueso corroído). También estudiamos el efecto de la inhibición funcional de la semaforina 4D y de la plexina B1 sobre la osteonodiosidad. Cuando se usaron osteoblastos de ratón y osteoclastos de ratones WT, la osteonodiosidad se aceleraba en función de la concentración de anticuerpos anti-Sema 4D (placas 1 a 3 desde la izquierda en el panel superior de la Figura 24). Sin embargo, la osteonodiosidad que era inhibida por la Fc-sema4d se aceleraba en función de la concentración de los anticuerpos anti-plexina B1 (panel inferior de la Figura 24). Tomando como base estos resultados, cuando la interacción semaforina 4D-plexina B1 es inhibida por un tratamiento con anticuerpos anti-Sema 4d o un tratamiento con anticuerpos anti-plexina B1, no solo se inhibe la disminución en la cantidad de hueso en la osteoporosis, sino que también se indica un efecto que promueve un aumento en la cantidad de hueso. También estudiamos el efecto de la inhibición funcional de la semaforina 4D en osteoblastos humanos sobre la osteonodiosidad. Esto significa que cuando llevamos a cabo una validación usando osteoclastos que se habían diferenciado a partir de células CD 14 positivas derivadas de monocitos de sangre periférica humana (Figura 25, fila inferior) y el sobrenadante del cultivo de las mismas (Figura 25, fila superior) y cuando las añadimos a los osteoclastos y al sobrenadante del cultivo de los mismos, y añadimos los anticuerpos anti-Sema4d a los osteoblastos, la osteonodiosidad se aceleraba en función de la concentración de los anticuerpos anti-Sema 4d (Figura 25). Estos resultados indican que los resultados en el anteriormente mencionado modelo de ratón con osteoporosis postmenopáusico eran apoyados para las células humanas, y que la inhibición de la interacción semaforina 4D-plexina B1 es una nueva estrategia en la promoción de la osteogénesis.

Realizamos un análisis detallado de la acción de la inhibición de la diferenciación de los osteoblastos por parte de la semaforina RD. Esto significa que cuando comparamos el número de células hematopoyéticas en la médula ósea (Sca-1+ CD105+ CD106+ CD44+ CD45, 2-CD11b) en los ratones Sema4d-/- con los ratones naturales mediante la realización de un análisis por citometría de flujo, no había diferencias. También llevamos a cabo un análisis de la proliferación celular, y aunque había un cierto aumento debido a la Sema4d previo la diferenciación de los osteoblastos (Día 0), no se produjo ningún cambio debido a la estimulación por parte de la semaforina 4D en el proceso de diferenciación de los osteoblastos (Día 14). Adicionalmente, basándonos en un análisis de UFC, la osteogénesis indicada en la manifestación de la ALP y la alizarina, era inhibida debido a la estimulación por parte de la semaforina 4D. Estos resultados sugieren que la semaforina 4D actúa en las etapas de diferenciación de los osteoblastos.

Se sabe que las señales del sustrato del receptor de la insulina (IRS) causadas por los factores de crecimiento insulinoides (IGF)-1 aceleran la diferenciación de los osteoblastos. Por lo tanto, estudiamos la fosforilación de la Akt y de la ERK con respecto a las señales del IRS con una estimulación con semaforina 4D, y el nivel de fosforilación disminuyó. La fosforilación de la Tyr, que es un indicador de la activación del IRS, también disminuyó. Estos resultados sugieren que la estimulación por parte de la semaforina 4D disminuye las señales del IRS. También está claro que la RhoA de tipo activado reduce la fosforilación de la Akt y de la ERK, y por el contrario Y-27632 y RKI, que son inhibidores de la RhoA, promueven esta fosforilación. También está claro que el inhibidor de la RhoA induce la promoción de la fosforilación de tipo activación en las señales del IRS. Estos resultados sugieren que la semaforina 4D induce una disminución en las señales del IRS mediante la activación de la RhoA, y que inhibe la diferenciación de los osteoblastos.

Sumario

Tomando como base los experimentos mencionados anteriormente, identificamos la semaforina 4D derivada de los osteoclastos como un mediador extremadamente importante para la transmisión entre osteoclastos y osteoblastos en la reconstrucción ósea. La reconstrucción ósea se lleva a cabo en ciclos formados por tres etapas (comenzando por una resorción ósea debida a los osteoclastos, una transición a una nueva osteogénesis debida a los osteoblastos y la finalización de una nueva síntesis de hueso (K. Matsuo, N. Irie, Arch Biochem Biofys 473, 201 (mayo de 2008)). La sema4d que se manifiesta en los osteoclastos funciona hasta el momento en que se completa la resorción de los osteoclastos como un factor de inhibición de la osteogénesis en la fase inicial, en la que está inhibida la diferenciación de los osteoblastos. Adicionalmente, también se indica que la activación de la RhoA inhibe la osteogénesis de los osteoblastos *in vivo*. Se indica que la EfrinB2/EfB4, que contribuye a la fase de transición, también hace uso de la RhoA para regular la osteogénesis (C. Zhao et al., Cell Metab 4, 111 (agosto de 2006)), lo que sugiere que la familia Rho-GTPasa molecular menor actúa como un coordinador para la transmisión individual en la reconstrucción ósea. Se ha indicado que la RhoA específica que contiene PDZ, GEFArgef 12 (LARG) (J. M. Swiercz, R. Kuner, J. Behrens, S. Offermanns, Neuron 35, 51 (3 de julio de 2002); V. Perrot, J. Vázquez-Prado, J. S. Gutkind, J Bio Chem 277, 43115 (8 de noviembre de 2002)) tiene una elevada manifestación en los osteoblastos en un análisis mediante GeneChip. Estos resultados respaldan la importancia de la vía de la semaforina 4D-plexina B1-RhoA. Adicionalmente, basándonos en el análisis usando una tinción inmunofluorescente, se ha observado una regulación por disminución para la cadherina 11 después de la estimulación con Fc-sema Rd, y se sugiere la contribución de la función de unión gap regulada. El tratamiento intermitente con hormonas paratiroideas (PTH) es el

único método eficaz que se ha demostrado que aumenta la osteogénesis. Los anticuerpos anti-Sost, que actualmente están en desarrollo, han atraído atención como un nuevo agente para la osteogénesis, mientras que puede esperarse que los factores dirigidos a los anticuerpos relacionados con la vía de la semaforina 4D-plexina B1-RhoA y los inhibidores y similares sean unos nuevos agentes terapéuticos para los pacientes con osteopenia.

5 Aplicación industrial

La presente invención puede usarse para efectuar una aceleración en la osteogénesis y en la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas.

10 LISTADO DE SECUENCIAS

<110> National University Corporation Tokyo Medical and Dental University

15 <120> Agente para promover la osteogénesis

<130> P11-005P

20 <150> 2011-108642

<151> 13-05-2011

<160> 20

25 <170> PatentIn versión 3.1

<210> 1

<211> 2217

<212> ADN

30 <213> *Homo sapiens*

<220>

<223> Inventor: Takayanagi, Hiroshi; Negishi, Takako

35 <400> 1

ES 2 640 567 T3

atgaggatgt	gcacccccat	tagggggctg	ctcatggccc	ttgcagtgat	gtttgggaca	60
gcgatggcat	ttgcacccat	accccggatc	acctgggagc	acagagaggt	gcacctggtg	120
cagtttcatg	agccagacat	ctacaactac	tcagccttgc	tgctgagcga	ggacaaggac	180
accttgtaga	taggtgcccg	ggaggcggtc	ttcgctgtga	acgcactcaa	catctccgag	240
aagcagcatg	aggtgtattg	gaaggtctca	gaagacaaaa	aagcaaatg	tgagaaaaag	300
gggaaatcaa	aacagacaga	gtgcctcaac	tacatccggg	tgctgcagcc	actcagcggc	360
acttcccttt	acgtgtgtgg	gaccaacgca	ttccagccgg	cctgtgacca	cctgaactta	420
acatccttta	agtttctggg	gaaaaatgaa	gatggcaaag	gaagatgtcc	ctttgacca	480
gcacacagct	acacatccgt	catggttgat	ggagaacttt	attcggggac	gtcgtataat	540
tttttgggaa	gtgaacccat	catctcccga	aattcttccc	acagtcctct	gaggacagaa	600
tatgcaatcc	cttggctgaa	cgagcctagt	ttcgtgtttg	ctgacgtgat	ccgaaaaagc	660
ccagacagcc	ccgacggcga	ggatgacagg	gtctacttct	tcttcacgga	ggtgtctgtg	720
gagtatgagt	ttgtgttcag	ggtgctgatc	ccacggatag	caagagtgtg	caagggggac	780
cagggcggcc	tgaggacctt	gcagaagaaa	tggacctcct	tcttgaagc	ccgactcctc	840
tgctcccggc	cagacagcgg	cttggctctc	aatgtgctgc	gggatgtctt	cgtgctcagg	900
tccccgggcc	tgaaggtgcc	tgtgttctat	gcaactctca	ccccacagct	gaacaacgtg	960
gggctgtcgg	cagtgtgcgc	ctacaacctg	tccacagccg	aggaggtctt	ctcccacggg	1020
aagtacatgc	agagcaccac	agtggagcag	tcccacacca	agtgggtgcg	ctataatggc	1080
ccggtacca	agcccgggcc	tggagcgtgc	atcgacagcg	aggcacgggc	cgccaactac	1140
accagctcct	tgaatttgcc	agacaagacg	ctgcagttcg	ttaaagacca	ccctttgatg	1200

ES 2 640 567 T3

gatgactcgg taacccaat agacaacagg cccagggttaa tcaagaaaga tgtgaactac 1260
 acccagatcg tggaggaccg gaccaggcc ctggatggga ctgtctatga tgtcatgttt 1320
 gtcagcacag accggggagc tctgcacaaa gccatcagcc tcgagcacgc tgttcacatc 1380
 atcgaggaga cccagctctt ccaggacttt gagccagtcc agaccctgct gctgtcttca 1440
 aagaagggca acaggtttgt ctatgctggc tctaactcgg gcgtggtcca ggccccgctg 1500
 gccttctgtg ggaagcacgg cacctgcgag gactgtgtgc tggcgcgga cccctactgc 1560
 gcctggagcc cgcccacagc gacctgcgtg gctctgcacc agaccgagag cccagcagg 1620
 ggtttgattc aggagatgag cggcgatgct tctgtgtgcc cggcctcgtc tcctaagcoc 1680
 ctccctctc ctggctctc ttcctgtcc tgtctgggcc atgtggggga caggaggctt 1740
 tcctctccct ggaccccctg gccagcctcg ggtgcggggc ccgacagcag ctcgagggtc 1800
 tccttctgtc cgcccttctt gagtgaccag gcacagcacg tgcacgccct ggggaacttc 1860
 tacctcttct gccaggccac aggtcctgca gacattcgtt ttgtctggga gaagaatggg 1920
 cgagctctgg agacctgtgt ccctgtgcag acccatgcac tgcccgatgg cagggcccat 1980
 gcactcagct ggctgcagga cgccatcagg gaaagcgtg agtategctg ctctgtctc 2040
 tcctcagcag ggaacaagac ttcgaaggtg caggttgctg tgatgagacc tgaagtgacc 2100
 caccaggaga ggtggaccag agagctctct gcctggaggg ctgtggctgg ggagcacgac 2160
 cggatgatgc agagctggag gaaggcgtgg gaaagctgta gcaaggacac cctgtag 2217

<210> 2
 <211> 738
 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*

5

<400> 2

Met Arg Met Cys Thr Pro Ile Arg Gly Leu Leu Met Ala Leu Ala Val
 1 5 10 15
 Met Phe Gly Thr Ala Met Ala Phe Ala Pro Ile Pro Arg Ile Thr Trp
 20 25 30
 Glu His Arg Glu Val His Leu Val Gln Phe His Glu Pro Asp Ile Tyr
 35 40 45
 Asn Tyr Ser Ala Leu Leu Leu Ser Glu Asp Lys Asp Thr Leu Tyr Ile
 50 55 60
 Gly Ala Arg Glu Ala Val Phe Ala Val Asn Ala Leu Asn Ile Ser Glu
 65 70 75 80

10

ES 2 640 567 T3

Lys Gln His Glu Val Tyr Trp Lys Val Ser Glu Asp Lys Lys Ala Lys
 85 90 95
 Cys Ala Glu Lys Gly Lys Ser Lys Gln Thr Glu Cys Leu Asn Tyr Ile
 100 105 110
 Arg Val Leu Gln Pro Leu Ser Ala Thr Ser Leu Tyr Val Cys Gly Thr
 115 120 125
 Asn Ala Phe Gln Pro Ala Cys Asp His Leu Asn Leu Thr Ser Phe Lys
 130 135 140
 Phe Leu Gly Lys Asn Glu Asp Gly Lys Gly Arg Cys Pro Phe Asp Pro
 145 150 155 160
 Ala His Ser Tyr Thr Ser Val Met Val Asp Gly Glu Leu Tyr Ser Gly
 165 170 175
 Thr Ser Tyr Asn Phe Leu Gly Ser Glu Pro Ile Ile Ser Arg Asn Ser
 180 185 190
 Ser His Ser Pro Leu Arg Thr Glu Tyr Ala Ile Pro Trp Leu Asn Glu
 195 200 205
 Pro Ser Phe Val Phe Ala Asp Val Ile Arg Lys Ser Pro Asp Ser Pro
 210 215 220
 Asp Gly Glu Asp Asp Arg Val Tyr Phe Phe Phe Thr Glu Val Ser Val
 225 230 235 240
 Glu Tyr Glu Phe Val Phe Arg Val Leu Ile Pro Arg Ile Ala Arg Val
 245 250 255
 Cys Lys Gly Asp Gln Gly Gly Leu Arg Thr Leu Gln Lys Lys Trp Thr
 260 265 270
 Ser Phe Leu Lys Ala Arg Leu Ile Cys Ser Arg Pro Asp Ser Gly Leu
 275 280 285
 Val Phe Asn Val Leu Arg Asp Val Phe Val Leu Arg Ser Pro Gly Leu
 290 295 300
 Lys Val Pro Val Phe Tyr Ala Leu Phe Thr Pro Gln Leu Asn Asn Val
 305 310 315 320
 Gly Leu Ser Ala Val Cys Ala Tyr Asn Leu Ser Thr Ala Glu Glu Val
 325 330 335

ES 2 640 567 T3

Phe Ser His Gly Lys Tyr Met Gln Ser Thr Thr Val Glu Gln Ser His
 340 345 350
 Thr Lys Trp Val Arg Tyr Asn Gly Pro Val Pro Lys Pro Arg Pro Gly
 355 360 365
 Ala Cys Ile Asp Ser Glu Ala Arg Ala Ala Asn Tyr Thr Ser Ser Leu
 370 375 380
 Asn Leu Pro Asp Lys Thr Leu Gln Phe Val Lys Asp His Pro Leu Met
 385 390 395 400
 Asp Asp Ser Val Thr Pro Ile Asp Asn Arg Pro Arg Leu Ile Lys Lys
 405 410 415
 Asp Val Asn Tyr Thr Gln Ile Val Val Asp Arg Thr Gln Ala Leu Asp
 420 425 430
 Gly Thr Val Tyr Asp Val Met Phe Val Ser Thr Asp Arg Gly Ala Leu
 435 440 445
 His Lys Ala Ile Ser Leu Glu His Ala Val His Ile Ile Glu Glu Thr
 450 455 460
 Gln Leu Phe Gln Asp Phe Glu Pro Val Gln Thr Leu Leu Leu Ser Ser
 465 470 475 480
 Lys Lys Gly Asn Arg Phe Val Tyr Ala Gly Ser Asn Ser Gly Val Val
 485 490 495
 Gln Ala Pro Leu Ala Phe Cys Gly Lys His Gly Thr Cys Glu Asp Cys
 500 505 510
 Val Leu Ala Arg Asp Pro Tyr Cys Ala Trp Ser Pro Pro Thr Ala Thr
 515 520 525
 Cys Val Ala Leu His Gln Thr Glu Ser Pro Ser Arg Gly Leu Ile Gln
 530 535 540
 Glu Met Ser Gly Asp Ala Ser Val Cys Pro Ala Ser Ser Pro Lys Pro
 545 550 555 560
 Leu Pro Pro Pro Gly Ser Ser Ser Leu Ser Cys Leu Gly His Val Gly
 565 570 575
 Asp Arg Arg Leu Ser Ser Pro Trp Thr Pro Trp Pro Ala Ser Gly Ala
 580 585 590

ES 2 640 567 T3

Gly Pro Asp Ser Ser Ser Arg Val Ser Leu Leu Pro Pro Phe Leu Ser
 595 600 605

Asp Gln Ala Gln His Val His Ala Leu Gly Asn Phe Tyr Leu Phe Cys
 610 615 620

Gln Ala Thr Gly Pro Ala Asp Ile Arg Phe Val Trp Glu Lys Asn Gly
 625 630 635 640

Arg Ala Leu Glu Thr Cys Val Pro Val Gln Thr His Ala Leu Pro Asp
 645 650 655

Gly Arg Ala His Ala Leu Ser Trp Leu Gln Asp Ala Ile Arg Glu Ser
 660 665 670

Ala Glu Tyr Arg Cys Ser Val Leu Ser Ser Ala Gly Asn Lys Thr Ser
 675 680 685

Lys Val Gln Val Ala Val Met Arg Pro Glu Val Thr His Gln Glu Arg
 690 695 700

Trp Thr Arg Glu Leu Ser Ala Trp Arg Ala Val Ala Gly Glu His Asp
 705 710 715 720

Arg Met Met Gln Ser Trp Arg Lys Ala Trp Glu Ser Cys Ser Lys Asp
 725 730 735

Thr Leu

<210> 3
 <211> 6408
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*

<400> 3

atgcctgctc tgggccagc tcttctccag gctctctggg ccgggtgggt cctcaccctc 60
 cagccccttc caccaactgc attcactccc aatggcacgt atctgcagca cctggcaagg 120
 gacccacct caggcaccct ctacctgggg gctaccaact tctgttcca gctgagcct 180
 gggctgcagc tggaggccac agtgtccacc ggccctgtgc tagacagcag ggactgcctg 240
 ccacctgtga tgectgatga gtgccccag gccagccta ccaacaacc gaatcagctg 300
 ctctgtgtga gccaggggc cctggtggtg tgcgggagcg tgcaccaggg ggtctgtgaa 360
 cagcggcgcc tggggcagct cgagcagctg ctgctgcggc cagagcggcc tggggacaca 420
 caatatgtgg ctgccaatga tctgctgggc agcacggtgg ggctggtagc ccagggcttg 480

5

10

ES 2 640 567 T3

gcaggggagc ccctcctggt tgtggggcga ggatacacca gcaggggtgt ggggggtggc 540
attccaccca tcacaacccg ggccctgtgg ccgcccgacc cccaagctgc cttctcctat 600
gaggagacag ccaagctggc agtgggcccgc ctctccgagt acagccacca cttcgtgagt 660
gcctttgcac gtggggccag cgcctacttc ctgttcctgc ggcgggacct gcaggctcag 720
tctagagctt ttcgtgccta tgtatctcga gtgtgtctcc gggaccagca ctactactcc 780
tatgtggagt tgccctctggc ctgcgaaggt ggccgctacg ggctgatcca ggctgcagct 840
gtggccacgt ccagggaggt ggcgcacatgg gaggtgctct ttgcagcttt ctctcggct 900
gcacccccca ctgtgggccc gcccccacatcg gcggtgctg gggcatctgg agcctctgcc 960
ctctgtgcct tccccctgga tgagggtggac cggcttgcta atcgcacgcg agatgcctgc 1020
tacacccggg agggtcgtgc tgaggatggg accgaggtgg cctacatcga gtatgatgtc 1080
aattctgact gtgcacagct gccagtgga accctggatg cttatccctg tggctcagac 1140
cacacgccc gccccatggc cagccgggtc ccgctggaag ccacaccaat tctggagtgg 1200
ccagggattc agctaacagc tgtggcagtc accatggaag atggacacac catcgctttc 1260
ctgggtgata gtcaagggca gotgcacagg gtctacttgg gccagggag cgatggccac 1320
ccatactcca cacagagcat ccagcagggg tctgcagtga gcagagacct cacctttgat 1380
gggaaccttg agcacctgta tgtcatgacc cagagcacac ttctgaaggt tcctgtgget 1440
tcctgtgctc agcacctgga ctgtgcacatc tgccttgcctc acagggacct atactgtggg 1500
tggtgctgctc tccttggcag gtgcagtcgc cgttctgagt gctcgagggg ccagggccca 1560
gagcagtggc tatggagctt ccagcctgag ctgggctgtc tgcaagtggc agccatgagt 1620
cctgccaaaca tcagccgaga ggagaccagg gaggttttcc tatcagtgcc agacctgcca 1680
ccctgtggc caggggagtc atattcctgc cactttgggg aacatcagag tcctgcccctg 1740
ctgactggtt ctgggtgtgat gtgcccctcc ccagacccta gtgaggcccc agtgctgccg 1800
agaggagccg actacgtatc cgtgagcgtg gagctcagat ttggcgtgt tgtgategcc 1860
aaaacttccc tctctttcta tgactgtgtg gcggtcactg aactccgcc atctgcgcag 1920
tgccaggcct gtgtgagcag ccgctggggg tgtaactggt gtgtctggca gcacctgtgc 1980
accacaagg cctcgtgtga tgctgggccc atggttgcaa gccatcagag cccgcttgtc 2040
tccccagacc ctctcgaag aggtggaccc agcccctccc caccacagc ccccaaagcc 2100
ctggccaccc ctgctcctga cacccttccc gtggagcctg gggctccctc cacagccaca 2160
gcttcggaca tctcacctgg ggctagtcct tcctgctca gccctgggg gccatgggca 2220
ggttctggct ccatacttc ccctggctcc acagggctgc ctctccatga ggagccctcc 2280
cctcccagcc cccaaaatgg acctggaacc gctgtccctg ccccaactga cttcagacct 2340

ES 2 640 567 T3

tcagccacac ctgaggacct cttggcctcc ccgctgtcac cgtcagaggt agcagcagtg 2400
 ccccctgcag accctggccc cgaggetctt catcccacag tggccctgga cctgccccct 2460
 gccactgttc ctgccaccac tttcccaggg gccatgggct ccgtgaagcc cgccctggac 2520
 tggctcacga gagaaggcgg cgagctgccc gaggcggacg agtggacggg gggtgacgca 2580
 cccgccttct ccaettecac cctcctctca ggtgatggag actcagcaga gcttgagggc 2640
 cctcccggcc cctcctcct cccgtccagc ctgcactacc agtatgacac ccccgggctc 2700
 tgggagctgg aagaggcgac cttgggggca agctcctgcc cctgtgtgga gacggttcag 2760
 ggctccacgt tgatgccggg ccatgtggag cgggaaatcc ggctgctagg caggaacctg 2820
 caccttttcc aggatggccc aggagacaat gagtgtgtga tggagctgga gggcctcgag 2880
 gtggtggttg agggccgggt cgagtgtgag ccacctccag ataccagtg ccatgtcacc 2940
 tgccagcagc accagctcag ctatgaggct ctgcagccgg agctccgtgt ggggctgttt 3000
 ctgcgtcggg cgggccgtct gcgtgtggac agtgcctgagg ggctgcatgt ggtactgtat 3060
 gactgttccg tgggacatgg agactgcagc cgctgcaaaa ctgccatgcc ccagtatggc 3120
 tgtgtgtggt gtgaggggga gcgtccacgt tgtgtgaccc gggaggcctg tggtgaggct 3180
 gaggctgtgg ccaccagtg cccagcggcc ctcatccact cgggtggagcc actgactggg 3240
 cctgtagacg gaggcacccg tgtcaccatc aggggctcca acctgggcca gcatgtgcag 3300
 gatgtgctgg gcatggtcac ggtggctgga gtgccctgtg ctgtggatgc ccaggagtac 3360
 gaggtctcca gcagcctcgt gtgcatcacc ggggccagtg gggaggaggt ggccggcgcc 3420
 acagcgggtg aggtgccggg aagaggacgt ggtgtctcag aacacgactt tgcctaccag 3480
 gatccgaagg tccattccat ctcccggcc cgcggcccca gagctggggg caccctctc 3540
 accctgaatg gctccaagct cctgactggg cggtggagg acatccaggt ggtggttggg 3600
 gaccagcctt gtcacttgct gccggagcag cagtcagaac aactgcggtg tgagaccagc 3660
 ccacgcccc aegctgccac gctccctgtg gctgtgtggt ttggggccac ggagcggagg 3720
 cttcaacgag gacagttcaa gtataccttg gacccaaca tcacctctgc tggccccacc 3780
 aagagcttcc tcagtggagg acgtgagata tgcgtccgtg gccagaatct ggacgtggtg 3840
 cagacgcaa gaatccgggt gaccgtggtc tcgagaatgc tgcagcccag ccaggggctt 3900
 ggacggaggc gtgcgtggt cccggagacg gcatgttccc ttggaccctc ctgcagtagc 3960
 cagcaatttg aggagccgtg ccatgtcaac tcctcccagc tcatcacgtg ccgcacacct 4020
 gccctcccag gectgcctga ggaccctgg gtccgggtgg aatttatcct tgacaacctg 4080
 gtctttgact ttgcaacct gaacccccaca cctttctcct atgaggccga cccaccctg 4140
 cagccactca acctgagga ccccaccatg ccattccggc acaagcctgg gagtgtgttc 4200
 tccgtggagg gggagaacct ggacctgca atgtccaagg aggaggtggt ggctatgata 4260

ES 2 640 567 T3

ggggatggcc cctgtgtggt gaagacgctg acgcggcacc acctgtactg cgagccccc 4320
 gtggagcagc ccctgccacg gcaccatgcc ctccgagagg cacctgactc tttgcctgag 4380
 ttcacgggtgc agatggggaa cttgcgcttc tccttgggtc acgtgcagta tgacggcgag 4440
 agccctgggg cttttcctgt ggcagcccag gtgggcttgg gggtgggcac ctctcttctg 4500
 gctctgggtg tcatcatcat tgtcctcatg tacaggagga agagcaagca ggccctgagg 4560
 gactataaga aggttcagat ccagctggag aatctggaga gcagtgtgcg ggaccgctgc 4620
 aagaaggaat tcacagacct catgactgag atgaccgatc tcaccagtga cctcctgggc 4680
 agcggcatcc ccttcctcga ctacaaggty tatgcggaga ggatcttctt ccctgggcac 4740
 cgcgagtgc ccttgaccg ggacctgggt gtgcctgaga gcagacggcc cactgtggag 4800
 caagggctgg ggcagctctc taacctgctc aacagcaagc tcttcctcac caagttcatc 4860
 cacacgctgg agagccagcg caccttttca gctcgggacc gtgcctacgt ggcatctctg 4920
 ctaccgctgg cactgcatgg gaagcttgag tatttctactg acatcctccg cactctgctc 4980
 agtgacctgg ttgcccagta tgtggccaag aacccaagc tgatgctgcg caggacagag 5040
 actgtggtgg agaagctgct caccaactgg atgtccatct gtctgtatac cttcgtgagg 5100
 gactccgtag gggagcctct gtacatgctc tttcgaggga ttaagcacca agtggataag 5160
 gggccagtgg acagtgtgac aggcaaggcc aaatacacct tgaacgaaa ccgcctgctc 5220
 agagaggatg tggagtaccg tcccctgacc ttgaatgcac tattggetgt ggggcctggg 5280
 gcaggagagg cccagggcgt gcccgtgaag gtccctagact gtgacacat ctcccaggca 5340
 aaggagaaga tgctggacca gctttataaa ggagtgcctc tcaccagcg gccagacct 5400
 cgcacccttg atgttgagtg gcggtctggg gtggccgggc acctcattct ttctgacgag 5460
 gatgtcactt ctgagggtcca gggctctgtg aggcgcctga acacactgca gcattacaag 5520
 gtcccagatg gagcaactgt ggcctcgtc ccctgcctca ccaagcatgt gctccgggaa 5580
 aaccaggatt atgtccctgg agagcggacc ccaatgctgg aggatgtaga tgaggggggc 5640
 atccggccct ggcacctgt gaagccaagt gatgagccg agccgccag gcctcggagg 5700
 ggcagccttc ggggcgggga gcgtgagcgc gccaaaggca tccttgagat ctacctgacc 5760
 cgcctgctgt ccatgaaggg caccctgcag aagttcgtgg atgacctgt ccaggtgatt 5820
 ctcagcacca gccgccccgt gccgctcgt gtgaagtact tctttgacct gctggatgag 5880
 caggcccagc agcatggcat ctccgaccag gacaccatcc acatctggaa gaccaacagc 5940
 ttgcctctga ggttctggat caatataata aaaaaccgca agtttgtgtt cgacgtgcaa 6000
 acatctgata acatggatgc ggtgctcctt gtcattgcac agacctcat ggacgcctgc 6060
 acctggccg accacaagct gggccgggac tccccgatca acaaacttct gtatgcacgg 6120

ES 2 640 567 T3

gacattcccc ggtacaagcg gatggtggaa aggtactatg cagacatcag acagactgtc 6180
 ccagccagcg accaagagat gaactctgtc ctggctgaac tgtcctggaa ctactccgga 6240
 gacctcgggg cgcgagtggc cctgcatgaa ctctacaagt acatcaacaa gtactatgac 6300
 cagatcatca ctgccctgga ggaggatggc acggcccaga agatgcagct gggctatcgg 6360
 ctccagcaga ttgcagctgc tgtggaaaac aaggtcacag atctatag 6408

<210> 4
 <211> 2135
 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*

5

<400> 4

Met Pro Ala Leu Gly Pro Ala Leu Leu Gln Ala Leu Trp Ala Gly Trp
 1 5 10 15
 Val Leu Thr Leu Gln Pro Leu Pro Pro Thr Ala Phe Thr Pro Asn Gly
 20 25 30
 Thr Tyr Leu Gln His Leu Ala Arg Asp Pro Thr Ser Gly Thr Leu Tyr
 35 40 45
 Leu Gly Ala Thr Asn Phe Leu Phe Gln Leu Ser Pro Gly Leu Gln Leu
 50 55 60
 Glu Ala Thr Val Ser Thr Gly Pro Val Leu Asp Ser Arg Asp Cys Leu
 65 70 75 80
 Pro Pro Val Met Pro Asp Glu Cys Pro Gln Ala Gln Pro Thr Asn Asn
 85 90 95
 Pro Asn Gln Leu Leu Leu Val Ser Pro Gly Ala Leu Val Val Cys Gly
 100 105 110
 Ser Val His Gln Gly Val Cys Glu Gln Arg Arg Leu Gly Gln Leu Glu
 115 120 125
 Gln Leu Leu Leu Arg Pro Glu Arg Pro Gly Asp Thr Gln Tyr Val Ala
 130 135 140
 Ala Asn Asp Pro Ala Val Ser Thr Val Gly Leu Val Ala Gln Gly Leu
 145 150 155 160
 Ala Gly Glu Pro Leu Leu Phe Val Gly Arg Gly Tyr Thr Ser Arg Gly
 165 170 175
 Val Gly Gly Gly Ile Pro Pro Ile Thr Thr Arg Ala Leu Trp Pro Pro

10

ES 2 640 567 T3

			180					185				190			
Asp	Pro	Gln	Ala	Ala	Phe	Ser	Tyr	Glu	Glu	Thr	Ala	Lys	Leu	Ala	Val
		195					200					205			
Gly	Arg	Leu	Ser	Glu	Tyr	Ser	His	His	Phe	Val	Ser	Ala	Phe	Ala	Arg
	210					215					220				
Gly	Ala	Ser	Ala	Tyr	Phe	Leu	Phe	Leu	Arg	Arg	Asp	Leu	Gln	Ala	Gln
225				230						235					240
Ser	Arg	Ala	Phe	Arg	Ala	Tyr	Val	Ser	Arg	Val	Cys	Leu	Arg	Asp	Gln
			245						250					255	
His	Tyr	Tyr	Ser	Tyr	Val	Glu	Leu	Pro	Leu	Ala	Cys	Glu	Gly	Gly	Arg
			260					265					270		
Tyr	Gly	Leu	Ile	Gln	Ala	Ala	Ala	Val	Ala	Thr	Ser	Arg	Glu	Val	Ala
		275					280						285		
His	Gly	Glu	Val	Leu	Phe	Ala	Ala	Phe	Ser	Ser	Ala	Ala	Pro	Pro	Thr
	290					295					300				
Val	Gly	Arg	Pro	Pro	Ser	Ala	Ala	Ala	Gly	Ala	Ser	Gly	Ala	Ser	Ala
305					310					315					320
Leu	Cys	Ala	Phe	Pro	Leu	Asp	Glu	Val	Asp	Arg	Leu	Ala	Asn	Arg	Thr
				325					330					335	
Arg	Asp	Ala	Cys	Tyr	Thr	Arg	Glu	Gly	Arg	Ala	Glu	Asp	Gly	Thr	Glu
			340					345					350		
Val	Ala	Tyr	Ile	Glu	Tyr	Asp	Val	Asn	Ser	Asp	Cys	Ala	Gln	Leu	Pro
		355					360					365			
Val	Asp	Thr	Leu	Asp	Ala	Tyr	Pro	Cys	Gly	Ser	Asp	His	Thr	Pro	Ser
	370					375					380				
Pro	Met	Ala	Ser	Arg	Val	Pro	Leu	Glu	Ala	Thr	Pro	Ile	Leu	Glu	Trp
385					390					395					400
Pro	Gly	Ile	Gln	Leu	Thr	Ala	Val	Ala	Val	Thr	Met	Glu	Asp	Gly	His
				405					410					415	
Thr	Ile	Ala	Phe	Leu	Gly	Asp	Ser	Gln	Gly	Gln	Leu	His	Arg	Val	Tyr
			420				425						430		

ES 2 640 567 T3

Leu Gly Pro Gly Ser Asp Gly His Pro Tyr Ser Thr Gln Ser Ile Gln
 435 440 445

Gln Gly Ser Ala Val Ser Arg Asp Leu Thr Phe Asp Gly Thr Phe Glu
 450 455 460

His Leu Tyr Val Met Thr Gln Ser Thr Leu Leu Lys Val Pro Val Ala
 465 470 475 480

Ser Cys Ala Gln His Leu Asp Cys Ala Ser Cys Leu Ala His Arg Asp
 485 490 495

Pro Tyr Cys Gly Trp Cys Val Leu Leu Gly Arg Cys Ser Arg Arg Ser
 500 505 510

Glu Cys Ser Arg Gly Gln Gly Pro Glu Gln Trp Leu Trp Ser Phe Gln
 515 520 525

Pro Glu Leu Gly Cys Leu Gln Val Ala Ala Met Ser Pro Ala Asn Ile
 530 535 540

Ser Arg Glu Glu Thr Arg Glu Val Phe Leu Ser Val Pro Asp Leu Pro
 545 550 555 560

Pro Leu Trp Pro Gly Glu Ser Tyr Ser Cys His Phe Gly Glu His Gln
 565 570 575

Ser Pro Ala Leu Leu Thr Gly Ser Gly Val Met Cys Pro Ser Pro Asp
 580 585 590

Pro Ser Glu Ala Pro Val Leu Pro Arg Gly Ala Asp Tyr Val Ser Val
 595 600 605

Ser Val Glu Leu Arg Phe Gly Ala Val Val Ile Ala Lys Thr Ser Leu
 610 615 620

Ser Phe Tyr Asp Cys Val Ala Val Thr Glu Leu Arg Pro Ser Ala Gln
 625 630 635 640

Cys Gln Ala Cys Val Ser Ser Arg Trp Gly Cys Asn Trp Cys Val Trp
 645 650 655

Gln His Leu Cys Thr His Lys Ala Ser Cys Asp Ala Gly Pro Met Val
 660 665 670

Ala Ser His Gln Ser Pro Leu Val Ser Pro Asp Pro Pro Ala Arg Gly
 675 680 685

ES 2 640 567 T3

Gly Pro Ser Pro Ser Pro Pro Thr Ala Pro Lys Ala Leu Ala Thr Pro
690 695 700

Ala Pro Asp Thr Leu Pro Val Glu Pro Gly Ala Pro Ser Thr Ala Thr
705 710 715 720

Ala Ser Asp Ile Ser Pro Gly Ala Ser Pro Ser Leu Leu Ser Pro Trp
725 730 735

Gly Pro Trp Ala Gly Ser Gly Ser Ile Ser Ser Pro Gly Ser Thr Gly
740 745 750

Ser Pro Leu His Glu Glu Pro Ser Pro Pro Ser Pro Gln Asn Gly Pro
755 760 765

Gly Thr Ala Val Pro Ala Pro Thr Asp Phe Arg Pro Ser Ala Thr Pro
770 775 780

Glu Asp Leu Leu Ala Ser Pro Leu Ser Pro Ser Glu Val Ala Ala Val
785 790 795 800

Pro Pro Ala Asp Pro Gly Pro Glu Ala Leu His Pro Thr Val Pro Leu
805 810 815

Asp Leu Pro Pro Ala Thr Val Pro Ala Thr Thr Phe Pro Gly Ala Met
820 825 830

Gly Ser Val Lys Pro Ala Leu Asp Trp Leu Thr Arg Glu Gly Gly Glu
835 840 845

Leu Pro Glu Ala Asp Glu Trp Thr Gly Gly Asp Ala Pro Ala Phe Ser
850 855 860

Thr Ser Thr Leu Leu Ser Gly Asp Gly Asp Ser Ala Glu Leu Glu Gly
865 870 875 880

Pro Pro Ala Pro Leu Ile Leu Pro Ser Ser Leu Asp Tyr Gln Tyr Asp
885 890 895

Thr Pro Gly Leu Trp Glu Leu Glu Glu Ala Thr Leu Gly Ala Ser Ser
900 905 910

Cys Pro Cys Val Glu Ser Val Gln Gly Ser Thr Leu Met Pro Val His
915 920 925

Val Glu Arg Glu Ile Arg Leu Leu Gly Arg Asn Leu His Leu Phe Gln
930 935 940

ES 2 640 567 T3

Asp Gly Pro Gly Asp Asn Glu Cys Val Met Glu Leu Glu Gly Leu Glu
 945 950 955 960

Val Val Val Glu Ala Arg Val Glu Cys Glu Pro Pro Pro Asp Thr Gln
 965 970 975

Cys His Val Thr Cys Gln Gln His Gln Leu Ser Tyr Glu Ala Leu Gln
 980 985 990

Pro Glu Leu Arg Val Gly Leu Phe Leu Arg Arg Ala Gly Arg Leu A
 995 1000 1005

Val Asp Ser Ala Glu Gly Leu His Val Val Leu Tyr Asp Cys Ser
 1010 1015 1020

Val Gly His Gly Asp Cys Ser Arg Cys Gln Thr Ala Met Pro Gln
 1025 1030 1035

Tyr Gly Cys Val Trp Cys Glu Gly Glu Arg Pro Arg Cys Val Thr
 1040 1045 1050

Arg Glu Ala Cys Gly Glu Ala Glu Ala Val Ala Thr Gln Cys Pro
 1055 1060 1065

Ala Pro Leu Ile His Ser Val Glu Pro Leu Thr Gly Pro Val Asp
 1070 1075 1080

Gly Gly Thr Arg Val Thr Ile Arg Gly Ser Asn Leu Gly Gln His
 1085 1090 1095

Val Gln Asp Val Leu Gly Met Val Thr Val Ala Gly Val Pro Cys
 1100 1105 1110

Ala Val Asp Ala Gln Glu Tyr Glu Val Ser Ser Ser Leu Val Cys
 1115 1120 1125

Ile Thr Gly Ala Ser Gly Glu Glu Val Ala Gly Ala Thr Ala Val
 1130 1135 1140

Glu Val Pro Gly Arg Gly Arg Gly Val Ser Glu His Asp Phe Ala
 1145 1150 1155

Tyr Gln Asp Pro Lys Val His Ser Ile Phe Pro Ala Arg Gly Pro
 1160 1165 1170

Arg Ala Gly Gly Thr Arg Leu Thr Leu Asn Gly Ser Lys Leu Leu

ES 2 640 567 T3

1175						1180						1185			
Thr	Gly	Arg	Leu	Glu	Asp	Ile	Arg	Val	Val	Val	Gly	Asp	Gln	Pro	
1190						1195					1200				
Cys	His	Leu	Leu	Pro	Glu	Gln	Gln	Ser	Glu	Gln	Leu	Arg	Cys	Glu	
1205						1210					1215				
Thr	Ser	Pro	Arg	Pro	Thr	Pro	Ala	Thr	Leu	Pro	Val	Ala	Val	Trp	
1220						1225					1230				
Phe	Gly	Ala	Thr	Glu	Arg	Arg	Leu	Gln	Arg	Gly	Gln	Phe	Lys	Tyr	
1235						1240					1245				
Thr	Leu	Asp	Pro	Asn	Ile	Thr	Ser	Ala	Gly	Pro	Thr	Lys	Ser	Phe	
1250						1255					1260				
Leu	Ser	Gly	Gly	Arg	Glu	Ile	Cys	Val	Arg	Gly	Gln	Asn	Leu	Asp	
1265						1270					1275				
Val	Val	Gln	Thr	Pro	Arg	Ile	Arg	Val	Thr	Val	Val	Ser	Arg	Met	
1280						1285					1290				
Leu	Gln	Pro	Ser	Gln	Gly	Leu	Gly	Arg	Arg	Arg	Arg	Val	Val	Pro	
1295						1300					1305				
Glu	Thr	Ala	Cys	Ser	Leu	Gly	Pro	Ser	Cys	Ser	Ser	Gln	Gln	Phe	
1310						1315					1320				
Glu	Glu	Pro	Cys	His	Val	Asn	Ser	Ser	Gln	Leu	Ile	Thr	Cys	Arg	
1325						1330					1335				
Thr	Pro	Ala	Leu	Pro	Gly	Leu	Pro	Glu	Asp	Pro	Trp	Val	Arg	Val	
1340						1345					1350				
Glu	Phe	Ile	Leu	Asp	Asn	Leu	Val	Phe	Asp	Phe	Ala	Thr	Leu	Asn	
1355						1360					1365				
Pro	Thr	Pro	Phe	Ser	Tyr	Glu	Ala	Asp	Pro	Thr	Leu	Gln	Pro	Leu	
1370						1375					1380				
Asn	Pro	Glu	Asp	Pro	Thr	Met	Pro	Phe	Arg	His	Lys	Pro	Gly	Ser	
1385						1390					1395				
Val	Phe	Ser	Val	Glu	Gly	Glu	Asn	Leu	Asp	Leu	Ala	Met	Ser	Lys	
1400						1405					1410				

ES 2 640 567 T3

Glu Glu Val Val Ala Met Ile Gly Asp Gly Pro Cys Val Val Lys
 1415 1420 1425
 Thr Leu Thr Arg His His Leu Tyr Cys Glu Pro Pro Val Glu Gln
 1430 1435 1440
 Pro Leu Pro Arg His His Ala Leu Arg Glu Ala Pro Asp Ser Leu
 1445 1450 1455
 Pro Glu Phe Thr Val Gln Met Gly Asn Leu Arg Phe Ser Leu Gly
 1460 1465 1470
 His Val Gln Tyr Asp Gly Glu Ser Pro Gly Ala Phe Pro Val Ala
 1475 1480 1485
 Ala Gln Val Gly Leu Gly Val Gly Thr Ser Leu Leu Ala Leu Gly
 1490 1495 1500
 Val Ile Ile Ile Val Leu Met Tyr Arg Arg Lys Ser Lys Gln Ala
 1505 1510 1515
 Leu Arg Asp Tyr Lys Lys Val Gln Ile Gln Leu Glu Asn Leu Glu
 1520 1525 1530
 Ser Ser Val Arg Asp Arg Cys Lys Lys Glu Phe Thr Asp Leu Met
 1535 1540 1545
 Thr Glu Met Thr Asp Leu Thr Ser Asp Leu Leu Gly Ser Gly Ile
 1550 1555 1560
 Pro Phe Leu Asp Tyr Lys Val Tyr Ala Glu Arg Ile Phe Phe Pro
 1565 1570 1575
 Gly His Arg Glu Ser Pro Leu His Arg Asp Leu Gly Val Pro Glu
 1580 1585 1590
 Ser Arg Arg Pro Thr Val Glu Gln Gly Leu Gly Gln Leu Ser Asn
 1595 1600 1605
 Leu Leu Asn Ser Lys Leu Phe Leu Thr Lys Phe Ile His Thr Leu
 1610 1615 1620
 Glu Ser Gln Arg Thr Phe Ser Ala Arg Asp Arg Ala Tyr Val Ala
 1625 1630 1635
 Ser Leu Leu Thr Val Ala Leu His Gly Lys Leu Glu Tyr Phe Thr
 1640 1645 1650

ES 2 640 567 T3

Asp Ile Leu Arg Thr Leu Leu Ser Asp Leu Val Ala Gln Tyr Val
 1655 1660 1665

 Ala Lys Asn Pro Lys Leu Met Leu Arg Arg Thr Glu Thr Val Val
 1670 1675 1680

 Glu Lys Leu Leu Thr Asn Trp Met Ser Ile Cys Leu Tyr Thr Phe
 1685 1690 1695

 Val Arg Asp Ser Val Gly Glu Pro Leu Tyr Met Leu Phe Arg Gly
 1700 1705 1710

 Ile Lys His Gln Val Asp Lys Gly Pro Val Asp Ser Val Thr Gly
 1715 1720 1725

 Lys Ala Lys Tyr Thr Leu Asn Asp Asn Arg Leu Leu Arg Glu Asp
 1730 1735 1740

 Val Glu Tyr Arg Pro Leu Thr Leu Asn Ala Leu Leu Ala Val Gly
 1745 1750 1755

 Pro Gly Ala Gly Glu Ala Gln Gly Val Pro Val Lys Val Leu Asp
 1760 1765 1770

 Cys Asp Thr Ile Ser Gln Ala Lys Glu Lys Met Leu Asp Gln Leu
 1775 1780 1785

 Tyr Lys Gly Val Pro Leu Thr Gln Arg Pro Asp Pro Arg Thr Leu
 1790 1795 1800

 Asp Val Glu Trp Arg Ser Gly Val Ala Gly His Leu Ile Leu Ser
 1805 1810 1815

 Asp Glu Asp Val Thr Ser Glu Val Gln Gly Leu Trp Arg Arg Leu
 1820 1825 1830

 Asn Thr Leu Gln His Tyr Lys Val Pro Asp Gly Ala Thr Val Ala
 1835 1840 1845

 Leu Val Pro Cys Leu Thr Lys His Val Leu Arg Glu Asn Gln Asp
 1850 1855 1860

 Tyr Val Pro Gly Glu Arg Thr Pro Met Leu Glu Asp Val Asp Glu
 1865 1870 1875

 Gly Gly Ile Arg Pro Trp His Leu Val Lys Pro Ser Asp Glu Pro
 1880 1885 1890

ES 2 640 567 T3

Glu Pro Pro Arg Pro Arg Arg Gly Ser Leu Arg Gly Gly Glu Arg
 1895 1900 1905

 Glu Arg Ala Lys Ala Ile Pro Glu Ile Tyr Leu Thr Arg Leu Leu
 1910 1915 1920

 Ser Met Lys Gly Thr Leu Gln Lys Phe Val Asp Asp Leu Phe Gln
 1925 1930 1935

 Val Ile Leu Ser Thr Ser Arg Pro Val Pro Leu Ala Val Lys Tyr
 1940 1945 1950

 Phe Phe Asp Leu Leu Asp Glu Gln Ala Gln Gln His Gly Ile Ser
 1955 1960 1965

 Asp Gln Asp Thr Ile His Ile Trp Lys Thr Asn Ser Leu Pro Leu
 1970 1975 1980

 Arg Phe Trp Ile Asn Ile Ile Lys Asn Pro Gln Phe Val Phe Asp
 1985 1990 1995

 Val Gln Thr Ser Asp Asn Met Asp Ala Val Leu Leu Val Ile Ala
 2000 2005 2010

 Gln Thr Phe Met Asp Ala Cys Thr Leu Ala Asp His Lys Leu Gly
 2015 2020 2025

 Arg Asp Ser Pro Ile Asn Lys Leu Leu Tyr Ala Arg Asp Ile Pro
 2030 2035 2040

 Arg Tyr Lys Arg Met Val Glu Arg Tyr Tyr Ala Asp Ile Arg Gln
 2045 2050 2055

 Thr Val Pro Ala Ser Asp Gln Glu Met Asn Ser Val Leu Ala Glu
 2060 2065 2070

 Leu Ser Trp Asn Tyr Ser Gly Asp Leu Gly Ala Arg Val Ala Leu
 2075 2080 2085

 His Glu Leu Tyr Lys Tyr Ile Asn Lys Tyr Tyr Asp Gln Ile Ile
 2090 2095 2100

 Thr Ala Leu Glu Glu Asp Gly Thr Ala Gln Lys Met Gln Leu Gly
 2105 2110 2115

 Tyr Arg Leu Gln Gln Ile Ala Ala Ala Val Glu Asn Lys Val Thr

	2120	2125	2130
	Asp Leu		
	2135		
5	<210> 5 <211> 20 <212> ADN <213> Artificial		
10	<220> <223> Plxnb1 sentido		
	<400> 5 tgggtcatgt gcagtacgat	20	
15	<210> 6 <211> 20 <212> ADN <213> Artificial		
20	<220> <223> Plxnb1 antisentido		
25	<400> 6 cactgctctc caggtctcc	20	
30	<210> 7 <211> 20 <212> ADN <213> Artificial		
	<220> <223> Plxnb2 sentido		
35	<400> 7 aggggagcct ctctacaagc	20	
40	<210> 8 <211> 20 <212> ADN <213> Artificial		
45	<220> <223> Plxnb2 antisentido		
	<400> 8 tcgatccctt catcctgaac	20	
50	<210> 9 <211> 20 <212> ADN <213> Artificial		
55	<220> <223> Plxnb3 sentido		
60	<400> 9 atatgctgag cgtgccttct	20	
	<210> 10		

ES 2 640 567 T3

<211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

5 <220>
 <223> Plxnb3 antisentido

<400> 10

10 tgctgtgag caaattggag 20

<210> 11
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

15 <220>
 <223> CD72 sentido

20 <400> 11

gccttctct gtcctgtctg 20

<210> 12
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

25 <220>
 <223> CD72 antisentido

30 <400> 12

cctcctggaa ctgctgagac 20

<210> 13
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

40 <220>
 <223> Alpl sentido

<400> 13

45 aaccagaca caagcattcc 20

<210> 14
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

50 <220>
 <223> Alpl antisentido

55 <400> 14

gccttgagg ttttggta 20

60 <210> 15
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Artificial

65 <220>
 <223> Bglap sentido

ES 2 640 567 T3

	<400> 15	
5	gcgctctgtc tctctgacct	20
	<210> 16	
	<211> 20	
	<212> ADN	
10	<213> Artificial	
	<220>	
	<223> Bglap antisentido	
	<400> 16	
15	accttattgc cctcctgctt	20
	<210> 17	
	<211> 20	
20	<212> ADN	
	<213> Artificial	
	<220>	
	<223> Col1a1 sentido	
25	<400> 17	
	gagcggagag tactggatcg	20
30	<210> 18	
	<211> 20	
	<212> ADN	
	<213> Artificial	
35	<220>	
	<223> Col1a1 antisentido	
	<400> 18	
40	gttcgggctg atgtaccagt	20
	<210> 19	
	<211> 20	
	<212> ADN	
45	<213> Artificial	
	<220>	
	<223> Gapdh sentido	
50	<400> 19	
	accagaaga ctgtggatgg	20
	<210> 20	
55	<211> 20	
	<212> ADN	
	<213> Artificial	
	<220>	
60	<223> Gapdh antisentido	
	<400> 20	
65	cacattgggg gtaggaacac	20

REIVINDICACIONES

- 5 1. Un anticuerpo anti-semaforina 4D o un fragmento funcional del mismo, o un anticuerpo anti-plexina B1 o un fragmento funcional del mismo, para su uso en la prevención y el tratamiento de enfermedades óseas en un sujeto.
2. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según la reivindicación 1, en el que la enfermedad ósea es una fractura ósea, una insuficiencia ósea, osteoporosis, osteomalacia, osteopenia, dolor lumbar, enfermedad ósea de Paget, mielitis tónica, reumatismo articular o artrosis deformante.
- 10 3. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el anticuerpo o el fragmento del mismo puede acelerar la osteogénesis y promover la diferenciación de los osteoblastos.
- 15 4. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el sujeto es un mamífero.
5. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según la reivindicación 4, en el que el sujeto es un ser humano.
- 20 6. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el anticuerpo o el fragmento del mismo es monoclonal.
- 25 7. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el fragmento funcional del anticuerpo es un fragmento F(ab')₂, un fragmento Fab', un fragmento Fab, un fragmento Fv, un fragmento FV unido por disulfuro, un fragmento FV de cadena única (scFV) o un polímero de uno o más de dichos fragmentos.
- 30 8. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el anticuerpo es un anticuerpo humano o un fragmento funcional del mismo.
- 35 9. El anticuerpo o el fragmento funcional del mismo para su uso según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el anticuerpo o el fragmento del mismo puede ser administrado por vía oral, mediante una administración vascular, mediante una administración intravenosa, mediante una administración muscular, mediante una administración hipodérmica, mediante una administración transdérmica, mediante una administración nasal o mediante una administración transpulmonar.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15

FIG. 16

FIG. 17

FIG. 18

FIG. 19

FIG. 20

FIG. 21

FIG. 22

FIG. 23

FIG. 24

FIG. 25

FIG. 26

FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29