19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 650 799**

51 Int. Cl.:

C12N 9/10 (2006.01)

C12N 9/90 (2006.01)

C12P 19/04 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **24.04.2008 PCT/JP2008/058323**

87 Fecha y número de publicación internacional: **06.11.2008 WO08133350**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **24.04.2008 E 08740988 (4)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **01.11.2017 EP 2142643**

54 Título: **Bacteria que produce condroitina y procedimiento de producción de condroitina**

30 Prioridad:

24.04.2007 US 913713 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

22.01.2018

73 Titular/es:

**SEIKAGAKU CORPORATION (100.0%)
6-1, MARUNOUCHI 1-CHOME
CHIYODA-KU TOKYO 100-0005, JP**

72 Inventor/es:

**SUZUKI, KIYOSHI;
MIYAMOTO, KENTARO y
KASEYAMA, HIROMI**

74 Agente/Representante:

DURAN-CORRETJER, S.L.P

Observaciones:

Véase nota informativa (Remarks, Remarques o Bemerkungen) en el folleto original publicado por la Oficina Europea de Patentes

ES 2 650 799 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Bacteria que produce condroitina y procedimiento de producción de condroitina

5 Sector técnico

La presente invención se refiere a una bacteria que produce condroitina y a un procedimiento de producción de condroitina.

10 Antecedentes técnicos

La condroitina es un polisacárido que comprende una estructura repetida de disacáridos de un resto de ácido glucurónico (GlcUA) y un resto de N-acetil-D-galactosamina (GalNAc) (-GlcUA β (1-3)-GalNAc β (1-4)-; en la presente memoria también se denomina un esqueleto de hidratos de carbono con condroitina). El sulfato de condroitina es un polisacárido que consiste en la sulfatación de la condroitina.

De manera convencional, la condroitina y el sulfato de condroitina se extraen y se purifican a partir de cartílagos, órganos y similares de animales. Sin embargo, en los últimos años, se ha estudiado una técnica para sintetizar artificialmente un esqueleto de hidratos de carbono común a la condroitina y al sulfato de condroitina, debido a la escasez de materiales, tales como cartílagos y órganos.

Se han descrito condroitina sintasas, que producen condroitina mediante la transferencia alternativa de GlcUA y GalNAc desde sus sustratos donantes a oligosacáridos aceptores y se ha propuesto un procedimiento de producción de condroitina utilizando la enzima.

25 El documento J. Biol. Chem. 275(31), 24124-24129 (2000) da a conocer una condroitina sintasa derivada de *Pasteurella multocida*.

Además, los documentos WO 2003/102193 y WO 2003/102194 dan a conocer condroitina sintasas derivadas de ser humano.

Además, el documento US 2003-0109693 (JP 2003-199583 A) da a conocer una condroitina sintasa novedosa (KfoC) producida por la cepa K4 de *Escherichia coli*.

35 Sin embargo, en el caso de producir condroitina mediante los procedimientos enzimáticos, es necesario preparar materiales costosos, tales como oligosacáridos como aceptores y nucleótidos de azúcar para los donantes de GlcUA y GalNAc, y, de este modo, se ha deseado un procedimiento de producción de condroitina que utilice materiales más económicos.

40 Es conocido que la cepa K4 de *Escherichia coli* produce un polisacárido que tiene una estructura de esqueleto de condroitina como una cápsula. Sin embargo, su estructura consiste en una unidad de repetición que comprende trisacáridos de un resto de GalNAc, un resto de GlcUA y un resto de fructosa que está unida a un grupo hidroxilo en C3 de un resto de GlcUA. Además, se han detectado más de 100 polisacáridos capsulares químicamente diferentes en *Escherichia coli*. Por ejemplo, la cepa K5 de *Escherichia coli* produce un polisacárido capsular K5 que tiene un esqueleto de hidratos de carbono con heparina/sulfato de heparán (J. Biol. Chem., 272 (5), pág. 2682-2687, 1997). Sin embargo, la existencia de *Escherichia coli* que produce condroitina en sí no es conocida. Por lo tanto, se desconoce un procedimiento de producción de condroitina utilizando una bacteria de *Escherichia*.

Aunque la solicitud de patente publicada de Estados Unidos 2007-0281342 da a conocer un procedimiento de producción de condroitina mediante la utilización de una bacteria *Bacillus* gram-positiva recombinante introducida con un gen de condroitina sintasa derivado de *Pasteurella multocida*, se ha deseado un mayor desarrollo en la producción fermentativa de condroitina. Otro documento del estado de la técnica que proporciona información de base relevante para la presente solicitud es Ninomiya y otros 2002 (J. Biol. Chem, vol. 277, No. 24, páginas 21575-21575), que da a conocer el procedimiento de clonación y caracterización de condroitina polimerasa. El documento WO0180810 da a conocer un procedimiento para aislar y producir un gen de condroitina sintasa a partir de *Pasteurella multocida* y la utilización de condroitina no sulfatada. Lidholt y otros 1997 (J. Biol. Chem, vol. 272, no. 5, páginas 2682-2687) da a conocer la síntesis del polisacárido capsular de *E. coli* K4. El documento EP1283259 da a conocer un procedimiento para producir una condroitina polimerasa, y Rodríguez y otros 1988 (Eur. J. Biochem. Vol. 177, páginas 117-124) da a conocer las características estructurales y serológicas del antígeno K4 capsular de *E. coli*.

60 Descripción de la invención

Un objetivo de la presente invención es dar a conocer un nuevo microorganismo capaz de producir condroitina y un nuevo procedimiento de producción de condroitina utilizando el microorganismo.

Los inventores de la presente invención han realizado amplios estudios y, como resultado, han descubierto que una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP, tal como la cepa K5 de *Escherichia coli*, que se introduce con genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli*, produce condroitina con alta eficiencia, realizando, de este modo, la presente invención.

5 Un objetivo de la presente invención es dar a conocer una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP, en la que se introduce un gen kfoA de la cepa K4 de *Escherichia coli* y un gen kfoC de la cepa K4 de *Escherichia coli*, en la que dicha bacteria tiene la capacidad de producir condroitina como un polisacárido capsular y en la que el gen kfoA codifica una proteína seleccionada del grupo que comprende (A) y (B): (A) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2; y (B) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, que incluye la sustitución, delección, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos; y en la que el gen kfoC codifica una proteína seleccionada del grupo que comprende (C) a (F): (C) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4; (D) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4, que incluye la sustitución, delección, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos; (E) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6; y (F) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6, que incluye la sustitución, delección, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos.

El gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser, de manera preferente, un ADN seleccionado del grupo que comprende los siguientes (a) y (b):

- (a) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1; y
- (b) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 1 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que comprende la actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa.

El gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser, de manera preferente, un ADN seleccionado del grupo que comprende los siguientes (c) y (d):

- (c) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3; y
- (d) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 3 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa.

El gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser, de manera preferente, un ADN seleccionado del grupo que comprende los siguientes (e) y (f):

- (e) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5; y
- (f) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 5 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa.

La bacteria productora de ácido glucurónico-UDP es, de manera preferente, la cepa K5 de *Escherichia coli*.

Otro objetivo de la presente invención es dar a conocer un procedimiento de producción de condroitina que comprende, como mínimo, las siguientes etapas (1) y (2):

- (1) cultivar la bacteria, tal como se ha descrito anteriormente; y
- (2) recoger la condroitina del cultivo.

Otro objetivo de la presente invención es dar a conocer un procedimiento de producción de sulfato de condroitina que comprende: producir condroitina mediante el procedimiento, tal como se ha descrito anteriormente; y a continuación, sulfatar la condroitina para producir sulfato de condroitina.

Descripción breve de los dibujos

La figura 1 es un dibujo que muestra una estructura de un vector para expresar los genes kfoA y kfoC. La figura 2 es un dibujo (fotografía) que muestra la expresión de las proteínas KfoA y kfoC. El carril 1 muestra una cepa introducida sin plásmido (control), el carril 2 muestra una cepa introducida con pTrcHis-kfoCA y M muestra un marcador de peso molecular.

La figura 3 muestra los resultados de análisis de composiciones de disacáridos utilizando un sistema de HPLC fluorescente para la fracción L tratada con condroitinasa ABC (cABC) (A), la fracción L tratada sin cABC (B) y la fracción L tratada con cABC inactivada por calor (C).

La figura 4 muestra los resultados de análisis de disacáridos por fluorescencia para la fracción E tratada con cABC (A), la fracción E tratada sin cABC (B) y la fracción E tratada con cABC inactivada por calor (C).

La figura 5 muestra los resultados de análisis de disacáridos por fluorescencia para la fracción S tratada con cABC (A), la fracción S tratada sin cABC (B) y la fracción S tratada con cABC inactivada por calor (C).

La figura 6 muestra los resultados de análisis de disacáridos por fluorescencia para el patrón de condroitina tratado con cABC (A) y una mezcla del patrón de condroitina tratado con cABC y la fracción L tratada con cABC (B).

La figura 7 es un dibujo (fotografía) que muestra la expresión de proteínas KfoA, kfoC y KfoC utilizando (A) un anticuerpo contra KfoC (EK-C) como primer anticuerpo, (B) un anticuerpo contra KfoA (EK-A) como primer anticuerpo y (C) suero de conejo normal. Los carriles 1 y 5 muestran el marcador molecular, patrón MagicMarkXP (Invitrogen), el carril 2 muestra una cepa introducida con pTrcHis-kfoCA, el carril 3 muestra una cepa introducida con

pTrcHis-kfoA y el carril 4 muestra una cepa introducida con pTrcHis-kfoA.

Descripción de las realizaciones preferentes

5 En lo sucesivo, la presente invención se describirá en detalle.

<1> Bacteria de la presente invención

10 La bacteria de la presente invención es una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP introducida con los genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* y que tiene capacidad de producir condroitina.

15 La "bacteria productora de ácido glucurónico-UDP" proporciona ácido glucurónico-UDP, que se utiliza para la producción de un polisacárido compuesto por ácido glucurónico. La "bacteria productora de ácido glucurónico-UDP" no está limitada, siempre y cuando produzca ácido glucurónico-UDP y entre los ejemplos de las mismas se incluyen una bacteria que pertenece al género *Gluconacetobacter*, tal como *Gluconacetobacter hansenii* y *Gluconacetobacter xylinus*, una bacteria que pertenece al género *Rhizobium*, tal como *Rhizobium meffloti*, una bacteria que pertenece al género *Acetobacter*, tal como *Acetobacter xylinum*, una bacteria que pertenece al género *Erwinia*, tal como *Erwinia amylovora*, una bacteria que pertenece al género *Thiobacillus*, tal como *Thiobacillus ferrooxidans*, una bacteria que pertenece al género *Xylella*, tal como *Xylella fastidiosa*, una bacteria que pertenece al género *Sinorhizobium*, tal como *Sinorhizobium melloti*, una bacteria que pertenece al género *Rhodococcus*, tal como *Rhodococcus rhodochrous*, una bacteria que pertenece al género *Klebsiella*, tal como *Klebsiella aerogenes*, una bacteria que pertenece al género *Enterobacter*, tal como *Enterobacter aerogenes* y una bacteria que pertenece al género *Escherichia*, tal como *Escherichia coli*.

25 La "bacteria productora de ácido glucurónico-UDP" es, de manera preferente, una bacteria que pertenece al género *Escherichia* y es capaz de producir ácido glucurónico-UDP y, de manera más preferente, una bacteria que pertenece a *Escherichia coli* y es capaz de producir ácido glucurónico-UDP.

30 Un ejemplo específico de la misma incluye la cepa K5 de *Escherichia coli*. La cepa K5 se ha depositado en la American Type Culture Collection (ATCC: PO Box 1549, Manassas, VA 20108, Estados Unidos de América) bajo el número de acceso ATCC23506 y está disponible en el catálogo o en la página principal de la ATCC.

35 La cepa a introducir con los genes kfoA y kfoC puede ser una cepa que es un derivado de la cepa K5 de *Escherichia coli* y dichas cepas derivadas se pueden obtener mediante la introducción de una mutación génica en la cepa K5 de *Escherichia coli* o la introducción de un gen en la cepa K5 de *Escherichia coli* mediante recombinación genética. Es decir, un aspecto de la bacteria de la presente invención incluye: una cepa obtenida mediante la introducción de los genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* en la cepa K5 de *Escherichia coli*; una cepa obtenida mediante la introducción de los genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* en la cepa K5 de *Escherichia coli* y la introducción adicional de una mutación génica; y una cepa obtenida mediante la introducción de los genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* en la cepa K5 de *Escherichia coli* y la introducción adicional de otro gen.

45 Entre los ejemplos del gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* se incluyen un ADN que codifica una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2 y un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1.

50 En general, la sustitución, delección, inserción o adición en uno o varios aminoácidos que constituyen una proteína no tiene ningún efecto sobre la actividad de la proteína, en muchos casos y, por lo tanto, el gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser un gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, incluyendo la sustitución, delección, inserción o adición de uno o varios aminoácidos y que tiene actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa.

55 La frase "uno o varios aminoácidos", tal como se utiliza en el presente documento, se refiere al número de aminoácidos que pueden provocar una sustitución, delección, inserción o adición sin afectar a la actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa. Específicamente, el número es, por ejemplo, un número entero de 1 a 20, de manera preferente, un número entero de 1 a 10, de manera más preferente, un número entero de 1 a 5.

60 Paralelamente, el gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser un gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos que es idéntica en no menos del 90%, de manera preferente, no menos del 95%, de manera más preferente, no menos del 98% a la secuencia completa de la SEQ ID NO: 2 y que tiene actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa.

65 El gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* se puede obtener mediante PCR utilizando un ADN cromosómico de la cepa K4 de *Escherichia coli* como una plantilla.

La cepa K4 de *Escherichia coli* se ha depositado en la American Type Culture Collection (ATCC) con el número de

acceso ATCC23502 y está disponible en el catálogo o en la página principal de la ATCC.

El gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, incluyendo la sustitución, deleción, inserción o adición de uno o varios aminoácidos o una secuencia de aminoácidos que es idéntica en no menos del 90% a la secuencia completa de la SEQ ID NO: 2 y que tiene actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa, se puede obtener mediante la modificación de la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1, de manera que se introduce la sustitución, deleción, inserción o adición de uno o varios aminoácidos en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2 mediante mutagénesis específica de sitio (Kramer, W. y Frits, H.J., Meth. in Enzymol., 154, 350 (1987); Kunkel, T.A. y otros, Meth. in Enzymol., 154, 367 (1987)) o similares.

El gen también se puede obtener mediante: cribado de un ADN que codifica una proteína que tiene actividad UDP-glucosa-4-epimerasa mediante hibridación con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1 o una secuencia parcial de la misma en condiciones rigurosas.

La expresión "condiciones rigurosas" se refiere a condiciones en las que se forma el denominado híbrido específico y no se forma el híbrido no específico (véase Sambrook, J. y otros, Molecular Cloning. A Laboratory Manual, segunda edición, Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989), etc.). Entre los ejemplos específicos de las "condiciones rigurosas" se incluyen las condiciones de hibridación a 42°C en una solución que contiene formamida al 50%, 4 x SSC, HEPES 50 mM (pH 7,0), 10 x solución de Denhardt, ADN de esperma de salmón a 100 µg/ml y lavado con 2 X SSC, solución de SDS al 0,1% a temperatura ambiente y, a continuación, 0,1 X SSC, solución de SDS al 0,1% a 60°C.

Si el gen obtenido, tal como se ha descrito anteriormente, codifica una proteína que tiene actividad UDP-glucosa-4-epimerasa puede evaluarse mediante la introducción del gen resultante en un huésped apropiado para expresar la proteína y la medición a continuación de la actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa, según el procedimiento descrito en el documento J. Biol. Chem., 277 (24), pág. 21567-21575, 2002.

Entre los ejemplos del gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* se incluyen un ADN que codifica una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4 y un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3. Entre los ejemplos del gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* también se incluyen un ADN que codifica una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6 y un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5.

El gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser un gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4 ó 6, que incluye la sustitución, deleción, inserción o adición de uno o varios aminoácidos y que tiene actividad de condroitina sintasa.

El gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* puede ser un gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos que es idéntica en no menos del 90%, de manera preferente, no menos del 95%, de manera más preferente, no menos del 98% a la secuencia completa de la SEQ ID NO: 4 ó 6 y que tiene actividad de condroitina sintasa.

La expresión "actividad de condroitina sintasa", tal como se utiliza en el presente documento, se refiere a una actividad para transferir alternativamente GlcUA de un donante de GlcUA o GalNAc de un donante de GalNAc al extremo no reducido de una cadena de azúcares.

El gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* se puede obtener mediante PCR utilizando un ADN cromosómico de la cepa K4 de *Escherichia coli* como plantilla. Además, el gen kfoC que codifica la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6, tal como un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5, se puede obtener según el procedimiento descrito en el documento WO2007/145197.

El gen que codifica una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4 ó 6, incluyendo la sustitución, deleción, inserción o adición de uno o varios aminoácidos o una secuencia de aminoácidos que es idéntica en no menos del 90% a la secuencia completa de la SEQ ID NO: 4 ó 6 y que tiene actividad de condroitina sintasa, se puede obtener mediante la modificación de la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3 ó 5, de manera que la sustitución, deleción, inserción o adición de uno o varios aminoácidos se introduce en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4 ó 6 mediante mutagénesis específica de sitio o similar.

El gen también se puede obtener mediante: cribado de un ADN que codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa mediante hibridación con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3 ó 5 o una secuencia parcial de la misma en condiciones rigurosas.

Las definiciones de las expresiones "uno o varios" y "condiciones rigurosas" son las mismas que se han descrito anteriormente.

Si el gen obtenido, tal como se ha descrito anteriormente, codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa puede evaluarse mediante la introducción del gen resultante en un huésped apropiado para expresar la proteína y a continuación la medición de la actividad de condroitina sintasa según el procedimiento descrito en el documento US 2003-0109693 (JP 2003-199583 A).

5 La bacteria de la presente invención se puede obtener mediante la introducción de un gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* y de un gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* en una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP, tal como se ha descrito anteriormente.

10 El término "introducción" utilizado en la presente invención incluye la introducción de ambos genes en una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP utilizando un vector, tal como un plásmido o un bacteriófago, y la introducción de ambos genes en un cromosoma de la bacteria productora de ácido glucurónico-UDP mediante recombinación homóloga o similar.

15 El vector, tal como un plásmido o un bacteriófago, a utilizar en el presente documento no está particularmente limitado, siempre y cuando pueda utilizarse para la introducción de genes en *Escherichia coli*, y entre los ejemplos de los mismos se incluyen pTrcHis (Invitrogen Corporation), el vector pET (Novagen) y el vector pGEX (Amersham Pharmacia).

20 En la introducción de un gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* y de un gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli*, se pueden utilizar promotores nativos de los genes, pero es preferente utilizar un promotor que sea potente en *Escherichia coli*, tales como el promotor lac, el promotor trp, el promotor trc, el promotor PR o el promotor lacUV.

25 El gen kfoA y el gen kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* se pueden introducir uno por uno o de manera simultánea utilizando un único vector. Es más preferente utilizar un vector, tal como un plásmido o un bacteriófago, que contiene ambos genes kfoA y kfoC, ya que la introducción y la expresión de los genes se pueden realizar fácilmente.

30 Los genes kfoA y kfoC derivados de la cepa K4 de *Escherichia coli* se pueden introducir de manera que se expresen como proteínas de fusión con otros péptidos.

Entre los ejemplos de los otros péptidos se incluyen etiqueta de polihistidina y etiqueta de GST (glutación-S-transferasa). La expresión de los productos génicos como proteínas de fusión es preferente porque la detección (confirmación de la expresión) de los productos génicos se puede realizar fácilmente.

35 La introducción de un gen se puede realizar mediante un procedimiento de transformación conocido. Entre los ejemplos del procedimiento se incluyen el procedimiento de electroporación, el procedimiento de DEAE-dextrano y el procedimiento de fosfato de calcio.

40 La introducción de un gen se puede confirmar mediante: un procedimiento de detección de un gen, tal como RT-PCR o transferencia Northern; un procedimiento de expresión de detección particular de una proteína recombinante, tal como transferencia de Western; y un procedimiento de medición de la actividad, tal como se ha descrito anteriormente.

45 Si el gen kfoA derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* y el gen kfoC derivado de la cepa K4 de *Escherichia coli* introducidos funcionan en una bacteria productora de ácido glucurónico-UDP, la bacteria adquiere la capacidad de producir condroitina como un polisacárido capsular.

50 <2> Procedimiento de producción de condroitina

El procedimiento de producción de condroitina de la presente invención comprende, como mínimo, las siguientes etapas (1) y (2).

- 55 (1) cultivar una bacteria de la presente invención.
(2) recoger la condroitina del cultivo.

El cultivo se puede realizar mediante un procedimiento general para el cultivo de bacterias que pertenecen al género *Escherichia*.

60 El medio de cultivo no está particularmente limitado, siempre y cuando se pueda utilizar para el cultivo de bacterias que pertenecen al género *Escherichia* y entre los ejemplos preferentes del mismo se incluyen medio LB (medio de Luria-Bertani) (que contiene 10,0 g de triptona Bacto, 5,0 g de extracto de levadura Bacto y 5,0 g de NaCl por litro) y medio CYG (ácido casamino al 2,0%, extracto de levadura al 0,5% y glucosa al 0,2%, ajustar el pH a 7,0 antes de utilizar el autoclave). En el caso en el que se introduce un gen utilizando un vector que contiene un gen resistente a antibióticos, el medio contiene, de manera preferente, un antibiótico correspondiente al gen.

Las condiciones de cultivo no están particularmente limitadas, siempre y cuando las bacterias que pertenecen al género *Escherichia* puedan crecer y, a efectos de producir condroitina con alta eficacia, el cultivo se realiza, de manera preferente, a una temperatura de 20°C a 40°C durante de 8 a 72 horas.

5 A efectos de producir la condroitina con alta eficacia, una bacteria se puede precultivar en una placa o medio líquido.

El procedimiento de recogida de la condroitina del cultivo no está particularmente limitado, siempre y cuando la condroitina se pueda recoger, y entre los ejemplos se incluye el procedimiento, tal como se describe en los ejemplos mostrados a continuación. Específicamente, las células recombinantes recogidas se suspenden en PBS (solución salina tamponada con fosfato) o similares; se tratan las células con lisozima, ADNasa I y proteinasa K; y se extraen las proteínas. La condroitina se puede detectar, por ejemplo, mediante el tratamiento de la fracción con condroitinasa y la realización de un análisis de la composición de disacárido.

15 <3> Procedimiento de producción de sulfato de condroitina

El sulfato de condroitina se puede producir mediante la sulfatación adicional de condroitina preparada a partir de las bacterias recombinantes descritas en la presente invención.

20 La sulfatación se puede realizar mediante un procedimiento conocido de sulfatación de glicosaminoglicanos, que no está particularmente limitado, y entre los ejemplos del mismo se incluye el procedimiento descrito en el documento JP 61-47701 A.

Además, la sulfatación se puede realizar utilizando una enzima para transferir un grupo sulfato a la condroitina (sulfotransferasa). Bajo la existencia del 3'-fosfoadenosina 5'-fosfosulfato (PAPS) como donante de sulfato, las sulfotransferasas pueden producir sulfato de condroitina mediante reacción a condroitina producida por las bacterias recombinantes descritas en la presente invención. Entre los ejemplos de una sulfotransferasa conocida para la transferencia de un grupo sulfato a la condroitina se incluyen la transferasa de grupo 6-O-sulfato de condroitina (J. Biol. Chem., 275 (28), 21075-21080 (2000)) y la transferasa del grupo 4-sulfato de galactosaminoglicano (JP 2000-4877 A).

30 EJEMPLOS

En lo sucesivo, la presente invención se describirá en detalle haciendo referencia a los ejemplos.

35 Ejemplo 1: Preparación del vector de coexpresión de kfoC/KfoA

<Amplificación del gen kfoA>

40 Se realizó una PCR utilizando un ADN cromosómico de la cepa K4 de *E. coli* como plantilla, según el procedimiento descrito en el documento J. Biol. Chem., Vol. 277, Edición 24, 21567-21575, y el producto de PCR resultante se insertó en pTrcHis (vector de expresión de la proteína de fusión con histidina, Invitrogen), para producir de este modo pTrcHis-kfoA.

Los cebadores utilizados son los siguientes:
 45 K4A-SP: 5'-CGGGATCCCGATGAGTATTCTTAATCAAGC-3' (SEQ ID NO: 7) y
 K4A-AS: 5'-GGAATTCGGCCAGTCTACATGTTTATCAC-3' (SEQ ID NO: 8)

<Amplificación del gen kfoC>

50 Se realizó una PCR utilizando un ADN cromosómico de la cepa K4 de *E. coli* como plantilla, según el procedimiento descrito en el documento JP 2003-199583 A, y el producto de PCR resultante se insertó en pTrcHis, para producir de este modo pTrcHis-kfoC.

Los cebadores utilizados son los siguientes:
 55 K4C-SP: 5'-CGGGATCCCGATGAGTATTCTTAATCAAGC-3' (SEQ ID NO: 9) y
 K4C-AS: 5'-GGAATTCGGCCAGTCTACATGTTTATCAC-3' (SEQ ID NO: 10).

<Preparación de pTrcHis-kfoCA>

60 El pTrcHis-kfoCA se preparó a partir de los pTrcHis-kfoA y pTrcHis-kfoC mencionados anteriormente de la siguiente manera.

En primer lugar, se introdujo el sitio NotI-Sall en la secuencia C-terminal de pTrcHis-kfoC mediante PCR. La PCR se realizó utilizando los cebadores mostrados a continuación para amplificar la longitud completa de pTrcHis-kfoC desde el lado C-terminal de kfoC, y el producto de PCR resultante se autoligó para producir de este modo un plásmido pTrcHis-kfoC-NotI-Sall.

Los cebadores utilizados son los siguientes:

NotSal-pTrcHisC-rev: 5'-GCGGCCGCAAACAGCCAAGCTTCGAATTC-3' (SEQ ID NO: 11) y
 NotSal-pTrcHisC-for: 5'-ACGCGTCGACGGCGGATGAGAGAAGATTTTCA-3' (SEQ ID NO: 12)

5 A continuación, se diseñaron los cebadores (NotI-RBS-KfoA-N:
 5'-GCGGCCGCAAATTAAGAGGTATATATTAATGTATCGA-3' (SEQ ID NO: 13) y Sall-KfoA-C:
 5'-GTCGACCTCTCATCCGCCAAAACA-3' (SEQ ID NO: 14)) en dirección 5' del sitio de unión al ribosoma (RBS) y la
 10 región C-terminal de kfoA de pTrcHis-kfoA, respectivamente, y se utilizaron para PCR utilizando pTrcHis-kfoA como
 plantilla. A continuación, el producto de PCR resultante se insertó en pCR4-TOPO (Invitrogen) para producir de este
 modo pCR4-TOPO-kfoA.

Se escindió un inserto que contenía kfoA de pCR4-TOPO-kfoA con NotI-Sall y se introdujo en el sitio NotI-Sall de
 pTrcHis-kfoC-NotI-Sall, y el plásmido resultante se denominó pTrcHis-kfoCA (figura 1).

15 Ejemplo 2

Coexpresión de la kfoC y KfoA recombinante

20 Se introdujo el vector de expresión, pTrcHis-kfoCA, en la cepa K5 de *Escherichia coli* mediante electroporación (100
 µl de células, 200 Q, 25 µF, 2,5 kV, cubeta de 0,1 cm) para producir de este modo la cepa K5/pTrcHis-kfoCA de *E.*
coli. Las colonias se transfirieron a medio LB complementado con 100 ppm de ampicilina y, a continuación, el cultivo
 de siembra se incubó a 37°C durante una noche. Se transfirió un ml del cultivo de siembra a 20 ml de medio CYG
 25 complementado con 100 ppm de ampicilina. Las bacterias recombinantes se cultivaron a 37°C durante 3 horas
 (DO600 = 1,8, 1,7-2,0) y, a continuación, se añadió IPTG al cultivo a una concentración final de 1,0 mM. El cultivo
 resultante se cultivó a 37°C durante 5 horas adicionales para inducir la expresión de las proteínas recombinantes.

Se recogieron las células bacterianas de 900 µl del cultivo mediante centrifugación. Las células obtenidas se
 suspendieron en 90 µl de tampón de Laemmli (x1). Después de calentar en un baño de agua hirviendo durante 10
 30 minutos, se sometieron 10 µl del sobrenadante a SDS-PAGE en un gel de gradiente 5/20% y se transfirieron a una
 membrana de PVDF, seguido por análisis de Western para detectar la expresión de proteínas recombinantes. Se
 utilizó anti-Penta-His-HRP (QIAGEN) diluido a 1/2.000 para la detección de proteínas de fusión con histidina
 recombinantes. Como resultado, se confirmaron las expresiones de las proteínas recombinantes KfoA y kfoC (figura
 2).

35 Ejemplo 3

Preparación de polisacárido y su detección mediante análisis de disacárido

40 <Preparación de células bacterianas>

Se cultivó una cepa de K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli* en medio LB complementado con 100 ppm de ampicilina como
 cultivo de siembra. El cultivo de siembra (750 µl) se transfirió a medio CYG complementado con 100 ppm de
 ampicilina (15 ml) y, a continuación, se cultivó a 37°C durante 3 horas. Al cultivo se le añadió IPTG (concentración
 45 final: 1 mM), y se realizó el cultivo durante 5 horas adicionales. Las células bacterianas se recogieron por
 centrifugación.

<Preparación del sobrenadante de cultivo>

50 El cultivo de siembra (1 ml) se transfirió a medio CYG complementado con 100 ppm de ampicilina (20 ml) y, a
 continuación, se cultivó a 37°C durante 3 horas. Al cultivo se le añadió IPTG (concentración final: 0,1 mM) y se
 realizó el cultivo durante 5 horas adicionales. El sobrenadante de cultivo se recogió por centrifugación.

<Preparación de la fracción de polisacárido>

55 Los polisacáridos se prepararon a partir de las células recombinantes y el sobrenadante de cultivo mediante los tres
 procedimientos siguientes.

60 Preparación 1) Las células bacterianas obtenidas descritas anteriormente se resuspendieron en PBS y se trataron
 con lisozima y ADNasa I a 37°C durante 1 hora, seguido de tratamiento con proteinasa K a 37°C durante 1 hora. A
 continuación, las enzimas se sometieron a inactivación por calor y las proteínas se extrajeron mediante precipitación
 con sulfato amónico al 70%. La fracción sobrenadante resultante se dializó contra Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) para
 producir la muestra L.

65 Preparación 2) Las células bacterianas obtenidas descritas anteriormente se trataron con los agentes para purificar

el plásmido: P1 (que contiene lisozima), P2, y P3 (QIAGEN) secuencialmente, según las instrucciones del fabricante. Después de recogerlo por centrifugación, el sobrenadante se sometió a precipitación con etanol. Los precipitados se recogieron por centrifugación y se resuspendieron en 100 µl de agua esterilizada. La suspensión se trató con ADNasa I a 37°C durante 1 hora para digerir los ADN, seguido de tratamiento con proteinasa K a 37°C durante 1 hora. A continuación, las enzimas se sometieron a inactivación por calor y las proteínas se extrajeron por precipitación con sulfato amónico al 70%. La fracción sobrenadante resultante se dializó contra Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) para producir la muestra E.

Preparación 3) El sobrenadante de cultivo (20 ml) se evaporó a sequedad. Los materiales secados se disolvieron en 2 ml de agua destilada. La solución se dializó contra Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) para producir la muestra S.

<Detección de condroitina mediante análisis de disacáridos>

Las muestras L, E y S (100 µl cada una) fueron tratadas con cABC (condroitinasa ABC; fabricada por Seikagaku Corporation) en tampón Tris-HCl 50 mM (pH 8,0) que contenía NaOAc 50 mM a 37°C durante toda la noche.

Como controles, se prepararon muestras L, E y S tratadas sin cABC y muestras L, E y S tratadas con cABC inactivada por calor. Se realizó ultrafiltración para extraer las macromoléculas con tamaño igual o superior a 10.000 y las muestras se analizaron mediante análisis de la composición de disacáridos utilizando un sistema de HPLC fluorescente (J Biol Chem. Julio 2000 21; 275 (29): 2269 a 2275) (figuras 3, 4 y 5). Se utilizó Senshu Pak Decosil C22 (D.I. 4,6 x 150 mm) como una columna de separación en el sistema HPLC y las longitudes de onda de excitación y emisión del detector de fluorescencia se fijaron a 346 nm y 410 nm, respectivamente.

Como resultado, sólo en los casos de las muestras tratadas con cABC, se detectaron picos específicos. El perfil de la composición de disacáridos de cada muestra se correspondió estrechamente con el perfil de la muestra obtenida mediante el tratamiento de la condroitina patrón con cABC, tal como se muestra en la figura 6(A). Paralelamente, en el caso en el que la condroitina patrón tratada con cABC se mezcló con la muestra L tratada con cABC, sólo se detectó un pico y, de este modo, se confirmó que la muestra L contenía condroitina (figura 6(B)). En el caso de la muestra E y S, se obtuvieron los mismos resultados (datos no mostrados).

Ejemplo 4

Preparación del vector de coexpresión Kfo Δ C/KfoA

<Amplificación del Kfo Δ C>

Según el procedimiento descrito en el documento WO2007/145197, se clonó un ADN que codificaba KfoC truncada en N-terminal que comprendía la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5 (gen kfo Δ C). El gen kfo Δ C se insertó en pTrcHis para obtener pTrcHis-kfo Δ C.

<Preparación de pTrcHis-kfo Δ CA>

El plásmido pTrcHis-kfoCA preparado en el ejemplo 1 se escindió utilizando las enzimas de restricción SphI y SmaI. Se obtuvo un fragmento de ADN (2,9 kDa) mediante digestión del plásmido pTrcHis-kfo Δ C utilizando las mismas enzimas de restricción. Según el procedimiento convencional, el fragmento de ADN se insertó en el sitio SphI-SmaI del plásmido escindido y, a continuación, el plásmido resultante se denominó pTrcHis-kfo Δ CA.

Ejemplo 5

Preparación de anticuerpos contra KfoA y KfoC

<Preparación de anticuerpos contra KfoA>

Se sintetizó el oligopéptido que comprendía la secuencia peptídica de la SEQ ID No: 15 (CIVSR RDGDI AESWS SPEKA NK, pureza: >70%) y 4 mg del oligopéptido se conjugaron con KLH (hemocianina de lapa californiana) mediante el procedimiento convencional. Después de preparar la solución de antígeno mediante la mezcla con adyuvante completo, se llevó a cabo la inmunización 5 veces en el intervalo de 2 semanas. Se recogió la sangre completa, después de confirmar el título de anticuerpos. A partir de la sangre de cada conejo, se obtuvieron 48 ml (muestra A) y 60 ml (muestra B) de suero contra KfoA, respectivamente. Después de la purificación utilizando columna de Proteína A, se obtuvieron 32 ml de la fracción EK-A de IgG (concentración de IgG: 5,30 mg/ml) a partir de la muestra A.

<Preparación de anticuerpos contra KfoC>

Se sintetizó el oligopéptido que comprendía la secuencia de péptido de la SEQ ID No: 16 (CQEPP GKENE TDRAA GK, pureza: >70%) y 4 mg del oligopéptido se conjugaron con KLH (hemocianina de lapa californiana) mediante el

procedimiento convencional. Después de preparar la solución de antígeno mediante la mezcla con adyuvante completo, se llevó a cabo la inmunización 5 veces en el intervalo de 2 semanas. Se recogió la sangre completa, después de confirmar el título de anticuerpos. A partir de la sangre de cada conejo, se obtuvieron 65 ml (muestra A) y 39 ml (muestra B) de suero contra KfoA, respectivamente. Después de la purificación utilizando columna de Proteína A, se obtuvieron 39 ml de la fracción EK-A de IgG (concentración de IgG: 4,41 mg/ml) a partir de la muestra A.

Ejemplo 6

De la misma manera que en el ejemplo 2, se introdujo el plásmido pTrcHis-kfo Δ CA en la cepa K5 de *E. coli* para obtener la cepa K5/pTrcHis-kfo Δ CA de *E. coli* y la cepa recombinante se cultivó para evaluar la expresión de las proteínas recombinantes. El cultivo de siembra desarrollado en medio LB complementado con 100 ppm de ampicilina (0,5 ml) se transfirió a medio CYG complementado con 100 ppm de ampicilina (10 ml) y, a continuación, el cultivo se llevó a cabo a 37°C durante 1,5 horas. Después de la adición de IPTG (concentración final: 1 mM), se continuó el cultivo durante 4 horas más. Las células bacterianas se recogieron a partir de 900 μ l del cultivo y se suspendieron en 90 μ l de tampón de Laemmli (x1). Después de calentar en un baño de agua hirviendo durante 10 min, se sometieron 10 μ l del sobrenadante a SDS-PAGE en un gel al 7,5% y se transfirieron a una membrana de PVDF, seguido por análisis de Western para detectar la expresión de proteínas recombinantes. Se utilizaron anticuerpos contra KfoA (EK-A) y anticuerpos contra KfoC (EK-C) diluidos a 1/1.000 como primer anticuerpo para la detección de las proteínas recombinantes KfoA, KfoC y Kfo Δ C. Se utilizaron inmunoglobulinas HRP contra conejo (DAKO, # p0448) como segundo anticuerpo. Además, se llevaron a cabo los mismos exámenes utilizando el cultivo de K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli* y K5/pTrcHis-kfoA de *E. coli* para comparar el nivel de expresión de proteínas recombinantes. Como resultado, no hubo una gran diferencia en el nivel de expresión de KfoA y KfoC (Kfo Δ C) entre K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli* y K5/pTrcHis-kfoA de *E. coli* (figura 7).

Ejemplo 7

Preparación de polisacárido y su detección mediante análisis de disacáridos

<Preparación de célula bacteriana>

De la misma manera que en el ejemplo 3, se prepararon células bacterianas y sobrenadante del cultivo de las cepas de K5/pTrcHis-kfo Δ CA de *E. coli*, K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli* y K5/pTrcHis-kfoA de *E. coli* después de tratamiento en autoclave a 121°C durante 5 minutos.

<Preparación de la fracción de polisacáridos>

El sobrenadante (1 ml) se dializó frente a agua corriente durante una noche y, a continuación, la solución dializada se liofilizó. Los materiales liofilizados se disolvieron en 100 μ l de Tris-HCl 50 mM (pH 8,0) para utilización como una fracción de polisacáridos.

<Detección de condroitina mediante análisis de disacáridos>

De la misma manera que en el ejemplo 3, se analizó la fracción obtenida mediante el análisis de la composición de disacáridos. Se analizó la solución patrón de condroitina (200 μ g/ml y 100 μ g/ml) mediante HPLC fluorescente para elaborar la curva de calibración de condroitina. La relación entre la concentración de condroitina y el área de pico de azúcar doble insaturado, Δ Di-0S, se mostró en la ecuación-1.

[Condroitina; μ g/ml de sobrenadante] = (0,000591 x [área del pico] + 1,219)/[índice de concentración] ($r^2 = 0,9984$) (Ecuación-1)

El pico de acuerdo con el disacárido insaturado (Δ Di-0S) se detectó en las muestras preparadas a partir de K5/pTrcHis-kfo Δ CA de *E. coli* y K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli* (datos no mostrados). La tabla 1 muestra el resultado de la concentración de condroitina calcula utilizando la ecuación-1 en los cultivos recombinantes.

Tabla 1 Comparación del contenido de condroitina en el cultivo de las cepas recombinantes.

K5 de <i>E. coli</i>	Concentración	Área de pico	Condroitina [μ g/ml]
K5/pTrcHis-kfoA	10	10.187,4	0,7
K5/pTrcHis-kfoCA	10	505.032,3	30,0
K5/pTrcHis-kfo Δ CA	10	888.677,6	52,6

Mediante la comparación de la productividad de condroitina entre K5/pTrcHis-kfo Δ CA de *E. coli* y K5/pTrcHis-kfoCA de *E. coli*, la cepa recombinante K5/pTrcHis-kfo Δ CA de *E. coli* es más adecuada para la producción de condroitina

mediante fermentación. Este resultado sugirió que la producción de condroitina se podría mejorar mediante la utilización del gen kfoC que codifica KfoC truncada en N-terminal.

Aplicabilidad industrial

5 Mediante la utilización de la bacteria de la presente invención, se pueden producir condroitina y sulfato de condroitina con una alta eficiencia y a bajo coste.

LISTADO DE SECUENCIAS

10 <110> Seikagaku Corporation

<120> Bacteria que produce condroitina y procedimiento de producción de condroitina

<130> F200717C7102

<150> US 60/913.713

<151> 24-04-2007

<160> 16

<170> PatentIn versión 3.3

<210> 1

<211> 1020

<212> ADN

<213> Escherichia coli

<220>

<221> CDS

<222> (1).. (1017)

<400> 1

atg aat ata tta gtt aca ggt gga gca ggc tat att ggc tcg cat act	48
Met Asn Ile Leu Val Thr Gly Gly Ala Gly Tyr Ile Gly Ser His Thr	
1 5 10 15	
agt tta tgt ctt ctg aat aaa ggt tac aat gtt gta atc att gac aac	96
Ser Leu Cys Leu Leu Asn Lys Gly Tyr Asn Val Val Ile Ile Asp Asn	
20 25 30	
tta att aat tca tct tgc gag agc att cga agg att gaa tta ata gct	144
Leu Ile Asn Ser Ser Cys Glu Ser Ile Arg Arg Ile Glu Leu Ile Ala	
35 40 45	
aaa aaa aaa gtt act ttc tat gag ttg aac atc aac aat gaa aaa gaa	192
Lys Lys Lys Val Thr Phe Tyr Glu Leu Asn Ile Asn Asn Glu Lys Glu	
50 55 60	
ggt aat caa att cta aaa aaa cac aaa ttt gat tgt ata atg cat ttt	240
Val Asn Gln Ile Leu Lys Lys His Lys Phe Asp Cys Ile Met His Phe	
65 70 75 80	
gcc ggt gca aag tct gtt gct gaa tct tta ata aaa ccc att ttt tat	288
Ala Gly Ala Lys Ser Val Ala Glu Ser Leu Ile Lys Pro Ile Phe Tyr	

ES 2 650 799 T3

	85	90	95	
tat gat aat aat gtt tca ggg acg ttg caa tta att aat tgc gct ata				336
Tyr Asp Asn Asn Val Ser Gly Thr Leu Gln Leu Ile Asn Cys Ala Ile				
	100	105	110	
aaa aac gat gtg gct aat ttt att ttt agc tct tct gca acg gtt tat				384
Lys Asn Asp Val Ala Asn Phe Ile Phe Ser Ser Ser Ala Thr Val Tyr				
	115	120	125	
ggt gaa agc aaa ata atg cct gta aca gaa gat tgc cat ata gga gga				432
Gly Glu Ser Lys Ile Met Pro Val Thr Glu Asp Cys His Ile Gly Gly				
	130	135	140	
aca tta aat cca tat ggt aca tca aag tat ata tca gaa ttg atg att				480
Thr Leu Asn Pro Tyr Gly Thr Ser Lys Tyr Ile Ser Glu Leu Met Ile				
	145	150	155	160
aga gat att gca aaa aaa tat agc gat act aat ttt ttg tgt ctg aga				528
Arg Asp Ile Ala Lys Lys Tyr Ser Asp Thr Asn Phe Leu Cys Leu Arg				
	165	170	175	
tat ttt aac cca aca ggt gct cac gag tgc gga atg atc ggt gaa agt				576
Tyr Phe Asn Pro Thr Gly Ala His Glu Ser Gly Met Ile Gly Glu Ser				
	180	185	190	
ccc gct gat ata cca agc aat tta gtt cct tat ata tta caa gtt gct				624
Pro Ala Asp Ile Pro Ser Asn Leu Val Pro Tyr Ile Leu Gln Val Ala				
	195	200	205	
atg ggt aaa cta gaa aaa ctt atg gtg ttt ggg ggg gat tac cct aca				672
Met Gly Lys Leu Glu Lys Leu Met Val Phe Gly Gly Asp Tyr Pro Thr				
	210	215	220	
aag gat gga acc ggt gtt cgt gat tat ata cac gta atg gat tta gcg				720
Lys Asp Gly Thr Gly Val Arg Asp Tyr Ile His Val Met Asp Leu Ala				
	225	230	235	240
gaa ggg cat gtg gct gct tta tct tac ctt ttc cgt gat aat aac act				768
Glu Gly His Val Ala Ala Leu Ser Tyr Leu Phe Arg Asp Asn Asn Thr				
	245	250	255	
aat tat cat gtt ttt aat tta ggt act ggt aaa gga tat tct gtt tta				816
Asn Tyr His Val Phe Asn Leu Gly Thr Gly Lys Gly Tyr Ser Val Leu				
	260	265	270	
gag ctg gtt tct acc ttt gaa aaa ata tct ggg gtt aga att cca tat				864
Glu Leu Val Ser Thr Phe Glu Lys Ile Ser Gly Val Arg Ile Pro Tyr				
	275	280	285	
gaa att gtt tcg aga aga gat ggg gat att gct gaa agt tgg tca tca				912
Glu Ile Val Ser Arg Arg Asp Gly Asp Ile Ala Glu Ser Trp Ser Ser				
	290	295	300	
cca gaa aaa gca aat aag tat ctc aat tgg aaa gct aaa agg gaa ttg				960
Pro Glu Lys Ala Asn Lys Tyr Leu Asn Trp Lys Ala Lys Arg Glu Leu				
	305	310	315	320

ES 2 650 799 T3

gaa aca atg ctt gag gat gcc tgg cgc tgg caa atg aaa aac cca aat 1008
 Glu Thr Met Leu Glu Asp Ala Trp Arg Trp Gln Met Lys Asn Pro Asn
 325 330 335
 ggt tat att taa 1020
 Gly Tyr Ile

<210> 2
 <211> 339
 <212> PRT
 <213> Escherichia coli

<400> 2

Met Asn Ile Leu Val Thr Gly Gly Ala Gly Tyr Ile Gly Ser His Thr
 1 5 10 15
 Ser Leu Cys Leu Leu Asn Lys Gly Tyr Asn Val Val Ile Ile Asp Asn
 20 25 30
 Leu Ile Asn Ser Ser Cys Glu Ser Ile Arg Arg Ile Glu Leu Ile Ala
 35 40 45
 Lys Lys Lys Val Thr Phe Tyr Glu Leu Asn Ile Asn Asn Glu Lys Glu
 50 55 60
 Val Asn Gln Ile Leu Lys Lys His Lys Phe Asp Cys Ile Met His Phe
 65 70 75 80
 Ala Gly Ala Lys Ser Val Ala Glu Ser Leu Ile Lys Pro Ile Phe Tyr
 85 90 95
 Tyr Asp Asn Asn Val Ser Gly Thr Leu Gln Leu Ile Asn Cys Ala Ile
 100 105 110
 Lys Asn Asp Val Ala Asn Phe Ile Phe Ser Ser Ser Ala Thr Val Tyr
 115 120 125
 Gly Glu Ser Lys Ile Met Pro Val Thr Glu Asp Cys His Ile Gly Gly
 130 135 140
 Thr Leu Asn Pro Tyr Gly Thr Ser Lys Tyr Ile Ser Glu Leu Met Ile
 145 150 155 160
 Arg Asp Ile Ala Lys Lys Tyr Ser Asp Thr Asn Phe Leu Cys Leu Arg
 165 170 175
 Tyr Phe Asn Pro Thr Gly Ala His Glu Ser Gly Met Ile Gly Glu Ser
 180 185 190
 Pro Ala Asp Ile Pro Ser Asn Leu Val Pro Tyr Ile Leu Gln Val Ala
 195 200 205
 Met Gly Lys Leu Glu Lys Leu Met Val Phe Gly Gly Asp Tyr Pro Thr
 210 215 220
 Lys Asp Gly Thr Gly Val Arg Asp Tyr Ile His Val Met Asp Leu Ala

ES 2 650 799 T3

```

225                230                235                240
Glu Gly His Val Ala Ala Leu Ser Tyr Leu Phe Arg Asp Asn Asn Thr
                245                250                255
Asn Tyr His Val Phe Asn Leu Gly Thr Gly Lys Gly Tyr Ser Val Leu
                260                265                270
Glu Leu Val Ser Thr Phe Glu Lys Ile Ser Gly Val Arg Ile Pro Tyr
                275                280                285
Glu Ile Val Ser Arg Arg Asp Gly Asp Ile Ala Glu Ser Trp Ser Ser
                290                295                300
Pro Glu Lys Ala Asn Lys Tyr Leu Asn Trp Lys Ala Lys Arg Glu Leu
305                310                315                320
Glu Thr Met Leu Glu Asp Ala Trp Arg Trp Gln Met Lys Asn Pro Asn
                325                330                335
Gly Tyr Ile

```

<210> 3
 <211> 2061
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

<220>
 <221> CDS
 <222> (1).. (2058)

<400> 3

```

atg agt att ctt aat caa gca ata aat tta tat aaa aac aaa aat tat      48
Met Ser Ile Leu Asn Gln Ala Ile Asn Leu Tyr Lys Asn Lys Asn Tyr
1                5                10                15
cgc caa gct tta tct ctt ttt gag aag gtt gct gaa att tat gat gtt      96
Arg Gln Ala Leu Ser Leu Phe Glu Lys Val Ala Glu Ile Tyr Asp Val
                20                25                30
agt tgg gtc gaa gca aat ata aaa tta tgc caa acc gca ctc aat ctt      144
Ser Trp Val Glu Ala Asn Ile Lys Leu Cys Gln Thr Ala Leu Asn Leu
                35                40                45
tct gaa gaa gtt gat aag tta aat cgt aaa gct gtt att gat att gat      192
Ser Glu Glu Val Asp Lys Leu Asn Arg Lys Ala Val Ile Asp Ile Asp
                50                55                60
gca gca aca aaa ata atg tgt tct aac gcc aaa gca att agt ctg aac      240
Ala Ala Thr Lys Ile Met Cys Ser Asn Ala Lys Ala Ile Ser Leu Asn
65                70                75                80

```

ES 2 650 799 T3

gag gtt gaa aaa aat gaa ata ata agc aaa tac cga gaa ata acc gca	288
Glu Val Glu Lys Asn Glu Ile Ile Ser Lys Tyr Arg Glu Ile Thr Ala	
85 90 95	
aag aaa tca gaa cgg gcg gag tta aag gaa gtc gaa ccc att cct tta	336
Lys Lys Ser Glu Arg Ala Glu Leu Lys Glu Val Glu Pro Ile Pro Leu	
100 105 110	
gat tgg cct agt gat tta act tta ccg ccg tta cct gag agc aca aac	384
Asp Trp Pro Ser Asp Leu Thr Leu Pro Pro Leu Pro Glu Ser Thr Asn	
115 120 125	
gat tat gtt tgg gcg ggg aaa aga aaa gag ctt gat gat tat cca aga	432
Asp Tyr Val Trp Ala Gly Lys Arg Lys Glu Leu Asp Asp Tyr Pro Arg	
130 135 140	
aaa cag tta atc att gac ggg ctt agt att gta att cct aca tat aat	480
Lys Gln Leu Ile Ile Asp Gly Leu Ser Ile Val Ile Pro Thr Tyr Asn	
145 150 155 160	
cga gca aaa ata ctt gca att aca ctt gct tgt ctt tgt aac caa aag	528
Arg Ala Lys Ile Leu Ala Ile Thr Leu Ala Cys Leu Cys Asn Gln Lys	
165 170 175	
acc ata tac gac tat gaa gtt att gtt gcc gat gat gga agt aaa gaa	576
Thr Ile Tyr Asp Tyr Glu Val Ile Val Ala Asp Asp Gly Ser Lys Glu	
180 185 190	
aat att gaa gaa ata gta aga gaa ttt gaa agt tta tta aat ata aaa	624
Asn Ile Glu Glu Ile Val Arg Glu Phe Glu Ser Leu Leu Asn Ile Lys	
195 200 205	
tat gta cgt cag aag gat tat gga tat caa ctg tgt gct gtt aga aat	672
Tyr Val Arg Gln Lys Asp Tyr Gly Tyr Gln Leu Cys Ala Val Arg Asn	
210 215 220	
ctt ggg ctt agg gct gca aag tat aat tat gtt gca att ctg gat tgt	720
Leu Gly Leu Arg Ala Ala Lys Tyr Asn Tyr Val Ala Ile Leu Asp Cys	
225 230 235 240	
gat atg gct ccg aac cca cta tgg gtt cag tca tat atg gaa cta tta	768
Asp Met Ala Pro Asn Pro Leu Trp Val Gln Ser Tyr Met Glu Leu Leu	
245 250 255	
gcg gtg gac gat aat gtt gct cta att ggc cct aga aaa tat ata gat	816
Ala Val Asp Asp Asn Val Ala Leu Ile Gly Pro Arg Lys Tyr Ile Asp	
260 265 270	
aca agc aag cat aca tat tta gat ttc ctt tcc caa aaa tca cta ata	864
Thr Ser Lys His Thr Tyr Leu Asp Phe Leu Ser Gln Lys Ser Leu Ile	
275 280 285	
aat gaa att cct gaa atc att act aat aat cag gtt gca ggc aag gtt	912
Asn Glu Ile Pro Glu Ile Ile Thr Asn Asn Gln Val Ala Gly Lys Val	
290 295 300	
gag caa aac aaa tca gtt gac tgg cga ata gaa cat ttc aaa aat acc	960

ES 2 650 799 T3

Glu Gln Asn Lys Ser Val Asp Trp Arg Ile Glu His Phe Lys Asn Thr	
305	310 315 320
gat aat cta aga tta tgc aac aca cca ttt cga ttt ttt agc gga ggt	1008
Asp Asn Leu Arg Leu Cys Asn Thr Pro Phe Arg Phe Phe Ser Gly Gly	
325 330 335	
aat gtc gct ttt gcg aaa aaa tgg ctt ttc cgt gca gga tgg ttt gat	1056
Asn Val Ala Phe Ala Lys Lys Trp Leu Phe Arg Ala Gly Trp Phe Asp	
340 345 350	
gaa gag ttt acg cat tgg ggg ggg gag gat aat gag ttt gga tat cgt	1104
Glu Glu Phe Thr His Trp Gly Gly Glu Asp Asn Glu Phe Gly Tyr Arg	
355 360 365	
ctc tac aga gaa gga tgt tac ttt cgg tct gtt gaa gga gca atg gca	1152
Leu Tyr Arg Glu Gly Cys Tyr Phe Arg Ser Val Glu Gly Ala Met Ala	
370 375 380	
tat cat caa gaa cca ccc ggg aaa gaa aac gag acg gat cgt gcg gca	1200
Tyr His Gln Glu Pro Pro Gly Lys Glu Asn Glu Thr Asp Arg Ala Ala	
385 390 395 400	
ggg aaa aat att act gtt caa ttg tta cag caa aaa gtt cct tat ttc	1248
Gly Lys Asn Ile Thr Val Gln Leu Leu Gln Gln Lys Val Pro Tyr Phe	
405 410 415	
tat aga aaa aaa gaa aaa ata gaa tcc gcg aca tta aaa aga gta cca	1296
Tyr Arg Lys Lys Glu Lys Ile Glu Ser Ala Thr Leu Lys Arg Val Pro	
420 425 430	
cta gta tct ata tat att ccc gcc tat aac tgc tct aaa tat att gtt	1344
Leu Val Ser Ile Tyr Ile Pro Ala Tyr Asn Cys Ser Lys Tyr Ile Val	
435 440 445	
cgt tgt gtt gaa agc gcc ctt aat cag aca ata act gac tta gaa gta	1392
Arg Cys Val Glu Ser Ala Leu Asn Gln Thr Ile Thr Asp Leu Glu Val	
450 455 460	
tgc ata tgc gat gat ggt tcc aca gat gat aca ttg cgg att ctt cag	1440
Cys Ile Cys Asp Asp Gly Ser Thr Asp Asp Thr Leu Arg Ile Leu Gln	
465 470 475 480	
gag cat tat gca aac cat cct cga gtt cgt ttt att tca caa aaa aac	1488
Glu His Tyr Ala Asn His Pro Arg Val Arg Phe Ile Ser Gln Lys Asn	
485 490 495	
aaa gga att ggt tca gca tct aat aca gca gtt aga ttg tgt cgg gga	1536
Lys Gly Ile Gly Ser Ala Ser Asn Thr Ala Val Arg Leu Cys Arg Gly	
500 505 510	
ttc tat ata ggt cag tta gac tct gat gac ttt ctt gaa cca gat gct	1584
Phe Tyr Ile Gly Gln Leu Asp Ser Asp Asp Phe Leu Glu Pro Asp Ala	
515 520 525	
ggt gaa cta tgt cta gat gaa ttt aga aaa gat cta tca ttg gca tgt	1632
Val Glu Leu Cys Leu Asp Glu Phe Arg Lys Asp Leu Ser Leu Ala Cys	

ES 2 650 799 T3

```

530          535          540
ggt tat aca act aac cgt aat ata gat cgt gaa ggt aat ttg ata tca      1680
Val Tyr Thr Thr Asn Arg Asn Ile Asp Arg Glu Gly Asn Leu Ile Ser
545          550          555          560
aat ggc tat aat tgg ccc att tat tgc cga gaa aaa ctt act agt gca      1728
Asn Gly Tyr Asn Trp Pro Ile Tyr Ser Arg Glu Lys Leu Thr Ser Ala
          565          570          575
atg ata tgt cat cat ttc agg atg ttc aca gca aga gca tgg aac cta      1776
Met Ile Cys His His Phe Arg Met Phe Thr Ala Arg Ala Trp Asn Leu
          580          585          590
act gaa ggt ttc aac gaa tgc atc agc aac gca gtt gat tac gat atg      1824
Thr Glu Gly Phe Asn Glu Ser Ile Ser Asn Ala Val Asp Tyr Asp Met
          595          600          605
tat tta aaa ctt agt gaa gtt gga ccg ttc aag cat ata aac aaa att      1872
Tyr Leu Lys Leu Ser Glu Val Gly Pro Phe Lys His Ile Asn Lys Ile
          610          615          620
tgt tat aat cgc gta ttg cat ggt gaa aat acg tct ata aaa aag ttg      1920
Cys Tyr Asn Arg Val Leu His Gly Glu Asn Thr Ser Ile Lys Lys Leu
          625          630          635          640
gat att caa aag gaa aat cat ttt aaa gtt gtt aac gaa tca tta agt      1968
Asp Ile Gln Lys Glu Asn His Phe Lys Val Val Asn Glu Ser Leu Ser
          645          650          655
agg cta ggc ata aaa aaa tat aaa tat tca cca tta act aat ttg aat      2016
Arg Leu Gly Ile Lys Lys Tyr Lys Tyr Ser Pro Leu Thr Asn Leu Asn
          660          665          670
gaa tgt aga aaa tat acc tgg gaa aaa ata gag aat gat tta taa      2061
Glu Cys Arg Lys Tyr Thr Trp Glu Lys Ile Glu Asn Asp Leu
          675          680          685

```

<210> 4

<211> 686

<212> PRT

<213> Escherichia coli

<400> 4

```

Met Ser Ile Leu Asn Gln Ala Ile Asn Leu Tyr Lys Asn Lys Asn Tyr
1          5          10          15
Arg Gln Ala Leu Ser Leu Phe Glu Lys Val Ala Glu Ile Tyr Asp Val
          20          25          30
Ser Trp Val Glu Ala Asn Ile Lys Leu Cys Gln Thr Ala Leu Asn Leu
          35          40          45
Ser Glu Glu Val Asp Lys Leu Asn Arg Lys Ala Val Ile Asp Ile Asp

```

ES 2 650 799 T3

50						55						60							
Ala	Ala	Thr	Lys	Ile	Met	Cys	Ser	Asn	Ala	Lys	Ala	Ile	Ser	Leu	Asn				
65						70				75				80					
Glu	Val	Glu	Lys	Asn	Glu	Ile	Ile	Ser	Lys	Tyr	Arg	Glu	Ile	Thr	Ala				
				85					90					95					
Lys	Lys	Ser	Glu	Arg	Ala	Glu	Leu	Lys	Glu	Val	Glu	Pro	Ile	Pro	Leu				
			100					105					110						
Asp	Trp	Pro	Ser	Asp	Leu	Thr	Leu	Pro	Pro	Leu	Pro	Glu	Ser	Thr	Asn				
		115						120					125						
Asp	Tyr	Val	Trp	Ala	Gly	Lys	Arg	Lys	Glu	Leu	Asp	Asp	Tyr	Pro	Arg				
		130				135						140							
Lys	Gln	Leu	Ile	Ile	Asp	Gly	Leu	Ser	Ile	Val	Ile	Pro	Thr	Tyr	Asn				
145					150					155					160				
Arg	Ala	Lys	Ile	Leu	Ala	Ile	Thr	Leu	Ala	Cys	Leu	Cys	Asn	Gln	Lys				
				165					170					175					
Thr	Ile	Tyr	Asp	Tyr	Glu	Val	Ile	Val	Ala	Asp	Asp	Gly	Ser	Lys	Glu				
			180					185					190						
Asn	Ile	Glu	Glu	Ile	Val	Arg	Glu	Phe	Glu	Ser	Leu	Leu	Asn	Ile	Lys				
		195					200					205							
Tyr	Val	Arg	Gln	Lys	Asp	Tyr	Gly	Tyr	Gln	Leu	Cys	Ala	Val	Arg	Asn				
		210				215						220							
Leu	Gly	Leu	Arg	Ala	Ala	Lys	Tyr	Asn	Tyr	Val	Ala	Ile	Leu	Asp	Cys				
225					230						235			240					
Asp	Met	Ala	Pro	Asn	Pro	Leu	Trp	Val	Gln	Ser	Tyr	Met	Glu	Leu	Leu				
				245					250					255					
Ala	Val	Asp	Asp	Asn	Val	Ala	Leu	Ile	Gly	Pro	Arg	Lys	Tyr	Ile	Asp				
			260					265						270					
Thr	Ser	Lys	His	Thr	Tyr	Leu	Asp	Phe	Leu	Ser	Gln	Lys	Ser	Leu	Ile				
		275					280						285						
Asn	Glu	Ile	Pro	Glu	Ile	Ile	Thr	Asn	Asn	Gln	Val	Ala	Gly	Lys	Val				
		290				295						300							
Glu	Gln	Asn	Lys	Ser	Val	Asp	Trp	Arg	Ile	Glu	His	Phe	Lys	Asn	Thr				
305					310					315					320				
Asp	Asn	Leu	Arg	Leu	Cys	Asn	Thr	Pro	Phe	Arg	Phe	Phe	Ser	Gly	Gly				
				325					330					335					
Asn	Val	Ala	Phe	Ala	Lys	Lys	Trp	Leu	Phe	Arg	Ala	Gly	Trp	Phe	Asp				
			340					345						350					
Glu	Glu	Phe	Thr	His	Trp	Gly	Gly	Glu	Asp	Asn	Glu	Phe	Gly	Tyr	Arg				
		355					360						365						
Leu	Tyr	Arg	Glu	Gly	Cys	Tyr	Phe	Arg	Ser	Val	Glu	Gly	Ala	Met	Ala				
		370				375							380						
Tyr	His	Gln	Glu	Pro	Pro	Gly	Lys	Glu	Asn	Glu	Thr	Asp	Arg	Ala	Ala				
385					390					395					400				

ES 2 650 799 T3

Gly Lys Asn Ile Thr Val Gln Leu Leu Gln Gln Lys Val Pro Tyr Phe
 405 410 415
 Tyr Arg Lys Lys Glu Lys Ile Glu Ser Ala Thr Leu Lys Arg Val Pro
 420 425 430
 Leu Val Ser Ile Tyr Ile Pro Ala Tyr Asn Cys Ser Lys Tyr Ile Val
 435 440 445
 Arg Cys Val Glu Ser Ala Leu Asn Gln Thr Ile Thr Asp Leu Glu Val
 450 455 460
 Cys Ile Cys Asp Asp Gly Ser Thr Asp Asp Thr Leu Arg Ile Leu Gln
 465 470 475 480
 Glu His Tyr Ala Asn His Pro Arg Val Arg Phe Ile Ser Gln Lys Asn
 485 490 495
 Lys Gly Ile Gly Ser Ala Ser Asn Thr Ala Val Arg Leu Cys Arg Gly
 500 505 510
 Phe Tyr Ile Gly Gln Leu Asp Ser Asp Asp Phe Leu Glu Pro Asp Ala
 515 520 525
 Val Glu Leu Cys Leu Asp Glu Phe Arg Lys Asp Leu Ser Leu Ala Cys
 530 535 540
 Val Tyr Thr Thr Asn Arg Asn Ile Asp Arg Glu Gly Asn Leu Ile Ser
 545 550 555 560
 Asn Gly Tyr Asn Trp Pro Ile Tyr Ser Arg Glu Lys Leu Thr Ser Ala
 565 570 575
 Met Ile Cys His His Phe Arg Met Phe Thr Ala Arg Ala Trp Asn Leu
 580 585 590
 Thr Glu Gly Phe Asn Glu Ser Ile Ser Asn Ala Val Asp Tyr Asp Met
 595 600 605
 Tyr Leu Lys Leu Ser Glu Val Gly Pro Phe Lys His Ile Asn Lys Ile
 610 615 620
 Cys Tyr Asn Arg Val Leu His Gly Glu Asn Thr Ser Ile Lys Lys Leu
 625 630 635 640
 Asp Ile Gln Lys Glu Asn His Phe Lys Val Val Asn Glu Ser Leu Ser
 645 650 655
 Arg Leu Gly Ile Lys Lys Tyr Lys Tyr Ser Pro Leu Thr Asn Leu Asn
 660 665 670
 Glu Cys Arg Lys Tyr Thr Trp Glu Lys Ile Glu Asn Asp Leu
 675 680 685

<210> 5
 <211> 1890
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

<220>
 <221> CDS
 <222> (1) .. (1887)

<400> 5

ES 2 650 799 T3

195	200	205	
ggc cct aga aaa tat ata gat aca agc aag cat aca tat tta gat ttc			672
Gly Pro Arg Lys Tyr Ile Asp Thr Ser Lys His Thr Tyr Leu Asp Phe			
210	215	220	
ctt tcc caa aaa tca cta ata aat gaa att cct gaa atc att act aat			720
Leu Ser Gln Lys Ser Leu Ile Asn Glu Ile Pro Glu Ile Ile Thr Asn			
225	230	235	240
aat cag gtt gca ggc aag gtt gag caa aac aaa tca gtt gac tgg cga			768
Asn Gln Val Ala Gly Lys Val Glu Gln Asn Lys Ser Val Asp Trp Arg			
245	250	255	
ata gaa cat ttc aaa aat acc gat aat cta aga tta tgc aac aca cca			816
Ile Glu His Phe Lys Asn Thr Asp Asn Leu Arg Leu Cys Asn Thr Pro			
260	265	270	
ttt cga ttt ttt agc gga ggt aat gtc gct ttt gcg aaa aaa tgg ctt			864
Phe Arg Phe Phe Ser Gly Gly Asn Val Ala Phe Ala Lys Lys Trp Leu			
275	280	285	
ttc cgt gca gga tgg ttt gat gaa gag ttt acg cat tgg ggg ggg gag			912
Phe Arg Ala Gly Trp Phe Asp Glu Glu Phe Thr His Trp Gly Gly Glu			
290	295	300	
gat aat gag ttt gga tat cgt ctc tac aga gaa gga tgt tac ttt cgg			960
Asp Asn Glu Phe Gly Tyr Arg Leu Tyr Arg Glu Gly Cys Tyr Phe Arg			
305	310	315	320
tct gtt gaa gga gca atg gca tat cat caa gaa cca ccc ggg aaa gaa			1008
Ser Val Glu Gly Ala Met Ala Tyr His Gln Glu Pro Pro Gly Lys Glu			
325	330	335	
aac gag acg gat cgt gcg gca ggg aaa aat att act gtt caa ttg tta			1056
Asn Glu Thr Asp Arg Ala Ala Gly Lys Asn Ile Thr Val Gln Leu Leu			
340	345	350	
cag caa aaa gtt cct tat ttc tat aga aaa aaa gaa aaa ata gaa tcc			1104
Gln Gln Lys Val Pro Tyr Phe Tyr Arg Lys Lys Glu Lys Ile Glu Ser			
355	360	365	
gcg aca tta aaa aga gta cca cta gta tct ata tat att ccc gcc tat			1152
Ala Thr Leu Lys Arg Val Pro Leu Val Ser Ile Tyr Ile Pro Ala Tyr			
370	375	380	
aac tgc tct aaa tat att gtt cgt tgt gtt gaa agc gcc ctt aat cag			1200
Asn Cys Ser Lys Tyr Ile Val Arg Cys Val Glu Ser Ala Leu Asn Gln			
385	390	395	400
aca ata act gac tta gaa gta tgc ata tgc gat gat ggt tcc aca gat			1248
Thr Ile Thr Asp Leu Glu Val Cys Ile Cys Asp Asp Gly Ser Thr Asp			
405	410	415	
gat aca ttg cgg att ctt cag gag cat tat gca aac cat cct cga gtt			1296
Asp Thr Leu Arg Ile Leu Gln Glu His Tyr Ala Asn His Pro Arg Val			
420	425	430	

ES 2 650 799 T3

cgt ttt att tca caa aaa aac aaa gga att ggt tca gca tct aat aca 1344
 Arg Phe Ile Ser Gln Lys Asn Lys Gly Ile Gly Ser Ala Ser Asn Thr
 435 440 445
 gca gtt aga ttg tgt cgg gga ttc tat ata ggt cag tta gac tct gat 1392
 Ala Val Arg Leu Cys Arg Gly Phe Tyr Ile Gly Gln Leu Asp Ser Asp
 450 455 460
 gac ttt ctt gaa cca gat gct gtt gaa cta tgt cta gat gaa ttt aga 1440
 Asp Phe Leu Glu Pro Asp Ala Val Glu Leu Cys Leu Asp Glu Phe Arg
 465 470 475 480
 aaa gat cta tca ttg gca tgt gtt tat aca act aac cgt aat ata gat 1488
 Lys Asp Leu Ser Leu Ala Cys Val Tyr Thr Thr Asn Arg Asn Ile Asp
 485 490 495
 cgt gaa ggt aat ttg ata tca aat ggc tat aat tgg ccc att tat tcg 1536
 Arg Glu Gly Asn Leu Ile Ser Asn Gly Tyr Asn Trp Pro Ile Tyr Ser
 500 505 510
 cga gaa aaa ctt act agt gca atg ata tgt cat cat ttc agg atg ttc 1584
 Arg Glu Lys Leu Thr Ser Ala Met Ile Cys His His Phe Arg Met Phe
 515 520 525
 aca gca aga gca tgg aac cta act gaa ggt ttc aac gaa tcg atc agc 1632
 Thr Ala Arg Ala Trp Asn Leu Thr Glu Gly Phe Asn Glu Ser Ile Ser
 530 535 540
 aac gca gtt gat tac gat atg tat tta aaa ctt agt gaa gtt gga ccg 1680
 Asn Ala Val Asp Tyr Asp Met Tyr Leu Lys Leu Ser Glu Val Gly Pro
 545 550 555 560
 ttc aag cat ata aac aaa att tgt tat aat cgc gta ttg cat ggt gaa 1728
 Phe Lys His Ile Asn Lys Ile Cys Tyr Asn Arg Val Leu His Gly Glu
 565 570 575
 aat acg tct ata aaa aag ttg gat att caa aag gaa aat cat ttt aaa 1776
 Asn Thr Ser Ile Lys Lys Leu Asp Ile Gln Lys Glu Asn His Phe Lys
 580 585 590
 gtt gtt aac gaa tca tta agt agg cta ggc ata aaa aaa tat aaa tat 1824
 Val Val Asn Glu Ser Leu Ser Arg Leu Gly Ile Lys Lys Tyr Lys Tyr
 595 600 605
 tca cca tta act aat ttg aat gaa tgt aga aaa tat acc tgg gaa aaa 1872
 Ser Pro Leu Thr Asn Leu Asn Glu Cys Arg Lys Tyr Thr Trp Glu Lys
 610 615 620
 ata gag aat gat tta taa 1890
 Ile Glu Asn Asp Leu
 625

<210> 6
 <211> 629
 <212> PRT
 <213> Escherichia coli

<400> 6

<220>
 <223> cebador

 <400> 7
 cgggatcccg atgagtattc ttaatcaagc 30

 <210> 8
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> cebador

 <400> 8
 ggaattccgg ccagttctaca tgttatcac 30

 <210> 9
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> cebador

 <400> 9
 cgggatcccg atgagtattc ttaatcaagc 30

 <210> 10
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> cebador

 <400> 10
 ggaattccgg ccagttctaca tgttatcac 30

 <210> 11
 <211> 30
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> cebador

 <400> 11
 gcggccgcaa aacagccaag ctcgaattc 30

 <210> 12
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> cebador

ES 2 650 799 T3

<400> 12
acgcgctgcac ggcggatgag agaagattt ca 32

<210> 13
<211> 39
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> cebador

<400> 13
goggccgcaa aattaaagag gtatatatta atgtatcga 39

<210> 14
<211> 24
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> cebador

<400> 14
gtcgacctct catccgcaa aaca 24

<210> 15
<211> 22
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> péptido parcial de KfoA

<400> 15

Cys	Ile	Val	Ser	Arg	Arg	Asp	Gly	Asp	Ile	Ala	Glu	Ser	Trp	Ser	Ser
1				5					10					15	
Pro	Glu	Lys	Ala	Asn	Lys										
				20											

<210> 16
<211> 17
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> péptido parcial de KfoC

<400> 16

Cys	Gln	Glu	Pro	Pro	Gly	Lys	Glu	Asn	Glu	Thr	Asp	Arg	Ala	Ala	Gly
1				5					10					15	
Lys															

REIVINDICACIONES

- 5 1. Bacteria productora de ácido glucurónico-UDP, en la que se introducen un gen kfoA de la cepa K4 de *Escherichia coli* y un gen kfoC de la cepa K4 de *Escherichia coli*, en la que dicha bacteria tiene la capacidad de producir condroitina como un polisacárido capsular,
 y en la que el gen kfoA codifica una proteína seleccionada del grupo que comprende (A) y (B)
 (A) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2; y
 (B) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, que incluye la sustitución, deleción, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos y que tiene actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa; y
 10 en la que el gen kfoC codifica una proteína seleccionada del grupo que comprende (C) a (F);
 (C) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4;
 (D) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4, que incluye la sustitución, deleción, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos y que tiene actividad de condroitina sintasa;
 (E) una proteína que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6; y
 15 (F) una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6, que incluye la sustitución, deleción, inserción o adición de 1 a 20 aminoácidos y que tiene actividad de condroitina sintasa.
2. Bacteria, según la reivindicación 1, en la que el gen kfoA es un ADN seleccionado del grupo que comprende (a) y (b):
 20 (a) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1; y
 (b) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 1 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que tiene actividad de UDP-glucosa-4-epimerasa.
3. Bacteria, según la reivindicación 1 ó 2, en la que el gen kfoC es un ADN seleccionado del grupo que comprende (c) y (d):
 25 (c) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3; y
 (d) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 3 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa.
4. Bacteria, según la reivindicación 1 ó 2, en la que el gen kfoC es un ADN seleccionado del grupo que comprende (e) y (f):
 30 (e) un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5; y
 (f) un ADN que hibrida con un ADN que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la SEQ ID NO: 5 en condiciones rigurosas y que codifica una proteína que tiene actividad de condroitina sintasa.
 35
5. Bacteria, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que dicha bacteria es la cepa K5 de *Escherichia coli*.
6. Procedimiento de producción de condroitina que comprende, como mínimo, las siguientes etapas (1) y (2):
 40 (1) cultivar la bacteria, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5; y
 (2) recoger la condroitina del cultivo.
7. Procedimiento de producción de sulfato de condroitina que comprende: producir condroitina mediante el procedimiento, según la reivindicación 6; y sulfatar la condroitina para producir sulfato de condroitina.
 45

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

(A)

(B)

(C)

Fig. 6

(A)

(B)

Fig. 7