19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 676 874**

51 Int. Cl.:

C07K 14/79 (2006.01)

C12N 9/64 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **07.06.2011 PCT/KR2011/004131**

87 Fecha y número de publicación internacional: **08.12.2011 WO11152694**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **07.06.2011 E 11790052 (2)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **25.04.2018 EP 2576625**

54 Título: **Proteína de fusión que tiene actividad del factor VII**

30 Prioridad:

04.06.2010 KR 20100052719

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

25.07.2018

73 Titular/es:

**TIUMBIO CO., LTD. (100.0%)
5th Floor, 310 Pangyo-ro, Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13494, KR**

72 Inventor/es:

**SONG, IN-YOUNG;
KIM, HUN-TAEK;
LEE, BONG-YONG;
PARK, MAHN-HOON;
LEE, HO-SOON;
LIM, YUN JUNG;
LEE, JI-HYE;
SON, SEO YEON y
KIM, MIN-SUN**

74 Agente/Representante:

ISERN JARA, Jorge

ES 2 676 874 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Proteína de fusión que tiene actividad del factor VII

5 Campo técnico

La presente invención se refiere a una proteína de fusión que tiene actividad del factor VII (FVII); y, más particularmente, a una proteína de fusión que comprende FVII y transferrina y que tiene 0,7 o más de la actividad específica del FVII en comparación con el FVII de tipo natural no fusionado, un ADN que lo codifica, un vector recombinante que comprende en ADN y una célula hospedadora que comprende el vector recombinante.

Antecedentes de la técnica

15 Diversos trastornos hemorrágicos están provocados por la falta de factores de coagulación sanguínea. Los trastornos más comunes son la hemofilia A y B provocada por deficiencias o anomalía de los factores de coagulación sanguínea VIII y IX, respectivamente.

La hemofilia A es un trastorno hemorrágico genético provocado por un rasgo recesivo ligado al cromosoma X de un gen del factor VIII defectuoso. Se ha usado un concentrado de un factor VIII procedente de plasma o recombinante para el tratamiento de la hemofilia A. La hemofilia B está provocada por una deficiencia o disfunción del factor IX, que se trata usando un concentrado de factor IX procedente de plasma o recombinante. Sin embargo, la aparición de aloanticuerpos contra los factores de reemplazo sigue siendo un problema médico grave en el tratamiento de la hemofilia A y B. Se generan anticuerpos contra el factor VIII en hasta el 30 % de los pacientes con hemofilia A. Aunque se producen menos anticuerpos contra el factor IX, estos son menos sensibles a una terapia de inducción de tolerancia inmunitaria, lo que conduce a resultados más graves.

La coagulación sanguínea se inicia por la formación de un complejo entre el factor tisular expuesto a sangre en circulación después del daño de una pared vascular y una forma activada del factor VII (FVIIa). Dicho complejo activa el factor IX y el factor X y el factor Xa resultante produce la cantidad limitada de trombina. En un bucle de retroalimentación positiva, la trombina activa diversos factores (tales como factor VIII, factor V, factor XI, etc.) de cascada de coagulación sanguínea y los factores activados constituyen un complejo de factor Xasa o un complejo de protrombinasa. Estos complejos amplifican adicionalmente su propia generación y la producción de trombina. Esta cantidad suficiente de trombina denominada "estallido de trombina" convierte fibrinógeno en sitios de hemorragia en fibrina, consiguiendo de este modo hemostasia completa. Sin embargo, en caso de enfermos de hemofilia que tienen una alta concentración de anticuerpos neutralizantes contra el factor VIII o el factor IX, no se consigue hemostasia suficiente ya que no pueden producirse los complejos de factor Xasa mencionados anteriormente. Se ha usado FVIIa como un producto terapéutico importante para los pacientes que tienen anticuerpos neutralizantes contra el factor VIII o el factor IX, debido a que puede activar el factor X, incluso en ausencia del factor VIII y el factor IX, produciendo de este modo en última instancia una cantidad suficiente de trombina para conseguir los efectos terapéuticos deseados.

El FVII es una glucoproteína monocatenaria que consiste en 406 aminoácidos, tiene un peso molecular de 50 kDa y se secreta al torrente sanguíneo como un zimógeno. El FVII consiste en cuatro dominios distintos, es decir, un dominio de ácido carboxiglutámico (Gla) amino terminal, dos dominios de tipo factor de crecimiento epidérmico (EGF) y un dominio de serina proteasa (Hagen FS *et al.*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83(8):2412-2416, 1986). El FVII se convierte en su forma activada, FVIIa, formando dos cadenas polipeptídicas unidas por un enlace disulfuro, es decir, cadena ligera N terminal (24 kDa) y cadena pesada C terminal (28 kDa) mediante la proteólisis de un único enlace peptídico localizado en Arg 152-Ile 153. FVII está presente a una concentración de 500 ng/ml en plasma y 1 % (es decir, 5 ng/ml) de FVII está presente como FVIIa.

Al mismo tiempo, se ha indicado que la semivida de FVII en plasma es de aproximadamente 4 horas (3-6 horas), mientras que la de FVIIa es de aproximadamente 2,5. Debido a la corta semivida, es necesario administrar FVIIa mediante múltiples inyecciones intravenosas o inyección continua. Sin embargo, esto limitaría los usos terapéuticos de FVIIa con respecto a altos gastos de tratamiento y a la incomodidad del paciente.

Para solucionar estos problemas, se han proporcionado métodos para preparar proteínas de fusión que comprenden FVII y un compañero de fusión unido al mismo, pero las proteínas resultantes tuvieron el problema de perder sus actividades biológicas, incluso aunque la semivida *in vivo* corta mejoró en cierta medida en comparación con la proteína no fusionada.

En consecuencia, existe la necesidad de proporcionar y obtener una proteína de fusión de FVII que tenga una semivida *in vivo* mejorada que conserve al mismo tiempo la actividad biológica del FVII de tipo natural.

Divulgación de la invención

Problema técnico

5 Es un objeto de la presente invención proporcionar una proteína de fusión que tenga la actividad biológica del FVII de tipo natural.

Es otro objeto de la presente invención proporcionar un gen que codifique la proteína de fusión.

10 Es un objeto adicional de la presente invención proporcionar un vector recombinante que comprenda el gen.

Es un objeto adicional de la presente invención proporcionar una célula hospedadora que comprenda el vector recombinante.

15 Solución al problema

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona una proteína de fusión que comprende factor VII (FVII) y transferrina, en la que la transferrina se une con el extremo C del FVII, en la que dicha proteína de fusión comprende además un enlazador entre el FVII y la transferrina, en la que dicho FVII es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos 95 % de homología con un polipéptido representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1, y en la que dicha transferrina es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos 95 % de homología con un polipéptido representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2.

25 De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un ADN que codifica la proteína de fusión.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, se proporciona un vector recombinante que comprende el ADN.

30 De acuerdo con un otro aspecto adicional de la presente invención, se proporciona una célula hospedadora que comprende el vector recombinante.

Efectos ventajosos de la invención

35 La proteína de fusión según la presente invención tiene una semivida *in vivo* mejorada en comparación con el FVII de tipo natural conservando al mismo tiempo una alta actividad biológica de FVII y por lo tanto puede emplearse eficazmente en la terapia que usa FVII.

Breve descripción de los dibujos

40 Los anteriores y otros objetos y características de la presente invención se harán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de la invención, cuando se tome junto con los dibujos adjuntos, que muestran respectivamente:

45 la Fig. 1 es un diagrama esquemático que muestra un procedimiento de clonación para construir un vector de expresión de FVII-Tf a partir de un vector que comprende un ADNc que codifica la secuencia de FVII y un vector que comprende un ADNc que codifica la secuencia de transferrina (Tf);

la Fig. 2 es un diagrama esquemático que muestra un procedimiento para construir un vector de expresión de FVII-GS1 (enlazador)-Tf mediante PCR solapante;

50 la Fig. 3 es un diagrama esquemático que muestra un procedimiento de construcción de vectores de expresión de FVII-enlazador de GS-Tf que comprenden GS3, GS5, GS7, GS9, GS11, GS13, GS15 o GS-I-T como un enlazador;

la Fig. 4 presenta resultados de transferencia de Western de proteínas de fusión de VII-Tf, FVII-GS1-Tf, FVII-GS3-Tf, FVII-GS5-Tf, FVII-GS7-Tf, FVII-GS9-Tf, FVII-GS11-Tf, FVII-GS13-Tf, FVII-GS15-Tf, FVII-GS1-T-Tf y FVII-Hélice-Tf de la presente invención, proteína de fusión de FVII-albúmina (FVII-Alb) y FVII (NovoSevenTM);

55 la Fig. 5 es un gráfico que muestra actividades específicas de proteínas de fusión de FVII-Tf, FVII-GS1-Tf, FVII-GS3-Tf, FVII-GS5-Tf, FVII-GS7-Tf, FVII-GS9-Tf, FVII-GS11-Tf, FVII-GS13-Tf, FVII-GS15-Tf, FVII-GS1-T-Tf y FVII-Hélice-Tf, y proteína de fusión de FVII-albúmina (FVII-Alb);

la Fig. 6 presenta la estructura de un enlazador y secuencias de reconocimiento de restricción en ambos extremos en la proteína de fusión de FVII-GS1-T-Tf; y

60 la Fig. 7 muestra resultados de transferencia de Western de proteínas de fusión de FVII-Tf, FVII-GS1-Tf, FVII-GS1-T-Tf, FVII-GS3-Tf y FVII-GS15-Tf purificadas de la presente invención, NovoSevenTM y FVII.

Mejor modo para llevar a cabo la invención

65 La presente invención proporciona una proteína de fusión que comprende factor VII (FVII) y transferrina, en la que dicha transferrina se une con el extremo C de dicho FVII, en la que dicha proteína de fusión comprende además un enlazador entre el FVII y la transferrina, en la que dicho FVII es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos

con al menos 95 % de homología con un polipéptido representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1, y en la que dicha transferrina es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos 95 % de homología con un polipéptido representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2. Más preferentemente, FVII tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1 y transferrina tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2.

FVII o transferrina usados en la proteína de fusión de la presente invención pueden ser un equivalente funcional o un derivado funcional de tipo natural del mismo que tiene una actividad funcional sustancialmente equivalente, siempre que satisfaga los requisitos de identidad de secuencia descritos anteriormente en el presente documento. Los equivalentes funcionales ejemplares incluyen mutantes inducidos por supresión, inserción o sustitución no conservativa o conservativa de cualquier resto de aminoácido, o una combinación de las mismas en secuencia de aminoácidos representadas por las SEQ ID NO: 1 y 2, respectivamente, en las que dichos cambios no alteran sustancialmente los sitios o dominios activos que proporcionan actividades biológicas a FVII.

En algunos casos, la proteína de fusión de la presente invención puede modificarse, por ejemplo, mediante fosforilación, sulfatación, acrilación, glucosilación, metilación, farnesilación, acetilación, amidación y otras, para la mejora o reducción de sus propiedades físicas o químicas y dichos derivados funcionales también quedan dentro del alcance de la presente invención siempre que la actividad biológica de FVII se conserve sustancialmente.

En la proteína de fusión de la presente invención, la transferrina se une con el extremo C del FVII. La proteína de fusión en el orden de FVII-transferrina es superior a una proteína de fusión en el orden de transferrina-FVII, probablemente debido a la exposición del extremo N del FVII (véase tabla 3).

La proteína de fusión de la presente invención puede comprender además secuencia o secuencias de reconocimiento para una enzima de restricción entre FVII y transferrina para facilitar la inserción de un enlazador como se describe posteriormente. La secuencia de reconocimiento de restricción puede ser cualquier secuencia de reconocimiento de restricción conocida por un experto habitual en la materia y puede usarse preferentemente secuencia de reconocimiento de *Agel* (A/CCGGT). En otras palabras, las proteínas de fusión, en las que la secuencia de reconocimiento de restricción está unida al extremo C de FVII y la transferrina está unida a la secuencia de reconocimiento de restricción, están incluidas dentro del alcance de la presente invención.

La presente invención proporciona una proteína de fusión que comprende un enlazador entre FVII y transferrina.

El enlazador puede tener de 1 a 100 aminoácidos, preferentemente de 1 a 75 aminoácidos, más preferentemente de 5 a 25 aminoácidos y puede ser cualquier péptido que pueda separar funcionalmente FVII y transferrina. El enlazador puede tener una estructura secundaria estable tal como una hélice u originarse de una región bisagra de IgG. Preferentemente, el enlazador puede rotar libremente en solución acuosa y no tiene una estructura fija y, por lo tanto, no sería inmunogénico y aumentaría las actividades de FVII de proteínas de fusión minimizando la interferencia potencial entre dos compañeros de fusión. Como ejemplo, dicho enlazador puede ser un enlazador helicoidal representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 11. Además, dicho enlazador flexible puede contener glicina (G) y serina (S) en un patrón repetido o aleatorio. Por ejemplo, el enlazador comprende $(GGGGS)_N$ (en el que N es un número entero comprendido entre 1 y 20) y preferentemente tiene una cualquiera del grupo que consiste en las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID NO: 3 a 11 (véase tabla 1). Además, puede usarse también cualquier secuencia de aminoácidos que no tenga menos del 80 % de homologías con el enlazador, preferentemente que no tenga menos del 85 % de homologías en la proteína de fusión de la presente invención.

Asimismo, el enlazador también puede incluir sitio o sitios de escisión de proteasa que son reconocidos por proteasa o proteasas en un tejido no lesionado. El sitio de escisión puede escindirse mediante una proteasa seleccionada entre el grupo que consiste en trombina, factor Xa, factor IXa y factor VIIa. La proteína de fusión que tiene dicho sitio de escisión de proteasa se escinde en el sitio de trabajo para producir cada proteína, es decir, FVII y transferrina, y las proteínas resultantes actúan como proteínas individuales. Preferentemente, el enlazador tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 12 (véase tabla 1).

El enlazador puede insertarse en una proteína de fusión más fácilmente mediante la secuencia de reconocimiento de enzimas de restricción que se localiza entre FVII y transferrina. En consecuencia, la secuencia de reconocimiento de enzimas de restricción puede estar presente en un extremo cualquiera o ambos extremos del enlazador y traducirse a su vez en aminoácidos codificados por la secuencia. Por ejemplo, cuando se usa la secuencia de reconocimiento de enzimas de restricción de *Agel*, Thr puede estar presente en el extremo N del enlazador y Thr-Gly puede estar presente en el extremo C del enlazador. Es decir, cuando se usa un enlazador $(GGGGS)_3$, la secuencia de reconocimiento y el enlazador pueden estar presentes en una forma de $--T(GGGGS)_3TG--$. Los aminoácidos traducidos en los extremos N y C del enlazador pueden variar dependiendo de la secuencia de reconocimiento de enzimas de restricción empleada, pero la presencia de la misma no influye en las actividades de las proteínas de fusión (véase tabla 5).

La proteína de fusión de la presente invención no muestra menos de 0,7 de la actividad específica del FVII en comparación con el FVII de tipo natural no fusionado.

En un aspecto de la presente invención, la proteína de fusión, que comprende FVII representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1 y transferrina representada por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, tiene de aproximadamente 0,82 a aproximadamente 0,92 de la actividad específica de FVII en comparación con el FVII de tipo natural no fusionado (véase tablas 2 y 3).

Además, la proteína de fusión, que comprende FVII representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1, el enlazador representado la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 3 y transferrina representada por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2, tiene aproximadamente 0,97 de la actividad específica de FVII en comparación con el FVII de tipo natural no fusionado (véase tabla 2).

Las proteínas de fusión según la presente invención, en las que se insertan otros enlazadores entre FVII y transferrina, también tienen de aproximadamente 0,74 a aproximadamente 1 de las actividades específicas de FVII en comparación con el FVII de tipo natural no fusionado (véase tabla 2).

Asimismo, la proteína de fusión de la presente invención tiene una semivida 3~4 veces más larga que la de FVII sin transferrina unida al mismo (véase tabla 6).

La presente invención también proporciona un ADN que codifica la proteína de fusión.

El ADN que codifica la proteína de fusión puede someterse a diversos cambios y modificaciones debidos a la degradación del codón o teniendo en cuenta los codones preferidos en el organismo para expresar la proteína de fusión, a no ser que la secuencia de aminoácidos de la proteína de fusión se altere sustancialmente, y los ADN modificados también se incluyen en el alcance de la presente invención. En la presente invención, el ADN que codifica la proteína de fusión puede representarse preferentemente mediante una cualquiera de las secuencias de nucleótidos de las SEQ ID NO: 13 a 24. El ADN que codifica la proteína de fusión de la presente invención puede ser proporcionado por un vector para expresar el ADN.

La presente invención proporciona un vector recombinante que comprende el ADN que codifica la proteína de fusión.

El término "vector" usado en el presente documento se refiere a un medio para introducir un ADN que codifica dicha proteína de fusión en una célula hospedadora y expresar la proteína de fusión en la misma. El vector puede incluir todos los vectores convencionales tales como vectores plasmídicos, vectores cosmídicos, vectores de bacteriófagos, vectores víricos y otros, preferentemente un vector plasmídico.

Un vector de expresión adecuado contiene elementos reguladores de la expresión tales como promotores, codones de inicio, codones de terminación, señales de poliadenilación y potenciadores, así como secuencias de señal o secuencias líder para dirección a membrana o secreción y puede prepararse de forma diversa según los fines. El codón de inicio y codón de terminación deberían actuar con seguridad en un organismo en el que se administra la construcción génica y deberían estar en fase con la secuencia codificante. Además, el vector de expresión contiene un marcador selectivo para seleccionar una célula hospedadora que contiene el vector y un origen de replicación si el vector de expresión es reproducible. El vector puede autorreplicarse o integrarse en el ADN de una célula hospedadora.

Específicamente, el vector de expresión recombinante según la presente invención puede prepararse insertando un ADN que codifica la secuencia de proteína de fusión en el vector pcDNA3.1-hygro.

Además, la presente invención proporciona una célula hospedadora que produce la proteína de fusión por transformación con dicho vector de expresión recombinante.

Ya que los niveles de expresión y modificaciones de las proteínas varían dependiendo del tipo de células hospedadoras, se prefiere elegir una célula hospedadora más adecuada para el fin. Los ejemplos de células hospedadoras incluyen células de mamífero, por ejemplo, células de ovario de hámster chino (CHO), células de riñón embrionario humano (HEK293), células de riñón de hámster (BHK 21), células de cáncer de hígado humano (Hep G2) y otros, pero no están limitados a los mismos.

Para transformar una célula hospedadora con el vector de expresión recombinante según la presente invención, puede emplearse cualquier método conocido por los expertos habituales en la materia y el ejemplo de dicho método incluye, pero sin limitación, electroporación, fusión de protoplastos, precipitación con fosfato de calcio (CaPO₄), precipitación con cloruro de calcio (CaCl₂) y otros.

Modo para la invención

Los ejemplos siguientes se proporcionan con fines ilustrativos únicamente y no se pretende que limiten el alcance de la presente invención.

Ejemplo 1: Preparación de vector plasmídico del factor VII (FVII) (pcDNA3.1-hygro-FVII)

Se usó ARN total purificado a partir de células Hep G2 (KCLB N.º 88065) como un molde para transcripción inversa. El transcrito de ADN complementario (ADNc) se amplificó mediante PCR usando cebadores específicos del gen del FVII, FVII-F y FVII-R (SEQ ID NO: 25 y 26) para obtener la fase abierta de lectura del gen del FVII humano. La PCR se realizó tratando 50 µl de solución de reacción (0,5 µl de ADNc, 0,4 µM (10 pmol/µl) de cebadores de las SEQ ID NO: 25 y 26, 0,2 mM de dNTP, 5 unidades de ADN polimerasa Taq y agua) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 94 °C durante 5 min, 35 ciclos de amplificación a 94 °C durante 1 min, a 60 °C durante 1 min y a 72 °C durante 2,5 min y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 5 min. El producto de PCR purificado se clonó en el vector pGEM-T easy (Promega, Cat n.º: A1360). Los clones positivos se seleccionaron por digestión de restricción usando *EcoRI* y *NcoI*. Los clones seleccionados se verificaron adicionalmente por secuenciación de ADN. Para transferir la ORF del FVII (FVII-ORF) a un vector de expresión, FVII-ORF escindido con *NotI* se hizo romo mediante ADN polimerasa T4 y se ligó con el vector pcDNA3.1-hygro (Invitrogen) digerido con *HindIII/XbaI* y se hizo romo. El vector ligado se confirmó mediante digestión de restricción con *Apal*, *XbaI*, *EcoRI*, *NcoI*, *RstI* y secuenciación de ADN. Este vector se designó 'pcDNA3.1-hygro-FVII'.

Ejemplo 2: Construcción del vector de expresión de FVII-Tf (pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf)

Se fusionó ADNc del FVII preparado en el ejemplo 1 con ADNc de transferrina humana (Tf) para expresar como un único zimógeno en una célula animal. Se obtuvo ADNc de transferrina humana de Origene (Cat n.º: SC322130) y se verificó si es igual a la secuencia del n.º de referencia de GenBank: NM_001063.2. Los cebadores usados en la fusión se diseñaron para retirar el codón de terminación del FVII y el péptido de señal de la transferrina. Para facilitar la inserción de los diversos tamaños de enlazadores entre el FVII y la Tf, el sitio *Agel* (ACCGGT), que se traducirá a treonina (Thr) y glicina (Gly), se añadió a los cebadores de enlace. La proteína de fusión resultante tendría la siguiente estructura: (péptido líder)-(FVII maduro)-(Thr-Gly)-(Tf madura) (en la que el péptido líder consiste en un péptido de señal (prepéptido) no presente en el FVII maduro y un propéptido para escindir por una enzima de procesamiento, que está compuesta de 38 aminoácidos y corresponde a aminoácidos que varían de las posiciones 1 a 38 en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1). Los ADNc del FVII y la Tf se amplificaron usando cebadores FVII-S1, FVII-AS1, Tf-S1 y Tf-AS1 (SEQ ID NO: 27 a 30) y se usó el vector como se describe en el ejemplo 1. Los cebadores de las SEQ ID NO: 27 y 30 contienen los sitios *NheI* y *XhoI*, respectivamente.

Una estrategia de clonación para la unión de ADNc del FVII y ADNc de la Tf se representa en la Fig. 1. En primer lugar, se amplificó ADNc del FVII a partir del vector pcDNA3.1-hygro-FVII por PCR. La PCR se realizó tratando 50 µl de solución de reacción (1 µl de molde de vector, 1 µl de un conjunto de cebadores, FVII-S1 y FVII-AS1 (10 µM), 10 µl de tampón Phusion HF 5x, 200 µM de dNTP, 0,5 µl de ADN polimerasa Phusion (FINNZYMES, n.º F-530S, 2 unidades/µl) y 35,5 µl de agua) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 30 s, 30 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 60 °C durante 45 s, y a 72 °C durante 30 s, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 7 min.

A continuación, se amplificó usando ADNc de transferrina como un molde. El procedimiento de PCR anteriormente mencionado se repitió excepto por el uso de un conjunto de cebadores (Tf-S1: 10 µM; Tf-AS1: 10 µM).

El ADNc de FVII y Tf amplificado se unieron por una serie de restricción y ligamiento. Cada ADN amplificado por PCR se digirió con *Agel* y *XhoI*, o con *NheI*. Los ADN digeridos se purificaron y se ligaron a una relación molar 1:1. El ADN ligado se subclonó en el vector pcDNA3.1-hygro vector (Invitrogen) digerido con *NheI/XhoI*. El tamaño y la secuencia del inserto se verificó adicionalmente mediante secuenciación de ADN.

Ejemplo 3: Construcción del vector de expresión FVII-enlazador GS-Tf

Como una unidad de enlazador básica se usó un péptido que consistía en 5 aminoácidos que comprendían glicina y serina. La unidad de enlazador básica comprende cuatro glicinas y una serina con la siguiente secuencia: 'GGGGS'. La unidad de enlazador básica (en lo sucesivo en el presente documento, denominada "enlazador GS-X" en la que X es el número de repeticiones de la unidad de enlazador GS básica) se utilizó para constituir los enlazadores de GS más largos. En este ejemplo, se construyeron los enlazadores que variaban de GS-1 a GS-15.

1) Construcción del vector de expresión FVII-enlazador GS-1-Tf

Se sintetizó un conjunto de cebadores, GS-FV-AS1 y GS-Tf-S1 (SEQ ID NO: 31 y 32), que contenía la unidad de enlazador GS básica y se insertó entre FVII y Tf por PCR solapante (véase Fig. 2).

El enlazador GS-1 se unió a FVII mediante PCR usando un conjunto de cebadores FVII-S1 y GS-FV-AS1 (SEQ ID NO: 27 y 31) y ADN polimerasa Phusion (FINNZYMES, n.º F-530S). La PCR se realizó tratando 50 µl de solución de reacción (1 µl de vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf, 1 µl de FVII-S1 (10 pmol/1 µl), 1 µl de GS-FV-AS1 (10 pmol/µl), 1 µl de dNTP 10 mM, 10 µl de tampón Phusion HF 5x, 35,5 µl de agua y 0,5 µl de ADN polimerasa Phusion (2 unidades/µl)) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 30 s, 35 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 64 °C durante 30 s, y a 72 °C durante 45 s, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 7 min. Al mismo tiempo,

para conectar el enlazador GS-1 con Tf, se repitió el procedimiento de PCR anterior excepto por el uso de un conjunto de cebadores GS-Tf-SI y Tf-AS1 (SEQ ID NO: 32 y 30). Los productos de PCR amplificados se utilizaron como moldes de PCR solapante. La PCR solapante se realizó tratando la solución de reacción (1 µl de productos de PCR amplificados, 1 µl de FVII-S1 (10 pmol/µl, SEQ ID NO: 27), 1 µl de cebador antisentido (Tf-AS1 10 pmol/µl, SEQ ID NO: 30), 10 µl de tampón Phusion HF 5x, 1 µl de dNTP 10 mM, 34,5 µl de agua, 0,5 µl de ADN polimerasa Phusion (2 unidades/µl)) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 1 min, 45 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 66/68 °C durante 30 s, y a 72 °C durante 45 s, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 7 min. El producto de PCR solapante amplificado se clonó en pcDNA3.1-hygro-lacZ digerido con *NheI* y *XhoI*.

2) Construcción del vector de expresión FVII-enlazador GS-3-Tf

Se sintetizó un conjunto de cebadores, GS3-S y GS3-AS (SEQ ID NO: 33 y 34), que contenían GS-3 y un sitio *Agel*. Para preparar un enlazador bicatenario GS-3, los cebadores se hibridaron calentando una mezcla (5 µl de GS3-S (100 pmol/µl), 5 µl de GS3-AS (100 pmol/µl), 2 µl de tampón de hibridación 10X (Tris-Cl 100 mM [pH 8,0], NaCl 1 M, EDTA 10 mM) y 8 µl de agua) a 98 °C durante 10 min y enfriando a 25 °C durante 1 hora. El enlazador hibridado se digirió con *Agel* y el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf preparado en el ejemplo 2 también se digirió con *Agel*. El vector digerido se trató con 1 µl de CIP (fosfatasa intestinal de ternero; NEB, n.º M0290S) a 37 °C durante 1 hora y se sometió a un procedimiento de extracción en gel (QIAGEN, n.º 28704), seguido de ligamiento a una relación molar de 1:3 (vector: inserto) usando ADN ligasa T4 (TAKARA, n.º 2011A).

3) Construcción de vectores de expresión FVII-enlazador GS-5-Tf a FVII-enlazador GS-15-Tf

Para construir un vector de expresión de proteínas de fusión que contuviera un enlazador GS-5, se implementó una nueva estrategia. Se construyeron vectores de fusión FVII-Tf que contenían enlazadores extendidos siguiendo dos etapas.

La primera etapa es la adición de un enlazador GS2 bicatenario (bc) al enlazador previamente obtenido. Después de asegurar la extensión del enlazador, el enlazador se cortó y se insertó entre los genes de FVII y Tf en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf. Por ejemplo, para extender el enlazador GS-3 al enlazador GS-5, la unidad de enlazador GS-2bc sintetizada de la SEQ ID NO: 35 se digirió con *BglII* y se ligó con el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-GS3-Tf tratado con *BamHI* y *StuI*. A continuación, después de confirmar la extensión del enlazador mediante digestión con *BamHI* y *Agel*, el enlazador extendido se cortó con *Agel* y se subclonó en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf tratado con *Agel* y CIP. Se construyeron vectores de expresión de fusión de FVII-Tf que contenían enlazadores GS-7, GS-9, GS-11, GS-13 y GS-15 mediante la misma estrategia (véase Fig. 3).

Ejemplo 4: Construcción de vector de expresión de FVII-Tf (pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-T-Tf) que contiene un enlazador que comprende un sitio de escisión de trombina

Se preparó un enlazador que contenía un sitio de escisión de trombina uniendo una unidad de GS-1 a ambos extremos de la secuencia de reconocimiento de trombina (en lo sucesivo en el presente documento, denominada "enlazador GS1-T"). El enlazador GS1bc-T de SEQ ID NO: 36 (con sentido) se diseñó y se sintetizó para contener sitios *Agel* en ambos extremos. El enlazador GS1bc -T se digirió con *Agel* y se purificó usando un kit de purificación de PCR (Qiagen, cat n.º: 28104). El enlazador purificado se ligó en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf tratado con CIP/*Agel*.

Ejemplo 5: Construcción del vector de expresión de FVII-Tf (pcDNA3.1-hygro-FVII-Hélice-Tf) que contiene un enlazador helicoidal

Se preparó un ADN de enlazador helicoidal por el método desvelado en la publicación de los Estados Unidos abierta a inspección pública N.º 2009/0170163. Se añadió un sitio *Agel* a ambos extremos del ADN de enlazador de helicoidal preparado usando cebadores, enlazador helicoidal S y enlazador helicoidal AS (SEQ ID NO: 37 y 38). Los cebadores enlazador helicoidal S y enlazador helicoidal AS se hibridaron y digirieron con *Agel*, seguido de inserción en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf con *Agel* y CIP. El vector construido se confirmó mediante secuenciación de ADN.

Ejemplo comparativo 1: Construcción del vector de expresión de fusión de FVII-albúmina (FVII-Alb)

Se construyó la proteína de fusión de FVII-albúmina desvelada en la patente de EP N.º 1816201. Se obtuvo ADNc de albúmina humana mediante RT-PCR usando ARNm de hígado humano (Clontech) como un molde y cebadores específicos de genes de albúmina, Albúmina-S y Albúmina-AS (SEQ ID NO: 39 y 40). Se realizó RT-PCR usando el kit del sistema de RT-PCR de alta fidelidad AccuScript (Cat n.º 600180) según el manual del fabricante. En primer lugar, 10 µl de solución de reacción de transcripción inversa (1 µl de tampón de transcriptasa inversa 10X, 0,6 µl de cebador de oligo-dT, 1 µl de dNTP, 0,4 µl de agua, 5 µl de ARNm de hígado humano (10 ng/µl)) se mantuvieron a 65 °C durante 5 min y a una temperatura ambiente durante 5 min, y se sometió a una reacción con 1 µl de DTT 100 mM y 1 µl de transcriptasa inversa a 42 °C durante 1 hora. Se obtuvo una secuencia de albúmina humana mediante PCR usando el ADNc sintetizado como un molde y los cebadores Albúmina-S y Albúmina-AS. La PCR se realizó tratando 50 µl de una solución de reacción (1 µl de ADNc, 10 µl de tampón Phusion HF 5x, 1 µl de cebadores Albúmina-S y Albúmina-AS, respectivamente, 1 µl de dNTP 10 mM, 0,5 µl de ADN polimerasa Phusion (FINNZYMES, n.º F-530S; 2 unidades/µl) y

35,5 µl de agua) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 1 min, 30 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 62°C durante 30 s, y a 72 °C durante 60 s, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 7 min. Los oligonucleótidos sintetizados de SEQ ID NO: 41 y 42 se hibridaron con el enlazador GS [SS(GGS)₉GS] (SEQ ID NO: 45) divulgada en la Patente de EP n.º 1816201. Para conectar el ADNc de FVII en el ejemplo 1 con el enlazador anterior, el codón de terminación de FVII en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII se reemplazó con el sitio de *XhoI* mediante mutagénesis basada en PCR usando los cebadores mut FVII(*XhoI*)-S y mut FVII(*XhoI*)-AS (SEQ ID NO: 43 y 44). Usando sitios *XhoI*/*Apal*, el enlazador GS [SS(GGS)₉GS] se fusionó con el extremo 3' de ADNc de FVII en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII. Finalmente, el ADNc de albúmina humana digerido con *Bam*HI se insertó en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-enlazador GS. El vector de expresión pcDNA3.1-hygro-FVII-enlazador GS-albúmina se verificó por secuenciación de ADN.

Las características de vectores de expresión construidos en los ejemplos 2 a 5 y el ejemplo comparativo 1 se muestran en la tabla 1.

15 Tabla 1

[Tabla 1]

Proteína de fusión de FVII	Extremo C de FVII	Secuencia de enlazador (SEQ ID NO)	Extremo N del compañero de fusión	Número de aminoácidos en el enlazador
FVII-Tf	APFP		VPDKTV	0
FVII-GS1-Tf	APFP	GGGGS (SEQ ID NO: 3)	VPDKTV	5
FVII-GS3-Tf	APFP	(GGGGS) ₃ (SEQ ID NO: 4)	VPDKTV	15
FVII-GS5-Tf	APFP	(GGGGS) ₅ (SEQ ID NO: 5)	VPDKTV	25
FVII-GS7-Tf	APFP	(GGGGS) ₇ (SEQ ID NO: 6)	VPDKTV	35
FVII-GS9-Tf	APFP	(GGGGS) ₉ (SEQ ID NO: 7)	VPDKTV	45
FVII-GS11-Tf	APFP	(GGGGS) ₁₁ (SEQ ID NO: 8)	VPDKTV	55
FVII-GS13-Tf	APFP	(GGGGS) ₁₃ (SEQ ID NO: 9)	VPDKTV	65
FVII-GS15-Tf	APFP	(GGGGS) ₁₅ (SEQ ID NO: 10)	VPDKTV	75
FVII-GS1-T-Tf	APFP	GGGSLVPRGSGGGS (SEQ ID NO: 12)	VPDKTV	15
FVII-Hélice-Tf	APFP	GA(EAAAK) ₄ A (SEQ ID NO: 11)	VPDKTV	23
FVII-Alb	APFP	SS(GGS) ₉ GS (SEQ ID NO: 45)	DAHK	31

* Para FVII-Tf, está presente Thr-Gly obtenido de *Agel*. * Para los enlazadores de las SEQ ID NO: 4 a 12, está presente Thr obtenido de *Agel* en el extremo N y está presente Thr-Gly obtenido de *Agel* en el extremo C.

20 Ejemplo experimental 1: Medición de actividades específicas de proteínas de fusión de FVII

Las proteínas de fusión de FVII construidas en los ejemplos 2 a 5 y el ejemplo comparativo 1 se expresaron en una célula CHO (CHO(VK2)) que expresa de forma estable VKORC1 (subunidad 1 del complejo de vitamina K epóxido reductasa).

25 Los vectores de expresión construidos en los ejemplos 2 a 5 y el ejemplo comparativo 1 se purificaron usando el maxi kit de plásmidos Endo-free (Qiagen, n.º 27104). Se usó β-galactosidasa como un control interno para transfección. Se sembraron células CHO (VK2) a una densidad de 1,5x10⁶ células/pocillo en placas de 6 pocillos. Las células se incubaron en α-MEM (Lonza, n.º 12-169F) complementado con FBS 10 % (Lonza, n.º 14-501F), HT 1X (Invitrogen, n.º 11067-030), L-glutamina 4 mM (Lonza, n.º 17-605E) y 200 µg/ml de higromicina (Invitrogen, n.º 10687-010) durante 24

horas, y después se transfectaron usando lipofectamine 2000 (Invitrogen) según el manual del fabricante. Cuatro horas después de la transfección, el medio se reemplazó con medio sin suero (OptiMEM) y se complementó con 5 µg/ml de vitamina K. Después de 48 horas de incubación, se tomaron muestras del medio de cultivo y se almacenó a -70 °C.

Se analizaron las proteínas de fusión de FVII con respecto a sus actividades cromogénicas y cantidades de antígeno usando el kit de ensayo del factor VII COATEST (Chromogenix, n.º 821900-63) y el kit de ELISA de FVII (Cedarlane Lab, n.º CL20030K), respectivamente. Los ensayos se realizaron según el manual del fabricante. Se usó plasma humano convencional normalizado frente al patrón de la OMS como un FVII de control en ambos ensayos. La proteína de expresión se evaluó mediante análisis de transferencia de Western. Se cargaron cantidades iguales de proteínas de fusión de FVII basándose en los resultados de ELISA. Se descubrió que las proteínas de fusión de FVII expresadas tenían los tamaños esperados sin fragmentación detectable (véase Fig. 4).

Al mismo tiempo, las actividades específicas de proteínas de fusión de FVII-transferrina fueron de 0,74 a 1, que eran mayores en comparación con la de la proteína de fusión de FVII-albúmina (0,52) (véase tabla 2). Las proteínas de fusión de FVII-transferrina que contenían enlazadores también conservaron no menos del 70 % de actividades de FVII. No hubo ninguna relación entre las longitudes de los enlazadores y las actividades específicas, pero las proteínas de fusión de FVII con enlazadores GS más cortos mostraron actividades específicas algo mayores que las proteínas de fusión con enlazadores GS más largos. En particular, las proteínas de fusión FVII-GS1-Tf y FVII-GS1-T-Tf mostraron actividades específicas (véase Fig. 5).

Tabla 2

[Tabla 2]

Proteína de fusión de FVII	Antígeno (%)	Actividad (%)	Actividad específica (actividad/antígeno)
FVII-Tf	53,2 ± 5,0	43,9 ± 0,3	0,82
FVII-GS1-Tf	53,4 ± 3,1	52,0 ± 0,5	0,97
FVII-GS3-Tf	61,9 ± 8,0	57,7 ± 0,2	0,93
FVII-GS5-Tf	69,3 ± 5,6	55,9 ± 1,4	0,81
FVII-GS7-Tf	70,9 ± 8,2	59,3 ± 1,1	0,84
FVII-GS9-Tf	64,2 ± 8,6	47,5 ± 0,7	0,74
FVII-GS11-Tf	59,1 ± 3,9	45,3 ± 0,9	0,77
FVII-GS13-Tf	59,7 ± 5,1	49,1 ± 0,8	0,82
FVII-GS15-Tf	59,2 ± 6,0	50,2 ± 0,5	0,85
FVII-GS1-T-Tf	70,8 ± 8,7	71,0 ± 2,6	1,00
FVII-Hélice-Tf	89,0 ± 5,7	78,9 ± 2,2	0,89
FVII-Alb	106,6 ± 5,4	54,9 ± 3,3	0,52

Ejemplo 6: Caracterización de proteínas de fusión de FVII según la dirección de fusión de Tf

En este ejemplo, se preparó una proteína de fusión en la que la transferrina humana (Tf) está unida al extremo N de FVII y se comparó con una proteína de fusión en la que la transferrina se une con el extremo C del FVII, para examinar el cambio de características según la dirección de fusión en proteínas de fusión. El procedimiento detallado es el siguiente.

<6-1> Construcción de vectores de expresión de Tf-FVII y Tf-GS1-T-FVII

Se diseñaron dos proteínas de fusión con Tf unida al extremo N de FVII de la siguiente manera: (1) (péptido líder de Tf)-(Tf madura)-(Thr-Gly)-(FVII maduro); y (2) (péptido líder de Tf)-(Tf madura)-(Thr)-(GS1-T; SEQ ID NO: 12)-(Thr-Gly)-(FVII maduro).

En primer lugar, para obtener una secuencia génica de Tf que contuviera un péptido líder, se diseñó un cebador directo (Nhe-Tf: SEQ ID NO: 46) para contener un sitio *NheI* con el fin de clonar y se diseñó un cebador inverso (Tf-Age: SEQ ID NO: 47) para contener un sitio *AgeI* con el fin de retirar el codón de terminación de transferrina y clonar. Para clonar el FVII maduro con el péptido líder retirado, se diseñó un cebador directo (Age-FVII: SEQ ID NO: 48) para contener un sitio *AgeI* y se diseñó un cebador inverso para contener un sitio *XhoI*.

Para el gen de Tf, se usó ADNc obtenido de Origene (Cat n.º SC322130) como en el ejemplo 2 como un molde de PCR. La PCR se realizó tratando 50 µl de una solución de reacción (1 µl de molde de vector, 2 µl de cebadores *Nhe*-Tf y Tf-*AgeI* (10 µM), 10 µl de tampón Phusion HF 5x, 1 µl de dNTP 10 mM, 0,5 µl de ADN polimerasa Phusion (FINNZYMES, n.º F-530S, 2 unidades/µl) y 33,5 µl de agua) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 30 s, 25 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 70 °C durante 30 s, y a 72 °C durante 36 s, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 10 min. FVII se amplificó mediante PCR usando un vector pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-T-Tf como un molde como en el ejemplo 4. Las condiciones de PCR fueron iguales que las condiciones de PCR de Tf anteriores, excepto por el uso de cebadores Age-FVII (10 µM) y VH-*Xho* (10 µM).

El gen de Tf amplificado se insertó en el vector pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-T-Tf usando *NheI/Agel* para obtener el vector pcDNA3.1-hygro-Tf-Tf. El vector de pcDNA3.1-hygro-Tf-Tf y el producto de PCR de FVII se digirieron con *Agel/XhoI* y se ligaron para construir un vector de expresión que contenía la proteína de fusión pcDNA3.1-hygro-Tf-FVII. El vector de expresión pcDNA3.1-hygro-Tf-GS1-T-FVII se construyó insertando la secuencia de GS1bc-T sintetizada en el ejemplo 4 mediante *Agel*. Los vectores de expresión construidos se confirmaron por mapeo de restricción y secuenciación de ADN.

<6-2> Expresión de proteínas de fusión y caracterización

Para caracterizar las proteínas de fusión con Tf unida al extremo N de FVII, los vectores de expresión de las mismas, es decir, pcDNA3.1-hygro-FVII-Tf, pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-Tf-VII, pcDNA3.1-hygro-Tf-FVII y pcDNA3.1-hygro-Tf-GS1-T-FVII, se expresaron de forma transitoria en células CHO.

Los cuatro ADN plasmídicos construidos se aislaron usando el kit de maxipre Endo-free (Qiagen). Un día antes de la transfección, se aislaron células CHO (DG44) cultivadas en matraces T75 mediante tripsina y se sembraron a una densidad de $1,5 \times 10^6$ células/pocillo en placas de 6 pocillos. Después de 24 horas, las células se transfectaron según el manual del fabricante.

Cuatro horas después de la transfección, el medio en cada pocillo se retiró y se reemplazó con 2 ml de un medio de cultivo complementado con 5 µg/ml de vitamina K. Después de la transfección, la placa de 6 pocillos se incubó en un incubador de CO₂ 5 %, a 37 °C, y, después de 48 horas, se recogió el medio. El sobrenadante recogido se transfirió a tubos de 1,5 ml y se almacenó a -70 °C para ensayo cromogénico y ELISA de FVII. La placa con el medio retirado se lavó con 2 ml de HBSS por cada pocillo y se lisó con 250 µl de una solución de lisis (Tropix, n.º ABX210LM, adición de DTT 1 mM), seguido de almacenamiento a -70 °C para ensayo de β-galactosidasa.

El ensayo cromogénico y ELISA de FVII se realizaron como en el ejemplo experimental 1. Se prepararon muestras para análisis descongelando el medio almacenado congelado después de la transfección justo antes del experimento y obteniendo el sobrenadante mediante centrifugación. Se usó plasma humano (Dade Behring, n.º ORKL13, Lote n.º 503216F) como un patrón en el ensayo.

Los resultados de la medición se muestran en la tabla 3. Para Tf-FVII y Tf-GS1-T-Tf con Tf unida al extremo N del FVII, no se midieron actividades a diferencia de FVII-Tf y FVII-GS1-T-Tf con Tf unido al extremo C del FVII. Además, se detectaron cantidades bajas de proteínas de fusión con Tf unida al extremo N en ELISA del FVII. Sin embargo, las proteínas de fusión mostraron sensibilidades de detección similares, independientemente de las direcciones de fusión, en resultados de transferencia de Western usando anticuerpos policlonales de Tf. Estos resultados indican que, cuando Tf está unida al extremo N del FVII, se generaron proteínas de fusión sin actividades de FVII, incluso aunque se realizaran normalmente traducciones de aminoácidos.

Tabla 3

[Tabla 3]

Proteína de fusión	Actividad de FVII (%)	Antígeno de FVII (%)	Actividad específica (actividad/antígeno)
FVII-Tf	33,8 ± 0,73	37,0 ± 2,17	0,92
Tf-FVII	no detectado	8,0 ± 1,51	-
FVII-GS-I-T-Tf	46,6 ± 0,29	43,0 ± 4,75	1,08

Proteína de fusión	Actividad de FVII (%)	Antígeno de FVII (%)	Actividad específica (actividad/antígeno)
Tf-GS-I-T-Tf	no detectado	13,5 ± 1,01	-

Ejemplo 7: Caracterización de proteínas de fusión según la supresión de secuencias de reconocimiento de enzimas de restricción usadas en la fusión

5 En el ejemplo 2, se usaron secuencias de reconocimiento de enzimas de restricción (*Agel*) para facilitar la inserción de diversos enlazadores entre FVII y Tf. Como consecuencia, algunas proteínas de fusión llegaron a tener Thr y Gly que están codificadas por la enzima de restricción anterior, en ambos extremos de los enlazadores. En este ejemplo, se examinó si las propiedades de proteínas de fusión son alteradas o no por la presencia de la secuencia de reconocimiento de enzimas de restricción (*Agel*).

10 Las secuencias de reconocimiento de enzimas de restricción se suprimieron de la proteína de fusión FVII-GS1-T-Tf que contenía enlazador GS1-T, mediante mutagénesis dirigida basada en PCR usando cebadores mutagénicos. Como se muestra en la Fig. 6, este experimento se diseñó para suprimir "Thr" en el extremo N y "Thr-Gly" en el extremo C y se enumeran cebadores usados en el experimento en la tabla 4.

15 Tabla 4

[Tabla 4]

Cebador	Secuencia (5'→3')	SEQ ID NO
TG del-S	CAG CGG AGG CGG TTC AGT CCC TGA TAA AACTG	50
TG del-AS	CAG TTT TAT CAG GGA CTG AAC CGC CTC CGC TG	51
T del-S	CGA GCC CCA TTT CCC GGT GGA GGC GGA TC	52
T del-AS	GAT CCG CCT CCA CCG GGA AAT GGG GCT CG	53

20 <7-1> Supresión de Thr-Gly

Se realizó mutagénesis basada en PCR. La PCR se realizó tratando una solución de reacción (1 µl de vector pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-T-Tf, 0,2 µl de cebador con sentido (TG del-S 10 µM), 0,2 µl de cebador antisentido (TG del-AS 10 µM), 1 µl de dNTP 10 mM, 4 µl de tampón de PCR 5X, 14 µl de agua y 0,2 µl de ADN polimerasa Phusion (FINNZYMES, # F-530S)) en la siguiente condición: 1 ciclo de desnaturalización a 98 °C durante 30 s, 18 ciclos de amplificación a 98 °C durante 10 s, a 58 °C durante 30 s, y a 72 °C durante 3 min, y 1 ciclo de extensión final a 72 °C durante 7 min. Para retirar el ADN molde original, el producto de PCR amplificado se trató con 1 µl de *DpnI* (NEB, n.º R0176S) y se incubó a 37 °C durante 1 hora. Se transformaron 50 µl de célula HIT competente (DH5α, RH617) usando 10 µl del ADN tratado con *DpnI* y se incubaron en un medio sólido de LB+amp (10 mg/ml) durante una noche. Se analizaron cuatro clones obtenidos de este modo mediante secuenciación de ADN y se verificaron dos clones como mutantes.

<7-2> Supresión de Thr

35 Para suprimir Thr, se realizó un método similar al del ejemplo <7-1> usando diferentes cebadores. Brevemente, se realizó mutagénesis basada en PCR usando, como molde, 1 µl de ADN plasmídico de los clones en los que la mutación se confirmó en el ejemplo <7-1> y 1 µl de cebador con sentido (T del-S; 10 pmol) y 1 µl de cebador antisentido (T del-AS; 10 pmol), en la misma condición. Por secuenciación de ADN de cuatro clones que se seleccionaron, se confirmó que tres clones tenían mutaciones. El vector de expresión obtenido se denominó "pcDNA3.1-hygro-FVII-GS1-T-Tf(M3)".

<7-3> Caracterización de proteínas de fusión con secuencias de reconocimiento de enzimas de restricción suprimidas

45 Se transfectaron células CHO con vectores de expresión FVII-GS1-T-Tf y FVII-GS1-T-Tf(M3) y vector de expresión FVII-Alb como un control, y se obtuvieron los sobrenadantes del medio. Los sobrenadantes obtenidos se sometieron a un ensayo cromogénico de FVII (Chromogenix) y ELISA de FVII (cedarlane) para verificar el cambio en la relación de actividad/antígeno. Como se muestra en la tabla 5, las cantidades de antígenos y actividades de proteínas de fusión FVII-GS1-T-Tf y FVII-GS1-T-Tf(M3) fueron casi iguales entre sí y las relaciones (actividades específicas) tampoco variaron. Además, se confirmó que las actividades específicas eran significativamente mayores que la de la proteína de fusión FVII-Alb.

Tabla 5

[Tabla 5]

	Antígeno de FVII (%)	Actividad de FVII (%)	Actividad específica (actividad/antígeno)
FVII-GS1-T-Tf	34,1 ± 2,1	39,6 ± 2,2	1,16
FVII-GS1-T-Tf(M3)	33,5 ± 4,7	38,0 ± 0,7	1,14
FVII-Alb	50,1 ± 1,2	26,3 ± 0,8	0,53

5 Ejemplo 8: Medición de la semivida de proteínas de fusión

Para examinar el aumento de la semivida en las proteínas de fusión según la presente invención, FVII-Tf, FVII-GS1-Tf, FVII-GS3-Tf, FVII-GS15-Tf y FVII-GS1-T-Tf se usaron como grupos experimentales y FVII de tipo silvestre y FVIIa disponible en el mercado (NovoSeven®; Novo Nordisk) se usaron como grupos de control.

10

<8-1> Preparación de muestras

1) Obtener medio de expresión

15

La proteína de FVII de tipo silvestre y cinco proteínas de fusión de FVII fusionadas con Tf se expresaron en la línea celular CHO-S FreeStyle™ (Invitrogen, Cat. n.º R800-07). Las células CHO-S se cultivaron en suspensión en un matraz de agitación con medio de expresión de CHO freestyle complementado con L-glu 8 mM (GIBCO, L-glutamina 200 mM (100X), Cat. N.º 25030-081). Las células cultivadas se sembraron a una densidad de 4×10^5 células/ml 24 horas antes de la transfección y se transfectaron cuando la densidad llegó a 1×10^6 células/ml.

20

Los ADN usados en la transfección se prepararon usando el kit de maxi prep Endo-free (QIAGEN, Cat. N.º 12362) o kit de mega prep plasmídico Endo-free (QIAGEN, 12381), y la transfección se realizó en referencia al protocolo de transfección de reactivo FreeStyle MAX (Invitrogen, Cat. N.º 16447-100). Se añadieron 500 µg de ADN a 8 ml de OptiPRO SFM (Invitrogen, Cat. N.º 12309-019) y se mezclaron. A otro tubo, se añadieron 8 ml de OptiPRO SFM (Invitrogen, Cat. N.º 12309-019) y 500 µl de reactivo FreeStyle Max, y después los dos anteriores se mezclaron lentamente y se almacenaron a temperatura ambiente durante 10 min. Después de 10 min, se transfectaron células CHO-S FreeStyle™ con la mezcla. Las células transfectadas se cultivaron en un incubador de CO₂ 5 %, a 37 °C, durante 3~5 días y después se obtuvo el sobrenadante.

25

2) Purificación del medio de expresión

30

El medio obtenido por un cultivo de matraz de agitación se filtró a través de un filtro de 0,22 µm (Corning) para retirar las células y los residuos restantes. El medio filtrado se concentró 10 veces por ultrafiltración usando membrana de flujo tangencial (satorius, 30 KDa). El medio concentrado se aplicó a una columna XK16/20 (GE healthcare) cargada con resina de hidroxapatita cerámica (BIO-RAD, 157-0040). La columna de hidroxapatita cerámica se equilibró con más de 10 volúmenes de columna de tampón de equilibrado (imidazol 25 mM, Tween 80 0,02 % y NaCl 150 mM, pH 6,5). Después de cargar el medio concentrado, la columna se lavó con el tampón de equilibrado y tampón de lavado-1 (imidazol 25 mM, Tween 80 0,02 %, fosfato de sodio 100 mM, pH 6,3) y tampón de lavado-2 (imidazol 25 mM, Tween 80 0,02 %, fosfato de sodio 100 mM, NaCl 1 M, pH 6,3). Tras el lavado, la proteína de fusión capturada en la columna se eluyó con un tampón de elución (imidazol 25 mM, Tween 80 0,02 %, fosfato de sodio 500 mM, pH 6,3). La proteína eluida se analizó mediante ensayo cromogénico de FVII, ensayo de ELISA de FVII y SDS-PAGE/transferencia de Western.

35

40

<8-2> Ensayo de transferencia de Western

45

Se confirmó que las proteínas de fusión de FVII y FVII/Tf purificadas parcialmente mediante columnas de dos etapas tenían 45 % o más de purezas por SDS-PAGE/tinción con azul de Coomassie. La presencia de fragmentos obtenidos de FVII en las proteínas purificadas se evaluó por transferencia de Western, ya que los FVII fragmentados en proteínas de fusión purificadas podrían tener semivida más corta que la proteína de fusión de FVII intacta y producir un error en la determinación de la semivida de cada proteína de fusión de FVII. NovoSeven® (Novo Nordisk, 1,2 mg/vial, 60 KUI) y las muestras purificadas se prepararon a 0,1 UI (actividad de FVII)/10 µl, y después se realizó SDS-PAGE usando gel bis-Tri 4-12 % NuPage (Invitrogen). Después de finalizar la electroforesis, el gel se transfirió a una membrana de PVDF y la membrana se bloqueó a temperatura ambiente durante 1 hora añadiendo 10 ml de tampón de bloqueo (Tris 25 mM, NaCl 150 mM (pH 7,2), leche desnatada al 5 % y Tween 80 0,1 %). La solución de bloqueo se decantó y se añadieron 10 ml (leche desnatada al 5 % en PBS-T) de anticuerpo anti FVII (Cat. N.º F8146, Sigma) o anticuerpo antitransferrina (sc52256, santa cruz) a una relación de 1:5000 y 1:500, y se incubó durante 1 hora en un agitador oscilante. La membrana se lavó cuatro veces con una solución de lavado (Tris 25 mM, NaCl 150 mM, pH 7,2) y se incubó durante 1 hora en 10 ml (leche desnatada al 5 % en PBS-T) de solución en la que se había añadido anticuerpo

50

55

de cabra anti IgG de ratón-HRP (Cat. No. G21040, Invitrogen) como un anticuerpo secundario a una relación de 1:50.000. Después de lavarse la membrana cuatro veces con una solución de lavado (Tris 25 mM, NaCl 150 mM, pH 7.2), se añadieron 2 ml de mezcla Femto de west Super-signal (Thermo) a ella durante 5 min. Tras finalizar la reacción, se reveló la película.

5 Los resultados de transferencia de Western se muestran en la Fig. 7. Como se muestra en la Fig. 7, no se detectaron fragmentos obtenidos de FVII en las proteínas purificadas. No se detectaron transferrinas fragmentadas en la mancha de transferencia explorada mediante anticuerpo antitransferrina.

10 <8-3> Medición de la semivida

Las semividas de la proteína de fusión que no tienen ningún enlazador, las proteínas de fusión que tienen cuatro enlazadores (GS1, GS1-T, GS3 y GS15), y un FVII de tipo silvestre expresado y purificado en la misma condición y un NovoSeven disponible en el mercado como controles se midieron y se compararon entre sí en ratas. El análisis cuantitativo de la cantidad de FVII en muestras para administrar y muestras recogidas de un experimento animal se realizó mediante ELISA de FVII humano (Cedarlane, anticuerpos emparejados para ELISA de factor VII, n.º CL20030K), según las instrucciones del fabricante. Las concentraciones de muestras para administrar se determinaron promediando los valores de tres diluciones diferentes de una muestra. La solución de dilución de administración (NaCl 3 mg/ml, CaCl₂ dihidrato 1,5 mg/ml, glicilglicina 1,3 mg/ml, polisorbato 80 0,1 mg/ml y manitol 30 mg/ml, pH 5,5) se usó como un diluyente. Después de la cuantificación de ELISA de FVII, cada proteína se diluyó con la solución de dilución de administración y la muestra diluida se administró por vía intravenosa a ratas (250~300 g de Sprague Dawley, tres ratas por grupo) a través de la vena de la cola a 150 UI/kg basándose en los pesos de las ratas medidos el día del experimento. Las sangres se tomaron en un total de once puntos temporales, es decir, 0 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 1,5 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas y 24 horas después de la administración del fármaco. Se mezclaron 225 µl de la sangre y 25 µl de citrato de sodio 3,2 % y se centrifugaron a 4 °C y 13.000 rpm durante 1 min, seguido de almacenamiento del sobrenadante a -70 °C. Se analizó plasma de rata mediante dilución de 1/50 o 1/100 con un tampón de lavado usado en un kit de ELISA de FVII (cedarlane). Se obtuvo una curva de regresión representando el logaritmo de la concentración de antígeno de FVII humano frente a los puntos temporales de toma de muestras. La semivida de cada FVII se determinó calculando a partir de la fórmula 'semivida = ln2 / pendiente de curva de regresión'. Como se muestra en la tabla 6, las proteínas de fusión de la presente invención mostraron una semivida mejorada 3~4 veces en comparación con el FVII de tipo silvestre.

Tabla 6

35

[Tabla 6]

Tipo	Semivida (min)
FVII-GS1-Tf	254,2 ± 19,1
FVII-GS3-Tf	227,4 ± 23,5
FVII-GS1-T-Tf	235,4 ± 27,4
FVII-GS15-Tf	257,0 ± 23,9
FVII-Tf	277,0 ± 24,5
NovoSeven	80,3 ± 27,4
FVII de tipo natural	59,6 ± 2,9

<110> SK CHEMICALS CO., LTD.

<120> Proteína de fusión que tiene actividad del factor VII

40

<130> PCB105030

<150> KR 10-2010-0052719

<151> 04-06-2010

45

<160> 53

<170> KopatentIn 1.71

ES 2 676 874 T3

<210> 1
 <211> 444
 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*

5

<220>
 <221> PÉPTIDO
 <222> (1)..(444)
 <223> Proteína del factor VII

10

<400> 1
 Met Val Ser Gln Ala Leu Arg Leu Leu Cys Leu Leu Leu Gly Leu Gln
 1 5 10 15
 Gly Cys Leu Ala Ala Val Phe Val Thr Gln Glu Glu Ala His Gly Val
 20 25 30
 Leu His Arg Arg Arg Arg Ala Asn Ala Phe Leu Glu Glu Leu Arg Pro
 35 40 45
 Gly Ser Leu Glu Arg Glu Cys Lys Glu Glu Gln Cys Ser Phe Glu Glu
 50 55 60
 Ala Arg Glu Ile Phe Lys Asp Ala Glu Arg Thr Lys Leu Phe Trp Ile
 65 70 75 80
 Ser Tyr Ser Asp Gly Asp Gln Cys Ala Ser Ser Pro Cys Gln Asn Gly
 85 90 95
 Gly Ser Cys Lys Asp Gln Leu Gln Ser Tyr Ile Cys Phe Cys Leu Pro
 100 105 110
 Ala Phe Glu Gly Arg Asn Cys Glu Thr His Lys Asp Asp Gln Leu Ile
 115 120 125
 Cys Val Asn Glu Asn Gly Gly Cys Glu Gln Tyr Cys Ser Asp His Thr
 130 135 140
 Gly Thr Lys Arg Ser Cys Arg Cys His Glu Gly Tyr Ser Leu Leu Ala
 145 150 155 160
 Asp Gly Val Ser Cys Thr Pro Thr Val Glu Tyr Pro Cys Gly Lys Ile
 165 170 175
 Pro Ile Leu Glu Lys Arg Asn Ala Ser Lys Pro Gln Gly Arg Ile Val
 180 185 190
 Gly Gly Lys Val Cys Pro Lys Gly Glu Cys Pro Trp Gln Val Leu Leu
 195 200 205

ES 2 676 874 T3

Leu Val Asn Gly Ala Gln Leu Cys Gly Gly Thr Leu Ile Asn Thr Ile
 210 215 220
 Trp Val Val Ser Ala Ala His Cys Phe Asp Lys Ile Lys Asn Trp Arg
 225 230 235 240
 Asn Leu Ile Ala Val Leu Gly Glu His Asp Leu Ser Glu His Asp Gly
 245 250 255
 Asp Glu Gln Ser Arg Arg Val Ala Gln Val Ile Ile Pro Ser Thr Tyr
 260 265 270
 Val Pro Gly Thr Thr Asn His Asp Ile Ala Leu Leu Arg Leu His Gln
 275 280 285
 Pro Val Val Leu Thr Asp His Val Val Pro Leu Cys Leu Pro Glu Arg
 290 295 300
 Thr Phe Ser Glu Arg Thr Leu Ala Phe Val Arg Phe Ser Leu Val Ser
 305 310 315 320
 Gly Trp Gly Gln Leu Leu Asp Arg Gly Ala Thr Ala Leu Glu Leu Met
 325 330 335
 Val Leu Asn Val Pro Arg Leu Met Thr Gln Asp Cys Leu Gln Gln Ser
 340 345 350
 Arg Lys Val Gly Asp Ser Pro Asn Ile Thr Glu Tyr Met Phe Cys Ala
 355 360 365
 Gly Tyr Ser Asp Gly Ser Lys Asp Ser Cys Lys Gly Asp Ser Gly Gly
 370 375 380
 Pro His Ala Thr His Tyr Arg Gly Thr Trp Tyr Leu Thr Gly Ile Val
 385 390 395 400
 Ser Trp Gly Gln Gly Cys Ala Thr Val Gly His Phe Gly Val Tyr Thr
 405 410 415
 Arg Val Ser Gln Tyr Ile Glu Trp Leu Gln Lys Leu Met Arg Ser Glu
 420 425 430
 Pro Arg Pro Gly Val Leu Leu Arg Ala Pro Phe Pro
 435 440

<210> 2
 <211> 679
 <212> PRT
 <213> *Homo sapiens*

5

<220>
 <221> PÉPTIDO
 <222> (1)..(679)
 <223> Proteína de transferrina

10

<400> 2

ES 2 676 874 T3

Val Pro Asp Lys Thr Val Arg Trp Cys Ala Val Ser Glu His Glu Ala
1 5 10 15
Thr Lys Cys Gln Ser Phe Arg Asp His Met Lys Ser Val Ile Pro Ser
20 25 30
Asp Gly Pro Ser Val Ala Cys Val Lys Lys Ala Ser Tyr Leu Asp Cys
35 40 45

ES 2 676 874 T3

Ile Arg Ala Ile Ala Ala Asn Glu Ala Asp Ala Val Thr Leu Asp Ala
50 55 60

Gly Leu Val Tyr Asp Ala Tyr Leu Ala Pro Asn Asn Leu Lys Pro Val
65 70 75 80

Val Ala Glu Phe Tyr Gly Ser Lys Glu Asp Pro Gln Thr Phe Tyr Tyr
85 90 95

Ala Val Ala Val Val Lys Lys Asp Ser Gly Phe Gln Met Asn Gln Leu
100 105 110

Arg Gly Lys Lys Ser Cys His Thr Gly Leu Gly Arg Ser Ala Gly Trp
115 120 125

Asn Ile Pro Ile Gly Leu Leu Tyr Cys Asp Leu Pro Glu Pro Arg Lys
130 135 140

Pro Leu Glu Lys Ala Val Ala Asn Phe Phe Ser Gly Ser Cys Ala Pro
145 150 155 160

Cys Ala Asp Gly Thr Asp Phe Pro Gln Leu Cys Gln Leu Cys Pro Gly
165 170 175

Cys Gly Cys Ser Thr Leu Asn Gln Tyr Phe Gly Tyr Ser Gly Ala Phe
180 185 190

Lys Cys Leu Lys Asp Gly Ala Gly Asp Val Ala Phe Val Lys His Ser
195 200 205

Thr Ile Phe Glu Asn Leu Ala Asn Lys Ala Asp Arg Asp Gln Tyr Glu
210 215 220

Leu Leu Cys Leu Asp Asn Thr Arg Lys Pro Val Asp Glu Tyr Lys Asp
225 230 235 240

Cys His Leu Ala Gln Val Pro Ser His Thr Val Val Ala Arg Ser Met
245 250 255

Gly Gly Lys Glu Asp Leu Ile Trp Glu Leu Leu Asn Gln Ala Gln Glu
260 265 270

His Phe Gly Lys Asp Lys Ser Lys Glu Phe Gln Leu Phe Ser Ser Pro
275 280 285

His Gly Lys Asp Leu Leu Phe Lys Asp Ser Ala His Gly Phe Leu Lys
290 295 300

Val Pro Pro Arg Met Asp Ala Lys Met Tyr Leu Gly Tyr Glu Tyr Val
305 310 315 320

Thr Ala Ile Arg Asn Leu Arg Glu Gly Thr Cys Pro Glu Ala Pro Thr
325 330 335

Asp Glu Cys Lys Pro Val Lys Trp Cys Ala Leu Ser His His Glu Arg
340 345 350

Leu Lys Cys Asp Glu Trp Ser Val Asn Ser Val Gly Lys Ile Glu Cys
355 360 365

Val Ser Ala Glu Thr Thr Glu Asp Cys Ile Ala Lys Ile Met Asn Gly
370 375 380

ES 2 676 874 T3

Glu Ala Asp Ala Met Ser Leu Asp Gly Gly Phe Val Tyr Ile Ala Gly
 385 390 395 400
 Lys Cys Gly Leu Val Pro Val Leu Ala Glu Asn Tyr Asn Lys Ser Asp
 405 410 415
 Asn Cys Glu Asp Thr Pro Glu Ala Gly Tyr Phe Ala Val Ala Val Val
 420 425 430
 Lys Lys Ser Ala Ser Asp Leu Thr Trp Asp Asn Leu Lys Gly Lys Lys
 435 440 445
 Ser Cys His Thr Ala Val Gly Arg Thr Ala Gly Trp Asn Ile Pro Met
 450 455 460
 Gly Leu Leu Tyr Asn Lys Ile Asn His Cys Arg Phe Asp Glu Phe Phe
 465 470 475 480
 Ser Glu Gly Cys Ala Pro Gly Ser Lys Lys Asp Ser Ser Leu Cys Lys
 485 490 495
 Leu Cys Met Gly Ser Gly Leu Asn Leu Cys Glu Pro Asn Asn Lys Glu
 500 505 510
 Gly Tyr Tyr Gly Tyr Thr Gly Ala Phe Arg Cys Leu Val Glu Lys Gly
 515 520 525
 Asp Val Ala Phe Val Lys His Gln Thr Val Pro Gln Asn Thr Gly Gly
 530 535 540
 Lys Asn Pro Asp Pro Trp Ala Lys Asn Leu Asn Glu Lys Asp Tyr Glu
 545 550 555 560
 Leu Leu Cys Leu Asp Gly Thr Arg Lys Pro Val Glu Glu Tyr Ala Asn
 565 570 575
 Cys His Leu Ala Arg Ala Pro Asn His Ala Val Val Thr Arg Lys Asp
 580 585 590
 Lys Glu Ala Cys Val His Lys Ile Leu Arg Gln Gln Gln His Leu Phe
 595 600 605
 Gly Ser Asn Val Thr Asp Cys Ser Gly Asn Phe Cys Leu Phe Arg Ser
 610 615 620
 Glu Thr Lys Asp Leu Leu Phe Arg Asp Asp Thr Val Cys Leu Ala Lys
 625 630 635 640
 Leu His Asp Arg Asn Thr Tyr Glu Lys Tyr Leu Gly Glu Glu Tyr Val
 645 650 655
 Lys Ala Val Gly Asn Leu Arg Lys Cys Ser Thr Ser Ser Leu Leu Glu
 660 665 670
 Ala Cys Thr Phe Arg Arg Pro
 675

<210> 3
 <211> 5
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Enlazador GS-1

ES 2 676 874 T3

<400> 3

Gly Gly Gly Gly Ser
1 5

5 <210> 4
<211> 15
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

10 <220>
<223> Enlazador GS-3

<400> 4

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
1 5 10 15

15 <210> 5
<211> 25
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

20 <220>
<223> Enlazador GS-5

<400> 5

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15

Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
20 25

25 <210> 6
<211> 35
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

30 <220>
<223> Enlazador GS-7

35 <400> 6

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15

Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
20 25 30

Gly Gly Ser
35

40 <210> 7
<211> 45
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Enlazador GS-9

45 <400> 7

ES 2 676 874 T3

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15
Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
20 25 30
Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
35 40 45

5 <210> 8
<211> 55
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

10 <220>
<223> Enlazador GS-11

<400> 8
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15
Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
20 25 30
Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
35 40 45
Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
50 55

15 <210> 9
<211> 65
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

20 <220>
<223> Enlazador GS-13

<400> 9
Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
1 5 10 15
Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
20 25 30
Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
35 40 45
Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly
50 55 60
Ser
65

25 <210> 10
<211> 75
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

30 <220>
<223> Enlazador GS-15

ES 2 676 874 T3

<400> 10
 Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly
 1 5 10 15
 Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly
 20 25 30
 Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly
 35 40 45
 Gly Ser Gly Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly
 50 55 60
 Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
 65 70 75

5 <210> 11
 <211> 23
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

10 <220>
 <223> Enlazador helicoidal

<400> 11
 Gly Ala Glu Ala Ala Ala Lys Glu Ala Ala Ala Lys Glu Ala Ala Ala
 1 5 10 15
 Lys Glu Ala Ala Ala Lys Ala
 20

15 <210> 12
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

20 <220>
 <223> Enlazador GS1-T

<400> 12
 Gly Gly Gly Gly Ser Leu Val Pro Arg Gly Ser Gly Gly Gly Ser
 1 5 10 15

25 <210> 13
 <211> 3378
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

30 <220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-Tf

<400> 13

ES 2 676 874 T3

atggtctccc aggccctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccaggga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcgccaac 120
 gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
 tccttcgagg aggccgggga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctccctgcaag 300
 gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
 agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cgggtgccacg aggggtactc tctgctggca 480
 gacgggggtg cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
 aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaaggtgtg ccccaaaggg 600
 gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cgggtgctggg cgagcacgac ctccagcagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgcaggtcat catcccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
 ccccggtgta tgaccaggga ctgcctgcag cagtacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgctc aaccgtggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgctc tcagagccac gccaggagt cctcctgcga 1320
 gccccatttc ccaccggtgt ccctgataaa actgtgagat ggtgtgcagt gtcggagcat 1380
 gaggccacta agtgccagag tttccgcgac catatgaaaa gcgtcattcc atccgatggt 1440
 cccagtgttg cttgtgtgaa gaaagcctcc taccttgatt gcatcagggc cattgcggca 1500
 aacgaagcgg atgctgtgac actggatgca ggtttggtgt atgatgctta cctggctccc 1560
 aataacctga agcctgtggt ggcagagttc tatgggtcaa aagaggatcc acagactttc 1620
 tattatgctg ttgctgtggt gaagaaggat agtggcttcc agatgaacca gcttcgaggc 1680
 aagaagtcct gccacacggg tctaggcagg tccgctgggt ggaacatccc cataggctta 1740
 ctttactgtg acttacctga gccacgtaaa cctcttgaga aagcagtggc caatttcttc 1800
 tcgggcagct gtgccccttg tgccgatggg acggacttcc cccagctgtg tcaactgtgt 1860
 ccaggggtgt gctgctccac ccttaaccaa tacttcggct actcaggagc cttcaagtgt 1920
 ctgaaggatg gtgctgggga tgtggccttt gtcaagcact cgactatatt tgagaacttg 1980

ES 2 676 874 T3

gcaaacaagg ctgacagggga ccagtatgag ctgctttgcc tggacaacac cgggaagccg 2040
 gtagatgaat acaaggactg ccacttggcc caggtccctt ctcataccgt cgtggcccga 2100
 agtatgggcg gcaaggagga cttgatctgg gagcttctca accaggccca ggaacatttt 2160
 ggcaaagaca aatcaaaaaga attccaacta ttcagctctc ctcattggaa ggacctgctg 2220
 ttttaaggact ctgcccacgg gtttttaaaa gtcccccca ggatggatgc caagatgtac 2280
 ctgggctatg agtatgtcac tgccatccgg aatctacggg aaggcacatg cccagaagcc 2340
 ccaacagatg aatgcaagcc tgtgaagtgg tgtgctgctga gccaccacga gaggctcaag 2400
 tgtgatgagt ggagtgttaa cagtgtaggg aaaatagagt gtgtatcagc agagaccacc 2460
 gaagactgca tcgccaagat catgaatgga gaagctgatg ccatgagctt ggatggaggg 2520
 tttgtctaca tagcgggcaa gtgtggtctg gtgctgtct tggcagaaaa ctacaataag 2580
 agcgataatt gtgaggatac accagaggca gggatatttg ctgtagcagt ggtgaagaaa 2640
 tcagcttctg acctcacctg ggacaatctg aaaggcaaga agtcctgcca tacggcagtt 2700
 ggcagaaccg ctggctggaa catccccatg ggctgtctct acaataagat caacctctgc 2760
 agatttgatg aatttttcag tgaaggttgt gccctgggt ctaagaaaga ctccagtctc 2820
 tgtaagctgt gtatgggctc aggcctaaac ctgtgtgaac ccaacaacaa agagggatac 2880
 tacggctaca caggcgcttt caggtgtctg gttgagaagg gagatgtggc ctttgtgaaa 2940
 caccagactg tcccacagaa cactggggga aaaaaccctg atccatgggc taagaatctg 3000
 aatgaaaaag actatgagtt gctgtgcctt gatggtacca ggaaacctgt ggaggagtat 3060
 gcgaactgcc acctggccag agccccgaat cacgctgtgg tcacacggaa agataaggaa 3120
 gcttgcgtcc acaagatatt acgtcaacag cagcacctat ttggaagcaa cgtaactgac 3180
 tgctcgggca acttttgttt gttccggtcg gaaaccaagg accttctgtt cagagatgac 3240
 acagtatggt tggccaaact tcatgacaga aacacatatg aaaaatactt aggagaagaa 3300
 tatgtcaagg ctgttggtaa cctgagaaaa tgctccacct catcactcct ggaagcctgc 3360
 actttccgta gaccttaa 3378

<210> 14
 <211> 3387
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS1-Tf

<400> 14
 atggtctccc aggcctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccacagga ggaagcccac ggctgctgc accggcgccg gcgcccac 120
 gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcagga ggagcagtgc 180

ES 2 676 874 T3

tccttcgagg	aggcccggga	gatcttcaag	gacgcggaga	ggacgaagct	gttctggatt	240
tcttacagtg	atggggacca	gtgtgcctca	agtccatgcc	agaatggggg	ctcctgcaag	300
gaccagctcc	agtcctatat	ctgcttctgc	ctccctgcct	tcgagggccg	gaactgtgag	360
acgcacaagg	atgaccagct	gatctgtgtg	aacgagaacg	gcggtgtga	gcagtactgc	420
agtgaccaca	cgggcaccaa	gcgctcctgt	cgggtccacg	aggggtactc	tctgctggca	480
gacggggtgt	cctgcacacc	cacagttgaa	tatccatgtg	gaaaaatacc	tattctagaa	540
aaaagaaatg	ccagcaaacc	ccaaggccga	attgtggggg	gcaagggtgtg	ccccaaaggg	600
gagtgtccat	ggcaggtcct	gttgttgggtg	aatggagctc	agttgtgtgg	ggggaccctg	660
atcaacacca	tctgggtggg	ctcgcgggcc	cactgtttcg	acaaaatcaa	gaactggagg	720
aacctgatcg	cgggtgctggg	cgagcacgac	ctcagcgagc	acgacgggga	tgagcagagc	780
cggcgggtgg	cgcaggtcat	catccccagc	acgtacgtcc	cgggcaccac	caaccacgac	840
atcgcgctgc	tccgcctgca	ccagcccgtg	gtcctcactg	accatgtggg	gcccctctgc	900
ctgccgaac	ggagcttctc	tgagaggacg	ctggccttcg	tgcgcttctc	attggtcagc	960
ggctggggcc	agctgctgga	ccgtggcgcc	acggccctgg	agctcatggt	cctcaacgtg	1020
ccccggctga	tgaccagga	ctgcctgcag	cagtcacgga	aggtgggaga	ctccccaaat	1080
atcacggagt	acatgttctg	tgccggctac	tcggatggca	gcaaggactc	ctgcaagggg	1140
gacagtggag	gcccacatgc	caccactac	cggggcacgt	ggtacctgac	gggcatcgtc	1200
agctggggcc	agggctgcgc	aaccgtgggc	cactttgggg	tgtacaccag	ggtctcccag	1260
tacatcgagt	ggctgcaaaa	gctcatgcgc	tcagagccac	gcccaggagt	cctcctgcga	1320
gccccatttc	ccggtggagg	cggatccgtc	cctgataaaa	ctgtgagatg	gtgtgcagtg	1380
tcggagcatg	aggccactaa	gtgccagagt	ttccgcgacc	atatgaaaag	cgtcattcca	1440
tccgatggtc	ccagtgttgc	ttgtgtgaag	aaagcctcct	accttgattg	catcagggcc	1500
attgoggcaa	acgaagcggg	tgctgtgaca	ctggatgcag	gtttgggtga	tgatgcttac	1560
ctggctccca	ataacctgaa	gcctgtgggtg	gcagagtctc	atgggtcaaa	agaggatcca	1620
cagactttct	attatgctgt	tgctgtgggtg	aagaaggata	gtggcttcca	gatgaaccag	1680
cttcgaggca	agaagtcctg	ccacacgggt	ctaggcaggt	ccgctgggtg	gaacatcccc	1740
ataggcttac	tttactgtga	cttacctgag	ccacgtaaac	ctcttgagaa	agcagtggcc	1800
aatttcttct	cgggcagctg	tgccccttgt	gcggatggga	cggacttccc	ccagctgtgt	1860
caactgtgtc	caggggtgtg	ctgctccacc	cttaaccaat	acttcggcta	ctcaggagcc	1920
ttcaagtgtc	tgaaggatgg	tgctggggat	gtggcctttg	tcaagcactc	gactatattt	1980
gagaacttgg	caaacaaggc	tgacagggac	cagtatgagc	tgctttgcct	ggacaacacc	2040
cggaagccgg	tagatgaata	caaggactgc	cacttgcccc	aggtcccttc	tcataccgtc	2100

ES 2 676 874 T3

gtggcccga gtatgggac caaggaggac ttgatctggg agcttctcaa ccaggcccag 2160
 gaacattttg gcaaagacaa atcaaaaagaa ttccaactat tcagctctcc tcatgggaag 2220
 gacctgctgt ttaaggactc tgcccacggg tttttaaaag tcccccccag gatggatgcc 2280
 aagatgtacc tgggctatga gtatgtcact gccatccgga atctacggga aggcacatgc 2340
 ccagaagccc caacagatga atgcaagcct gtgaagtggg gtgctgctgag ccaccacgag 2400
 aggctcaagt gtgatgagt gagtgtaaac agtgtaggga aaatagagtg tgtatcagca 2460
 gagaccaccg aagactgcat cgccaagatc atgaatggag aagctgatgc catgagcttg 2520
 gatggagggt ttgtctacat agcgggcaag tgtgggtctgg tgctgtctt ggagaaaaac 2580
 tacaataaga gcgataattg tgaggatata ccagaggcag ggtattttgc ttagcagtg 2640
 gtgaagaaat cagcttctga cctcacctgg gacaatctga aaggcaagaa gtcctgccat 2700
 acggcagttg gcagaaccgc tggctggaac atccccatgg gcctgctcta caataagatc 2760
 aaccactgca gatttgatga atttttcagt gaaggttggt cccctgggtc taagaaagac 2820
 tccagtctct gtaagctgtg tatgggctca ggctaaacc tgtgtgaacc caacaacaaa 2880
 gagggatact acggctacac aggcgctttc aggtgtctgg ttgagaaggg agatgtggcc 2940
 tttgtgaaac accagactgt cccacagaac actgggggaa aaaaccctga tccatgggct 3000
 aagaatctga atgaaaaaga ctatgagttg ctgtgccttg atggtaccag gaaacctgtg 3060
 gaggagtatg cgaactgcc cctggccaga gccccgaatc acgctgtggg cacacggaaa 3120
 gataaggaag cttgctcca caagatatta cgtcaacagc agcacctatt tggagcaac 3180
 gtaactgact gctcgggcaa cttttgttg ttccggctcg aaaccaagga cttctgttc 3240
 agagatgaca cagtatgtt ggccaaactt catgacagaa acacatatga aaaatactta 3300
 ggagaagaat atgtcaaggc tgttgtaac ctgagaaaat gctccacctc atcactcctg 3360
 gaagcctgca cttccgtag accttaa 3387

<210> 15
 <211> 3426
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS3-Tf

<400> 15
 atggctctccc aggcctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcgccaac 120
 gcgttctctgg aggagctgag gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtc 180
 tccttcgagg aggccggga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctccctgcaag 300

ES 2 676 874 T3

gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cggtgccacg aggggtactc tctgctggca 480
gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgtg ccccaaaggg 600
gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
atcaacacca tctgggtggt ctccgaggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctacagcagc acgacgggga tgagcagagc 780
cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
ccccggctga tgaccagga ctgcctgcag cagtacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
agctggggcc agggctgctc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
tacatogagt ggctgcaaaa gctcatgctc tcagagccac gccaggagt cctcctgcca 1320
gccccatttc ccaccggtg aggcggttca ggcggagggtg gctctggcgg tggcggatcc 1380
accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag 1440
tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc gtcattccat ccgatggtcc cagtgttgct 1500
tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc atcagggcca ttgcggcaaa cgaagcggat 1560
gctgtgacac tggatgcagg tttggtgtat gatgcttacc tggctccaa taacctgaag 1620
cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa gaggatccac agactttcta ttatgctgtt 1680
gctgtggtga agaaggatag tggcttcag atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtctgc 1740
cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg aacatcccca taggcttact ttactgtgac 1800
ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt 1860
gccccttggt cggatgggac ggacttcccc cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgagg 1920
tgctccacc ttaaccaata cttcggctac tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt 1980
gctggggatg tggcctttgt caagcactcg actatatttg agaacttggc aaacaaggct 2040
gacagggacc agtatgagct gctttgctg gacaacacc ggaagccggt agatgaatac 2100
aaggactgcc acttggccca ggtcccttct cataccgtcg tggcccgaag tatgggcggc 2160
aaggaggact tgatctggga gcttctcaac caggcccagg aacattttgg caaagacaaa 2220
tcaaagaat tccaactatt cagctctcct catgggaagg acctgctgtt taaggactct 2280

ES 2 676 874 T3

gcccacgggt ttttaaaagt cccccccagg atggatgcca agatgtacct gggctatgag 2340
 tatgtcactg ccatccgaa tctacgggaa ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa 2400
 tgcaagcctg tgaagtgggt tgcgctgagc caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg 2460
 agtgtaaca gtgtagggaa aatagagtgt gtatcagcag agaccaccga agactgcatc 2520
 gccaagatca tgaatggaga agctgatgcc atgagcttgg atggagggtt tgtctacata 2580
 gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg gcagaaaact acaataagag cgataattgt 2640
 gaggatacac cagaggcagg gtatthttgct gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac 2700
 ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag tcctgccata cggcagttgg cagaaccgct 2760
 ggctggaaca tccccatggg cctgctctac aataagatca accactgcag atttgatgaa 2820
 tttttcagtg aaggttgtgc ccctgggtct aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt 2880
 atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct aacaacaaag agggatacta cggctacaca 2940
 ggcgctttca ggtgtctggt tgagaagggg gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc 3000
 ccacagaaca ctgggggaaa aaacctgat ccatgggcta agaactctgaa tgaaaaagac 3060
 tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac 3120
 ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc acacggaaag ataaggaagc ttgcgtccac 3180
 aagatattac gtcaacagca gcacctatth ggaagcaacg taactgactg ctcgggcaac 3240
 ttttgthttgt tccggtcggg aaccaaggac cthctgttca gagatgacac agtatgthttg 3300
 gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct 3360
 gttggttaacc tgagaaaaatg ctccacctca tcactcctgg aagcctgcac thtccgtaga 3420
 ccttaa 3426

- <210> 16
- <211> 3456
- <212> ADN
- <213> Secuencia artificial

- <220>
- <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS5-Tf

10 <400> 16
 atggctctccc aggcacctcag gctcctctgc cthctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcccac 120
 gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtg 180
 tccttcgagg aggcctggga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gthctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctctgcaag 300
 gaccagctcc agtccatata ctgcttctgc ctccctgctc tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420

ES 2 676 874 T3

agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cggtgccacg aggggtactc tctgctggca 480
 gacgggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
 aaaagaaatg ccagcaaac ccaaggccga attgtggggg gcaaggtgtg ccccaaagg 600
 gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cgggtgctggg cgagcacgac ctgagcagac acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtccctactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
 ccccggtga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgctc aaccgtggc cactttggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgctc tcagagccac gccaggagt cctcctgcga 1320
 gccccatttc ccaccggtg aggcggttca ggcggagggtg gctctggcgg tggcggatct 1380
 ggcggagggtg gctctggcgg tggcggatcc accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg 1440
 tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc 1500
 gtcattccat ccgatggtcc cagtgttgct tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc 1560
 atcagggcca ttgcggcaaa cgaagcggat gctgtgacac tggatgcagg tttggtgtat 1620
 gatgcttacc tggctcccaa taacctgaag cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa 1680
 gaggatccac agactttcta ttatgctgtt gctgtggtga agaaggatag tggcttccag 1740
 atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtcctgc cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg 1800
 aacatcccca taggcttact ttactgtgac ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa 1860
 gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt gcccttctg cggatgggac ggacttcccc 1920
 cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgtggc tgctccacc ttaaccaata cttcggctac 1980
 tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt gctggggatg tggcctttgt caagcactcg 2040
 actatatttg agaacttggc aaacaaggct gacagggacc agtatgagct gctttgcctg 2100
 gacaacacc cgaagccggt agatgaatac aaggactgcc acttgccca ggtcccttct 2160
 cataccgtcg tggcccgaag tatgggcggc aaggaggact tgatctggga gcttctcaac 2220
 caggcccagg aacattttg caaagacaaa tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct 2280
 catgggaagg acctgctgtt taaggactct gccacgggt ttttaaaagt cccccagg 2340

ES 2 676 874 T3

atggatgcca agatgtacct gggctatgag tatgtcactg ccatccggaa tctacgggaa	2400
ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa tgcaagcctg tgaagtggg tgcgctgagc	2460
caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg agtggttaaca gtgtagggaa aatagagtgt	2520
gtatcagcag agaccaccga agactgcata gccaaagatca tgaatggaga agctgatgcc	2580
atgagcttgg atggaggggt tgtctacata gcgggcaagt gtggtctggg gcctgtcttg	2640
gcagaaaact acaataagag cgataattgt gaggatacac cagaggcagg gtattttgct	2700
gtagcagtgg tgaagaatc agcttctgac ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag	2760
tcttgccata cggcagttgg cagaaccgct ggctggaaca tccccatggg cctgctctac	2820
aataagatca accactgcag atttgatgaa tttttcagtg aaggttgtgc ccctgggtct	2880
aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct	2940
aacaacaaag agggatacta cggctacaca ggcgctttca ggtgtctggg tgagaagggg	3000
gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc ccacagaaca ctgggggaaa aaacctgat	3060
ccatgggcta agaactctgaa tgaaaagac tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg	3120
aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac ctggccagag ccccgaaatca cgctgtggtc	3180
acacggaaag ataaggaagc ttgctccac aagatattac gtcaacagca gcacctatct	3240
ggaagcaacg taactgactg ctcgggcaac ttttgtttgt tccggtcgga aaccaaggac	3300
cttctgttca gagatgacac agtatgtttg gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa	3360
aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct gttggttaacc tgagaaaatg ctccacctca	3420
tcactcctgg aagcctgcac tttcogtaga ccttaa	3456

<210> 17
 <211> 3486
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

5

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS7-Tf

10

<400> 17	
atggtctccc aggccctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct	60
gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcccac	120
gcgttctctg aggagctcgc gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc	180
tccttcgagg aggcccgga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt	240
tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctccctcaag	300
gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgctc tcgagggccg gaactgtgag	360
acgcacaagc atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggtgtgga gcagtactgc	420
agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cgggtccacg aggggtactc tctgctggca	480

ES 2 676 874 T3

gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgtg ccccaaaggg 600
gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctcagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
cggcggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
atcgcgctgc tccgctgca ccagcccgtg gtccctactg accatgtggt gccctctgc 900
ctgccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
ccccgctga tgaccagga ctgcctgcag cagtacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
agctggggcc agggctgctc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgctc tcagagccac gcccaggagt cctcctgcga 1320
gccccatttc ccaccggtg aggcggttca ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1380
ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatcc 1440
accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag 1500
tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc gtcattccat ccgatggtcc cagtgttgct 1560
tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc atcagggcca ttgcccgaaa cgaagcggat 1620
gctgtgacac tggatgcagg tttggtgat gatgcttacc tggctcccaa taacctgaag 1680
cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa gaggatccac agactttcta ttatgctgtt 1740
gctgtggtga agaaggatag tggcttccag atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtctgc 1800
cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg aacatcccc a taggcttact ttactgtgac 1860
ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt 1920
gccccttgtg cggatgggac ggacttccc cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgtggc 1980
tgctccacc ttaaccaata ctccgctac tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt 2040
gctggggatg tggccttct caagcactcg actatatttg agaacttggc aaacaaggct 2100
gacagggacc agtatgagct gctttgctg gacaacacc ggaagccggt agatgaatac 2160
aaggactgcc acttgccca ggtcccttct catacctcg tggcccgaag tatgggcggc 2220
aaggaggact tgatctggga gcttctcaac caggcccag aacattttg caaagacaaa 2280
tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct catgggaagg acctgctgtt taaggactct 2340
gccacgggt ttttaaaagt cccccccag atggatgcca agatgtacct gggctatgag 2400
tatgtcactg ccataccgaa tctacggaa ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa 2460

ES 2 676 874 T3

tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg 2520
 agtgtaaca gtgtagggaa aatagagtgt gtatcagcag agaccaccga agactgcatc 2580
 gccaaatca tgaatggaga agctgatgcc atgagcttgg atggaggggtt tgtctacata 2640
 gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg gcagaaaact acaataagag cgataattgt 2700
 gaggatacac cagaggcagg gtatcttgct gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac 2760
 ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag tcttgccata cggcagttgg cagaaccgct 2820
 ggctggaaca tccccatggg cctgctctac aataagatca accactgcag atttgatgaa 2880
 ttttccagtg aaggttgctc ccctgggtct aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt 2940
 atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct aacaacaaag aggataacta cggctacaca 3000
 ggcgctttca ggtgtctggt tgagaaggga gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc 3060
 ccacagaaca ctgggggaaa aaaccctgat ccatgggcta agaactctgaa tgaaaagac 3120
 tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac 3180
 ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc acacggaaag ataaggaagc ttgctccac 3240
 aagatattac gtcaacagca gcacctattt ggaagcaacg taactgactg ctggggcaac 3300
 ttttgtttgt tccggtcggg aaccaaggac cttctgttca gagatgacac agtatgtttg 3360
 gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct 3420
 gttgtaacc tgagaaaatg ctccacctca tcaactcctgg aagcctgcac tttccgtaga 3480
 ccttaa 3486

<210> 18

<211> 3516

<212> ADN

5 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS9-Tf

10 <400> 18

atggtctccc aggccctcag gtcctctgctc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcttggt 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcccac 120
 gcgttctctg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
 tccttcgagg aggccggga gatcttcaag gacgaggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctctgcaag 300
 gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
 agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cgggtccacg aggggtactc tctgctggca 480
 gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540

ES 2 676 874 T3

aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaaggtgtg ccccaaaggg 600
 gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctgagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgccogaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
 ccccggtga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgcmc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgcmc tcagagccac gccaggagt cctcctgcmg 1320
 gccccatttc ccaccggtgg aggcggttca ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1380
 ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1440
 ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatcc accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg 1500
 tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag tgccagagtt tccgcmacca tatgaaaagc 1560
 gtcattccat ccgatggtcc cagtgttctc tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc 1620
 atcagggcca ttgcmgcaaa cmgagcmgat gctgtgacac tggatgcagg tttggtgtat 1680
 gatgcttacc tggctcccaa taacctgaag cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa 1740
 gaggatccac agactttcta ttatgctgtt gctgtggtga agaaggatag tggcttccag 1800
 atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtcctgc cacacgggtc taggcaggtc cmctgggtgg 1860
 aacatcccca taggcttact ttactgtgac ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa 1920
 gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt gcccttctg cggatgggac ggacttcccc 1980
 cagctgtgtc aactgtgtcc aggtgtggc tgctccaccc ttaaccaata cttoggctac 2040
 tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt gctggggatg tggcctttgt caagcactcm 2100
 actatatttg agaacttggc aaacaaggct gacagggacc agtatgagct gctttgcmctg 2160
 gacaacaccc ggaagcmggt agatgaatac aaggactgcc acttggccca ggtcccttct 2220
 catacgmctg tggccmgaag tatggcmgmc aaggaggact tgatctggga gcttctcaac 2280
 cagggccagg aacattttgg caaagacaaa tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct 2340
 catgggaagg acctgctgtt taaggactct gccacgggt ttttaaaagt ccccccmg 2400
 atggatgcca agatgtacct gggctatgag tatgtcactg ccatcmgga tctacmga 2460

ES 2 676 874 T3

ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc 2520
caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg agtgттаааа gtgtagggaa aatagagtgt 2580
gtatcagcag agaccaccga agactgcac gccaaatca tgaatggaga agctgatgcc 2640
atgagcttg atggagggtt tgtctacata gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg 2700
gcagaaaact acaataagag cgataattgt gaggatacac cagaggcagg gtattttgct 2760
gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag 2820
tcctgccata cggcagttgg cagaaccgct ggctggaaca tccccatggg cctgctctac 2880
aataagatca accactgcag atttgatgaa tttttcagtг аaggттgtgc ccctgggtct 2940
aagaaagact ccagtctctg тааgctgtgt atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct 3000
aacaacaaag agggatacta cggctacaca ggcgctttca ggtgtctggt tgagaagggg 3060
gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc ccacagaaca ctgggggaaa aaaccctgat 3120
ccatgggcta agaatctgaa tgaaaagac tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg 3180
aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc 3240
acacggaaag атааggaagc ttgcgtccac ааgататтаc gtcaacagca gcacctattt 3300
ggaagcaacg таactgactg ctсgggcaac ttttgттtgt tccggtcgga aaccaaggac 3360
cttctgttca gagatgacac agtatgtttg gccaaacttc atgacagaaa cacatagaa 3420
aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct gttggtaacc tgagaaaatg ctccacctca 3480
tcaactctgg aagcctgcac tttcogtaga ccttaa 3516

<210> 19

<211> 3546

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

5

<220>

<223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS11-Tf

10

<400> 19

atggtctccc aggccctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctgget 60
gcagtcttcg таaccсagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgcсg gcgcgccaac 120
gcgttctctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
tccttcgagg agggccggga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt 240
tcttacagtг atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc аааatggggg ctctgcaag 300
gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cgggtccacg aggggtactc tctgctggca 480
gacgggggtg cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540

ES 2 676 874 T3

aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaaggtgtg ccccaaaggg	600
gagtgtccat ggcaggtcct gttgttgggt aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg	660
atcaacacca tctgggtggt ctccgcgcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg	720
aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctgagcgagc acgacgggga tgagcagagc	780
cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac	840
atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtocctactg accatgtggt gccctctgc	900
ctgccogaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc	960
ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg	1020
ccccggctga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat	1080
atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg	1140
gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc	1200
agctggggcc agggctgccc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctccag	1260
tacatogagt ggctgcaaaa gctcatgccc tcagagccac gccaggagt cctcctgcga	1320
gccccatttc ccaccgtgg aggcggttca ggccggaggtg gctctggcgg tggcggatct	1380
ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggccggaggtg gctctggcgg tggcggatct	1440
ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggccggaggtg gctctggcgg tggcggatcc	1500
accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag	1560
tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc gtcattccat ccgatggtcc cagtgttgct	1620
tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc atcaggcca ttgcggcaaa cgaagcggat	1680
gctgtgacac tggatgcagg tttggtgtat gatgcttacc tggctccaa taacctgaag	1740
cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa gaggatccac agactttcta ttatgctgtt	1800
gctgtggtga agaaggatag tggcttcag atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtctgc	1860
cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg aacatccca taggcttact ttactgtgac	1920
ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt	1980
gcccttctgt cggatgggac ggacttcccc cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgtggc	2040
tgctccacc ttaaccaata cttcggctac tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt	2100
gctggggatg tggcctttgt caagcactcg actatatttg agaacttggc aaacaaggct	2160
gacagggacc agtatgagct gctttgctg gacaacacc ggaagccggt agatgaatac	2220
aaggactgcc acttgccca ggtcccttct catacctcg tggcccgaag tatgggcggc	2280
aaggaggact tgatctggga gcttctcaac caggcccagg aacatthttg caaagacaaa	2340
tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct catgggaagg acctgctgtt taaggactct	2400
gcccacgggt ttttaaaagt cccccagc atggatgcca agatgtacct gggctatgag	2460
tatgtcactg ccatccgaa tctacgggaa ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa	2520

ES 2 676 874 T3

tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg	2580
agtgttaaca gtgtagggaa aatagagtgt gtatcagcag agaccaccga agactgcatc	2640
gccaagatca tgaatggaga agctgatgcc atgagcttgg atggagggtt tgtctacata	2700
gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg gcagaaaact acaataagag cgataattgt	2760
gaggatacac cagaggcagg gtatcttgct gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac	2820
ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag tcctgccata cggcagttgg cagaaccgct	2880
ggctggaaca tccccatggg cctgctctac aataagatca accactgcag atttgatgaa	2940
tttttcagtg aaggttgtgc ccctgggtct aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt	3000
atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct aacaacaaag agggatacta cggctacaca	3060
ggcgctttca ggtgtctggt tgagaaggga gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc	3120
ccacagaaca ctgggggaaa aaaccctgat ccatgggcta agaactctgaa tgaaaaagac	3180
tatgagttgc tgtgccttga tgggtaccagg aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac	3240
ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc acacggaaag ataaggaagc ttgcgtccac	3300
aagatattac gtcaacagca gcacctattt ggaagcaacg taactgactg ctcgggcaac	3360
ttttgtttgt tccggtcggg aaccaaggac cttctgttca gagatgacac agtatgtttg	3420
gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct	3480
gttggttaacc tgagaaaatg ctccacctca tcactcctgg aagcctgcac tttcogtaga	3540
ccttaa	3546

<210> 20
 <211> 3576
 <212> ADN

5 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS13-Tf

10 <400> 20

ES 2 676 874 T3

atggtctccc aggccctcag gtcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct	60
gcagtcttcg taaccagga ggaagccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcgccaac	120
gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc	180
tccttcgagg aggcccgga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt	240
tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctctgcaag	300
gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag	360
acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc	420
agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cggtgccacg aggggtactc tctgctggca	480
gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa	540

ES 2 676 874 T3

aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgtg ccccaaaggg 600
 gagtgtccat ggcaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggacctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cgtgctggg cgagcacgac ctcagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtg ggcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaactg 1020
 ccccggtga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgcbc aaccgtggc cactttggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgcbc tcagagccac gccaggagt cctcctgca 1320
 gcccatttc ccaccggtg aggcggttca ggcggaggtg gctctggcg tggcggatct 1380
 ggcggaggtg gctctggcg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcg tggcggatct 1440
 ggcggaggtg gctctggcg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcg tggcggatct 1500
 ggcggaggtg gctctggcg tggcggatcc accggtgtcc ctgataaac tgtgagatgg 1560
 tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc 1620
 gtcatccat ccgatggtcc cagtgttctg tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc 1680
 atcagggcca ttgcggcaaa cgaagcgat gctgtgacac tggatgcagg tttggtgat 1740
 gatgcttacc tggctcccaa taacctgaag cctgtggtg cagagttcta tgggtcaaaa 1800
 gaggatccac agactttcta ttatgctgtt gctgtggtga agaaggatag tggcttccag 1860
 atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtcctgc cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtg 1920
 aacatcccca taggcttact ttactgtgac ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa 1980
 gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt gcccttctg cggatgggac ggacttcccc 2040
 cagctgtgtc aactgtgtcc aggtgtggc tgctccacc ttaaccaata ctctggctac 2100
 tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt gctggggatg tggcctttgt caagcactcg 2160
 actatatttg agaacttggc aaacaaggct gacagggacc agtatgagct gctttgctg 2220
 gacaacacc ggaagccggt agatgaatac aaggactgcc acttggcca ggtcccttct 2280
 cataccgtcg tggcccgaag tatggcggc aaggaggact tgatctggga gcttctcaac 2340
 caggcccag aacattttg caagacaaa tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct 2400
 catgggaagg acctgctgtt taaggactct gccacgggt ttttaaagt cccccag 2460

ES 2 676 874 T3

atggatgcca agatgtacct gggctatgag tatgtcactg ccatccggaa tctacgggaa 2520
 ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc 2580
 caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg agtgtaaca gtgtagggaa aatagagtgt 2640
 gtatcagcag agaccaccga agactgcatc gccaaagatca tgaatggaga agctgatgcc 2700
 atgagcttgg atggagggtt tgtctacata gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg 2760
 gcagaaaact acaataagag cgataattgt gaggatacac cagaggcagg gtattttgc 2820
 gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag 2880
 tcctgccata cggcagttgg cagaaccgct ggctggaaca tccccatggg cctgctctac 2940
 aataagatca accactgcag atttgatgaa ttttctcagtg aaggttgtgc ccctgggtct 3000
 aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct 3060
 aacaacaaag agggatacta cggctacaca ggcgctttca ggtgtctggt tgagaagggg 3120
 gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc ccacagaaca ctgggggaaa aaacctgat 3180
 ccatgggcta agaactctgaa tgaaaaagac tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg 3240
 aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc 3300
 acacggaag ataaggaagc ttgcgtccac aagatattac gtcaacagca gcacctattt 3360
 ggaagcaacg taactgactg ctcgggcaac ttttgtttgt tccggtcgga aaccaaggac 3420
 cttctgttca gagatgacac agtatgtttg gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa 3480
 aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct gttgtaacc tgagaaaatg ctccacctca 3540
 tcactcctgg aagcctgcac tttccgtaga ccttaa 3576

<210> 21
 <211> 3606
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

5

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS15-Tf

10

<400> 21
 atggctctccc aggccctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgcg gcgcgccaac 120
 gcgttctctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
 tccttcgagg agggccggga gatcttcaag gacgoggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctctgcaag 300
 gaccagctcc agtccctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
 agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cggtgccacg aggggtactc tctgctggca 480

ES 2 676 874 T3

gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
 aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgtg ccccaaaggg 600
 gagtgtccat ggacaggtcct gttgttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctgagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgacaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaactgt 1020
 ccccggtgga tgaccagga ctgcctgca cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgcgc aaccgtggc cactttggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgcgc tcagagccac gccaggagt cctcctgcga 1320
 gcccatttc ccaccggtgg aggcggttca ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1380
 ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1440
 ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct 1500
 ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatct ggcggaggtg gctctggcgg tggcggatcc 1560
 accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag 1620
 tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc gtcattccat ccgatgggtcc cagtgttct 1680
 tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc atcagggcca ttgaggcaaa cgaagcggat 1740
 gctgtgacac tggatgcagg tttggtgat gatgcttacc tggtcccaa taacctgaag 1800
 cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa gaggatccac agactttcta ttatgctgtt 1860
 gctgtggtga agaaggatag tggcttcag atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtctgc 1920
 cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg aacatccca taggcttact ttactgtgac 1980
 ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt 2040
 gcccttgtg cggatgggac ggacttccc cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgtggc 2100
 tgctccacc ttaaccaata cttcggctac tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt 2160
 gctggggatg tggcctttgt caagcactcg actatatttg agaacttggc aaacaaggct 2220
 gacagggacc agtatgagct gctttgcctg gacaacacc ggaagccggt agatgaatac 2280
 aaggactgcc acttgccca ggtcccttct catacctcg tggcccgaag tatggcgggc 2340
 aaggaggact tgatctggga gcttctcaac caggcccagg aacatthtgg caaagacaaa 2400
 tcaaaagaat tccaactatt cagctctcct catgggaagg acctgctgtt taaggactct 2460

ES 2 676 874 T3

gccacgggt ttttaaaagt cccccccagg atggatgcca agatgtacct gggctatgag 2520
 tatgtcactg ccatccggaa tctacgggaa ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa 2580
 tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg 2640
 agtgtaaca gtgtagggaa aatagagtgt gtatcagcag agaccaccga agactgcatc 2700
 gccaaatca tgaatggaga agctgatgcc atgagcttgg atggaggggtt tgtctacata 2760
 gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg gcagaaaact acaataagag cgataattgt 2820
 gaggatacac cagaggcagg gtatcttctg gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac 2880
 ctacactggg acaatctgaa aggcaagaag tcctgccata cggcagttgg cagaaccgct 2940
 ggctggaaca tccccatggg cctgctctac aataagatca accactgcag atttgatgaa 3000
 ttttctcagt aaggttgtgc ccctgggtct aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt 3060
 atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct aacaacaaag agggatacta cggctacaca 3120
 ggcgcttca ggtgtctggt tgagaaggga gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc 3180
 ccacagaaca ctgggggaaa aaaccctgat ccatgggcta agaactctgaa tgaaaaagac 3240
 tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac 3300
 ctggccagag ccccgaatca cgctgtggtc acacggaaaag ataaggaagc ttgcgtccac 3360
 aagatattac gtcaacagca gcacctattt ggaagcaacg taactgactg ctcgggcaac 3420
 ttttgtttgt tccggctcga aaccaaggac cttctgttca gagatgacac agtatgtttg 3480
 gccaaaactc atgacagaaa cacatatgaa aaatacttag gagaagaata tgtcaaggct 3540
 gttggttaacc tgagaaaatg ctccacctca tcaactcctgg aagcctgcac tttccgtaga 3600
 ccttaa 3606

<210> 22

<211> 3450

<212> ADN

5 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-Hélice-Tf

10 <400> 22

ES 2 676 874 T3

atggtctccc aggccctcag gtcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct	60
gcagtcttcg taaccagga ggaagccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcgccaac	120
gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc	180
tccttcgagg aggcccgga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt	240
tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctcctgcaag	300
gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag	360
acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc	420

ES 2 676 874 T3

agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cggtgccacg aggggtactc tctgctggca 480
 gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
 aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgtg ccccaaaggg 600
 gagtgtccat ggcaggtcct gttggtggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctcagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttog tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
 ccccggtga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
 atcacggagt acatggtctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgcgc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgcgc tcagagccac gccaggagt cctcctgcca 1320
 gcccatttc ccaccggtgc tgaagctgca gccaaagaag ctgcagcaa agaggccgca 1380
 gctaaggaag ccgcagcaaa agctaccggt gtccctgata aaactgtgag atggtgtgca 1440
 gtgtcggagc atgaggccac taagtccag agtttccgag accatatgaa aagcgtcatt 1500
 ccatccgatg gtcccagtgt tgcttgtgtg aagaaagcct cctaccttga ttgcatcagg 1560
 gccattgagg caaacgaagc ggatgctgtg aactggatg caggtttggg gtatgatgct 1620
 tactggctc ccaataacct gaagcctgtg gtggcagagt tctatgggtc aaaagaggat 1680
 ccacagactt tctattatgc tgttgctgtg gtgaagaagg atagtggctt ccagatgaac 1740
 cagcttcgag gcaagaagtc ctgccacacg ggtctaggca ggtccgctgg gtggaacatc 1800
 cccataggct tactttactg tgacttacct gagccacgta aacctcttga gaaagcagtg 1860
 gccaatctt tctcgggcag ctgtgccctt tgtgcggatg ggacggactt ccccagctg 1920
 tgtcaactgt gtccaggggtg tggctgctcc acccttaacc aatacttogg ctactcagga 1980
 gccttcaagt gtctgaagga tgggtgctgg gatgtggcct ttgtcaagca ctcgactata 2040
 tttgagaact tggcaaacia ggctgacagg gaccagtatg agctgctttg cctggacaac 2100
 acccgaagc cggtagatga atacaaggac tgccacttgg cccaggccc ttctcatacc 2160
 gtcgtggccc gaagtatggg cggcaaggag gacttgatct gggagcttct caaccaggcc 2220
 caggaacatt ttggcaaaga caaatcaaaa gaattccaac tattcagctc tcctcatggg 2280
 aaggacctgc tgtttaagga ctctgcccac gggtttttaa aagtcccccc caggatggat 2340

ES 2 676 874 T3

gccaagatgt acctgggcta tgagtatgtc actgccatcc ggaatctacg ggaaggcaca 2400
 tgcccagaag ccccaacaga tgaatgcaag cctgtgaagt ggtgtgcgct gagccaccac 2460
 gagaggctca agtgtgatga gtggagtgtt aacagtgtag ggaaaataga gtgtgtatca 2520
 gcagagacca ccgaagactg catcgccaag atcatgaatg gagaagctga tgccatgagc 2580
 ttggatggag ggtttgtcta catagcgggc aagtgtggtc tgggtcctgt cttggcagaa 2640
 aactacaata agagcgataa ttgtgaggat acaccagagg cagggatattt tgctgtagca 2700
 gtggtgaaga aatcagcttc tgacctcacc tgggacaatc tgaaaggcaa gaagtcctgc 2760
 catacggcag ttggcagaac cgctggctgg aacatcccca tgggcctgct ctacaataag 2820
 atcaaccact gcagatttga tgaatttttc agtgaagggt gtgccctgg gtctaagaaa 2880
 gactccagtc tctgtaagct gtgtatgggc tcaggcctaa acctgtgtga acccaacaac 2940
 aaagagggat actacggcta cacaggcgct ttcaggtgtc tggttgagaa gggagatgtg 3000
 gcctttgtga aacaccagac tgtcccacag aacactgggg gaaaaaacc tgatccatgg 3060
 gctaagaatc tgaatgaaaa agactatgag ttgctgtgcc ttgatggtac caggaaacct 3120
 gtggaggagt atgcgaactg ccacctggcc agagccccga atcacgctgt ggtcacacgg 3180
 aaagataagg aagcttgctg ccacaagata ttacgtcaac agcagcacct atttggaagc 3240
 aacgtaactg actgctcggg caacttttgt ttgttccggt cggaaaccaa ggaccttctg 3300
 ttcagagatg acacagtatg tttggccaaa cttcatgaca gaaacacata tgaaaaatac 3360
 ttaggagaag aatatgtcaa ggctgttgggt aacctgagaa aatgctccac ctcatcactc 3420
 ctggaagcct gcactttccg tagaccttaa 3450

<210> 23
 <211> 3426
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

5

<220>
 <223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS1-T-Tf

10

<400> 23
 atggtctccc aggccctcag gctcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgcctggct 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgcg gcgcgccaac 120
 gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
 tccttcgagg aggccgggga gatcttcaag gacgcggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaattgggg ctctctgcaag 300
 gaccagctcc agtctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
 agtgaccaca cgggcaccaa gcgctcctgt cgggtccacg aggggtactc tctgctggca 480

ES 2 676 874 T3

gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
aaaagaaatg ccagcaaacc ccaaggccga attgtggggg gcaaggtgtg ccccaaaggg 600
gagtgtccat ggcaggtcct gttgttgggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
atcaacacca tctgggtggg ctccgcggcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
aacctgatcg cgggtgctggg cgagcacgac ctcagcgagc acgacgggga tgagcagagc 780
cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gcccctctgc 900
ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
ccccggctga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
gacagtggag gcccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
agctggggcc agggctgcgc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctccag 1260
tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgcgc tcagagccac gcccaggagt cctcctgcga 1320
gccccatttc ccaccggtgg aggcggatcc ctggtgccgc gcggcagcgg aggcggttca 1380
accggtgtcc ctgataaaac tgtgagatgg tgtgcagtgt cggagcatga ggccactaag 1440
tgccagagtt tccgcgacca tatgaaaagc gtcattccat ccgatggtcc cagtgttgct 1500
tgtgtgaaga aagcctccta ccttgattgc atcagggcca ttgcggcaa cgaagcggat 1560
gctgtgacac tggatgcagg tttggtgtat gatgcttacc tggctcccaa taacctgaag 1620
cctgtggtgg cagagttcta tgggtcaaaa gaggatccac agactttcta ttatgctggt 1680
gctgtggtga agaaggatag tggcttcag atgaaccagc ttcgaggcaa gaagtctgc 1740
cacacgggtc taggcaggtc cgctgggtgg aacatcccc a taggcttact ttactgtgac 1800
ttacctgagc cacgtaaacc tcttgagaaa gcagtggcca atttcttctc gggcagctgt 1860
gccccttggt cggatgggac ggacttcccc cagctgtgtc aactgtgtcc aggggtgtggc 1920
tgctccacce ttaaccaata cttcggctac tcaggagcct tcaagtgtct gaaggatggt 1980
gctggggatg tggcctttgt caagcactcg actatatttg agaacttggc aaacaaggct 2040
gacagggacc agtatgagct gctttgcctg gacaacacc ggaagccggt agatgaatac 2100
aaggactgcc acttggccca ggtcccttct cataccgtcg tggcccgaag tatgggcggc 2160
aaggaggact tgatctggga gcttctcaac caggcccagg aacatthttg caaagacaaa 2220
tcaaagaat tccaactatt cagctctcct catgggaagg acctgctgtt taaggactct 2280
gcccacgggt ttttaaaagt cccccccagg atggatgcca agatgtacct gggctatgag 2340
tatgtcactg ccatccgaa tctacgggaa ggcacatgcc cagaagcccc aacagatgaa 2400
tgcaagcctg tgaagtgggtg tgcgctgagc caccacgaga ggctcaagtg tgatgagtgg 2460

ES 2 676 874 T3

agtgттааса gtgtagggaa aatagagtgt gtatcagcag agaccaccga agactgcatc 2520
 gccaaatca tgaatggaga agctgatgcc atgagcttgg atggaggggt tgtctacata 2580
 gcgggcaagt gtggtctggt gcctgtcttg gcagaaaact acaataagag cgataattgt 2640
 gaggatacac cagaggcagg gtatcttctg gtagcagtgg tgaagaaatc agcttctgac 2700
 ctcacctggg acaatctgaa aggcaagaag tctctccata cggcagttgg cagaaccgct 2760
 ggctggaaca tccccatggg cctgctctac aataagatca accactgcag atttgatgaa 2820
 tttttcagtg aaggttgtgc ccctgggtct aagaaagact ccagtctctg taagctgtgt 2880
 atgggctcag gcctaaacct gtgtgaacct aacaacaaag agggatacta cggctacaca 2940
 ggcgctttca ggtgtctggt tgagaaggga gatgtggcct ttgtgaaaca ccagactgtc 3000
 ccacagaaca ctgggggaaa aaacctgat ccatgggcta agaactctgaa tgaaaaagac 3060
 tatgagttgc tgtgccttga tggtagcagg aaacctgtgg aggagtatgc gaactgccac 3120
 ctggccagag ccccgaaatca cgctgtggtc acacggaaag ataaggaagc ttgctgccac 3180
 aagatattac gtcaacagca gcacctattt ggaagcaacg taactgactg ctgggcaac 3240
 ttttgtttgt tccggtcgga aaccaaggac cttctgttca gagatgacac agtatgtttg 3300
 gccaaacttc atgacagaaa cacatatgaa aaataacttag gagaagaata tgtcaaggct 3360
 gttggtaacc tgagaaaatg ctccacctca tcaactcctgg aagcctgcac tttccgtaga 3420
 ccttaa 3426

<210> 24

<211> 3417

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

5

<220>

<223> secuencia génica que codifica la proteína FVII-GS1-T-Tf(M3)

<400> 24

atggtctccc aggcctcag gtcctctgc cttctgcttg ggcttcaggg ctgctggct 60
 gcagtcttcg taaccagga ggaagcccac ggcgtcctgc accggcgccg gcgcgccaac 120
 gcgttcctgg aggagctgcg gccgggctcc ctggagaggg agtgcaagga ggagcagtgc 180
 tccttcgagg aggccggga gatcttcaag gacgaggaga ggacgaagct gttctggatt 240
 tcttacagtg atggggacca gtgtgcctca agtccatgcc agaatggggg ctctgcaag 300
 gaccagctcc agtcctatat ctgcttctgc ctccctgcct tcgagggccg gaactgtgag 360
 acgcacaagg atgaccagct gatctgtgtg aacgagaacg gcggctgtga gcagtactgc 420
 agtgaccaca cgggcaccaa gcgtcctgt cgggtccacg aggggtactc tctgctggca 480
 gacggggtgt cctgcacacc cacagttgaa tatccatgtg gaaaaatacc tattctagaa 540
 aaaagaaatg ccagcaaac ccaaggccga attgtggggg gcaagggtgt ccccaaaggg 600

10

ES 2 676 874 T3

gagtgtccat ggcaggtcct gttggttggtg aatggagctc agttgtgtgg ggggaccctg 660
 atcaacacca tctgggtggt ctccgcgcc cactgtttcg acaaaatcaa gaactggagg 720
 aacctgatcg cggtgctggg cgagcacgac ctacagcagc acgacgggga tgagcagagc 780
 cggcgggtgg cgcaggtcat catccccagc acgtacgtcc cgggcaccac caaccacgac 840
 atcgcgctgc tccgcctgca ccagcccgtg gtcctcactg accatgtggt gccctctgc 900
 ctgcccgaac ggacgttctc tgagaggacg ctggccttcg tgcgcttctc attggtcagc 960
 ggctggggcc agctgctgga ccgtggcgcc acggccctgg agctcatggt cctcaacgtg 1020
 ccccggctga tgaccagga ctgcctgcag cagtcacgga aggtgggaga ctccccaaat 1080
 atcacggagt acatgttctg tgccggctac tcggatggca gcaaggactc ctgcaagggg 1140
 gacagtggag gccacatgc caccactac cggggcacgt ggtacctgac gggcatcgtc 1200
 agctggggcc agggctgctc aaccgtgggc cactttgggg tgtacaccag ggtctcccag 1260
 tacatcgagt ggctgcaaaa gctcatgctc tcagagccac gcccaggagt cctcctgcga 1320
 gccccatttc ccggtggagg cggatccctg gtgccgctgc gcagcggagg cggttcagtc 1380
 cctgataaaa ctgtgagatg gtgtgcagtg tcggagcatg aggccactaa gtgccagagt 1440
 ttccgctgacc atatgaaaag cgtcattcca tccgatggtc ccagtgttgc ttgtgtgaag 1500
 aaagcctcct accttgattg catcagggcc attgctgcaa acgaagcggg tgctgtgaca 1560
 ctggatgcag gtttggtgta tgatgcttac ctggctccca ataacctgaa gcctgtggtg 1620
 gcagagttct atgggtcaaa agaggatcca cagactttct attatgctgt tgctgtggtg 1680
 aagaaggata gtggcttcca gatgaaccag cttcgaggca agaagtcctg ccacacgggt 1740
 ctaggcaggt ccgctgggtg gaacatcccc ataggcttac tttactgtga cttacctgag 1800
 ccacgtaaac ctcttgagaa agcagtggtc aatttcttct cgggcagctg tgccccttgt 1860
 gcggatggga cggacttccc ccagctgtgt caactgtgtc cagggtgtgg ctgctccacc 1920
 cttaaccaat acttcggcta ctcaggagcc ttcaagtgtc tgaaggatgg tgctggggat 1980
 gtggcctttg tcaagcactc gactatattt gagaacttgg caaacaaggc tgacagggac 2040
 cagtatgagc tgctttgcct ggacaacacc cgggaagccgg tagatgaata caaggactgc 2100
 cacttgcccc aggtcccttc tcataccgtc gtggcccga gtatgggagg caaggaggac 2160
 ttgatctggg agcttctcaa ccaggcccag gaacattttg gcaaagaaa atcaaaagaa 2220
 ttccaactat tcagctctcc tcatgggaag gacctgctgt ttaaggactc tgcccacggg 2280
 tttttaaag tccccccag gatggatgcc aagatgtacc tgggctatga gtatgtcact 2340
 gccatccgga atctacggga aggcacatgc ccagaagccc caacagatga atgcaagcct 2400
 gtgaagtggg gtgcgctgag ccaccacgag aggctcaagt gtgatgagt gagtgtaac 2460
 agtgtagga aatagagtg tgtatcagca gagaccaccg aagactgcat cgccaagatc 2520

ES 2 676 874 T3

atgaatggag aagctgatgc catgagcttg gatggagggt ttgtctacat agcgggcaag 2580
 tgtgggtctgg tgcctgtctt ggcagaaaac tacaataaga gcgataattg tgaggatata 2640
 ccagaggcag ggtatTTTTgc tgtagcagtG gtgaagaaat cagcttctga cctcacctgg 2700
 gacaatctga aaggcaagaa gtccctgccat acggcagttg gcagaaccgc tggctggaac 2760
 atccccatgg gcctgctcta caataagatc aaccactgca gatttgatga atTTTTcagt 2820
 gaaggttGtg cccctgggtc taagaaagac tccagtctct gtaagctgtg tatgggctca 2880
 ggcctaaacc tgtgtgaacc caacaacaaa gagggatact acggctacac aggcgctttc 2940
 aggtgtctgg ttgagaaggG agatgtggcc tttgtgaaac accagactgt cccacagaac 3000
 actgggggaa aaaaccctga tccatgggct aagaatctga atgaaaaaga ctatgagttg 3060
 ctgtgccttg atggTaccag gaaaccctgtg gaggagtatg cgaactgcca cctggccaga 3120
 gccccgaatc acgctgtggT cacacggaaa gataaggaag cttgcgtcca caagatatta 3180
 cgtcaacagc agcacctatt tggaagcaac gtaactgact gctcgggcaa cTTTTgtttg 3240
 ttccggtcgg aaaccaagga ctttctgttc agagatgaca cagtatgttt ggccaaactt 3300
 catgacagaa acacatatga aaaatactta ggagaagaat atgtcaaggc tgttggtaac 3360
 ctgagaaaat gctccacctc atcactcctg gaagcctgca ctttccgtag accttaa 3417

5 <210> 25
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Cebador de FVII-F

10 <400> 25
 aggggcagca ctgcagagat tTcat 25

15 <210> 26
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Cebador de FVII-R

20 <400> 26
 tatgggattt ggtgccagga cagtt 25

25 <210> 27
 <211> 31
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

30 <220>
 <223> Cebador de FVII-S1

<400> 27
 aattgctagc atggtctccc aggcctcag g 31

ES 2 676 874 T3

	<210> 28	
	<211> 31	
	<212> ADN	
5	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Cebador de FVII-AS1	
	<400> 28	
10	aattaccggt gggaaatggg gctcgcagga g	31
	<210> 29	
	<211> 33	
15	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Cebador de Tf-S1	
20	<400> 29	
	atataccggt gtccctgata aaactgtgag atg	33
	<210> 30	
25	<211> 34	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
30	<223> Cebador de Tf-AS1	
	<400> 30	
	aattctcag ttaaggtcta cggaaagtgc aggc	34
	<210> 31	
35	<211> 36	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
40	<223> Cebador de GS-FV-AS1	
	<400> 31	
	ggatccgcct ccaccgggaa atggggctcg caggag	36
45	<210> 32	
	<211> 40	
	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
50	<220>	
	<223> Cebador de GS-Tf-S1	
	<400> 32	
55	ggtggaggcg gatccgtccc tgataaaact gtgagatggt	40
	<210> 33	
	<211> 48	
	<212> ADN	
60	<213> Secuencia artificial	
	<220>	
	<223> Cebador de GS3-S	
	<400> 33	
65	ccggtggagg cggttcaggc ggaggtggct ctggcggtgg cggatcca	48

ES 2 676 874 T3

5	<210> 34 <211> 48 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
	<220> <223> Cebador de GS3-AS	
10	<400> 34 acctccgcca agtccgcctc caccgagacc gccaccgcct aggtggcc	48
	<210> 35 <211> 50 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
15	<220> <223> Unidad de enlazador GS-2	
20	<400> 35 tattagatct ggcgagggtg gctctggcgg tggcggatcc accggtatta	50
	<210> 36 <211> 60 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
25	<220> <223> Enlazador GS1bc	
30	<400> 36 aattaccggt ggaggcggat ccctggtgcc gcgcggcagc ggaggcggtt caaccggtat	60
		60
35	<210> 37 <211> 58 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
	<220> <223> Cebador de enlazador helicoidal S	
40	<400> 37 aattaccggt gctgaagctg cagccaaaga agctgcagcc aaagaggccg cagctaag	58
	<210> 38 <211> 46 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
45	<220> <223> Cebador de enlazador helicoidal AS	
50	<400> 38 ttataccggt agcttttctgct gcggcttcct tagctgoggc ctcttt	46
	<210> 39 <211> 31 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
55	<220> <223> Cebador de albúmina-S	
60		

	<400> 39 gtgggatccg atgcacacaa gagtgagggtt g	31
5	<210> 40 <211> 35 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
10	<220> <223> Cebador de albúmina-AS	
	<400> 40 cacggatccc tataagccta aggcagcttg acttg	35
15	<210> 41 <211> 55 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
20	<220> <223> oligonucleótido 1	
	<400> 41 gtgctcgagc gggggatctg gcgggtctgg aggctctgga gggtcgggag gctct	55
25	<210> 42 <211> 74 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
30	<220> <223> oligonucleótido 2	
	<400> 42 caagggccct taccaggatc ccgaccctcc agaccgccca gatccccagc agcctccaga	60
35	gcctcccagc cctc	74
40	<210> 43 <211> 33 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
	<220> <223> Cebador de mut FVII(XhoI)-S	
45	<400> 43 gagcccatt tcctcgagc ccagcagccc tgg	33
50	<210> 44 <211> 33 <212> ADN <213> Secuencia artificial	
	<220> <223> Cebador de mut FVII(XhoI)-AS	
55	<400> 44 ccagggctgc tgggctcgag ggaaatgggg etc	33
60	<210> 45 <211> 31 <212> PRT <213> Secuencia artificial	

ES 2 676 874 T3

<220>
 <223> Enlazador GS (documento EP1816201)

<400> 45
 Ser Ser Gly Gly
 1 5 10 15
 Ser Gly Gly Ser Gly Gly Ser Gly Gly Ser Gly Gly Ser Gly Ser
 5 20 25 30

<210> 46
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> Cebador Nhe-Tf

15 <400> 46
 aattgctagc atgaggctcg ccgtg 25

<210> 47
 <211> 28
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

20

<220>
 <223> Cebador Tf-Age

25 <400> 47
 aattaccggt aggtctacgg aaagtgca 28

<210> 48
 <211> 25
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

30

<220>
 <223> Cebador Age-VII

35 <400> 48
 aattaccggt gccaacgcgt tcctg 25

40 <210> 49
 <211> 28
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

45 <220>
 <223> Cebador VII-Xho

50 <400> 49
 aattctcgag ttagggaaat ggggctcg 28

<210> 50
 <211> 32
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

55 <220>
 <223> Cebador TG del-S

60 <400> 50
 cagcggaggc ggttcagtcc ctgataaaac tg 32

ES 2 676 874 T3

5
<210> 51
<211> 32
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Cebador TG del-AS

10 <400> 51
cagttttatc agggactgaa ccgcctccgc tg 32

15 <210> 52
<211> 29
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

20 <220>
<223> Cebador T del-S

<400> 52
cgagcccat ttcccgtgg aggcggatc 29

25 <210> 53
<211> 29
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

30 <220>
<223> Cebador T del-AS

<400> 53
gatccgcctc caccgggaaa tggggctcg 29

REIVINDICACIONES

- 5 1. Una proteína de fusión que comprende factor VII (FVII) y transferrina, en la que dicha transferrina se une con el extremo C de dicho FVII, en la que dicha proteína de fusión comprende además un enlazador entre el FVII y la transferrina, en la que dicho FVII es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos 95 % de homología con la SEQ ID NO: 1, y en la que dicha transferrina es un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos 95 % de homología con la SEQ ID NO: 2.
- 10 2. La proteína de fusión de la reivindicación 1, en la que dicho FVII es un polipéptido que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 1.
3. La proteína de fusión de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que dicha transferrina es un polipéptido que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2.
- 15 4. La proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además un sitio de escisión de proteasa entre el extremo C de dicho FVII y dicha transferrina y en la que dicha proteasa es abundante en un tejido lesionado.
- 20 5. La proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el enlazador consiste en de 1 a 100 aminoácidos, de 1 a 75 aminoácidos o de 5 a 25 aminoácidos.
- 25 6. La proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que el enlazador tiene la secuencia de aminoácidos de una cualquiera de las SEQ ID NO: 3 a 11 o en la que el enlazador comprende un sitio de escisión de trombina, factor Xa, factor IXa o factor VIIa.
7. La proteína de fusión de la reivindicación 6, en la que el enlazador tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 12.
- 30 8. Un ADN que codifica la proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
9. El ADN de la reivindicación 8, en el que el DNA tiene la secuencia de nucleótidos de una cualquiera de las SEQ ID NO: 13 a 24.
- 35 10. Un vector recombinante que comprende el DNA de la reivindicación 8.
11. Una célula hospedadora que comprende el vector recombinante de la reivindicación 10.
- 40 12. La célula hospedadora de la reivindicación 11, en la que la célula se selecciona entre el grupo que consiste en célula CHO, célula BHK21, célula HEK293 y célula Hep G2.
13. La proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para su uso en terapia.

[Fig.1]

[Fig. 2]

[Fig.3]

[Fig.4]

[Fig.5]

[Fig.6]

[Fig. 7]

- 1: NovoSeven
- 2: FVII
- 3: FVII-Tf
- 4: FVII-GS1-Tf
- 5: FVII-GS1-T-Tf
- 6: FVII-GS3-Tf
- 7: FVII-GS15-Tf