19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 681 692**

51 Int. Cl.:

C07K 14/195 (2006.01)

A23C 9/12 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **29.03.2011 PCT/EP2011/054865**

87 Fecha y número de publicación internacional: **06.10.2011 WO11120993**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **29.03.2011 E 11713215 (9)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **02.05.2018 EP 2552945**

54 Título: **Polipéptidos que tienen actividad transgalactosilante**

30 Prioridad:

29.03.2010 US 318580 P
29.03.2010 EP 10158172

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
14.09.2018

73 Titular/es:

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
(100.0%)
Langebrogade 1
1411 Copenhagen K, DK

72 Inventor/es:

LARSEN, MORTEN KROG y
POULSEN, CHARLOTTE, HORSMANS

74 Agente/Representante:

ELZABURU, S.L.P

ES 2 681 692 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Polipéptidos que tienen actividad transgalactosilante

Campo de la invención

- 5 La presente invención se refiere a polipéptidos, específicamente polipéptidos que tienen actividad transgalactosilante y a los ácidos nucleicos que los codifican, y sus usos en, p. ej. productos lácteos.

Antecedentes de la invención

10 Los galactooligosacáridos (GOS) son hidratos de carbono que no son digeribles en seres humanos y animales que comprenden dos o más moléculas de galactosa, típicamente hasta nueve, unidas mediante enlaces glucosídicos. Los GOS también pueden incluir una o más moléculas de glucosa. Uno de los efectos beneficiosos de GOS es su capacidad de actuar como compuestos prebióticos estimulando selectivamente la proliferación de microorganismos colónicos beneficiosos, tales como bacterias, para proporcionar beneficios fisiológicos al consumidor. Los efectos sobre la salud contrastados han dado lugar a un creciente interés en los GOS como ingredientes alimentarios para diversos tipos de alimentos.

15 La enzima β -galactosidasa (EC 3.2.1.23) generalmente hidroliza la lactosa a los monosacáridos D-glucosa y D-galactosa. En la reacción enzimática normal de las β -galactosidasas, la enzima hidroliza lactosa y una transitoriamente el monosacárido galactosa en un complejo galactosa-enzima que transfiere galactosa al grupo hidroxilo del agua, que da como resultado la liberación de D-galactosa y D-glucosa. Sin embargo, a altas concentraciones de lactosa, algunas β -galactosidasas son capaces de transferir galactosa a los grupos hidroxilo de D-galactosa o D-glucosa en un proceso llamado transgalactosilación mediante el cual se producen galactooligosacáridos.

20 El género *Bifidobacterium* es uno de los tipos de cultivos de bacterias más comúnmente utilizados en la industria láctea para la fermentación de una variedad de productos lácteos. La ingestión de productos que contienen *Bifidobacterium* tiene además un efecto promotor de la salud. Este efecto no solo se logra por un pH reducido de los contenidos intestinales sino también por la capacidad de *Bifidobacterium* para repoblar la flora intestinal en individuos a los que se les ha alterado la flora intestinal por ejemplo por la ingesta de antibióticos. Además, *Bifidobacterium* tiene el potencial de desplazar los microorganismos intestinales potencialmente nocivos.

25 Los galactooligosacáridos son conocidos por potenciar el crecimiento de *Bifidobacterium*. Este efecto probablemente se logra a través de la capacidad única de *Bifidobacterium* para aprovechar los galactooligosacáridos como fuente de carbono. También se cree que el suplemento dietético de galactooligosacáridos tiene una serie de efectos de protección de enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, la ingesta de galactooligosacáridos ha demostrado ser altamente protectora contra el desarrollo de cáncer colorrectal en ratas. Por lo tanto, existe un gran interés en desarrollar métodos económicos y eficientes para producir galactooligosacáridos para uso en la industria para mejorar los suplementos dietéticos y los productos lácteos.

30 Se conoce un polipéptido beta-galactosidasa de *Ruminococcus/Blautia hansenii* que tiene 1807 aminoácidos (con SEQ ID NO: 12) de la base de datos UniProt, 24 de noviembre de 2009, "Subname: Full=Beta-galactosidase" XP002591904 obtenido del no. de acceso EBI UNIPROT: C9LAL1.

35 Se conoce una glicosidasa que tiene 1768 aminoácidos (con SEQ ID NO: 13) de la base de datos UniProt, 14 de octubre de 2008, "Subname: Full=Putative no characterised protein" XP002610554 obtenido del no. de acceso EBI UN-IPROT: B5CQV4.

40 Se ha descrito una lactasa extracelular de *Bifidobacterium bifidum* DSM20215 truncada con aproximadamente 580 aminoácidos (BIF3) como una enzima transgalactosilante en una solución que contiene lactosa solubilizada en agua (Jørgensen et al. (2001), Appl. Microbiol. Biotechnol., 57: 647 - 652). En el documento WO 2009/071539 se describe un fragmento truncado diferente comparado con BIF3 que da como resultado una hidrólisis eficiente y una producción muy baja de GOS cuando se ensaya en leche.

45 El documento WO 01/90317 describe un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante de *Bifidobacterium bifidum* (OLGA5) y su uso para producir productos lácteos.

50 Las enzimas lactasa de *Bifidobacterium bifidum* descritas anteriormente tienen la desventaja de que requieren altas concentraciones de lactosa para exhibir actividad transgalactosilasa o que tienen predominantemente actividad beta-galactosilasa (hidrolasa).

Todavía existe la necesidad de desarrollar enzimas que sean eficientes en la producción de GOS y que, además, puedan funcionar a bajos niveles de sustrato lactosa, tal como en leche.

Objeto de la invención

Es un objeto de las realizaciones de la invención proporcionar polipéptidos que tengan actividad transgalactosilante. Polipéptidos que tienen una relación útil de actividad de transgalactosilación a hidrólisis y, por lo tanto, son productores eficientes de GOS cuando se incuban con lactosa incluso a bajos niveles de lactosa tal como en un producto a base de leche. Describimos un método para la producción de galactooligosacáridos (GOS) in situ en productos lácteos. También describimos un método para desarrollar un método más barato y más eficiente para la producción de galactooligosacáridos (GOS) para uso en la industria.

Compendio de la invención

La presente invención describe un polipéptido aislado que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 80% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO 1, cuyo polipéptido tiene una longitud entre 900 y 1180 aminoácidos. Los polipéptidos descritos en la presente memoria son sorprendentemente capaces de producir galactooligosacáridos in situ cuando se incuban con lactosa tal como leche. Por lo tanto, cuando el polipéptido, como se describe en la presente memoria, o una célula anfitriona que expresa el polipéptido se incuban con lactosa bajo condiciones apropiadas, se producen galactooligosacáridos con una alta eficiencia y, por lo tanto, se reduce la lactosa. La presencia de galactooligosacáridos en productos lácteos u otros productos comestibles tiene la ventaja de potenciar el crecimiento de *Bifidobacterium sp.* promotora de la salud en el producto o en la flora intestinal del consumidor después de la ingesta del producto o de ambos.

También describimos un polipéptido aislado que tiene actividad transgalactosilante seleccionada del grupo que consiste en:

a. un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1,

b. un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 2,

c. un polipéptido codificado por un polinucleótido que se hibrida bajo al menos condiciones de baja rigurosidad con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 10 que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii);

d. un polipéptido codificado por un polinucleótido que se hibrida bajo al menos condiciones de baja rigurosidad con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 11 que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 2; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii);

e. un polipéptido que comprende una sustitución conservadora, delección y/o inserción de uno o más aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y

f. un polipéptido que comprende una sustitución conservadora, delección y/o inserción de uno o más aminoácidos de SEQ ID NO: 2,

siempre que el polipéptido de los puntos anteriores a, c, y e tenga como máximo una longitud de 1806 aminoácidos y siempre que el polipéptido de los puntos anteriores b, d, y f tenga como máximo una longitud de 1767 aminoácidos.

En un aspecto, se describe en la presente memoria un método para expresar un polipéptido, comprendiendo el método obtener una célula como se describe en la presente memoria y expresar el polipéptido en la célula, y opcionalmente purificar el polipéptido. En un aspecto adicional, se describe en la presente memoria una composición que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria, preferiblemente una composición alimentaria, más preferiblemente un producto lácteo. En un aspecto adicional, se describe en la presente memoria un método para producir un producto alimentario tratando un sustrato que comprende lactosa con un polipéptido como se describe en la presente memoria tal como producir un producto lácteo tratando un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, los polipéptidos se utilizan para tratar un sustrato con una beta-galactosidasa hidrolizante. En un aspecto adicional, se describe en la presente memoria un producto alimentario, preferiblemente un producto lácteo, que comprende una enzima transgalactosilante obtenida a partir de *Ruminococcus hansenii* o *Ruminococcus lactaris*, preferiblemente como se define en los puntos a-f anteriores, y más preferiblemente un polipéptido como se define adicionalmente en la presente memoria. En un aspecto adicional, se describe en la presente memoria un galactooligosacárido o composición del mismo obtenido tratando un sustrato que comprende lactosa con un polipéptido como se describe en la presente memoria.

En un aspecto, se proporciona un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene

- a. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y/o
- b. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2.

5 En otro aspecto, se proporciona un polipéptido que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1 medida a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene

- a. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y/o
- b. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:2.

10 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8. En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5 para producir galactooligosacáridos. En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8 para producir galactooligosacáridos.

15 En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene

- 20 a. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3,
- b. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 4,
- c. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 6, o
- d. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 7,

para producir galactooligosacáridos.

25 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1 medida a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción. En un aspecto adicional, se proporciona un ácido nucleico capaz de codificar un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un plásmido que comprende un ácido nucleico como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un vector de expresión que comprende un ácido nucleico como se describe en la presente memoria, o capaz de expresar un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona una célula anfitriona que comprende, y preferiblemente transformada con, un plásmido como se describe en la presente memoria, o un vector de expresión como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona una célula capaz de expresar un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un método para expresar un polipéptido, comprendiendo el método obtener una célula anfitriona o una célula como se describe en la presente memoria y la expresión del polipéptido a partir de la célula o célula anfitriona, y opcionalmente la purificación del polipéptido. En un aspecto adicional, se proporciona una composición que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria y un estabilizador. En un aspecto adicional, se proporciona una composición que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria y un sustrato de hidrato de carbono. En un aspecto adicional, se proporciona un método para producir un producto lácteo mediante tratamiento de un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1, al menos 2,5, al menos 3, al menos 4, al menos 5, al menos 6, al menos 7, al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11 o al menos 12, medido a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción. En un aspecto adicional, se proporciona un método para producir un producto lácteo mediante tratamiento de un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un uso de una célula como se describe en la presente memoria para producir un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, producto de leche fermentada, suplemento dietético y producto comestible probiótico. En un aspecto adicional, se proporciona un producto lácteo que comprende una célula como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un producto lácteo que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un producto lácteo que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria en una concentración de 0,01-1000 ppm. En un aspecto adicional, se proporciona un producto lácteo que comprende un polipéptido inactivado como se describe en la presente memoria.

55 En un aspecto adicional, se proporciona un producto lácteo que comprende GOS formado in situ mediante un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la

presente memoria para producir galactooligosacáridos. En un aspecto adicional, se proporciona un uso de un polipéptido transgalactosilante descrito en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para ser parte de un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, productos lácteos fermentados, suplementos dietéticos y productos comestibles probióticos. En un aspecto adicional, se proporciona un uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para potenciar el crecimiento de *Bifidobacterium*. En un aspecto adicional, se proporciona un uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para potenciar el crecimiento de *Bifidobacterium* en una fermentación con cultivo mixto. En un aspecto adicional, se proporciona un método para producir un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria, que comprende cultivar una célula como se describe en la presente memoria en un medio de cultivo adecuado bajo condiciones que permiten la expresión de dicho polipéptido, y recuperar el polipéptido resultante del cultivo. En un aspecto adicional, un método para producir galactooligosacáridos, que comprende el contacto de un polipéptido como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria con una solución a base de leche que comprende lactosa.

Lista de secuencias

- La SEQ ID NO: 1 es un fragmento truncado de 1125 aminoácidos de la SEQ ID NO: 12.
- La SEQ ID NO: 2 es un fragmento truncado de 1150 aminoácidos de la SEQ ID NO: 13.
- La SEQ ID NO: 3 es los restos de aminoácidos 559-649 de la SEQ ID NO: 1.
- La SEQ ID NO: 4 es los restos de aminoácidos 579-649 de la SEQ ID NO: 1.
- La SEQ ID NO: 5 es los restos de aminoácidos 579-636 de la SEQ ID NO: 1.
- La SEQ ID NO: 6 es los restos de aminoácidos 575-665 de la SEQ ID NO: 2.
- La SEQ ID NO: 7 es los restos de aminoácidos 594-665 de la SEQ ID NO: 2.
- La SEQ ID NO: 8 es los restos de aminoácidos 594-652 de la SEQ ID NO: 2.
- La SEQ ID NO: 9 es un péptido señal del vector de expresión de *Bacillus subtilis* pBN.
- La SEQ ID NO: 10 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 1 que incluye la secuencia que codifica el péptido señal.
- La SEQ ID NO: 11 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 2 que incluye la secuencia que codifica el péptido señal.
- La SEQ ID NO: 12 es una beta-galactosidasa de *Ruminococcus/Blautia hansenii* DSM 20583.
- La SEQ ID NO: 13 es una glucosidasa de *Ruminococcus lactaris* ATCC 29176.
- SEQ ID NO: 14 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 12 sin la secuencia señal.
- SEQ ID NO: 15 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 13 sin la secuencia señal.
- La SEQ ID NO: 16 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 1.
- La SEQ ID NO: 17 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 2.

Leyendas de las figuras

- La Fig. 1 muestra un mapa de plásmido de la construcción de expresión de *Ruminococcus hansenii*. La secuencia codificante de rhBIF3d3 se fusionó en fase con la secuencia señal aprE utilizando BssHII y PaeI como sitios de restricción.
- La Fig. 2 muestra la acumulación de galactosa y glucosa durante el tratamiento enzimático de una solución de lactosa al 5% p/p en tampón T con Lactozym® como control, *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1), *Ruminococcus lactaris* (SEQ ID NO: 2) y *Bifidobacterium bifidum* BIF3d3 (truncado) (como se describe por Jørgensen et al. (2001), Appl. Microbiol. Biotechnol., 57: 647 - 652 y patente EP 1.283.876).
- La Fig. 3 muestra el resultado de la cromatografía en capa fina de los polipéptidos en 9% p/p de leche reconstituida que proporciona una concentración final de lactosa de 5% p/p. Los polipéptidos se dosificaron en base a la actividad LAU determinada como se describe en el ejemplo 1 a una concentración final de 6 LAU/ml.

La Fig. 4 muestra los resultados de la cromatografía de intercambio aniónico de variantes de la *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1). El gel es un Nu-PAGE 4 - gel de acrilamida al 12% teñido con tinción azul brillante de coomassie.

5 Descripción detallada de la invención

En la presente memoria se describe un polipéptido aislado que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 80% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1, cuyo polipéptido tiene una longitud entre 900 y 1180 aminoácidos.

10 En la presente memoria se describe un polipéptido aislado que tiene actividad transgalactosilante seleccionada del grupo que consiste en:

a. un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1,

b. un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 2,

15 c. un polipéptido codificado por un polinucleótido que se hibrida bajo al menos condiciones de baja rigurosidad con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 10 que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii);

d. un polipéptido codificado por un polinucleótido que se hibrida bajo al menos condiciones de baja rigurosidad con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 11 que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 2; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii);

20 e. un polipéptido que comprende una sustitución conservadora, delección y/o inserción de uno o más aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y

f. un polipéptido que comprende una sustitución conservadora, delección y/o inserción de uno o más aminoácidos de SEQ ID NO: 2,

25 siempre que el polipéptido de los puntos anteriores a, c, y e tenga como máximo una longitud de 1806 aminoácidos y siempre que el polipéptido de los puntos b, d, y f anteriores tenga como máximo una longitud de 1767 aminoácidos.

30 De acuerdo con esta descripción detallada, se aplican las siguientes abreviaturas y definiciones. Se debe observar que tal como se utiliza en la presente memoria, las formas singulares "un", "una" y "el" incluyen referencias plurales a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a "un polipéptido" incluye una pluralidad de tales polipéptidos, y la referencia a "la formulación" incluye la referencia a una o más formulaciones y equivalentes de los mismos conocidos por los expertos en la técnica, y así sucesivamente.

35 A menos que se defina lo contrario, todos los términos técnicos y científicos utilizados en la presente memoria tienen el mismo significado como se entiende comúnmente por un experto en la técnica. Los siguientes términos se proporcionan a continuación.

"Transgalactosilasa" significa una enzima que, entre otras cosas, es capaz de transferir galactosa a los grupos hidroxilo de D-galactosa o D-glucosa por lo que se producen galactooligosacáridos. En un aspecto, se identifica una transgalactosilasa mediante reacción de la enzima sobre lactosa en la que la cantidad de galactosa generada es menor que la cantidad de glucosa generada en cualquier momento dado.

40 En el presente contexto, el término "actividad transgalactosilante" significa la transferencia de una parte de galactosa a una molécula distinta de agua y se mide como $[\text{glucosa}] - [\text{galactosa}]$ generada en cualquier momento dado durante la reacción.

En el presente contexto, el término "actividad β -galactosidasa" significa la capacidad de una enzima para hidrolizar β -galactósidos tal como, por ejemplo, lactosa en monosacáridos, glucosa y galactosa.

45 En el presente contexto, el término "actividad de transgalactosilación relativa" significa $([\text{glucosa}] - [\text{galactosa}] * 100) / [\text{glucosa}]$ medida en un punto de tiempo después de 15 minutos de tiempo de reacción.

En el presente contexto, el término $[\text{glucosa}]$ significa la concentración de glucosa en % en peso medida mediante HPLC.

50 En el presente contexto, el término $[\text{galactosa}]$ significa la concentración de galactosa en % en peso medida mediante HPLC.

En el presente contexto, el término "después de 15 min de reacción" significa la cantidad de tiempo que debe pasar antes de la medición de la actividad después de la incubación con el polipéptido descrito en la presente memoria en un ensayo.

- 5 En un aspecto, la actividad se mide después de 15 min de reacción, 30 min de reacción, 60 min de reacción, 90 min de reacción, 120 min de reacción o 180 min de reacción. Por lo tanto, en un aspecto, como ejemplo la actividad transgalactosilante relativa es medida 15 minutos después de la adición de la enzima, tal como 30 minutos después de la adición de la enzima, tal como 60 minutos después de la adición de la enzima, tal como 90 minutos después de la adición de la enzima, tal como 120 minutos después de la adición de la enzima o 180 minutos después de la adición de la enzima.

En el presente contexto, el término "relación de actividad transgalactosilante:actividad β -galactosidasa" significa ([glucosa]-[galactosa]/[galactosa]).

- 15 En el presente contexto, el término "lactosa ha sido transgalactosilada" significa que una molécula de galactosa se ha unido covalentemente a la molécula de lactosa tal como, por ejemplo, unida covalentemente a cualquiera de los grupos hidroxilo libres en la molécula de lactosa o generada por transgalactosilación interna por ejemplo formando alolactosa.

- 20 En el presente contexto, el término "ensayo basado en leche" significa un ensayo realizado en leche, leche reconstituida o soluciones que contienen constituyentes de leche principales tales como, por ejemplo, lactosa. Se puede realizar un ensayo basado en leche preparando muestras en leche reconstituida al 9% p/p a partir de leche en polvo desnatada (tal como, p. ej., Humana Milk Union, DE NW508 EG) dando una concentración final de lactosa de 5% p/p. Las enzimas se dosifican basándose en la actividad de LAU determinada como se describe a continuación, dando la concentración final deseada en LAU/ml.

- 25 Se toma una muestra antes de la adición de la enzima y se toman muestras adicionales en puntos de tiempo indicados y las enzimas se inactivan inmediatamente incubando a 95°C durante 10 minutos. Las muestras se diluyen 1:10 y se aplican 2 μ l sobre placas de gel de sílice 60 HPTLC activadas (161°C durante 10 min) (Merck Cat # 1.05641.0001) con un CAMAG Automatic TLC Sampler 4. Las placas de TLC se eluyen con un eluyente que contiene (80) acetonitrilo: (20) acetato de etilo: (50) 1-propanol: (40) agua. Las muestras se visualizan mediante calentamiento (161°C durante 10 min) y se dejan enfriar antes de sumergirlas en H₂SO₄ al 5% p/p en etanol al 99,9% p/p. Las placas se desarrollan con calentamiento a 161°C durante 3 min.

- 30 En un aspecto, tal ensayo es como se describe en el ejemplo 3.

- 35 En el contexto de la presente solicitud, 1 unidad de lactasa (1 LAU) es la cantidad de enzima que libera 1 micromol de glucosa por minuto en tampón M a pH 6,5 y 37°C con una concentración de lactosa de 4,75% p/v. El tampón M se prepara disolviendo 3,98 g de C₆H₅Na₃O₇·5 H₂O, 8,31 g de ácido cítrico, 0,9 g de K₂SO₄, 2,6 g de K₂HPO₄, 7,35 g de KH₂PO₄, 5,45 g de KOH, 4,15 g, MgCl₂ 6H₂O, 3,75 g de CaCl₂ 2H₂O y 1,4 g de NaHCO₃ en 4 litros de agua, añadiendo 12,5 ml de NaOH 4N, ajustando a pH 6,5 utilizando HCl, y agregando agua hasta un volumen total de 5 litros.

- 40 La actividad en LAU de una lactasa específica se puede determinar mediante medición directa de la glucosa liberada a partir de lactosa bajo las condiciones descritas anteriormente. El experto sabrá cómo determinar tal actividad. Alternativamente, la actividad se puede determinar utilizando el ensayo de actividad de lactasa descrito en el Ejemplo 1 de la presente solicitud. Aquí, la actividad se obtiene comparando con una curva estándar con una lactasa de actividad conocida, y la actividad de la muestra desconocida se calcula a partir de esto. La lactasa de actividad conocida puede, p. ej., ser Lactozym obtenida de Novozymes A/S, Dinamarca.

En el presente contexto, el término "cuyo polipéptido está liofilizado" significa que el polipéptido se ha obtenido liofilizando un líquido del polipéptido a una presión apropiada y durante un período apropiado retirando el agua.

- 45 En el presente contexto, el término "cuyo polipéptido está en solución" se refiere a un polipéptido que es soluble en un disolvente sin precipitación de la solución. Un disolvente para este fin incluye cualquier medio en el que pueda aparecer el polipéptido, tal como un tampón acuoso o una solución salina, un caldo de fermentación o el citoplasma de un anfitrión de expresión.

- 50 En el presente contexto, el término "estabilizador" significa cualquier estabilizador para estabilizar el polipéptido, p. ej., un poliol tal como, p. ej., glicerol o propilenglicol, un azúcar o un alcohol de azúcar, ácido láctico, ácido bórico o un derivado de ácido bórico (p. ej., un éster de borato aromático). En un aspecto, el estabilizador es glicerol.

En el presente contexto, el término "sustrato de hidrato de carbono" significa un compuesto orgánico con la fórmula general C_m(H₂O)_n, es decir, que consiste únicamente en carbono, hidrógeno y oxígeno, los dos últimos en la proporción de átomos 2:1, tal como un disacárido.

- 55 En el presente contexto, el término "disacárido" es dos unidades monosacáridas unidas por un enlace covalente conocido como un enlace glucosídico formado mediante una reacción de deshidratación, que da como resultado la

pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro. La fórmula de disacáridos no modificados es $C_{12}H_{22}O_{11}$. En un aspecto, el disacárido es lactulosa, trehalosa, ramnosa, maltosa, sacarosa, lactosa o celobiosa. En un aspecto adicional, el disacárido es lactosa.

- 5 El término "aislado" significa que la secuencia está al menos sustancialmente libre de al menos otro componente con el que la secuencia está asociado de forma natural en la naturaleza y tal como se encuentra en la naturaleza. En un aspecto, "polipéptido aislado" como se utiliza en la presente memoria se refiere a un polipéptido que es al menos 30% puro, al menos 40% puro, al menos 60% puro, al menos 80% puro, al menos 90% puro, y al menos 95% puro, según se determinó mediante SDS-PAGE.
- 10 El término "polipéptido sustancialmente puro" significa en la presente memoria una preparación de polipéptido que contiene como máximo 10%, preferiblemente como máximo 8%, más preferiblemente como máximo 6%, más preferiblemente como máximo 5%, más preferiblemente como máximo 4%, como máximo 3% , incluso más preferiblemente como máximo 2%, más preferiblemente como máximo 1%, e incluso más preferiblemente como máximo 0,5% en peso de otro material polipeptídico con el que está asociado de forma natural. Por lo tanto, se
- 15 prefiere que el polipéptido sustancialmente puro sea al menos 92% puro, preferiblemente al menos 94% puro, más preferiblemente al menos 95% puro, más preferiblemente al menos 96% puro, más preferiblemente al menos 96% puro, más preferiblemente al menos 97% puro, más preferiblemente al menos 98% puro, incluso más preferiblemente al menos 99%, lo más preferiblemente al menos 99,5% puro, e incluso lo más preferiblemente 100% puro en peso del material polipeptídico total presente en la preparación. Los polipéptidos descritos en la presente
- 20 memoria están preferiblemente en una forma sustancialmente pura. En particular, se prefiere que los polipéptidos estén en "forma esencialmente pura", es decir, que la preparación del polipéptido esté esencialmente libre de otro material polipeptídico con el que esté asociado de forma natural. Esto se puede lograr, por ejemplo, preparando el polipéptido por medio de métodos recombinantes bien conocidos o mediante métodos de purificación clásicos. En la presente memoria, el término "polipéptido sustancialmente puro" es sinónimo de los términos "polipéptido aislado" y
- 25 "polipéptido en forma aislada".

El término "purificado" o "puro" significa que un componente dado está presente en un estado de alto nivel p. ej. al menos aproximadamente 51% puro, o al menos aproximadamente 75%, o al menos aproximadamente 80%, o al menos aproximadamente 90% puro, o al menos aproximadamente 95% puro o al menos aproximadamente 98% puro. El componente es deseablemente el componente activo predominante presente en una composición.

- 30 El término "microorganismo" en el presente contexto incluye cualquier microorganismo que podría comprender una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido que tiene las propiedades específicas como se definen en la presente memoria y/o productos obtenidos del mismo.

En el presente contexto, "microorganismo" puede incluir cualquier bacteria u hongo que sea capaz de fermentar un sustrato de leche.

- 35 El término "célula anfitriona" - en el presente contexto incluye cualquier célula que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido que tiene las propiedades específicas como se define en la presente memoria o un vector de expresión como se describió anteriormente y que se utiliza en la producción de un polipéptido que tiene las propiedades específicas como se define en la presente memoria. En un aspecto, la producción es producción recombinante.

- 40 El término "leche", en el contexto de la presente invención, se debe entender como la secreción láctea obtenida a partir de cualquier mamífero, tal como vacas, ovejas, cabras, búfalos o camellos.

- En el presente contexto, el término "sustrato a base de leche" significa cualquier material de leche cruda y/o procesada o un material derivado de constituyentes de leche. Los sustratos útiles a base de leche incluyen pero no se limitan a soluciones/suspensiones de cualquier leche o productos lácteos que contengan lactosa, tal como leche
- 45 entera o baja en grasa, leche desnatada, suero de leche, leche en polvo reconstituida, leche condensada, soluciones de leche en polvo, leche UHT, suero, filtrado de suero, suero ácido o nata. Preferiblemente, el sustrato a base de leche es leche o una solución acuosa de leche desnatada en polvo. El sustrato a base de leche puede estar más concentrado que la leche cruda. El sustrato a base de leche puede tener una proporción de proteína a lactosa de al menos 0,2, preferiblemente al menos 0,3, al menos 0,4, al menos 0,5, al menos 0,6 o, lo más preferiblemente, al
- 50 menos 0,7. El sustrato a base de leche se puede homogeneizar y/o pasteurizar según métodos conocidos en la técnica.

"Homogenizar" como se utiliza en la presente memoria significa un mezclado intensivo para obtener una suspensión o emulsión soluble. Se puede realizar para dividir la grasa de la leche en tamaños más pequeños para que ya no se separe de la leche. Esto se puede lograr forzando la leche a alta presión a través de pequeños orificios.

- 55 "Pasteurizar" como se utiliza en la presente memoria significa reducir o eliminar la presencia de organismos vivos, tales como microorganismos, en el sustrato a base de leche. Preferiblemente, la pasteurización se logra manteniendo una temperatura especificada durante un período de tiempo específico. La temperatura especificada generalmente se alcanza calentando. La temperatura y duración se pueden seleccionar para matar o inactivar

ciertas bacterias, tales como bacterias dañinas, y/o para inactivar enzimas en la leche. Una etapa de enfriamiento rápido puede seguir.

5 Un "producto alimentario" o "composición alimentaria" en el presente contexto puede ser cualquier alimento comestible o producto alimentario adecuado para el consumo por un animal o ser humano.

Un "producto lácteo" en el presente contexto puede ser cualquier producto alimentario en donde uno de los principales constituyentes esté basado en leche. Preferible, el componente principal es a base de leche. Más preferiblemente, el constituyente principal es un sustrato a base de leche que se ha tratado con una enzima que tiene actividad transgalactosilante.

10 En el presente contexto, "uno de los principales constituyentes" significa un constituyente que tiene una materia seca que constituye más del 20%, preferiblemente más del 30% o más del 40% de la materia seca total del producto lácteo, mientras que "el principal constituyente" significa un constituyente que tiene una materia seca que constituye más del 50%, preferiblemente más del 60% o más del 70% de la materia seca total del producto lácteo.

15 Un "producto lácteo fermentado" en el presente contexto se debe entender como cualquier producto lácteo en donde cualquier tipo de fermentación forma parte del proceso de producción. Ejemplos de productos lácteos fermentados son productos como yogur, suero de leche, nata fresca, requesón y queso fresco. Un producto lácteo fermentado se puede producir mediante cualquier método conocido en la técnica.

20 El término "fermentación" significa la conversión de hidratos de carbono en alcoholes o ácidos a través de la acción de un microorganismo tal como un cultivo iniciador. En un aspecto, la fermentación comprende la conversión de lactosa en ácido láctico.

25 En el presente contexto, el término "dominios Pfam" significa regiones dentro de una secuencia proteica que se identifican como Pfam-A o Pfam-B basadas en alineamientos de secuencias múltiples y la presencia de Hidden Markov Motifs ("The Pfam protein families database": RD Finn, J. Mistry, J. Tate, P. Coggill, A. Heger, JE Pollington, OL Gavin, P. Gunasekaran, G. Ceric, K. Forslund, L. Holm, EL Sonnhammer, SR Eddy, A. Bateman Nucleic Acids Research (2010) Database Issue 38: D211-222.). Como ejemplos de dominios Pfam, se pueden mencionar Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y el dominio similar a Ig bacteriana (grupo 4) (PF07532).

30 Como se utiliza en la presente memoria "una posición que corresponde a la posición" significa que se realiza un alineamiento como se describe en la presente memoria entre un polipéptido pregunta particular y el polipéptido de referencia. La posición que corresponde a una posición específica en el polipéptido de referencia se identifica luego como el aminoácido correspondiente en el alineamiento con la identidad de secuencia más alta.

En un aspecto, se proporciona un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácido que tiene

- a. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácido de SEQ ID NO: 1, y/o
- 35 b. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácido de SEQ ID NO: 2.

En un aspecto, se proporciona un polipéptido, en donde la secuencia de aminoácido comprende al menos uno o más restos de aminoácidos seleccionados de los siguientes grupos:

- a. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/N/Q en una posición que corresponde a la posición 576 en la SEQ ID NO: 1,
- 40 b. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/N/Q en una posición que corresponde a la posición 588 en la SEQ ID NO: 1,
- c. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en E/D/Q/N en una posición que corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 1 y/o
- 45 d. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/Q/N en una posición que corresponde a la posición 625 en la SEQ ID NO: 1.

En un aspecto, se proporciona un polipéptido, en donde la secuencia de aminoácido comprende al menos uno o más restos de aminoácidos seleccionados de los siguientes grupos:

- a. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/N/Q en una posición que corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 2,
- 50 b. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/N/Q en una posición que corresponde a la posición 604 en la SEQ ID NO: 2,

c. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en E/D/Q/N en una posición que corresponde a la posición 608 en la SEQ ID NO: 2 y/o

5 d. un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D/E/Q/N en una posición que corresponde a la posición 641 en la SEQ ID NO: 2.

Se ha encontrado que el aminoácido en una posición que corresponde a la posición 576, 588, 592 y 625 en la SEQ ID NO: 1 y los respectivos aminoácidos en una posición que corresponde a la posición 592, 604, 608 y 641 en la SEQ ID NO: 2 tienen un efecto sobre la actividad de los polipéptidos descritos en la presente memoria.

10 En un aspecto, se describe en la presente memoria un polipéptido, en donde la secuencia de aminoácidos comprende al menos uno o más restos de aminoácidos ácidos tales como D o E, en una posición que corresponde a la posición 576, 588, 592 y 625 en la SEQ ID NO: 1 o en una posición que corresponde a la posición 592, 604, 608 y 641 en la SEQ ID NO: 2.

15 En otro aspecto, describimos un polipéptido que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1 medida a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene

a. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y/o

b. al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2.

20 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8. En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5 para producir galactooligosacáridos. En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8 para producir galactooligosacáridos.

25 En un aspecto adicional, se proporciona el uso de un polipéptido que tiene actividad transgalactosilante que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene

a. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3,

30 b. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 4,

c. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 6, o

d. al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 7,

para producir galactooligosacáridos.

35 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, y al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5.

En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2, y al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8.

40 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que contiene uno o más dominios Pfam seleccionados de: Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y dominio similar a Ig bacteriana (grupo 4) (PF07532). En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que contiene los dominios Pfam Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y el dominio similar a Ig bacteriano (grupo 4) (PF07532). En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que contiene los dominios Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703) y Glyco_hydro 2C (PF02836) cuyos dominios constituyen el dominio catalítico del polipéptido.

45 En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos y que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1, al menos 2,5, al menos 3, al menos 4, al menos 5, al menos 6, al menos 7, al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11 o al menos 12 medidos a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 15 o 30 minutos de reacción. En un aspecto adicional, el polipéptido se obtiene a partir de *Ruminococcus hansenii* o *Ruminococcus lactaris*.

- 5 En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria tienen una actividad transgalactosilante tal que más del 20%, más del 30%, más del 40%, hasta el 50% de la lactosa inicial está transgalactosilada como se mide a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción.
- En un aspecto adicional, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria tienen una actividad β -galactosidasa tal que menos del 80%, menos del 70%, menos del 60%, menos del 50%, menos del 40%, menos del 30%, menos del 20% de la lactosa se ha hidrolizado, como se mide a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción.
- 10 En un aspecto, la actividad β -galactosidasa y/o la actividad transgalactosilante se miden a una concentración de 6 LAU/ml, 3 LAU/ml o 1 LAU/ml.
- En un aspecto adicional, la presente memoria describe polipéptido o polipéptidos que tienen una o más de las siguientes características:
- 15 a) una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1, al menos 2,5, al menos 3, al menos 4, al menos 5, al menos 6, al menos 7, al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11, o al menos 12 como se mide a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche a 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción, y/o
- 20 b) tiene una actividad transgalactosilante tal que más del 20%, más del 30%, más del 40% y hasta el 50% de la lactosa inicial se ha transgalactosilado como se mide a una concentración de 6 LAU/ml en un ensayo basado en leche en 37°C y 5% p/p de lactosa después de 30 minutos de reacción.
- En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3. En otro aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 4. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 6. En un aspecto adicional, se proporciona un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 94% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 7.
- 25 Las proteínas generalmente están compuestas por una o más regiones funcionales, comúnmente denominadas dominios. La presencia de diferentes dominios en diversas combinaciones en diferentes proteínas da lugar al repertorio diverso de proteínas que se encuentran en la naturaleza. Una forma de describir los dominios es con la ayuda de la base de datos Pfam que es una gran colección de familias de proteínas como se describe en "The Pfam protein families database": RD Finn, J. Mistry, J. Tate, P. Coggill, A Heger, JE Pollington, OL Gavin, P. Gunasekaran, G. Ceric, K. Forslund, L. Holm, E.L. Sonnhammer, S.R. Eddy, A. Bateman Nucleic Acids Research (2010) Database Issue 38: D211-222. Cada familia está representada por alineamientos de secuencias múltiples y modelos de Markov ocultos (HMM). En un aspecto adicional, los presentes autores han descubierto que el o los polipéptidos proporcionados en la presente memoria contienen uno o más de los dominios Pfam Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y dominio similar a Ig bacteriana (grupo 4) (PF07532). En un aspecto, el o los polipéptidos proporcionados en la presente memoria contienen Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y dominio similar a Ig bacteriana (grupo 4) (PF07532).
- 30 En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tienen un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E, N y Q en una posición que corresponde a la posición 576 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E y N en una posición que corresponde a la posición 576 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D y E en una posición que corresponde a la posición 576 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos cuyo resto de aminoácido D en una posición corresponde a la posición 576 en la SEQ ID NO: 1.
- 35 En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E, N y Q en una posición que corresponde a la posición 588 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E y N en una posición que corresponde a la posición 588 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de
- 40
- 45
- 50
- 55

aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D y E en una posición que corresponde a la posición 588 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos cuyo resto de aminoácido D en una posición corresponde a la posición 588 en la SEQ ID NO: 1.

5 En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E, N y Q en una posición que corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E y Q en una posición que corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D y E en una posición que corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos cuyo resto de aminoácido E en una posición corresponde a la posición 592 en la SEQ ID NO: 1.

10 En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E, N y Q en una posición que corresponde a la posición 625 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D, E y N en una posición que corresponde a la posición 625 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene un resto de aminoácido seleccionado del grupo que consiste en D y E en una posición que corresponde a la posición 625 en la SEQ ID NO: 1. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos cuyo resto de aminoácido D en una posición corresponde a la posición 625 en la SEQ ID NO: 1.

15 En un aspecto, los polipéptidos tienen actividad transgalactosilante útil en un intervalo de pH de 4-9, tal como 5-8, tal como 5,5-7,5.

20 Describimos polipéptidos que tienen un cierto grado de identidad de secuencia u homología de secuencia con la o las secuencias de aminoácidos definidas en la presente memoria o con un polipéptido que tiene las propiedades específicas definidas en la presente memoria. La presente invención abarca, péptidos que tienen un grado de identidad de secuencia de al menos 80% con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1, cuyo polipéptido tiene una longitud entre 900 y 1180 aminoácidos.

25 En un aspecto, la secuencia de aminoácidos y/o la secuencia de nucleótidos homóloga debería proporcionar y/o codificar un polipéptido que retiene la actividad transgalactosilante funcional y/o potencia la actividad transgalactosilante en comparación con un polipéptido de SEQ ID NO: 1 o 2.

30 En el presente contexto, se toma una secuencia homóloga para incluir una secuencia de aminoácidos que puede ser al menos 66%, 70%, 75%, 78%, al menos 80%, al menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al menos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 99%, idéntica a la secuencia encontrada. Típicamente, los homólogos comprenderán los mismos sitios activos, etc., que la secuencia de aminoácidos encontrada. Aunque la homología también se puede considerar en términos de similitud (es decir, restos de aminoácidos que tienen propiedades/funciones químicas similares), en el presente contexto se prefiere expresar la homología en términos de identidad de secuencia.

35 Las comparaciones de identidad de secuencia se pueden realizar a simple vista, o más habitualmente, con la ayuda de programas de comparación de secuencias fácilmente disponibles. Estos programas informáticos disponibles en el mercado utilizan algoritmos de comparación complejos para alinear dos o más secuencias que reflejan mejor los eventos evolutivos que podrían haber conducido a la o las diferencias entre las dos o más secuencias. Por lo tanto, estos algoritmos operan con un sistema de puntuación que recompensa el alineamiento de aminoácidos idénticos o similares y penaliza la inserción de huecos, extensiones de huecos y el alineamiento de aminoácidos no similares. El sistema de puntuación de los algoritmos de comparación incluye:

- 40 i) asignación de una puntuación de penalización cada vez que se inserta un hueco (puntuación de penalización por huecos),
- ii) asignación de una puntuación de penalización cada vez que se extiende un hueco existente con una posición adicional (puntuación de penalización por extensión),
- 45 iii) asignación de puntuaciones altas al alineamiento de aminoácidos idénticos, y
- iv) asignación de puntuaciones variables al alineamiento de aminoácidos no idénticos.

La mayoría de los programas de alineamiento permiten modificar las penalizaciones por huecos. Sin embargo, se prefiere utilizar los valores predeterminados cuando se utiliza tal software para comparaciones de secuencias.

55 Las puntuaciones dadas para alineamiento de aminoácidos no idénticos se asignan según una matriz de puntuación también llamada matriz de sustitución. Las puntuaciones proporcionadas en tales matrices de sustitución están

reflejando el hecho de que la probabilidad de que un aminoácido se sustituya por otro durante la evolución varía y depende de la naturaleza física o química del aminoácido que se va a sustituir. Por ejemplo, la probabilidad de que un aminoácido polar se sustituya por otro aminoácido polar es mayor en comparación con que se sustituya por un aminoácido hidrófobo. Por lo tanto, la matriz de puntuación asignará la puntuación más alta para aminoácidos idénticos, una puntuación más baja para aminoácidos no idénticos pero similares e incluso una puntuación más baja para aminoácidos no idénticos no similares. Las matrices de puntuación utilizadas más frecuentemente son las matrices PAM (Dayhoff et al. (1978), Jones et al. (1992)), las matrices BLOSUM (Henikoff and Henikoff (1992)) y la matriz Gonnet (Gonnet et al. (1992)).

Los programas informáticos adecuados para llevar a cabo dicho alineamiento incluyen, pero no se limitan a, Vector NTI (Invitrogen Corp.) y los programas ClustalV, ClustalW y ClustalW2 (Higgins DG y Sharp PM (1988), Higgins et al. (1992), Thompson et al. (1994), Larkin et al. (2007)). Se encuentra disponible una selección de diferentes herramientas de alineamiento del servidor ExPASy Proteomics en www.expasy.org. Otro ejemplo de software que puede realizar el alineamiento de secuencias es BLAST (herramienta básica de búsqueda de alineamiento local, por sus siglas en inglés), que está disponible en la página web del National Center for Biotechnology Information que se puede encontrar actualmente en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/> y que fue descrito en primer lugar en Altschul et al. (1990) J. Mol. Biol. 215; 403-410.

Una vez que el software ha producido un alineamiento, es posible calcular el % de similitud y el % de identidad de secuencia. El software generalmente hace esto como parte de la comparación de secuencias y genera un resultado numérico.

El software ClustalW se puede utilizar para realizar alineamientos de secuencia. Preferiblemente, el alineamiento con ClustalW se realiza con los siguientes parámetros para el alineamiento por pares:

Matriz de sustitución	Gonnet 250
Penalización por abrir hueco	20
Penalización por extender hueco	0,2
Penalización por terminar hueco	Ninguna

Por ejemplo, ClustalW2 está disponible en Internet por el European Bioinformatics Institute en la página web EMBL-EBI www.ebi.ac.uk under tools - sequence analysis - ClustalW2. Actualmente, la dirección exacta de la herramienta ClustalW2 es www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2.

Alternativamente, el programa Align X en Vector NTI (Invitrogen) se puede utilizar para realizar alineamientos de secuencia. Exp10 se puede utilizar con la configuración predeterminada:

Penalización por abrir hueco: 10

Penalización por extender de hueco: 0,05

Intervalo de penalización por separación de huecos: 8

El porcentaje de identidad de una secuencia de aminoácidos con, o para, otra secuencia de aminoácidos se puede determinar mediante el uso de la matriz de puntuación: blosum62mt2 y la configuración de alineamiento por pares Vector NTI.

Configuración	K-tupla	1
	Número de mejores diagonales	5
	Tamaño de ventana	5
	Penalización de hueco	3
	Penalización por abrir hueco	10
	Penalización por extender hueco	0,1

Por lo tanto, describimos variantes, homólogos y derivados de cualquier secuencia de aminoácidos de una proteína o polipéptido como se define en la presente memoria, particularmente las de SEQ ID NO: 1 o aquellas de SEQ ID NO: 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 definidas a continuación.

Las secuencias, particularmente las de variantes, homólogos y derivados de SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 definidas a continuación, también pueden tener deleciones, inserciones o sustituciones de restos de aminoácidos que producen restos de aminoácidos que producen un cambio silencioso y dan como resultado una sustancia funcionalmente equivalente. Las sustituciones de aminoácidos deliberadas se pueden realizar sobre la base de la similitud en polaridad, carga, solubilidad, hidrofobicidad, hidrofiliidad y/o la naturaleza anfipática de los restos, siempre que se retenga la actividad de unión secundaria de la sustancia. Por ejemplo, los aminoácidos cargados negativamente incluyen ácido aspártico y ácido glutámico; los aminoácidos cargados positivamente incluyen lisina y arginina; y los aminoácidos con grupos de cabeza polar no cargados que tienen valores de hidrofiliidad similares incluyen leucina, isoleucina, valina, glicina, alanina, asparagina, glutamina, serina, treonina, fenilalanina y tirosina.

La sustitución conservadora (tanto sustitución como reemplazo se utilizan en la presente memoria para referirse al intercambio de un resto de aminoácido existente, con un resto alternativo) que se puede producir, es decir, sustitución homogénea tal como básico por básico, ácido por ácido, polar por polar, etc. La sustitución no conservadora también se puede producir, es decir, de una clase de resto a otra o alternativamente implica la inclusión de aminoácidos no naturales tales como ornitina (en lo sucesivo denominada Z), ácido diaminobutírico ornitina (en lo sucesivo denominada B), norleucina ornitina (en lo sucesivo denominado O), pirilalanina, tienilalanina, naftilalanina y fenilglicina.

Las sustituciones conservadoras que se pueden realizar son, por ejemplo, dentro de los grupos de aminoácidos básicos (arginina, lisina e histidina), aminoácidos ácidos (ácido glutámico y ácido aspártico), aminoácidos alifáticos (alanina, valina, leucina, isoleucina), aminoácidos polares (glutamina, asparagina, serina, treonina), aminoácidos aromáticos (fenilalanina, triptófano y tirosina), hidroxilaminoácidos (serina, treonina), aminoácidos grandes (fenilalanina y triptófano) y aminoácidos pequeños (glicina, alanina).

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 1 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 66%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, al menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al menos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 1 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 70% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID NO: 1 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 75% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 1 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 80% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 3 o una variante polipeptídica que tiene al menos 60%, al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, al menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al menos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 4 o una variante polipeptídica que tiene al menos 60%, al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80% , al menos el 85%, al menos el 90%, al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al menos el 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 5 o una variante polipeptídica que tiene al menos 60%, al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80% , al menos el 85%, al menos el 90%, al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al menos el 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 2 o una variante polipeptídica que tiene al menos 60%, al menos 65%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, al menos 85% , al menos el 90%, al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al menos el 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID NO: 2 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 70% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 2 o una variante polipeptídica que tiene al menos un 75% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma. El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 2 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 80% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

El polipéptido puede ser un polipéptido que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 6 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, al menos 85%, al menos 90%, al menos 94%, al menos 95%, al menos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.

- 5 El polipéptido puede ser una variante polipeptídica que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 7 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, a al menos el 85%, al menos el 90%, al menos el 94%, al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al menos el 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.
- El polipéptido puede ser una variante polipeptídica que tiene la secuencia mostrada en la SEQ ID NO: 8 o una variante polipeptídica que tiene al menos al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 78%, al menos 80%, a al menos el 85%, al menos el 90%, al menos el 94%, al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al menos el 99% de identidad de secuencia de aminoácidos con la misma.
- 10 En un aspecto, la secuencia polipeptídica descrita en la presente memoria puede estar en una forma purificada.
- En un aspecto, el polipéptido descrito o proteína descrita en la presente memoria puede estar en una forma aislada.
- 15 Una "variante" o una "variantes" se refiere a polipéptidos o ácidos nucleicos. El término "variante" se puede utilizar indistintamente con el término "mutante". Las variantes incluyen inserciones, sustituciones, transversiones, truncamientos y/o inversiones en una o más ubicaciones en la secuencia de aminoácidos o nucleótidos, respectivamente. Las frases "polipéptido variante", "variante polipeptídica", "polipéptido", "variante" y "enzima variante" significan un polipéptido/proteína que tiene o comprende la secuencia de aminoácidos de, o está modificada comparada con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Los polipéptidos variantes incluyen un polipéptido que tiene un cierto porcentaje, por ejemplo, 60%, 65%, 66%, 68%, 70%, 72%, 74%, 76%, 78%, 80%, 85%, 90%, 91 %, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% de identidad de secuencia con las
- 20 SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ó 8. Como se utiliza en la presente memoria, "enzimas parentales", "secuencia parental", "polipéptido parental" significan enzimas y polipéptidos a partir de los cuales se basan cualquiera de los polipéptidos variantes, p. ej., SEQ ID NO: 1 o 2. Un "ácido nucleico parental" significa una secuencia de ácido nucleico que codifica el polipéptido parental. La secuencia señal de una "variante" puede ser la misma o puede diferir de la secuencia señal del *Ruminococcus lactaris* de tipo salvaje o *Blautia/Ruminococcus hansenii* o un péptido señal de *Bacillus* o cualquier secuencia señal que secretará el polipéptido. Una variante se puede expresar como
- 25 una proteína de fusión que contiene un polipéptido heterólogo. Por ejemplo, la variante puede comprender un péptido señal de otra proteína o una secuencia diseñada para ayudar a la identificación o purificación de la proteína de fusión expresada, tal como una secuencia His-Tag.
- 30 Para describir las diversas variantes que se contemplan para abarcar la presente descripción, se adoptará la siguiente nomenclatura para facilitar la referencia. Donde la sustitución incluye un número y una letra, p. ej., 592P, entonces esto se refiere a {posición según el sistema de numeración/aminoácido sustituido}. Por consiguiente, por ejemplo, la sustitución de un aminoácido por prolina en la posición 592 se designa como 592P. Cuando la sustitución incluye una letra, un número y una letra, p. ej., D592P, esto se refiere a {aminoácido original/posición según el sistema de numeración/aminoácido sustituido}. Por consiguiente, por ejemplo, la sustitución de alanina con prolina
- 35 en la posición 592 se designa como A592P.
- Cuando dos o más sustituciones son posibles en una posición particular, esto se designará con letras contiguas, que pueden estar separadas opcionalmente por barras "/", p. ej., G303ED o G303E/D.
- 40 La o las posiciones y las sustituciones se enumeran con referencia a SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2. Se pueden encontrar posiciones equivalentes en otra secuencia alineando esta secuencia con SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2 para encontrar un alineamiento con el mayor porcentaje de identidad y luego determinar qué aminoácido se alinea para corresponderse con un aminoácido de una posición específica de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2. Tal alineamiento y uso de una secuencia como primera referencia es simplemente una cuestión de rutina para un experto en la técnica.
- 45 Los "ácidos nucleicos variantes" pueden incluir secuencias que son complementarias a secuencias que son capaces de hibridarse con las secuencias de nucleótidos presentadas en la presente memoria, en particular con SEQ ID NO: 10-11. Por ejemplo, una secuencia variante es complementaria de secuencias capaces de hibridarse bajo condiciones rigurosas, p. ej., 50°C y 0,2X SSC (1X SSC = 0,15 M NaCl, 0,015 M citrato de sodio, pH 7,0), con las secuencias de nucleótidos presentadas en la presente memoria, en particular con SEQ ID NO: 10-11. Más particularmente, el término variante abarca secuencias que son complementarias a secuencias que son capaces de hibridarse bajo condiciones altamente restrictivas, p. ej., 65°C y 0,1X SSC, con las secuencias de nucleótidos
- 50 presentadas en la presente memoria, en particular con SEQ ID NO: 10-11. El punto de fusión (T_f) de un ácido nucleico variante puede ser aproximadamente 1, 2 o 3°C menor que el T_f del ácido nucleico de tipo salvaje.
- 55 En un aspecto, describimos polipéptidos aislados que tienen actividad transgalactosilante como se indicó anteriormente que están codificados por polinucleótidos que se hibridan bajo condiciones de rigurosidad muy baja, preferiblemente condiciones de rigurosidad baja, más preferiblemente condiciones de rigurosidad media, más preferiblemente condiciones de rigurosidad media-alta, incluso más preferiblemente condiciones de rigurosidad alta, y lo más preferiblemente condiciones de rigurosidad muy alta con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 10 que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii) o con i) la secuencia de ácido nucleico comprendida en la SEQ ID NO: 11 que codifica el

5 polipéptido maduro de SEQ ID NO: 2; ii) la secuencia de ADNc de i) o iii) la cadena complementaria de i) o ii); (J. Sambrook, E. F. Fritsch, y T. Maniatis, 1989, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2d edition, Cold Spring Harbor, Nueva York). Una subsecuencia de SEQ ID NO: 10 u 11 contiene al menos 100 nucleótidos contiguos o preferiblemente al menos 200 nucleótidos contiguos. Además, la subsecuencia puede codificar un fragmento polipeptídico que tiene actividad lactasa.

10 La secuencia de nucleótidos de SEQ ID NO: 10 u 11 o una subsecuencia de la misma, así como la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 o 2 o un fragmento de la misma, se puede utilizar para diseñar una sonda de ácido nucleico para identificar y clonar ADN que codifica polipéptidos que tienen actividad transgalactosilasa a partir de cepas de diferentes géneros o especies según métodos bien conocidos en la técnica. En particular, tales sondas se pueden utilizar para la hibridación con el ADN genómico o ADNc del género o especie de interés, siguiendo métodos de transferencia Southern convencionales, con el fin de identificar y aislar el gen correspondiente en el mismo. Tales sondas pueden ser considerablemente más cortas que la secuencia completa, pero deberían ser al menos 14, preferiblemente al menos 25, más preferiblemente al menos 35, y más preferiblemente al menos 70 nucleótidos de longitud. Sin embargo, se prefiere que la sonda de ácido nucleico tenga al menos 100 nucleótidos de longitud. Por ejemplo, la sonda de ácido nucleico puede tener al menos 200 nucleótidos, preferiblemente al menos 300 nucleótidos, más preferiblemente al menos 400 nucleótidos, o más preferiblemente al menos 500 nucleótidos de longitud. Se pueden utilizar sondas incluso más largas, p. ej., sondas de ácido nucleico que son al menos 600 nucleótidos, al menos preferiblemente al menos 700 nucleótidos, más preferiblemente al menos 800 nucleótidos, o más preferiblemente al menos 900 nucleótidos de longitud. Se pueden utilizar sondas de ADN y ARN. Las sondas están típicamente marcadas para detectar el gen correspondiente (por ejemplo, con ³²P, ³H, ³⁵S, biotina o avidina).

25 Una biblioteca de ADN genómico preparada a partir de cualquier otro organismo puede, por lo tanto, cribarse para ADN que se hibrida con las sondas descritas anteriormente y que codifica un polipéptido que tiene actividad lactasa. El ADN genómico u otro a partir de cualquier otro organismo se puede separar mediante electroforesis en gel de agarosa o poliacrilamida u otras técnicas de separación. El ADN de las bibliotecas o el ADN separado se puede transferir e inmovilizar sobre nitrocelulosa u otro material de soporte adecuado. Con el fin de identificar un clon o ADN que sea homólogo con la SEQ ID NO: 10 u 11 o una subsecuencia de la misma, el material de soporte se utiliza en una transferencia Southern.

30 La hibridación indica que la secuencia de nucleótidos se hibrida con una sonda de ácido nucleico marcada que corresponde con la secuencia de nucleótidos mostrada en la SEQ ID NO: 10 u 11, su cadena complementaria, o una subsecuencia de la misma, bajo condiciones de rigurosidad muy baja a muy alta. Las moléculas a las que la sonda de ácido nucleico se hibrida bajo estas condiciones se pueden detectar utilizando una película de rayos X.

35 En un aspecto preferido, la sonda de ácido nucleico es los nucleótidos 175 a 2011 o los nucleótidos 198 a 2040 de la SEQ ID NO: 10 o SEQ ID NO: 11 respectivamente. En otro aspecto preferido, la sonda de ácido nucleico es una secuencia de polinucleótidos que codifica el polipéptido de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2, o una subsecuencia de la misma. En otro aspecto preferido, la sonda de ácido nucleico es la SEQ ID NO: 10 o SEQ ID NO: 11. En otro aspecto preferido, la sonda de ácido nucleico es la región que codifica el polipéptido maduro de SEQ ID NO: 10 o SEQ ID NO: 11.

40 Para sondas largas de al menos 100 nucleótidos de longitud, las condiciones de rigurosidad muy baja a muy alta se definen como prehibridación e hibridación a 42°C en 5X SSPE, SDS al 0,3%, 200 g/ml de ADN de esperma de salmón fragmentado y desnaturalizado, y formamida al 25% para rigurosidades muy bajas y bajas, formamida al 35% para rigurosidades medias y medias-altas, o formamida al 50% para rigurosidades altas y muy altas, siguiendo procedimientos estándar de transferencia Southern durante 12 a 24 horas de manera óptima.

45 Para sondas largas de al menos 100 nucleótidos de longitud, el material de soporte se lava finalmente tres veces cada uno durante 15 minutos utilizando 2X SSC, SDS al 0,2% preferiblemente al menos a una temperatura de 45°C (rigurosidad muy baja), más preferiblemente al menos a 50°C (rigurosidad baja), más preferiblemente al menos a 55°C (rigurosidad media), más preferiblemente al menos a 60°C (rigurosidad media-alta), incluso más preferiblemente al menos a 65°C (rigurosidad alta), y lo más preferiblemente al menos a 70°C (rigurosidad muy alta).

50 El lavado se puede realizar utilizando 0,2X SSC, SDS al 0,2% preferiblemente al menos a una temperatura de 45°C (rigurosidad muy baja), más preferiblemente al menos a 50°C (rigurosidad baja), más preferiblemente al menos a 55°C (rigurosidad media), más preferiblemente al menos a 60°C (rigurosidad media-alta), incluso más preferiblemente al menos a 65°C (rigurosidad alta), y lo más preferiblemente al menos a 70°C (rigurosidad muy alta). El lavado se puede realizar utilizando 0,1X SSC, SDS al 0,2% preferiblemente al menos a una temperatura de 45°C (rigurosidad muy baja), más preferiblemente al menos a 50°C (rigurosidad baja), más preferiblemente al menos a 55°C (rigurosidad media), más preferiblemente al menos a 60°C (rigurosidad media-alta),

55 incluso más preferiblemente al menos a 65°C (rigurosidad alta), y lo más preferiblemente al menos a 70°C (rigurosidad muy alta).

Para sondas cortas que tienen aproximadamente 15 nucleótidos a aproximadamente 70 nucleótidos de longitud, las condiciones de rigurosidad se definen como prehibridación, hibridación y lavado posterior a la hibridación a una

temperatura de aproximadamente 5°C a aproximadamente 10°C por debajo del T_f calculado utilizando el cálculo según Bolton y McCarthy (1962, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 48:1390) en NaCl 0,9 M, Tris-HCl 0,09 M, pH 7,6, EDTA 6 mM, NP-40 al 0,5%, 1X solución de Denhardt, pirofosfato de sodio 1 mM, fosfato monobásico de sodio 1 mM, ATP 0,1 mM y 0,2 mg de ARN de levadura por ml siguiendo métodos de transferencia Southern estándar.

Para sondas cortas que tienen aproximadamente 15 nucleótidos a aproximadamente 70 nucleótidos de longitud, el material de soporte se lava una vez en 6X SSC más SDS al 0,1% durante 15 minutos y dos veces cada uno durante 15 minutos utilizando 6X SSC a una temperatura de 5°C a 10°C por debajo del T_f calculado.

En condiciones de hibridación que contienen sal, el T_f efectivo es lo que controla el grado de identidad requerido entre la sonda y el ADN unido al filtro para una hibridación exitosa. El T_f efectivo se puede determinar utilizando la fórmula siguiente para determinar el grado de identidad requerido para que dos ADN se hibriden en diversas condiciones de rigurosidad.

$$T_f \text{ efectivo} = 81,5 + 16,6(\log M[\text{Na}^+]) + 0,41(\%G+C) - 0,72(\% \text{ de formamida})$$

(Véase www.ndsu.nodak.edu/instruct/mcclean/plsc731/dna/dna6.htm). El contenido de G+C de SEQ ID NO: 10 es 42% y el contenido de G+C de SEQ ID NO: 11 es 44%. Para rigurosidad media, la formamida es 35% y la concentración de Na^+ para 5X SSPE es 0,75 M.

Otra relación relevante es que un desajuste del 1% de dos ADN reduce el T_f en 1,4°C. Para determinar el grado de identidad requerido para que dos ADN se hibriden bajo condiciones de rigurosidad media a una temperatura de 42°C, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\% \text{ de homología} = 100 - [(T_f \text{ efectivo} - \text{Temperatura})/1,4]$$

(Véase www.ndsu.nodak.edu/instruct/mcclean/plsc731/dna/dna6.htm)

Los ácidos nucleicos variantes incluyen un polinucleótido que tiene un cierto porcentaje, p. ej., 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o 99% de identidad de secuencia con la codificación de ácido nucleico SEQ ID NO: 1 o 2. En un aspecto, se proporciona un ácido nucleico capaz de codificar un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, el ácido nucleico descrito en la presente memoria tiene una secuencia de ácido nucleico que es al menos 60%, tal como al menos 65%, tal como al menos 70%, tal como al menos 75%, tal como al menos 80%, tal como al menos el 85%, tal como al menos el 90%, tal como al menos el 95%, tal como al menos el 99% idéntico a la SEQ ID NO: 10 u 11.

En un aspecto, los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro codificado por la secuencia de nucleótidos que codifica la transgalatosilasa contenida en el n° de acceso DSM: 20583. En un aspecto, los polipéptidos descritos en la presente memoria comprenden una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 66% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro codificado por la secuencia de nucleótidos que codifica la transgalatosilasa contenida en el n° de acceso ATCC: 29176. Todas las consideraciones y limitaciones relacionadas con las identidades de secuencia y funcionalidad discutidas en términos de la SEQ ID NO: 1 o 2 se aplican según corresponda a las identidades de secuencia y a la funcionalidad de estos polipéptidos y nucleótidos.

Como se utiliza en la presente memoria, el término "expresión" se refiere al método mediante el cual se produce un polipéptido en base a la secuencia de ácido nucleico de un gen. El método incluye transcripción y traducción.

Como se utiliza en la presente memoria, "polipéptido" se utiliza de forma intercambiable con los términos "secuencia de aminoácidos", "enzima", "péptido" y/o "proteína". Como se utiliza en la presente memoria, "secuencia de nucleótidos" o "secuencia de ácidos nucleicos" se refiere a una secuencia de oligonucleótidos o secuencia de polinucleótidos y variantes, homólogos, fragmentos y derivados de los mismos. La secuencia de nucleótidos puede ser de naturaleza genómica, sintética o recombinante y puede ser de doble cadena o monocatenaria, ya sea representando la cadena sentido o antisentido. Como se utiliza en la presente memoria, el término "secuencia de nucleótidos" incluye ADN genómico, ADNc, ADN sintético y ARN.

"Homólogo" significa una entidad que tiene un cierto grado de identidad u "homología" con las secuencias de aminoácidos y las secuencias de nucleótidos encontradas. En un aspecto, la secuencia de aminoácidos encontrada es SEQ ID NO: 1-8, y la secuencia de aminoácidos encontrada es preferiblemente SEQ ID NO: 10-11.

Una "secuencia homóloga" incluye un polinucleótido o un polipéptido que tiene un cierto porcentaje, por ejemplo, 80%, 85%, 90%, 95% o 99%, de identidad de secuencia con otra secuencia. El porcentaje de identidad significa que, cuando se alinea, ese porcentaje de bases o restos de aminoácidos es el mismo cuando se comparan las dos secuencias. Las secuencias de aminoácidos son no idénticas, donde un aminoácido está sustituido, eliminado o añadido en comparación con la secuencia en cuestión. El porcentaje de identidad de secuencia típicamente se mide con respecto a la secuencia madura de la proteína encontrada, es decir, después de la eliminación de una

secuencia señal, por ejemplo. Típicamente, los homólogos comprenderán los mismos restos del sitio activo que la secuencia de aminoácidos encontrada. Los homólogos también retienen actividad enzimática, aunque el homólogo puede tener diferentes propiedades enzimáticas que el tipo salvaje.

- 5 Como se utiliza en la presente memoria, "hibridación" incluye el proceso mediante el cual una cadena de ácido nucleico se une con una cadena complementaria a través del emparejamiento de bases, así como el proceso de amplificación como se lleva a cabo en tecnologías de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El ácido nucleico variante puede existir como ADN o ARN monocatenario o bicatenario, un ARN/ADN heterodúplex o un ARN/ADN copolímero. Como se utiliza en la presente memoria, "copolímero" se refiere a una única cadena de ácido nucleico
10 que comprende tanto ribonucleótidos como desoxirribonucleótidos. El ácido nucleico variante puede estar optimizado con codones para aumentar adicionalmente la expresión.

15 Como se utiliza en la presente memoria, un compuesto "sintético" se produce mediante síntesis química o enzimática *in vitro*. Incluye, pero no se limita a, ácidos nucleicos variantes preparados con el uso óptimo de codones para organismos anfitriones, tales como una célula anfitriona de levadura u otros anfitriones de expresión de elección.

20 Como se utiliza en la presente memoria, "célula transformada" incluye células, que incluyen tanto células bacterianas como fúngicas, que se han transformado mediante el uso de técnicas de ADN recombinante. La transformación típicamente se produce mediante la inserción de una o más secuencias de nucleótidos en una célula. La secuencia de nucleótidos insertada puede ser una secuencia de nucleótidos heteróloga, es decir, es una secuencia que no es natural para la célula que se va a transformar, tal como una proteína de fusión.

Como se utiliza en la presente memoria, "unidos operablemente" significa que los componentes descritos están en una relación que les permite funcionar de la manera prevista. Por ejemplo, una secuencia reguladora unida operablemente a una secuencia codificante está ligada de tal forma que la expresión de la secuencia codificante se consigue bajo condiciones compatibles con las secuencias control.

- 25 Como se utiliza en la presente memoria, el término "fragmento" se define como un polipéptido que tiene uno o más (varios) aminoácidos eliminados del extremo amino y/o carboxilo, por ejemplo, del polipéptido de SEQ ID NO: 12 ó 13; en donde el fragmento tiene actividad transgalactosilante.

30 En un aspecto, el término "fragmento polipeptídico" se define en la presente memoria como un polipéptido que tiene uno o más (varios) aminoácidos eliminados del extremo amino y/o carboxilo del polipéptido de SEQ ID NO: 1 ó 2; en donde el fragmento tiene actividad transgalactosilante.

En un aspecto, un fragmento contiene al menos 500, 700, 900 o 1000 restos de aminoácidos. En un aspecto, un fragmento contiene como máximo 1250, 1200, 1180, 1170, 1150 u 1125 restos de aminoácidos.

35 En un aspecto adicional, la longitud del polipéptido descrito en la presente memoria es de 500 a 1250 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 500 a 1200 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 700 a 1170 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 900 a 1180 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 900 a 1150 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 1000 a 1125 aminoácidos.

40 En un aspecto, se proporciona un plásmido que comprende un ácido nucleico como se describe en la presente memoria.

En un aspecto, se proporciona un vector de expresión que comprende un ácido nucleico como se describe en la presente memoria, o capaz de expresar un polipéptido como se describe en la presente memoria.

45 En un aspecto adicional, se proporciona una célula anfitriona que comprende, preferiblemente transformada con, un plásmido como se describe en la presente memoria o un vector de expresión como se describe en la presente memoria.

En un aspecto adicional, se proporciona una célula capaz de expresar un polipéptido como se describe en la presente memoria.

En un aspecto, la célula anfitriona como se describe en la presente memoria, o la célula como se describe en la presente memoria es una célula bacteriana, fúngica o de levadura.

- 50 En un aspecto adicional, la célula anfitriona se selecciona del grupo que consiste en *Ruminococcus*, *Bifidobacterium*, *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Escherichia*, *Bacillus*, *Streptomyces*, *Saccharomyces*, *Kluyveromyces*, *Candida*, *Torula*, *Torulopsis* y *Aspergillus*.

55 En un aspecto adicional, la célula de célula anfitriona se selecciona del grupo que consiste en *Ruminococcus hansenii*, *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium infantis*, *Bifidobacterium bifidum* y *Lactococcus lactis*.

En un aspecto adicional, un método de expresión de un polipéptido como se describe en la presente memoria comprende obtener una célula anfitriona o una célula como se describe en la presente memoria y expresar el polipéptido en la célula o célula anfitriona, y opcionalmente purificar el polipéptido.

5 Variantes polipeptídicas de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2

En un aspecto, se proporciona una variante de SEQ ID NO: 1 ó 2 que tiene una sustitución en una o más posiciones que afecta a una propiedad alterada tal como transgalactosilación mejorada, con respecto a SEQ ID NO: 1 ó 2. Dichos polipéptidos variantes también se mencionan en este documento por conveniencia como "polipéptido variante", "variante polipeptídica" o "variante". En un aspecto, los polipéptidos como se definen en la presente memoria tienen una actividad transgalactosilante mejorada en comparación con el polipéptido de SEQ ID NO: 1 ó 2. En otro aspecto, los polipéptidos como se definen en la presente memoria tienen una velocidad de reacción mejorada en comparación con el polipéptido de SEQ ID NO: 1 ó 2.

En un aspecto, los polipéptidos y variantes como se definen en la presente memoria exhiben actividad enzimática. En un aspecto, los polipéptidos y los polipéptidos variantes descritos en la presente memoria comprenden actividad transgalactosilante.

En un aspecto, la relación de actividad transgalactosilante:actividad de β -galactosidasa es al menos 2,5, tal como al menos 3, tal como al menos 4, tal como al menos 5, tal como al menos 6, tal como al menos 7, tal como al menos 8, tal como al menos 9, tal como al menos 10, tal como al menos 11, o tal como al menos 12 después de 30 min de reacción.

En un aspecto, los polipéptidos y las variantes como se definen en la presente memoria se pueden obtener a partir de fuentes microbianas, en particular de un hongo filamentoso o levadura, o de una bacteria. La enzima se puede, p. ej., obtener a partir de una cepa de *Agaricus*, p. ej. *A. bisporus*; *Ascovaginospora*; *Aspergillus*, p. ej. *A. niger*, *A. awamori*, *A. foetidus*, *A. japonicus*, *A. oryzae*; *Candida*; *Chaetomium*; *Chaetotomastia*; *Dictyostelium*, p. ej. *D. discoideum*; *Kluveromyces*, p. ej. *K. fragilis*, *K. lactis*; *Mucor*, p. ej. *M. javanicus*, *M. mucedo*, *M. subtilissimus*; *Neurospora*, p. ej. *N. crassa*; *Rhizomucor*, p. ej. *R. pusillus*; *Rhizopus*, p. ej. *R. arrizus*, *R. japonicus*, *R. stolonifer*; *Sclerotinia*, p. ej. *S. libertiana*; *Torula*; *Torulopsis*; *Trichophyton*, p. ej. *T. rubrum*; *Whetzelinia*, p. ej. *W. sclerotiorum*; *Bacillus*, p. ej. *B. coagulans*, *B. circulans*, *B. megaterium*, *B. novalis*, *B. subtilis*, *B. pumilus*, *B. stearothermophilus*, *B. thuringiensis*; *Bifidobacterium*, p. ej. *B. longum*, *B. bifidum*, *B. animalis*; *Chryseobacterium*; *Citrobacter*, p. ej. *C. freundii*; *Clostridium*, p. ej. *C. perfringens*; *Diplodia*, p. ej. *D. gossypina*; *Enterobacter*, p. ej. *E. aerogenes*, *E. cloacae*; *Edwardsiella*, *E. tarda*; *Erwinia*, p. ej. *E. herbicola*; *Escherichia*, p. ej. *E. coli*; *Klebsiella*, p. ej. *K. pneumoniae*; *Miriococcum*; *Mirotesio*; *Mucor*; *Neurospora*, p. ej. *N. crassa*; *Proteus*, p. ej. *P. vulgaris*; *Providencia*, p. ej. *P. stuartii*; *Pycnoporus*, p. ej. *Pycnoporus cinnabarinus*, *Pycnoporus sanguineus*; *Ruminococcus*, p. ej. *R. torques*; *Salmonella*, p. ej. *S. typhimurium*; *Serratia*, p. ej. *S. liquefaciens*, *S. marcescens*; *Shigella*, p. ej. *S. flexneri*; *Streptomyces*, p. ej. *S. antibioticus*, *S. castaneoglobosporus*, *S. violeceoruber*; *Trametes*; *Trichoderma*, p. ej. *T. reesei*, *T. viride*; *Yersinia*, p. ej. *Y. enterocolitica*.

Se proporciona un polipéptido aislado y/o purificado que comprende un polipéptido o un polipéptido variante como se define en la presente memoria. El polipéptido variante puede ser una forma madura del polipéptido (SEQ ID NO: 1 ó 2). En un aspecto, las variantes incluyen un dominio C-terminal.

En un aspecto, un polipéptido variante como se define en la presente memoria incluye variantes en donde se han añadido o eliminado entre uno y aproximadamente 25 restos de aminoácidos con respecto a la SEQ ID NO: 1 o la SEQ ID NO: 2. En un aspecto, la variante tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2, en donde se ha sustituido cualquier número entre uno y aproximadamente 25 aminoácidos. En un aspecto adicional, la variante tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2, en donde se ha sustituido cualquier número entre tres y doce aminoácidos. En un aspecto adicional, la variante tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2, en donde se ha sustituido cualquier número entre cinco y nueve aminoácidos.

En un aspecto, al menos dos, en otro aspecto al menos tres, y en otro aspecto, se han sustituido al menos cinco aminoácidos de la SEQ ID NO: 1 o SEQ ID NO: 2.

En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria tienen la secuencia de SEQ ID NO: 1 ó 2.

En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria tienen la secuencia de SEQ ID NO: 1 ó 2, en donde el aminoácido 10, tal como 9, tal como 8, tal como 7, tal como 6, tal como 5, tal como 4, tal como 3, tal como 2, tal como 1 en el extremo N-terminal se sustituye y/o se elimina.

En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 500 a 1250 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 500 a 1200 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 700 a 1170 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 900 a 1180 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 900 a 1150 aminoácidos. En un aspecto adicional, la longitud de la variante polipeptídica es de 1000 a 1125 aminoácidos.

Caracterización de polipéptidos

- Las enzimas y variantes enzimáticas de las mismas se pueden caracterizar por su ácido nucleico y secuencias polipeptídicas primarias, por modelado estructural tridimensional y/o por su actividad específica. Las características adicionales de los polipéptidos o variantes polipeptídicas como se define en la presente memoria incluyen estabilidad, rango de pH, estabilidad a la oxidación y termoestabilidad, por ejemplo. Los niveles de expresión y la actividad de la enzima se pueden evaluar utilizando ensayos estándar conocidos por los expertos en la técnica. En otro aspecto, las variantes demuestran características de rendimiento mejoradas con respecto al polipéptido con SEQ ID NO: 1 ó 2, tales como estabilidad mejorada a altas temperaturas, p. ej., 65-85°C.
- Una característica de expresión significa un nivel alterado de expresión de la variante, cuando la variante se produce en una célula anfitriona particular. La expresión generalmente se refiere a la cantidad de variante activa que es recuperable a partir de un caldo de fermentación utilizando técnicas estándar conocidas en esta técnica durante un período de tiempo dado. La expresión también se puede relacionar con la cantidad o relación de variante producida dentro de la célula anfitriona o secretada por la célula anfitriona. La expresión también se puede relacionar con la velocidad de traducción del ARNm que codifica el polipéptido variante.
- Se proporciona un ácido nucleico complementario a un ácido nucleico que codifica cualquiera de las variantes polipeptídicas expuestas como se define en la presente memoria. Adicionalmente, se proporciona un ácido nucleico capaz de hibridarse con el complemento. La secuencia para uso en los métodos y composiciones descritos en la presente memoria puede ser una secuencia sintética. Incluye, pero no se limita a, secuencias hechas con el uso de codones óptimos para la expresión en organismos anfitriones, tales como levadura.
- Las variantes polipeptídicas como se proporcionan en la presente memoria se pueden producir sintéticamente o mediante expresión recombinante en una célula anfitriona, según procedimientos bien conocidos en la técnica. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria son polipéptidos recombinantes. La variante polipeptídica expresada como se define en la presente memoria opcionalmente se aísla antes del uso.
- La variante polipeptídica como se define en la presente memoria se puede purificar después de la expresión. Los métodos de modificación genética y producción recombinante de variantes polipeptídicas se describen, por ejemplo, en las Patentes de EE.UU. núms. de publicación 7.371.552, 7.166.453; 6.890.572; y 6.667.065; y los Núms. de solicitudes publicadas de EE.UU. 2007/0141693; 2007/0072270; 2007/0020731; 2007/0020727; 2006/0073583; 2006/0019347; 2006/0018997; 2006/0008890; 2006/0008888; y 2005/0137111. Las enseñanzas relevantes de estas descripciones, que incluyen secuencias polinucleotídicas que codifican polipéptidos, cebadores, vectores, métodos de selección, células anfitrionas, purificación y reconstitución de variantes polipeptídicas expresadas, y caracterización de variantes polipeptídicas como se define en la presente memoria, que incluyen tampones útiles, intervalos de pH, concentraciones de Ca²⁺, concentraciones de sustrato y concentraciones de enzimas para ensayos enzimáticos.
- Las células anfitrionas adecuadas incluyen una bacteria Gram positiva seleccionada del grupo que consiste en *Bacillus subtilis*, *B. licheniformis*, *B. lentus*, *B. brevis*, *B. stearothermophilus*, *B. alkalophilus*, *B. amyloliquefaciens*, *B. coagulans*, *B. circulans*, *B. lautus*, *B. thuringiensis*, *Streptomyces lividans* o *S. murinus*; o una bacteria Gram negativa, en donde dicha bacteria Gram negativa es *Escherichia coli* o una especie de *Pseudomonas*. En un aspecto, la célula anfitriona es *B. subtilis* o *B. licheniformis*. La célula anfitriona puede ser *B. subtilis*, y la proteína expresada se modifica por ingeniería genética para que comprenda una secuencia señal de *B. subtilis*, como se expone con más detalle a continuación. En un aspecto, la célula anfitriona expresa el polinucleótido como se establece en las reivindicaciones.
- Una célula anfitriona se puede modificar genéticamente para expresar una variante polipeptídica como se define en la presente memoria con una secuencia de aminoácidos que tiene al menos aproximadamente 66%, 68%, 70%, 72%, 74%, 78%, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 100% de identidad con el polipéptido de SEQ ID NO: 1 ó 2. El polinucleótido que codifica una variante polipeptídica como se define en la presente memoria puede tener una secuencia de ácido nucleico que codifica la proteína de SEQ ID NO: 1 o una secuencia de ácido nucleico que tiene al menos aproximadamente 66%, 68%, 70%, 72%, 74%, 78%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100% de identidad de secuencia con un ácido nucleico que codifica la proteína de SEQ ID NO: 1 ó 2. La secuencia de ácido nucleico puede tener al menos aproximadamente 60%, 66%, 68%, 70%, 72%, 74%, 78%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% de identidad de secuencia con el ácido nucleico de SEQ ID NO: 10-11.

Vectores

- En un aspecto, un vector puede comprender un polinucleótido. En un aspecto, una célula bacteriana comprende el vector. Una construcción de ADN puede comprender un ácido nucleico que codifica una variante que se transfiere a una célula hospedadora en un vector de expresión que comprende secuencias reguladoras unidas operablemente a una secuencia codificante. El vector puede ser cualquier vector que se pueda integrar en un genoma de célula anfitriona fúngica y replicarse cuando se introduzca en la célula anfitriona. El FGSC Catalogue of Strains, University of Missouri, enumera vectores adecuados. Se proporcionan ejemplos adicionales de vectores de expresión y/o

integración adecuados en Sambrook et al., MOLECULAR CLONING: A LABORATORY MANUAL, 3rd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York (2001); Bennett et al., MORE GENE MANIPULATIONS IN FUNGI, Academic Press, San Diego (1991), pp. 396-428; y Num de patente de EE.UU. 5.874.276. Los vectores ilustrativos incluyen pFB6, pBR322, PUC18, pUC100 y pENTR/D, pDON™201, pDONR™221, pENTR™, pGEM@3Z y pGEM@4Z. Ejemplos de uso en células bacterianas incluyen pBR322 y pUC19, que permiten la replicación en *E. coli*, y pE194, por ejemplo, que permite la replicación en *Bacillus*.

Un ácido nucleico que codifica una variante se puede unir operablemente a un promotor adecuado, que permite la transcripción en la célula anfitriona. El promotor se puede obtener a partir de genes que codifican proteínas homólogas o heterólogas a la célula anfitriona. Los ejemplos no limitantes adecuados de promotores incluyen promotores *cbh1*, *cbh2*, *egl1* y *egl2*. El promotor puede ser uno que sea nativo de la célula anfitriona. Por ejemplo, cuando *P. saccharophila* es el anfitrión, el promotor es un promotor nativo de *P. saccharophila*. Un "promotor inducible" es un promotor que está activo bajo regulación ambiental o de desarrollo. El promotor puede ser uno que sea heterólogo para la célula anfitriona.

La secuencia codificante puede estar unida operablemente a una secuencia de ADN que codifica una secuencia señal. Un péptido señal representativo es la SEQ ID NO: 9 que es la secuencia señal nativa del precursor de *apRE* de *Bacillus subtilis*. El ADN que codifica la secuencia señal se puede reemplazar con una secuencia de nucleótidos que codifica una secuencia señal de otros precursores de *Bacillus subtilis* extracelulares. El polinucleótido que codifica la secuencia señal puede estar inmediatamente secuencia arriba y dentro del marco del polinucleótido que codifica el polipéptido. La secuencia señal se puede seleccionar de la misma especie que la célula anfitriona.

Una secuencia señal y una secuencia promotora que comprende una construcción de ADN o vector para ser introducida en una célula anfitriona fúngica se pueden obtener a partir de la misma fuente. El vector de expresión también puede incluir una secuencia de terminación. La secuencia de terminación y la secuencia promotora se pueden obtener a partir de la misma fuente. La secuencia de terminación puede ser homóloga a la célula anfitriona.

Un vector de expresión puede incluir un marcador seleccionable. Los ejemplos de marcadores seleccionables adecuados incluyen aquellos que confieren resistencia a agentes antimicrobianos, p.ej., higromicina o fleomicina. Los marcadores selectivos nutricionales también son adecuados e incluyen *amdS*, *argB* y *pyr4*. El marcador selectivo puede ser el gen *amdS*, que codifica la enzima acetamidasa; permite a las células transformadas crecer sobre acetamida como fuente de nitrógeno. El uso de un gen *amdS* de *A. nidulans* como marcador selectivo se describe en Kelley et al., EMBO J. 4: 475-479 (1985) y Penttila et al., Gene 61: 155-164 (1987).

Un vector de expresión adecuado que comprende una construcción de ADN con un polinucleótido que codifica una variante puede ser cualquier vector que sea capaz de replicarse de forma autónoma en un organismo hospedador dado o integrarse en el ADN del hospedador. El vector de expresión puede ser un plásmido. Se contemplan dos tipos de vectores de expresión para obtener la expresión de genes. El primer vector de expresión comprende secuencias de ADN en las que el promotor, la región codificante y el terminador se originan todos a partir del gen que se va a expresar. El truncamiento génico se puede obtener eliminando secuencias de ADN no deseadas para dejar que el dominio se exprese bajo el control de sus propias secuencias reguladoras transcripcionales y traduccionales. El segundo tipo de vector de expresión está preensamblado y contiene las secuencias requeridas para la transcripción de alto nivel y un marcador seleccionable. La región codificante de un gen o parte del mismo se puede insertar en este vector de expresión de uso general, de manera que está bajo el control transcripcional de las secuencias promotora y terminadora de la construcción de expresión. Los genes o parte de los mismos se pueden insertar secuencia abajo del promotor *cbh1* fuerte.

Transformación, expresión y cultivo de células anfitrionas

La introducción de una construcción o vector de ADN en una célula anfitriona incluye técnicas tales como transformación; electroporación; microinyección nuclear; transducción; transfección, p. ej., mediada por lipofección y mediada por DEAE-Dextrina; incubación ADN precipitado con fosfato cálcico; bombardeo a alta velocidad con microproyectiles recubiertos de ADN; y fusión de protoplastos. Las técnicas de transformación generales son conocidas en la técnica. Véase, p. ej., Ausubel et al. (1987), *supra*, chapter 9; Sambrook et al. (2001), *supra*; y Campbell et al., Curr. Opin. Biotech. 16: 53-56 (1989). La expresión de proteínas heterólogas en *Trichoderma* se describe, por ejemplo, en la Patente de EE.UU. N° de publicación 6.022.725; Patente de EE.UU. N° de publicación 6.268.328; Harkki et al., Enzyme Microb. Technol. 13: 227-233 (1991); Harkki et al., BioTechnol. 7: 596-603 (1989); EP 244,234; y EP 215,594. Los transformantes genéticamente estables se pueden construir con sistemas de vectores en los que el ácido nucleico que codifica una variante se integra de forma estable en un cromosoma de la célula anfitriona. Los transformantes se purifican a continuación mediante técnicas conocidas.

En un ejemplo no limitante, los transformantes estables que incluyen un marcador *amdS* se distinguen de los transformantes inestables por su velocidad de crecimiento más rápida y la formación de colonias circulares con un contorno liso, en lugar de irregular sobre un medio de cultivo sólido que contiene acetamida. Además, en algunos casos se lleva a cabo una prueba adicional de estabilidad cultivando los transformantes sobre medio sólido no selectivo, p. ej., un medio que carece de acetamida, recolectando esporas de este medio de cultivo y determinando

el porcentaje de estas esporas que posteriormente germinan y crecen sobre medio selectivo que contiene acetamida. Otros métodos conocidos en la técnica se pueden utilizar para seleccionar transformantes.

Identificación de actividad

- 5 Para evaluar la expresión de una variante en una célula anfitriona, los ensayos pueden medir la proteína expresada, el ARNm correspondiente o la actividad β -galactosidasa. Por ejemplo, los ensayos adecuados incluyen transferencia Northern y Southern, RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) e hibridación *in situ*, utilizando una sonda de hibridación marcada apropiadamente. Los ensayos adecuados también incluyen medir la actividad en una muestra. Los ensayos adecuados de la actividad de la variante incluyen, pero no se limitan a ensayos basados en ONPG o determinación de glucosa en mezclas de reacción tales como las descritas en los ejemplos de la presente memoria.

Métodos para purificar polipéptidos descritos en la presente memoria

- 15 En general, una variante producida en cultivo celular se secreta en el medio y se puede purificar o aislar, p. ej., retirando componentes no deseados del medio de cultivo celular. En algunos casos, una variante se puede recuperar de un lisado celular. En tales casos, la enzima se purifica a partir de las células en las que se produjo utilizando técnicas empleadas rutinariamente por los expertos en la técnica. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, cromatografía de afinidad, métodos cromatográficos de intercambio iónico, que incluyen intercambio de iones de alta resolución, cromatografía de interacción hidrofóbica, división en dos fases, precipitación con etanol, HPLC de fase inversa, cromatografía sobre sílice o sobre resina de intercambio catiónico, tal como DEAE, cromatoenfoco, SDS-PAGE, precipitación con sulfato de amonio y filtración en gel utilizando Sephadex G-75, por ejemplo. Dependiendo del uso pretendido, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria se pueden, por ejemplo, liofilizar o preparar en una solución. En un aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria están en forma liofilizada. En otro aspecto, el o los polipéptidos descritos en la presente memoria están en solución.

Métodos para inmovilizar y formular los polipéptidos descritos en la presente memoria

- 25 Las composiciones polipeptídicas se pueden preparar de acuerdo con métodos conocidos en la técnica y pueden estar en forma de una composición líquida o seca. Por ejemplo, la composición polipeptídica puede estar en forma de un granulado o de un microgranulado. El polipéptido que se incluirá en la composición se puede estabilizar de acuerdo con métodos conocidos en la técnica.

- 30 La preparación enzimática, tal como en forma de un ingrediente alimentario puede estar en forma de una solución o como un sólido dependiendo del uso y/o el modo de aplicación y/o el modo de administración. La forma sólida puede ser como un polvo enzimático desecado o como una enzima granulada.

Los ejemplos de formulaciones enzimáticas secas incluyen productos secados por atomización, productos de granulación por mezclador, productos estratificados tales como gránulos de lecho fluido, gránulos extruidos o peletizados, productos prensados o productos liofilizados.

- 35 La preparación enzimática, tal como en forma de un ingrediente alimentario puede estar en forma de una solución o como un sólido dependiendo del uso y/o el modo de aplicación y/o el modo de administración. La forma sólida puede ser como un polvo enzimático desecado o como una enzima granulada.

En un aspecto, describimos una preparación de complejo enzimático que comprende un complejo enzimático, un portador de enzimas y opcionalmente un estabilizador y/o un conservante.

- 40 En otro aspecto adicional, el portador de enzima se puede seleccionar del grupo que consiste en glicerol o agua.

- 45 En un aspecto adicional, la preparación comprende un estabilizador. En un aspecto, el estabilizador se selecciona del grupo que consiste en sales inorgánicas, polioles, azúcares y combinaciones de los mismos. En un aspecto, el estabilizador es una sal inorgánica tal como cloruro de potasio. En otro aspecto, el poliol es glicerol, propilenglicol o sorbitol. En otro aspecto más, el azúcar es un hidrato de carbono de molécula pequeña, en particular cualquiera de los hidratos de carbono de sabor dulce, tales como glucosa, galactosa, fructosa y sacarosa.

Y en un aspecto adicional, la preparación comprende un conservante. En un aspecto, el conservante es metilparabeno, propilparabeno, benzoato, sorbato u otros conservantes autorizados para uso alimentario o una mezcla de los mismos.

- 50 Un método para producir un producto alimentario se puede ensayar con enzimas inmovilizadas, p. ej. una lactasa inmovilizada u otro galactooligosacárido productor de enzimas. La enzima se puede inmovilizar sobre cualquier soporte orgánico o inorgánico. Los soportes inorgánicos ilustrativos incluyen alúmina, celita, Dowex-1-cloruro, perlas de vidrio y gel de sílice. Los soportes orgánicos ilustrativos incluyen DEAE-celulosa, hidrogeles de alginato o perlas de alginato o equivalentes. En varios aspectos, la inmovilización de la lactasa se puede optimizar mediante adsorción física sobre el soporte inorgánico. Las enzimas se pueden inmovilizar en diferentes medios, incluyendo

agua, tampón Tris-HCl y solución tamponada con fosfato. La enzima se puede inmovilizar con cualquier tipo de sustrato, p. ej. filtros, fibras, columnas, perlas, coloides, geles, hidrogeles, mallas y similares.

Uso de los polipéptidos descritos en la presente memoria

5 En un aspecto, se proporciona un método para producir un producto lácteo tratando un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto adicional, se proporciona un método para producir un producto lácteo tratando un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido que tiene una actividad transgalactosilante relativa por encima de 60%, tal como por encima de 70%, tal como por encima de 75% después de 15 min de reacción. En un aspecto, la actividad transgalactosilante relativa está por encima de 3 después de 30 min de reacción. En un aspecto adicional, la actividad transgalactosilante relativa está por encima de 6 después de 30 min de reacción. Y en otro aspecto, la actividad transgalactosilante relativa está por encima de 12 después de 30 min de reacción. En un aspecto, se proporciona un método, en donde el tratamiento con un polipéptido como se describe en la presente memoria tiene lugar a una temperatura óptima para la actividad de la enzima. En un aspecto adicional, el polipéptido se añade al sustrato a base de leche a una concentración de 0,01-1000 ppm. Y en un aspecto adicional, el polipéptido se añade al sustrato a base de leche a una concentración de 0,1-100 ppm. En un aspecto adicional, el polipéptido se añade al sustrato a base de leche a una concentración de 1-10 ppm. En un aspecto, se proporciona un método que comprende además fermentar un sustrato tal como un producto lácteo con un microorganismo. En un aspecto adicional, el producto lácteo es yogurt. En un aspecto adicional, el tratamiento con el polipéptido y el microorganismo se realiza esencialmente al mismo tiempo. En un aspecto, el polipéptido y el microorganismo se añaden al sustrato a base de leche esencialmente al mismo tiempo.

En un aspecto, se proporciona una composición preferiblemente una composición alimentaria, más preferiblemente un producto lácteo que comprende una célula o un polipéptido como se describe en la presente memoria.

25 En un aspecto, se proporciona un producto lácteo que comprende una célula o un polipéptido como se describe en la presente memoria. En un aspecto, el polipéptido como se define en la presente memoria se añade en una concentración de 0,01-1000 ppm. En un aspecto, se proporciona un producto lácteo que comprende un polipéptido inactivado como se define en la presente memoria. En un aspecto, se proporciona un producto lácteo que comprende un polipéptido inactivado como se define en la presente memoria en una concentración de 0,01-1000 ppm. En un aspecto, se proporciona un producto lácteo que comprende GOS formado in situ por un polipéptido como se define en la presente memoria. En un aspecto, se proporciona un producto lácteo que comprende una célula como se define en la presente memoria.

35 Un producto lácteo como se describe en la presente memoria puede ser, p. ej., leche desnatada, leche baja en grasa, leche entera, nata, leche UHT, leche que tiene una vida útil prolongada, un producto lácteo fermentado, queso, yogur, mantequilla, leche, suero de leche, bebida de leche acidificada, crema agria, bebida a base de suero de leche, helado, leche condensada, dulce de leche o una bebida láctea con sabor. Un producto lácteo se puede fabricar mediante cualquier método conocido en la técnica.

40 Un producto lácteo puede comprender adicionalmente componentes no lácteos, p. ej. componentes vegetales tales como, p. ej., aceite vegetal, proteína vegetal y/o hidratos de carbono vegetales. Los productos lácteos también pueden comprender otros aditivos tales como, p. ej., enzimas, aromatizantes, cultivos microbianos tales como cultivos probióticos, sales, edulcorantes, azúcares, ácidos, frutas, zumos de frutas o cualquier otro componente conocido en la técnica como componente de, o aditivo a, un producto lácteo.

Uno o más componentes de leche y/o fracciones de leche representan al menos el 50% (peso/peso), tal como al menos 70%, p. ej. al menos 80%, preferiblemente al menos 90%, del producto lácteo.

45 Uno o más sustratos a base de leche que se han tratado con una enzima como se define en la presente memoria que tiene actividad transgalactosilante pueden representar al menos 50% (peso/peso), tal como al menos 70%, p. ej. al menos 80%, preferiblemente al menos 90%, del producto lácteo.

El producto lácteo puede ser un producto lácteo que no se enriquece mediante la adición de galactooligosacáridos preproducidos.

50 El sustrato a base de leche tratado con polipéptido puede no secarse antes de utilizarse como un ingrediente en el producto lácteo.

El producto lácteo puede ser helado. En el presente contexto, el helado puede ser cualquier tipo de helado, como el helado con toda la crema, el helado bajo en grasa o el helado a base de yogur u otros productos lácteos fermentados. El helado se puede fabricar mediante cualquier método conocido en la técnica.

El producto lácteo puede ser leche o leche condensada.

55 El producto lácteo puede ser leche UHT. La leche UHT en el presente contexto es leche que ha sido sometida a un proceso de esterilización que está destinado a matar todos los microorganismos, incluidas las esporas bacterianas.

El tratamiento UHT (temperatura ultra alta, por sus siglas en inglés) puede ser, p. ej., tratamiento térmico durante 30 segundos a 130°C, o tratamiento térmico durante un segundo a 145°C.

5 El producto lácteo puede ser leche ESL. La leche ESL en el presente contexto es leche que tiene una vida útil prolongada debido a la microfiltración y/o tratamiento térmico y que se puede mantener fresca durante al menos 15 días, preferiblemente durante al menos 20 días, en el estante de la tienda a 2-5°C.

El producto lácteo puede ser un producto lácteo fermentado, p. ej., yogur.

10 Los microorganismos utilizados para la mayoría de los productos lácteos fermentados se seleccionan del grupo de bacterias generalmente denominadas bacterias ácido lácticas. Como se utiliza en la presente memoria, el término "bacteria ácido láctica" designa una bacteria gram-positiva, microaerófila o anaeróbica, que fermenta azúcares con la producción de ácidos que incluye ácido láctico como ácido producido predominantemente, ácido acético y ácido propiónico. Las bacterias de ácido láctico más útiles industrialmente se encuentran dentro del orden "Lactobacillales" que incluye *Lactococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Lactobacillus spp.*, *Leuconostoc spp.*, *Pseudoleuconostoc spp.*, *Pediococcus spp.*, *Brevibacterium spp.*, *Enterococcus spp.* y *Propionibacterium spp.* Adicionalmente, las bacterias productoras de ácido láctico que pertenecen al grupo de bacterias anaerobias, bifidobacterias, es decir, *Bifidobacterium spp.*, que se utilizan frecuentemente como cultivos alimenticios solos o en combinación con bacterias ácido lácticas, se incluyen generalmente en el grupo de bacterias de ácido lácticas.

20 Las bacterias ácido lácticas normalmente se suministran a la industria láctea como cultivos congelados o liofilizados para la propagación de iniciador a granel o los llamados cultivos "Direct Vat Set" (DVS), destinados a la inoculación directa en un recipiente de fermentación o cuba para la producción de un producto lácteo fermentado. Tales cultivos se conocen en general como "cultivos iniciadores" o "iniciadores".

25 Las cepas de cultivo iniciador comúnmente utilizadas de bacterias ácido lácticas generalmente se dividen en organismos mesófilos que tienen temperaturas de crecimiento óptimas a aproximadamente 30°C y organismos termófilos que tienen temperaturas de crecimiento óptimas en el intervalo de aproximadamente 40 a aproximadamente 45°C. Los organismos típicos que pertenecen al grupo mesófilo incluyen *Lactococcus lactis*, *Lactococcus lactis subsp. cremoris*, *Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris*, *Pseudoleuconostoc mesenteroides subsp. cremoris*, *Pediococcus pentosaceus*, *Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis*, *Lactobacillus casei subsp. casei* y *Lactobacillus paracasei subsp. paracasei*. Las especies bacterianas ácido lácticas termófilas incluyen como ejemplos *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis*, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* y *Lactobacillus acidophilus*.

30 También las bacterias anaeróbicas que pertenecen al género *Bifidobacterium* que incluyen *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium animalis* y *Bifidobacterium longum* se utilizan comúnmente como cultivos lácteos iniciadores y generalmente se incluyen en el grupo de bacterias ácido lácticas. Además, las especies de *Propionibacteria* se utilizan como cultivos iniciadores lácteos, en particular en la fabricación de queso. Además, los organismos que pertenecen al género *Brevibacterium* se utilizan comúnmente como cultivos iniciadores alimentarios.

Otro grupo de cultivos microbianos iniciadores son cultivos fúngicos, que incluyen cultivos de levadura y cultivos de hongos filamentosos, que se utilizan particularmente en la fabricación de ciertos tipos de queso y bebidas. Los ejemplos de hongos incluyen *Penicillium roqueforti*, *Penicillium candidum*, *Geotrichum candidum*, *Torula kefir*, *Saccharomyces kefir* y *Saccharomyces cerevisiae*.

40 El microorganismo utilizado para la fermentación del sustrato a base de leche puede ser *Lactobacillus casei* o una mezcla de *Streptococcus thermophilus* y *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*.

45 Los métodos de fermentación son bien conocidos y la persona experta en la técnica sabrá cómo seleccionar condiciones del método adecuadas, tales como temperatura, oxígeno, cantidad y características de microorganismo o microorganismos, aditivos tales como p. ej. hidratos de carbono, aromas, minerales, enzimas y tiempo de proceso. Obviamente, las condiciones de fermentación se seleccionan para apoyar el logro deseado.

Como resultado de la fermentación, se reducirá el pH del sustrato a base de leche. El pH de un producto lácteo fermentado puede estar, p. ej., en el rango 3,5-6, tal como en el rango 3,5-5, preferiblemente en el rango 3,8-4,8.

50 En un aspecto, se proporciona un método para utilizar los polipéptidos o utilizar uno o más de los tipos de células mencionados anteriormente para producir oligosacáridos. Los oligosacáridos comprenden, pero no se limitan a fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, isomaltooligosacáridos, maltooligosacáridos, lactosacarosa y xilooligosacáridos.

55 Los oligosacáridos se pueden producir incubando la célula que expresa el polipéptido en un medio que comprende un sustrato de disacárido tal como, por ejemplo, lactulosa, trehalosa, ramnosa, maltosa, sacarosa, lactosa o celobiosa. La incubación se lleva a cabo en condiciones en las que se producen oligosacáridos. Las células pueden ser parte de un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, productos lácteos fermentados, suplementos dietéticos y productos comestibles probióticos. Alternativamente, los oligosacáridos se pueden recuperar y posteriormente añadirse al producto de interés antes o después de su preparación.

En un aspecto, se proporciona el uso de una célula descrita en la presente memoria para producir un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, producto de leche fermentada, suplemento dietético y producto comestible probiótico.

5 En un aspecto, los polipéptidos descritos en la presente memoria se pueden utilizar para preparar productos de queso y en métodos para preparar los productos de queso. Los productos de queso pueden, p. ej. ser seleccionados del grupo que consiste en queso crema, requesón y queso procesado. Añadiendo polipéptidos, los quesos pueden contener niveles significativamente aumentados de galactooligosacáridos y niveles reducidos de lactosa. En un aspecto, los niveles de lactosa en el producto de queso final se pueden reducir en al menos aproximadamente 25 por ciento, preferiblemente al menos aproximadamente 50 por ciento, y más preferiblemente al menos aproximadamente 75 por ciento. Los polipéptidos se pueden utilizar para reducir la lactosa en los productos de queso a menos de aproximadamente 1 gramo por porción, una cantidad que puede ser tolerada por la mayoría de los individuos intolerantes a la lactosa.

15 Los productos de queso proporcionados en la presente memoria son productos de queso enriquecidos nutricionalmente que tienen un contenido de fibra soluble aumentada, contenido calórico reducido, excelentes propiedades organolépticas, textura y sabor mejorados. Además, los polipéptidos descritos en la presente memoria pueden reducir el índice glucémico de los productos de queso porque los GOS se absorben más lentamente que la lactosa o sus productos de hidrólisis. Finalmente, los polipéptidos pueden reducir el coste de producción de productos de queso, particularmente productos de queso crema, porque los GOS sorprendentemente proporcionan una textura mejorada al producto de queso crema, permitiendo de este modo el uso reducido de estabilizadores, o permitiendo un contenido de humedad incrementado sin sinéresis.

25 En un aspecto adicional, se proporciona una composición que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria y un sustrato de hidrato de carbono. En un aspecto adicional, el sustrato de hidrato de carbono es un disacárido. En un aspecto adicional, el disacárido es, por ejemplo, lactulosa, trehalosa, ramnosa, maltosa, sacarosa, lactosa o celobiosa. En otro aspecto más, el sustrato de hidrato de carbono es lactosa. La composición se prepara de forma tal que se producen oligosacáridos. El polipéptido como se describe en la presente memoria puede ser parte de un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, productos lácteos fermentados, suplementos dietéticos y productos comestibles probióticos. En un aspecto, se proporciona una composición que comprende un polipéptido como se describe en la presente memoria y un estabilizante. Ejemplos de estabilizantes son, p. ej., un poliol tal como, p. ej., glicerol o propilenglicol, un azúcar o un alcohol de azúcar, ácido láctico, ácido bórico o un derivado de ácido bórico (p. ej., un éster de borato aromático).

35 En un aspecto, se proporciona el uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos. En un aspecto, se proporciona el uso de un polipéptido transgalactosilante descrito en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para ser parte de un producto seleccionado del grupo que consiste en yogur, queso, productos lácteos fermentados, suplementos dietéticos y productos comestibles probióticos. En un aspecto, el producto es yogur, queso o productos lácteos fermentados. En un aspecto, se proporciona el uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para potenciar el crecimiento de Bifidobacterium. En un aspecto, se proporciona el uso de un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria, para producir galactooligosacáridos para potenciar el crecimiento de Bifidobacterium en una fermentación de cultivo mixto.

45 En un aspecto, se proporciona un método para producir un polipéptido transgalactosilante como se describe en la presente memoria, que comprende cultivar una célula como se describe en la presente memoria en un medio de cultivo adecuado bajo condiciones que permiten la expresión de dicho polipéptido y recuperar el polipéptido resultante del cultivo. Se proporciona un método para producir galactooligosacáridos, que comprende poner en contacto un polipéptido como se describe en la presente memoria o una célula como se describe en la presente memoria con una solución a base de leche que comprende lactosa.

50 La adición de oligosacáridos puede potenciar el crecimiento de Bifidobacterium solo o de Bifidobacterium en un cultivo mixto.

55 El tratamiento de productos lácteos con enzimas que convierten la lactosa en monosacáridos o GOS tiene varias ventajas. En primer lugar, los productos pueden ser consumidos por personas con intolerancia a la lactosa que, de lo contrario, presentarían síntomas como la flatulencia y la diarrea. En segundo lugar, los productos lácteos tratados con lactasa tendrán un dulzor más alto que los productos no tratados similares debido al mayor dulzor percibido de la glucosa y la galactosa en comparación con la lactosa. Este efecto es particularmente interesante para aplicaciones tales como yogur y helado, donde se desea un alto dulzor del producto final y esto permite una reducción neta de hidratos de carbono en el producto consumido. En tercer lugar, en la producción de helados se observa a menudo un fenómeno denominado arenosidad, donde las moléculas de lactosa cristalizan debido a la baja solubilidad relativa de la lactosa. Cuando la lactosa se convierte en monosacáridos o GOS, la sensación en la boca del helado mejora mucho con respecto a los productos no tratados. La presencia de una sensación arenosa debido a la cristalización de lactosa se puede eliminar y los costos de la materia prima se pueden reducir

reemplazando la leche desnatada en polvo por suero en polvo. Los principales efectos del tratamiento enzimático fueron dulzor aumentado.

En un aspecto, el o los polipéptidos transgalactosilantes como se describe en la presente memoria se pueden utilizar junto con otras enzimas tales como proteasas tales como quimosina o renina, lipasas tales como fosfolipasas, amilasas, transferasas y lactasas. En un aspecto, el o los polipéptidos transgalactosilantes como se describe en la presente memoria se pueden utilizar junto con lactasa. Esto puede ser especialmente útil cuando existe el deseo de reducir la lactosa residual después del tratamiento con el o los polipéptidos transgalactosilantes como se describe en la presente memoria especialmente a bajos niveles de lactosa. Una lactasa en la presente memoria es cualquier glucósido hidrolasa que tiene la capacidad de hidrolizar el disacárido lactosa en galactosa y en monómeros de glucosa constituyentes. El grupo de lactasas comprende, pero no se limita a, enzimas asignadas a la subclase EC 3.2.1.108. Las enzimas asignadas a otras subclases, tales como, p. ej., EC 3.2.1.23, también pueden ser lactasas en el presente contexto. Una lactasa en el presente contexto puede tener otras actividades además de la actividad hidrolítica de la lactosa, tal como, por ejemplo, una actividad transgalactosilante. En el presente contexto, la actividad hidrolítica de lactosa de la lactasa se puede denominar como su actividad lactasa o su actividad beta-galactosidasa. Las enzimas que tienen actividad lactasa pueden ser de origen animal, vegetal o microbiano. Las enzimas preferidas se obtienen a partir de fuentes microbianas, en particular a partir de un hongo filamentoso o levadura, o de una bacteria. La enzima se puede, p. ej., obtener a partir de una cepa de *Agaricus*, p. ej. *A. bisporus*; *Ascovaginospora*; *Aspergillus*, p. ej. *A. niger*, *A. awamori*, *A. foetidus*, *A. japonicus*, *A. oryzae*; *Candida*; *Chaetomium*; *Chaetotomastia*; *Dictyostelium*, p. ej. *D. discoideum*; *Klu- veromyces*, p. ej. *K. fragilis*, *K. lactis*; *Mucor*, p. ej. *M. javanicus*, *M. mucedo*, *M. subtilissimus*; *Neurospora*, p. ej. *N. crassa*; *Rhizomucor*, p. ej. *R. pusillus*; *Rhizopus*, p. ej. *R. arrhizus*, *R. japonicus*, *R. stolonifer*; *Sclerotinia*, p. ej. *S. libertiana*; *Torula*; *Torulopsis*; *Trichophyton*, p. ej. *T. rubrum*; *Whetzelinia*, p. ej. *W. sclerotiorum*; *Bacillus*, p. ej. *B. coagulans*, *B. circulans*, *B. megaterium*, *B. novalis*, *B. subtilis*, *B. pumilus*, *B. stearothermophilus*, *B. thuringiensis*; *Bifidobacterium*, p. ej. *B. longum*, *B. bifidum*, *B. animalis*; *Chryseobacterium*; *Citrobacter*, p. ej. *C. freundii*; *Clostridium*, p. ej. *C. perfringens*; *Diplodia*, p. ej. *D. gossypina*; *Enterobacter*, p. ej. *E. aerogenes*, *E. cloacae* *Edwardsiella*, *E. tarda*; *Erwinia*, p. ej. *E. herbicola*; *Escherichia*, p. ej. *E. coli*; *Klebsiella*, p. ej. *K. pneumoniae*; *Miriococcum*; *Myrothesium*; *Mucor*; *Neurospora*, p. ej. *N. crassa*; *Proteus*, p. ej. *P. vulgaris*; *Providencia*, p. ej. *P. stuartii*; *Pycnoporus*, p. ej. *Pycnoporus cinnabarinus*, *Pycnoporus sanguineus*; *Ruminococcus*, p. ej. *R. torques*; *Salmonella*, p. ej. *S. typhimurium*; *Serratia*, p. ej. *S. liquefaciens*, *S. marcescens*; *Shigella*, p. ej. *S. flexneri*; *Streptomyces*, p. ej. *S. antibioticus*, *S. castaneoglobisporus*, *S. violeceoruber*; *Trametes*; *Trichoderma*, p. ej. *T. reesei*, *T. viride*; *Yersinia*, p. ej. *Y. enterocolitica*. La lactasa puede ser un componente intracelular de microorganismos como *Kluveromyces* y *Bacillus*. *Kluveromyces*, especialmente *K. fragilis* y *K. lactis*, y otros hongos tales como los de los géneros *Candida*, *Torula* y *Torulopsis*, son una fuente común de lactasas fúngicas, mientras que *B. coagulans* y *B. circulans* son fuentes bien conocidas de lactasas bacterianas. Varias preparaciones de lactasa comerciales derivadas de estos organismos están disponibles tales como *Lactozym.RTM.* (disponible de Novozymes, Dinamarca), *HA-Lactase* (disponible de Chr. Hansen, Dinamarca) y *Maxilact.RTM.* (disponible de DSM, Países Bajos), todos a partir de *K. lactis*. Todas estas lactasas se denominan lactasas neutras que tienen un pH óptimo entre pH 6 y pH 8. Cuando tales lactasas se utilizan en la producción de, p. ej., yogur bajo en lactosa, el tratamiento enzimático se tendrá que hacer en un paso separado antes de la fermentación o se deben utilizar dosificaciones enzimáticas altas, porque su actividad disminuye a medida que disminuye el pH durante la fermentación. Además, estas lactasas no son adecuadas para la hidrólisis de lactosa en leche realizada a alta temperatura, lo que en algunos casos sería beneficioso para mantener el recuento microbiano bajo y garantizar así una buena calidad de la leche.

La enzima puede ser una lactasa de una bacteria, p. ej. de la familia *Bifidobacteriaceae*, tal como del género *Bifidobacterium* tal como la lactasa descrita en el documento WO 2009/071539.

Ejemplo 1

Producción de polipéptidos

Se adquirió un gen sintético de *Ruminococcus hansenii* con codones optimizados para la expresión en *Bacillus subtilis* de GeneART (Regensburg, Alemania). El gen sintético se clonó en el vector de expresión pBN *Bacillus subtilis* (figura 1) y se transformó en la cepa BG6006 de *Bacillus subtilis*. Los transformantes se volvieron a sembrar dos veces en placas LB que contenían 10 mg/ml de neomicina como selección.

Se preparó un precultivo en medio LB que contenía 10 mg/ml de neomicina y se cultivó durante 7 horas a 37°C y a 180 rpm de agitación. Se utilizaron 500 ml de este precultivo para inocular 50 ml de medio modificado de Grant que contenía 10 mg/ml de neomicina al que se dejó crecer durante 48 horas a 33°C y a 180 rpm de agitación.

Los cultivos se recogieron por centrifugación a 10.000 x g y se filtraron en condiciones estériles. Los caldos de fermentación se concentraron por arriba utilizando Sartorius Vivaspin20 MWCO 10,000 Dalton (Código de producto VS2002) a 4000 rpm en una centrífuga de mesa. El concentrado se estabilizó con un 20% p/p de glicerol.

El medio modificado de Grant se preparó según las siguientes instrucciones:

ES 2 681 692 T3

PARTE I (Autoclave)

Soytone	10g
Llevar a	500 ml por litro

PARTE II

K ₂ NPO ₄ 1M	3 ml
Glucosa	75 g
Urea	3,6 g
10X MOPS de Grant	100 ml

Llevar a 400 ml por litro

La PARTE I (2% p/p de Soytone) se preparó, y se trató en un autoclave durante 20-25 minutos. La PARTE II se preparó, y se mezcló con la PARTE I y el pH se ajustó a pH a 7,3 con HCl/NaOH.

El volumen se llevó a volumen completo y se esterilizó a través de un filtro de PES de 0,22 µm.

- 5 El tampón 10X MOPS se preparó según las siguientes instrucciones:

83,72 g	Ticina
7,17 g	Gránulos de KOH
12 g	NaCl
29,22 g	K ₂ SO ₄ 0,276M
10 ml	MgCl ₂ 0,528M
10 ml	Micronutrientes de Grant 100X

Llevar a 100 ml.

Los Micronutrientes 100X se preparan según las siguientes instrucciones:

Citrato de sodio.2H ₂ O	1,47 g
CaCl ₂ . 2H ₂ O	1,47 g
FeSO ₄ .7H ₂ O	0,4 g
MnSO ₄ .H ₂ O	0,1 g
ZnSO ₄ .H ₂ O	0,1 g
CuCl ₂ .2H ₂ O	0,05 g
CoCl ₂ .6H ₂ O	0,1 g
Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O	0,1 g

El volumen se alcanzó con agua milliQ.

La esterilización se realizó a través de un filtro de PES de 0,2 µm.

La protección de la luz fue envolviendo en papel de aluminio.

- 10 El almacenamiento fue a 4°C.

Determinación de la actividad de hidrólisis de las preparaciones enzimáticas

La actividad enzimática de *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1), *Ruminococcus lactaris* (SEQ ID NO:2) y *Bifidobacterium bifidum* BIF3d3 (truncado) (como se describe por Jørgensen et al. (2001), Appl. Microbiol.

Biotechnol., 57: 647 - 652 y patente EP 1.283.876) se midió usando el sustrato comercialmente disponible 2-nitrofenil-β-D-galactopiranosido (ONPG) (Sigma N1127).

Composición de tampón 1 x ONPG:

50	mM Na-Citrato
100	mM NAPO4
2	mM CaCl2
1	mM MgCl2
20	mM ONPG

- 5 Las series de dilución de las enzimas anteriores y Lactozym® (de Novozymes) como control estándar se realizaron en placas de microtitulación de 96 pocillos. Se transfirieron 75 ml de las diluciones a una nueva placa de microtitulación y se mezclaron con 75 ml de tampón 2 x ONPG concentrado. Las mediciones de absorbancia se registraron a 450 nm en un dispositivo molecular SpectraMax controlado por el paquete de software Softmax. La cámara se equilibró a 37°C y se realizaron grabaciones cada 15 segundos durante 10 minutos en total. Se midió la generación de ONP y se determinó la Vmax de la reacción. El Vmax para cada preparación enzimática se comparó con concentraciones conocidas de (3000 LAU/ml) Lactozym® y la actividad en LAU/ml se calculó a partir del estándar Lactozym® (véase la Tabla 1 a continuación).

Tabla: 1

Enzima	LAU/ml
Lactozym®	3000
Bifidobacterium bifidum BIF3s3 (truncada)*	105
Ruminococcus lactaris (SEQ ID NO:2)	45
Ruminococcus hansenii (SEQ ID NO:1)	42

Ejemplo 2

- 15 Definición de unidad de enzima productora de GOS

En la presente solicitud, la actividad transgalactosilante relativa se define como la diferencia entre la cantidad de glucosa liberada restada de la cantidad de galactosa liberada dividida por la cantidad de galactosa generada en tampón T a 37°C.

Ecuación 1:

20 Actividad relativa transgalactosilante =
$$\frac{[\text{Glucosa}] - [\text{Galactosa}]}{[\text{Glucosa}]}$$

El tampón T se preparó de la siguiente manera:

50	mM No-citrato
100	mM Na – PO4
2	mM CaCl2
1	mM MgCl2
5	p/p % Lactosa
	pH 6,0

Medición de galactosa y glucosa por cromatografía HPLC

- 25 La galactosa y la glucosa se analizaron utilizando un sistema Dionex ICS3000 que consta del automuestreador ICS-3000 AS, el detector ED ICS-3000, el módulo de cromatografía DC ICS-3000 y una bomba de gradiente DP (Dionex Corp, Sunnyvale, California, EE.UU.).

La galactosa y la glucosa se separaron utilizando una columna CarboPac PA1 de 4 mm con una columna de protección CarboPac PA1 de 4 mm (Dionex Corp, Sunnyvale, California, EE.UU.). El flujo fue de 1 ml/min. El gradiente se realizó según la tabla 2, y la cuantificación se realizó con el uso de estándares externos.

5 Tabla 2: Programa de gradiente (p/p %) utilizado para el análisis de monosacáridos en muestras

Tiempo (min)	Agua Milli Q	NaOH 150 mM
0-12	90%-85%	10%-15%
12-25	85%-0%	15%-100%
25-30	0%	100%
30-32	0%-90%	100%-10%
32-34	90%	10%

Los eluyentes utilizados fueron agua y NaOH 150 mM. Se preparó NaOH 150 mM (eluyente) desgasificando 2 l de agua Milli Q durante 10 minutos y añadiendo 16 ml de NaOH al 50% p/p y desgasificando durante otros 5 minutos.

Cálculo de la actividad transgalactosilante

10 La actividad relativa transgalactosilante se calculó según la ecuación 1 y las concentraciones de glucosa y galactosa se midieron mediante HPLC.

Tabla 3: Concentración de Galactosa en %:

Tiempo/min	0	15	30	60	120	180
Lactozym®	0	1,5	1,9	2,1	2,3	2,1
<i>Bifidobacterium, bifidum</i> BIF3d3 (truncado)	0	0,5	1	1	1	0,9
<i>Ruminococcus hansenii</i> (SEQ ID NO:1)	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
<i>Ruminococcus lactaris</i> (SEQ ID NO:2)	0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3

Tabla 4: Concentración de Glucosa en %:

Tiempo/min	0	15	30	60	120	180
Lactozym®	0	1,9	2,3	2,3	2,4	2,2
<i>Bifidobacterium, bifidum</i> BIF3d3 (truncado)	0	1,5	1,8	1,8	1,6	1,8
<i>Ruminococcus hansenii</i> (SEQ ID NO:1)	0	0,7	1,3	1,2	1,3	1,3
<i>Ruminococcus lactaris</i> (SEQ ID NO:2)	0	0,4	0,5	0,8	0,7	0,8

Tabla 5: Relación de actividad transgalactosilante:Actividad β -galactosidasa

Tiempo/min	0	15	30	60	120	180
Lactozym®	nd	0,27	0,21	0,10	0,04	0,05
<i>Bifidobacterium, bifidum</i> BIF3d3 (truncado)	nd	2,00	0,80	0,80	0,60	1,00
<i>Ruminococcus hansenii</i> (SEQ ID NO:1)	nd	6,00	12,00	5,00	5,50	5,50
<i>Ruminococcus lactaris</i> (SEQ ID NO:2)	nd	3,00	4,00	7,00	2,50	1,67
nd: No determinado para este punto de tiempo.						

Tabla 6: Actividad transgalactosilante relativa en %:

Tiempo/min	0	15	30	60	120	180
Lactozym®	nd	21,05	17,39	8,70	4,17	4,55
<i>Bifidobacterium, bifidum</i> BIF3d3 (truncado)	nd	66,67	44,44	44,44	37,50	50,00
<i>Ruminococcus hansenii</i> (SEQ ID NO:1)	nd	85,71	92,31	83,33	84,62	84,62
<i>Ruminococcus lactaris</i> (SEQ ID NO:2)	nd	75,00	80,00	87,50	71,43	62,50
nd: No determinado para este punto de tiempo.						

La Fig. 2 muestra la acumulación de glucosa y galactosa en el tiempo extra. Como es claramente evidente a partir de la Fig. 2 y las tablas anteriores, las enzimas de *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1) y *Ruminococcus lactaris* (SEQ ID NO: 2) generan solo entre 10 - 20% de galactosa en relación con la enzima de *Bifidobacterium, bifidum* BIF3d3 (truncada). Estos hallazgos sugieren que las enzimas de *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1) y *Ruminococcus lactaris* (SEQ ID NO: 2) son capaces de excluir agua del sitio activo de manera más eficiente que Lactozym® y la enzima de *Bifidobacterium, bifidum* BIF3d3 (truncada).

Ejemplo 3

10 Ensayo en leche

Se prepararon muestras en 9% p/p de leche reconstituida a partir de leche desnatada en polvo (Humana Milk Union, DE NW508 EG) dando una concentración final de lactosa de 5% p/p. Las enzimas se dosificaron en base a la actividad de LAU determinada como se describió anteriormente a una concentración final de 6 LAU/ml. Se tomó una muestra antes de la adición de la enzima y se tomaron muestras adicionales en puntos de tiempo indicados y las enzimas se inactivaron inmediatamente incubando a 95°C durante 10 minutos. Las muestras se diluyeron 1:10 y se aplicaron 2 ml sobre placas de gel de sílice 60 HPTLC activadas (161°C durante 10 minutos) (Merck Cat NO 1.05641.0001) con un CAMAG Automatic TLC Sampler 4. Las placas de TLC se eluyeron con un eluyente que contiene (80) acetonitrilo: (20) acetato de etilo: (50) 1-propanol: (40) agua. Las muestras se visualizaron calentando (161°C durante 10 minutos) y se dejaron enfriar antes de sumergirlas en 5% p/p de H2SO4 en etanol al 99,9%. Las placas se desarrollaron con calentamiento a 161°C durante 3 min.

Tabla 7: Composición de estándares:

	Conc Std A (p/p %)	Conc Std B (p/p %)	Conc Std C (p/p %)
Glucosa	0,5	0,4	0,1
Lactosa	0,3	0,2	0,5
Galactosa	0,1	0,05	0,3

El número de muestra en la fig. 3 es como se muestra en la tabla a continuación:

Número de muestra:

1	Std A	8	Lactozym® 120 min	15	<i>B.bifidum</i> 180 min	22	<i>R. lactaris</i> 0 min
2	Std B	9	Lactozym® 180 min	16	<i>R. hansenii</i> 0 min	23	<i>R. lactaris</i> 15 min
3	Std C	10	<i>B.bifidum</i> 0 min	17	<i>R. hansenii</i> 15 min	24	<i>R. lactaris</i> 30 min
4	Lactozym® 0 min	11	<i>B.bifidum</i> 15 min	18	<i>R. hansenii</i> 30 min	25	<i>R. lactaris</i> 60 min
5	Lactozym® 15 min	12	<i>B.bifidum</i> 30 min	19	<i>R. hansenii</i> 60 min	26	<i>R. lactaris</i> 120 min
6	Lactozym® 30 min	13	<i>B.bifidum</i> 60 min	20	<i>R. hansenii</i> 120 min	27	<i>R. lactaris</i> 180 min
7	Lactozym® 60 min	14	<i>B.bifidum</i> 120 min	21	<i>R. hansenii</i> 180 min		

La Fig. 3 muestra la composición de azúcar de la leche en diversos puntos de tiempo durante la incubación. Mientras que Lactozym® genera cantidades aproximadamente iguales de glucosa y galactosa, las enzimas de *Bifidobacterium, bifidum* BIF3d3 (truncadas), *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1) y *Ruminococcus lactaris* (SEQ ID NO: 2) generan todas más glucosa que galactosa. Estos resultados son indicativos de que todas estas enzimas son capaces de realizar transgalactosilación en leche reconstituida con una concentración de lactosa inicial de 5% p/p.

Ejemplo 4

Actividad de mutantes de núcleo catalítico de *Ruminococcus hansenii*

Purificación de la enzima a partir de muestras crudas

- 5 Se obtuvieron muestras de enzimas crudas como se describe en el ejemplo 1.

Método de purificación

Cromatografía de intercambio iónico, Q HiTrap HP FF 5 ml

La columna se preparó como se describe por el fabricante y se equilibró en tampón Tris/HCl 20 mM, pH 8,0 (tampón A).

- 10 La muestra (5 ml) se desaló en Tampón A y se aplicó a la columna a un caudal de 4 ml/min. La columna se lavó con tampón A y las proteínas unidas se eluyeron con un gradiente lineal de NaCl 0-0,6 M en tampón A. Durante todo el recorrido se recogieron fracciones de 4 ml.

Ensayo de actividad

- 15 Se mezclaron 90 ml de tampón de reacción con 30 ml de la muestra de enzima diluida indicada (tabla 8) en una placa de PCR Eppendorf twin tech de 96 pocillos (Cat. 951020401) y se incubaron durante 30 minutos a 42°C en un equipo PCR Eppendorf Mastercycler Gradient. La reacción se detuvo transfiriendo la mezcla a una placa Costar 9017 de 96 pocillos que contenía 120 ml de Na-carbonato 10% (solución de parada). Las reacciones se midieron a 420 nm en un lector de placas Spectra Max 190 de Molecular Devices.

Tabla 8:

	Proteína, µg/ml	Diluida	OD420	Tiempo/min	Actividad/min, %
E592Q Frac. 13	62	10X	0,011	25	3
D625N Frac. 14	11	2X	0,168	25	50
D588N Frac. 14	6	1X	0,019	25	6
D576N Frac. 17	29	5X	0,270	5	81
WT Frac. 17	33	5,5X	0,335	5	100

- 20 Las concentraciones de proteína se ajustaron a la de la muestra D588N diluyendo con tampón Na-P 50 mM (pH 7,0) y se midió la actividad como se describe anteriormente.

La Tabla 8 muestra la concentración de proteína en las fracciones indicadas, el factor de dilución para alcanzar la concentración de D588N, la medición de OD420, el tiempo de reacción en minutos y la actividad relativa por minuto de la enzima de tipo salvaje (WT) de *Ruminococcus hansenii*.

- 25 La Fig. 4 muestra los resultados de la cromatografía de intercambio aniónico de las variantes anteriores de *Ruminococcus hansenii* (SEQ ID NO: 1). El gel es un gel de acrilamida Nu-PAGE 4-12% teñido con tinción azul brillante coomassie.

Calle	Muestra
1	E592Q cruda
2	Frac. 13 eluida
3	Frac. 14 eluida
4	D625N cruda
5	Frac. 14 eluida
6	Frac. 15 eluida
7	D588N cruda
8	Frac.14 eluida
9	Frac.17 eluida

ES 2 681 692 T3

Calle	Muestra
13	D576N cruda
14	Frac. 17 eluida
15	Frac. 18 eluida
16	WT cruda
17	Frac. 17 eluida
18	Frac. 18 eluida

Lista de secuencias

La SEQ ID NO: 1 es un fragmento truncado de 1125 aminoácidos de la SEQ ID NO: 12.

KADSQTQMSSEPEQVAVKDYGSNSARTQNF	DSDWKFNLDGVSNAQTPTFD	DSKWRTLSLP	60			
HDYSIEQEYSQSLEAESGYLPGGVGWYRKN	FTLGEEAKGKRIRIDFDGVY	MNATVYVNGK	120			
EVGTHPYGYTFPFDITDYLSYDKENTIAV	KVDHQTPSSRWYSGSGIYRS	VNLTTTNDVH	180			
VDLNGIKVESNNLEKEAGKT	VNTDVKTTVNGSKEAKNIT	ITHTVFKKGE	KPKAIGTFT	240		
TEAQEIGAGKTEISATVPV	KNPELWSVENPALYTI RTEV	KAGDKLLDSY	DTEYGFHYLN	300		
FDTETGFQLNGKNVKLKGVC	MHHDQGALGAVANRRAIERQ	VEILQEMGCN	SIRVTHNPAS	360		
KDLIEVCNEKGILVIEEVED	GWHRAKNGNSNDYSVWFEKA	IEEDNAILGK	EADMTWAEYD	420		
LKAIMKRDQNAPSIIEWSLG	NEIQEGAGSGYAERADKLI	KWAKEADATK	TLTIGSNAVK	480		
RGDWEQVSIKDKLTKAGGTS	GTNYS DGASYDKIHKEHPDW	KLYGSETASS	VNSRGIYSVT	540		
GNQEATSDQQLTAYDNSRVN	WGALASQAWYDVIQRDFVAG	EYVWTGFDYI	GEPTPWNGTD	600		
PGAKGTWPSPKNSYFGIIDT	AGFPKDSYFYQSQWNEEVN	TLHLVLPWNE	DVVKKNSDGT	660		
VPVVVYSDAK	EVELFFT PAN	GGEKKS LGKK	TFKTETTKAG	YSYQVLENGK	KKHKDLYMEW	720
QVPYEAGTLE	AVAKDAKGNV	IKDTEGRSVV	KTTGEEAKLS	AKTDRNSIQA	DGKDL SYITV	780
DVTDKDCNIV	PDAANRVTFD	VQCAGKLVGV	DNGSSPDHDS	YKADNRKAFS	GKVLAI VQST	840
EKAGEITVTA	KADGLESSTV	KITTTTPVKEE	PSERYVESYK	YSKSYVVKTG	TKPQLPKKIE	900
AQYSDRTKED	VAVKWDEISD	EQISKTG SFT	VEGTVGKRDI	TVNINMIDDV	AALLNYSGAT	960
QKGVKPOLPD	VRPAVLDPGT	VLAASFPVQW	DEKDADTFQK	PDEIVTVNGS	ADIFGKTI PV	1020
TASIRVQKED	IKIGSSVTNV	AKLSQNIQGS	DTLEAIKDGK	TEMSLNNDGG	PNESAWSNWD	1080
ASQKGTKEAE	LTFTFDTPQQR	IGEIVIHFAK	DNNSIRFPDA	GTTEI		1125

5 La SEQ ID NO: 2 es un fragmento truncado de 1150 aminoácidos de la SEQ ID NO: 13.

AGVSVPALAQ	QAVRTESEQTQ	MSSDPELVYV	NNYSSTAQRS	QNFNSNWKFY	FGDAGNAQGA	60
TFDDSKWEQV	SLPHDYSISQ	EYSKSMEAES	GYLGGGTGWY	RKNFTLSSDT	QGKRVRIDFD	120
GVYMNATVWV	NGHEVGTHPY	GYTSFSFDIT	DYVKYDGENT	IAVKVVNNTPT	SSRWYSGSGI	180
YRDVDLTTITD	DVHVDLNGTK	VTTPNLETEK	GSTVNTDVTA	TVANDSDAAK	SVAVRHTVFP	240
KDGSADQSIG	TVTNTAQ SIA	AGATAEIQAT	VPVSNPELWS	VENPSLYTVR	TEVLVDGQVP	300
DTYDTEYGFR	YFNFD SNTGF	SLNGENMKLK	GVCMHHDQGS	LGAAAYDSAI	DRQVKL LKEM	360
GCNSIRVTHN	PAAQDLIDAC	NEQGILVVEE	AFDTWTRPKN	GNSNDYSVWF	NQTVASDNEI	420
LGATNGETWA	QFDLESMSR	DYNAPSVIMW	SLGNEVMEGI	SGGTDAEYEA	TATKLINWAY	480
DADNTRPMTI	GDNK LKANWQ	ISKTFARLLT	EKGGTVGFNY	ADGRVLDSYH	SSNSNWLLYG	540
SETASAINSR	GIYYRTTGGG	QTS DKQLTSY	DNSNVGWGAT	ASNAWYTVLT	RDFAAGEYVW	600
TGFDYLG EPT	PWNGTGS GAV	GSWPSPKNSY	FGI IDTAGFA	KDSYFFYQSQ	WNDDVT LHV	660
LPANNNNVVS	KDSSGNVPV	VYSDAASVEL	FFQAKGSDTK	TSLGKKTFTQ	KTTDAGYTYQ	720
IYEGSDKNST	TDKNLYLTWN	VPYADGTVSA	VAYNSNGQKI	TDTVGQSSVT	TTGKASKLKA	780
SADHKKIAAD	GESLSYITVD	VTDANGNIVP	DAENRVKFTV	EGDGELVGV	NGSSPDHDSY	840
QADNRKAFSG	KVLAI V KSTK	EAGTITV TAS	ADGLDSASVK	TTTTAVDNGS	TEKQID SFKM	900
SRTYYVKVGS	TPELPEKIVT	RYTDGTSEEL	PVTWDAITED	QIAAAGSFQV	KGTVKGGYSV	960
AVNVNMIDEV	GGLLNYS TNT	AVGVAPVLP	SRPAVLDPGT	VMDVTFPVTW	EDKAASAYDK	1020
ACTVTVNGTA	NVLGKELAVT	ASVRVQEETI	TIGDSVSADA	LNLTFQSVPAD	KQSDTLNALK	1080
DGSTTISSNT	SGGANPTVWS	NYDYSQDGNT	TADIIFEYAT	EQRLGQIVTH	FARDSWSMRY	1140
PDAGATEIYV						1150

La SEQ ID NO: 3 es los restos de aminoácidos 559-649 de la SEQ ID NO: 1.

VNWGALASQA	WYDVIQRDFV	AGEYVWTGFD	YIGEPTPWNG	TDPGAKGTWP	SPKNSYFGII	60
DTAGFPKDSY	YFYQSQWNEE	VNTLHVLPAN	N			91

ES 2 681 692 T3

La SEQ ID NO: 4 es los restos de aminoácidos 579-649 de la SEQ ID NO: 1.

```
AGEYVWTGFD YIGEPTPWNG TDPGAKGTWP SPKNSYFGII DTAGFPKDSY YFYQSQWNEE    60
VNTLHVLPAN N                                                                    71
```

La SEQ ID NO: 5 es los restos de aminoácidos 579-636 de la SEQ ID NO: 1.

5 AGEYVWTGFD YIGEPTPWNG TDPGAKGTWP SPKNSYFGII DTAGFPKDSY YFYQSQWN 58

La SEQ ID NO: 6 es los restos de aminoácidos 575-665 de la SEQ ID NO: 2.

```
VGWGATASNA WYTVLTRDFA AGEYVWTGFD YLGEPTPWNG TGSGAVGSWP SPKNSYFGII    60
DTAGFAKDSY YFYQSQWNDD VTTLHVLPAN N                                          91
```

La SEQ ID NO: 7 es los restos de aminoácidos 594-665 de la SEQ ID NO: 2.

```
AGEYVWTGFD YLGEPTPWNG TGSGAVGSWP SPKNSYFGII DTAGFAKDSY YFYQSQWNDD    60
VTTLHVLPAN N                                                                    71
```

10 La SEQ ID NO: 8 es los restos de aminoácidos 594-652 de la SEQ ID NO: 2.

AGEYVWTGFD YLGEPTPWNG TGSGAVGSWP SPKNSYFGII DTAGFAKDSY YFYQSQWN 58

La SEQ ID NO: 9 es un péptido señal del vector de expresión de Bacillus subtilis pBN.

VRSKKLWISLLFALALIFTMAFGSTSSAQA

15 La SEQ ID NO: 10 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 1 que incluye la secuencia que codifica el péptido señal.

```
gtgagaagcaaaaaattgtggatcagtttctgctttgcttagcgtaatcttacgatggcgttcggcagcacatccagcgcgaggc
ggcagggaaaaaagcagatagccaacacaaatgtcatcagaaccggaacaagtgcggttaagattatggctcaaatagcgc
acgcacacagaatattgatagcattggaatttaacctgggagatgtagcaatgcacagacaccgacattgatgattcaaatg
```

gcgcacactgtcactgccgatgattatagcatcgaacaggaatattcacaatcactggaagcagaatcagggtatctccggagg
 cgttgctggtatcgcaaaattttacactggcgagaagaagcgaaaggcaaacgcattcgcattgattttgatggcgtctatagaat
 gcaacagtctatgtaagtgcaaaagagttggcacacatccgatggctatacaccgttagcttgatcacagattatcagcta
 tgataaagaaaaacaattgctgcaaaagtcgatcatcaaacaccgctcatcaagatggtattcaggcagcggcattatagatcagt
 caacctgacaacaacaatgatgtccatgtcagatctgaatggcattaagtcgaaagcaacaacctggaaaaagaagcaggcaaa
 acagtcaacacagatgtgaaaaacaacagttgtgaacggctcaaaagaagcgaaaaacatcacaattacacatacagctcttaaaa
 aaggcgaaaaaccggataaaagcagatcggcacatttacaacagaagcgcaagaaattggcgcaggcaaaaaaacagaaatcagc
 gcaacagtcccggtaaaaaatccggaactgtggtcagttgaaaatccggcactgtatacaattcgcaacagaagtaaaagcaggcga
 taaactgctggatagctatgatacagaatattgcttctcattatctgaaacttgatacagaacaggcttccagctgaatggcaaaac
 gttaaaactgaaaggcgttgcagatcatgatcaaggcgcacttgccgcagttgcaaatagaagagcaattgacgccaagtgcga
 aattctgcaagaaatgggctgcaatagcattagagtcacacataatccggcaagcaagatctgattgaagtctgcaacgaaaaag
 gcattctggtcattgaaagttttgacggctggcatagagcaaaaaatggcaacagcaacgattatagcgtctggttgaaaaag
 cgatcgaagaagataacgcgattctgggaaaaagaagcggatagcttggcagaatattgatctgaaagcagattatgaaacgcga
 tcaaatgcaaccgagcattatgaaatggtcactggcaatgaaattcaagaaggcgcaggcggatcaggctatgcagaaagagcg
 gataaactgatcaaatggcgaaagaagcagacgcaaaaaacactgacaattggcagcaatgcagttaaaagggcgattgg
 gaacaagttagcatcggcgataaacttacaagaagcaggcgggaacatcaggcacaattattcagatggcgcacatagataaact
 tcaaaagaaactccggattggaactgtatggctcagaacagcatcatcagtaataagcctggttattcagttacaggtacaggca
 caagaagcaacaagcagatcaacaactgcagcgtatgataatagcagagtttaattggggagcactggcacaagcattggtatg
 atgitatccagagagattttgtcgcaggcgaatattggtgacaggcttgattatcggcgaaccgacaccgtggaatggcacaaga
 tccgggagcaaaaggcacatggcgtcaccgaaaaacagctactttggcattatcgatacagcaggcttccgaaagattcatatta
 ttttatcagagccagtggaatgaagaagtcaatacactgcagcttctccggcatggaatgaagatgctcaaaaaaaactcaga
 tggcacagttccgggttgtttattcagatgcgaaagaagtcgaactgtttttaccggcaaatggcggagaaaaaaaagcctg
 ggaaaaaaacatttaaacagaaacaacaaaagctggctatagctatcaagttctggaaaaacggcaaaaaaaacataaagat
 ctgtatattggaatggcaagttccgtatgaagcaggcacactgaagcagttgcgaaagatgcaaaaggcaacgtcattaagatac
 agaaggcagaagcgtctgtaaaacaacaggcgaagaagcaaaactgtcagcaaaaacggatcgaatagcattcaagcagatg
 gcaaaagatctgtcatatattacagtcgatgtcacagataaagatgcaaatattgttccggatgcagcaaatagatcatttggatg
 ccaaggcgcaggaaaaactgggtgctgataatgctcatccggatcatgatagctataaagcggataaccgcaagcattttc
 aggcaaaagtctgcaattgttcagtcacagaaaaagcaggcgaatattacagttacagcaaaagcagatggcctggaatcaagc
 acagtcaaaatcacaacaacaccggtaaaagaagaaccgagcgaagaatattgctgaaagctataaatacagcaaaagctattatg
 tgaaaacaggcacaacacccgcaactgcccgaaaaaattgaagcgcagtatagcagatcgcaaaaagaggtggttgcgtcaaat
 gggatgaaatctcagatgaacaaattagcaaaaacaggcagcttaccagttgaaggcacagttggcaaaagagatcacagtcac
 cattaacatgatcagatgattgcagcactgctgaattattcaggcgcacaacaaaaaggcgttaaacccgcaactccggatggttag
 ccggcagttctgctgatggcacagtcctggcagcatcatttccgggtcagttggatgaaaaagatgggatacatttcagaaaccg
 gatgaaattgtacagttaacggcagcagatattcttggcaaaaacattccgggttacagcaagcattagagtgcaaaagaaga
 tatcaaaattggcagcagcgttacaaatggtgcaaaaactgagcaaaatattcaaggcagcagatacactggaaagcaatcaagatg
 gcaaaaacagaaatgagcctgaataatgatggcggaccgaatgaatcagcatggtcaaatgggatgcatcacagaaaggcaca
 aagaagccgaactgacatttattgatacacagcaacgcattggcgaatgtcattcattttgcaagataacaactcaatcag
 atttccgatgctggcacaacagaatctaa

La SEQ ID NO: 11 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 2 que incluye la secuencia que codifica el péptido señal.

gtggatcagtttgctgtttgcttaagcgttaactttacgatggcgttcggcagcacatccagcgcagggcggcaggaagcaggcg
 tttcagttccggcactggcacaacaagcagttagaacagaaagccaaacacaatgtcatcagatccggaactggtctatgtaata
 actatagcagcacagcacaagaagccagaactttaacagcaactggaaatttactctcgagatgcccggaaatgcaacaggcgc
 aacatttgatgatagcaaatgggaacaagtttactgcccgatgattattcaatcagccaagaatagcaaatcaatggaagcaga
 atcaggctatcttggcggaggcagggctggtatcgcaaaattttactgagcagcagatacacaaggcaaaagagtcggcattg
 atttgatggcgtctatagaatgcaacagttgggttaattggcagatgagttggcacacatccgtatggctatacaagcttctg
 atatcacagattatgaaatattggtggcaaaaacacaattgcagtcgcaaatgctcaataatacaccgtaagcagatggtattcag
 gctcaggcattatagagatgctgatctgacaatcacagatgatgttcatgttgatctgaaaggcacaacaaagttacaacaccgaact
 ggaaacagaaaaaggcagcagcagtcataacagatgttacagcaacagttgcaatgattcagatgcagcaaaatcagttgcagtt
 cgccatacagttttccgaaagatggcagcgcagatcaatcaattggcacagtcacaacaaatgcaaatcaattgcagcagggcgc
 aacagcagaaattcaagcaacgggtccggttcaaatcctgaaactgtggtcagttgaaaatccgtcactgtatacagtcagaacaga
 agttctggtcagcggcaagtcacagatacatatgatacagaatattggcttctgctatttaactttgatagcaacacaggctttcact
 gaatggcgaatatgaaactgaaaggcgtctgcatcatgatcaaggctcacttggcgcagcagcagatacagactcagcaattg
 atcggcaggtcaaaatctgaaagaatgggctgcaatagcatttagagtcacacataatccggcagcacaagatctgattgatgct
 tgcattgcaaaaggcattctggttgaagaagcgtttgacttggaacagaccgaaaaatggcaacagcaacgattatagcgtc
 tggtttaacagacagttgctgagataatgaaattctgggagcgaacaaatggcgaacatgggcaaatgttgcagttgaaagcag
 gatctcacgcgattataatgcaaccgtcagtcattatgtggtcactggcaatgaagttatggaaggcattagcggaggcagatg

5

agaatatgaagcgacagcgacgaaactgattaactggcgatgatgctggataatacacgctccgatgacaattggcgataacaa
ctgaaagcgaactggcagatctcaaaaaatttgcgagactgctgacagaaaaaggcggaacagtggttattatgagatg
gcagagtctggattcatatcatagcagcaatgcaattggctgctgatggtcagaaacagcatcagcgattaatagccgtggcat
ctattatagaacaacaggcggaggccaaacatcagataaacagctgacaagctatgataattcaaattggtggctgggagcaaca
gcatcaaatgcatggtatcacagtctgacaagagatttgcggcaggcgaatattggtgacagcgttggattatctggcgaaaccga
caccgtggaatggcacaggctcaggcgcagttggctcatggccgtcaccgaaaaattcttatttggcattatcgatacagcaggctt
cgaaaaagatagctatttttatcagagccagtggaatgatgatgttacaacactgcatgttctccggcatggaataataatgctg
tcagcaaaagattcatcagcgaatggtccggttgggttattcagatgctggcagcagcgaactgttttcaagcaaaaggcagcagat
acaaaaacaagcctgggcaaaaaacatttacacagaaaaacaacagcagcaggctatacatatcagatctatgaaggctcagata
aaaacagcacaacagacaaaaactgtatctgacatggaatggtccgatgagatggaacagtttcagcagttgctgataatagca
acggccagaaaaattacagatacagttggccagctcagttacaacaacaggcaaacgctcaaaactgaaagcatcagcggatca
taaaaaaattgcagcggatggcgaatcactgtcatatatacagctgatgacagatgcaatggcaatattgtccggatgcaga
aaatcgctcaaaattcagttgaaggcagtggaactggttggcgtgataatggtctatcaccggatcatgattcatatcaagcg
gataaccgcaaacgatttcaggcaaacggttggcaattgtgaaaagcacaagaagctggcacaattacagttacagcatcagc
agatggcctggattcagcatcagtcaaaatcacaacaacagcagtcgalaatggcagcacagaaaaacaatcgatagctttaa
atgagccgcacatattatgtaaagtggcagcacaccggaactgcccgaaaaaattgtcacacgctatacagatggcacatcaga
agaactgctgttacttggatgcaattacagaagatcaaattgcagcagcagcagcattcaagttaaaggcagtcacaaggcg
gatattcagttgagcagcgaacatgattgatggaagtggcggactggaattattcaacaatacagcagttggtgctgacc
ggttctccgacatcaagaccggcagttctgcaagatggcacagttatggtatcatttccggtcacatgggaagataaagcagc
aagcgcatatgataaagcagggcacagtgacagtcaatggcacagcaaatggtctggcgaagaattgagttacagcagcgtt
agagttcaggaagaacaatcacaattggagattcagttcagcggatgactgaatctgacacaaagcgttccggcagataaca
aagcgatacactgaacgcaataaagatggctcaacaacaattagctcaatacaagcggagggcgaatccgacagtttgagc
aactatgactatagccagatggcaatacagcagcgatatttttgaatatgagcagacaaagactgggcaaatcgttaca
catttgcgagagatagctggtcaatgagatacctgatgcaggcgtacagaaattatgtctaa

La SEQ ID NO: 12 es una beta-galactosidasa de *Ruminococcus/Blautia hansenii* DSM 20583.

myffgrsaimmltkrkeifmrkqlrilarigaatlaavltvqgmgsstvyakeepvrkadsqtqmssepeqvavkdygsnsar
tqnfdsdwkfnlgdvsnaqtpfddskwrtislpdysieqeqsqsleaesgylpgvgwyrknfllgeeakgkriridfdgvymna
tvvngkevgthpygytptfsditdyisydkentiaavkvdhqtppsrwysggyrsvnlttndvhdngikvesnlekeagktv
ntdvtktvngskeaknitithvfkkgkepdkagttteaeigagkkteisatvpvknpelwsvenpaltyirtvkvagdklldsy
dteygfhylnfdtetgfngknvklkgvcmhhdqgalgavanraierqveilqemgcnsvrthnpaskdliedvncgkglviev
fdgwhrakngnsndysvwfekaieednailgkeadmwaeydlkaimkrdqnapsliewslgneiqegaggsgyaeradklik
wakeadatktitignavkrgdweqvsgdkitkaggtsgtnysdgasydkihkehpdklygsetassvnsrgiysvtgnqeats
dqqltaydnsvnwgalasqawydviqrdfvageyvwgtfyigeptpwnngtdpgakgtwpspknsyfgiidtagfpkdsyyfy
qsqwneevntlhvlpawnedvkknsdgtvpvvydsakevefftpanggekkslgkktfktettkagysyqvlengkkkkhkd
ymewqvppeagtleavakdakgnviktdegrsvvktgeeklsaktdrnsiqadgkdlstytvdtdkdgnivpdaanrvtdv
qgagklvgvndngsspdhdsykadnrkafsgkvlavqstekageitvtakadglesstvkitttppkeepseryseskyksyyv
ktgkqplpkkieaqsdrkedvavkwdeisdeqisktsftvegtvgrditvnmiddvaallnysgatqkqvkpqlpvrpa
vlpdgtvlaasfpvqwkdedatdfqkpdvvtvngsadifgktpvtasirvqkedikigssvtnvaklsqniqgsdtleaidgkte
mslnndggpnesawsnwdsqkqkeaeltfdfdqqrigeivihfakdnnsirfpdagtteifvstgkdtgkvevkehigee
kdrvkayryeiapvtatyvkvkvnanatdtgnrkpctaitevelkkaegsfkvnetaeieevkvgervlpnaayaldsvspetd
aavtaktkdnasltliphenvvrmilesedhkatknfavrmgeetvlpdddsrdypvekitatagseykpgtanegpvkyvidg
kaethwhnwsvsgegskpehrtvtlqigndeeeapmidalrymprsngangrvteyeyiqysldgdkwqtaatgeidkkqtgw
milgfeepvqakyvrfigthtsdqndkhmavselrvarvateapapsekytitanvndktmgavtldsetgeyekgkattlavp
kegfavnwtidgqevskenpyihtvetdatitanferievenegwvqtengweyyengqkvvgwkevsqkwyyfeenglmqt
gwwfvnnhwyymdqwgamcigwvavdgwhwyymdqwgamctgwsvngwhwyhmdqwgamqtwalvdsnwyyln
tdgsmaigwvavngwhwyymdqwgamqtwalvdsnwyylntdgsmaigwvavngwhwyymdqwgamqtwvlgvsgd
wyylntdgsmassqwidgyyvdsagkmmk

5 La SEQ ID NO: 13 es una glucosidasa de *Ruminococcus lactaris* ATCC 29176.

mkkkkrcrtrvgagalaavlavtaagvsvpalaqqavrtesqtqmssdpelvynnsstaqrnsqfnfnsnwkyfgdagnaagat
fddskweqvslpndysieqeqsksmeaesgylgggtgwykrknfllssdtgkkrvridfdgvymnatvwnghvevthpygytsf
sfditdyvkydgentiavkvvntpssrwwysggyrvdltitddvhdngtkvtpnltekgstvtndvtdvatvandsdaaksva
vrhtvfpkqgsadqsigvttnaqsiaagataelqatvpvsnpelwsvenpslytrtevlvdgqvtdtydteygyfryfnfndstgfs
ngenmklkgvcmhhdqgslgaaaydsaidrkvkilkemgcnsvrthnpaaqdlidacneqgllvveeafdtwtrpkngnsndy
svwfnqtvasdneilgatngetwaqfdlesmsirdynapsvimwslgnevmegisggtdaeyeatatklinwaydadntrpmtl
gdnklikanwqisktfarlltekggtvgfnyadgrvldsyhssnsnwllgsetasainsrgiyyrtgggqtsdkqltsydnsvngw

atasnawytvltrdffaageyvwgtfdylgeptpwngtgsgavgswwpspknsyfgliidtagfakdsyyfyqsqwnddvtllhlvpa
wnnnvskdssgnvpvvyvysdaasvelffqakgsdtktslgkktftqkttdagtyqiyegsdknsttdknlyltwnvpyadgtvs
avaynsngqkitdvtvgqssvttgkasklkasadhkkaaadgeslsyitvdvtdangnivpdaenrvkftvegdelvgvndngssp
dhdsyqadnrkafsgkvlavkstkkeagtitvtasadgldsasvkittavdngstekqidsfkmsrtyyvkvgstpelpekivtrytd
gtseelpvtwdaitedqiaaagsfvkgtvkggysvavvnmidevggllnystntavgvapvlptsrpavlqdgvtvmdvtfpvt
wedkaasaydkagvtvngtanvlgkeiavtasvrvqeetitgdsvsadalnltqsvpadkqsdtnaikdgsttissntsgganpt
vwsnydysqdgnttadiifeyateqrlgqivthfardswsmrypdagateiyvspdgtwnakldttetigtsgnvpkytydfapv
gatfvkfhltntstqatgttakactgiteielkvatgsrtnttaelqtlvngkevpqaldskvytppailaeieatakdnasvvlpaynd
viriiivesedhqtrntyevrlneaeqtpdsdsrdypvskltasagseqsttvegpasnakdgddestlwhtrwsapaatsdqlwfty
eleetvidalrylprqgtadgqnngrvneyrvevstdgstwtvstgnwedsqdwklaeftepvaakyvrltgvhvygssaand
kymsaairlmaesktdiadaangvtvtapsievakadaenpvmfdlsvkagdtlrygvdyvisyenntdfgtaklvikgi
dgygtleheftitqkakvmtgitwntkpekviytegetldvtglvinvydddsteavayseanadefltpaldtklaatkvtvt
ykgasliyditvnpkkvdptdpqdpkdpdpdngndngndnngngnngtdgkdkpqqsgvtdnknqgnnsnngtaagn
kanaaaktgdtanmllpmiaamlagtavvgtisirrrrr

SEQ ID NO: 14 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 12 sin la secuencia señal.

aaagcagatagccaaacacaatgtcatcagaaccggaacaagttgcggttaaagattatggctcaaatagcgcaacacacaga
atthgatagcgattggaatttaacctgggagatgtagcaatgcacagacaccgacattgatgattcaaaatggcgacactgtc
actgccgatgattatagcatcgaacaggaatattcaaatcactggaagcagaatcaggctatctccggggaggcggtggctgta
tcgcaaaaatcttactggggaagaagcgaaggcaaacgcattcgattgattttgatggcgtctatatgaatgcaacagctcat
gtgaatggcaagaagttggcacacatccgtatggctatacaccgttagctttgatcatcacagattatatcagctatgataaagaaa
acacaattgctgcaaatgcatcaaacaccgtcatcaagatggtattcaggcagcggcatttatagatcagtcacactgacaa
caacaatgatgtccatgtcgtatctgaatggcattaagtcgaaagcaacaacctggaaaaagaagcaggcaaacagtcacac
agatgtgaaaacaacagttgtgaacggctcaaaagaagcgaaaaacatcacatacagctcttaaaaaaggcgaaaaa
ccggataaagcgatcggcacatttacaacagaagcgcaagaattggcgagggcaaaaaacagaaatcagcgcaacagtcaccg
gttaaaaatccggaactgtggtcagttgaaatccggcactgtatacaatcgacagaaagttaaagcaggcgataaactgctggat
agctatgatacagaatagctttcattatctgaactttgatacagaacaggcttcagctgaatggcaaaaactgaaactgaaag
gctttgatgcatgatcaaggcgactggcgagattgcaaatagaagagcaattgaacgccaagtgcgaattctgcaagaa
atgggctgcaatagcattagatcacacataatccggcaagcaagatctgattgaagtctgcaacgaaaaaggcattctggtcatt
gaagaagttttgacggctggcatagagcaaaaatggcaacagcaacgattatagcgtctggttgaaaaagcgatcgaagaag
ataacgagattctgggaaaagaagcggatagacttggcagaatagatctgaaagcgattatgaaacgcatcaaaatgcacc
gagcattattgaatggtcactggcaatgaaattcaagaaggcgaggggatcaggctatgcagaagagcggataaactgatc
aaatggcgaaagaagcagacgcaacaaaaactgacaattggcagcaatgcagttaaagaggcgattgggaacaagttag
catcggcgataaacttacaagaagcaggcggaacatcaggcacaattattcagatggcgcatcatatgataaaatcataaagaac
atccggattgaaactgatggctcagaacagcatcatcagttaatagccgtggcatttattcagttacaggcaatcaagaagcaa
caagcagatcaacaactgacagcgtatgataatagcagagttattggggagcactggcatcacaagcagatggtatgatgtatccag
agagattttgctgcaggcgaatagtttggacaggctttgattatctggcgaaccgacaccgtggaatggcacagatccgggagca
aaaggcacatggcgtcaccgaaaaacagctactttggcattatcgatacagcaggcttccgaaagattcatattttttatcagag
ccagtggaatgaagaagtaatacactgcacgttctccggcatggaatgaagatgtcgtcaaaaaaactcagatggcacagttc
cggttgtttttattcagatgcgaagaagtcgaactgtttttacaccggcaaatggcgagaaaaaaaagcctgggaaaaaaa
acatttaaacagaaacaacaagactggctatagctatcaagttctggaaaacggcaaaaaaaacataaagatctgtatagga
atggcaagttccgatgaagcaggcacactgaagcagttgcaagaatgcaaaaggcaacgctcattaaagatacagaaggcag
aagcgtcgttaaaacaacaggcgaagaagcaaaactgtcagcaaaaacggatcgcaatagcattcaagcagatggcaaatct

gtcatatattacagtcgatgtcacagataaagatggcaatattgttccggatgcagcaaataagagtcacatttgatgtccaaggcgca
 ggaaaactggttggcgtgataatggctcatcaccggatcatgatagctataaagcggataaccgcaaagcattttcaggcaaagtt
 ctggcaattgtcagtcacagaaaaagcaggcgaaattacagttacagcaaaagcagatggcctggaatcaagcacagtcacaaa
 tcacaacaacaccggttaagaagaaccgagcgaaagatatgtcgaagctataaatacagcaaaagctattatgtgaaaacagg
 cacaaaaccgcaactgccgaaaaaaattgaagcgcagtatagcgatcgcaaaaagaggatggttgcggtcaaatgggatgaaat
 ctcagatgaacaaattagcaaaacaggcagccttacagttgaaggcacagttggcaaaagagatatcacagtcacattaacatga
 tcgatgatgttcagcactgctgaattattcaggcgcaacacaaaaggcgttaaacccgcaactccggatgtagaccggcagttct
 gctgatggcacagtcctggcagcatcatttccggtcagtgggatgaaaaagatgaggatacatttcagaaaaccggatgaaattgt
 tacagttaacggcagcgcagatatcttggcaaaacaattccggttacagcaagcattagagtgcagaaagaagatatcaaaattg
 gcagcagcgttacaatgttgcaaaactgagccaaaatattcaaggcagcgatacactggaagcaatcaagatggcaaaacaga
 aatgagcctgaataatgatggcggaccgaatgaatcagcatggtcaaatgggatgcatcacagaaaggcacaaaagaagccga
 actgacatttacatttgatacacagcaacgcattggcgaattgtcattcattttgcgaaagataacaactcaatcagatttccggatg
 ctggcacaacagaaatcttgtttcagaaacaggcaaaagatggcacatgggaaaaagttgaagtcaaagagcatattggcgaaga
 aaaagatcgcgtcaaagcatatcgctatgaaattgacccggttacagcgacatatgttaaagttaaagtcgtaatcgaacgcgac
 agatacaggcaatagaaaaaccgtgcacagcaattacagaagtcgaactgaaaaagcagaaggcagctttaaagtcacgaaac
 agcagaactggaagaagttaaagttggcgaacgtgttctccgaatgcagcatatgcactggattcatattcagttccggaaaccgga
 tgcagcagttacagcaaaaacaaaagataatgcgagcctgacaatcctgccgaaacatgaaatgtcgtcagaatgattctgaaa
 gcgaagaccataaagcgacgaaaaactttgagttagaatgggccaagaagaacagttctccggatgatgattcaagagatta
 tccggtcgaaaaatcacagcaacagcaggctcagaatataaccgggaacagcaaatgaaggaccggttaaatatgttctggat
 ggcaaacgagaaacacattggcatacaaatgggtcagtttcaggcgaaggctcaaaaccggaacatagaacagttacactgcaac
 tgggcaatgatgaagaagaagcaccgatgattgacgcactgagatatatgccgagatcaaatggcgcaaatggcagagttacgga
 atatgaaattcagtatagcctggatggcgataaatggcaaacagcagcaaacaggcgaatcgataaaaaacaaacaggctggat
 gatcctgggcttgaagaaccggttcaagcaaaatgtccgcttattggcacacatacaacatcagatcagggcaatgataaacat
 atggcagtttcagaactgagagcaagagttgcaacagaagcaccggcaccgtcagagaagtatacaattacagcgaacgtcaacg
 ataaaaaatgggagcagttacacttgatagcgaaacaggcgaatgaaaaaggcagaaagcaaacactgacagcagttccga
 aagaaggcttgcatttgcactggacaattgatggccaagaagtctcaaaagaaaaccgatatatccatcagttgaaacggatg
 cgacaatcacagcgaatgttgaacgcattgaagtcgaaaaatgaaggctgggttcaaacagaaaatggctgggaatattatgagaat
 ggcaaaaagttgtcggctggaagaagttcaggcaaatggtactacttgaagaaaatggcctgatgcaaacaggatgggtctt
 gttacaaccattggtattataggatcagtgggggcaatgtgattggctgggttcagttgatggcattggtactacatggacc
 aatggggtgctatgtgtacaggtcgggttagcgtcaatggacattggtatcatatggaccaatggggagccatgcaaacaggctgg
 gcactggttattcaaatggtattacctgaatacggatggcctcaatggcaattggatgggtcgcagtgacggccactggtattaca
 tggatcaatggggagctatgcagacggatgggctcttggatagcaactggtattatcttaacacagatggcagcatggcaatcg
 gctgggtggcggtaatggacactggtactataggatcaatggggtgcaatgcagacaggtgggttctggtcggcagcagattggt
 actatttaaacaggatggatctatggcatcaagccaatggattgatggctattatgtgatgcaagcggcaagatgaag

SEQ ID NO: 15 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 13 sin la secuencia señal.

gcaggcgttcagttccggcactggcacaacaagcagttagaacagaagccaaacacaaatgtcatcagatccggaactggtcta
 tgtgaataactatagcagcacagcaaaagaagccagaacttaacagcaactggaaattctactcggagatgfcgggaaatgcac

aaggcgcaacatttgatgatagcaaatgggaacaagtttactgccgatgattatcaatcagccaagaatatagcaaatcaatgg
aagcagaatcaggctatcttggcggaggcacaggctggtatcgcaaaaattttactgagcagcgatacacaaggcaaaagagt
ccgattgattttgatggcgtctatatgaatgcaacagtttgggtaatggccatgaagtggcacaatccgatggctatacaagctt
tagctttgatcacagattatgtgaaatgatggcgaaaacacaattgcagtcgaagtcgcaataatacaccgcaagcagatg
gtattcaggctcaggcatttatagagatgtcgatctgacaatcacagatgatgttcatgttgatctgaacggcacaagttacaaca
ccgaacctggaaacagaaaaaggcagcagatcaatacagatgttacagcaacagttgcaatgattcagatgcagcaaatcag
ttgcagttcgccatacagttttccgaaagatggcagcagatcaatcaattggcacagtcacaacaatgcacaatcaattgcagc
aggcgcaacagcagaaattcaagcaacgggtccggttcaaactcctgaactgtggtcagttgaaatccgtcactgtatacagtcag
aacagaagttctggtcgacggccaagtacagatacatatgatagcaaatatggctttcgctattttaactttgatagcaacacaggc
tttactgaatggcgaatgatgaaactgaaaggcgtctgatcatcatgatcaaggctcactggcgcagcagcagcagcagcagcagc
gcaattgatcgccaggtcaaaaactgaaagaaatgggctgcaatagcattagagtcacacataatccggcagcacaagatctgat
tgatgctgcaatgaacaaggcattctggttgtgaagaagcgtttgatacttggacaagaccgaaaaatggcaacagcaacgatt
atagcgtctggttaatcagacagttcgagcagataatgaaactctgggagcgacaaatggcgaaacatgggcacaatttgatctgg
aaagcatgatctcagcagattataatgcaccgtcagtcattatgtggtcactgggcaatgaagttatggaaggcattagcggaggca
cagatgcagaatgaagcgacagcagcagaaactgattaactggcgtatgatgaggataatacacgtccgatgacaattggcgat
aacaactgaaagcgaactggcagatctcaaaaactttgcgagactgtgacagaaaaaggcggaacagtgggcttaaltatg
cagatggcagagttctggattcatatcatagcagcaatagcaattggctgctgatggctcagaaaacagcatcagcagtaataagcc
gtggcatctattatagaacaacaggcggaggcacaacatcagataaacagctgacaagctatgataattcaaattgttgctgggga
gcaacagcatcaaatgcatggtatacagttctgacaagagattttgcggcaggcgaatggttgacaggccttgattatctgggag
aaccgacacagtggaatggcagcaggtcaggcgcagttggctcatggccgtcaccgaaaaattctattttggcattatcgatacagc
aggcttcgcaaaagatagctatttttatcagagccagtggaatgalgatgttacaacactgcatgttctccggcatggaataata
atgctgctcagcaaatcagcagcaatgttccggttgtttattcagatgcggcatcagtcgaactgtttttcaagcaaaaggca
gagatacaaaaacaagcctgggcaaaaaaacatttacacagaaaaacaacagcagcaggtatacatatcagatctatgaaggctc
agataaaaacagcacaacagcaaaaaactgtatctgacatggaatgttccgtatgcagatggaacagttcagcagttgctgata
atagcaacggccagaaaattacagatacagttggcagtcctcagttacaacaacaggcaaaagcgtcaaaactgaaagcatcagc
ggatcataaaaaaattgcagcggatggcgaatcactgtcatatatacagtcgatgtcacagatgcgaatggcaatattgttccgga
tgcaaaaaatcgcgtcaaatlacagttgaaggcagatggcgaactggtggcgttgataatggctcatcaccggatcatgattcatat
caagcggataaccgcaagcattttcaggcaagttctggcaattgtgaaaagcacaagaagctggcacaattacagttacagc
atcagcagatggcctggattcagcatcagtcacaatcacaacaacagcagtcgataatggcagcagcaaaaaacaatcagatagc
ttaaaatgagccgacatatattgttaaagttggcagcacaccggaactccggaaaaaattgtcacacgctatacagatggcaca
tcagaagaactgcctgttacttgggatgcaattacagaagatcaaatgcagcagcagcagcctattcaagttaaaggcagcagcaaa
ggcgatattcagttgagtcacagtcacatgattgatgaattggcggactgctgaattatcaaaaatacagcagttggcgttg
caccggttctcggacatcaagaccggcagttctgcaagatggcagatgatgatttccggtcatatgggaagataaag
cagcaagcgcataatgataaagcaggcagcagtcagtcgaatggcagcaaatgttctgggcaagaaattgcagttacagcag
cgttagagttcaggaagaacaatcacaattggagattcagttcagcggatgactgaatctgacacaaagcgttccggcagata
aacaagcgatacactgaacgcaattaagatggctcaacaacaattagctcaatacaagcggaggcgcaaatccgacagtttg
gagcaactatgactatagccaggtgcaatacagacagcgatattttgaaatgcaagacaaagactggccaaatcg
ttacacattttcgagagatagctggtcaatgagatcctgatgcaggcgtacagaaatttatgtctcaccggatggcacaattg
ggcaaaactggatacaacagaaacaattggcagcaaaagcggcaatgtaaacctgatacatatgattttgacccggttggcgca
catttgttaaatttcatctgacaaacagcacaagcaacaggcacaacagcaaaagcatgcacaggcattacagaattgaactg

aaagttgcaacaggctcacgcacaacaatacaacagcagaactgcaaacactgacagttaatggcaaagaagttccgcaaaac
gcactggatagcaaagttatacaacaccggcaattctggcagaaattgaagcaacagcgaagataatgcaacggttacagttctt
ccggcatataatgatgtcattcgattattgtcgaagcgaagatcatcaaacacgcaatacatatgaagtcagactgaaatgaagcg
gaacaaacaacaccggattcagattcaagagattatccggttagcaaacactgacagcatcagcaggctcagaacaatcaacaacag
gCGTgaaggaccggcatcaaatgcaaaagacggatgaatcaaacactgtggcacaagaatgggtcagcaccggcagcaacatc
agatcaactgtggttacatagaaactggaagaagaacggtagctgacgactgagatattctgCGAGACAAGGCAGCAGAT
ggccaaaataatggcagagttaatgaatatcgctcgaagttagcacagatggcagcacatggacaacagttcaacaggcaattg
ggaagatagccaagattggaactggcagaattacagaaccggttgagcaaaatattgactgacagcggttcatacatatg
gctcatcagcagcaaacgtcgataaatacatgagcgcagcagaatttagactgagaatggcagaagcaaacggatattgag
atgCAGAAAATGGGTTACAGTTACAGCACCGGATTCGAATTGAAGTTGCAAAAGCAGATGCAGAAAACCGGTTATGTTGATCTGA
gCGATATTGTTGTCAAAGCAGGCGATACAACACTGAGATATGGCGTTGATTATGTCATTAGCTATGAAAAACAACAGATTTGGC
AGCGAAACTGGTCATTAAGGCATTGATGGCTATACAGGCACACTGGAACATGAATTCACATCACGCAGAAAAGCCAAGTCATGA
CAGGCATCATGGAATACAAAACCGGAAAAAGTCATTTACCGGAAGGTGAACGCTGGATGTACAGGCTGGTTATTAATGTG
TCTATGATGATGATAGCAGAGAAGCAGTTGCATATAGCGAAGCAAATGCGGATGAATTTACATTTCCCGGACTGGATACAAAAC
TGGCAGCGACAGATAAAACAGTCACAGTTACATATAAAGGCGCAAGCCTGATTTATGATTAACAGTCAACCCGAAAAAGTCGAT
CCGACAGATCCGGATCAGCCTGATAAACCGGATACACCGGATAATGGCAATGATAACGGCAACGATAATAATGGCAACGGCAATA
ACAACGGCACAGATGATGGCAAAAAGATCCGGGACAATCAGGCGTTACAGATAACAAAATCAGGGCAATAACAGCAATAATG
GAACAGCAGCAGGCAATAAAGCAAATGCAGCAGCAAAAACAGGCGATACAGCAAATATGCTGCTGCCGATGATTGCAGCAATGC
TGGCAGGCACAGCAGTTGTTGGCAATTTCAATTCGACAGCAGCAGACGC

La SEQ ID NO: 16 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 1.

aaagcagatagccaaacacaaatgcatcagaaccggacaagttgCGGTTAAAGATTATGGCTCAAATAGCGCACGCACAGAATTTGATAGCGATTGGAAAT
TTAACTGGGAGATGTTAGCAATGCACAGACACCACATTTGATGATCAAAATGGCGCACACTGTCACTGCCGATGATTATAGCATCGAACAGGAATTTCAAAAT
CACTGGAAGCAGAAATCAGGCTATCTCCGGGAGGCGTTGGCTGATCGAAAAATTTACTGGCGGAAGAAGCGAAAAGGCAACGCATTCGATTTGAT
GGCGTCTATGAATGCAACAGTCTATGTAATGGCAAAGAAGTTGGCACACATCCGATGCTATACACCGTTAGCTTTGATACACAGATTATACAGTATGATAA
AGAAAAACAATTCGGTCAAAAGTCGATCATCAAACACCCTCAACAGATGGTATTCAGGCAGCGCAATTTAGATCAGTCAACCTGACAACAACAATGATGTC
ATGCTGATCTGAATGGCAATAAGTGAAGCAACAACCTGAAAAAGAAGCAGGCAAAAACAGTCAACACAGATGTGAAAAACAAGTTGAAAGCGCTCAAAA
GAAGCGAAAAACATCACAATACATACAGTCTTTAAAAAGGCGAAAAACCGGATAAAGCGATCGGCACATTTACAACAGAAGCGCAAGAAATGGCGCAGG
CAAAAAACAGAAATCAGCGCAACAGTCCCGTTAAAAATCCGGAACCTGTTGTCAGTTGAAAAATCCGGCACTGTATACAATTCGACAGAAAGTTAAAGCAGGCGA
TAACTGCTGGATAGCTATGATACAGAAATGGCTTTCAATCTGAACTTGATACAGAAACAGGCTTCAGCTGAATGGCAAAAACGTTAACTGAAAGCGCTTGA
TGCATCATGATCAAGGCGCACTGGCGAGTTGCAAATAGAAGCAATGAAACGCCAAGTCGAAATTCGAAAGAAATGGCTGCAATAGCAATGATGATCACACA
TAATCCGGCAAGCAAAAGATCTGATTGAAGTCTGCAACGAAAAAGCAATCTGTTGATTGAAGAAGTTTTGACGGCTGGCATAGACAAAAATGGCAACGCAAC
GATTATAGCTGCTGTTGAAAAAGCGATCGAAGAAGATAACGCAATCTGGGAAAAAGAGCGGATGACTGGGCAGAAATGATCTGAAAGCGATTATGAAC
GCGATCAAAATGCACCGACATTTGAATGGTCACTGGCAATGAAATCAAGAAGGCGCAGGCGGATCAGGCTATGCAGAAAGAGCGGATAAATGATCAAA
TGGCGAAAAAGCAGACGCAACAAAAACACTGACAATGGCAGCAATGCAAGTAAAGAGGCGATTGGGAACAAGTTAGCATCGCGATAAATCAAAAAG
CAGGCGGAACATCAGGCACAATTTAGATGGCGCATATGATAAATCATAAAGAACATCCGATTGGAACTGTATGGCTCAGAAACAGCATCATCAGTT
AATAGCCGTTGATTTACTGTTACAGGCAATCAAGAAGCAACAAGCATCAACAACACTGACGCGTATGATAATGACAGGTTAATGGGGAGCACTGGCATCAC
AAGCATGGTATGATTTACCAGAGAGATTTGTCGAGCGCAATATGTTGGACAGGCTTTGATATATCGCGCAACCGACACCCTGGAATGGCACAGATCCGGGA

gcaaaaggcacatgcccaccgaaaaacagcactctggcaltatcagatagcagcgtttccgaaagattcatattttttatcagagccagtggaatgaagaa
 gtcaatacactgcacgttctccggcatggaatgaagatgctgcaaaaaaacacagatggcacagttccgggtgtgtttaltcagatgcaaaagaagtgaactgt
 ttttacaccggcaaatggcgagaaaaaaaagcctgggaaaaaacatttaaacagaaacaacaaaagcctggctatagctatcaagttctgaaaacggca
 aaaaaaacataaagatctgtatggaatggcaagttccgtatgaagcagcagcacttgaagcagttgcaaaagatgcaaaaggcaacgtcafaaaagatacag
 aaggcagaagcgtgtaaaacaacagcgaagaagcaaaactgtcagcaaaacggatgcaatagcattcaagcagatggcaaaagatctgtcatataftaca
 gtcgatgtcacagataaagatggcaatattttccggatgagcaaatagagtcacatttgatgtccaaggcgcaggaaaactggttggcgttgataatggctcacc
 accggatcatgatagctataaaggcgaataaccgcaaaagcatttcaggcaaaagttctgcaattgttcagtcacaagaaaaagcagggcaaaatcagttacagca
 aaagcagatggcctggaatcaagcagcagcfaaatcacaacaacaccggtaaaagaagaaccgagcgaagatgctgaaagctataaatcagcaaaagcta
 ttatgtgaaaaagcagcacaacaccgcaactccgaaaaaaatggaagcagatagcagatgcacaaaagggatgttggcgtcaaatgggatgaaatctcag
 afgaacaatagcaaaacagcagcctttacagttgaaggcacagttggcaaaaagatatacagtcacaattaacatgatcagatggtgagcagcactgctgaat
 taltcaggcgcacaacaaaaaggcgttaaacccgcaactccggatgtagaccggcagttctgcctgatggcacagtcctggcagcatattccgggtcagtgagg
 afgaaaaagatggcagatattcagaacccggatgaaatgttacagttaacggcagcgcagatattcttggcaaaaacaattccgggttacagcaagcattagagtg
 cagaaaagaaatacaaaatggcagcagcgttacaatgtgcaaaactgagcacaatattcaaggcagcagatacactggaagcaatcaagatggcaaaaaca
 gaaatgagcctgaataatgatggcgaccgaatgaatcagcatggtcaaatgggatgcatcacagaagggcacaacaaagaagccgaactgacattacatttgata
 cacagcaocgatggcgaatgtgcaatcttggcaagataacaactcaatcagatttccggatgctggcacaacagaaatc

La SEQ ID NO: 17 es la secuencia de nucleótidos que codifica la SEQ ID NO: 2.

gcagggcttccagttccggcactggcacaacaagcagttagaacagaagccaaacacaatgcatcagatccggaactggctctatgtgaaataactatagcagc
 acagcacaagaagccagaacttaacagcaactggaaattctactcggagatgcccggaaatgcacaaggcgaacatttgatgatagcaaatgggaaacaggt
 tcaactccgatgatttcaatcagccaagaatatagcaaatcaatggaagcagaatcaggctacttggcggaggcagcagcctggatcgcacaaaatfttact
 gagcagcagatacacaaggcaaaagagtcggcactgatttggatggcgtctatgaatgcaacagttgggttaagtgccatgaagttggcagacatccgtatggct
 atacaagcctttgacttggatcacagatattgaaatattgagggcaaaactgcaagtcagtcacaagtcgcaafaatacaccgcaagcagatggatcagcagc
 aggcattatagagatgctgatctgacaatcacagatgattcatgttcatctgaacggcacaacaaagttacaacaccgaaactggaaacagaaaaaggcagcaca
 gtcaatacagatggtacagcaacagttgcaatgattcagatgacgcaaaatcagttcagttcgcatacagttttccgaaagatggcagcagatcaatcaat
 ggcaagtcacaacaaatgcaatcaatgagcagcgcacaacagcagaatcaagcaacggctccggttcaaatcctgaaactggtcagttgaaatccgt
 cactgtatacagtcagaacagaagttctggcagcggccaagtcacagatacatatgatacagaataggcttctgctatttacttggatagcaacacagcctttca
 ctgaatggcgaaaatgaaactgaaaggcgtctgatcagatgatacaaggctcacttggcgcagcagcatagcactcagcaatgatcggcaggtcaaaatcc
 tgaagaaatgggctgcaatgacattagagtcacacataatccggcagcacaagatctgattgctgcaatgaacaagcattctggttgaagagcgtt
 gatactggacaagaccgaaatggcaacagcaacgattatagcgtctggttaatcagacagttgagcagataatgaaatctgggagcgacaatggcgaa
 acatgggcacaatgtgatcggaaagcagatctcagcggcattataatgaccgtcagtcattatgctgactggcgaatgaagttatggaagcattagcggagg
 cacagatgcagaatgaaagcagcagcagcaaaactgaaactggcgtatgagcggataatacagcgtccgatgcaatggcgatacaaaactgaaagcga
 actggcagatctcaaaaacttggcagactgctgacagaaaaaggcgaacagtggtccttattatgacagatggcagagttctgattcatatcagcagcaat
 agcaatggctgctgattggtcagaaacagc
 agctatgataatcaaatggtgctggggagcaacagc
 atcggggcaaccgacacgtggaatggcagc
 aaaagatagctattttttatcagagccagtggaatgatggttacaacactgcatgttcttccggcatggaataaatgctgagcaaaagattcatcagcgaatg
 tccgggtgtgtttatcagatggcagc
 cagagc
 ttcagc
 cataaaaaaattgcagcggatggcgaatcagc
 gttgaagc
 gttgaaagcacaacaaagcgtggcacaatcagttacagc
 cacagaaaaaactgatactttaaagtagccgcacataatgtaaaagttggcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagc
 acatcagaagaactgctgttacttgggatgcaatcagaagatcaaatgcaagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagcagc
 agtcaactgcaacatgattgatgaagttggcggactgctgaatattcaacaatacagcagttggcgtgaccgggtctgcccagatcaagaccggcagttctgc
 aagatggcagc
 tctgggcaaaagaaatgcaagc
 ccggcagataaaacaaagc
 gactatagc
 gagatctctgatcagc

5

Listado de secuencias

- <110> Danisco A/S
- <120> Polipéptidos que tienen actividad transgalactosilante

ES 2 681 692 T3

<130> 18028PCT00

<160> 17

<170> PatentIn versión 3.5

5

<210> 1

<211> 1125

<212> PRT

<213> Ruminococcus hansenii

<400> 1

Lys Ala Asp Ser Gln Thr Gln Met Ser Ser Glu Pro Glu Gln Val Ala
1 5 10 15

Val Lys Asp Tyr Gly Ser Asn Ser Ala Arg Thr Gln Asn Phe Asp Ser
20 25 30

Asp Trp Lys Phe Asn Leu Gly Asp Val Ser Asn Ala Gln Thr Pro Thr
35 40 45

Phe Asp Asp Ser Lys Trp Arg Thr Leu Ser Leu Pro His Asp Tyr Ser
50 55 60

Ile Glu Gln Glu Tyr Ser Gln Ser Leu Glu Ala Glu Ser Gly Tyr Leu
65 70 75 80

Pro Gly Gly Val Gly Trp Tyr Arg Lys Asn Phe Thr Leu Gly Glu Glu
85 90 95

Ala Lys Gly Lys Arg Ile Arg Ile Asp Phe Asp Gly Val Tyr Met Asn
100 105 110

Ala Thr Val Tyr Val Asn Gly Lys Glu Val Gly Thr His Pro Tyr Gly
115 120 125

Tyr Thr Pro Phe Ser Phe Asp Ile Thr Asp Tyr Ile Ser Tyr Asp Lys
130 135 140

Glu Asn Thr Ile Ala Val Lys Val Asp His Gln Thr Pro Ser Ser Arg
145 150 155 160

10

Trp Tyr Ser Gly Ser Gly Ile Tyr Arg Ser Val Asn Leu Thr Thr Thr

ES 2 681 692 T3

405 410 415

Ala Glu Tyr Asp Leu Lys Ala Ile Met Lys Arg Asp Gln Asn Ala Pro
420 425 430

Ser Ile Ile Glu Trp Ser Leu Gly Asn Glu Ile Gln Glu Gly Ala Gly
435 440 445

Gly Ser Gly Tyr Ala Glu Arg Ala Asp Lys Leu Ile Lys Trp Ala Lys
450 455 460

Glu Ala Asp Ala Thr Lys Thr Leu Thr Ile Gly Ser Asn Ala Val Lys
465 470 475 480

Arg Gly Asp Trp Glu Gln Val Ser Ile Gly Asp Lys Leu Thr Lys Ala
485 490 495

Gly Gly Thr Ser Gly Thr Asn Tyr Ser Asp Gly Ala Ser Tyr Asp Lys
500 505 510

Ile His Lys Glu His Pro Asp Trp Lys Leu Tyr Gly Ser Glu Thr Ala
515 520 525

Ser Ser Val Asn Ser Arg Gly Ile Tyr Ser Val Thr Gly Asn Gln Glu
530 535 540

Ala Thr Ser Asp Gln Gln Leu Thr Ala Tyr Asp Asn Ser Arg Val Asn
545 550 555 560

Trp Gly Ala Leu Ala Ser Gln Ala Trp Tyr Asp Val Ile Gln Arg Asp
565 570 575

Phe Val Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Ile Gly Glu
580 585 590

Pro Thr Pro Trp Asn Gly Thr Asp Pro Gly Ala Lys Gly Thr Trp Pro
595 600 605

Ser Pro Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly Phe Pro
610 615 620

Lys Asp Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn Glu Glu Val Asn
625 630 635 640

Thr Leu His Val Leu Pro Ala Trp Asn Glu Asp Val Val Lys Lys Asn

ES 2 681 692 T3

				645						650						655
Ser	Asp	Gly	Thr	Val	Pro	Val	Val	Val	Tyr	Ser	Asp	Ala	Lys	Glu	Val	
			660					665					670			
Glu	Leu	Phe	Phe	Thr	Pro	Ala	Asn	Gly	Gly	Glu	Lys	Lys	Ser	Leu	Gly	
		675					680					685				
Lys	Lys	Thr	Phe	Lys	Thr	Glu	Thr	Thr	Lys	Ala	Gly	Tyr	Ser	Tyr	Gln	
	690					695					700					
Val	Leu	Glu	Asn	Gly	Lys	Lys	Lys	His	Lys	Asp	Leu	Tyr	Met	Glu	Trp	
705					710					715					720	
Gln	Val	Pro	Tyr	Glu	Ala	Gly	Thr	Leu	Glu	Ala	Val	Ala	Lys	Asp	Ala	
				725					730					735		
Lys	Gly	Asn	Val	Ile	Lys	Asp	Thr	Glu	Gly	Arg	Ser	Val	Val	Lys	Thr	
			740					745						750		
Thr	Gly	Glu	Glu	Ala	Lys	Leu	Ser	Ala	Lys	Thr	Asp	Arg	Asn	Ser	Ile	
		755					760					765				
Gln	Ala	Asp	Gly	Lys	Asp	Leu	Ser	Tyr	Ile	Thr	Val	Asp	Val	Thr	Asp	
	770					775						780				
Lys	Asp	Gly	Asn	Ile	Val	Pro	Asp	Ala	Ala	Asn	Arg	Val	Thr	Phe	Asp	
785					790					795					800	
Val	Gln	Gly	Ala	Gly	Lys	Leu	Val	Gly	Val	Asp	Asn	Gly	Ser	Ser	Pro	
				805					810						815	
Asp	His	Asp	Ser	Tyr	Lys	Ala	Asp	Asn	Arg	Lys	Ala	Phe	Ser	Gly	Lys	
			820					825						830		
Val	Leu	Ala	Ile	Val	Gln	Ser	Thr	Glu	Lys	Ala	Gly	Glu	Ile	Thr	Val	
		835					840					845				
Thr	Ala	Lys	Ala	Asp	Gly	Leu	Glu	Ser	Ser	Thr	Val	Lys	Ile	Thr	Thr	
	850					855					860					
Thr	Pro	Val	Lys	Glu	Glu	Pro	Ser	Glu	Arg	Tyr	Val	Glu	Ser	Tyr	Lys	
865					870					875					880	
Tyr	Ser	Lys	Ser	Tyr	Tyr	Val	Lys	Thr	Gly	Thr	Lys	Pro	Gln	Leu	Pro	

ES 2 681 692 T3

885	890	895
Lys Lys Ile Glu Ala Gln Tyr Ser Asp Arg Thr Lys Glu Asp Val Ala 900 905 910		
Val Lys Trp Asp Glu Ile Ser Asp Glu Gln Ile Ser Lys Thr Gly Ser 915 920 925		
Phe Thr Val Glu Gly Thr Val Gly Lys Arg Asp Ile Thr Val Asn Ile 930 935 940		
Asn Met Ile Asp Asp Val Ala Ala Leu Leu Asn Tyr Ser Gly Ala Thr 945 950 955 960		
Gln Lys Gly Val Lys Pro Gln Leu Pro Asp Val Arg Pro Ala Val Leu 965 970 975		
Pro Asp Gly Thr Val Leu Ala Ala Ser Phe Pro Val Gln Trp Asp Glu 980 985 990		
Lys Asp Ala Asp Thr Phe Gln Lys Pro Asp Glu Ile Val Thr Val Asn 995 1000 1005		
Gly Ser Ala Asp Ile Phe Gly Lys Thr Ile Pro Val Thr Ala Ser 1010 1015 1020		
Ile Arg Val Gln Lys Glu Asp Ile Lys Ile Gly Ser Ser Val Thr 1025 1030 1035		
Asn Val Ala Lys Leu Ser Gln Asn Ile Gln Gly Ser Asp Thr Leu 1040 1045 1050		
Glu Ala Ile Lys Asp Gly Lys Thr Glu Met Ser Leu Asn Asn Asp 1055 1060 1065		
Gly Gly Pro Asn Glu Ser Ala Trp Ser Asn Trp Asp Ala Ser Gln 1070 1075 1080		
Lys Gly Thr Lys Glu Ala Glu Leu Thr Phe Thr Phe Asp Thr Gln 1085 1090 1095		
Gln Arg Ile Gly Glu Ile Val Ile His Phe Ala Lys Asp Asn Asn 1100 1105 1110		
Ser Ile Arg Phe Pro Asp Ala Gly Thr Thr Glu Ile		

ES 2 681 692 T3

Glu Lys Gly Ser Thr Val Asn Thr Asp Val Thr Ala Thr Val Ala Asn
 210 215 220

Asp Ser Asp Ala Ala Lys Ser Val Ala Val Arg His Thr Val Phe Pro
 225 230 235 240

Lys Asp Gly Ser Ala Asp Gln Ser Ile Gly Thr Val Thr Thr Asn Ala
 245 250 255

Gln Ser Ile Ala Ala Gly Ala Thr Ala Glu Ile Gln Ala Thr Val Pro
 260 265 270

Val Ser Asn Pro Glu Leu Trp Ser Val Glu Asn Pro Ser Leu Tyr Thr
 275 280 285

Val Arg Thr Glu Val Leu Val Asp Gly Gln Val Thr Asp Thr Tyr Asp
 290 295 300

Thr Glu Tyr Gly Phe Arg Tyr Phe Asn Phe Asp Ser Asn Thr Gly Phe
 305 310 315 320

Ser Leu Asn Gly Glu Asn Met Lys Leu Lys Gly Val Cys Met His His
 325 330 335

Asp Gln Gly Ser Leu Gly Ala Ala Ala Tyr Asp Ser Ala Ile Asp Arg
 340 345 350

Gln Val Lys Ile Leu Lys Glu Met Gly Cys Asn Ser Ile Arg Val Thr
 355 360 365

His Asn Pro Ala Ala Gln Asp Leu Ile Asp Ala Cys Asn Glu Gln Gly
 370 375 380

Ile Leu Val Val Glu Glu Ala Phe Asp Thr Trp Thr Arg Pro Lys Asn
 385 390 395 400

Gly Asn Ser Asn Asp Tyr Ser Val Trp Phe Asn Gln Thr Val Ala Ser
 405 410 415

Asp Asn Glu Ile Leu Gly Ala Thr Asn Gly Glu Thr Trp Ala Gln Phe
 420 425 430

Asp Leu Glu Ser Met Ile Ser Arg Asp Tyr Asn Ala Pro Ser Val Ile
 435 440 445

ES 2 681 692 T3

Met Trp Ser Leu Gly Asn Glu Val Met Glu Gly Ile Ser Gly Gly Thr
 450 455 460

Asp Ala Glu Tyr Glu Ala Thr Ala Thr Lys Leu Ile Asn Trp Ala Tyr
 465 470 475 480

Asp Ala Asp Asn Thr Arg Pro Met Thr Ile Gly Asp Asn Lys Leu Lys
 485 490 495

Ala Asn Trp Gln Ile Ser Lys Thr Phe Ala Arg Leu Leu Thr Glu Lys
 500 505 510

Gly Gly Thr Val Gly Phe Asn Tyr Ala Asp Gly Arg Val Leu Asp Ser
 515 520 525

Tyr His Ser Ser Asn Ser Asn Trp Leu Leu Tyr Gly Ser Glu Thr Ala
 530 535 540

Ser Ala Ile Asn Ser Arg Gly Ile Tyr Tyr Arg Thr Thr Gly Gly Gly
 545 550 555 560

Gln Thr Ser Asp Lys Gln Leu Thr Ser Tyr Asp Asn Ser Asn Val Gly
 565 570 575

Trp Gly Ala Thr Ala Ser Asn Ala Trp Tyr Thr Val Leu Thr Arg Asp
 580 585 590

Phe Ala Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Leu Gly Glu
 595 600 605

Pro Thr Pro Trp Asn Gly Thr Gly Ser Gly Ala Val Gly Ser Trp Pro
 610 615 620

Ser Pro Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly Phe Ala
 625 630 635 640

Lys Asp Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn Asp Asp Val Thr
 645 650 655

Thr Leu His Val Leu Pro Ala Trp Asn Asn Asn Val Val Ser Lys Asp
 660 665 670

Ser Ser Gly Asn Val Pro Val Val Val Tyr Ser Asp Ala Ala Ser Val
 675 680 685

ES 2 681 692 T3

Glu Leu Phe Phe Gln Ala Lys Gly Ser Asp Thr Lys Thr Ser Leu Gly
 690 695 700
 Lys Lys Thr Phe Thr Gln Lys Thr Thr Asp Ala Gly Tyr Thr Tyr Gln
 705 710 715 720
 Ile Tyr Glu Gly Ser Asp Lys Asn Ser Thr Thr Asp Lys Asn Leu Tyr
 725 730 735
 Leu Thr Trp Asn Val Pro Tyr Ala Asp Gly Thr Val Ser Ala Val Ala
 740 745 750
 Tyr Asn Ser Asn Gly Gln Lys Ile Thr Asp Thr Val Gly Gln Ser Ser
 755 760 765
 Val Thr Thr Thr Gly Lys Ala Ser Lys Leu Lys Ala Ser Ala Asp His
 770 775 780
 Lys Lys Ile Ala Ala Asp Gly Glu Ser Leu Ser Tyr Ile Thr Val Asp
 785 790 795 800
 Val Thr Asp Ala Asn Gly Asn Ile Val Pro Asp Ala Glu Asn Arg Val
 805 810 815
 Lys Phe Thr Val Glu Gly Asp Gly Glu Leu Val Gly Val Asp Asn Gly
 820 825 830
 Ser Ser Pro Asp His Asp Ser Tyr Gln Ala Asp Asn Arg Lys Ala Phe
 835 840 845
 Ser Gly Lys Val Leu Ala Ile Val Lys Ser Thr Lys Glu Ala Gly Thr
 850 855 860
 Ile Thr Val Thr Ala Ser Ala Asp Gly Leu Asp Ser Ala Ser Val Lys
 865 870 875 880
 Ile Thr Thr Thr Ala Val Asp Asn Gly Ser Thr Glu Lys Gln Ile Asp
 885 890 895
 Ser Phe Lys Met Ser Arg Thr Tyr Tyr Val Lys Val Gly Ser Thr Pro
 900 905 910
 Glu Leu Pro Glu Lys Ile Val Thr Arg Tyr Thr Asp Gly Thr Ser Glu
 915 920 925

ES 2 681 692 T3

Glu Leu Pro Val Thr Trp Asp Ala Ile Thr Glu Asp Gln Ile Ala Ala
 930 935 940

Ala Gly Ser Phe Gln Val Lys Gly Thr Val Lys Gly Gly Tyr Ser Val
 945 950 955 960

Ala Val Asn Val Asn Met Ile Asp Glu Val Gly Gly Leu Leu Asn Tyr
 965 970 975

Ser Thr Asn Thr Ala Val Gly Val Ala Pro Val Leu Pro Thr Ser Arg
 980 985 990

Pro Ala Val Leu Gln Asp Gly Thr Val Met Asp Val Thr Phe Pro Val
 995 1000 1005

Thr Trp Glu Asp Lys Ala Ala Ser Ala Tyr Asp Lys Ala Gly Thr
 1010 1015 1020

Val Thr Val Asn Gly Thr Ala Asn Val Leu Gly Lys Glu Ile Ala
 1025 1030 1035

Val Thr Ala Ser Val Arg Val Gln Glu Glu Thr Ile Thr Ile Gly
 1040 1045 1050

Asp Ser Val Ser Ala Asp Ala Leu Asn Leu Thr Gln Ser Val Pro
 1055 1060 1065

Ala Asp Lys Gln Ser Asp Thr Leu Asn Ala Ile Lys Asp Gly Ser
 1070 1075 1080

Thr Thr Ile Ser Ser Asn Thr Ser Gly Gly Ala Asn Pro Thr Val
 1085 1090 1095

Trp Ser Asn Tyr Asp Tyr Ser Gln Asp Gly Asn Thr Thr Ala Asp
 1100 1105 1110

Ile Ile Phe Glu Tyr Ala Thr Glu Gln Arg Leu Gly Gln Ile Val
 1115 1120 1125

Thr His Phe Ala Arg Asp Ser Trp Ser Met Arg Tyr Pro Asp Ala
 1130 1135 1140

Gly Ala Thr Glu Ile Tyr Val
 1145 1150

<210> 3
 <211> 91

ES 2 681 692 T3

<212> PRT

<213> Ruminococcus hansenii

<400> 3

Val Asn Trp Gly Ala Leu Ala Ser Gln Ala Trp Tyr Asp Val Ile Gln
1 5 10 15

Arg Asp Phe Val Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Ile
20 25 30

Gly Glu Pro Thr Pro Trp Asn Gly Thr Asp Pro Gly Ala Lys Gly Thr
35 40 45

Trp Pro Ser Pro Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly
50 55 60

Phe Pro Lys Asp Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn Glu Glu
65 70 75 80

5 Val Asn Thr Leu His Val Leu Pro Ala Trp Asn
85 90

<210> 4

<211> 71

<212> PRT

<213> Ruminococcus hansenii

10 <400> 4

Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Ile Gly Glu Pro Thr
1 5 10 15

Pro Trp Asn Gly Thr Asp Pro Gly Ala Lys Gly Thr Trp Pro Ser Pro
20 25 30

Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly Phe Pro Lys Asp
35 40 45

Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn Glu Glu Val Asn Thr Leu
50 55 60

His Val Leu Pro Ala Trp Asn
65 70

<210> 5

<211> 58

<212> PRT

15 <213> Ruminococcus hansenii

<400> 5

ES 2 681 692 T3

Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Ile Gly Glu Pro Thr
1 5 10 15

Pro Trp Asn Gly Thr Asp Pro Gly Ala Lys Gly Thr Trp Pro Ser Pro
20 25 30

Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly Phe Pro Lys Asp
35 40 45

Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn
50 55

<210> 6

<211> 91

5 <212> PRT

<213> *Ruminococcus lactaris*

<400> 6

Val Gly Trp Gly Ala Thr Ala Ser Asn Ala Trp Tyr Thr Val Leu Thr
1 5 10 15

Arg Asp Phe Ala Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Leu
20 25 30

Gly Glu Pro Thr Pro Trp Asn Gly Thr Gly Ser Gly Ala Val Gly Ser
35 40 45

Trp Pro Ser Pro Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile Ile Asp Thr Ala Gly
50 55 60

Phe Ala Lys Asp Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser Gln Trp Asn Asp Asp
65 70 75 80

Val Thr Thr Leu His Val Leu Pro Ala Trp Asn
85 90

<210> 7

<211> 71

10 <212> PRT

<213> *Ruminococcus lactaris*

<400> 7

Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr Gly Phe Asp Tyr Leu Gly Glu Pro Thr

ES 2 681 692 T3

gtgagaagca aaaaattgtg gatcagtttg ctgtttgctt tagcgttaat ctttacgatg	60
gcgttcggca gcacatccag cgcgcaggcg gcagggaaaa aagcagatag ccaaacacaa	120
atgtcatcag aaccggaaca agttgcggtt aaagattatg gctcaaatag cgcacgcaca	180
cagaattttg atagcgattg gaaatttaac ctgggagatg ttagcaatgc acagacaccg	240
acatttgatg attcaaaatg gcgcacactg tcaactgccgc atgattatag catcgaacag	300
gaatattcac aatcaactgga agcagaatca ggctatcttc cgggaggcgt tggctggtat	360
cgcaaaaatt ttacactggg cgaagaagcg aaaggcaaac gcattcgcat tgattttgat	420
ggcgtctata tgaatgcaac agtctatgtg aatggcaaag aagttggcac acatccgat	480
ggctatacac cgtttagctt tgatatacaca gattatatca gctatgataa agaaaacaca	540
attgcggtca aagtcgatca tcaaacaccg tcatcaagat ggtattcagg cagcggcatt	600
tatagatcag tcaacctgac aacaacaaat gatgtccatg tcgatctgaa tggcattaaa	660
gtcgaaagca acaacctgga aaaagaagca ggcaaaaacag tcaacacaga tgtgaaaaca	720
acagttgtga acggctcaa agaagcgaaa aacatcaca ttacacatac agtctttaa	780
aaaggcgaaa aaccggataa agcgatcggc acatttaca cagaagcgca agaaattggc	840
gcaggcaaaa aaacagaaat cagcgcaca gtcccggta aaaatccgga actgtggtca	900
gttgaaaatc cggcactgta tacaattcgc acagaagtta aagcaggcga taaactgctg	960
gatagctatg atacagaata tggctttcat tatctgaact ttgatacaga aacaggcttt	1020
cagctgaatg gcaaaaacgt taaactgaaa ggcgtttgca tgcacatga tcaaggcgca	1080
cttggcgagc ttgcaaatag aagagcaatt gaacgccaag tcgaaattct gcaagaaatg	1140
ggctgcaata gcattagagt cacacataat ccggcaagca aagatctgat tgaagtctgc	1200
aacgaaaaag gcattctggt cattgaagaa gtttttgacg gctggcatag agcaaaaaat	1260
ggcaacagca acgattatag cgtctggttt gaaaaagcga tcgaagaaga taacgcgatt	1320
ctgggaaaag aagcggatat gacttgggca gaatatgatc tgaaagcgat tatgaaacgc	1380
gatcaaaatg caccgagcat tattgaatgg tcaactgggca atgaaattca agaaggcgca	1440
ggcggatcag gctatgcaga aagagcggat aaactgatca aatgggcgaa agaagcagac	1500
gcaacaaaaa cactgacaat tggcagcaat gcagttaaaa gaggcgattg ggaacaagtt	1560
agcatcggcg ataaacttac aaaagcaggc ggaacatcag gcacaaatta ttcagatggc	1620
gcatcatatg ataaaattca taaagaacat ccggattgga aactgtatgg ctcagaaca	1680
gcatcatcag ttaatagccg tggcatttat tcagttacag gcaatcaaga agcaacaagc	1740

ES 2 681 692 T3

gatcaacaac tgacagcgta tgataatagc agagttaatt ggggagcact ggcatacaaa	1800
gcatggtatg atgttatcca gagagatfff gtcgcaggcg aatatgtttg gacaggcttt	1860
gattatatcg gcgaaccgac accgtggaat ggcacagatc cgggagcaaa aggcacatgg	1920
ccgtcaccga aaaacagcta ctttggcatt atcgatacag caggctttcc gaaagattca	1980
tattatffff atcagagcca gtggaatgaa gaagtcaata cactgcacgt tcttccggca	2040
tggaatgaag atgtcgtcaa aaaaaactca gatggcacag ttccggttgt tgtttattca	2100
gatgcgaaag aagtcgaaact gttttttaca cgggcaaatg gcggagaaaa aaaaagcctg	2160
ggaaaaaaaa catttaaac agaaacaaca aaagctggct atagctatca agttctggaa	2220
aacggcaaaa aaaaacataa agatctgtat atggaatggc aagtccgta tgaagcaggc	2280
acacttgaag cagttgcgaa agatgcaaaa ggcaacgtca ttaaagatac agaaggcaga	2340
agcgtcgtta aaacaacagg cgaagaagca aaactgtcag caaaaacgga tcgcaatagc	2400
attcaagcag atggcaaaga tctgtcatat attacagtcg atgtcacaga taaagatggc	2460
aatattgttc cggatgcagc aaatagagtc acatttgatg tccaaggcgc aggaaaactg	2520
gttggcgttg ataatggctc atcaccggat catgatagct ataaagcggg taaccgcaaa	2580
gcattttcag gcaaagtctt ggcaattggt cagtcaacag aaaaagcagg cgaaattaca	2640
gttacagcaa aagcagatgg cctggaatca agcacagtca aaatcacaac aacaccggtt	2700
aaagaagaac cgagcgaaag atatgtcgaa agctataaat acagcaaaaag ctattatgtg	2760
aaaacaggca caaaaccgca actgccgaaa aaaattgaag cgcagtatag cgatcgcaca	2820
aaagaggatg ttgcggtcaa atgggatgaa atctcagatg aacaaattag caaaacaggc	2880
agctttacag ttgaaggcac agttggcaaa agagatatca cagtcaacat taacatgatc	2940
gatgatgttg cagcactgct gaattattca ggcgcaacac aaaaaggcgt taaaccgcaa	3000
cttccggatg ttagaccggc agttctgctt gatggcacag tcttggcagc atcatttccg	3060
gttcagtggg atgaaaaaga tgcggataca tttcagaaac cggatgaaat tgttacagtt	3120
aacggcagcg cagatatctt tggcaaaaaca attccggtta cagcaagcat tagagtgcag	3180
aaagaagata tcaaaattgg cagcagcgtt acaaatgttg caaaactgag ccaaaatatt	3240
caaggcagcg atacactgga agcaatcaaa gatggcaaaa cagaaatgag cctgaataat	3300
gatggcggac cgaatgaatc agcatggtca aattgggatg catcacagaa aggcacaaaa	3360
gaagccgaac tgacatttac atttgataca cagcaacgca ttggcgaaat tgtcattcat	3420
tttgcgaaag ataacaactc aatcagatft cgggatgctg gcacaacaga aatctaa	3477

<210> 11
<211> 3534

ES 2 681 692 T3

<212> ADN

<213> *Ruminococcus lactaris*

<400> 11

```

gtggatcagt ttgctgtttg ctttagcggtt aatccttacg atggcgttcg gcagcacatc      60
cagcgcgcag gcggcaggga agcaggcggtt tcagttccgg cactggcaca acaagcagtt      120
agaacagaaa gccaaacaca aatgtcatca gatccggaac tggctctatgt gaataactat      180
agcagcacag cacaagaag ccagaacttt aacagcaact ggaaattcta cttcggagat      240
gcgggaaatg cacaaggcgc aacatttgat gatagcaaat gggaaacaagt ttcactgccg      300
catgattatt caatcagcca agaatatagc aatcaatgg aagcagaatc aggctatctt      360
ggcggaggca caggctggta tcgcaaaaat tttaactga gcagcgatac acaaggcaaa      420
agagtccgca ttgattttga tggcgtctat atgaatgcaa cagtttgggt taatggccat      480
gaagttggca cacatccgta tggctataca agctttagct ttgatatcac agattatgtg      540
aaatatgatg gcgaaaacac aattgcagtc aaagtctca ataatacacc gtcaagcaga      600
tggatttcag gctcaggcat ttatagagat gtcgatctga caatcacaga tgatgttcat      660
gttgatctga acggcacaaa agttacaaca ccgaacctgg aacagaaaa aggcagcaca      720
gtcaatacag atgttacagc aacagttgcg aatgattcag atgcagcaaa atcagttgca      780
gttcgccata cagtttttcc gaaagatggc agcgcagatc aatcaattgg cacagtcaca      840
acaaatgcac aatcaattgc agcaggcgca acagcagaaa ttcaagcaac ggttccggtt      900
tcaaatcctg aactgtggtc agttgaaaat ccgtcactgt atacagtcag aacagaagtt      960
ctggtcgacg gccaaagtcac agatacatat gatacagaat atggctttcg ctattttaac     1020
tttgatagca acacaggctt ttcactgaat ggcgaaaata tgaaactgaa aggcgtctgc     1080
atgcatcatg atcaaggctc acttggcgca gcagcatacg actcagcaat tgatcgccag     1140
gtcaaaatcc tgaaagaaat gggctgcaat agcattagag tcacacataa tccggcagca     1200
caagatctga ttgatgcgtg caatgaacaa ggcattctgg ttggtgaaga agcgtttgat     1260
acttggacia gaccgaaaaa tggcaacagc aacgattata gcgtctgggt taatcagaca     1320
gttgcgagcg ataataaat tctgggagcg acaaatggcg aaacatgggc acaatttgat     1380
ctggaaagca tgatctcacg cgattataat gcaccgtcag tcattatgtg gtcactgggc     1440
aatgaagtta tggaaggcat tagcggaggc acagatgcag aatatgaagc gacagcgacg     1500
aaactgatta actgggcgta tgatgcggat aatacacgtc cgatgacaat tggcgataac     1560
aaactgaaag cgaactggca gatctcaaaa acatttgca gactgctgac agaaaaaggc     1620
5 ggaacagtgg gctttaatta tgcagatggc agagttctgg attcatatca tagcagcaat     1680

```

ES 2 681 692 T3

agcaattggc tgctgtatgg ctcagaaaca gcatcagcga ttaatagccg tggcatctat	1740
tatagaacaa caggcggagg ccaaacatca gataaacagc tgacaagcta tgataattca	1800
aatgttggct ggggagcaac agcatcaaat gcatggtata cagttctgac aagagatttt	1860
gcggcaggcg aatatgtttg gacaggcttt gattatctgg gcgaaccgac accgtggaat	1920
ggcacaggct caggcgcagt tggctcatgg ccgtcaccga aaaattctta ttttggcatt	1980
atcgatacag caggcttcgc aaaagatagc tattatTTTT atcagagcca gtggaatgat	2040
gatgttacia cactgcatgt tcttccggca tggaaataata atgtcgtcag caaagattca	2100
tcaggcaatg ttccggttgt tgtttattca gatgcggcat cagtcgaact gttttttcaa	2160
gcaaaaggca gcgatacaaa aacaagcctg ggcaaaaaaa catttacaca gaaaacaaca	2220
gacgcaggct atacatatca gatctatgaa ggctcagata aaaacagcac aacagacaaa	2280
aacctgtatc tgacatggaa tgttccgtat gcagatggaa cagtttcagc agttgcgtat	2340
aatagcaacg gccagaaaat tacagataca gttggccagt cctcagttac aacaacaggc	2400
aaagcgtcaa aactgaaagc atcagcggat cataaaaaaa ttgcagcggga tggcgaatca	2460
ctgtcatata tcacagtcga tgtcacagat gcgaatggca atattgttcc ggatgcagaa	2520
aatcgcgtca aatttacagt tgaaggcgat ggcgaactgg ttggcgttga taatggctca	2580
tcaccggatc atgattcata tcaagcggat aaccgcaaag cattttcagg caaagttctg	2640
gcaattgtga aaagcacaaa agaagctggc acaattacag ttacagcatc agcagatggc	2700
ctggattcag catcagtcaa aatcacaca acagcagtcg ataatggcag cacagaaaaa	2760
caaatcgata gctttaaaat gagccgcaca tattatgtta aagttggcag cacaccggaa	2820
ctgccggaaa aaattgtcac acgctataca gatggcacat cagaagaact gcctgttact	2880
tgggatgcaa ttacagaaga tcaaattgca gcagcaggct catttcaagt taaaggcaca	2940
gtcaaaggcg gatattcagt tgcagtcaac gtcaacatga ttgatgaagt tggcggactg	3000
ctgaattatt caacaaatac agcagttggc gttgcaccgg ttctgccgac atcaagaccg	3060
gcagttctgc aagatggcac agttatggat gttacatttc cggtcacatg ggaagataaa	3120
gcagcaagcg catatgataa agcaggcaca gtgacagtca atggcacagc aatgttctg	3180
ggcaaagaaa ttgcagttac agcgagcgtt agagttcagg aagaaacaat cacaattgga	3240
gattcagttt cagcggatgc actgaatctg acacaaaagc ttccggcaga taaacaaagc	3300
gatacactga acgcaattaa agatggctca acaacaatta gctcaatac aagcggaggc	3360
gcaaatccga cagtttggag caactatgac tatagccagg atggcaatac gacagcggat	3420
atcatttttg aatatgagc agaacaaaga ctgggcaaaa tcgttacaca ttttgcgaga	3480
gatagctggc caatgagata tcctgatgca ggcgctacag aaatttatgt ctaa	3534

ES 2 681 692 T3

<210> 12
 <211> 1807
 <212> PRT
 5 <213> Ruminococcus hansenii

<400> 12

Met Tyr Phe Phe Gly Arg Ser Ala Ile Met Met Leu Thr Val Lys Thr
 1 5 10 15

Arg Lys Glu Ile Phe Met Arg Lys Gln Arg Leu Ala Arg Ile Gly Ala
 20 25 30

Ala Thr Leu Ala Ala Val Leu Thr Val Gln Gly Met Gly Phe Ser Ser
 35 40 45

Thr Val Tyr Ala Lys Glu Glu Pro Val Arg Val Lys Ala Asp Ser Gln
 50 55 60

Thr Gln Met Ser Ser Glu Pro Glu Gln Val Ala Val Lys Asp Tyr Gly
 65 70 75 80

Ser Asn Ser Ala Arg Thr Gln Asn Phe Asp Ser Asp Trp Lys Phe Asn
 85 90 95

Leu Gly Asp Val Ser Asn Ala Gln Thr Pro Thr Phe Asp Asp Ser Lys
 100 105 110

Trp Arg Thr Leu Ser Leu Pro His Asp Tyr Ser Ile Glu Gln Glu Tyr
 115 120 125

Ser Gln Ser Leu Glu Ala Glu Ser Gly Tyr Leu Pro Gly Gly Val Gly
 130 135 140

Trp Tyr Arg Lys Asn Phe Thr Leu Gly Glu Glu Ala Lys Gly Lys Arg
 145 150 155 160

Ile Arg Ile Asp Phe Asp Gly Val Tyr Met Asn Ala Thr Val Tyr Val
 165 170 175

Asn Gly Lys Glu Val Gly Thr His Pro Tyr Gly Tyr Thr Pro Phe Ser
 180 185 190

Phe Asp Ile Thr Asp Tyr Ile Ser Tyr Asp Lys Glu Asn Thr Ile Ala

ES 2 681 692 T3

675						680										685
Phe	Tyr	Gln	Ser	Gln	Trp	Asn	Glu	Glu	Val	Asn	Thr	Leu	His	Val	Leu	
690						695					700					
Pro	Ala	Trp	Asn	Glu	Asp	Val	Val	Lys	Lys	Asn	Ser	Asp	Gly	Thr	Val	
705					710					715					720	
Pro	Val	Val	Val	Tyr	Ser	Asp	Ala	Lys	Glu	Val	Glu	Leu	Phe	Phe	Thr	
				725					730					735		
Pro	Ala	Asn	Gly	Gly	Glu	Lys	Lys	Ser	Leu	Gly	Lys	Lys	Thr	Phe	Lys	
			740					745						750		
Thr	Glu	Thr	Thr	Lys	Ala	Gly	Tyr	Ser	Tyr	Gln	Val	Leu	Glu	Asn	Gly	
		755					760						765			
Lys	Lys	Lys	His	Lys	Asp	Leu	Tyr	Met	Glu	Trp	Gln	Val	Pro	Tyr	Glu	
	770					775					780					
Ala	Gly	Thr	Leu	Glu	Ala	Val	Ala	Lys	Asp	Ala	Lys	Gly	Asn	Val	Ile	
785					790					795					800	
Lys	Asp	Thr	Glu	Gly	Arg	Ser	Val	Val	Lys	Thr	Thr	Gly	Glu	Glu	Ala	
				805					810						815	
Lys	Leu	Ser	Ala	Lys	Thr	Asp	Arg	Asn	Ser	Ile	Gln	Ala	Asp	Gly	Lys	
			820					825						830		
Asp	Leu	Ser	Tyr	Ile	Thr	Val	Asp	Val	Thr	Asp	Lys	Asp	Gly	Asn	Ile	
		835					840						845			
Val	Pro	Asp	Ala	Ala	Asn	Arg	Val	Thr	Phe	Asp	Val	Gln	Gly	Ala	Gly	
	850					855						860				
Lys	Leu	Val	Gly	Val	Asp	Asn	Gly	Ser	Ser	Pro	Asp	His	Asp	Ser	Tyr	
865					870					875					880	
Lys	Ala	Asp	Asn	Arg	Lys	Ala	Phe	Ser	Gly	Lys	Val	Leu	Ala	Ile	Val	
				885					890					895		
Gln	Ser	Thr	Glu	Lys	Ala	Gly	Glu	Ile	Thr	Val	Thr	Ala	Lys	Ala	Asp	
			900					905						910		
Gly	Leu	Glu	Ser	Ser	Thr	Val	Lys	Ile	Thr	Thr	Thr	Pro	Val	Lys	Glu	

ES 2 681 692 T3

915	920	925
Glu Pro Ser Glu Arg Tyr Val Glu Ser Tyr Lys Tyr Ser Lys Ser Tyr 930		
Tyr Val Lys Thr Gly Thr Lys Pro Gln Leu Pro Lys Lys Ile Glu Ala 945	950	955
Gln Tyr Ser Asp Arg Thr Lys Glu Asp Val Ala Val Lys Trp Asp Glu 965	970	975
Ile Ser Asp Glu Gln Ile Ser Lys Thr Gly Ser Phe Thr Val Glu Gly 980	985	990
Thr Val Gly Lys Arg Asp Ile Thr Val Asn Ile Asn Met Ile Asp Asp 995	1000	1005
Val Ala Ala Leu Leu Asn Tyr Ser Gly Ala Thr Gln Lys Gly Val 1010	1015	1020
Lys Pro Gln Leu Pro Asp Val Arg Pro Ala Val Leu Pro Asp Gly 1025	1030	1035
Thr Val Leu Ala Ala Ser Phe Pro Val Gln Trp Asp Glu Lys Asp 1040	1045	1050
Ala Asp Thr Phe Gln Lys Pro Asp Glu Ile Val Thr Val Asn Gly 1055	1060	1065
Ser Ala Asp Ile Phe Gly Lys Thr Ile Pro Val Thr Ala Ser Ile 1070	1075	1080
Arg Val Gln Lys Glu Asp Ile Lys Ile Gly Ser Ser Val Thr Asn 1085	1090	1095
Val Ala Lys Leu Ser Gln Asn Ile Gln Gly Ser Asp Thr Leu Glu 1100	1105	1110
Ala Ile Lys Asp Gly Lys Thr Glu Met Ser Leu Asn Asn Asp Gly 1115	1120	1125
Gly Pro Asn Glu Ser Ala Trp Ser Asn Trp Asp Ala Ser Gln Lys 1130	1135	1140
Gly Thr Lys Glu Ala Glu Leu Thr Phe Thr Phe Asp Thr Gln Gln		

ES 2 681 692 T3

1145		1150		1155
Arg Ile Gly Glu Ile Val Ile His Phe Ala Lys Asp Asn Asn Ser		Ile		
1160		1165		1170
Ile Arg Phe Pro Asp Ala Gly Thr Thr Glu Ile Phe Val Ser Glu				
1175		1180		1185
Thr Gly Lys Asp Gly Thr Trp Glu Lys Val Glu Val Lys Glu His				
1190		1195		1200
Ile Gly Glu Glu Lys Asp Arg Val Lys Ala Tyr Arg Tyr Glu Ile				
1205		1210		1215
Ala Pro Val Thr Ala Thr Tyr Val Lys Val Lys Val Val Asn Ala				
1220		1225		1230
Asn Ala Thr Asp Thr Gly Asn Arg Lys Pro Cys Thr Ala Ile Thr				
1235		1240		1245
Glu Val Glu Leu Lys Lys Ala Glu Gly Ser Phe Lys Val Asn Glu				
1250		1255		1260
Thr Ala Glu Leu Glu Glu Val Lys Val Gly Glu Arg Val Leu Pro				
1265		1270		1275
Asn Ala Ala Tyr Ala Leu Asp Ser Tyr Ser Val Pro Glu Thr Asp				
1280		1285		1290
Ala Ala Val Thr Ala Lys Thr Lys Asp Asn Ala Ser Leu Thr Ile				
1295		1300		1305
Leu Pro Lys His Glu Asn Val Val Arg Met Ile Leu Glu Ser Glu				
1310		1315		1320
Asp His Lys Ala Thr Lys Asn Phe Ala Val Arg Met Gly Glu Glu				
1325		1330		1335
Glu Thr Val Leu Pro Asp Asp Asp Ser Arg Asp Tyr Pro Val Glu				
1340		1345		1350
Lys Ile Thr Ala Thr Ala Gly Ser Glu Tyr Lys Pro Gly Thr Ala				
1355		1360		1365
Asn Glu Gly Pro Val Lys Tyr Val Leu Asp Gly Lys Ala Glu Thr				

ES 2 681 692 T3

1370														
His Trp	His Thr	Asn Trp	Ser	Val	Ser Gly	Glu Gly	Ser Lys	Pro						
1385			1390				1395							
Glu His	Arg Thr	Val Thr	Leu	Gln Leu	Gly Asn	Asp	Glu Glu	Glu						
1400			1405				1410							
Ala Pro	Met Ile	Asp Ala	Leu	Arg Tyr	Met Pro	Arg	Ser Asn	Gly						
1415			1420				1425							
Ala Asn	Gly Arg	Val Thr	Glu	Tyr Glu	Ile Gln	Tyr	Ser Leu	Asp						
1430			1435				1440							
Gly Asp	Lys Trp	Gln Thr	Ala	Ala Thr	Gly Glu	Ile	Asp Lys	Lys						
1445			1450				1455							
Gln Thr	Gly Trp	Met Ile	Leu	Gly Phe	Glu Glu	Pro	Val Gln	Ala						
1460			1465				1470							
Lys Tyr	Val Arg	Phe Ile	Gly	Thr His	Thr Thr	Ser	Asp Gln	Gly						
1475			1480				1485							
Asn Asp	Lys His	Met Ala	Val	Ser Glu	Leu Arg	Ala	Arg Val	Ala						
1490			1495				1500							
Thr Glu	Ala Pro	Ala Pro	Ser	Glu Lys	Tyr Thr	Ile	Thr Ala	Asn						
1505			1510				1515							
Val Asn	Asp Lys	Thr Met	Gly	Ala Val	Thr Leu	Asp	Ser Glu	Thr						
1520			1525				1530							
Gly Glu	Tyr Glu	Lys Gly	Thr	Lys Ala	Thr Leu	Thr	Ala Val	Pro						
1535			1540				1545							
Lys Glu	Gly Phe	Ala Phe	Val	Asn Trp	Thr Ile	Asp	Gly Gln	Glu						
1550			1555				1560							
Val Ser	Lys Glu	Asn Pro	Tyr	Ile His	Thr Val	Glu	Thr Asp	Ala						
1565			1570				1575							
Thr Ile	Thr Ala	Asn Phe	Glu	Arg Ile	Glu Val	Glu	Asn Glu	Gly						
1580			1585				1590							
Trp Val	Gln Thr	Glu Asn	Gly	Trp Glu	Tyr Tyr	Glu	Asn Gly	Gln						

ES 2 681 692 T3

1595						1600									1605
Lys	Val	Val	Gly	Trp	Lys	Glu	Val	Ser	Gly	Lys	Trp	Tyr	Tyr	Phe	
1610						1615					1620				
Glu	Glu	Asn	Gly	Leu	Met	Gln	Thr	Gly	Trp	Val	Phe	Val	Asn	Asn	
1625						1630					1635				
His	Trp	Tyr	Tyr	Met	Asp	Gln	Trp	Gly	Ala	Met	Cys	Ile	Gly	Trp	
1640						1645					1650				
Val	Ala	Val	Asp	Gly	His	Trp	Tyr	Tyr	Met	Asp	Gln	Trp	Gly	Ala	
1655						1660					1665				
Met	Cys	Thr	Gly	Trp	Val	Ser	Val	Asn	Gly	His	Trp	Tyr	His	Met	
1670						1675					1680				
Asp	Gln	Trp	Gly	Ala	Met	Gln	Thr	Gly	Trp	Ala	Leu	Val	Asp	Ser	
1685						1690					1695				
Asn	Trp	Tyr	Tyr	Leu	Asn	Thr	Asp	Gly	Ser	Met	Ala	Ile	Gly	Trp	
1700						1705					1710				
Val	Ala	Val	Asn	Gly	His	Trp	Tyr	Tyr	Met	Asp	Gln	Trp	Gly	Ala	
1715						1720					1725				
Met	Gln	Thr	Gly	Trp	Ala	Leu	Val	Asp	Ser	Asn	Trp	Tyr	Tyr	Leu	
1730						1735					1740				
Asn	Thr	Asp	Gly	Ser	Met	Ala	Ile	Gly	Trp	Val	Ala	Val	Asn	Gly	
1745						1750					1755				
His	Trp	Tyr	Tyr	Met	Asp	Gln	Trp	Gly	Ala	Met	Gln	Thr	Gly	Trp	
1760						1765					1770				
Val	Leu	Val	Gly	Ser	Asp	Trp	Tyr	Tyr	Leu	Asn	Thr	Asp	Gly	Ser	
1775						1780					1785				
Met	Ala	Ser	Ser	Gln	Trp	Ile	Asp	Gly	Tyr	Tyr	Val	Asp	Ala	Ser	
1790						1795					1800				
Gly	Lys	Met	Lys												
1805															

ES 2 681 692 T3

<210> 13
 <211> 1768
 <212> PRT

5 <213> *Ruminococcus lactaris*

<400> 13

Met Lys Lys Lys Lys Arg Cys Thr Arg Val Gly Ala Gly Ala Leu Ala
 1 5 10 15

Ala Val Leu Ala Val Thr Ala Ala Gly Val Ser Val Pro Ala Leu Ala
 20 25 30

Gln Gln Ala Val Arg Thr Glu Ser Gln Thr Gln Met Ser Ser Asp Pro
 35 40 45

Glu Leu Val Tyr Val Asn Asn Tyr Ser Ser Thr Ala Gln Arg Ser Gln
 50 55 60

Asn Phe Asn Ser Asn Trp Lys Phe Tyr Phe Gly Asp Ala Gly Asn Ala
 65 70 75 80

Gln Gly Ala Thr Phe Asp Asp Ser Lys Trp Glu Gln Val Ser Leu Pro
 85 90 95

His Asp Tyr Ser Ile Ser Gln Glu Tyr Ser Lys Ser Met Glu Ala Glu
 100 105 110

Ser Gly Tyr Leu Gly Gly Gly Thr Gly Trp Tyr Arg Lys Asn Phe Thr
 115 120 125

Leu Ser Ser Asp Thr Gln Gly Lys Arg Val Arg Ile Asp Phe Asp Gly
 130 135 140

Val Tyr Met Asn Ala Thr Val Trp Val Asn Gly His Glu Val Gly Thr
 145 150 155 160

His Pro Tyr Gly Tyr Thr Ser Phe Ser Phe Asp Ile Thr Asp Tyr Val
 165 170 175

Lys Tyr Asp Gly Glu Asn Thr Ile Ala Val Lys Val Val Asn Asn Thr
 180 185 190

Pro Ser Ser Arg Trp Tyr Ser Gly Ser Gly Ile Tyr Arg Asp Val Asp
 195 200 205

Leu Thr Ile Thr Asp Asp Val His Val Asp Leu Asn Gly Thr Lys Val
 210 215 220

ES 2 681 692 T3

Thr Thr Pro Asn Leu Glu Thr Glu Lys Gly Ser Thr Val Asn Thr Asp
225 230 235 240

Val Thr Ala Thr Val Ala Asn Asp Ser Asp Ala Ala Lys Ser Val Ala
245 250 255

Val Arg His Thr Val Phe Pro Lys Asp Gly Ser Ala Asp Gln Ser Ile
260 265 270

Gly Thr Val Thr Thr Asn Ala Gln Ser Ile Ala Ala Gly Ala Thr Ala
275 280 285

Glu Ile Gln Ala Thr Val Pro Val Ser Asn Pro Glu Leu Trp Ser Val
290 295 300

Glu Asn Pro Ser Leu Tyr Thr Val Arg Thr Glu Val Leu Val Asp Gly
305 310 315 320

Gln Val Thr Asp Thr Tyr Asp Thr Glu Tyr Gly Phe Arg Tyr Phe Asn
325 330 335

Phe Asp Ser Asn Thr Gly Phe Ser Leu Asn Gly Glu Asn Met Lys Leu
340 345 350

Lys Gly Val Cys Met His His Asp Gln Gly Ser Leu Gly Ala Ala Ala
355 360 365

Tyr Asp Ser Ala Ile Asp Arg Gln Val Lys Ile Leu Lys Glu Met Gly
370 375 380

Cys Asn Ser Ile Arg Val Thr His Asn Pro Ala Ala Gln Asp Leu Ile
385 390 395 400

Asp Ala Cys Asn Glu Gln Gly Ile Leu Val Val Glu Glu Ala Phe Asp
405 410 415

Thr Trp Thr Arg Pro Lys Asn Gly Asn Ser Asn Asp Tyr Ser Val Trp
420 425 430

Phe Asn Gln Thr Val Ala Ser Asp Asn Glu Ile Leu Gly Ala Thr Asn
435 440 445

Gly Glu Thr Trp Ala Gln Phe Asp Leu Glu Ser Met Ile Ser Arg Asp
450 455 460

ES 2 681 692 T3

Tyr Asn Ala Pro Ser Val Ile Met Trp Ser Leu Gly Asn Glu Val Met
465 470 475 480

Glu Gly Ile Ser Gly Gly Thr Asp Ala Glu Tyr Glu Ala Thr Ala Thr
485 490 495

Lys Leu Ile Asn Trp Ala Tyr Asp Ala Asp Asn Thr Arg Pro Met Thr
500 505 510

Ile Gly Asp Asn Lys Leu Lys Ala Asn Trp Gln Ile Ser Lys Thr Phe
515 520 525

Ala Arg Leu Leu Thr Glu Lys Gly Gly Thr Val Gly Phe Asn Tyr Ala
530 535 540

Asp Gly Arg Val Leu Asp Ser Tyr His Ser Ser Asn Ser Asn Trp Leu
545 550 555 560

Leu Tyr Gly Ser Glu Thr Ala Ser Ala Ile Asn Ser Arg Gly Ile Tyr
565 570 575

Tyr Arg Thr Thr Gly Gly Gly Gln Thr Ser Asp Lys Gln Leu Thr Ser
580 585 590

Tyr Asp Asn Ser Asn Val Gly Trp Gly Ala Thr Ala Ser Asn Ala Trp
595 600 605

Tyr Thr Val Leu Thr Arg Asp Phe Ala Ala Gly Glu Tyr Val Trp Thr
610 615 620

Gly Phe Asp Tyr Leu Gly Glu Pro Thr Pro Trp Asn Gly Thr Gly Ser
625 630 635 640

Gly Ala Val Gly Ser Trp Pro Ser Pro Lys Asn Ser Tyr Phe Gly Ile
645 650 655

Ile Asp Thr Ala Gly Phe Ala Lys Asp Ser Tyr Tyr Phe Tyr Gln Ser
660 665 670

Gln Trp Asn Asp Asp Val Thr Thr Leu His Val Leu Pro Ala Trp Asn
675 680 685

Asn Asn Val Val Ser Lys Asp Ser Ser Gly Asn Val Pro Val Val Val
690 695 700

ES 2 681 692 T3

Tyr Ser Asp Ala Ala Ser Val Glu Leu Phe Phe Gln Ala Lys Gly Ser
 705 710 715 720
 Asp Thr Lys Thr Ser Leu Gly Lys Lys Thr Phe Thr Gln Lys Thr Thr
 725 730 735
 Asp Ala Gly Tyr Thr Tyr Gln Ile Tyr Glu Gly Ser Asp Lys Asn Ser
 740 745 750
 Thr Thr Asp Lys Asn Leu Tyr Leu Thr Trp Asn Val Pro Tyr Ala Asp
 755 760 765
 Gly Thr Val Ser Ala Val Ala Tyr Asn Ser Asn Gly Gln Lys Ile Thr
 770 775 780
 Asp Thr Val Gly Gln Ser Ser Val Thr Thr Thr Gly Lys Ala Ser Lys
 785 790 795 800
 Leu Lys Ala Ser Ala Asp His Lys Lys Ile Ala Ala Asp Gly Glu Ser
 805 810 815
 Leu Ser Tyr Ile Thr Val Asp Val Thr Asp Ala Asn Gly Asn Ile Val
 820 825 830
 Pro Asp Ala Glu Asn Arg Val Lys Phe Thr Val Glu Gly Asp Gly Glu
 835 840 845
 Leu Val Gly Val Asp Asn Gly Ser Ser Pro Asp His Asp Ser Tyr Gln
 850 855 860
 Ala Asp Asn Arg Lys Ala Phe Ser Gly Lys Val Leu Ala Ile Val Lys
 865 870 875 880
 Ser Thr Lys Glu Ala Gly Thr Ile Thr Val Thr Ala Ser Ala Asp Gly
 885 890 895
 Leu Asp Ser Ala Ser Val Lys Ile Thr Thr Thr Ala Val Asp Asn Gly
 900 905 910
 Ser Thr Glu Lys Gln Ile Asp Ser Phe Lys Met Ser Arg Thr Tyr Tyr
 915 920 925
 Val Lys Val Gly Ser Thr Pro Glu Leu Pro Glu Lys Ile Val Thr Arg
 930 935 940

ES 2 681 692 T3

Tyr Thr Asp Gly Thr Ser Glu Glu Leu Pro Val Thr Trp Asp Ala Ile
 945 950 955 960

Thr Glu Asp Gln Ile Ala Ala Ala Gly Ser Phe Gln Val Lys Gly Thr
 965 970 975

Val Lys Gly Gly Tyr Ser Val Ala Val Asn Val Asn Met Ile Asp Glu
 980 985 990

Val Gly Gly Leu Leu Asn Tyr Ser Thr Asn Thr Ala Val Gly Val Ala
 995 1000 1005

Pro Val Leu Pro Thr Ser Arg Pro Ala Val Leu Gln Asp Gly Thr
 1010 1015 1020

Val Met Asp Val Thr Phe Pro Val Thr Trp Glu Asp Lys Ala Ala
 1025 1030 1035

Ser Ala Tyr Asp Lys Ala Gly Thr Val Thr Val Asn Gly Thr Ala
 1040 1045 1050

Asn Val Leu Gly Lys Glu Ile Ala Val Thr Ala Ser Val Arg Val
 1055 1060 1065

Gln Glu Glu Thr Ile Thr Ile Gly Asp Ser Val Ser Ala Asp Ala
 1070 1075 1080

Leu Asn Leu Thr Gln Ser Val Pro Ala Asp Lys Gln Ser Asp Thr
 1085 1090 1095

Leu Asn Ala Ile Lys Asp Gly Ser Thr Thr Ile Ser Ser Asn Thr
 1100 1105 1110

Ser Gly Gly Ala Asn Pro Thr Val Trp Ser Asn Tyr Asp Tyr Ser
 1115 1120 1125

Gln Asp Gly Asn Thr Thr Ala Asp Ile Ile Phe Glu Tyr Ala Thr
 1130 1135 1140

Glu Gln Arg Leu Gly Gln Ile Val Thr His Phe Ala Arg Asp Ser
 1145 1150 1155

Trp Ser Met Arg Tyr Pro Asp Ala Gly Ala Thr Glu Ile Tyr Val
 1160 1165 1170

ES 2 681 692 T3

Ser	Pro	Asp	Gly	Thr	Asn	Trp	Ala	Lys	Leu	Asp	Thr	Thr	Glu	Thr
	1175					1180					1185			
Ile	Gly	Thr	Glu	Ser	Gly	Asn	Val	Lys	Pro	Tyr	Thr	Tyr	Asp	Phe
	1190					1195					1200			
Ala	Pro	Val	Gly	Ala	Thr	Phe	Val	Lys	Phe	His	Leu	Thr	Asn	Ser
	1205					1210					1215			
Thr	Gln	Ala	Thr	Gly	Thr	Thr	Ala	Lys	Ala	Cys	Thr	Gly	Ile	Thr
	1220					1225					1230			
Glu	Ile	Glu	Leu	Lys	Val	Ala	Thr	Gly	Ser	Arg	Thr	Thr	Asn	Thr
	1235					1240					1245			
Thr	Ala	Glu	Leu	Gln	Thr	Leu	Thr	Val	Asn	Gly	Lys	Glu	Val	Pro
	1250					1255					1260			
Gln	Thr	Ala	Leu	Asp	Ser	Lys	Val	Tyr	Thr	Thr	Pro	Ala	Ile	Leu
	1265					1270					1275			
Ala	Glu	Ile	Glu	Ala	Thr	Ala	Lys	Asp	Asn	Ala	Ser	Val	Thr	Val
	1280					1285					1290			
Leu	Pro	Ala	Tyr	Asn	Asp	Val	Ile	Arg	Ile	Ile	Val	Glu	Ser	Glu
	1295					1300					1305			
Asp	His	Gln	Thr	Arg	Asn	Thr	Tyr	Glu	Val	Arg	Leu	Asn	Glu	Ala
	1310					1315					1320			
Glu	Gln	Thr	Thr	Pro	Asp	Ser	Asp	Ser	Arg	Asp	Tyr	Pro	Val	Ser
	1325					1330					1335			
Lys	Leu	Thr	Ala	Ser	Ala	Gly	Ser	Glu	Gln	Ser	Thr	Thr	Gly	Val
	1340					1345					1350			
Glu	Gly	Pro	Ala	Ser	Asn	Ala	Lys	Asp	Gly	Asp	Glu	Ser	Thr	Leu
	1355					1360					1365			
Trp	His	Thr	Arg	Trp	Ser	Ala	Pro	Ala	Ala	Thr	Ser	Asp	Gln	Leu
	1370					1375					1380			
Trp	Phe	Thr	Tyr	Glu	Leu	Glu	Glu	Glu	Thr	Val	Leu	Asp	Ala	Leu
	1385					1390					1395			

ES 2 681 692 T3

Arg Tyr Leu Pro Arg Gln Gly Thr Ala Asp Gly Gln Asn Asn Gly
 1400 1405 1410

Arg Val Asn Glu Tyr Arg Val Glu Val Ser Thr Asp Gly Ser Thr
 1415 1420 1425

Trp Thr Thr Val Ser Thr Gly Asn Trp Glu Asp Ser Gln Asp Trp
 1430 1435 1440

Lys Leu Ala Glu Phe Thr Glu Pro Val Ala Ala Lys Tyr Val Arg
 1445 1450 1455

Leu Thr Gly Val His Thr Tyr Gly Ser Ser Ala Ala Asn Val Asp
 1460 1465 1470

Lys Tyr Met Ser Ala Ala Glu Ile Arg Leu Arg Met Ala Glu Ser
 1475 1480 1485

Lys Thr Asp Ile Ala Asp Ala Ala Asn Gly Val Thr Val Thr Ala
 1490 1495 1500

Pro Asp Ser Ile Glu Val Ala Lys Ala Asp Ala Glu Asn Pro Val
 1505 1510 1515

Met Phe Asp Leu Ser Asp Ile Val Val Lys Ala Gly Asp Thr Thr
 1520 1525 1530

Leu Arg Tyr Gly Val Asp Tyr Val Ile Ser Tyr Glu Asn Asn Thr
 1535 1540 1545

Asp Phe Gly Thr Ala Lys Leu Val Ile Lys Gly Ile Asp Gly Tyr
 1550 1555 1560

Thr Gly Thr Leu Glu His Glu Phe Thr Ile Thr Gln Lys Ala Lys
 1565 1570 1575

Val Met Thr Gly Ile Thr Trp Asn Thr Lys Pro Glu Lys Val Ile
 1580 1585 1590

Tyr Thr Glu Gly Glu Thr Leu Asp Val Thr Gly Leu Val Ile Asn
 1595 1600 1605

Val Val Tyr Asp Asp Asp Ser Thr Glu Ala Val Ala Tyr Ser Glu
 1610 1615 1620

ES 2 681 692 T3

Ala Asn Ala Asp Glu Phe Thr Phe Ser Pro Ala Leu Asp Thr Lys
 1625 1630 1635

Leu Ala Ala Thr Asp Lys Thr Val Thr Val Thr Tyr Lys Gly Ala
 1640 1645 1650

Ser Leu Ile Tyr Asp Ile Thr Val Asn Pro Lys Lys Val Asp Pro
 1655 1660 1665

Thr Asp Pro Asp Gln Pro Asp Lys Pro Asp Thr Pro Asp Asn Gly
 1670 1675 1680

Asn Asp Asn Gly Asn Asp Asn Asn Gly Asn Gly Asn Asn Asn Gly
 1685 1690 1695

Thr Asp Asp Gly Lys Lys Asp Pro Gly Gln Ser Gly Val Thr Asp
 1700 1705 1710

Asn Lys Asn Gln Gly Asn Asn Ser Asn Asn Gly Thr Ala Ala Gly
 1715 1720 1725

Asn Lys Ala Asn Ala Ala Ala Lys Thr Gly Asp Thr Ala Asn Met
 1730 1735 1740

Leu Leu Pro Met Ile Ala Ala Met Leu Ala Gly Thr Ala Val Val
 1745 1750 1755

Gly Thr Ile Ser Ile Arg Arg Arg Arg Arg
 1760 1765

- <210> 14
- <211> 5244
- <212> ADN
- <213> Ruminococcus hansenii

5

<400> 14
 aaagcagata gccaaacaca aatgtcatca gaaccggaac aagttgctgt taaagattat 60
 ggctcaaata gcgcacgcac acagaatttt gatagcgatt ggaaatttaa cctgggagat 120
 gttagcaatg cacagacacc gacatttgat gattcaaaat ggcgcacact gtcactgccg 180
 catgattata gcatcgaaca ggaatattca caatcactgg aagcagaatc aggctatctt 240
 ccgggaggcg ttggctggta tcgcaaaaat ttacactgg gcgaagaagc gaaaggcaaa 300
 cgcattcgca ttgattttga tggcgtctat atgaatgcaa cagtctatgt gaatggcaaa 360
 gaagttggca cacatccgta tggctataca ccgtttagct ttgatcac agattatc 420

ES 2 681 692 T3

agctatgata aagaaaacac aattgcggtc aaagtcgadc atcaaacacc gtcacatcaaga	480
tggtattcag gcagcggcat ttatagatca gtcaacctga caacaacaaa tgatgtccat	540
gtcgatctga atggcattaa agtcgaaagc aacaacctgg aaaaagaagc aggcaaaaca	600
gtcaacacag atgtgaaaac aacagttgtg aacggctcaa aagaagcgaa aaacatcaca	660
attacacata cagtctttaa aaaaggcgaa aaaccggata aagcgatcgg cacatttaca	720
acagaagcgc aagaaattgg cgcaggcaaa aaaacagaaa tcagcgcgaac agtcccggtt	780
aaaaatccgg aactgtggtc agttgaaaat ccggcactgt atacaattcg cacagaagtt	840
aaagcaggcg ataaactgct ggatagctat gatacagaat atggctttca ttatctgaac	900
tttgatacag aacaggcctt tcagctgaat ggcaaaaacg ttaaactgaa aggcgtttgc	960
atgcatcatg atcaaggcgc acttggcgca gttgcaaata gaagagcaat tgaacgcaa	1020
gtcgaattc tgcaagaaat gggctgcaat agcattagag tcacacataa tccggcaagc	1080
aaagatctga ttgaagtctg caacgaaaaa ggcattctgg tcattgaaga agtttttgac	1140
ggctggcata gagcaaaaaa tggcaacagc aacgattata gcgtctggtt tgaaaaagcg	1200
atcgaagaag ataacgcgat tctgggaaaa gaagcggata tgacttgggc agaatatgat	1260
ctgaaagcga ttatgaaacg cgatcaaaaat gcaccgagca ttattgaatg gtcactgggc	1320
aatgaaattc aagaaggcgc aggcggatca ggctatgcag aaagagcggg taaactgatc	1380
aaatgggcca aagaagcaga cgcaacaaaa aactgacaa ttggcagcaa tgcagttaaa	1440
agaggcgatt gggaacaagt tagcatcggc gataaactta caaaagcagg cggaacatca	1500
ggcaciaaatt atcagatgg cgcacatcat gataaaattc ataaagaaca tccggattgg	1560
aaactgtatg gtcagaaaac agcatcatca gttaatagcc gtggcattta ttcagttaca	1620
ggcaatcaag aagcaacaag cgatcaacaa ctgacagcgt atgataatag cagagttaat	1680
tggggagcac tggcatcaca agcatggat gatgttatcc agagagattt tgtcgcaggc	1740
gaatatgttt ggacaggcct tgattatata ggcgaccga caccgtggaa tggcacagat	1800
ccgggagcaa aaggcacatg gccgtcaccg aaaaacagct actttggcat tatcgataca	1860
gcaggctttc cgaaagattc atattatatt tatcagagcc agtggaatga agaagtcaat	1920
aactgcacg ttcttccggc atggaatgaa gatgtcgtca aaaaaaactc agatggcaca	1980
gttccggttg ttgtttattc agatgcgaaa gaagtcgaac tgttttttac accggcaaat	2040
ggcggagaaa aaaaaagcct gggaaaaaaa acatttaaaa cagaaacaac aaaagctggc	2100
tatagctatc aagttctgga aaacggcaaa aaaaaacata aagatctgta tatggaatgg	2160
caagttccgt atgaagcagg cacacttgaa gcagttgcga aagatgcaaa aggcaacgtc	2220

ES 2 681 692 T3

attaaagata	cagaaggcag	aagcgtcgtt	aaaacaacag	gcgaagaagc	aaaactgtca	2280
gcaaaaacgg	atcgcaatag	cattcaagca	gatggcaaag	atctgtcata	tattacagtc	2340
gatgtcacag	ataaagatgg	caatattggt	ccggatgcag	caaatagagt	cacatttgat	2400
gtccaaggcg	caggaaaact	ggttggcgtt	gataatggct	catcaccgga	tcatgatagc	2460
tataaagcgg	ataaccgcaa	agcattttca	ggcaaagttc	tggcaattgt	tcagtcaaca	2520
gaaaaagcag	gcgaaattac	agttacagca	aaagcagatg	gcctggaatc	aagcacagtc	2580
aaaatcacia	caacaccggt	taaagaagaa	ccgagcgaag	gatatgtcga	aagctataaa	2640
tacagcaaaa	gctattatgt	gaaaacaggc	acaaaaccgc	aactgccgaa	aaaaattgaa	2700
gcgcagtata	gcgatcgcac	aaaagaggat	gttgcggtca	aatgggatga	aatctcagat	2760
gaacaaatta	gcaaaacagc	cagctttaca	gttgaaggca	cagttggcaa	aagagatata	2820
acagtcaaca	ttaacatgat	cgatgatggt	gcagcactgc	tgaattattc	aggcgcaaca	2880
caaaaaggcg	ttaaaccgca	acttccggat	gtagaccggt	cagttctgcc	tgatggcaca	2940
gtcctggcag	catcatttcc	ggttcagtg	gatgaaaaag	atgccggatac	atttcagaaa	3000
ccggatgaaa	ttgttacagt	taacggcagc	gcagatatct	ttggcaaac	aattccggtt	3060
acagcaagca	ttagagtgca	gaaagaagat	atcaaaattg	gcagcagcgt	tacaaatggt	3120
gcaaaaactga	gccaaaatat	tcaaggcagc	gatacactgg	aagcaatcaa	agatggcaaa	3180
acagaaatga	gcctgaataa	tgatggcggg	ccgaatgaat	cagcatggtc	aaattgggat	3240
gcatcacaga	aaggcacaaa	agaagccgaa	ctgacattta	catttgatac	acagcaacgc	3300
attggcgaaa	ttgtcattca	ttttgcgaaa	gataacaact	caatcagatt	tccggatgct	3360
ggcacaacag	aatctttgt	ttcagaaaca	ggcaaagatg	gcacatggga	aaaagttgaa	3420
gtcaaagagc	atattggcga	agaaaaagat	cgcgtcaaag	catatcgcta	tgaaattgca	3480
ccggttacag	cgacatatgt	taaagttaaa	gtcgtcaatg	cgaacgcgac	agatacaggc	3540
aatagaaaac	cgtgcacagc	aattacagaa	gtcgaactga	aaaaagcaga	aggcagcttt	3600
aaagtcaacg	aaacagcaga	actggaagaa	gttaaagttg	gcgaaocgtgt	tctgccgaat	3660
gcagcatatg	caactggattc	atattcagtt	ccgaaaacgg	atgcagcagt	tacagcaaaa	3720
acaaaagata	atgcgagcct	gacaatcctg	ccgaaacatg	aaaatgtcgt	cagaatgatt	3780
ctggaaagcg	aagaccataa	agcgacgaaa	aactttgcag	ttagaatggg	cgaagaagaa	3840
acagttctgc	cggatgatga	ttcaagagat	tatccggtcg	aaaaaatcac	agcaacagca	3900
ggctcagaat	ataaaccggg	aacagcaaat	gaaggaccgg	ttaaatatgt	tctggatggc	3960
aaagcagaaa	cacattggca	tacaaattgg	tcagtttcag	gcgaaggctc	aaaaccggaa	4020

ES 2 681 692 T3

catagaacag ttacactgca actgggcaat gatgaagaag aagcaccgat gattgacgca	4080
ctgagatata tgccgagatc aaatggcgca aatggcagag ttacggaata tgaaattcag	4140
tatagcctgg atggcgataa atggcaaaca gcagcaacag gcgaaatcga taaaaaacia	4200
acaggctgga tgatcctggg ctttgaagaa cgggttcaag caaaatatgt ccgctttatt	4260
ggcacacata caacatcaga tcagggcaat gataaacata tggcagtttc agaactgaga	4320
gcaagagttg caacagaagc accggcaccg tcagagaagt atacaattac agcgaacgtc	4380
aacgataaaa caatgggagc agttacactt gatagcgaaa caggcgaata tgaaaaaggc	4440
acgaaagcaa cactgacagc agttccgaaa gaaggctttg catttgtcaa ctggacaatt	4500
gatggccaag aagtctcaa agaaaacccg tatatccata cagttgaaac ggatgcgaca	4560
atcacagcga attttgaacg cattgaagtc gaaaatgaag gctgggttca aacagaaaat	4620
ggctgggaat attatgagaa tggccaaaaa gttgtcggct ggaaagaagt ttcaggcaaa	4680
tgggtactact ttgaagaaaa tggcctgatg caaacaggat gggctcttgt taacaacat	4740
tgggtattata tggatcagtg gggggcaatg tgcattggct gggttgcagt tgatggccat	4800
tgggtactaca tggaccaatg ggggtgatg tgtacaggct gggttagcgt caatggacat	4860
tgggtatcata tggaccaatg gggagccatg caaacaggct gggcactggt tgattcaaat	4920
tgggtattacc tgaatacggg tggctcaatg gcaattggat gggctgcagt gaacggccac	4980
tgggtattaca tggatcaatg gggagctatg cagacgggat gggctcttgt tgatagcaac	5040
tgggtattatc ttaacacaga tggcagcatg gcaatcggct ggggtggcggg taatggacac	5100
tgggtactata tggatcaatg gggtgcaatg cagacaggct gggttctggt cggcagcgat	5160
tgggtactatt taaacacgga tggatctatg gcatcaagcc aatggattga tggctattat	5220
gttgatgcaa gcggaagat gaag	5244

<210> 15
<211> 5235

5

<212> ADN
<213> *Ruminococcus lactaris*

<400> 15

gcaggcgttt cagttccggc actggcacia caagcagtta gaacagaaag ccaaacacia	60
atgtcatcag atccggaact ggtctatgtg aataactata gcagcacagc acaagaagc	120
cagaacttta acagcaactg gaaattctac ttcggagatg cgggaaatgc acaaggcgca	180
acatttgatg atagcaaatg ggaacaagtt tcaactgccgc atgattattc aatcagccaa	240
gaatatagca aatcaatgga agcagaatca ggctatcttg gcggaggcac aggctggtat	300
cgcaaaaatt ttacactgag cagcgataca caaggcaaaa gagtccgcat tgattttgat	360

ES 2 681 692 T3

ggcgtctata tgaatgcaac agtttgggtt aatggccatg aagttggcac acatccgtat	420
ggctatacaa gctttagctt tgatatcaca gattatgtga aatatgatgg cgaaaacaca	480
attgcagtca aagtcgtcaa taatacaccg tcaagcagat ggtattcagg ctcaggcatt	540
tatagagatg tcgatctgac aatcacagat gatgttcatg ttgatctgaa cggcacaaaa	600
gttacaacac cgaacctgga aacagaaaaa ggcagcacag tcaatacaga tgttacagca	660
acagttgcga atgattcaga tgcagcaaaa tcagttgcag ttcgccatac agtttttccg	720
aaagatggca gcgcagatca atcaattggc acagtcacaa caaatgcaca atcaattgca	780
gcaggcgcaa cagcagaaat tcaagcaacg gttccggttt caaatcctga actgtgggtca	840
gttgaaaatc cgtcactgta tacagtcaga acagaagttc tggtcgacgg ccaagtcaca	900
gatacatatg atacagaata tggctttcgc tattttaact ttgatagcaa cacaggcttt	960
tcactgaatg gcgaaaatat gaaactgaaa ggcgtctgca tgcacatga tcaaggctca	1020
cttggcgagcag cagcatacga ctcagcaatt gatcgccagg tcaaaaatcct gaaagaaatg	1080
ggctgcaata gcattagagt cacacataat ccggcagcac aagatctgat tgatgcgtgc	1140
aatgaacaag gcattctggt tgttgaagaa gcgtttgata cttggacaag accgaaaaat	1200
ggcaacagca acgattatag cgtctggttt aatcagacag ttgcgagcga taatgaaatt	1260
ctgggagcga caaatggcga aacatgggca caatttgatc tggaaagcat gatctcacgc	1320
gattataatg caccgtcagt cattatgtgg tcaactgggca atgaagtat ggaaggcatt	1380
agcggaggca cagatgcaga atatgaagcg acagcgacga aactgattaa ctgggcgtat	1440
gatgcggata atacacgtcc gatgacaatt ggcgataaca aactgaaagc gaactggcag	1500
atctcaaaaa catttgcgag actgctgaca gaaaaaggcg gaacagtggg ctttaattat	1560
gcagatggca gagttctgga ttcatatcat agcagcaata gcaattggct gctgtatggc	1620
tcagaaaacag catcagcgat taatagccgt ggcattctatt atagaacaac aggcggaggc	1680
caaacatcag ataaacagct gacaagctat gataattcaa atgttggctg gggagcaaca	1740
gcatcaaatg catggtatac agttctgaca agagatthttg cggcaggcga atatgthttg	1800
acaggcttht attatctggg cgaaccgaca ccgtggaatg gcacaggctc aggcgcagtt	1860
ggctcatggc cgtcaccgaa aaattcttat tttggcatta tcgatacagc aggcttcgca	1920
aaagatagct attatthtta tcagagccag tggaatgatg atgttacaac actgcatgth	1980
cttccggcat ggaataataa tgctgctcagc aaagattcat caggcaatgt tccgthttht	2040
gthtattcag atgcggcatc agtcgaactg thththcaag caaaaggcag cgatacaaaa	2100
acaagcctgg gcaaaaaaac atttacacag aaaacaacag acgcaggcta tacatatcag	2160

ES 2 681 692 T3

atctatgaag	gctcagataa	aaacagcaca	acagacaaaa	acctgtatct	gacatggaat	2220
gttccgtag	cagatggaac	agtttcagca	gttgcgtata	atagcaacgg	ccagaaaatt	2280
acagatacag	ttggccagtc	ctcagttaca	acaacaggca	aagcgtcaaa	actgaaagca	2340
tcagcggatc	ataaaaaaat	tgcagcggat	ggcgaatcac	tgtcatatat	cacagtcgat	2400
gtcacagatg	cgaatggcaa	tattggtccg	gatgcagaaa	atcgcgtcaa	atttacagtt	2460
gaaggcgatg	gcgaactggg	tggcgttgat	aatggctcat	caccggatca	tgattcatat	2520
caagcggata	accgcaaagc	attttcaggc	aaagttctgg	caattgtgaa	aagcacaaaa	2580
gaagctggca	caattacagt	tacagcatca	gcagatggcc	tggattcagc	atcagtcaaa	2640
atcacaacia	cagcagtcga	taatggcagc	acagaaaaac	aatcgatag	cttataaatg	2700
agccgcacat	attatgttaa	agttggcagc	acaccggaac	tgccggaaaa	aattgtcaca	2760
cgctatacag	atggcacatc	agaagaactg	cctgttactt	gggatgcaat	tacagaagat	2820
caaattgcag	cagcaggctc	atttcaagtt	aaaggcacag	tcaaaggcgg	atattcagtt	2880
gcagtcaacg	tcaacatgat	tgatgaagtt	ggcggactgc	tgaattattc	aacaatata	2940
gcagttggcg	ttgcaccggt	tctgccgaca	tcaagaccgg	cagttctgca	agatggcaca	3000
gttatggatg	ttacatttcc	ggtcacatgg	gaagataaag	cagcaagcgc	atatgataaa	3060
gcaggcacag	tgacagtcaa	tggcacagca	aatgttctgg	gcaaagaaat	tgcagttaca	3120
gcgagcgтта	gagttcagga	agaacaatc	acaattggag	attcagtttc	agcggatgca	3180
ctgaatctga	cacaaagcgt	tccggcagat	aaacaaagcg	atacactgaa	cgcaattaaa	3240
gatggctcaa	caacaattag	ctcaaataca	agcggaggcg	caaatccgac	agtttggagc	3300
aactatgact	atagccagga	tggcaatacg	acagcggata	tcatttttga	atatgcgaca	3360
gaacaaagac	tgggccaat	cgttacacat	tttgcgagag	atagctggtc	aatgagatat	3420
cctgatgcag	gcgctacaga	aatttatgtc	tcaccggatg	gcacaaattg	ggcaaaactg	3480
gatacaacag	aaacaattgg	cacagaaagc	ggcaatgtta	aaccgtatac	atatgatttt	3540
gcaccggttg	gcgcaacatt	tgttaaatth	catctgacaa	acagcacaca	agcaacaggc	3600
acaacagcaa	aagcatgcac	aggcattaca	gaaattgaac	tgaaagttgc	aacaggctca	3660
cgcacaaaa	atacaacagc	agaactgcaa	acactgacag	ttaatggcaa	agaagttccg	3720
caaacagcac	tggatagcaa	agtttataca	acaccggcaa	ttctggcaga	aattgaagca	3780
acagcgaag	ataatgcaag	cgttacagtt	cttccggcat	ataatgatgt	cattcgcatt	3840
attgtcgaaa	gcgaagatca	tcaaacacgc	aatacatatg	aagtcagact	gaatgaagcg	3900
gaacaaacia	caccggattc	agattcaaga	gattatccgg	ttagcaaaact	gacagcatca	3960

ES 2 681 692 T3

gcaggctcag aacaatcaac aacaggcggt gaaggaccgg catcaaatgc aaaagacggt 4020
gatgaatcaa cactgtggca tacaagatgg tcagcaccgg cagcaacatc agatcaactg 4080
tggtttacat atgaactgga agaagaaacg gtactggacg cactgagata tctgccgaga 4140
caaggcacag cagatggcca aaataatggc agagttaatg aatatcgcgt cgaagttagc 4200
acagatggca gcacatggac aacagtttca acaggcaatt ggggaagatag ccaagattgg 4260
aaactggcag aatttacaga accggttgca gcaaaatatg tcagactgac aggcgttcat 4320
acatatggct catcagcagc aaacgtcgat aaatacatga gcgcagcaga aattagactg 4380
agaatggcag aaagcaaac ggatattgca gatgcagcaa atggcgttac agttacagca 4440
ccggattcaa ttgaagttgc aaaagcagat gcagaaaacc cggttatggt tgatctgagc 4500
gatattgttg tcaaagcagg cgatacaaca ctgagatatg gcgttgatta tgtcattagc 4560
tatgaaaaca acacagattht tggcacagcg aaactggctca ttaaaggcat tgatggctat 4620
acaggcacac tggaaatga attcacaatc acgcagaaag ccaaagtcac gacaggcatc 4680
acatggaata caaaaccgga aaaagtcatt tatacgaag gtgaaacgct ggatgttaca 4740
ggcctgggta ttaatgtcgt ctatgatgat gatagcacag aagcagttgc atatagcgaa 4800
gcaaatgcbg atgaatthac atthttcaccg gcactggata caaaactggc agcgacagat 4860
aaaacagtca cagttacata taaaggcgca agcctgattt atgatattac agtcaaccgg 4920
aaaaaagtcg atccgacaga tccggatcag cctgataaac cggatacacc ggataatggc 4980
aatgataacg gcaacgataa taatggcaac ggcaataaca acggcacaga tgatggcaaa 5040
aaagatccgg gacaatcagg cgttacagat aacaaaaatc agggcaataa cagcaataat 5100
ggaacagcag caggcaataa agcaaatgca gcagcaaaaa caggcgatac agcaaatatg 5160
ctgctgccga tgattgcagc aatgctggca ggcacagcag ttggtggcac aatttcaatt 5220
cgcagacgca gacgc 5235

<210> 16
<211> 3375
5 <212> ADN
<213> Ruminococcus hansenii

<400> 16
aaagcagata gccaaacaca aatgtcatca gaaccggaac aagttgcggt taaagattat 60
ggctcaaata gcgcacgcac acagaattht gatagcgatt ggaatthta cctgggagat 120
gtagcaatg cacagacacc gacatthgat gattcaaat ggcgcacact gtcactgccg 180
catgattata gcacgaaca ggaatattca caatcactgg aagcagaatc aggctatctt 240
ccgggagcg ttggctggta tcgcaaaaat thtactgg gcgaagaagc gaaaggcaaa 300

ES 2 681 692 T3

cgcatctcgca ttgattttga tggcgtctat atgaatgcaa cagtctatgt gaatggcaaa	360
gaagttggca cacatccgta tggctataca ccgtttagct ttgatatac agattatac	420
agctatgata aagaaaacac aattgcggtc aaagtcgatc atcaaacacc gtcacatcaaga	480
tggatattcag gcagcggcat ttatagatca gtcaacctga caacaacaaa tgatgtccat	540
gtcgatctga atggcattaa agtcgaaagc aacaacctgg aaaaagaagc aggcaaaaca	600
gtcaacacag atgtgaaaac aacagttgtg aacggctcaa aagaagcgaa aaacatcaca	660
attacacata cagtctttaa aaaagggcga aaaccggata aagcgatcgg cacatttaca	720
acagaagcgc aagaaattgg cgcaggcaaa aaaacagaaa tcagcgcac agtcccgggt	780
aaaaatccgg aactgtggtc agttgaaaat ccggcactgt atacaattcg cacagaagtt	840
aaagcaggcg ataaactgct ggatagctat gatacagaat atggctttca ttatctgaac	900
tttgatacag aaacaggctt tcagctgaat ggcaaaaacg ttaaactgaa aggcgtttgc	960
atgcatcatg atcaagcgc acttggcgca gttgcaaata gaagagcaat tgaacgcaa	1020
gtcgaattc tgcaagaaat gggctgcaat agcattagag tcacacataa tccggcaagc	1080
aaagatctga ttgaagtctg caacgaaaaa ggcattctgg tcattgaaga agtttttgac	1140
ggctggcata gagcaaaaaa tggcaacagc aacgattata gcgtctgggt tgaaaaagcg	1200
atcgaagaag ataacgcgat tctgggaaaa gaagcggata tgacttgggc agaatatgat	1260
ctgaaagcga ttatgaaacg cgatcaaaat gcaccgagca ttattgaatg gtcactgggc	1320
aatgaaattc aagaaggcgc aggcggatca ggctatgcag aaagagcggg taaactgatc	1380
aatgggcca aagaagcaga cgcaacaaaa aactgacaa ttggcagcaa tgcagttaaa	1440
agaggcgatt gggaacaagt tagcatcggc gataaactta caaaagcagg cggaacatca	1500
ggcacaatt attcagatgg cgcacatata gataaattc ataaagaaca tccggattgg	1560
aaactgtatg gtcagaaac agcatcatca gttaatagc gtggcattta ttcagttaca	1620
ggcaatcaag aagcaacaag cgatcaacaa ctgacagcgt atgataatag cagagttaat	1680
tggggagcac tggcatcaca agcatggtat gatgttatcc agagagattt tgtcgcaggc	1740
gaatatgttt ggacaggctt tgattatata ggcgaaccga caccgtggaa tggcacagat	1800
ccgggagcaa aaggcacatg gccgtcaccg aaaaacagct actttggcat tatcgataca	1860
gcaggctttc cgaaagattc atattatattt tatcagagcc agtggaatga agaagtcaat	1920
aactgcacg ttcttccggc atggaatgaa gatgtcgtca aaaaaaactc agatggcaca	1980
gttccggttg ttgtttattc agatgcgaaa gaagtcgaac tgttttttac accggcaaat	2040
ggcggagaaa aaaaaagcct gggaaaaaaa acatttaaaa cagaaacaac aaaagctggc	2100

ES 2 681 692 T3

tatagctatc aagttctgga aaacggcaaa aaaaaacata aagatctgta tatggaatgg 2160
 caagttccgt atgaagcagg cacacttgaa gcagttgcca aagatgcaaa aggcaacgtc 2220
 attaaagata cagaaggcag aagcgtcggt aaaacaacag gcgaagaagc aaaactgtca 2280
 gcaaaaacgg atcgcaatag cattcaagca gatggcaaag atctgtcata tattacagtc 2340
 gatgtcacag ataaagatgg caatattggt ccggatgcag caaatagagt cacatttgat 2400
 gtccaaggcg caggaaaact ggttggcggt gataatggct catcaccgga tcatgatagc 2460
 tataaagcgg ataaccgcaa agcattttca ggcaaagttc tggcaattgt tcagtcaaca 2520
 gaaaaagcag gcgaaattac agttacagca aaagcagatg gcctggaatc aagcacagtc 2580
 aaaatcacia caacaccggt taaagaagaa ccgagcgaaa gatatgtcga aagctataaa 2640
 tacagcaaaa gctattatgt gaaaacaggc acaaaaccgc aactgccgaa aaaaattgaa 2700
 gcgcagtata gcgatcgac aaaagaggat gttgcggtca aatgggatga aatctcagat 2760
 gaacaaatta gcaaaacagg cagctttaca gttgaaggca cagttggcaa aagagatatc 2820
 acagtcaaca ttaacatgat cgatgatggt gcagcactgc tgaattattc aggcgcaaca 2880
 caaaaaggcg ttaaacgca acttccggat gttagaccgg cagttctgcc tgatggcaca 2940
 gtctggcag catcatttcc ggttcagtgg gatgaaaaag atgcccgtac atttcagaaa 3000
 ccggatgaaa ttgttacagt taacggcagc gcagatatct ttggcaaac aattccggtt 3060
 acagcaagca ttagagtgca gaaagaagat atcaaaattg gcagcagcgt taaaaatggt 3120
 gcaaaactga gccaaaatat tcaaggcagc gatacactgg aagcaatcaa agatggcaaa 3180
 acagaaatga gcctgaataa tgatggcgga ccgaatgaat cagcatggtc aaattgggat 3240
 gcatcacaga aaggcaciaa agaagccgaa ctgacattta catttgatac acagcaacgc 3300
 attggcgaaa ttgtcattca ttttgcgaaa gataacaact caatcagatt tccggatgct 3360
 ggcaacaacag aaatc 3375

<210> 17
 <211> 3450
 <212> ADN
 <213> *Ruminococcus lactaris*

5

<400> 17
 gcaggcgttt cagttccggc actggcacia caagcagtta gaacagaaag ccaaacacia 60
 atgtcatcag atccggaact ggtctatgtg aataactata gcagcacagc acaagaagc 120
 cagaacttta acagcaactg gaaattctac ttcggagatg cgggaaatgc acaaggcgca 180
 acatttgatg atagcaaatg ggaacaagtt tcaactgccgc atgattattc aatcagccaa 240
 gaatatagca aatcaatgga agcagaatca ggctatcttg gcggaggcac aggctggtat 300

ES 2 681 692 T3

cgcaaaaatt ttactctgag cagcgataca caaggcaaaa gagtccgcat tgatthttgat	360
ggcgtctata tgaatgcaac agthttgggtt aatggccatg aagttggcac acatccgtat	420
ggctatacaa gctthtagctt tgatatacaca gattatgtga aatatgatgg cgaaaacaca	480
attgcagtca aagtcgtcaa taatacaccg tcaagcagat ggtattcagg ctcaaggcatt	540
tatagagatg tcgatctgac aatcacagat gatgthcatg ttgatctgaa cggcacaaaa	600
gttacaacac cgaacctgga aacagaaaaa ggcagcacag tcaatacaga tgttacagca	660
acagttgcca atgattcaga tgcagcaaaa tcagttgca g ttcgccatac agthttttccg	720
aaagatggca ggcagatca atcaattggc acagtcacaa caaatgcaca atcaattgca	780
gcaggcgcaa cagcagaaat tcaagcaacg gttccggttt caaatcctga actgtgggtca	840
gttgaaaatc cgtcactgta tacagtcaga acagaagttc tggtcgacgg ccaagtcaca	900
gatacatatg atacagaata tggctthtgc tathtttaact ttgatagcaa cacaggctth	960
tcaactgaatg gcgaaaatat gaaactgaaa ggcgtctgca tgcatactga tcaaggctca	1020
cttggcgca g cagcatacga ctcaagcaatt gatcgccagg tcaaaatcct gaaagaaatg	1080
ggctgcaata gcattagagt cacacataat ccggcagcac aagatctgat tgatgcgtgc	1140
aatgaacaag gcattctggt tghtgaagaa gcgthttgata cttggacaag accgaaaaat	1200
ggcaacagca acgattatag cgtctggtht aatcagacag ttgcgagcga taatgaaatt	1260
ctgggagcga caaatggcga aacatgggca caathttgatc tggaaagcat gatctcacgc	1320
gattataatg caccgctcagt cattatgtgg tcaactgggca atgaagttat ggaaggcatt	1380
agcggaggca cagatgcaga atatgaagcg acagcgacga aactgattaa ctgggcgtat	1440
gatgcggata atacacgtcc gatgacaatt ggcgataaca aactgaaagc gaactggcag	1500
atctcaaaaa catttgcgag actgctgaca gaaaaaggcg gaacagtggg ctthtaattat	1560
gcagatggca gagthctgga thcatatcat agcagcaata gcaathggct gctgtatggc	1620
tcagaaacag catcagcgat taatagccgt ggcactctatt atagaacaac aggcggaggc	1680
caaacatcag ataaacagct gacaagctat gataattcaa atgthggctg gggagcaaca	1740
gcatcaaatg catggtatac agthctgaca agagathttg cggcaggcga atatgthttg	1800
acaggcttht attatctggg cgaaccgaca ccgtggaatg gcacaggctc aggcgcagtt	1860
ggctcatggc cgtcaccgaa aaathcttat thttggcatta tcgatacagc aggccttcgca	1920
aaagatagct attaththta tcagagccag tggaatgatg atgttacaac actgcatgth	1980
cttccggcat ggaataataa tgtcgtcagc aaagathcat caggcaatgt tccgthttgt	2040
gththttcag atgcggcatc agtcgaaactg thththtcaag caaaaggcag cgatacaaaa	2100

ES 2 681 692 T3

acaagcctgg gcaaaaaaac atttacacag aaaacaacag acgcaggcta tacatatcag	2160
atctatgaag gctcagataa aaacagcaca acagacaaaa acctgtatct gacatggaat	2220
gttccgtatg cagatggaac agtttcagca gttgcgtata atagcaacgg ccagaaaatt	2280
acagatacag ttggccagtc ctcagttaca acaacaggca aagcgtcaaa actgaaagca	2340
tcagcggatc ataaaaaaat tgcagcggat ggcgaatcac tgcatatat cacagtcgat	2400
gtcacagatg cgaatggcaa tattgttccg gatgcagaaa atcgcgtcaa atttacagtt	2460
gaaggcgatg gcgaactggt tggcgttgat aatggctcat caccggatca tgattcatat	2520
caagcggata accgcaaagc attttcaggc aaagttctgg caattgtgaa aagcacaaaa	2580
gaagctggca caattacagt tacagcatca gcagatggcc tggattcagc atcagtcaaa	2640
atcacaaca cagcagtcga taatggcagc acagaaaaac aatcgatag ctttaaaatg	2700
agccgcacat attatgtaa agttggcagc acaccggaac tgccgaaaa aattgtcaca	2760
cgctatacag atggcacatc agaagaactg cctgttactt gggatgcaat tacagaagat	2820
caaattgcag cagcaggtc atttcaagtt aaaggcacag tcaaaggcgg atattcagtt	2880
gcagtcaacg tcaacatgat tgatgaagtt ggcggactgc tgaattattc aacaaataca	2940
gcagttggcg ttgcaccggt tctgccgaca tcaagaccgg cagttctgca agatggcaca	3000
gttatggatg ttacatttcc ggtcacatgg gaagataaag cagcaagcgc atatgataaa	3060
gcaggcacag tgacagtcaa tggcacagca aatgttctgg gcaaagaaat tgcagttaca	3120
gcgagcgтта gagttcagga agaaacaatc acaattggag attcagtttc agcggatgca	3180
ctgaatctga caciaagcgt tccggcagat aaacaaagcg atacactgaa cgcaattaa	3240
gatggctcaa caacaattag ctcaaataca agcggaggcg caaatccgac agtttggagc	3300
aactatgact atagccagga tggcaatacg acagcggata tcatttttga atatgcgaca	3360
gaacaaagac tgggccaat cgttacacat tttgcgagag atagctggtc aatgagatat	3420
cctgatgcag gcgctacaga aatttatgtc	3450

REIVINDICACIONES

- 5 1. Un polipéptido aislado que tiene actividad transgalactosilante y que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 80% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 1, cuyo polipéptido tiene una longitud entre 900 y 1180 aminoácidos.
2. El polipéptido según la reivindicación 1 que tiene una relación entre actividad transgalactosilante y actividad β -galactosidasa de al menos 1, al menos 2,5, al menos 3, al menos 4, al menos 5, al menos 6, al menos 7, al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11, o al menos 12.
- 10 3. El polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en donde la secuencia de aminoácidos tiene al menos 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, o 99%, de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos madura de SEQ ID NO: 1.
4. El polipéptido según las reivindicaciones 1-3 que contiene el dominio catalítico de glicosil hidrolasa clase 2 (GH2), que preferiblemente contiene uno o más dominios Pfam seleccionados de: Glyco_hydro2N (PF02837), Glyco_hydro (PF00703), Glyco_hydro 2C (PF02836) y dominio similar a Ig bacteriana (grupo 4) (PF07532).
- 15 5. El polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-4 que comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1.
6. El polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5 que es un fragmento del polipéptido maduro de SEQ ID NO: 12.
- 20 7. El polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, que se obtiene a partir de *Ruminococcus hansenii* o *Ruminococcus lactaris*.
8. Un ácido nucleico que codifica un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7.
9. Un vector de expresión que comprende un ácido nucleico según la reivindicación 8 y que expresa un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7.
10. Una célula que expresa un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7.
- 25 11. Un método para expresar un polipéptido, comprendiendo el método utilizar una célula según la reivindicación 10 y expresar el polipéptido en la célula, y opcionalmente purificar el polipéptido.
12. Una composición que comprende un polipéptido según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, preferiblemente una composición alimentaria, más preferiblemente un producto lácteo.
- 30 13. Un método para producir un producto alimentario tratando un sustrato tal como un sustrato a base de leche que comprende lactosa con un polipéptido como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, y opcionalmente tratando además el sustrato con una beta-galactosidasa hidrolizante.

Fig. 1

Fig. 2

Figura 3

Figura 4