19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 699 652**

51 Int. Cl.:

C12N 7/00 (2006.01)

C12N 15/70 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **06.07.2012 PCT/EP2012/063244**

87 Fecha y número de publicación internacional: **10.01.2013 WO13004817**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **06.07.2012 E 12732669 (2)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **12.09.2018 EP 2729563**

54 Título: **Fago genéticamente modificado y uso del mismo**

30 Prioridad:

07.07.2011 EP 11173033
07.07.2011 US 201113178402

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
12.02.2019

73 Titular/es:

DELPHI GENETICS (100.0%)
Rue A. de Saint-Exupéry 5
6041 Gosselies, BE

72 Inventor/es:

SZPIRER, CÉDRIC

74 Agente/Representante:

SÁEZ MAESO, Ana

ES 2 699 652 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Fago genéticamente modificado y uso del mismo

5 Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de producción de biomoléculas de interés en sistemas biológicos. Específicamente, la presente invención se refiere a un fago genéticamente modificado integrado en el genoma de una célula anfitriona bacteriana, y uso del mismo con el fin de evitar la contaminación de fago del caldo de cultivo y/o lisis bacteriana.

Antecedente de la invención

Las células bacterianas son sistemas de elección para la producción de biomoléculas, especialmente de proteínas objetivo. Entre otras ventajas, los sistemas bacterianos son fáciles de utilizar y permiten la producción rápida de grandes cantidades de proteínas en un volumen limitado de cultivo.

Uno de los sistemas bacterianos utilizado amplia y habitualmente es el sistema de expresión del bacteriófago T7. Este sistema bacteriano fue descrito en el documento US 4,952,496. En este sistema, el gen que codifica la proteína objetivo se coloca bajo el control de un promotor T7 y se transforma en un anfitrión bacteriano, usualmente *E. coli*, que comprende un fago lisógeno DE3 lambda integrado. El fago lisógeno lambda DE3 lleva el gen que codifica la polimerasa de ARN T7 bajo el control de un promotor lacUV5. Cuando se cultiva en un medio que contiene IPTG, se induce la expresión de la polimerasa de ARN T7, y permite la expresión de la proteína objetivo. El documento US 2003/003472 divulga, una cepa de *E. coli*: 5HT71, producida por lisogenización de HB101 con λ DE3.

Debido a la integración del gen de la polimerasa de ARN T7 (gen 1 de T7) dentro de la secuencia del gen Int, el fago DE3 Lambda debe ser defectuoso en su capacidad para ingresar en la fase lítica. Sin embargo, la lisis bacteriana se observa durante algunas producciones de proteínas y en ausencia de cualquier otro fago, lo que sugiere que el fago DE3 puede recuperar sus propiedades líticas. La lisis bacteriana y aún más, la presencia de fagos infecciosos en el caldo de cultivo es altamente problemático porque (i) compromete el uso de proteínas objetivo producidas para algunas aplicaciones, tales como, por ejemplo, aplicaciones farmacéuticas, (ii) el proceso de descontaminación con el fin de eliminar cualquier rastro de fagos requiere el cierre de las líneas de producción y la renovación completa de los lotes de cultivo y (iii) reduce dramáticamente el rendimiento de la proteína recombinante.

Los fagos λ modificados se describieron en la técnica. Sternberg et al., 1979 (*Virology*, 96: 129-142) se refieren a vectores P1- λ híbridos, en los que se elimina el gen int, y que comprenden una supresión del 6% que elimina el ADN entre los genes P y Q lambda. Padukone et al., 1990 (*Biotechnology progress*, 6: 277-282) describen vectores derivados de bacteriófagos λ para la expresión de genes clonados estables, en los que dichos vectores comprenden una inactivación del gen S. Miao et al., 1993 (*Biotechnology progress*, 9: 153-159) describe la infección de células de *E. coli* con un fago lambda (λ CE6), en el que se suprime el gen int y en el que el gen S contiene la mutación de lisis Sam7. Lin et al., 1998 (*Biotechnology and bioengineering*, 57: 529-535) se refieren a un bacteriófago λ que comprende una mutación en el gen Q y al uso del mismo para producir proteínas recombinantes en el sistema de *E. coli*. Dorgai et al., 1998 (*J.Mol. Biol.* 277: 1059-1070) estudian la especificidad de recombinación de la integrasa de fagos lambda y HK022 en secuencias de ácidos nucleicos att y secuencias de proteínas Int. En particular, Dorgai et al., 1998, describen una bacteria lisogénica RW721 que lleva un profago Sam7 λ y se eliminó para att, Int e imm. Christensen et al., 2001 (*Mol. Biotechnology*, 17: 219-224) describen vectores de expresión del bacteriófago λ que comprenden un sistema de expresión derivado del bacteriófago T7 con mutación en el gen Q. El documento US 2002/090678 se refiere a un método para producir biomoléculas, en las que las células bacterianas de la cepa productora están infectadas con un bacteriófago λ que comprende mutación en uno de los genes N, Q y/o R de fase tardía. El documento WO 2006/091483 se refiere a sistemas de vectores de expresión para uso en la expresión de genes exógenos bajo el control del promotor de la polimerasa T7. Dicho vector de expresión comprende genes Q, S, E o R inactivados. Sin embargo, el uso de estos fagos λ modificados todavía se pueden asociar con la lisis de las células anfitrionas y la posterior contaminación del medio.

Se han descrito métodos alternativos para el uso de un fago:

El documento WO03/050240 describe un sistema de expresión para producir una proteína objetivo en una célula anfitriona que comprende un gen que codifica la polimerasa de ARN T7 integrada utilizando recombinación homóloga. Sin embargo, el sistema del documento WO03/050240 es difícil de implementar, debido al tamaño del gen de la polimerasa de ARN T7 y debido al hecho de que la recombinación homóloga no es fácil de hacer en todas las cepas de *E. coli* (como lo mencionaron Phue et al., *Biotechnology and Bioengineering*, 101, 831-836, 2008). En consecuencia, el número de células transformadas que llevan la integración de la polimerasa de ARN T7 permanece muy bajo o no se obtienen estas células. Más aún, utilizando una recombinación homóloga, es necesario utilizar un marcador selectivo para seleccionar las bacterias que contienen la integración del gen de la polimerasa de ARN T7. Este marcador no será utilizable para otra etapa de selección y podría no ser deseado para el uso final de la cepa. Por ejemplo, los marcadores selectivos que se utilizan a menudo son genes de resistencia a los antibióticos, pero se

recomienda evitar estos genes en producciones biofarmacéuticas. Por lo tanto, se requiere una etapa adicional para eliminar el gen de resistencia a los antibióticos de la cepa y no siempre es posible hacerlo.

5 El documento WO2008/139153 describe otro sistema de expresión, en el que la célula anfitriona se transforma con un plásmido que comprende un casete de expresión para la polimerasa de ARN de T7. Sin embargo, debido al uso de un plásmido, las células anfitrionas se deben mantener en condiciones selectivas para asegurarse de que aún comprenden el plásmido. Adicionalmente, los plásmidos se someten con frecuencia a recombinación, lo que altera el sistema de expresión.

10 Por lo tanto, subsiste la necesidad de un método novedoso para producir una biomolécula de interés, en el que, cuando se utiliza un fago, el cultivo no se contamine por fagos infecciosos o se lisan involuntariamente durante el crecimiento o la producción de proteínas.

15 Por lo tanto la presente invención proporciona un fago genéticamente modificado que no recupera sus propiedades líticas durante el cultivo, permitiendo de esta manera la producción de una biomolécula de interés sin contaminación por fagos.

Resumen

20 Un objeto de la invención es una célula anfitriona bacteriana que comprende un fago genéticamente modificado en el que

- se inserta un sistema de expresión, dicho sistema de expresión comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica una proteína, dicha proteína induce adicionalmente la expresión de una biomolécula de interés, y
25 - se suprimen los genes int, S, R, Rz, Xis,

en la que se integra fago genéticamente modificado en el genoma de dicha célula anfitriona bacteriana, y en la que el fago es el fago lambda, el fago 434, el fago phi80, el fago phi81, el fago HK97, o el fago P21.

30 En una realización, el gen Q se inactiva adicionalmente.

En una realización, el promotor comprendido en el sistema de expresión es inducible.

35 En otra realización de la invención, el sistema de expresión es el sistema de expresión T7.

En una realización, dicho fago es uno de los fagos P11 o P13, en el que

- P11 comprende la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Xis y Int, y
40 - P13 comprende la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Q, Xis y Int.

45 En una realización de la invención, la célula anfitriona es una enterobacteria, preferiblemente E. Coli, más preferiblemente BL21.

En otra realización de la invención, la célula anfitriona como se describió en este documento anteriormente comprende adicionalmente la inactivación de por lo menos uno de los genes tonA, galK, araB, araA, lon, ompT, rcsA, hsdR, mrr, endA y recA.

50 En otra realización de la invención, la célula anfitriona como se describió en este documento anteriormente comprende la inserción del gen ccdB.

Otro objeto de la invención es un kit que comprende la célula anfitriona como se describió en este documento anteriormente y un plásmido que comprende el gen ccdA.

55 Otro objeto de la invención es un proceso para preparar una célula anfitriona como se describió en este documento anteriormente, que comprende infectar una célula anfitriona con un fago genéticamente modificado como se describió en este documento anteriormente, y utilizar un fago ayudante para complementación.

60 Otro objeto de la invención es un proceso para producir una biomolécula de interés, que comprende

- cultivar una célula anfitriona que comprende como se describió en este documento, en la que dicha célula anfitriona comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés,
65 - expresar dicha biomolécula de interés.

Descripción detallada

La presente invención se refiere a una célula anfitriona bacteriana que comprende un fago genéticamente modificado, en la que se limita la capacidad del fago para recuperar sus propiedades líticas.

5 El alcance de la presente invención se determina por las reivindicaciones. Las siguientes realizaciones son realizaciones que caen dentro de las restricciones de las reivindicaciones.

10 Los inventores se centraron en la modificación genética de un fago. Sorprendentemente, los inventores mostraron que no era posible suprimir todas las secuencias víricas del fago integrado, ya que la viabilidad de las bacterias infectadas se vio gravemente comprometida en ese caso. En particular, los inventores mostraron que la supresión de un fragmento de ADN que comprende las secuencias de codificación del gen *ral* y el gen *N* conduce a la muerte de la célula anfitriona (véanse los EJEMPLOS). Este resultado fue sorprendente porque no se sabe que los genes *ral* y *N* estén involucrados en el estado lisogénico; el gen *N* solo se describe como esencial para el crecimiento lítico. Por el contrario, en el estado lisogénico, un represor del fago, llamado *C1* o *C2*, bloquea la expresión de *N* y *ral*.

15 De esta manera la presente invención se refiere a una célula anfitriona bacteriana que comprende un fago genéticamente modificado en la que

- 20 - se inserta un sistema de expresión, y
- se suprimen los genes *Int*, *Xis*, *R*, *S*, y *Rz* y opcionalmente en el que se inactiva el gen *Q*.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S*.

25 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *R*.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactiva el gen *Q*.

30 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *Int*.

35 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *Xis*.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S* y *Int*.

40 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S* y *Xis*.

45 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S* y *R*.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S* y *Rz*.

50 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *S* y *Q* se inactivan.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *R* y *Rz*.

55 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *R* y *Int*.

60 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *R* y *Xis*.

De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *R* y *Q*.

65 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes *Q* y *Rz*.

- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q y Int.
- 5 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int y Xis.
- 10 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int y R.
- 15 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Xis y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Xis y R.
- 20 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R y Q.
- 25 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Q y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Q y Int.
- 30 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Q y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Int y Xis.
- 35 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Int y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Xis y Rz.
- 40 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Q y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Xis y Q.
- 45 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Int y Q.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, Int y Rz.
- 50 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, Int y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, Xis y Rz.
- 60 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int, Xis y Rz.
- 65

ES 2 699 652 T3

- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int, Xis y R.
- 5 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, Int, R y Rz.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Xis y Rz.
- 10 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Rz, Xis y Int.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, Rz y S.
- 15 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, Rz y Int.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, S y Int.
- 20 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, Rz y Xis.
- 25 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, S y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, S y Xis.
- 30 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, Rz, S y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, R, Int y Xis.
- 35 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, Rz, Int y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes Q, S, Int y Xis.
- 40 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Rz, Xis y Int.
- 45 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Q, Rz y Xis.
- De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Q, Rz y Int.
- 50 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Q, Xis y Int.
- 55 De acuerdo con la divulgación, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes R, Q, Rz, Xis y Int.
- 60 En una realización, el fago genéticamente modificado comprende un sistema de expresión y se inactivan los genes S, R, Q, Rz, Xis y Int.
- 65 Ejemplos de fagos que se pueden utilizar en la invención incluyen, pero no se limitan a, los fagos lambda (λ), fago similar a lambda y lambdoides. El fago Lambda, también conocido como colifago lambda, es un virus que infecta a *Escherichia coli*. Lambda es un bacteriófago temperado. Los fagos similares a Lambda forman una familia de

bacteriófagos y virus arqueales que se caracterizan por largas colas no contráctiles. Los fagos lambdoides son parientes naturales del fago lambda. La mayoría de ellos crecen en *E. coli*, pero algunos provienen de otras células anfitrionas, tales como, por ejemplo, *Salmonella typhimurium*. Estos fagos pueden tener el mismo orden genético que lambda.

5 Los ejemplos de fagos de tipo lambda y lambdoides que se podrían utilizar en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, colifago 434, phi80, phi81, HK97, P21 y P22.

10 En una realización, el fago es lambda (Fago lambda de enterobacteria, número de acceso NC_001416). La organización del genoma del fago lambda se muestra en la tabla 1 a continuación.

Tabla 1

Inicio	Fin	Nombre	Descripción
191	736	nu1	Proteína de empaque de ADN
711	2636	A	Proteína de empaque de ADN
2633	2839	W	proteína de unión de cabeza y cola
2836	4437	B	componente de cápside
4418	5737	C	componente de cápside
5132	5737	nu3	proteína de ensamble de cápside
5747	6079	D	proteína de estabilización de ADN de cabeza
6135	7160	E	componente de cápside
7202	7600	Fi	Proteína de empaque de ADN
7612	7965	Fii	proteína de unión de cabeza y cola
7977	8555	Z	componente de cola
8552	8947	U	componente de cola
8955	9695	V	componente de cola
9711	10133	G	componente de cola
10115	10549	T	componente de cola
10542	13103	H	componente de cola
13100	13429	M	componente de cola
13429	14127	L	componente de cola
14276	14875	K	componente de cola
14773	15444	I	componente de cola
15505	18903	J	cola: proteína de especificidad del anfitrión
18965	19585	lom	membrana de anfitrión externa
19650	20855	orf-401	Proteína de fibra de cola
20767	20147	orf206b	proteína hipotética
21029	21973	orf-314	Fibra de cola
21973	22557	orf-194	Proteína de ensamble de fibra putativa
23918	22686	ea47	ea47
25399	24509	ea31	ea31
26973	25396	ea59	ea59
28882	27812	int	proteína de integración
29078	28860	xis	Excisionasa
29285	29118	hipotética	proteína hipotética
29655	29374	ea8.5	ea8.5
30395	39847	ea22	ea22
31024	30839	orf61	proteína hipotética
31196	31005	orf63	proteína hipotética
31351	31169	orf60a	proteína hipotética
32028	31348	exo	exonucleasa
32810	32025	bet	bet
33232	32816	gam	proteína Gam de inhibidor de nucleasa de anfitrión
33330	33187	kil	proteína de muerte de anfitrión
33463	33299	clll	proteína antiterminativa
35582	33494	ea10	Proteína de unión a ADN de cadena sencilla putativa
35582	33930	ral	proteína de alivio de restricción
34357	34271	orf28	proteína hipotética
34482	35036	lambdap48	Proteína B de exclusión de superinfección
35582	34560	N	regulador de gen temprano
36259	35825	rexb	proteína de exclusión
37114	36275	rexa	proteína de exclusión
37940	37227	cl	represor
38023	38135	cro	antirrepresor
38360	38653	cII	activador transcripcional

Inicio	Fin	Nombre	Descripción
38686	39585	O	Proteína de replicación de ADN
39582	40283	P	Proteína de replicación de ADN
40280	40570	ren	proteína de exclusión ren
40644	41084	NinB	NinB
41081	41953	NinC	Proteína NinC
41950	42123	NinD	Proteína NinD
42090	42272	NinE	Proteína NinE
42269	42439	NinF	Proteína NinF
42429	43043	NinG	Proteína NinG
43040	43246	NinH	Proteína NinH
43224	43889	NinI	Proteína NinI
43886	44509	Q	regulador de gen tardío
44621	44815	orf-64	proteína hipotética
45186	45509	S	Proteína de lisis celular
45493	45969	R	endolisina
45966	46427	Rz	proteína de lisis celular
46186	46368	Rz1	Proteína Rz1
46752	46459	bor	Precursor de proteína Bor
47575	47042	lambdap78	proteína de envoltura putativa
47738	47944	lambdap79	proteína hipotética

En la presente invención, la posición de los residuos dentro de la secuencia del fago lambda se refiere a NC_001416.

- 5 En otra realización, el fago es lambda DE3 (número de acceso EU078592). El fago Lambda DE3 es un fago lambda D69 modificado, que comprende el gen que codifica la polimerasa de ARN T7 bajo el control de un promotor lacUV5. La lista de los genes llevados por la secuencia de Lambda DE3 y su posición se muestran en la Tabla 2 a continuación.

10

Tabla 2

Inicio	Fin	Nombre	Descripción
341	1423	lacI	represor de operón de lactosa
1546	1995	lacZ	Fragmento de terminal N de beta-galactosidasa
2026	4677	1	Polimerasa de ARN dirigida a ADN T7
5804	5586	xis	excisionasa
6011	5844	hipotética	Proteína hipotética
6381	6100	ea8.5	ea8.5
7121	6573	ea22	ea22
7750	7565	hipotética	Proteína hipotética
7922	7731	hipotética	Proteína hipotética
8077	7895	hipotética	Proteína hipotética
8754	8074	exo	exonucleasa
9536	8751	bet	Bet
9958	9542	gam	proteína Gam de inhibidor de nucleasa de anfitrión
10056	9913	kil	proteína de muerte de anfitrión
10189	10025	cIII	proteína antiterminativa
10630	10262	ea10	proteína de unión a ADN de cadena sencilla putativa
11013	10813	ral	proteína de alivio de restricción
11083	10997	hipotética	Proteína hipotética
11391	11092	N	proteína N de regulación probable (regulador de gen temprano)
12356	11706	C2	Proteína C2 represora
12437	12622	cro	Proteína cro reguladora (Antirrepresor)
12738	13037	cII	proteína antiterminativa
13070	13969	O	Proteína de replicación de ADN
13966	14667	P	Proteína de replicación de ADN
14664	15467	ren	Proteína de exclusión ren
15464	16087	Q	regulador de gen tardío
16199	16393	hipotética	Proteína hipotética
16764	17087	S	proteína de lisis celular
17071	17547	R	proteína de lisis celular
17544	18005	Rz	proteína de lisis celular
18330	18037	Bor	Precursor de proteína Bor
19153	18620	putativa	proteína de envoltura putativa
19316	19522	hipotética	Proteína hipotética

Inicio	Fin	Nombre	Descripción
20270	20815	nu1	Proteína de empaque de ADN
20790	22715	A	Proteína de empaque de ADN
22712	22918	W	proteína de unión de cabeza y cola
22915	24516	B	componente de cápside
24497	25816	C	componente de cápside
25826	26158	D	proteína de estabilización de ADN de cabeza
26214	27239	E	componente de cápside
27281	27679	Fi	Proteína de empaque de ADN
27691	28044	Fii	proteína de unión de cabeza y cola
28056	28634	Z	componente de cola
28631	29026	U	componente de cola
29034	29774	V	componente de cola
29790	30212	G	componente de cola
30194	30628	T	componente de cola
30621	33182	H	componente de cola
33179	33508	M	componente de cola
33508	34206	L	componente de cola
34356	34955	K	componente de cola
34853	35524	I	componente de cola
35585	38983	J	cola: proteína de especificidad del anfitrión
39045	39665	lom	Membrana de anfitrión externa
39730	40935	cola	proteína de fibra de cola
41109	41372	cola	fibra de cola
42175	41237	ea59	ea59

En la presente invención, la posición de los residuos dentro de la secuencia del fago Lambda DE3 se refiere a EU078592.

5 Como se utiliza en este documento, un "sistema de expresión" se refiere a una molécula de ADN lineal o circular compuesta por un fragmento que codifica una secuencia de ácidos nucleicos unida operativamente a un fragmento adicional para la transcripción del sistema.

10 El fragmento adicional incluye un promotor y una secuencia de codón de parada. El sistema de expresión puede contener adicionalmente uno o más orígenes de replicación, uno o más marcadores de selección y una secuencia que codifica un sitio de unión a ribosoma.

15 "Unido operativamente" significa que los fragmentos están dispuestos para funcionar como se supone que funcionan, por ejemplo, una vez que la transcripción comienza en el promotor, pasa a través del fragmento codificado para detener el codón.

"Promotor" en el significado de la presente invención es un elemento de control de la expresión que permite la unión de la polimerasa de ARN y el inicio de la transcripción.

20 En una realización de la invención, la secuencia de ácidos nucleicos está bajo el control de un promotor "fuerte". Un promotor fuerte se caracteriza por una alta afinidad de unión de la secuencia promotora a una polimerasa de ARN, usualmente la polimerasa de ARN correspondiente de origen natural, por una parte, y la tasa de formación de ARNm por esa polimerasa de ARN por otra parte.

25 En una realización preferida, la secuencia de ácidos nucleicos está bajo el control de un "promotor inducible". Un "promotor inducible" es un promotor que puede estar regulado por factores externos, por ejemplo la presencia de una molécula inductora (también denominada "inductor") o la ausencia de una molécula represora, o factores físicos como el aumento o la disminución de la temperatura, la osmolalidad o el valor de pH. Los diferentes promotores y los respectivos principios de inducción fueron revisados por Makrides et al. (Microbiological Reviews, 1996, (60)3: 512-538). Ejemplos de promotores inducibles que se pueden utilizar en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, el promotor tac o trc, el promotor lac o lacUV5 (todos inducibles por lactosa o su análogo IPTG (isopropiltiol-βD-galactosida)), el promotor araBAD estrechamente regulable (PBAD; Guzman et al., 1995, inducible por arabinosa), el promotor trp (inducible por la adición de ácido β-indol acrílico o la inanición del triptófano, reprimible por la adición de triptófano), el promotor lambda pL (λ) (inducción por un aumento de la temperatura), el promotor phoA (inducible por inanición con fosfato), el PprpB (inducción con propionato) u otros promotores adecuados para la expresión de proteínas recombinantes, todos los cuales utilizan polimerasa de ARN de E. coli.

40 Entre los promotores inducibles se encuentran aquellos que muestran un comportamiento de expresión "permeable". Dichos promotores (llamados "promotores permeables") son, en principio, inducibles, pero muestran no obstante también una expresión basal sin ser inducidos externamente. Los promotores inducibles que muestran una expresión permeable en condiciones no inducidas se pueden comportar de manera similar a los promotores

constitutivos (es decir, son activos de manera constante y continua o se pueden activar o potenciar como resultado de ciertas condiciones de cultivo). Los promotores permeables pueden ser particularmente útiles para procesos de cultivo operados continuamente. Ejemplos de promotores permeables son el promotor T7 y el promotor trp.

5 En una realización de la invención, el promotor también puede ser constitutivo, es decir, un promotor que controla la expresión sin la necesidad de inducción por un lado, o la posibilidad de represión por otro lado. Por lo tanto, hay una expresión continua y constante en un cierto nivel. Como ejemplo, el promotor de HCD constitutivo fuerte (Poo et al., Biotechnology Letters, 2002, 24:1185-1189; Jeong et al., Protein expression and purification, 2004, 36:150-156) puede aplicarse para la expresión constitutiva.

10 En una realización, el sistema de expresión comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica una proteína que induce la expresión de la biomolécula de interés. De forma ventajosa, la expresión de la biomolécula de interés se induce en condiciones particulares, tales como, por ejemplo, bajo selección.

15 Ejemplos de dichas secuencias de ácidos nucleicos incluyen, pero no se limitan a, el gen que codifica la polimerasa de ARN T7, gen T7 1. En este caso, la expresión de la polimerasa de ARN T7 induce la expresión de la biomolécula de interés colocada bajo el control de un promotor T7.

20 Preferiblemente, el sistema de expresión es el sistema de expresión T7. El sistema de expresión T7 se describió en el documento US4,952,496, que se incorpora aquí como referencia. El sistema de expresión T7 comprende un fragmento de ADN del fago T7, que contiene la secuencia de codificación completa para la polimerasa de ARN T7 (es decir, el gen 1 de T7). Se eliminó cualquier promotor activo natural del gen 1 de T7 y se insertó un promotor lacUV5 inducible antes de la secuencia de codificación. El promotor lacUV5 se induce mediante la adición de IPTG al medio de cultivo.

25 De acuerdo con otra realización, el sistema de expresión comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés.

30 Con respecto a la biomolécula de interés, no existen limitaciones. Puede ser, en principio, cualquier secuencia de aminoácidos, secuencias de ácidos nucleicos, tales como, por ejemplo, ADN o ARN. Ejemplos de secuencias de aminoácidos incluyen polipéptidos, proteínas o péptidos que se producen en una escala de fabricación, por ejemplo una biomolécula industrial o una biomolécula terapéutica.

35 Ejemplos de biomoléculas que se pueden producir por el método de la invención son, sin limitación, enzimas, proteínas reguladoras, receptores, péptidos, por ejemplo hormonas peptídicas, citoquinas, proteínas de membrana o transporte.

40 Las biomoléculas de interés también pueden ser antígenos utilizados para la vacunación, vacunas, proteínas de unión a antígenos, proteínas inmunoestimulantes, alérgenos, anticuerpos de longitud completa o fragmentos de anticuerpos o derivados. Los derivados de anticuerpos se pueden seleccionar del grupo de anticuerpos de cadena sencilla (scFv), fragmentos Fab, fragmentos Fv, anticuerpos de dominio único (VH o fragmento VL), anticuerpos de dominio como anticuerpos de dominio único de camélidos (VHH, nanocuerpos) u otros formatos de anticuerpos como se describe por ejemplo en Andersen and Reilly (Current Opinion in Biotechnology, 2004, 15: 456-462) o Holliger and Hudson (Nature Biotechnology, 2005 (23) 9: 1126-1136).

45 Las biomoléculas de interés en la presente invención también se pueden ejemplificar por proteínas (antígeno vírico), por ejemplo, proteína de cubierta, proteína del núcleo, proteasa, transcriptasa inversa, integrasa, y así sucesivamente, codificadas en el genoma de un virus patógeno, por ejemplo, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, I-HV, influenza, y así sucesivamente; factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento de células madre (SCF), factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), factor de crecimiento transformante (TGF), factor de crecimiento nervioso (NGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), factor de crecimiento similar a insulina (IGF), y así sucesivamente; citoquinas tales como factor de necrosis tumoral, interferón, interleucina, y así sucesivamente; factores hematopoyéticos tales como eritropoyetina, factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de macrófagos de granulocitos, factor estimulante de colonias de macrófagos, trombopoyetina, y así sucesivamente; hormonas peptídicas tales como la hormona de liberación de hormona luteinizante (LB-RH), hormona liberadora de tiotropina (TRH), insulina, somatostatina, hormona del crecimiento, prolactina, hormona adrenocorticotrópica (ACTH), hormona estimulante de melanocitos (MSH), hormona estimulante de la tiroides (TSH), hormona luteinizante (LU), hormona estimulante de folículo (FSH), vasopresina, oxitoxina, calcitonina, hormona paratiroidea (PTH), glucagón, gastrina, secretina, pancreozimina, colecistoquinina, angiotensina, placenta lacto8en humana, gonototropina coriónica humana (HCG), ceruleina, motilina, y así sucesivamente; péptidos analgésicos tales como encefalina, endorfina, dinorfina, kitorfina, y así sucesivamente; enzimas tales como superóxido dismutasa (SOD), uroquinasa, activador del plasminógeno de tejido (TPA), asparaginasa, calicreína, y así sucesivamente; neurotransmisores peptídicos tales como bombesina, neutrotensina, bradiquinina, sustancia P, péptido amiloide de Alzheimer (AD), SOD1, presenilina 1 y 2, renina, Dsunucleina, amiloide A, amiloide P, activina, anti-HER-2, bombesina, encefalinasa, inhibidores de proteína, enzimas terapéuticas, antitripsina D 1-, inhibidor de

tripsina de mamíferos, inhibidor de tripsina pancreática de mamíferos, calcitonina, factor de hipertrofia cardíaca, cardiotrofinas (tales como cardiotrofina-1), proteínas CD (tales como CD-3, CD-4, CD-8) y CD-19), CFTR, CTNF, DNasa, gonadotropina coriónica humana, péptido asociado a gonadotropina de ratón, citoquinas, transtirretina, amilina, lipoproteínas, linfoquinas, lisozima, una hormona del crecimiento (que incluyen hormona del crecimiento humano), hormona de crecimiento bovino, factor de liberación de hormona del crecimiento, hormona paratiroidea, hormona estimulante de la tiroides, factores de crecimiento, factor de crecimiento neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento de fibroblastos (tales como D FGF y D FGF), factor de crecimiento similar a insulina I y II, des (1-3)-IGF-I (IGF-I de cerebro), proteínas de unión al factor de crecimiento similar a insulina, factor de crecimiento nervioso (tal como NGF-D), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), receptores para hormonas de crecimiento o factores de crecimiento, factor de crecimiento transformante (TGF) (como TGF-D, TGF-D 1, TGF-D2, TGF-D3, TGF-D4 o TGF-D5), factores neurotróficos (tales como neurotrofina-3, -4, -5, o -6), gelsolina, glucagón, calcitreínas, sustancia inhibidora de mulleriana, factores neurotróficos, p53, proteína A o D, prorelaxina, cadena A de relaxina, cadena B de relaxina, factores reumatoides, rodopsina, una albúmina sérica (tal como albúmina de suero humano), inhibina, insulina, cadenas de insulina, cadena A de insulina, cadena D de insulina, receptor de insulina, proinsulina, hormona luteinizante, integrina, interleucinas (IL) (tales como IL-1 a IL-10, IL-12), IL-13), eritropoyetina, trombopoyetina, fibrilina, hormona estimulante del folículo, factores de coagulación (tales como factor VIIIc, factor IX, factor de tejido y factor de von Willebrands), factores anticoagulantes (tales como proteína C, factor natriurético auricular, surfactante pulmonar), un activador del plasminógeno (tales como el activador del plasminógeno de tejido humano o uroquinasa), trombina, factor de necrosis tumoral D o D, deshidrogenasa de cetóácido D, adrenesinas, proteínas morfogenéticas óseas (BMP), colágeno, factores estimulantes de colonias (CSF) (tales como M-CSF, GM-CSF y G-CSF), factor de aceleración de desintegración, receptores de asentamiento, interferones (tales como interferón-alfa, -gamma y -beta), queratina, factores osteoinductivos, PRNP, proteínas reguladoras, superóxido dismutasa, proteínas de membrana de superficie, proteínas de transporte, receptores de células T, antígenos tales como inmunotoxinas gpl20(HIb), péptido natriurético auricular, proteína exocrina de vesícula seminal, D 2-microglobulina, PrP, precalcitonina, ataxina 1, ataxina 2, ataxina 3, ataxina 6, ataxina 7, huntingtina, receptor de andrógenos, proteína de unión a CREB, gpl 20, p300, CREB, API, ras, NFAT, jun, fos, proteína asociada a atrofia palidolusiana dentaorubral, una proteína microbiana (por ejemplo, proteína de unión a maltosa, transportador ABC, glutatión S transferasa, tioredoxina, D-lactamasa), proteína fluorescente verde, proteína fluorescente roja, una enzima tal como el superóxido dismutasa, asparaginasa, arginasa, arginina desaminasa, adenosina desaminasa, ribonucleasa, catalasa, uricasa, bilirrubina oxidasa, tripsina, papaína, fosfatasa alcalina, beta-glucoronidasa, nucleósido de purina fosforilasa o batroxobina, un opioide, por ejemplo endorfinas, encefalinas u opioides no naturales, una hormona o neuropéptido, por ejemplo calcitonina, glucagón, gastrinas, hormona adrenocorticotrópica (ACTH), colecistoquininas, hormona lutenizante, hormona de liberación de gonadotropina, gonadotropina coriónica, factor de liberación de corticotropina, vasopresina, oxitocina, hormonas antidiuréticas, hormona estimulante de la tiroides, hormona de liberación de tirotrópina, relaxina, prolactina, péptido YY, neuropéptido Y, polipéptido pancreático, leptina, CART (transcripción regulada de cocaína y anfetamina), un péptido relacionado con CART, perilipina, melano-cortinas (hormonas estimulantes de melanocitos) tales como MC-4, hormonas concentradas de melanina, péptidos natriuréticos, adrenomedulina, endotelina, secretina, amilina, péptido intestinal vasoactivo (VIP), polipéptido activador de adenilato ciclasa de pituitaria (PACAP), bombesina, péptidos similares a la bombesina, timosina, proteína de unión a heparina, CD4 soluble, factor de liberación hipotalámico y análogos de melanotoninas o funcionales de los mismos. En otra realización de la invención, la proteína objetivo puede ser una enzima de procesamiento tal como proteasas (por ejemplo, enterocinasas, caspasas de tripsina como serina proteasas), lipasa, fosfatasa, glicosil hidrolasas (por ejemplo, manosidasas, xilosidasas, fucosidasas), quinasa, mono o dioxidasa, peroxidasa, transglutaminasa, carboxipeptidasa, amidasa, esterasa y fosfatasa.

Las fuentes preferidas para dichos polipéptidos de mamíferos incluyen fuentes humanas, bovinas, equinas, porcinas, de lupinos y roedores, siendo particularmente preferidas las proteínas humanas.

La biomolécula de interés de la presente invención también abarca variantes de la proteína mencionada anteriormente. Estas variantes abarcan, por ejemplo, una proteína que tiene la misma actividad que la proteína mencionada anteriormente y que comprende una secuencia de aminoácidos con, en la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada, uno o más aminoácidos suprimidos, sustituidos, insertados y/o agregados. Dicha proteína puede ser ejemplificada por una proteína que tiene la misma actividad que la proteína mencionada anteriormente y que comprende una secuencia de aminoácidos con, en la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada anteriormente, uno o más aminoácidos suprimidos, sustituidos, insertados y/o agregados. Se pueden llevar a cabo dos o más tipos diferentes de modificaciones seleccionadas de supresión, sustitución, inserción y adición.

La biomolécula de interés de la presente invención también abarca "péptidos parciales" de la proteína mencionada anteriormente. Un péptido parcial de la proteína se puede ejemplificar mediante un péptido parcial que comprende una secuencia de aminoácidos en la que una porción de la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada se ejecuta ininterrumpidamente, en la que el péptido parcial tiene preferiblemente la misma actividad que dicha proteína. Dicho péptido parcial se puede ejemplificar mediante un polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos que comprende por lo menos 20 y preferiblemente por lo menos 50 de los residuos de aminoácidos en la secuencia de aminoácidos de la proteína mencionada anteriormente. Este polipéptido contiene preferiblemente la

- 5 secuencia de aminoácidos que corresponde a la región que está involucrada con la actividad de la proteína mencionada anteriormente. Adicionalmente, el péptido parcial utilizado en la presente invención también puede ser un péptido parcial dado por una modificación de este polipéptido en el que 1 o una pluralidad de residuos de aminoácidos (por ejemplo, aproximadamente 1 a 20, más preferiblemente aproximadamente 1 a 10, e incluso más preferiblemente, aproximadamente 1 a 5) se suprime de, se sustituye en, se inserta en, y/o se agrega a su secuencia de aminoácidos. El péptido parcial utilizado en la presente invención también se puede utilizar como un antígeno para la producción de anticuerpos.
- 10 En una realización de la invención, la biomolécula de interés se selecciona del grupo que comprende hormona de crecimiento humana, insulina humana, hormona estimulante del foliculo, factor VIII, eritropoyetina, factor estimulante de colonias de granulocitos, alfa-galactosidasa A, alfa-L-iduronidasa, N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa, Dornase alfa, activador del plasminogeno de tejido, glucocerebrosidasa, interferón, factor de crecimiento similar a insulina 1, somatotropina bovina, somatotropina porcina, quimiosina bovina y proteína de envoltura del virus de la hepatitis B.
- 15 La biomolécula de interés también abarca polipéptidos modificados o proteínas que se han sometido a modificaciones postraduccionales y posteriores a la exportación en el periplasma, tal como ciclación, glicosilación, fosforilación, metilación, oxidación, deshidratación y división proteolítica.
- 20 En una realización, la biomolécula de interés es una enzima para metabolizar una biomolécula en el medio extracelular (denominada en este documento "biomolécula extracelular"). En una realización, la biomolécula extracelular comprende un polisacárido o un lípido. En una realización de la invención, el polisacárido comprende alginato, pectina, celulosa, celobiosa, laminarina o una mezcla de los mismos. En una realización de la invención, el lípido comprende un ácido graso, un glicolípido, un lípido betaína, un glicerolípido, un fosfolípido, un glicerolfosfolípido, un esfingolípido, un lípido de esterol, un lípido de prenol, un sacarolípido, un policetido o una mezcla de los mismos. En una realización de la invención, la biomolécula de interés es una enzima que convierte el polisacárido en un monosacárido, un oligosacárido, o ambos.
- 25 En una realización de la invención, la biomolécula de interés es una enzima que convierte el lípido en un ácido graso, un monosacárido, o ambos. En una realización de la invención, el monosacárido u oligosacárido es oligoalginato, manuronato, guluronato, manitol, a-ceto-ácido, 4-desoxi-L-eritro-hexoselulosa uronato (DEHU), 2-ceto-3-desoxi D-gluconato (KDG), glucosa, glucuronato, galacturonato, galactosa, xilosa, arabinosa o manosa. En una realización de la invención, el ácido graso es 14:0, trans-14, 16:0, 16:1n-7, trans-16, 16:2n-6, 18:0, 18:1n-9, 18:2n-6, 18:3n-6, 18:3n-3, 18:4n-3, 20:0, 20:2n-6, 20:3n-6, 20:4n-3, 20:4n-6, o 20:5n-3.
- 30 En una realización de la invención, la biomolécula de interés es una enzima que convierte la biomolécula extracelular en un producto químico básico. En una realización de la invención, el producto químico básico es etanol, butanol o biodiesel. En una realización de la invención, el biodiesel es un ácido graso, un éster de ácido graso o un terpenoide.
- 35 Como se utiliza en el presente documento, el término "inactivado" se refiere a la interrupción o la supresión de la expresión de un gen a niveles transcripcionales o de traducción. Preferiblemente, el término "inactivado" se refiere a un gen cuya transcripción se suprime.
- 40 De acuerdo con la invención, la inactivación de un gen puede deberse a la mutación del gen o a la inserción del sistema de expresión dentro de la secuencia de codificación del gen. En el significado de la presente invención, el término "mutación" se refiere a un cambio estable en la secuencia genética. Ejemplos de mutación que podrían conducir a la inactivación de un gen en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, mutaciones puntuales, inserciones, supresiones y amplificación o duplicación de genes.
- 45 Preferiblemente, la mutación es una supresión. El término "supresión" como se utiliza en este documento significa la pérdida o ausencia de un gen, preferiblemente la pérdida o ausencia total de un gen. Más preferiblemente, la supresión comienza en o antes del codón de inicio del gen suprimido, y termina en o después del codón de parada del gen suprimido.
- 50 En una realización de la invención, se inactiva 1 gen S. El gen S codifica una proteína holina (S105) y una proteína anti-holina (S107). La proteína holina desencadena la formación de agujeros en la membrana. Se requiere la holina para liberación de la endolisina codificada por el gen R. En el lado opuesto, la proteína antiholina inhibe la formación de huecos S105. De acuerdo con una realización, el gen S tiene la secuencia SEQ ID NO: 1. En otra realización, la secuencia del gen S presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 1.
- 55 El gen S puede contener modificaciones de secuencia conservadoras que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan ni alteran significativamente la función de la proteína S. Dichas modificaciones conservadoras incluyen sustituciones, adiciones y supresiones de aminoácidos. Se pueden introducir modificaciones
- 60
- 65

en la secuencia del gen S mediante técnicas estándar conocidas en el arte, tales como la mutagénesis dirigida al sitio y la mutagénesis mediada por PCR. Las sustituciones conservadoras de aminoácidos son normalmente aquellas en las que un residuo de aminoácido se reemplaza con un residuo de aminoácido que tiene una cadena lateral con propiedades fisicoquímicas similares. La secuencia modificada de la proteína S puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. Cuando se hacen las sustituciones, las sustituciones preferidas serán modificaciones conservadoras. Las familias de residuos de aminoácidos que tienen cadenas laterales similares se han definido en la técnica. Estas familias incluyen aminoácidos con cadenas laterales básicas (por ejemplo, lisina, arginina, histidina), cadenas laterales ácidas (por ejemplo, ácido aspártico, ácido glutámico), cadenas laterales polares sin carga (por ejemplo, glicina, asparagina, glutamina, serina, treonina, tirosina, cisteína, triptófano), cadenas laterales no polares (por ejemplo, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, metionina), cadenas laterales beta-ramificadas (por ejemplo, treonina, valina, isoleucina) y cadenas laterales aromáticas (por ejemplo, tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina). Por lo tanto, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína S se pueden reemplazar con otros residuos de aminoácidos de la misma familia de cadenas laterales y la proteína S modificada se puede probar para la función retenida (es decir, las propiedades establecidas aquí) mediante comparación con la proteína S codificada por la secuencia SEQ ID NO: 1.

El término "identidad" o "idéntico", cuando se utiliza en una relación entre las secuencias de dos o más polipéptidos, se refiere al grado de relación de secuencia entre los polipéptidos, según lo determinado por el número de coincidencias entre cadenas de dos o más residuos de aminoácidos. La "identidad" mide el porcentaje de coincidencias idénticas entre la menor de dos o más secuencias con alineaciones de espacios (si las hay) abordadas por un modelo matemático o programa de computadora en particular (es decir, "algoritmos"). La identidad de los polipéptidos relacionados se puede calcular fácilmente mediante métodos conocidos. Dichos métodos incluyen, pero no se limitan a, aquellos descritos en Computational Molecular Biology, Lesk, A. M., ed., Oxford University Press, New York, 1988; Biocomputing: Informatics 5 and Genome Projects, Smith, D. W., ed., Academic Press, New York, 1993; Computer Analysis of Sequence Data, Part 1, Griffin, A. M., and Griffin, H. G., eds., Humana Press, New Jersey, 1994; Sequence Analysis in Molecular Biology, von Heinje, G., Academic Press, 1987; Sequence Analysis Primer, Gribskov, M. and Devereux, J., eds., M. Stockton Press, New York, 1991; and Carillo et al., SIAM J. Applied Math. 48,1073 (1988). Los métodos preferidos para determinar la identidad se diseñan para proporcionar la mayor coincidencia entre las secuencias probadas. Los métodos para determinar la identidad se describen en programas de ordenador disponibles públicamente. Los métodos de programas de ordenador preferidos para determinar la identidad entre dos secuencias incluyen el paquete de programas GCG, que incluye GAP (Devereux et al., Nucl. Acid. Res. 12, 387 (1984); Genetics Computer Group, University de Wisconsin, Madison, Wis.), BLASTP, BLASTN, y FASTA (Altschul et al., J. Mol. Biol. 215, 403-410 (1990)). El programa BLASTX está disponible públicamente en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) y otras fuentes (Manual BLAST, Altschul y otros. NCB/NLM/NIH Bethesda, Md. 20894; Altschul et al., supra). El conocido algoritmo Smith Waterman también se puede utilizar para determinar la identidad.

En otra realización, se inactiva el gen R. La proteína R es una endolisina: esta transglicosilasa degrada la mureina de la pared celular de la célula anfitriona. De acuerdo con una realización, el gen R tiene la secuencia SEQ ID NO: 2. En otra realización, la secuencia del gen R presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 2.

El gen R puede contener modificaciones de secuencia conservadoras como se describió aquí anteriormente que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan ni alteran significativamente la función de la proteína R. La secuencia modificada de la proteína R puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. Por lo tanto, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína R se pueden reemplazar con otros residuos de aminoácidos de la misma familia de cadenas laterales y la proteína R modificada se puede probar para la función retenida (es decir, las propiedades establecidas aquí) mediante comparación con la proteína R codificada por la secuencia SEQ ID NO: 2.

En otra realización, se inactiva el gen Rz. La proteína Rz pertenece a la familia de espanina. Esta proteína puede estar involucrada en la ruptura de la membrana externa de la célula anfitriona durante la fase lítica. De acuerdo con una realización, el gen Rz tiene la secuencia SEQ ID NO: 3. En otra realización, la secuencia del gen Rz presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 3.

El gen Rz puede contener modificaciones de secuencias conservadoras como se describió en este documento anteriormente que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan o alteran significativamente la función de la proteína Rz. La secuencia modificada de la proteína Rz puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. De esta manera, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína Rz se puede reemplazar con otros residuos de aminoácidos desde la misma familia cadena lateral y la proteína Rz modificada se puede probar para función retenida (es decir, las propiedades

establecidas en este documento) mediante comparación con la proteína Rz codificada mediante la secuencia SEQ ID NO: 3.

5 En otra realización, el gen Q se inactiva. La proteína Q es un regulador de gen tardío: la proteína Q es un antiterminador de Síntesis de ARN desde el promotor utilizado para transcripción de la región "tardía" completa de ADN de lambda. De acuerdo con una realización, el gen Q tiene la secuencia SEQ ID NO: 35. En otra realización, la secuencia del gen Q presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 35.

15 El gen Q puede contener modificaciones de secuencias conservadoras como se describió en este documento anteriormente que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan o alteran significativamente la función de la proteína Q. La secuencia modificada de la proteína Q puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. De esta manera, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína Q se puede reemplazar con otros residuos de aminoácidos desde la misma familia cadena lateral y la proteína Q modificada se puede probar para función retenida (es decir, las propiedades establecidas en este documento) mediante comparación con la proteína Q codificada por la secuencia SEQ ID NO: 35.

20 En otra realización, se suprime un fragmento de ácido nucleico que comprende la secuencia de codificación del gen S. De acuerdo con la invención, dicho fragmento de ácido nucleico no comprende las secuencias de codificación del gen ral (SEQ ID NO: 4) y/o del gen N (SEQ ID NO: 5). Por lo tanto, de acuerdo con una realización, cuando no se suprime el fago es lambda, la región entre residuos 33930 y 35582.

25 De acuerdo con otra realización, cuando no se suprime el fago es lambda(DE3), la región entre residuos 10813 y 11391.

30 Preferiblemente, dicho fragmento de ácido nucleico no comprende la secuencia de codificación de N y C2 (SEQ ID NO: 6), así como también las secuencias reguladoras del promotor de C2. Para asegurarse de que las secuencias reguladoras de C2 no se suprimen, el fragmento que se va a suprimir puede estar en el codón de inicio ATG del siguiente gen: el gen Cro.

35 Más preferiblemente, dicho fragmento de ácido nucleico no comprende la secuencia de codificación de ral, N y C2 (SEQ ID NO: 6), así como también las secuencias reguladoras del promotor de C2.

40 El gen C2 codifica una proteína represora, lo cual es importante para mantener el estado lisogénico. Este gen también se llama cl en la secuencia de varios otros fagos lambdaoides. En el fago lambda, la secuencia de codificación de los genes ral, N y cl es desde los residuos 33930 a 38040 o desde los residuos 33930 a 38022. En el fago Lambda DE3, la secuencia de codificación de los genes ral, N, C2 es desde los residuos 10813 a 12436.

45 En una realización, la longitud de dicho fragmento de ácido nucleico suprimido es desde 30 kb hasta 300 b, preferiblemente desde 5 kb hasta 500 b. En otra realización, la longitud de dicho fragmento de ácido nucleico suprimido es 30 kb, 25 kb, 20 kb, 15 kb, 10 kb, 9 kb, 8 kb, 7 kb, 6 kb, 5 kb, 4 kb, 3 kb, 2kb, 1 kb, 750 b, 500b.

De acuerdo con una realización en la que el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 45186, preferiblemente desde 38041 hasta 45186 o desde 38023 hasta 45186 y finaliza en una posición que varía desde la posición 45510 hasta la posición 48502

50 De acuerdo con otra realización en la que el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 16764, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 16764 y finaliza en una posición que varía desde 17088 y 42925.

55 En otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación del gen S y Rs. De acuerdo con una realización, cuando el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 45186, preferiblemente desde 38041 hasta 45186 o desde 38023 hasta 45186, y finaliza en una posición que varía desde la posición 45970 hasta la posición 48502. En otra realización, cuando el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 16764, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 16764, y finaliza en una posición que varía desde 17548 y 42925.

60 En otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación de los genes S, R y Rz. De acuerdo con una realización, cuando el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 45186, preferiblemente desde 38041 hasta 45186 o desde 38023 hasta 45186. De acuerdo con esta realización, el fragmento puede

ES 2 699 652 T3

finalizar en una posición que varía desde la posición 46428 hasta la posición 46458. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico puede finalizar en una posición que varía desde 46428 hasta 48502.

5 De acuerdo con otra realización, cuando el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 16764, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 16764. De acuerdo con esta realización, el fragmento puede finalizar en una posición que varía desde la posición 18006 y 18036. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico puede finalizar en una posición que varía desde la posición 18006 hasta 24496. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico puede finalizar en una posición que varía desde la posición 18006 hasta 42925.

10 De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación del gen R.

15 De acuerdo con una realización, cuando el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 45493, preferiblemente que varía desde la posición 38041 o 38022 hasta la posición 45493. De acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 45970 hasta la posición 48502.

20 De acuerdo con otra realización, cuando el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 17071, preferiblemente que varía desde la posición 12437 hasta la posición 17071. De acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 17548 hasta la posición 24496. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 17548 hasta la posición 42925.

25 De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación de los genes R y Rz.

30 De acuerdo con una realización, cuando el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 45493, preferiblemente que varía desde la posición 38041 o 38022 hasta la posición 45493. De acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 46428 hasta la posición 46458. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 46428 hasta la posición 48502.

35 De acuerdo con otra realización, cuando el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 17071, preferiblemente que varía desde la posición 12437 hasta la posición 17071. De acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 18006 hasta la posición 18330. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 18006 hasta la posición 24496. Incluso de acuerdo con esta realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir puede finalizar en una posición que varía desde 18006 hasta la posición 42925.

40 De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación del gen Q.

45 De acuerdo con una realización en la que el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 43886, preferiblemente desde 38041 hasta 43886 o desde 38023 hasta 43886 y finaliza en una posición que varía desde la posición 44510 hasta la posición 48502.

50 De acuerdo con otra realización en la que el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 15464, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 15464 y finaliza en una posición que varía desde 16088 y 42925.

55 De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación de los genes Q y S.

60 De acuerdo con una realización en la que el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 43886, preferiblemente desde 38041 hasta 43886 o desde 38023 hasta 43886 y finaliza en una posición que varía desde la posición 45510 hasta la posición 48502.

65 De acuerdo con otra realización en la que el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 15464, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 15464 y finaliza en una posición que varía desde 17088 y 42925.

De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación del gen Q, S y Rs.

5 De acuerdo con una realización en la que el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 43886, preferiblemente desde 38041 hasta 43886 o desde 38023 hasta 43886 y finaliza en una posición que varía desde la posición 45970 hasta la posición 48502.

10 De acuerdo con otra realización en la que el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 15464, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 15464 y finaliza en una posición que varía desde 17548 y 42925.

De acuerdo con otra realización, el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende por lo menos la secuencia de codificación de los genes Q, S, R y Rz.

15 De acuerdo con una realización en la que el fago es lambda, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 35582 hasta la posición 43886, preferiblemente desde 38041 hasta 43886 o desde 38023 hasta 43886 y finaliza en una posición que varía desde la posición 46428 hasta la posición 48502.

20 De acuerdo con otra realización en la que el fago es lambda DE3, el fragmento de ácido nucleico suprimido inicia en una posición que varía desde la posición 11392 hasta la posición 15464, preferiblemente desde 12437 hasta la posición 15464 y finaliza en una posición que varía desde 18006 y 42925.

25 En una realización, se inactiva el gen Int. La proteína Int maneja la inserción y la división del genoma de fago en el genoma del anfitrión. De acuerdo con una realización, el gen Int tiene la secuencia SEQ ID NO: 7. En otra realización, la secuencia del gen Int presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 7.

30 El gen Int puede contener modificaciones de secuencias conservadoras como se describió en este documento anteriormente que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan o alteran significativamente la función de la proteína Int. La secuencia modificada de la proteína Int puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. De esta manera, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína Int se puede reemplazar con otros residuos de aminoácidos de la misma familia cadena lateral y la proteína Int modificada se puede probar para función retenida (es decir, las propiedades establecidas en este documento) mediante comparación con la proteína Int codificada por la secuencia SEQ ID NO: 7.

40 En una realización, se inactiva el gen Xis. La proteína Xis es una excisionasa, que está involucrada en el proceso de división del fago lambda ADN fuera del cromosoma anfitrión bacteriano. De acuerdo con una realización, el gen Xis tiene la secuencia SEQ ID NO: 8. En otra realización, la secuencia del gen Xis presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70%, por lo menos 75%, por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 90%, por lo menos 91%, por lo menos 92%, por lo menos 93%, por lo menos 94%, por lo menos 95%, 5 por lo menos 96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, e incluso más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 8.

45 El gen Xis puede contener modificaciones de secuencias conservadoras como se describió en este documento anteriormente que se refieren a modificaciones de aminoácidos que no afectan o alteran significativamente la función de la proteína Xis. La secuencia modificada de la proteína Xis puede comprender una, dos, tres, cuatro o más inserciones, supresiones o sustituciones de aminoácidos. De esta manera, uno o más residuos de aminoácidos dentro de la secuencia de la proteína Xis se puede reemplazar con otros residuos de aminoácidos de la misma familia cadena lateral y la proteína Xis modificada se puede probar para función retenida (es decir, las propiedades establecidas en este documento) mediante comparación con la proteína Xis codificada por la secuencia SEQ ID NO: 8.

50 En una realización, se suprime un fragmento de ácido nucleico que comprende la secuencia de codificación del gen Int. De acuerdo con una realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende los residuos desde la posición 27812 hasta 28882. De acuerdo con otra realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir inicia en una posición que varía desde la posición 1 hasta la posición 27812; y finaliza en una posición que varía desde 28882 hasta 33929.

60 En una realización, se suprime un fragmento de ácido nucleico que comprende la secuencia de codificación del gen Xis.

65 De acuerdo con una realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico suprimido que se va a suprimir comprende los residuos desde la posición 28860 hasta 29078. De acuerdo con otra realización, el fago es lambda y

el fragmento inicia en una posición que varía desde la posición 1 hasta la posición 28860, y finaliza en una posición que varía desde la posición 29078 hasta la posición 33929.

5 De acuerdo con otra realización, el fago es DE3 y el ácido nucleico suprimido comprende los residuos desde la posición 5586 hasta 5804. De acuerdo con otra realización, el fragmento que se va a suprimir inicia en una posición que varía desde la posición 1 hasta la posición 5586, y finaliza en una posición que varía desde la posición 5804 hasta la posición 10812.

10 En una realización, se suprime un fragmento de ácido nucleico que comprende las secuencias de codificación de los genes Xis e Int. De acuerdo con una realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir comprende los residuos desde la posición 27812 hasta 29078. De acuerdo con otra realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico que se va a suprimir inicia en una posición que varía desde la posición 1 hasta la posición 27812; y finaliza en una posición que varía desde 29078 hasta 33929.

15 En una realización de la invención, el fago genéticamente modificado de la invención se inactiva adicionalmente para el gen kil. De acuerdo con una realización, el gen kil tiene la secuencia SEQ ID NO: 36. En otra realización, el gen kil presenta una identidad de secuencia de por lo menos 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, más preferiblemente de por lo menos 99% con la SEQ ID NO: 36. Preferiblemente, se suprime la secuencia de codificación del gen kil. De acuerdo con una realización, el fago es lambda y el fragmento de ácido nucleico
20 suprimido comprende los residuos desde la posición 33187 hasta 33331.

De acuerdo con otra realización, el fago es DE3 y el ácido nucleico suprimido comprende los residuos desde la posición 9913 hasta 10057.

25 De acuerdo con una realización, la secuencia attP no se suprime de la secuencia del fago de la invención. La secuencia attP es la SEQ ID NO: 9. La secuencia attP se ubica desde la posición 27586 y 27817 en la secuencia del fago lambda, y desde la posición 42788 hasta 42925 y desde 1 hasta 94 en el genoma del fago Lambda DE3 (el genoma del fago es circular, de esta manera la secuencia attP es continua).

30 En una realización de la invención, el fago genéticamente modificado comprende la secuencia attP y la secuencia del gen C2. En otra realización, el fago genéticamente modificado consiste de la secuencia attP y la secuencia del gen C2.

35 De acuerdo con una realización preferida, un fago genéticamente modificado de la invención P11 tiene la secuencia SEQ ID NO: 10 y es (DE3) Δ S-C, Δ xis-ea10 (DE3 se refiere al fago lambda DE3 en el que el gen de polimerasa de ARN T7 se ha integrado dentro de la secuencia de gen Int). Dicho fago P11 modificado corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Xis y Int.

40 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P12 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Int y S (un ejemplo de P12 es la secuencia DE3 Δ S, Δ xis-ea10).

45 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P13 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Q, Xis y Int (un ejemplo de P13 es la secuencia DE3 Δ S-C, Δ xis-ea10, Δ Q).

50 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P14 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R y Int (un ejemplo de P14 es la secuencia DE3 Δ R).

De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P15 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Q y Int (un ejemplo de P15 es la secuencia DE3 Δ Q).

55 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P16 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S y Xis (un ejemplo de P16 es la secuencia NC_001416 Δ S, Δ xis-ea10).

60 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P17 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R y Xis (un ejemplo de P17 es la secuencia NC_001416 Δ R, Δ xis-ea10).

65 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P18 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Q y Xis (un ejemplo de P18 es la secuencia NC_001416 Δ xis-ea10, Δ Q).

- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención p19 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz y Int (un ejemplo de P19 es la secuencia DE3 ΔR , ΔRz).
- 5 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P20 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz y Int (un ejemplo de P20 es la secuencia DE3 ΔS , ΔRz).
- 10 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P21 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Rz, Q y Int (un ejemplo de P21 es la secuencia DE3 ΔRz , ΔQ).
- 15 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P22 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Q y Int (un ejemplo de P22 es la secuencia DE3 ΔS , ΔQ).
- 20 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P23 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Q, y Int (un ejemplo de P23 es la secuencia DE3 ΔR , ΔQ).
- 25 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P24 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R y Int (un ejemplo de P24 es la secuencia DE3 ΔS , ΔR).
- 30 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P25 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz y Xis (un ejemplo de P25 es la secuencia NC_001416 ΔR , Δxis -ea10, ΔRz).
- 35 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P26 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz y Xis (un ejemplo de P26 es la secuencia NC_001416 ΔS , Δxis -ea10, ΔRz).
- 40 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P27 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Q, Rz y Xis (un ejemplo de P27 es la secuencia NC_001416 ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).
- 45 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P28 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Q y Xis (un ejemplo de P28 es la secuencia NC_001416 ΔS , Δxis -ea10, ΔQ).
- 50 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P29 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Q y Xis (un ejemplo de P29 es la secuencia NC_001416 ΔR , Δxis -ea10, ΔQ).
- 55 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P30 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, S y Xis (un ejemplo de P30 es la secuencia NC_001416 ΔS , Δxis -ea10, ΔR).
- 60 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P31 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Xis y Int (un ejemplo de P31 es la secuencia DE3 ΔR , Δxis -ea10).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P32 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Xis y Int (un ejemplo de P32 es la secuencia DE3 ΔS , Δxis -ea10).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P33 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Q, Xis y Int (un ejemplo de P33 es la secuencia DE3 Δxis -ea10, ΔQ).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P34 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Xis y Int (un ejemplo de P34 es la secuencia DE3 ΔS , Δxis -ea10, ΔR).

- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P35 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Q, Xis y Int (un ejemplo de P35 es la secuencia DE3 ΔR , Δxis -ea10, ΔQ).
- 5 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P36 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Q, Xis y Int (un ejemplo de P36 es la secuencia DE3 ΔS , Δxis -ea10, ΔQ).
- 10 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P37 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz, Xis y Int (un ejemplo de P37 es la secuencia DE3 ΔR , Δxis -ea10, ΔRz).
- 15 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P38 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz, Xis y Int (un ejemplo de P38 es la secuencia DE3 ΔS , Δxis -ea10, ΔRz).
- 20 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P39 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Rz, Q, Xis y Int (un ejemplo de P39 es la secuencia DE3 ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).
- 25 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P40 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Q y Int (un ejemplo de P40 es la secuencia DE3 ΔS , ΔR , ΔQ).
- 30 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P41 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz y Int (un ejemplo de P41 es la secuencia DE3 ΔS -C).
- 35 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P42 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz, Q y Int (un ejemplo de P42 es la secuencia DE3 ΔR , ΔRz , ΔQ).
- 40 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P43 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz, Q y Int (un ejemplo de P43 es la secuencia DE3 ΔS , ΔRz , ΔQ).
- 45 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P44 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Q y Xis (un ejemplo de P44 es la secuencia NC_001416 ΔS , ΔR , Δxis -ea10, ΔQ).
- 50 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P45 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz y Xis (un ejemplo de P45 es la secuencia NC_001416 ΔS -C, Δxis -ea10).
- 55 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P46 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz, Q y Xis (un ejemplo de P46 es la secuencia NC_001416 ΔR , ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).
- 60 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P47 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz, Q y Xis (un ejemplo de P47 es la secuencia NC_001416 ΔS , ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P48 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Q, Xis y Int (un ejemplo de P48 es la secuencia DE3 ΔS , ΔR , Δxis -ea10, ΔQ).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P49 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, Rz, Q, Xis y Int (un ejemplo de P49 es la secuencia DE3 ΔS , ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).
- De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P50 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes R, Rz, Q, Xis y Int (un ejemplo de P50 es la secuencia DE3 ΔR , ΔRz , Δxis -ea10, ΔQ).

De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P51 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Q, Rz y Int (un ejemplo de P51 es la secuencia DE3 ΔS-C, ΔQ).

5 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P52 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Q y Xis (un ejemplo de P52 es la secuencia NC_001416 ΔS-C, Δxis-ea10, ΔQ).

10 De acuerdo con otra realización, un fago genéticamente modificado de la invención P53 corresponde a la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes Q, Xis y Int (un ejemplo de P53 es la secuencia DE3 Δxis-ea10, ΔQ).

15 La presente invención también se refiere a un proceso para producir el fago modificado de la invención, en la que dicho proceso comprende por lo menos dos etapas de supresión de genes.

En una realización, el proceso de la invención se lleva a cabo con un fago integrado en el genoma de una célula anfitriona.

20 En una realización, la célula anfitriona es un microorganismo, preferiblemente un procarionta, más preferiblemente una bacteria, más preferiblemente una bacteria gram negativa. Ventajosamente, la célula anfitriona es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae de acuerdo con la taxonomía aplicable actual. Si la taxonomía cambiara, el experto en la técnica sabría cómo adaptar los cambios en la taxonomía para deducir las cepas que se podrían utilizar en la presente invención. Ejemplos de bacterias de la familia Enterobacteriaceae incluyen, pero no se limitan a, bacterias pertenecientes a los géneros Escherichia, Enterobacter, Erwinia, Klebsiella, Pantoea, Photorhabdus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Morganella y Yersinia. De acuerdo con una realización preferida, la célula anfitriona pertenece al género Escherichia, y más preferiblemente la célula anfitriona es Escherichia coli (E. coli).

25 Los métodos para eliminar genes de un fago integrado son bien conocidos por los expertos en la técnica. Ejemplos de dichos métodos incluyen, pero no se limitan a, la recombinación homóloga (también llamada recombinación) utilizando los genes codificados Red lambda: exo, bet y gam. También es posible utilizar los genes recE y recT correspondientes del profago Rac. Los genes exo y recE codifican una exonucleasa 5'-3' que produce salientes de 3'. Los genes bet y recT codifican una proteína de emparejamiento o también llamada proteína de hibridación que se une a las salientes 3' y media su hibridación y recombinación homóloga entre dos secuencias de ADN complementarias. El gen gam codifica un inhibidor de la exonucleasa RecBCD de E. coli y, por lo tanto, protege los fragmentos de ADN lineales de interés. El método de recombinación fue bien descrito por varios investigadores, incluidos Datsenko and Wanner (PNAS 97-12, 6640-6645, 2000) y Stewart et al (WO0104288). El principio del método es generar (mediante amplificación por PCR, por ejemplo) un fragmento de ADN que contenga el fragmento a integrar y dos brazos de recombinación. Estos brazos son homólogos a las regiones adyacentes al gen que se va a inactivar. Se utilizarán para apuntar a la inserción del fragmento de interés. Es posible crear este tipo de fragmento de ADN mediante PCR utilizando cebadores que contienen brazos homólogos de 20 a 60 nucleótidos.

30 La presente invención también se refiere a una célula anfitriona que comprende el fago genéticamente modificado de la invención. En una realización preferida, la célula anfitriona de la invención comprende el fago genéticamente modificado integrado en su genoma.

35 En una realización, la célula anfitriona es un microorganismo, preferiblemente un procarionta, más preferiblemente una bacteria, más preferiblemente una bacteria gram negativa. Ventajosamente, la célula anfitriona es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae de acuerdo con la taxonomía aplicable actual. Si la taxonomía cambiara, el experto en la materia sabría cómo adaptar los cambios en la taxonomía para deducir las cepas que se podrían utilizar en la presente invención. Ejemplos de bacterias de la familia Enterobacteriaceae incluyen, pero no se limitan a, bacterias pertenecientes a los géneros Escherichia, Enterobacter, Erwinia, Klebsiella, Pantoea, Photorhabdus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Morganella y Yersinia. De acuerdo con una realización preferida, la célula anfitriona pertenece al género Escherichia, y más preferiblemente la célula anfitriona es Escherichia coli (E. coli). Ejemplos de cepas de E. coli que se podrían utilizar en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, cepas derivadas de E. coli K-12, E. coli B o E. coli W, tales como, por ejemplo, MG1655, W3110, DG1, DG2, Top10, DH10B, DH5alpha, HMS174, BL21, BL21(DE3), HMS174(DE3), BL21(DE3) pLysS, BL21(DE3) pLysE.

40 En una realización, se pueden inactivar los genes de las células anfitrionas.

45 En una realización, se inactiva el gen tonA (también conocido como fhuA, SEQ ID NO: 11). La proteína TonA/FhuA es un receptor para los fagos T1, T5 y Phi80.

50 En una realización, se inactiva el gen galK (SEQ ID NO: 12). La supresión de este gen permite el uso de la selección positiva/negativa de galK para la supresión de los genes mediante un método con base en la recombinación homóloga.

55 En una realización, se inactiva el gen galK (SEQ ID NO: 12). La supresión de este gen permite el uso de la selección positiva/negativa de galK para la supresión de los genes mediante un método con base en la recombinación homóloga.

65

En una realización, se inactiva el gen *araB* (SEQ ID NO: 13). En otra realización, se inactiva el gen *araA* (SEQ ID NO: 14). La inactivación de *araB* y/o *araA* se recomienda para el uso del promotor PBAD (inducible por arabinosa) dentro de la célula anfitriona.

5 En una realización, se inactivan el gen *lon* (SEQ ID NO: 15) y/o el gen *ompT* (SEQ ID NO: 16). La proteína Lon es una proteasa dependiente de ATP. La proteína OmpT es una proteasa de membrana externa. Preferiblemente, se inactivan los genes *lon* y *ompT*.

10 En una realización, se inactiva el gen *rcaA* (SEQ ID NO: 17). La proteína RcsA es un regulador positivo de la síntesis de la cápsula, que se degrada por la proteasa Lon. En una realización, se inactivan el gen *hsdR* (SEQ ID NO: 18) y/o el gen *mrr* (SEQ ID NO: 19). Las proteínas HsdR y Mrr son enzimas de restricción con diferente especificidad. Preferiblemente, los genes *hsdR* y *mrr* ambos son inactivados.

15 En una realización, se inactivan el gen *endA* (SEQ ID NO: 20) y/o el gen *recA* (SEQ ID NO: 21). EndA es una endonucleasa específica a ADN. RecA es una proteína de recombinación con actividad de proteasa y nucleasa. Preferiblemente, se inactivan ambos genes *endA* y *recA*.

20 En una realización de la invención, por lo menos se inactivan uno de los genes *tonA*, *galK*, *araB*, *araA*, *lon*, *ompT*, *rcaA*, *hsdR*, *mrr*, *endA* y *recA*. Preferiblemente, se suprimen inactivados.

En una realización preferida, se inactivan los genes *tonA*, *galK*, *araB*, *lon*, *ompT*, *rcaA*, *hsdR*, *mrr*, *endA* y *recA*. Preferiblemente, se suprimen los genes *tonA*, *galK*, *araB*, *lon*, *ompT*, *rcaA*, *hsdR*, *mrr*, *endA* y *recA*.

25 En una realización de la invención, se transforma la célula anfitriona de la invención con una secuencia de ácidos nucleicos que codifica una molécula tóxica, como se describe en US2004/0115811. La presencia de la secuencia de ácidos nucleicos que codifica la molécula tóxica permitirá la selección de clones recombinantes que tienen integrados un gen de interés y una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de antídoto funcional a una molécula tóxica, en la que dichos clones recombinantes son los que sobreviven luego de su integración en una célula anfitriona que comprende en su genoma una secuencia de nucleótidos que codifica dicha molécula tóxica.

30 De acuerdo con una realización preferida de la presente invención, la proteína antídoto y la molécula tóxica son, respectivamente, una proteína antiveneno y una proteína venenosa. Dichas proteínas antivenenosas o venenosas podrían ser proteínas de tipo silvestre o proteínas modificadas que son natural o artificialmente venenosas y afectan una o más funciones vitales de una célula (preferiblemente, una célula procariota) y pueden conducir a la destrucción de la célula.

35 La proteína antídoto y la molécula tóxica se seleccionan preferiblemente del grupo que consiste en proteínas CcdA/CcdB, proteínas Kis/Kid, proteínas Phd/Doc, proteínas RelB/relE, proteínas PasB (o PasC)/PasA, proteínas *mazF/mazE* como se describe en el documento US2004/0115811, o cualquier otro par de moléculas antivenenosas/venenosas que sean o no de origen plásmido. La molécula tóxica también puede ser una proteína de toxina que es natural o artificialmente tóxica y afecta a una o más funciones vitales de una célula (procariota). La proteína codificada por el gen *sacB* (de *Bacillus amylolique-faciens*), la proteína GpE, la proteína GATA-1 y la proteína Crp son otros ejemplos de dichas moléculas tóxicas. El gen *sacB* codifica la sacarasa de levano que cataliza la hidrólisis de la sacarosa en productos que son tóxicos para *E. coli* (Pierce et al. Proc. Natl Acad. Sci., Vol. 89, N[deg.]6 (1992) p. 2056-2060). La proteína GpE codifica los genes E del bacteriófago [phi] X174 que incluye seis sitios de restricción únicos y codifica gpE y que causa lisis de las células de *E. coli* (Heinrich et al., Gene, Vol. 42 (3) (1986) p. 345- 349). Se ha descrito la proteína GATA-1 por Trudel et al. (Biotechniques 1996, vol. 20 (4), p. 684-693). La proteína Crp ha sido descrita por Schlieper et al. (Anal. Biochem. 1998, Vol. 257 (2), pág. 203-209).

50 Las proteínas antídotos contra dicha molécula tóxica son cualquier proteína capaz de reducir o suprimir el efecto de la molécula tóxica correspondiente sobre una célula (preferiblemente una célula procariota), cuando dicha célula tóxica es producida por dicha célula.

55 De acuerdo con una realización preferida, la célula anfitriona de la invención comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica la proteína CcdB. El gen *ccdB* tiene la secuencia SEQ ID NO: 22.

60 La presente invención también se refiere a un kit que comprende una célula anfitriona como se describió anteriormente, en la que se inserta el gen que codifica una proteína venenosa, y un plásmido que lleva la secuencia de ácidos nucleicos del gen que codifica la proteína antivenenosa. La expresión de la proteína antivenenosa en la célula anfitriona se requiere para mantener la viabilidad de la célula anfitriona. En una realización preferida, la proteína venenosa se codifica por el gen *ccdB*, y la proteína antivenenosa se codifica por el gen *ccdA* (SEQ ID NO: 23).

65 De acuerdo con una realización de la invención, el plásmido del kit adicionalmente puede contener, o se puede modificar para contener adicionalmente, la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés.

La presente invención también se refiere a un proceso para preparar una célula anfitriona como se describió anteriormente.

5 En una realización, el proceso de la invención comprende una etapa de infección de la célula anfitriona por un fago genéticamente modificado de acuerdo con la invención. En una realización de la invención, dicha etapa de infección incluye el uso de un fago ayudante. En el significado de la presente invención, el término "fago auxiliar" se refiere a un fago utilizado para complementar una eliminación o una inactivación de otro fago. El fago auxiliar proporcionará las funciones faltantes a otro fago para poder infectar bacterias o para preparar la reserva de fago. Usualmente, el fago auxiliar no puede formar un lisógeno por sí mismo porque es al menos (no tiene represor y, por lo tanto, es virulento).

10 El proceso para infectar una célula anfitriona con un fago que utiliza un fago auxiliar es bien conocido en la técnica. La primera etapa es la preparación de los lisados y la segunda es la lisogenización. Brevemente, los lisados bacterianos del fago auxiliar se preparan utilizando métodos estándar como se describe en "Molecular cloning: a laboratory manual", Sambrook et al (2001, ISBN 978-087969577-4) o en "Large- and Small-Scale Preparation of Bacteriophage lambda lysate and DNA", Su et al, BioTechniques 25:44-46 (Julio 1998). La preparación del fago de interés se realiza utilizando el mismo principio, después de la inducción del fago (la mayoría de las veces se utiliza radiación UV o cualquier situación en la que un lisógeno sufra daños en el ADN o la respuesta SOS del anfitrión o la producción de Cro) con el fin de iniciar el ciclo lítico y utilizar un fago auxiliar para proporcionar las funciones que faltan. Una alternativa al fago auxiliar es el uso de un plásmido que codifica las funciones faltantes.

15 A continuación, los lisados de fagos se mezclan con las bacterias seleccionadas y se colocan sobre placas LB con el fin de obtener lisógenos (como se describe en el kit de lisogenización DE3 de lambda de Novagen, User Protocol TB031 o se describe un método alternativo en Studier and Moffat, Journal of Molecular Biology, 1986, 189: 113-130). Se puede utilizar un fago de selección para seleccionar específicamente bacterias que contienen el fago de interés. Este fago de selección es un fago virulento que tiene la misma inmunidad que el fago de interés. En consecuencia, el fago de selección no puede formar placas o matar bacterias lisógenas para el fago de interés porque este fago produce el represor λ (también llamado C2 en el fago lambda DE3).

20 La presente invención también se refiere, por lo tanto, a un kit que comprende el fago modificado de la invención, como se describió anteriormente, y un fago auxiliar. Ejemplos de fagos auxiliares incluyen, pero no se limitan a, el fago auxiliar B10 o cualquier otro fago lambdaoide con una inmunidad diferente a la del fago de interés (ejemplo: fago con inmunidad 434, 80,...). Algunos fagos auxiliares y sus manipulaciones fueron bien descritos en la literatura, incluyendo en Haldimann and Wanner (Journal of Bacteriology, 183, 6384-6393, 2001).

25 En una realización, el proceso para preparar una célula anfitriona de la invención comprende adicionalmente una etapa de supresión, en la que se suprimen las secuencias de ácido nucleico de la célula anfitriona. Los métodos para suprimir la secuencia de un gen son bien conocidos por los expertos en la técnica. El método más eficiente es el método de recombinación homóloga mediado por los genes codificados en Red lambda o los genes recE y recT del profago Rac. Como se describió anteriormente, este método fue bien descrito por varios investigadores, incluidos Datsenko and Wanner (PNAS 97-12, 6640-6645, 2000) y Stewart et al (WO0104288). Los productos de PCR se generan utilizando cebadores con extensiones de 20 a 60 nt que son homólogas a las regiones adyacentes al gen que se va a inactivar. Dado que solo una pequeña cantidad de bacterias recombinará efectivamente el fragmento de interés, es necesario tener un marcador de selección fuerte para seleccionarlo. Se pueden utilizar marcadores de antibióticos para seleccionar los recombinantes: los cebadores modificados se utilizan para amplificar un gen de resistencia a antibióticos. Después de la transformación y activación de los genes de recombinación, las bacterias recombinantes se seleccionan en un medio que contiene el antibiótico apropiado. En este caso, el gen objetivo se reemplaza por un gen de resistencia a antibióticos. Con el fin de utilizar la misma estrategia para la próxima supresión, es necesario eliminar este gen de resistencia a los antibióticos durante una segunda etapa. Como se describe en Datsenko and Wanner, es posible utilizar un gen de resistencia a antibióticos que se flanquea por sitios FRT (objeto de reconocimiento de FLP). Los genes de resistencia se eliminan al utilizar un plásmido auxiliar que codifica la recombinasa FLP. El gen de resistencia a los antibióticos se elimina con esta recombinasa específica del sitio, pero este método deja rastros: un sitio de recombinación específico del sitio aún está presente después de la eliminación del gen de resistencia a los antibióticos.

30 Para evitar la presencia de este sitio, más preferiblemente, el método de la invención utiliza galK como un gen marcador. El principio de la selección de galK se describe en Warming et al. (Nucleic acid research, 2005, 33(4)). Este método utiliza galK como marcador de selección positiva (crecimiento sobre medio mínimo que contiene galactosa) durante la primera recombinación (inserción). La eliminación de este marcador se realiza durante una segunda etapa de recombinación homóloga. Durante esta etapa, galK se utiliza como marcador de selección negativa en medio mínimo que contiene 2-desoxi-galactosa (DOG). El producto del gen galK, la galactoquinasa, cataliza la primera etapa en la ruta de degradación de la galactosa. La galactoquinasa también cataliza eficientemente la fosforilación del análogo de galactosa DOG. El producto de esta reacción no se puede metabolizar adicionalmente, lo que lleva a la acumulación de una molécula tóxica (2-desoxi-galactosa-1-fosfato). La ventaja de este método es evitar la presencia de un sitio de recombinación específico después de la supresión del gen objetivo y la eliminación del marcador selectivo.

La presente invención también se refiere a un proceso para producir una biomolécula de interés, que comprende

- 5 - cultivar una célula anfitriona que comprende el fago genéticamente modificado de acuerdo con la invención y la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés,
- recuperar la biomolécula de interés.

10 En una realización de la invención, la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés está comprendida dentro del sistema de expresión del fago genéticamente modificado. De acuerdo con esta realización, la producción de la biomolécula de interés es directa, es decir, resulta de la expresión del gen del sistema de expresión, por ejemplo mediante cultivo en un medio en el que se induce el promotor comprendido en el sistema de expresión.

15 En otra realización de la invención, el sistema de expresión del fago genéticamente modificado comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la polimerasa de ARN T7 bajo el control de un promotor lac, preferiblemente el promotor lacUV5. De acuerdo con esta realización, el proceso para producir la biomolécula de interés comprende la transformación de la célula anfitriona con un plásmido que comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés bajo el control de un promotor T7. La expresión del promotor T7 está bajo el control de polimerasa de ARN T7, que es rigurosamente específica para el promotor T7, es decir, el promotor T7 solo puede ser utilizado por la polimerasa de ARN del bacteriófago T7. Cuando se agrega IPTG al medio de cultivo, la polimerasa de ARN de T7 se expresa por transcripción del promotor lac y permite la expresión de la biomolécula de interés.

20 En el significado de la presente invención, el término "promotor T7" incluye promotores que están presentes en el genoma del bacteriófago T7, así como secuencias de consenso y variantes de dichos promotores con la capacidad de mediar la transcripción por la polimerasa de ARN T7. El bacteriófago T7 contiene diecisiete secuencias promotoras diferentes, todas las cuales comprenden una secuencia de nucleótidos altamente conservada.

25 De acuerdo con una realización preferida, el plásmido que comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés también comprende la secuencia de ácidos nucleicos de ccdA, y la célula anfitriona comprende la secuencia de ccdB integrada en su genoma. Por lo tanto, solo se propagan clones recombinantes que contienen el plásmido.

30 De acuerdo con una realización, se secreta la biomolécula de interés por la célula anfitriona en el caldo de fermentación. De acuerdo con esta realización, la biomolécula de interés se puede recuperar fácilmente del caldo de fermentación.

35 De acuerdo con otra realización, la biomolécula de interés no es secretada por la célula anfitriona en el caldo de fermentación. Los métodos para recuperar una biomolécula intracelular de interés son bien conocidos en la técnica. Ejemplos de dicho método incluyen, pero no se limitan a, el uso de ácido tricloroacético (TCA) o tampón de craqueo que contiene dodecilsulfato de sodio (SDS) con el fin de recuperar proteínas citoplásmicas totales en condiciones de desnaturalización o el uso de sonicación, prensa francesa o equivalente para interrumpir bacterias bajo presión para recuperar proteínas citoplásmicas totales en condiciones nativas (no desnaturalizantes). A continuación, la proteína de interés se puede purificar utilizando métodos específicos que incluyen, pero no se limitan a, el uso de columnas de afinidad o de intercambio iónico.

40 Breve descripción de los dibujos

45 Figura 1: Imagen de un gel SDS-Page coloreado con tinción con azul de Coomassie, que muestra la producción de la proteína de interés. 1 y 6: tamaño; 2: sedimento [pScherry] M11DE3 antes de inducción; 3: sedimento [pScherry] M11DE3 después de inducción; 4: sedimento [pScherry] HMS174DE3 antes de inducción; 5: sedimento [pScherry] HMS174DE3 después de inducción. La matriz es para identificar la proteína de interés.

Ejemplos

50 La presente invención se ilustra adicionalmente mediante los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: Depresión de los genes xis, exo, bet, gam, kit, cIII, N y ral

55 a) Supresión de la región del ADN de xis y reemplazo por galk

60 Primero, el gen galk se amplificó mediante reacción en cadena de polimerasa (PCR) sobre el plásmido pGalk utilizando los cebadores de inicio (5' GGGGGTAAATCCCGCGCTCATGACTTCGCCTTCTTCCCAGAATTCCTGTTGAC AATTA 3', SEQ ID NO: 24) y de parada Xisgalk (5' GTTCTGATTATTGGAAATCTTCTTTGCCCTCCAGTGTGAGCAGCACTGTCCTGCTCCTTG 3', SEQ ID NO: 25). Estos cebadores contienen en el extremo 5' una secuencia de 40 bases idéntica al objetivo de ADN (en cursiva). Estas secuencias de 40 bases son los brazos de recombinación. Los extremos 3' se diseñaron

para amplificar el gen *galk* y su promotor constitutivo. El fragmento de ADN amplificado por PCR (1315 pb) se dirigió a los genes *xis*, *exo*, *bet*, *gam*, *kil* y *cIII* (fragmento de ADN de 5133 pb): estos genes se reemplazaron durante la recombinación homóloga por el gen *galk* y su promotor. Las bacterias electrocompetentes que llevan el profago T7 (DE3) y el plásmido pKD46 se prepararon de acuerdo con Datsenko y Wanner (PNAS 97-12, 6640-6645, 2000). A continuación, el fragmento *galk* amplificado se electroporó en estas bacterias de acuerdo con los procedimientos estándar (se utilizaron 200 ng de fragmento de ADN para cada electroporación). Se agregó medio SOC y se incubaron bacterias durante 1 hora a 37°C. A continuación, las bacterias se lavaron (se centrifugaron, se retiraron los medios, se agregaron medios frescos y se volvieron a suspender) dos veces con medio mínimo M9 (Sambrook et al (2001, ISBN 978-087969577-4)) y se colocaron en placas bacterianas que contenían medio M9 mínimo y galactosa al 1%. Las placas se incubaron a 37°C durante 1 o 2 días.

La siguiente etapa fue el cribado bacteriano: el cribado por PCR se realizó directamente sobre colonias utilizando los cebadores *Xis1* (5'GTCTTCAAGTGGAGCATCAG3', SEQ ID NO: 26) y *Xis4* (5'ACCAGGACTATCCGTATGAC3', SEQ ID NO: 27). Una amplificación de un fragmento de ADN de 5774 pb corresponde a un cromosoma no modificado (colonia no recombinante) y, por el contrario, una amplificación de un fragmento de ADN de 1955 pb corresponde a un cromosoma recombinante. Las bacterias que permitían la amplificación del fragmento de ADN de 1955 pb se seleccionaron y se sembraron dos veces en placas selectivas (medio M9 mínimo suplementado con 1% de galactosa) para purificarlo y eliminar posibles copias no modificadas del cromosoma. El cribado por PCR se realizó una vez más al final de la etapa de purificación y se seleccionaron 3 bacterias que permiten la amplificación del fragmento de ADN de 1955 pb. Los fragmentos de ADN amplificados correspondientes a estas bacterias se secuenciaron utilizando los mismos cebadores con el fin de confirmar la recombinación del ADN y la supresión de la región del ADN *Xis* (genes *xis*, *exo*, *bet*, *gam*, *kil* y *cIII*).

b) Eliminación de *Galk*

Un fragmento de ADN que contiene grandes brazos de recombinación (de 350 pb y 343 pb) se construyó mediante PCR para eliminar los genes *galk* y *N* y *ral*. El primer brazo se amplificó por PCR sobre colonias bacterianas que contenían el profago T7 (DE3) utilizando los cebadores *Xis1* y *Xis2* (5'CCAAACGGAACAGATGAAGAAGGCGAAGTCATGAG3', SEQ ID NO: 28). Se amplificó un fragmento de ADN de 365 bases. El segundo brazo también se realizó por PCR sobre la misma bacteria utilizando los cebadores *Xis3* (5'GACTTCGCCTTCTTCATCTGTTCCGTTTGGCTTCC3', SEQ ID NO: 29) y *Xis6* (5'GTAATGGAAAGCTGGTAGTCG3', SEQ ID NO: 30). Se amplificó un ADN de fragmento de 358 bases. Ambos brazos de recombinación se purificaron después de la electroforesis en gel de agarosa. Los cebadores *Xis2* y *Xis3* fueron diseñados para generar fragmentos de ADN que contienen una secuencia idéntica de 30 pares de bases. Esta secuencia se utilizó para unir ambos brazos de recombinación en una tercera PCR utilizando los cebadores *Xis1* y *Xis6*. Se generó un fragmento de ADN de 693 pb. Este fragmento de ADN se electroporó en bacterias seleccionadas anteriormente y que llevan el plásmido pKD46 (preparado como se describe en Datsenko and Wanner). Se agregó medio SOC y se incubaron bacterias a 37°C durante 1 hora. A continuación, las bacterias se lavaron dos veces con medio M9 y se colocaron en placas selectivas que contenían medio M9 suplementado con glicerol al 0.2% y DOG al 1%. Las placas se incubaron durante 2 días a 37°C. Se cribaron varias colonias por PCR utilizando los cebadores *Xis5* (5'CAGCCGTAAGTCTTGATCTC3', SEQ ID NO: 31) y *Xis7* (5'CAGCAGGCATGATCCAAGAG3', SEQ ID NO: 32). Siempre se obtuvo una amplificación de 3246 pb correspondiente al cromosoma de ADN no modificado en lugar de una amplificación de 1122 pb correspondiente al cromosoma modificado. El experimento se reprodujo completamente e independientemente tres veces sin éxito: no se obtuvo ninguna bacteria que comprenda la supresión deseada.

En consecuencia, decidimos eliminar solo el fragmento *Galk* y dejar los genes *N* y *ral*. El fragmento de ADN que contiene los brazos de recombinación se generó como se describió anteriormente utilizando *Xis1*, *Xis2b* (5'TTTGCCCTCCAGTGTGAAGAAGGCGAAGTCATGAG3', SEQ ID NO: 33) para el primer brazo de recombinación (365bp) y *Xis8* (5'CTCATGACTTCGCCTTCTTACACTGGAGGGCAAAGAAG, SEQ ID NO: 34) y *Xis4* para el segundo brazo de recombinación. La PCR de unión se realizó utilizando cebadores *Xis1* y *Xis4* y generó un fragmento de ADN de 714 pb. Este fragmento se electroporó como se describió anteriormente en las bacterias seleccionadas y que llevan el plásmido pKD46. Las bacterias se colocaron en placas en las mismas placas selectivas que contenían DOG y se incubaron durante dos días a 37°C. El cribado por PCR se realizó utilizando cebadores *Xis5* y *Xis6*. Las bacterias que muestran una amplificación de 1770 pb (en lugar de una amplificación de 3010 pb correspondiente al cromosoma no modificado) se seleccionaron y purificaron. El fragmento de ADN se secuenció utilizando los cebadores *Xis5* y *Xis6* y mostró la eliminación correcta del gen *galk*. Esta recombinación se realizó una sola vez, ya que las bacterias se obtuvieron inmediatamente.

Estos resultados muestran que no fue posible eliminar *galk* asociado a los genes *N* y *ral* mediante recombinación homóloga. Sin embargo, utilizando exactamente el mismo procedimiento, pudimos solo eliminar *galk*.

En conclusión, demostramos que la eliminación de los genes *N* y *ral* conduce a la muerte de bacterias, lo cual fue inesperado.

Ejemplo 2: Expresión de proteínas utilizando MG1655

Con el fin de probar la eficiencia de producción de proteínas de la cepa construida de acuerdo con la invención, se realizaron pruebas de expresión a pequeña escala utilizando bacterias llamadas M11 (DE3). El genotipo de esta cepa es MG1655 Δ galK, Δ rcaA, Δ lon, Δ hsdR-mm, Δ fhuA, Δ endA, Δ recA, Δ araB, Δ ompT, λ -DES (T7pol, Δ axis-ea10, Δ S-C). Dado que MG1655 es una *Escherichia coli* K-12, se comparó con otra cepa K-12 utilizada como estándar en el campo de la producción de proteínas y llamada HSM174 (DE3) (genotipo: recA1, hsdR, λ -DE3, (Rif R)). Ambas cepas se transformaron con ADN de plásmido pScherry1 (Delphi Genetics, Bélgica). Este plásmido codifica una proteína llamada "cherry" fácilmente detectable (por los ojos, color rojo) bajo el control del promotor T7.

10 Protocolo para una expresión a pequeña escala utilizando IPTG:

1) Se inocularon dos matraces Erlenmeyer que contenían 10 ml de medio LB, cada uno con una colonia única de HMS174 (DE3) y M11 (DE3) que llevaban el plásmido pScherry1 como se incubaron a 30°C durante la noche.

15 2) Dos nuevos matraces que contenían medio fresco se inocularon con 1 ml de los cultivos durante la noche y se incubaron con agitación a 37°C hasta que la OD600 alcanzó 0.6.

3) Se tomó una muestra (1 ml) de cada matraz y se centrifugó. El medio se descartó y el sedimento se mantuvo en hielo. Las muestras fueron los controles no inducidos. Para inducir la expresión de proteínas en el cultivo restante, se agregó IPTG (isopropil β -D-1-tiogalactopiranosido, 90 μ l de una solución madre de 100 mM fresca) para alcanzar una concentración final de 1 mM en ambos matraces. La incubación de ambos matraces se continuó durante 4 horas.

4) Al final del período de inducción, se midió la densidad óptica a 600 nm para cada cultivo (1.09 para M11 (DE3) y 1.13 para HMS174 (DE3)). Una muestra de 1 ml de cada matraz se centrifuga a la velocidad máxima (13000 g) durante 10 minutos a 4°C. Se observó que el sedimento era rojo de acuerdo con la expresión de la proteína Cherry. El sobrenadante se desechó y se agregaron 100 μ l de agua para resuspender las bacterias. También se agregaron 100 μ l de tampón de "craqueo" (DTT 100 mM, SDS al 2%, Tris-HCl 80 mM, pH 6.8, azul de bromofenol al 0.006%, glicerol al 15%) para lisar las bacterias. Las muestras no inducidas se trataron con el mismo protocolo, excepto que solo se utilizaron 60 μ l de agua y 60 μ l de tampón de craqueo (de acuerdo con la densidad óptica de las muestras).

5) Las muestras se calentaron a 70°C-100°C (10 min.) Para resuspender todas las proteínas y desnaturalizar las proteínas.

6) Se cargaron 10 μ l de cada muestra en gel de SDS-PAGE al 12% y se migró durante 2 horas a 100 voltios.

7) Después de la migración, las proteínas se colorearon con tinción con azul de Coomassie.

35 Como se muestra en la figura 1, ambas cepas fueron capaces de producir la proteína de interés (proteína Cherry, indicada por la matriz), pero la producción es de aproximadamente 5 a 10 veces mayor al utilizar M11 (DE3) que al utilizar HMS174 (DE3). El experimento se realizó dos veces con exactamente los mismos resultados.

Ejemplo 3: Expresión de proteínas utilizando BL21 (DE3)

40 Las cepas BL21 (DE3) suprimidas de Axis-ea10 y/o Δ S-C se construyeron de acuerdo con el ejemplo 1. La supresión Δ S-C se insertó en el cromosoma de la bacteria (en λ DE3 suprimida del gen int y codificaba la polimerasa de ARN de T7) sola o en combinación con la supresión Axis-ea10. Se construyeron de esta manera dos derivados BL21 (DE3): BL21 (DE3) Δ S-C y BL21 (DE3) Δ axis-ea10, Δ S-C. Las supresiones se confirmaron mediante amplificación por PCR de la región modificada y esta región se secuenció. Esta etapa de secuenciación confirmó la presencia de las supresiones correspondientes de acuerdo con las secuencias teóricas. A continuación, las bacterias construidas se probaron para determinar la expresión de proteínas utilizando dos plásmidos diferentes que codifican la proteína cherry (pScherry1 y pSSC-Cherry1, Delphi Genetics) de acuerdo con el ejemplo 2. Los resultados mostraron claramente una sobreexpresión del gen cherry que codifica la proteína cherry. Esta proteína fue detectada fácilmente por los ojos y en el análisis SDS-PAGE.

50 Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estas bacterias son capaces de sobreproducir proteínas sin riesgo de lisis bacteriana no deseada debido al fago λ DE3 porque este fago está por lo menos suprimido de los genes int, S, R y Rz que codifican las funciones requeridas para la división de fagos y lisis bacteriana.

55 Dado que la lisis bacteriana durante la proteína depende de varios parámetros, que incluyen las condiciones de crecimiento, la proteína sobreexpresada,... diseñamos una cepa modelo para mostrar que las cepas construidas son resistentes a la lisis debido a las supresiones de genes específicos. En el fago λ DE3, se requiere tener una expresión constitutiva del represor CI con el fin de reprimir el desarrollo lítico y mantener el estado lisogénico del profago. Un mutante (CI⁸⁵⁷) de este represor es bien conocido debido a su capacidad para ser termosensible: a 30°C, el represor mutado es completamente activo y mantiene el estado lisogénico. Sin embargo, a una temperatura más alta (37°C a 42°C), el CI⁸⁵⁷ no es eficiente e induce el estado lítico del fago λ DE3. Las cepas que llevan esta mutación CI⁸⁵⁷ y las supresiones de acuerdo con la invención se construyeron: BL21 (DE3) Δ S-C correspondiente a una cepa BL21 que comprende P41; BL21 (DE3) Axis-ea10 y Δ S-C correspondientes a una cepa BL21 que comprende P11; BL21 (DE3) Δ axis-ea10, Δ S-C y Δ Q correspondientes a una cepa BL21 que comprende P13; BL21 (DE3) Δ Q correspondiente a una cepa BL21 que comprende P15 y BL21 (DE3) Δ axis-ea10 y Δ Q correspondiente a una cepa BL21 que comprende P53.

Al cambiar la temperatura a 42°C, se induce el estado lítico. No se observó lisis para las cepas de la invención. Adicionalmente, observamos que el rendimiento de producción de la proteína de interés (proteína cherry) se mejoró para las cepas de la invención en comparación con el control.

5

Listado de secuencias

10 <110> DELPHI GENETICS
Szpirer, CÃ©dric

<120> Fago genéticamente modificado y uso del mismo

15 <130> CV-153/PCT

<160> 36

20 <170> BiSSAP 1.0

<210> 1

<211> 324

<212> ADN

<213> Fago lambda de enterobacteria

25

<220>

<221> fuente

<222> 1..324

<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

30

<400> 1

```

atgaagatgc cagaaaaaca tgacctggtg gccgccattc tcgcggcaaa ggaacaaggc      60
atcgggggcaa tccttgcggtt tgcaatggcg taccttcgcg gcagatataa tggcgggtgcg      120
tttacaaaaa cagtaatoga cgcaacgatg tgcgccatta tcgcctggtt cattcgtgac      180
cttctcgact tcgccggact aagtagcaat ctcgcttata taacgagcgt gtttatcggc      240
tacatcggta ctgactcgat tggttcgctt atcaaacgct tcgctgctaa aaaagccgga      300
gtagaagatg gtagaaatca ataa                                             324

```

35 <210> 2

<211> 477

<212> ADN

<213> Fago lambda de enterobacteria

40 <220>

<221> fuente

<222> 1..477

<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 2

ES 2 699 652 T3

atggtagaaa tcaataatca acgtaaggcg ttcctcgata tgctggcgtg gtcggaggga 60
actgataacg gacgtcagaa aaccagaaat catggttatg acgtcattgt aggcgggagag 120
ctattcactg attactccga tcaccctcgc aaacttgta cgctaaaccc aaaactcaaa 180
tcaacaggcg ccggacgcta ccagcttctt tcccgttggg gggatgccta ccgcaagcag 240
cttggcctga aagacttctc tccgaaaagt caggacgctg tggcattgca gcagattaag 300
gagcgtggcg ctttacctat gattgatcgt ggtgatatcc gtcaggcaat cgaccgttgc 360
agcaatatct gggcttcaact gccggcgct ggttatggtc agttcgagca taaggctgac 420
agcctgattg caaaattcaa agaagcgggc ggaacggta gagagattga tgtatga 477

<210> 3
<211> 462
5 <212> ADN
<213> Fago lambda de enterobacteria

<220>
10 <221> fuente
<222> 1..462
<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 3
atgagcagag tcaccgcgat tatctccgct ctggttatct gcatcatcgt ctgcctgtca 60
tgggctgtta atcattaccg tgataacgcc attacctaca aagcccagcg cgacaaaaat 120
gccagagaac tgaagctggc gaacgcggca attactgaca tgcagatgcg tcagcgtgat 180
gttgctgcgc tcgatgcaaa atacacgaag gagttagctg atgctaaagc tgaaaatgat 240
gctctgcgtg atgatgttgc cgctggcgtg cgctcggttgc acatcaaagc agtctgtcag 300
tcagtgcgtg aagccaccac cgcctccggc gtggataatg cagcctcccc ccgactggca 360
gacaccgctg aacgggatta tttcaccctc agagagaggc tgatcactat gcaaaaacaa 420
ctggaaggaa cccagaagta tattaatgag cagtgcagat ag 462

15 <210> 4
<211> 201
<212> ADN
20 <213> Fago lambda de enterobacteria

<220>
25 <221> fuente
<222> 1..201
<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 4
atgactacga ctattgataa aatcaatgg tgtggacaat tcaagcagat caatggatgc 60
aagctgcaat cggaatgcat ggttaagcct gaagaaatgt ttcctgtaat ggaagatggg 120
aaatatgtcg ataaatgggc aatacgaacg acggcaatga ttgccagaga acttggtaaa 180
cagaacaaca aagctgcctg a 201

ES 2 699 652 T3

<210> 5
 <211> 300
 <212> ADN
 <213> Fago lambda de enterobacteria

5

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..300
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

10

<400> 5

```

atggtaacca ttgtctggaa agaatccaaa ggtacggcaa aaagccgcta caaagctcgc      60
agagcagaac ttattgccga gcgacgcagt aatgaagcac tggcgcgaaa aattgcgcta      120
aagctctctg gttgcgtcag agcagataaa gcagcatcac tcggaagcct tcgctgcaag      180
aaggcagaag aagtcgagcg taaacagaac cgtatttact acagcaagcc acgcagtgaa      240
atgggtgtga cttgtgttgg tcgccagaaa attaaattag gcagcaaacc acttatttga      300
  
```

15

<210> 6
 <211> 651
 <212> ADN
 <213> Fago lambda de enterobacteria

20

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..651
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 6

```

atgaatacac aactgatggg tgagcgtatt cgcgctcgca gaaaagaact caagattagg      60
caggctgccc ttggcaagat ggttggcgtg tctaattgtg ctatttccca atgggagcga      120
tctgaaactg agcccaatgg cgaaaaccta ttggccttag ccaaggcttt gcagtgctcc      180
cctgattacc tgttgaaagg agaggatagt ctttcaaca ttgcctatca cagcaggcat      240
gatccaagag gttcgtatcc tctaattagt tgggtaagcg caggatgttg gatggaagct      300
gtagagccat atcataggcg tgcaatagat aactggtacg acacaacggt agattgttct      360
gaagactctt tttggctcga cgttaaaggc gattcaatga ctgccccggc aggactgagt      420
attcctgagg ggatgattat tctcgtcgcac ccagaagtcg aaccacgtaa tggaaagctg      480
gtagtcgcca aacttgaagg agaaaacgag gcgacattca aaaagttagt tattgatgcc      540
ggtagaaaat tcttgaaacc actcaatcca caatacccaa tgattgaaat caatgggaac      600
tgtaaaatca ttggcgttgt cgttgatgcc aagctagcaa accttcctta a              651
  
```

25

<210> 7
 <211> 1071
 <212> ADN
 <213> Fago lambda de enterobacteria

30

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..1071

ES 2 699 652 T3

<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 7

```

atgggaagaa ggcgaagtca tgagcgccgg gatttaccoc ctaaccttta tataagaaac      60
aatggatatt actgctacag ggacccaagg acgggtaaag agtttggatt aggcagagac      120
aggcgaatcg caatcactga agctatacag gccaacattg agttattttc aggacacaaa      180
cacaagcctc tgacagcgag aatcaacagt gataattccg ttacgttaca ttcattggctt      240
gatcgctacg aaaaaatcct ggccagcaga ggaatcaagc agaagacact cataaattac      300
atgagcaaaa ttaaagcaat aaggaggggt ctgcctgatg ctccacttga agacatcacc      360
acaaaagaaa ttgctggcaat gctcaatgga tacatagacg agggcaaggc ggcgtcagcc      420
aagttaatca gatcaacact gagcgatgca ttccgagagg caatagctga aggccatata      480
acaacaaacc atgtcgctgc cactcgcgca gcaaaatcag aggtaaggag atcaagactt      540
acggctgacg aatacctgaa aatttatcaa gcagcagaat catcaccatg ttggctcaga      600
cttgcaatgg aactggctgt tgttaccggg caacgagttg gtgatttatg cgaaatgaag      660
tggctctgata tcgtagatgg atatctttat gtcgagcaaa gcaaaacagg cgtaaaaatt      720
gccatcccaa cagcattgca tattgatgct ctcggaatat caatgaagga aacacttgat      780
aaatgcaaag agattcttgg cggagaaacc ataattgcat ctactcgtcg cgaaccgctt      840
tcatccggca cagtatcaag gtattttatg cgcgcacgaa aagcatcagg tctttccttc      900
gaaggggatc cgcctacctt tcacgagttg cgcagtttgt ctgcaagact ctatgagaag      960
cagataagcg ataagtttgc tcaacatctt ctcgggcata agtcggacac catggcatca     1020
cagtatcgtg atgacagagg caggagtggt gacaaaattg aatcaaata a                       1071

```

5

<210> 8

<211> 219

<212> ADN

10 <213> Fago lambda de enterobacteria

<220>

<221> fuente

<222> 1..219

15 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 8

```

atgtacttga cacttcagga gtggaacgca cgccagcgac gtccaagaag ccttgaaca      60
gttcgtcgat gggttcggga atgcaggata ttcccacctc cggttaagga tggagagag      120
tatctgttcc acgaatcagc ggtaaagggt gacttaaatc gaccagtaac aggtggcctt      180
ttgaagagga tcagaaatgg gaagaaggcg aagtcatga                               219

```

20 <210> 9

<211> 232

<212> ADN

<213> Fago lambda de enterobacteria

25 <220>

ES 2 699 652 T3

<221> fuente
<222> 1..232
<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

5 <400> 9
tacaggtcac taataccatc taagtagttg attcatagtg actgcatatg ttgtgtttta 60
cagtattatg tagtctgttt tttatgcaaa atctaattta atatattgat atttatatca 120
ttttacgttt ctggttcagc tttttatac taagttggca ttataaaaaa gcattgctta 180
tcaatttggtt gcaacgaaca ggtcactatc agtcaaaata aaatcattat tt 232

<210> 10
<211> 29865
10 <212> ADN
<213> secuencias artificiales

<220>
<221> fuente
15 <222> 1..29865
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="Fago genéticamente modificado"/organismo="secuencias artificiales"
<400> 10

ES 2 699 652 T3

gcttttttat	actaagttgg	cattataaaa	aagcattgct	tatcaatttg	ttgcaacgaa	60
caggtcacta	tcagtcaaaa	taaaatcatt	atgtgatttc	aattttgtcc	cactccctgc	120
ctctgtcatc	acgatactgt	gatgccatgg	tgtccgactt	atgcccgaga	agatgttgag	180
caaacttata	gcttatctgc	ttctcataga	gtcttgacga	caaactgcgc	aactcgtgaa	240
aggtaggcgg	atccagatcc	cggacaccat	cgaatggcgc	aaaacctttc	gcggtatggc	300
atgatagcgc	coggaagaga	gtcaattcag	ggtggtgaat	gtgaaaccag	taacgttata	360
cgatgtcgca	gagtatgccg	gtgtctctta	tcagaccggt	tcccgcgtgg	tgaaccaggc	420
cagccacggt	tctgcgaaaa	cgcgggaaaa	agtggaagcg	gcgatggcgg	agctgaatta	480
cattcccaac	cgogtggcac	aacaactggc	gggcaaacag	tcgttgctga	ttggcgttgc	540
cacctccagt	ctggccctgc	acgcgccgtc	gcaaattgtc	gcggcgatta	aatctcgcgc	600
cgatcaactg	ggtgccagcg	tgggtggtgc	gatggtagaa	cgaagcggcg	tcgaagcctg	660
taaagcggcg	gtgcacaatc	ttctcgcgca	acgcgtcagt	gggctgatca	ttaactatcc	720
gctggatgac	caggatgccca	ttgctgtgga	agctgcctgc	actaatgttc	cggcgttatt	780
tcttgatgtc	tctgaccaga	cacccatcaa	cagtattatt	ttctcccatg	aagacggtac	840
gcgactgggc	gtggagcatc	tggtcgcatt	gggtcaccag	caaatcgcgc	tgtagcggg	900
cccattaagt	tctgtctcgg	cgcgtctcgg	tctggctggc	tggcataaat	atctcactcg	960
caatcaaatt	cagccgatag	cggaacggga	aggcgactgg	agtgccatgt	ccggttttca	1020
aaaaccatg	caaatgctga	atgagggcat	cgttcccact	gcgatgctgg	ttgccaacga	1080
tcagatggcg	ctgggcgcaa	tgcgcgccat	taccgagtc	gggctgcgcg	ttggtgcgga	1140
tatctcggta	gtgggatacg	acgataccga	agacagctca	tgttatatcc	cgccgttaac	1200
caccatcaaa	caggattttc	gcctgctggg	gcaaaccagc	gtggaccgct	tgetgcaact	1260
ctctcagggc	caggcgggtga	agggcaatca	gctggtgcc	gtctcactgg	tgaaaagaaa	1320
aaccaccctg	gcgccaata	cgcaaaccgc	ctctccccgc	gcggtggcgg	attcattaat	1380

ES 2 699 652 T3

gcagctggca cgacaggttt cccgactgga aagcgggagc tgagcgcgaac gcaattaatg 1440
 taagttagct cactcattag gcaccccagg ctttacactt tatgcttccg gctcgtataa 1500
 tgtgtggaat tgtgagcggg taacaatttc acacaggaaa cagctatgac catgattacg 1560
 gattcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt gactgggaaa accctggcgt taccacaactt 1620
 aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc 1680
 gatcgcctt cccaacagtt gcgcagcctg aatggcgaat ggcgctttgc ctggtttccg 1740
 gcaccagaag cggtgccgga aagctggctg gagtgcgatc ttctgagggc cgatactgtc 1800
 gtcgtcccct caaactggca gatgcacggt tacgatgcgc ccatctacac caacgtgacc 1860
 tatcccatta cggtaaatcc gccgtttggt cccacggaga atccgacggg ttgttactcg 1920
 ctcacattta atgttgatga aagctggcta caggaaggcc agacgcgaat tatttttgat 1980
 ggcgtcggga tctgatccgg atttactaac tggaagaggc actaaatgaa cacgattaac 2040
 atcgctaaga acgacttctc tgacatcga ctggctgcta tcccgttcaa cactctggct 2100
 gaccattacg gtgagcgttt agctcgcgaa cagttggccc ttgagcatga gtcttacgag 2160
 atgggtgaag cacgcttccg caagatgttt gagcgtcaac ttaaagctgg tgaggttgcg 2220
 gataaocgtg ccgccaagcc tctcatcact accctactcc ctaagatgat tgcaacgcatc 2280
 aacgactggg ttgaggaagt gaaagctaag cgcggcaagc gcccgacagc cttccagttc 2340
 ctgcaagaaa tcaagccgga agccgtagcg tacatcacca ttaagaccac tctggcttgc 2400
 ctaaccagtg ctgacaatac aaccgttcag gctgtagcaa gcgcaatcgg tcgggccatt 2460
 gaggacgagg ctgcctcgg tcgtatccgt gacottgaag ctaagcaact caagaaaaac 2520
 gttgaggaac aactcaacaa gcgcgtaggg cacgtctaca agaaagcatt tatgcaagtt 2580
 gtcgaggctg acatgctctc taagggtcta ctgggtggcg aggcgtggtc ttctggcat 2640
 aaggaagact ctattcatgt aggagtacgc tgcacgaga tgctcattga gtcaaccgga 2700
 atggttagct tacaccgcca aatgctggc gtagtaggtc aagactctga gactatcgaa 2760
 ctgcacactg aatacgtga ggctatcga acccgtgcag gtgcgctggc tggcatctct 2820
 ccgatgttcc aaccttgcgt agttcctcct aagccgtgga ctggcattac tgggtgtggc 2880
 tattgggcta acggtcgtcg tcctctggcg ctgggtgcgta ctcacagtaa gaaagcactg 2940
 atgcgctacg aagacgttta catgcctgag gtgtacaaag cgattaacat tgcgcaaac 3000
 accgcatgga aatcaacaa gaaagtccta gcggctcgca acgtaatcac caagtggaag 3060
 cattgtccgg tcgaggacat ccctgcgatt gagcgtgaag aactcccgat gaaaccggaa 3120
 gacatcgaca tgaatcctga ggctctcacc gcgtggaaac gtgctgcgcg tgctgtgtac 3180
 cgcaaggaca aggctcgcaa gtctcgcctg atcagccttg agttcatgct tgagcaagcc 3240
 aataagtttg ctaaccataa ggccatctgg ttcccttaca acatggactg gcgcggtcgt 3300
 gtttacgctg tgtcaatggt caaccgcga ggtaacgata tgaccaaaagg actgcttacg 3360

ES 2 699 652 T3

ctggcgaaag gtaaaccaat cggtaaggaa ggttactact ggctgaaaat ccacggtgca 3420
 aactgtgcgg gtgtcgataa ggttccgttc cctgagcgca tcaagttcat tgaggaaaac 3480
 cacgagaaca tcatggcttg cgctaagtct ccaactggaga acacttgggtg ggctgagcaa 3540
 gattctccgt tctgcttcc tgcgttctgc tttgagtacg ctgggggtaca gcaccacggc 3600
 ctgagctata actgctccct tccgctggcg tttgacgggt cttgctctgg catccagcac 3660
 ttctccgcga tgctccgaga tgaggtaggt ggtcgcgcgg ttaacttgct tcctagttaa 3720
 accgttcagg acatctacgg gattgttgct aagaaagtca acgagattct acaagcagac 3780
 gcaatcaatg ggaccgataa cgaagtagtt accgtgaccg atgagaacac tgggtgaaatc 3840
 tctgagaaag tcaagctggg cactaaggca ctggctggtc aatggctggc ttacggtggt 3900
 actcgcagtg tgactaagcg ttcagtcctg acgctggctt acgggtccaa agagttcggc 3960
 ttccgtcaac aagtctgga agataccatt cagccagcta ttgattccgg caagggctctg 4020
 atgttcactc agccgaatca ggctgctgga tacatggcta agctgatttg ggaatctgtg 4080
 agcgtgacgg tggtagctgc ggttgaagca atgaactggc ttaagtctgc tgctaagctg 4140
 ctggctgctg aggtcaaaga taagaagact ggagagattc ttcgcaagcg ttgcgctgtg 4200
 cattgggtaa ctctgatgg tttccctgtg tggcaggaat acaagaagcc tattcagacg 4260
 cgcttgaacc tgatgttcc tggctcagttc cgcttacagc ctaccattaa caccaacaaa 4320
 gatagcgaga ttgatgcaca caaacaggag tctggatcgc ctccctaactt tgtacacagc 4380
 caagacggta gccaccttgc taagactgta gtgtgggcac acgagaagta cggaatcgaa 4440
 tcttttgca tgaattcacga ctccctcggg accattccgg ctgacgctgc gaacctgttc 4500
 aaagcagtg gcgaaactat ggttgacaca tatgagtctt gtgatgtact ggctgatttc 4560
 tacgaccagt tcgctgacca gttgcacgag tctcaattgg acaaaatgcc agcacttccg 4620
 gctaaaggta acttgaacct ccgtgacatc ttagagtcgg acttcgcggtt cgcgtaacgc 4680
 caaatcaata cgactccgga tccccttcga aggaaagacc tgatgctttt cgtgcgcgca 4740
 taaaatacct tgatactgtg ccggatgaaa gcggttcgcg acgagtagat gcaattatgg 4800
 tttctccgcc aagaatctct ttgcatttat caagtgttc cttcattgat attccgagag 4860
 catcaatatg caatgctgtt gggatggcaa tttttacgcc tgttttgctt tgctcgacat 4920
 aaagatatcc atctacgata tcagaccact tcatttcgca taaatcacca actcgttgcc 4980
 cggtaacaac agccagttcc attgcaagtc tgagccaaca tggatgatgat tctgctgctt 5040
 gataaatttt caggtattcg tcagccgtaa gtcttgatct ccttacctct gattttgctg 5100
 cgcgagtgcc agcgacatgg tttgttgta tatggccttc agctattgcc tctcggaatg 5160
 catcgctcag tgttgatctg attaacttgg ctgacgcgc cttgcctcgc tctatgtatc 5220
 cattgagcat tgccgcaatt tcttttggg tgatgtcttc aagtggagca tcaggcagac 5280

ES 2 699 652 T3

ccctccttat tgctttaatt ttgctcatgt aatttatgag tgtcttctgc ttgattcctc 5340
 tgctggccag gattttttcg tagcgatcaa gccatgaatg taacgtaacg gaattatcac 5400
 tgttgattct cgctgtcaga ggcttgtgtt tgtgtcctga aaataactca atgttggcct 5460
 gtatagcttc agtgattgag attcgcctgt ctctgcctaa tccaaactct ttaccocgctc 5520
 ttgggtccct gtagcagtaa tatccattgt ttcttatata aaggttaggg ggtaaatccc 5580
 ggcgctcatg acttcgcctt cttcacactg gagggcaaag aagatttcca ataatacagaa 5640
 caagtccgct cctgttttagt tacgagcgac attgctcctg gtattcactc gttggaatga 5700
 atacacagtg cagtgtttat tctgttattt atgccaaaaa taaaggccac tatcaggcag 5760
 ctttgttggt ctgtttacca agttctctgg caatcattgc cgtcgttctg attgccatt 5820
 tatogacata tttcccatct tccattacag gaaacatttc ttcaggctta accatgcatt 5880
 ccgattgcag cttgcatcca ttgcatcgt tgaattgtcc acaccattga tttttatcaa 5940
 tagtcttagt catacggata gtctctggtat tgttccatca catcctgagg atgctcttgg 6000
 aactcttcaa attctctctc catatatcac ctcaaataag tggtttgctg cctaatttaa 6060
 ttttctggcg accaacacaa gtcacaccca tttcactgctg tggcttgctg tagtaaatac 6120
 ggttctgttt acgctcgaact tcttctgcct tcttgccagc aaggcttccg agtgatgctg 6180
 ctttatctgc tctgacgcaa ccagagagct ttagcgaat ttttcgcgcc agtgcttcat 6240
 tactgcgtcg ctccgcaata agttctgctc tgcgagcttt gtagcggctt tttgccgtac 6300
 ctttgattc tttccagaca atggttacca tgatggtctc ctttaagtgg ctttgccgca 6360
 tgacgcgtcg aggtgcttat cttctcagtc gctgtcttgt agctgcaatt cgcgccatcc 6420
 ccaaaaccac tcaagttctg gtctcaacgg ttaggttgag agtccgtcga tgttaaagag 6480
 cctgccaatc tgttcogttt ggcttccagc gtctgctga tggcttaaat ttaagacttc 6540
 ttaatttatt ggtcaagtgc atttttgaag aaaacttaat tttatgggcg tgaatttagt 6600
 ttgtctttga tttttaacgg gaaataaaaa aggggcgaaa gcccttaag gaaggttgc 6660
 tagcttgga tcaacgacaa cgccaatgat tttacagttc ccattgattt caatcattgg 6720
 gtattgtgga ttgagtgggt tcaggaattt tctaccggca tcaataacta actttttgaa 6780
 tgtcgcctcg ttttctcctt caagtttggc gactaccagc tttccattac gtggttogac 6840
 ttctgggtcg acgagaataa tcatcccctc aggaatactc agtctgccc gggcagtcac 6900
 tgaatcgcct ttaacgtoga gccaaaaaga gtcttcagaa caatctaccg ttgtgtcgta 6960
 ccagttatct attgcacgcc tatgatatgg ctctacagct tccatccaac atcctgcgct 7020
 taccoacta attagaggat acgaacctct tggatcatgc ctgctgtgat aggcaatggt 7080
 tgaaagacta tcctctcctt tcaacaggta atcaggggag cactgcaaag ccttggtctaa 7140
 ggccaatagg ttttcgcat tgggctcagt ttcagatcgc tcccattggg aaatagcaac 7200
 attagacacg ccaaccatct tgccaagggc agcctgccta atottgagtt cttttctgog 7260

ES 2 699 652 T3

agcgcgaata	cgctcaccca	tcagttgtgt	attcatagtt	aagacatctt	aaataaactt	7320
gacttaagat	tcctttggtg	gataatttaa	gtgttcttta	atctcggagc	gagtctatgt	7380
acaaaaaaga	tgttattgac	cacttcggaa	cccagcgtgc	tgttgctaaa	gcactaggca	7440
ttagcgatgc	agcagtcctc	cagtggaaag	aagttatccc	agagaaagac	gcctatcgat	7500
tggaaatcgt	tacagctggc	gccctgaagt	atcaagaaag	tgcttaccgc	caagcggcat	7560
aagcaaattg	ctctttaaca	gttctggcct	ttcaacctta	accgggtgag	caaacatcag	7620
cggcaaatcc	attgggtgtg	ccgctataac	tcaatatcaa	tataggtaaa	ttaacaaatg	7680
gcacaagcaa	gctacagcaa	gccaacacag	cgagaaattg	atcgcgctga	aactgattta	7740
ctcatcaacc	tgtcaacgct	taccagcgc	ggtctggcaa	agatgattgg	ctgtcatgaa	7800
tcgaagataa	gcagaacgga	ctggagattt	attgcttcgg	tcttgtgtgc	tttcggaatg	7860
gcatcagaca	tcagtcgat	tagcagggct	tttaagtatg	cgcttgatgg	actcaciaaag	7920
aaaaaacgcc	cgggtgtgcaa	gaccgagcgt	tctgaacaaa	tccagatgga	gttctgaggt	7980
cattactgga	tctatcaaca	ggagtcatta	tgacaaatac	agcaaaaata	ctcaacttcg	8040
gcagaggtaa	ctttgccgga	caggagcgt	atgtggcaga	tctcgatgat	ggttacgcca	8100
gactatcaaa	tatgctgctt	gaggcttatt	cgggcgcaga	tctgaccaag	cgacagttta	8160
aagtgctgct	tgccattctg	cgtaaacct	atgggtgga	taaaccaatg	gacagaatca	8220
ccgattctca	acttagcgag	attacaaagt	tacctgtcaa	acggtgcaat	gaagccaagt	8280
tagaactcgt	cagaatgaat	attatcaagc	agcaaggcgg	catgtttga	ccaataaaaa	8340
acatctcaga	atgggtgtatc	cctcaaacg	agggaaaatc	ccctaaacg	agggataaaa	8400
catccctcaa	attgggggat	tgctatccct	caaacaggg	ggacacaaaa	gacactatta	8460
caaaagaaaa	aagaaaagat	tattcgtcag	agaattctgg	cgaatcctct	gaccagccag	8520
aaaacgacct	ttctgtggtg	aaaccgatg	ctgcaattca	gagcggcagc	aagtggggga	8580
cagcagaaga	cctgaccgcc	gcagagtgga	tgtttgacat	ggtgaagact	atcgcaccat	8640
cagccagaaa	accgaatctt	gctgggtggg	ctaacgatat	ccgcctgatg	cgtgaacgtg	8700
acggacgtaa	ccaccgcgac	atgtgtgtgc	tgttccgctg	ggcatgccag	gacaacttct	8760
ggtccggtaa	cgtgctgagc	ccggcctaac	tccgcgataa	gtggaccaa	ctcgaaatca	8820
accgtaacaa	gcaacaggca	ggcgtgacag	ccagcaaac	aaaactcgac	ctgacaaaca	8880
cagactggat	ttaccggggtg	gatctatgaa	aaacatcgcc	gcacagatgg	ttaactttga	8940
ccgtgagcag	atgcgtcggg	tcgccaacaa	catgccggaa	cagtacgacg	aaaagccgca	9000
ggtacagcag	gtagcgcaga	tcacaaacg	tgtgttcagc	cagttactgg	caactttccc	9060
ggcagacctg	gctaaccgtg	accagaacga	agtgaacgaa	atccgtcgcc	agtgggttct	9120
ggcttttcgg	gaaaacggga	tcaccacgat	ggaacaggtt	aacgcaggaa	tgccgcgtagc	9180

ES 2 699 652 T3

ccgtcggcag aatcgaccat ttctgccatc acccgggcag tttgttgcat ggtgccggga 9240
 agaagcatcc gttaccgccg gactgccaaa cgtcagcgag ctggttgata tggtttacga 9300
 gtattgccgg aagcgaggcc tgtatccgga tgcggagtct tatccgtgga aatcaaacgc 9360
 gcactactgg ctggttacca acctgtatca gaacatgocg gccaatgcgc ttactgatgc 9420
 ggaattacgc cgtaaggccg cagatgagct tgtccatag actgcgagaa ttaaccgtgg 9480
 tgaggcgatc cctgaaccag taaaacaact tctgtcatg ggcggtagac ctctaaatcg 9540
 tgcacaggct ctggcgaaga tcgcagaaat caaagctaag ttcggactga aaggagcaag 9600
 tgtatgacgg gcaaagaggc aattattcat tacctgggga cgcataatag cttctgtgcg 9660
 ccggacgttg ccgcgctaac aggcgcaaca gtaaccagca taaatcaggc cgcggctaaa 9720
 atggcacggg caggtcttct gggtatcgaa ggtaaggctc ggcgaaacgt gtattaccgg 9780
 tttgctacca ggaagaacg ggaaggaaag atgagcacga acctgatgaa caaactggat 9840
 acgattggat tcgacaacaa aaaagacctg cttatctcgg tggcgattt ggttgatcgt 9900
 ggtgcagaga acggtgaatg octggaatta atcacattcc cctggttcag agctgtacgt 9960
 gaaaccatg agcaaatgat gattgatggc ttatcagagc gtgaaacgt taatcactgg 10020
 ctgcttaatg gcggtggctg gttctttaat ctcgattacg acaaagaaat tctggctaaa 10080
 gctcttggcc ataaagcaga tgaacttccg ttaatcatcg aactggtgag caaagataaa 10140
 aaatatgta tctgccacgc cgattatccc tttgacgaat acgagtttg aaagccagtt 10200
 gatcatcagc aggtaatctg gaaccgcgaa cgaatcagca actcacaaaa cgggatcgtg 10260
 aaagaaatca aaggcgcgga cacgttcatc tttggtcata cgcagcagc gaaaccactc 10320
 aagtttgcca accaaatgta tatcgatacc ggcgcagtg tctgcggaaa cctaacattg 10380
 attcaggtac agggagaagg ogcatgagac tcgaaagcgt agctaaattt cattcgccaa 10440
 aaagcccgat gatgagcgac tcaccacggg ccacggcttc tgactctctt tccggtactg 10500
 atgtgatggc tgctatgggg atggcgcaat cacaagccgg attcggtagt gctgcattct 10560
 gcgtaagca cgaactcagc cagaacgaca aacaaaaggc tatcaactat ctgatgcaat 10620
 ttgcacacaa ggtatcgggg aaataccgtg gtgtggcata tcttgaagga aataactaagg 10680
 caaaggtact gcaagtgctc gcaacattcg cttatgcgga ttattgcogt agtgccgcga 10740
 cgccgggggc aagatgcaga gattgccatg gtacaggccg tcgggttgat attgccaaaa 10800
 cagagctgtg ggggagagtt gtogagaaag agtgcggaag atgcaaaggc gtcggctatt 10860
 caaggatgcc agcaagcgca gcatatcgcg ctgtgacgat gctaatccca aaccttacc 10920
 aaccacctg gtcacgcact gtaagccgc tgtatgacgc tctggtggtg caatgccaca 10980
 aagaagagtc aatcgagac aacattttga atgcggtcac acgttagcag catgattgcc 11040
 acggatggca acatattaac ggcgatgat tgaacttatt aataaaattg ggtaaatttg 11100
 actcaacgat gggtaattc gtcggttggt gtagtgagat gaaaagaggc ggcgcttact 11160

ES 2 699 652 T3

accgattccg cctagttggt cacttogacg tatcgtctgg aactccaacc atcgcaggca 11220
 gagaggtctg caaaatgcaa tcccgaaca gttcgcaggt aatagttaga gcctgcataa 11280
 cggtttcggg attttttata tctgcacaac aggtaagagc attgagtoga taatcgtgaa 11340
 gagtcggcga gcctggttag ccagtgctct ttccgttgtg ctgaattaag cgaataccgg 11400
 aagcagaacc ggatcaccaa atgcgtacag gcgtcatcgc cgccagcaa cagcacaacc 11460
 caaactgagc cgtagccact gtctgtcctg aattccatgc ttgaaccgc ctatgcgcgg 11520
 gttttctttt gtgcgcttgc aggccagctt gggatcagca gcctgacgga tgcggtgtcc 11580
 ggcgacagcc tgactgcca ggaggcactc gcgacgctgg cattatccgg tgatgatgac 11640
 ggaccacgac aggcccgag ttatcaggtc atgaacggca tcgccgtgct gccggtgtcc 11700
 ggcacgctgg tcagccggac gcgggcgctg cagccgtact cggggatgac cggttacaac 11760
 ggcattatcg cccgtctgca acaggctgcc agcgatccga tggaggacgg cattctgctc 11820
 gatatggaca cccccggcg gatggtggcg gggcatttg actgcgctga catcatcgcc 11880
 cgtgtgctg acataaaacc ggtatggcg cttgccaacg acatgaactg cagtgcaggt 11940
 cagttgcttg ccagtgccgc ctcccggcgt ctggtcacgc agaccgccg gacaggctcc 12000
 atcggcgta tgatggtca cagtaattac ggtgctgcgc tggagaaaca ggggtgtgaa 12060
 atcacgctga ttacagcgg cagccataag gtggatggca acccctacag ccatcttccg 12120
 gatgacgtcc gggagacact gcagtcggg atggacgcaa cccgccagat gtttgcgcag 12180
 aaggtgtcgg catataccgg cctgtccgtg caggttgtgc tggataccga ggctgcagtg 12240
 tacagcggtc aggagccat tgatgccgga ctggtgatg aacttgtaa cagcaccgat 12300
 gcgatcaccg tcatgcgtga tgcactggat gcacgtaaat cccgtctctc aggagggcga 12360
 atgaccaaag agactcaatc aacaactggt tcagccactg cttcgcaggc tgacgttact 12420
 gacgtggtgc cagcgacgga gggcgagaac gccagcgcg cgcagccgga cgtgaacgcg 12480
 cagatcaccg cagcggttgc ggcagaaaac agccgatta tggggatact caactgtgag 12540
 gaggctcacg gacgcgaaga acaggcacgc gtgctggcag aaacccccgg tatgaccgtg 12600
 aaaacggccc gccgcattct ggccgcagca ccacagagtg cacaggcgcg cagtgacact 12660
 gcgctggatc gtctgatgca gggggcaccg gcaccgctgg ctgcaggtaa cccggcatct 12720
 gatgccgtta acgatttgtc gaacacacca gtgtaaggga tgtttatgac gagcaaagaa 12780
 acctttacc attaccagcc gcagggcaac agtgaccgg ctcataccgc aaccgcgcc 12840
 ggcggattga gtgcgaaagc gcctgcaatg accccgctga tgctggacac ctccagccgt 12900
 aagctggttg cgtgggatgg caccaccgac ggtgctgcc ttggcattct tgcggttget 12960
 gctgaccaga ccagcaccac gctgacgttc tacaagtcg gcacgttccg ttatgaggat 13020
 gtgctctggc cggaggctgc cagcgacgag acgaaaaaac ggaccgcggt tgccggaacg 13080

ES 2 699 652 T3

gcaatcagca tcgtttaact ttacccttca tcaactaaagg cgcctgtgc ggctttttt 13140
acgggatttt tttatgtcga tgtacacaac cgcccaactg ctggcggcaa atgagcagaa 13200
atthaagttt gatccgctgt ttctgcgtct ctttttccgt gagagctatc ccttcaccac 13260
ggagaaagtc tatctctcac aaattccggg actggtaaac atggcgtgt acgtttcgcc 13320
gattgtttcc ggtgaggta tccgttcccc tggcggctcc acctctgaat ttacgccggg 13380
atatgtcaag ccgaagcatg aagtgaatcc gcagatgacc ctgcgtcgcc tgccgcatga 13440
agatccgcag aatctggcgg acccggctta ccgccgcgt cgcacatca tgcagaacat 13500
gcgtgacgaa gagctggcca ttgctcaggt cgaagagatg caggcagttt ctgccgtgct 13560
taagggcaaa tacacatga ccgggtgaagc cttcgatccg gttgaggagg atatgggccg 13620
cagtgaggag aataacatca cgcagtcggg cggcacggag tggagcaagc gtgacaagtc 13680
cacgtatgac ccgaccgacg atatcgaagc ctacgcgctg aacgccagcg gtgtggtgaa 13740
tatcatcgtg ttcgatccga aaggctgggc gctgttccgt tccttcaaag ccgtcaagga 13800
gaagctggat acccgtcgtg gctctaattc cgagctggag acagcgggta aagacctggg 13860
caaagcggtg tcctataagg ggatgtatgg cgatgtggcc atcgtcgtgt attccggaca 13920
gtacgtggaa aacggcgtca aaaagaactt cctgccggac aacacgatgg tgctggggaa 13980
cactcaggca cgcggctctg gcacctatgg ctgcattcag gatgcggacg cacagcgcga 14040
aggcattaac gcctctgccc gttaccgaa aaactgggtg accaccggcg atccggcgcg 14100
tgagttcacc atgattcagt cagcaccgct gatgctgctg gctgaccctg atgagttcgt 14160
gtccgtacaa ctggcgtaat catggccctt cggggccatt gtttctctgt ggaggagtcc 14220
atgacgaaag atgaactgat tgcccgtctc cgctcgtggt gtgaacaact gaaccgtgat 14280
gtcagcctga cggggaacgaa agaagaactg gcgctccgtg tggcagagct gaaagaggag 14340
cttgatgaca cggatgaaac tgccggctcag gacaccctc tcagccggga aatgtgctg 14400
accggacatg aaaatgaggt gggatcagcg cagccggata ccgtgattct ggatacgtct 14460
gaactggtca cggtcgtggc actggtgaag ctgcatactg atgcacttca cgccacgcgg 14520
gatgaacctg tggcatttgt gctgccggga acggcgtttc gtgtctctgc cgggtgtggca 14580
gccgaaatga cagagcgcgg cctggccaga atgcaataac gggaggcgt gtggctgatt 14640
tcgataacct gttcgtgct gccattgcc gcgccgatga aacgatacgc gggatcatgg 14700
gaacgtcagc caccattaca tccggtgagc agtcagggtgc ggtgatacgt ggtgtttttg 14760
atgaccctga aaatatcagc tatgccggac agggcgtgcg cgttgaaggc tccagcccgt 14820
ccctgtttgt ccggactgat gaggtgcggc agctgcggcg tggagacacg ctgaccatcg 14880
gtgaggaaaa tttctgggta gatcgggttt cgccggatga tggcggaaagt tgtcatctct 14940
ggcttgagc gggcgtaccg cctgccgtta accgtcgccg ctgaaagggg gatgtatggc 15000
cataaaaggt cttgagcagg ccgttgaaaa cctcagccgt atcagcaaaa cggcgggtgcc 15060

ES 2 699 652 T3

tgggtgccgcc gcaatggcca ttaaccgCGT tgcttcatcc gcgatatcgc agtcggcgtc 15120
 acaggttgcc cgtgagacaa aggtacgCGG gaaactggta aaggaaaggg ccaggctgaa 15180
 aagggccacg gtcaaaaatc cgcaggccag aatcaaagtt aaccggggggg atttgcccgt 15240
 aatcaagctg ggtaatgCgC gggttgtcct ttCGcgcCGc aggcgtcgta aaaaggggca 15300
 gcgttcatcc ctgaaaggTg gcggcagcgt gcttTgtggTg ggtaaccgTc gtattcccgg 15360
 cgcgtttatt cagcaactga aaaatggccg gtggcatgTc atgcagcgtg tggctgggaa 15420
 aaaccgTtac ccattgatg tggTgaaaat cccgatggcg gtgccgctga ccacggcgTt 15480
 taaacaaaat attgagcGga tacggcgtga acgtcttccg aaagagctgg gctatgcgct 15540
 gcagcatcaa ctgaggatgg taataaagcg atgaaacata ctgaaactccg tgcagccgta 15600
 ctggatgcac tggagaagca tgacaccggg gcgacgTttt ttgatggTcg ccccgctgtt 15660
 tttgatgagg cggattttcc ggcagttgcc gtttatctca ccggcgtga atacacgggc 15720
 gaagagctgg acagcgatac ctggcagggc gagctgcata tcgaagTttt cctgcctgct 15780
 caggtgccgg attcagagct ggatgcgtgg atggagTccc ggatttatcc ggtgatgagc 15840
 gatatcccgg cactgtcaga tttgatcacc agtatggTgg ccagcggcta tgactaccgg 15900
 cgcgacgatg atgCGggcTt gtggagTtca gccgatctga cttatgtcat tacctatgaa 15960
 atgtgaggac gctatgcctg taccaaatcc tacaatgccg gtgaaaggtg ccgggaccac 16020
 cctgtgggTt tataagggga gcggtgacc ttacgcgaat ccgctttcag acgttgactg 16080
 gtCGcgtctg gcaaaagtta aagacctgac gccCGgcga ctgaccgctg agtcctatga 16140
 cgacagctat ctCGatgatg aagatgcaga ctggactgcg accgggcagg ggcagaaatc 16200
 tgccggagat accagcttca cGctggcgtg gatgcccGga gagcaggggc agcagcgct 16260
 gctggcgtgg tttaatgaag gcgatacccg tgcctataaa atccgcttcc cgaacggcac 16320
 ggtCGatgtg ttccgtggct gggTcagcag tatcggtaag gcggtgacgg cgaaggaagt 16380
 gatcaccCGc acggtgaaag tcaccaatgt gggacgtccg tcgatggcag aagatcgcag 16440
 cacggtaaca gcggcaaccg gcatgaccgt gacgcctgcc agcacctcgg tggTgaaagg 16500
 gcagagcacc acgctgaccg tggccttcca gccggagggc gtaaccgaca agagctttcg 16560
 tgCGgtgtct gcggataaaa caaaagccac cgtgtcggTc agTggTatga ccatcaccgt 16620
 gaacggcgTt gctgcaggca aggtcaacat tccggttgta tccggtaatg gtgagTttgc 16680
 tgCGgttgca gaaattaccg tcaccgCCag ttaatccGga gagTcagcga tgttCctgaa 16740
 aaccgaatca tttgaacata acggtgtgac cgtcacgctt tctgaactgt cagccctgca 16800
 gcgcattgag catctcGccc tgatgaaacg gcaggcagaa cagcgcgagt cagacagcaa 16860
 ccggaagTtt actgtggaag acgCCatcag aaccggcGcg tttctggTgg cgatgtccct 16920
 gtggcataac catccgcaga agacgcagat gccgtccatg aatgaagccg ttaaacagat 16980

ES 2 699 652 T3

tgagcaggaa gtgcttacca cctggcccac ggaggcaatt tctcatgctg aaaacgtggt 17040
 gtaccggctg tctggtatgt atgagtttgt ggtgaataat gccoctgaac agacagagga 17100
 cgccggggccc gcagagcctg tttctgcggg aaagtgttcg acggtgagct gagttttgcc 17160
 ctgaaactgg cgcgtgagat ggggcgacct gactggcgtg ccatgcttgc cgggatgtca 17220
 tccaogagat atgccgactg gcaccgcttt tacagtacct attattttca tgatgttctg 17280
 ctggatatgc acttttccgg gctgacgtac accgtgctca gcctgttttt cagcgatccg 17340
 gatatgcac cgctggattt cagtctgctg aaccggcgcg aggctgacga agagcctgaa 17400
 gatgatgtgc tgatgcagaa agcggcaggg cttgccggag gtgtccgctt tggcccggac 17460
 gggaatgaag ttatccccgc ttccccgat gtggcggaca tgacggagga tgacgtaatg 17520
 ctgatgacag tatcagaagg gatcgagga ggagtccggt atggctgaac cggtaggca 17580
 tctggtcgtt gatattgagtc tggatgcggc cagatttgac gagcagatgg ccagagtca 17640
 gcgtcatttt tctggtacgg aaagtgatgc gaaaaaaaaa gcggcagtcg ttgaacagtc 17700
 gctgagccga caggcgctgg ctgcacagaa agcggggatt tccgtcgggc agtataaagc 17760
 cgccatgctg atgctgcctg cacagttcac cgacgtggcc acgcagcttg caggcgggca 17820
 aagtcogtgg ctgatcctgc tgcaacaggg ggggcaggtg aaggactcct tcggcgggat 17880
 gatccccatg ttcagggggc ttgccggtgc gatcacctg ccgatggtgg gggccacctc 17940
 gctggcggtg gcgaccggtg cgctggcgtg tgcctggtat cagggcaact caaccctgtc 18000
 cgatttcaac aaaacgctgg tcttttccgg caatcaggcg ggactgacgg cagatcgat 18060
 gctggtcctg tccagagccg ggcaggcggc agggctgacg ttaaccaga ccagcgagtc 18120
 actcagcgca ctggttaagg cgggggtaag cgggtgaggct cagattgctt ccatcagcca 18180
 gagtgtggcg cgtttctcct ctgcatccgg cgtggagggt gacaaggctc ctgaagcctt 18240
 cgggaagctg accacagacc cgacgtcggg gctgacggcg atggctcgcc agttccataa 18300
 cgtgtcggcg gagcagattg cgtatgttgc tcagttgcag cgttcggcg atgaagcgg 18360
 ggcattgcag gcggcgaacg aggcgcgaac gaaagggtt gatgaccaga cccgcgcct 18420
 gaaagagaac atgggcacgc tggagacctg ggcagacag actgcgcggg cattcaaact 18480
 catgtgggat gcggtgctgg atattggtcg tcttgatacc gcgcaggaga tgetgattaa 18540
 ggcagaggct gcgtataaga aagcagacga catctggaat ctgcgcaagg atgattattt 18600
 tgtaacgat gaagcgcggg cgcgttactg ggatgatcgt gaaaaggccc gtcttgcgct 18660
 tgaagccgcc cgaaagaagg ctgagcagca gactcaacag gacaaaaatg cgcagcagca 18720
 gagcgatacc gaagcgtcac ggctgaata taccgaagag gcgcagaagg cttacgaacg 18780
 gctgcagacg ccgctggaga aatataccgc ccgtcaggaa gaactgaaca aggcaactgaa 18840
 agacgggaaa atcctgcagg cggattacaa cacgctgatg gcggcggcga aaaaggatta 18900
 tgaagcgacg ctgaaaaagc cgaaacagtc cagcgtgaag gtgtctgcgg gcgatcgtca 18960

ES 2 699 652 T3

ggaagacagt gctcatgctg ccctgctgac gcttcaggca gaactccgga cgctggagaa 19020
gcatgccgga gcaaatgaga aatcagcca gcagcgccgg gatttgtgga aggcggagag 19080
tcagttcgcg gtactggagg aggcggcgca acgtcgccag ctgtctgcac aggagaaatc 19140
cctgctggcg cataaagatg agacgctgga gtacaaacgc cagctggctg cacttggcga 19200
caaggttacg tatcaggagc gcctgaacgc gctggcgag caggcggata aattcgacaca 19260
gcagcaacgg gcaaacggg ccgccattga tgcgaaaagc cgggggctga ctgaccggca 19320
ggcagaacgg gaagccacgg aacagcgctt gaaggaacag tatggcgata atccgctggc 19380
gctgaataac gtcatgtcag agcagaaaaa gacctgggcg gctgaagacc agcttcgchg 19440
gaactggatg gcaggcctga agtccgctg gagtgagtgg gaagagagcg ccacggacag 19500
tatgtcgag gtaaaaagtg cagccacgca gacctttgat ggtattgcac agaatatggc 19560
ggcgatgctg accggcagtg agcagaactg gcgagcttc acccgttccg tgctgtccat 19620
gatgacagaa attctgctta agcaggcaat ggtggggatt gtcgggagta tcggcagcgc 19680
cattggcggg gctgttgggt gcggcgcatc cgcgtcaggc ggtacagcca ttcaggccgc 19740
tgcggcгаа ttccatthtg caaccggagg atttacggga accggcggca aatatgagcc 19800
agcggggatt gttcaccgtg gtgagthtg cttcacgaag gaggcaacca gccggattgg 19860
cgtggggaat cthtaccggc tgatgcgcgg ctatgccacc ggcggttatg tcggtacacc 19920
ggcagcatg gcagacagcc ggtcgcaggc gtccgggacg tttgagcaga ataaccatgt 19980
ggtgattaac aacgacggca cgaacgggca gataggtccg gctgctctga aggcggtgta 20040
tgacatggcc cgcaaggggt cccgtgatga aattcagaca cagatgcgtg atggtggcct 20100
gthctccgga ggtggacgat gaagacctc cgctggaaag tgaaaccgg tatggatgtg 20160
gcttcggtcc cthctgtaag aaagtgcg c thtgggtgatg gctattctca gcgagcgct 20220
gccgggctga atgccaacct gaaaacgtac agcgtgacgc thtctgtccc ccgtgaggag 20280
gccacggtac tggagtcgth tctggaagag cacgggggct ggaaatcctt tctgtggacg 20340
ccgccttatg agtggcggca gataaaggth acctgcgcaa aatggtcgtc gcgggtcagt 20400
atgtcgcgtg thgagthcag cgcagagtht gaacaggthg tgaactgatg caggatatcc 20460
ggcaggaaac actgaatgaa tgcacctgtg cggagcagtc ggccagcgtg gtgctctggg 20520
aaatcgacct gacagaggtc ggtggagaac gthatttht ctgtaatgag cagaacgaaa 20580
aagtgagcc ggtcacctgg cagggcgac agtatcagcc gtatccatt caggggagcg 20640
gththgaact gaatggcaa ggcaccagta cgcgccccac gctgacggt thtaacctgt 20700
acggtatggt caccgggatg gcggaagata tgcagagtht ggtcggcgga acggtggtcc 20760
ggcgtaaagt thacgccgt thtctggatg cggthaacct cgtcaacgga aacagthacg 20820
ccgatccgga gcaggaggtg atcagccgct ggcgcattga gcagtgcagc gaactgagcg 20880

ES 2 699 652 T3

cggtgagtgc ctcctttgta ctgtccacgc cgacggaaac ggatggcgct gtttttcogg 20940
 gacgtatcat gctggccaac acctgcacct ggacctatcg cggtgacgag tgcggttata 21000
 gcgggtccggc tgtcgcggat gaatatgacc agccaacgtc cgatatcacg aaggataaat 21060
 gcagcaaatg cctgagcggg tghtaagtcc gcaataacgt cggcaacttt ggcggcttcc 21120
 tttccattaa caaactttcg cagtaaatcc catgacacag acagaatcag cgattctggc 21180
 gcacgcccgg cgatgtgccc cagcggagtc gtgcccgttc gtggttaagca cgccggaggg 21240
 ggaaagatat ttcccctgcg tgaatatctc cgggtgagccg gaggcgtatt tccgtatgtc 21300
 gccggaagac tggctgcagg cagaaatgca ggggtgagatt gtggcgctgg tccacagcca 21360
 ccccggtggg ctgccctggc tgagtgaggc cgaccggcgg ctgcaggtgc agagtgattt 21420
 gccgtgggtg ctggtctgcc gggggacgat tcataagttc cgctgtgtgc cgcactcac 21480
 cgggcggcgc ttgagcacg gtgtgacgga ctgttacaca ctgttcggg atgcttatca 21540
 tctggcgggg attgagatgc cggactttca tcgtgaggat gactgggtggc gtaacggcca 21600
 gaatctctat ctggataatc tggaggcgcg ggggctgtat caggtgccgt tgtcagcggc 21660
 acagccgggc gatgtgctgc tgtgctgttt tggttcatca gtgccgaatc acgccgaat 21720
 ttactgcccg cagcggcagc tgctgcacca tattcctgaa caactgagca aacgagagag 21780
 gtacaccgac aaatggcagc gacgcacaca ctccctctgg cgtcacccgg catggcgcgc 21840
 atctgccttt acggggattt acaacgattt ggtcgcgcga tcgaccttcg tgtgaaaacg 21900
 ggggctgaag ccatccgggc actggccaca cagctcccgg cgtttcgtca gaaactgagc 21960
 gacggctggg atcaggtacg gattgccggg cgggacgtca gcacgtccgg gtaaacggcg 22020
 cagttacatg agactctgcc tgatggcgtc gtaattcata ttgttcccag agtcgccggg 22080
 gccaaagtcag gtggcgtatt ccagattgtc ctgggggctg ccgccattgc cggatcattc 22140
 tttaccgccg gagccaacct tgcagcatgg ggggcagcca ttggggccgg tggtatgacc 22200
 ggcactctgt tttctctcgg tgccagtatg gtgctcgggt gtgtggcgca gatgctggca 22260
 ccgaaagcca gaactccccg tatacagaca acggataacg gtaagcagaa cacctatttc 22320
 tcctcactgg ataacatggg tgcccagggc aatgttctgc ctgttctgta cggggaaatg 22380
 cgcgtggggg cacgcgtggg ttctcaggag atcagcacgg cagacgaagg ggacgggtgg 22440
 caggttgtgg tgattggctc ctgatgcaa atgttttatg tgaaaccgcc tgcgggcggg 22500
 tttgtcattt atggagcgtg aggaatggg aaaggaagca gtaaggggca taccgccgcg 22560
 gaagcgaagg acaacctgaa gtccacgcag ttgctgagtg tgatcgatgc catcagcgaa 22620
 gggccgattg aaggtccggg ggatggctta aaaagcgtgc tgctgaacag tacgccgggtg 22680
 ctggacactg aggggaatac caacatatcc ggtgtcacgg tggtgttccg ggctgggtgag 22740
 caggagcaga ctccgccgga gggattttaa tcctccggct ccgagacggg gctgggtacg 22800
 gaagtgaat atgacacgcc gatcaccgcc accattacgt ctgcaaacat cgaccgtctg 22860

ES 2 699 652 T3

cgctttacct tcggtgtaca ggcaactggtg gaaaccacct caaaggtga caggaatccg 22920
 tcggaagtcc gcctgctggt tcagatacaa cgtaacggtg gctgggtgac ggaaaaagac 22980
 atcaccatta agggcaaaac cacctcgcag tatctggcct cgggtggtgat gggtaacctg 23040
 ccgccgcgcc cgtttaatat ccggatgccc aggatgacgc cggacagcac cacagaccag 23100
 ctgcagaaca aaacgctctg gtcgtcatac actgaaatca tcgatgtgaa acagtgtctac 23160
 ccgaacacgg cactggtcgg cgtgcagggtg gactcggagc agttcggcag ccagcagggtg 23220
 agccgtaatt atcatctgcy cgggcgtatt ctgcagggtc cgtcgaacta taaccgcag 23280
 acgcggcaat acagcggat ctgggacgga acgtttaaac cggcatacag caacaacatg 23340
 gcctggtgtc tgtgggatat gctgacccat ccgcgctacg gcatggggaa acgtcttgg 23400
 gcggcggatg tggataaatg ggcgctgtat gtcactcggc agtactgcga ccagtcagt 23460
 ccggacggct ttggcggcac ggagccgcgc atcacctgta atgcgtacct gaccacacag 23520
 cgtaaggcgt gggatgtgct cagcgatttc tgctcggcga tgcgctgtat gccggtatgg 23580
 aacgggcaga cgctgacgtt cgtgcaggac cgaccgtcgg ataagacgtg gacctataac 23640
 cgcagtaatg tggatgatgcc ggatgatggc gcgccgttcc gctacagctt cagcgccctg 23700
 aaggaccgcc ataatgccgt tgaggtgaac tggattgacc cgaacaacgg ctgggagacg 23760
 gcgacagagc ttgttgaaga tacgcaggcc attgcccgtt acggtcgtaa tgttacgaag 23820
 atggatgcct ttggctgtac cagccggggg caggcacacc gcgccgggct gtggctgatt 23880
 aaaacagaac tgctggaaac gcagaccgtg gatttcagcg tcggcgcaga agggcttgc 23940
 catgtaccgg gcgatgttat tgaaatctgc gatgatgact atgccggtat cagcaccgg 24000
 ggtcgtgtgc tggcgggtgaa cagccagacc cggacgctga cgctcgaccg tgaaatcacg 24060
 ctgccatcct ccggtaccgc gctgataagc ctggttgacg gaagtggcaa tccggtcagc 24120
 gtggaggttc agtccgtcac cgacggcgtg aaggtaaaag tgagccgtgt tctgacgg 24180
 gttgctgaat acagcgtatg ggagctgaag ctgccgacgc tgcgccagcg actgttccgc 24240
 tgcgtgagta tccgtgagaa cgacgacggc acgtatgcca tcaccgccgt gcagcatgtg 24300
 ccggaaaaag aggccatcgt ggataacggg gcgcactttg acggcgaaca gagtggcacg 24360
 gtgaatggtg tcacgccgcc agcgggtcag caoctgaccg cagaagtcac tgcagacagc 24420
 ggggaatata aggtgctggc gcgatgggac acaccgaagg tggatgaagg cgtgagtttc 24480
 ctgctccgtc tgaccgtaac agcggacgac ggcagtgagc ggctggtcag cacggccogg 24540
 acgacggaaa ccacataccg cttcacgcaa ctggcgctgg ggaactacag gctgacagtc 24600
 cgggcggtaa atgcgtgggg gcagcagggc gatccggcgt cggtatcgtt ccggattgcc 24660
 gcaccggcag caccgtcgag gattgagctg acgccgggct attttcagat aaccgccacg 24720
 ccgcatcttg ccgtttatga cccgacggta cagtttgagt tctggttctc ggaaaagcag 24780

ES 2 699 652 T3

attgocgata tcagacaggt tgaaccagc acgcggtatc ttggtacggc gctgtactgg 24840
 atagccgcca gtatcaatat caaacccggc catgattatt acttttatat ccgcagtggt 24900
 aacaccgttg gcaaatcggc attcgtggag gccgtcggtc gggcgagcga tgatgcggaa 24960
 gggtacctgg attttttcaa aggcaagata accgaatccc atctcggcaa ggagctgctg 25020
 gaaaaagtgc agctgacgga ggataacgcc agcagactgg aggagttttc gaaagagtgg 25080
 aaggatgcca gtgataagtg gaatgccatg tgggctgtca aaattgagca gaccaaagac 25140
 ggcaaacatt atgtcgcggg tattggcctc agcatggagg acacggagga aggcaaactg 25200
 agccagtttc tggttgccgc caatcgtatc gcatttattg acccggcaaa cgggaatgaa 25260
 acgccgatgt ttgtggcgca gggcaaccag atattcatga acgacgtggt cctgaagcgc 25320
 ctgacggccc ccaccattac cagcggcggc aatcctcggc ccttttccct gacaccggac 25380
 ggaaagctga ccgctaaaaa tgcggatata agtggcagtg tgaatgcgaa ctccgggacg 25440
 ctcagtaatg tgacgatagc tgaaaaactgt acgataaacg gtacgctgag ggcggaaaaa 25500
 atcgtcgggg acattgtaaa ggcggcgagc gcggcttttc cgcgccagcg tgaaagcagt 25560
 gtggactggc cgtcaggtac ccgtactgtc accgtgaccg atgaccatcc ttttgatcgc 25620
 cagatagtgg tgcttccgct gacgtttcgc ggaagtaagc gtactgtcag cggcaggaca 25680
 acgtattoga tgtgttatct gaaagtactg atgaacgggtg cgtgattta tgatggcgcg 25740
 gcgaacgagg cggtagcaggt gttctcccgt attgttgaca tgccagcggg tcggggaaac 25800
 gtgatcctga cgttcacgct tacgtccaca cggcattcgg cagatattcc gccgtatacg 25860
 tttgccagcg atgtgcaggt tatggtgatt aagaaacagg cgtgggcat cagcgtggtc 25920
 tgagtgtgtt acagaggttc gtccgggaac ggcggtttta ttataaaaca gtgagaggtg 25980
 aacgatgcgt aatgtgtgta ttgccgttgc tgtctttgcc gcacttgagg tgacagtcac 26040
 tccggcccgt gcggaaggtg gacatggtac gtttacgggtg ggctattttc aagtgaacc 26100
 gggtagcattg ccgtcgttgt cgggcgggga tacccggtgtg agtcatctga aagggattaa 26160
 cgtgaagtac cgttatgagc tgacggacag tgtgggggtg atggcttccc tggggttcgc 26220
 ccgctcgaaa aagagcagca cagtgatgac cggggaggat acgtttcact atgagagcct 26280
 gcgtggacgt tatgtgagcg tgatggccgg accggtttta caaatcagta agcaggtcag 26340
 tgcgtacgcc atggccggag tggctcacag tcgggtggtcc gccagtaca tggattaccg 26400
 taagacggaa atcactcccg ggtatatgaa agagacgacc actgccaggg acgaaagtgc 26460
 aatgcggcat acctcagtgg cgtggagtgc aggtatacag attaatacgg cagcgtccgt 26520
 cgttgttgat attgcttatg aaggctccgg cagtggcgac tggcgtactg acggattcat 26580
 cgttggggtc ggttataaat totgattagc caggtaaacac agtgttatga cagcccggcg 26640
 gaaccgggtg gcttttttgt ggggtgaata tggcagtaaa gatttcagga gtcctgaaag 26700
 acggcacagg aaaaccggta cagaactgca ccattcagct gaaagccaga cgtaacagca 26760

ES 2 699 652 T3

ccacggtggt ggtgaacacg gtgggctcag agaatccgga tgaagccggg cgttacagca 26820
 tggatgtgga gtacgggtcag tacagtgtca tcoctgcaggt tgacggtttt ccaccatogc 26880
 acgccgggac catcaccgtg tatgaagatt cacaaccggg gacgctgaat gattttctct 26940
 gtgccatgac ggaggatgat gcccggccgg aggtgctgcg tcgtcttgaa ctgatggtgg 27000
 aagaggtggc gcgtaacgcg tccgtggtgg cacagagtac ggagacgcg aagaaatcag 27060
 ccggcgatgc cagtgcacga gctgctcagg tcggggccct tgtgactgat gcaactgact 27120
 cagcacgcbc cgccagcacg tccgccggac aggctgcac gtcagctcag gaagcgtcct 27180
 ccggcgcaga agcggcatca gcaaaggcca ctgaagcggg aaaaagtgcc gcagccgcag 27240
 agtcctcaaa aaacgcgggc gccaccagtg ccggtgcggc gaaaacgtca gaaacgaatg 27300
 ctgcagcgtc acaacaatca gccgccacgt ctgcctccac cgcggccacg aaagcgtcag 27360
 aggccgccac ttcagcacga gatgcggtgg cctcaaaaga ggagcaaaa tcatcagaaa 27420
 cgaacgcac atcaagtgcc ggtcgtgcag cttcctcggc aacggcggca gaaaattctg 27480
 ccagggcggc aaaaacgtcc gagacgaatg ccaggtcac tgaacagca gcggaacgga 27540
 gcgcctctgc cgcgccagac gcaaaaacag cggcgccggg gagtgcgtca acggcatcca 27600
 cgaaggcgac agaggctgcg ggaagtgcgg tatcagcac gcagagcaaa agtgccggcag 27660
 aagcggcggc aatacgtgca gaaaattcgg caaacgtgc agaagatata gcttcagctg 27720
 tcgcgcttga ggatgcggac acaacgagaa aggggatagt gcagctcagc agtgcaacca 27780
 acagcacgtc tgaaacgctt gctgcaacgc caaaggcggg taaggtggtg atggatgaaa 27840
 cgaacagaaa agcccactgg acagtccggc actgaccgga acgccaacag caccaaccgc 27900
 gctcagggga acaacaata ccagattgc gaacaccgct tttgtactgg ccgcgattgc 27960
 agatgttacc gacgogtcac ctgacgcact gaatacgtg aatgaactgg ccgcagcgtc 28020
 cgggaatgat ccagatthttg ctaccaccat gactaacgcg cttgcgggta aacaaccgaa 28080
 gaatgcgaca ctgacggcgc tggcagggct ttccacggcg aaaaataaat taccgtatth 28140
 tgcggaaaat gatgccgcca gcctgactga actgactcag gttggcaggg atattctggc 28200
 aaaaaattcc gttgcagatg ttcttgaata ccttggggcc ggtgagaatt ctaagcggag 28260
 atgccttagt gattthtaac tattgctggc agcattcttg agtccaatat aaaagtattg 28320
 tgtaccttht gctgggtcag gttgttctth aggaggagta aaaggatcaa atgcactaaa 28380
 cgaaactgaa acaagcgcac gaaaatatcc cthtgggatt cttgactcga taagtctatt 28440
 atthtcagag aaaaaatatt cattgthttc tgggttggtg attgcaccaa tcattccatt 28500
 caaaattgth gthttaccac acccattccg ccogataaaa gcatgaatgt tcgtgctggg 28560
 catagaatta accgtcacct caaaaggtat agthaaatca ctgaatccgg gagcacttht 28620
 tctattaat gaaaagtgga aatctgacaa thctggcaaa ccatttaaca cacgtgcgaa 28680

ES 2 699 652 T3

ctgtccatga atttctgaaa gagttacccc tctaagtaat gaggtgttaa ggacgctttc 28740
 attttcaatg tccgctaate gatttggcca tactactaaa tcctgaatag ctttaagaag 28800
 gttatgttta aaaccatcgc ttaatttgct gagattaaca tagtagtcaa tgctttcacc 28860
 taaggaaaaa aacatttcag ggagttgact gaatttttta tctattaatg aataagtgtc 28920
 tacttcttct ttttgacctt caaaaccaat ttaacattt ccgatatcgc atttttcacc 28980
 atgctcatca aagacagtaa gataaaacat tgtaacaaag gaatagtcat tccaaccatc 29040
 tgctcgtagg aatgccttat ttttttctac tgcaggaata taccgcctc tttcaataac 29100
 actaaactcc aacatatagt aacccttaat tttattaaaa taaccgcaat ttatttggcg 29160
 gcaacacagg atctctcttt taagttactc tctattacat acgttttcca tctaaaaatt 29220
 agtagtattg aacttaacgg ggcacgtat tgtagttttc catatttagc tttctgcttc 29280
 cttttggata acccactggt attcatggtg catgggtcac tgtttatacc aacgatatag 29340
 tctattaatg catatatagt atcgccgaac gattagctct tcaggcttct gaagaagcgt 29400
 ttcaagtact aataagcoga tagatagcca cggacttctg agccattttt cataagtgtt 29460
 aacttccgct cctcgtcat aacagacatt cactacagtt atggcggaaa ggtatgcatg 29520
 ctgggtgtgg ggaagtcgtg aaagaaaaga agtcagctgc gtcgtttgac atcactgcta 29580
 tcttcttact ggttatgcag gtcgtagtgg gtggcacaca aagctttgca ctggattgcg 29640
 aggctttgtg cttctctgga gtgcgacagg tttgatgaca aaaaatttagc gcaagaagac 29700
 aaaaatcacc ttgcgctaata gctctgttac aggtcactaa taccatctaa gtagttgatt 29760
 catagtgact gcatatggtg tgttttacag tattatgtag tctgtttttt atgcaaaaatc 29820
 taatttaata tattgatatt tatatcattt tacgtttctc gttca 29865

<210> 11
 <211> 2244
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

5

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..2244
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

10

<400> 11
 atggcgcggt ccaaaaactgc tcagccaaaa cactcactgc gtaaaatcgc agttgtagta 60
 gccacagcgg ttagcggcat gtctgtttat gcacaggcag cggttgaacc gaaagaagac 120
 actatcaccg ttaccgctgc acctgcgccg caagaaagcg catggggggcc tgctgcaact 180
 attgcggcgc gacagtctgc taccggcact aaaaccgata cgccgattca aaaagtgcc 240
 cagtctattt ctgttgtagc cgccgaagag atggcgcgtc atcagccgaa gtcggtaaaa 300
 gaagcgtta gctacacgcc ggggtgtctct gttggtacgc gtggcgcac caacacctat 360

ES 2 699 652 T3

gaccacctga tcattcgcgg ctttgccgca gaaggccaaa gccagaataa ctatctgaat 420
ggcctgaagt tgcagggcaa cttctataac gatgcggtca ttgaccogta tatgctggaa 480
cgcgctgaaa ttatgcgtgg cccggtttcc gtgctttacg gtaaaagcag tcctggcggc 540
ctgttgaata tggtcagcaa gcgtccgacc accgaaccgc tgaagaagt tcagtttaaa 600
gccggtactg acagcctggt ccagactggt tttgacttta gcgattcgtt ggatgatgac 660
ggtgtttact cttatcgcct gaccggtcct gcgcgttctg ccaatgccca gcagaaaggg 720
tcagaagagc agcgttatgc tattgcaccg gcgttcacct ggcgtccgga tgataaaaacc 780
aattttacct tcctttctta cttccagaac gagccggaaa ccggttatta cggctggttg 840
ccgaaagagg gaaccggtga gccgctgccg aacggtaagc gtctgccgac agactttaat 900
gaaggggcca agaacaacac ctattctcgt aatgagaaga tggtcggcta cagcttcgat 960
cacgaattta acgacacct tactgtcgtc cagaacctgc gctttgctga aaacaaaacc 1020
tcgcaaaaaca gcgtttatgg ttacggcgtc tgctccgatc cggcgaatgc ttacagcaaa 1080
cagtgtcggc cattagcgc agcggataaa ggccattatc tggcacgtaa atacgtcgtt 1140
gatgatgaga agctgcaaaa cttctccgtt gataccagc tgacagcaa gtttgccact 1200
ggcgatatcg accacacct gctgaccggt gtcgacttta tgcgatgcg taatgacatc 1260
aacgcctggt ttggttacga cgactctgtg ccactgctca atctgtacaa tcoggtgaat 1320
accgatttgc acttcaatgc caaagatccg gcaaactccg gcccttaccg cattctgaat 1380
aaacagaaac aaacgggctg ttatgttcag gatcaggcgc agtgggataa agtgcgtggtc 1440
accctaggcg gtcgttatga ctgggcagat caagaatctc ttaaccgctg tgcggggacg 1500
accgataaac gtgatgacaa acagtttacc tggcgtggtg gtgttaacta cctgtttgat 1560
aatggtgtaa caccttactt cagctatagc gaatcgttt aaccttctc gcaagttggg 1620
aaggatggtg atattttcgc accgtctaaa ggtaagcagt atgaagtcgg cgtgaaatat 1680
gtaccggaag atcgtccgat ttagttact ggtgccgtgt ataatctcac taaaaccaac 1740
aacctgatgg cggaccctga gggttccttc ttctcggttg aagggtggca gatccgcgca 1800
cgtggcgtag aaatcgaagc gaaagcggcg ctgtcggcga gtgttaacgt agtcggttct 1860
tatacttaca ccgatgcgga atacaccacc gatactacct ataaaggcaa tacgcctgca 1920
caggtgccaa aacacatggc ttcgttgtgg gctgactaca ccttcttga cggctccgctt 1980
tcaggtctga cgtcgggcac cgggtggtcgt tatactggct ccagttatgg tgatccggct 2040
aactccttta aagtgggaag ttatacggtc gtggatgctg tagtacgta tgatctggcg 2100
cgagtcggca tggctggctc caacgtggcg ctgcatgta acaacctgtt cgatcgtgaa 2160
tacgtcggca gctgctttaa cacttatggc tgcttctggg gcgcagaacg tcaggtcgtt 2220
gcaaccgcaa ccttccgttt ctaa 2244

ES 2 699 652 T3

<210> 12
 <211> 1149
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

5

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..1149
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

10

<400> 12
 atgagtctga aagaaaaaac acaatctctg ttgccaacg catttggtta ccctgccact 60
 cacaccattc aggcgcctgg ccgcgtgaat ttgattggtg aacacaccga ctacaacgac 120
 ggtttcgttc tgccctgcgc gattgattat caaacctgga tcagttgtgc accacgcgat 180
 gaccgtaaag ttcgcgtgat ggcagccgat tatgaaaatc agctcgacga gttttccctc 240
 gatgcgcccc ttgtgcgaca tgaaaactat caatgggcta actacgttcg tggcgtggtg 300
 aaacatctgc aactgcgtaa caacagcttc ggcggcgtgg acatggtgat cagcggcaat 360
 gtgccgcagg gtgccgggtt aagttcttcc gcttcaactg aagtcgcggt cggaaccgta 420
 ttgcagcagc tttatcatct gccgctggac ggcgcacaaa tcgcgcttaa cggtcaggaa 480
 gcagaaaacc agtttgtagg ctgtaactgc gggatcatgg atcagctaat ttccgcgctc 540
 ggcaagaaaag atcatgcctt gctgatcgat tgccgctcac tggggaccaaa agcagtttcc 600
 atgcccaaag gtgtggctgt cgtcatcatc aacagtaact tcaaacgtac cctggttggc 660
 agcgaataca acaccctcg tgaacagtgc gaaaccggtg cgcgtttctt ccagcagcca 720
 gccctgcgtg atgtcaccat tgaagagttc aacgctggtg cgcctgaact ggaccogato 780
 gtggcaaaaac gcgtgcgtca tatactgact gaaaacgccc gcaccgttga agctgccagc 840
 gcgctggagc aaggcgacct gaaacgtatg ggcgagttga tggcggagtc tcatgcctct 900
 atgcgcgatg atttcgaaat caccgtgccg caaattgaca ctctggtaga aatcgtcaaa 960
 gctgtgattg gcgacaaaagg tggcgtacgc atgaccggcg gcggatttgg cggctgtatc 1020
 gtcgcgctga tcccgggaaga gctggtgcct gccgtacagc aagctgtcgc tgaacaatat 1080
 gaagcaaaaa caggtattaa agagactttt tacgtttgta aaccatcaca aggagcagga 1140
 cagtgcctga 1149

15

<210> 13
 <211> 1701
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

20

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..1701
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 13

ES 2 699 652 T3

atggcgattg caattggcct cgatthttggc agtgattctg tgcgagcttt ggcggtggac 60
 tgcgctaccg gtgaagagat cgccaccagc gtagagtggg atccccgttg gcagaaaggg 120
 caatthttgtg atgccccgaa taaccagttc cgtcatcatc cgcgtgacta cattgagtca 180
 atggaagcgg cactgaaaac cgtgcttgca gagcttagcg tcgaacagcg cgcagctgtg 240
 gtcgggattg gcggtgacag taccggctcg acgcccgcac cgattgatgc cgacggaaac 300
 gtgctggcgc tgcgcccgga gtttgccgaa aaccogaacg cgatggtcgt attgtggaaa 360
 gaccacactg cggttgaaga agcgggaagag attaccogtt tgtgccacgc gccgggcaac 420
 gttgactact cccgctacat tgggtggtatt tattccagcg aatggttctg ggcaaaaatc 480
 ctgcatgtga ctcgccagga cagcgcogtg gcgcaatctg ccgcatcgtg gattgagctg 540
 tgcgactggg tgccagctct gctttccggt accaccogcc cgcaggatat tcgtcgggga 600
 cgttgcagcg ccgggcataa atctctgtgg cacgaaagct ggggcggcct gccgccagcc 660
 agtttctttg atgagctgga ccgatactc aatcgccatt tgccttcccc gctggtcact 720
 gacacttggg ctgcccgatat tccggtgggc accttatgcc cggaatgggc gcagcgtctc 780
 ggcctgcctg aaagcgtggt gatttccggc ggcgcgthttg actgccatat gggcgcagtt 840
 ggcgcaggcg cacagcctaa cgcactggta aaagttatcg gtacttccac ctgcgacatt 900
 ctgattgccg acaaacagag cgttggcgag cgggcagtta aaggtatthtgc cggtcaggtt 960
 gatggcagcg tggtgcctgg atthtatcggg ctggaagcag gccaatcggc gthttggtgat 1020
 atctacgcct ggtthtggctg cgtactcggc tggccgctgg aacagctthgc cgcccagcat 1080
 ccggaactga aaacgcaaat caacgccagc cagaaacaac tgcttccggc gctgaccgaa 1140
 gcatgggcca aaaatccgtc tctggatcac ctgcccgtgg tgctcagctg gthtaacggc 1200
 cgccgcacac cgaacgctaa ccaacgcctg aaaggggtga ttaccgatct taacctcgtc 1260
 accgacgctc cgctgctgth cggcggthttg attgctgcca ccgcctthtg cgcacgcgca 1320
 atcatggagt gctthtaccga tcaggggatc gccgthtaata acgtgatggc actgggcggc 1380
 atcgcgcgga aaaaccaggt cattatgcag gcctgctgcg acgtgctgaa tcgcccgctg 1440
 caaattgtht cctctgacca gtgctgtgcg ctcggtgogg cgatthttgc tgcogtgcgc 1500
 gcgaaagtgc acgcagacat cccatcagct cagcaaaaaa tggccagthgc ggtagagaaa 1560
 accctgcaac cgtgcagcga gcaggcacia cgctthtgaac agctthtctg ccgctatcag 1620
 caatgggcga tgagcgcgga acaacactat ctccaactt ccgccccggc acaggctgcc 1680
 caggccgtht gcactctata a 1701

<210> 14
 <211> 1503
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

ES 2 699 652 T3

<220>

<221> fuente

<222> 1..1503

5 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 14

```

atgacgattt ttgataatta tgaagtgtgg tttgtcattg gcagccagca tctgtatggc      60
ccgгааaccс tgcgtcaggt cacccaacat gccgagcacg tcgttaatgc gctgaatacg      120
gaagcgaaac tgccctgcaa actggtgttg aaaccgctgg gcaccacgcc ggatgaaatc      180
accgctattt gccgcgacgc gaattacgac gatcgttgcg ctggtctggt ggtgtggctg      240
cacaccttct ccccggccaa aatgtggatc aacggcctga ccatgctcaa caaaccttg      300
ctgcaattcc acaccagtt caacgcggcg ctgccgtggg acagtatcga tatggacttt      360
atgaacctga accagactgc acatggcggg cgcgagttcg gcttcattgg cgcgcgatg      420
cgtcagcaac atgccgtggg taccggtcac tggcaggata aacaagccca tgagcgtatc      480
ggctcctgga tgcgtcaggc ggtctctaaa caggataccc gtcactgaa agtctgccga      540
tttggcgata acatgcgtga agtggcggtc accgatggcg ataaagtgc cgcacagatc      600
aagttcgggt tctccgtcaa tacctgggcg gttggcgatc tggcagcagg ggtgaactcc      660
atcagcgacg gcgatgttaa cgcgctggtc gatgagtacg aaagctgcta caccatgacg      720
cctgccacac aatccacgg caaaaaacga cagaacgtgc tggaagcggc gcgtattgag      780
ctggggatga agcgtttcct ggaacaaggt ggcttccacg cgttcaccac caccttgaa      840
gatttgacag gtctgaaaca gcttctggt ctggccgtac agcgtctgat gcagcagggt      900
tacggctttg cgggcgaagg cgactggaaa actgccgccc tgcttcgcat catgaagggt      960
atgtcaaccg gtctgcaggg cggcacctcc tttatggagg actacaccta tcacttcgag     1020
aaaggtaatg acctggtgct cggctcccat atgctggaag tctgcccgtc gatcgcgcga     1080
gaagagaaac cgatcctcga cgttcagcat ctcggtattg gtggtaaagga cgatcctgcc     1140
cgcctgatct tcaataccca aaccggccca gcgattgtcg ccagcttgat tgatctcggc     1200
gatcgttacc gtctactggt taactgcatc gacacggtga aaacaccgca ctccctgccg     1260
aaactgccgg tggcgaatgc gctgtgaaa gcgcaaccgg atctgccaac tgcttccgaa     1320
gcgtggatcc tcgctggtgg cgcgcacat accgtcttca gccatgcact gaacctcaac     1380
gatatgcgcc aattcgccga gatgcacgac attgaaatca cggtgattga taacgacaca     1440
cgcctgccag cgtttaaaga cgcgctgccc tggaacgaag tgtattacgg gtttcgtcgc     1500
taa                                                                 1503

```

10 <210> 15

<211> 2355

<212> ADN

<213> Escherichia coli

ES 2 699 652 T3

<220>

<221> fuente

<222> 1..2355

5 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 15

ES 2 699 652 T3

atgaatcctg	agcgttctga	acgcattgaa	atccccgtat	tgccgctgcg	cgatgtggtg	60
gtttatccgc	acatggtcat	ccccctat	gtcgggcggg	aaaaatctat	ccgttgtctg	120
gaagcggcga	tggaccatga	taaaaaatt	atgctggtcg	cgcagaaaga	agcttcaacg	180
gatgagccgg	gtgtaaacga	tcttttcacc	gtcgggaccg	tggcctctat	attgcagatg	240
ctgaaaactgc	ctgacggcac	cgtcaaagtg	ctggtcgagg	ggttacagcg	cgcgcgtatt	300
tctgcgctct	ctgacaatgg	cgaacacttt	tctgcgaagg	cggagtatct	ggagtgcgcc	360
accattgatg	agcgggaaca	ggaagtgctg	gtgcgtactg	caatcagcca	gttcgaaggc	420
tacatcaagc	tgaacaaaaa	aatcccacca	gaagtgctga	cgtcgtgaa	tagcatcgac	480
gatccggcgc	gtctggcggg	taccattgct	gcacatatgc	cgtgaaaact	ggctgacaaa	540
cagtctgttc	tggagatgtc	cgacgttaac	gaacgtctgg	aatatctgat	ggcaatgatg	600
gaatcgaaa	tcgatctgct	gcaggttgag	aaacgcattc	gcaaccgcgt	taaaaagcag	660
atggagaaat	cccagcgtga	gtactatctg	aacgagcaaa	tgaaagctat	tcagaaaagaa	720
ctcggtgaaa	tggacgacgc	gccggacgaa	aacgaagccc	tgaagcgcaa	aatcgacgcg	780
gcgaagatgc	cgaaagaggc	aaaagagaaa	gcggaagcag	agttgcagaa	gctgaaaatg	840
atgtctccga	tgtcggcaga	agcgaccgta	gtgcgtggtt	atatcgactg	gatggtacag	900
gtgccgtgga	atgcgcgtag	caaggtcaaa	aaagacctgc	gtcagggcga	ggaaatcctt	960
gataccgacc	attatggtct	ggagcgcgtg	aaagatcgaa	tccttgagta	tcttgcggtt	1020
caaagccgtg	tcaacaaaat	caagggaccg	atcctctgcc	tggtagggcc	gccgggggta	1080
ggtaaaacct	ctcttggtca	gtccattgcc	aaagccaccg	ggcgtaaata	tgtccgtatg	1140
gcgctgggcg	gcgtgcgtga	tgaagcggaa	atccgtggtc	accgccgtac	ttacatcggt	1200
tctatgccgg	gtaaactgat	ccagaaaatg	gcgaaagtgg	gcgtgaaaaa	cccgtgttc	1260
ctgctcgatg	agatcgacaa	aatgtcttct	gacatgcgtg	gcgatccggc	ctctgcactg	1320
cttgaagtgc	tggatccaga	gcagaacgta	gcgttcagcg	accactacct	ggaagtggat	1380
tacgatctca	gcgacgtgat	gtttgtcgcg	acgtcgaact	ccatgaacat	tccggcaccg	1440
ctgctggatc	gtatggaagt	gattcgcctc	tccggttata	ccgaagatga	aaaactgaac	1500
atcgccaaac	gtcacctgct	gccgaagcag	attgaacgta	atgcaactgaa	aaaaggtgag	1560
ctgaccgtcg	acgatagcgc	cattatcggc	attattcggt	actacaccgg	tgaggcgggc	1620
gtgcgtggtc	tggagcgtga	aatctccaaa	ctgtgtcgca	aagcggtaa	gcagttactg	1680
ctcgataagt	cattaaaaaca	tatcgaaatt	aacggcgata	acctgcatga	ctatctcggt	1740
gttcagcgtt	tcgactatgg	tcgcgcggat	aacgaaaacc	gtgtcgggtca	ggtaaccgggt	1800

ES 2 699 652 T3

ctggcgtgga cggaagtggg cggtgacttg ctgaccattg aaaccgcatg tgttccgggt 1860
 aaaggcaaac tgacctatac cggttcgcctc ggcgaagtga tgcaggagtc cattcaggcg 1920
 gcgttaacgg tggttcgtgc gcgtgcgga aaactgggga tcaaccctga tttttacgaa 1980
 aaacgtgaca tccacgtcca cgtaccggaa ggtgcgacgc cgaaagatgg tccgagtgcc 2040
 ggtattgcta tgtgcaccgc gctggtttct tgccctgaccg gtaaccgggt tcgtgccgat 2100
 gtggcaatga ccggtgagat cactctgcgt ggtcaggtac tgccgatcgg tggtttgaaa 2160
 gaaaaactcc tggcagcgca tcgcgcgggg attaaaacag tgctaattcc gttcgaaaat 2220
 aaacgcgatc tgggaagat tcttgacaac gtaattgccg atctggacat tcatcctgtg 2280
 aagcgcattg aggaagttct gactctggcg ctgcaaatg aaccgtctgg tatgcaggtt 2340
 gtgactgcaa aatag 2355

<210> 16
 <211> 954
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..954
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 16
 atgcggggcga aacttctggg aatagtctctg acaaccoccta ttgcgatcag ctcttttctg 60
 tctaccgaga ctttatcggt tactcctgac aacataaatg cggacattag tcttggaaact 120
 ctgagcggaa aaacaaaaga gcgtgtttat ctagccgaag aaggaggccg aaaagtccgt 180
 caactcgact ggaaattcaa taacgctgca attattaaag gtgcaattaa ttgggatttg 240
 atgccccaga tatctatcgg ggctgctggc tggacaactc tcggcagccg aggtggcaat 300
 atggctgatc aggactggat ggattccagt aaccocggaa cctggacgga tgaaagtaga 360
 caccctgata cacaactcaa ttatgccaac gaatttgatc tgaatatcaa aggctggctc 420
 ctcaacgaac ccaattaccg cctgggactc atggccggat atcaggaaag ccgttatagc 480
 tttacagcca gaggtgggtc ctatatctac agttctgagg agggattcag agatgatatc 540
 ggctccttcc cgaatggaga aagagcaatc ggctacaaac aacgttttaa aatgccctac 600
 attggcttga ctggaagtta tcgttatgaa gattttgaac tcggtggcac atttaataac 660
 agcggctggg tggaatcatc tgataacgat gaacactatg acccgggaaa aagaatcact 720
 tatcgcagta aggtcaaaga ccaaaattac tattctgttg cagtcaatgc aggttattac 780
 gtcacaccta acgcaaaagt ttatgttgaa ggcgcatgga atcgggttac gaataaaaaa 840
 ggtaataactt cactttatga tcacaataat aacacttcag actacagcaa aaatggagca 900
 ggtatagaaa actataactt catcactact gctggtctta agtacacatt ttaa 954

15

ES 2 699 652 T3

<210> 17
 <211> 624
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

5

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..624
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

10

<400> 17
 atgtcaacga ttattatgga tttatgtagt tacacccgac taggtttaac cgggtatctg 60
 ttgagtagag gggttaaaaa aagagaaatc aacgacattg aaaccgttga tgaccttgcc 120
 atagcttggtg attcacagcg cccttcagtg gtggttatta atgaggactg tttcatccac 180
 gatgcttcta acagtcagcg tatcaagctc atcattaatc aacatcccaa tacgttattt 240
 atcgttttta tggcaattgc caatgttcat tttgatgaat atctattggt cagaaaaaat 300
 ttattgatca gttctaaatc gattaaaccg gaatctctcg acgatatcct tggcgatatt 360
 ctgaaaaaag agacaacgat aacctcgttt ttaaataatgc cgacgttatc attgagccga 420
 accgaatcga gtatgttgcg aatgtggatg gcaggtcagg gaaccattca aatctctgac 480
 caaatgaata tcaaagccaa gaccgtttca tcgcataaag gtaatattaa acgtaagatc 540
 aaaacgcata ataaacaggt tatctacat gtcgtccgac tgacggataa tgtgactaat 600
 ggtatTTTTG tcaacatgCG ctaa 624

15

<210> 18
 <211> 3567
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

20

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..3567
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 18
 atgttatggg ccttaaatat ttggacagge ccgcacagca atggattaat aacaatgatg 60
 aataaatcca attttgaatt cctgaagggc gtcaacgact tcacttatgc catcgctgt 120
 gcggcggaaa ataactacco ggatgatccc aacacgacgc tgattaaaat gcgtatgttt 180
 ggogaagcca cagcgaaca tcttggctg ttactcaaca tcccccttg tgagaatcaa 240
 cacgatctcc tgcgtgaact cggcaaaatc gcctttgttg atgacaacat cctctctgta 300
 tttcaciaat tacgccgat tggtaaccag gcggtgcacg aatatcataa cgatctcaac 360
 gatgcccaga tgtgcctgcg actcgggttc cgcctggctg tctggtacta ccgtctggtc 420
 actaaagatt atgacttccc ggtgccggtg tttgtgttgc cggaacgtgg tgaaaacctc 480

25

ES 2 699 652 T3

tatcaccagg aagtgctgac gctaaaacaa cagcttgaac agcagggtgcg agaaaaagcg 540
cagactcagg cagaagtcga agcgcaacag cagaagctgg ttgccctgaa cggctatatac 600
gccattctgg aaggcaacaa gcaggaaacc gaagcgcaaa cccaggctcg ccttgccggca 660
ctggaagcac agctcgccga gaagaacgcg gaactggcaa aacagaccga acaggaacgt 720
aaggcttacc acaaagaaat taccgatcag gccatcaagc gcacactcaa ccttagcgaa 780
gaagagagtc gcttctgat tgatgcgcaa ctgctgtaaag caggctggca ggccgacagc 840
aaaaccctgc gcttctcaa aggcgcacgt ccggaaccg gcgtaataa agccattgcc 900
gaatggccga ccggaagaaga tgaaacgggt aatcagggtc ttgcccatta tgtgctgttt 960
gtcggcctca aaccatcgc ggtggtagag gcgaaacgta acaatatcga cgttcccgcc 1020
aggctcaatg agtcgtatcg ctacagtaaa tgtttcgata atggcttctc gcgggaaacc 1080
ttgcttgagc actactcacc ggatgaagtg catgaagcag tgccagagta tgaaaccagc 1140
tggcaggaca ccagcggcaa acaacggtt aaaatcccct tctgctactc gaccaacggg 1200
cgcaataacc gcgcaacaat gaagaccaa agcggcatct ggtatcgcga cgtgctgat 1260
accgcaata tgtcgaaagc cttaccgagc tggcaccgcc ccggaagagc gctggaaatg 1320
ctcggcagcg aaccgcaaaa acagaatcag tggtttgcg ataaccctgg catgagcgag 1380
ctgggcctgc gttattatca ggaagatgcc gtccgcgcgg ttgaaaaggc aatcgtcaag 1440
gggcaacaag agatcctgct ggcgatggcg accggtaccg gtaaaaccg tacggcaatc 1500
gccatgatgt tccgctgat ccagtcocag cgttttaaac gcattctctt ccttgctgac 1560
cgccgttctc ttggcgaaca ggcgctgggc gcgtttgaag atacgcgtat taacggcgac 1620
accttaaca gcattttcga cattaaggc ctgacggata aattcccga agacagcacc 1680
aaaattcacg ttgccaccgt acagtcgctg gtgaaacgca ccctgcaatc agatgaaccg 1740
atgccggtgg ccggttacga ctgtatcgtc gttgacgaag cgcacgcgg ctatattctc 1800
gataaagagc agacogaagg cgaactgcag ttccgcagcc agctggatta cgtctctgcc 1860
taccgtcgca ttctogatca cttcgatgcg gtaaaaatcg ctctcaccgc cccccggcg 1920
ctacatactg tgcagatttt cggcgagccg gtttacggtt atacctaccg tacccgggtt 1980
atcgacggtt ttctgatcga ccaggatccg cctattcaga tcatcaccgc caacgcgcag 2040
gaggggggtt atctctcaa aggcgagcag gtagagcgca tcagcccga gggagaagtg 2100
atcaatgaca ccctggaaga cgatcaggat tttgaagtgc ccgactttaa ccgtggcctg 2160
gtgatcccgg cgtttaaccg cgccgtctgt aacgaactca ccaattatct tgacccgacc 2220
ggatcgcaaa aaacgctggc cttctgcgtc accaatgccc atgccgatat ggtggtggaa 2280
gagctgcgtg ccgcttcaa gaaaaagtat ccgcaactgg agcacgacgc gatcatcaag 2340
atcaccggtg atccgataa agacgcgcgc aaagtgcaga ccatgatcac ccgcttcaat 2400
aaagagcggc tgcccaatat cgtggttaacc gtcgacctgc tgacgaccgg cgtcgatatt 2460

ES 2 699 652 T3

```

ccgtcgatct gtaatatcgt gttcctgCGT aaagtacgca gccgcattct gtacgaacag      2520
atgaaaaggcc gcgccacgCG cttatgcccG gaggtgaata aaaccagctt taagattttt      2580
gactgtgtCG atatctacag cacgctggag agcgtcgaca ccatgcgtcc ggtggTggtg      2640
cgcccgaagg tggaaactgca aacgctggTc aatgaaatta ccgattcaga aacctataaa      2700
atcaccgaag cggatggccG cagttttgCC gagcacagcc atgaacaact ggtggcgaag      2760
ctccagcGta tcatcggTct ggccacgTtt aaccgtgacc gcagcgaaac gatagataaa      2820
caggtgcGtc gtctggatga gctatgccag gacgCGggCG gCGTgaactt taacggcttc      2880
gcctcgcGCC tgcgggaaaa agggccgCAC tggagcGCCg aagtctttaa caaactgcct      2940
ggctttatCG cccgtctgga aaagctgaaa acggacatca acaacctgaa tgatgcGCCg      3000
atcttcctCG atatcgacga tgaagtggTg agtgtaaaat cGctgtacgg tgattacgac      3060
acgccgCagg atttcctCGa agcctttgac tCGctggTgc aacgttcccc gaacgcGcaa      3120
ccggcattgc aggcagttat taatcgcccG cGcgatctca cccgtaaagg gctggTcgag      3180
ctacaggagt ggtttgaccG ccagcacttt gaggaatctt ccctgcGcaa agcatggaaa      3240
gagacgcGca atgaagatat cGccgcccCG ctgattggTc atattcGCCg cGctgcggTg      3300
ggcGatgcGc tGaaaccgTt tGaggaacGt gTcGatcagc cGctgacGcg cattaagggc      3360
gaaaacgact ggagcagcGa gcaattaagc tggctcGatc gTttagcGca ggcGctgaaa      3420
gagaaaGtgg tGctcGacGa cGatgtcttc aaaaccggCa acttcaccG tCGcggcggg      3480
aaggcGatGc tGcaaagaac cTttgacGat aatctcGata ccctgctggg caaattcagc      3540
gattatatct gggacgagct ggcctga

```

<210> 19
 <211> 915
 5 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

<220>
 <221> fuente
 10 <222> 1..915
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 19

ES 2 699 652 T3

```

atgacggttc ctacctatga caaatattatt gaacctgttc tgcgttatct ggcaacaaaa      60
ccggaagggtg cagccgcgcg tgatgttcat gaggtgccg cggatgcatt aggactggat      120
gacagccagc gagcgaaagt cattaccagc ggacaacttg ttataaaaa tcgtgcaggc      180
tgggcgcgatg accgtttaa acgtgccggg ttgtcgcaa gtttgtcgcg tggcaaatgg      240
tgcctgactc ctgcggggtt tgactgggtt gcgtctcatc cccagccaat gacggagcag      300
gagacgaacc atctggcctt cgcttttgtg aatgtcaaac ttaagtcacg gccggatgcc      360
gtcgatttag atccgaaagc cgactctccc gatcatgaag aacttgcaa gagcagcccg      420

gacgatcggg tagatcaggc gctaaaagag cttcgtgatg cgggtggctga tgaggttctg      480
gaaaacttat tgcaggtttc tccttcgcgc tttgaagtca ttggtctgga tgttttgcac      540
cgcctggggg atggcggcca ccgtgatgat ttgcagcgtg ttggcgggtac tggagatggg      600
ggcatcgatg gtgtgatatc gcttgataaa cttggcctgg agaaagttaa tgttcaggca      660
aaacgttggc agaatactgt aggcaggcca gaattacagg cattttacgg cgcactggct      720
gggcaaaaag cgaaacgtgg ggtgtttatt accacttctg gatttacttc tcaggcgcgt      780
gactttgcc aatccgtcga gggatgggtg ttggttgatg gggaacgcct ggtgcactta      840
atgatcgaaa acgaagtagg ggtttcttca cgtttgttga aggtgccgaa actggatatg      900
gactattttg agtga                                                    915

```

<210> 20
 <211> 708
 <212> ADN
 <213> Escherichia coli

5

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..708
 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

10

<400> 20

ES 2 699 652 T3

```

atgtaccggt atttgtctat tgctgcggtg gtactgagcg cagcattttc cggcccggcg      60
ttggccgaag gtatcaatag tttttctcag gcgaaagccg cggcggtaaa agtccacgct      120
gacgcgcccc gtacgtttta ttgcggatgt aaaattaact ggcagggcaa aaaaggcggt      180
gttgatctgc aatcgtgcgg ctatcagggt cgcaaaaatg aaaaccgcgc cagccgcgta      240
gagtgggaac atgtcgttcc cgctggcag ttcggtcacc agcgccagtg ctggcaggac      300
ggtggacgta aaaactgcgc taaagatccg gtctatcgca agatggaaag cgatatgcat      360
aacctgcagc cgtcagtcgg tgaggtgaat ggcgatcgcg gcaactttat gtacagccag      420
tggaatggcg gtgaaggcca gtacggtcaa tgcgccatga aggtcgattt caaagaaaaa      480
gctgccgaac caccagcgcg tgcacgcggt gccattgcgc gcacctactt ctatatgcgc      540
gaccaataca acctgacact ctctcgccag caaacgcagc tgttcaacgc atggaacaag      600
atgtatccgg ttaccgactg ggagtgcgag cgcgatgaac gcatcgcgaa ggtgcagggc      660
aatcataacc cgtatgtgca acgcgcttgc caggcgcgaa agagctaa                      708

```

```

<210> 21
<211> 1062
5 <212> ADN
  <213> Escherichia coli

```

```

<220>
10 <221> fuente
    <222> 1..1062
    <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

```

```

<400> 21

```

ES 2 699 652 T3

atggctatcg acgaaaacaa acagaaagcg ttggcggcag cactgggcca gattgagaaa 60
caatttggtg aaggtccat catgcgctg ggtgaagacc gttccatgga tgtggaaacc 120
atctctaccg gttcgctttc actggatata gcgcttgggg caggtggtct gccgatgggc 180
cgtatcgtcg aaatctacgg accggaatct tccggtaaaa ccacgctgac gctgcaggtg 240
atcgccgcag cgcagcgtga aggtaaaacc tgtgcgttta tcgatgctga acacgcgctg 300
gaccaaatct acgcacgtaa actgggcgctc gatatcgaca acctgctgtg ctcccagccg 360
gacaccggcg agcaggcact ggaaatctgt gacgccctgg cgcgcttctgg cgcagtagac 420
gttatcgtcg ttgactccgt ggcggcactg acgccgaaag cggaaatcga aggcgaaatc 480
ggcgactctc acatgggcct tgcggcacgt atgatgagcc aggcgatgcg taagctggcg 540
ggtaacctga agcagtcca cacgctgctg atcttcatca accagatccg tatgaaaatt 600
ggtgtgatgt tcggtaacct ggaaaccact accggtggta acgcgctgaa attctacgcc 660
tctgttcgtc tcgacatccg tcgtatcggc gcggtgaaag agggcgaaaa cgtggtgggt 720
agcgaaacct gcgtgaaagt ggtgaagaac aaaatcgctg cgcgctttaa acaggctgaa 780
ttccagatcc tctacggcga aggtatcaac ttctacggcg aactggttga cctgggcgta 840
aaagagaagc tgatcgagaa agcaggcgcg tggtagctg acaaaggatga gaagatcgg 900
cagggtaaag cgaatgcgac tgcctggctg aaagataacc cggaaaccgc gaaagagatc 960
gagaagaaag tacgtgagtt gctgctgagc aaccggaact caacgccgga tttctctgta 1020
gatgatagcg aaggcgtagc agaaactaac gaagatTTTT aa 1062

5 <210> 22
<211> 306
<212> ADN
<213> Escherichia coli

10 <220>
<221> fuente
<222> 1..306
<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

<400> 22
atgcagttta aggtttacac ctataaaaga gagagccggt atcgtctggt tgtggatgta 60
cagagtgata ttattgacac gcccgggcga cggatggtga tccccctggc cagtgcacgt 120
ctgctgtcag ataaagtctc ccgtgaactt taccgggtgg tgcatatcgg ggatgaaagc 180
tggcgcagta tgaccaccga tatggccagt gtgccggtct ccgttatcgg ggaagaagtg 240
gctgatctca gccaccgcga aaatgacatc aaaaacgcca ttaacctgat gttctgggga 300
atataa 306

15 <210> 23
<211> 219
<212> ADN
<213> Escherichia coli

ES 2 699 652 T3

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..219
 5 <223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Escherichia coli"

 <400> 23
atgaagcagc gtattacagt gacagttgac agcgacagct atcagttgct caaggcatat 60
gatgtcaata tctccggtct ggtaagcaca accatgcaga atgaagcccg tcgtctgcgt 120
gccgaacgct ggaaagcggg aaatcagggg gggatggctg aggtcgcccg gtttattgaa 180
atgaacggct cttttgctga cgagaacagg gactggtga 219

10 <210> 24
 <211> 59
 <212> ADN
 <213> secuencias artificiales

15 <220>
 <221> fuente
 <222> 1..59
 <223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebadores XisgalKstart"/organismo="secuencias artificiales"

20 <400> 24
 gggggtaaat cccggcgctc atgacttcgc cttctcca gaattcctg tgacaatta 59

25 <210> 25
 <211> 60
 <212> ADN
 <213> secuencias artificiales

30 <220>
 <221> fuente
 <222> 1..60
 <223> /mol_tipo="ADN" /nota="parada XisgalK"/organismo="secuencias artificiales"

35 <400> 25
 gttctgatta ttgaaatct tctttgcct cagtgtag cagcactgct ctgctcctg 60

40 <210> 26
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> secuencias artificiales

45 <220>
 <221> fuente
 <222> 1..20
 <223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis1"/organismo="secuencias artificiales"

50 <400> 26
 gtctcaagt ggagcatcag 20

55 <210> 27
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> secuencias artificiales

<220>
 <221> fuente
 <222> 1..20
 <223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis4"/organismo="secuencias artificiales"

ES 2 699 652 T3

<400> 27
accaggacta tccgtatgac 20

5 <210> 28
<211> 35
<212> ADN
<213> secuencias artificiales

10 <220>
<221> fuente
<222> 1..35
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis2"/organismo="secuencias artificiales"

15 <400> 28
ccaaacggaa cagatgaaga aggccaagtc atgag 35

<210> 29
<211> 35
20 <212> ADN
<213> secuencias artificiales

<220>
<221> fuente
25 <222> 1..35
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis3"/organismo="secuencias artificiales"

<400> 29
gacttcgcct tctcatctg ttccgtttgg ctcc 35

30 <210> 30
<211> 21
<212> ADN
<213> secuencias artificiales

35 <220>
<221> fuente
<222> 1..21
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis6"/organismo="secuencias artificiales"

40 <400> 30
gtaatggaaa gctgtagtc g 21

<210> 31
45 <211> 20
<212> ADN
<213> secuencias artificiales

<220>
<221> fuente
50 <222> 1..20
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis5"/organismo="secuencias artificiales"

<400> 31
55 cagccgtaag tctgatctc 20

<210> 32
<211> 20
<212> ADN
60 <213> secuencias artificiales

<220>
<221> fuente
<222> 1..20
65 <223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis7"/organismo="secuencias artificiales"

ES 2 699 652 T3

<400> 32
cagcaggcat gatccaagag 20

5 <210> 33
<211> 35
<212> ADN
<213> secuencias artificiales

10 <220>
<221> fuente
<222> 1..35
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis2b"/organismo="secuencias artificiales"

15 <400> 33
ttgccctcc agtgtgaaga aggcgaagtc atgag 35

20 <210> 34
<211> 39
<212> ADN
<213> secuencias artificiales

25 <220>
<221> fuente
<222> 1..39
<223> /mol_tipo="ADN" /nota="cebador Xis8"/organismo="secuencias artificiales"

30 <400> 34
ctcatgactt cgccttctc acactggagg gcaaagaag 39

35 <210> 35
<211> 624
<212> ADN
<213> Fago lambda de enterobacteria

40 <220>
<221> fuente
<222> 1..624
<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

40 <400> 35
atgagactcg aaagcgtagc taaatttcat tcgccaaaaa gcccgatgat gagcgactca 60
ccacgggcca cggcttctga ctctctttcc ggtactgatg tgatggctgc tatgggggatg 120
gcgcaatcac aagccggatt cggtatggct gcattctgcg gtaagcacga actcagccag 180
aacgacaaac aaaaggctat caactatctg atgcaatttg cacacaaggt atcggggaaa 240
taccgtggtg tggcaaagct tgaaggaaat actaaggcaa aggtactgca agtgctcgca 300
acattcgctt atgcggatta ttgccgtagt gccgcgacgc cgggggcaag atgcagagat 360
tgccatggtg caggccgtgc ggttgatatt gccaaaacag agctgtgggg gagagttgtc 420
gagaaagagt gcggaagatg caaaggcgtc ggctattcaa ggatgccagc aagcgcagca 480
tatcgcgctg tgacgatgct aatcccaaac cttacccaac ccacctggtc acgcaactgtt 540
aagccgctgt atgacgctct ggtggtgcaa tgccacaaag aagagtcaat cgcagacaac 600
atthtgaatg cggtcacacg ttag 624

<210> 36
<211> 144

ES 2 699 652 T3

<212> ADN

<213> Fago lambda de enterobacteria

<220>

5 <221> fuente

<222> 1..144

<223> /mol_tipo="ADN"/organismo="Fago lambda de enterobacteria"

<400> 36

atggatcaaa cacttatggc tatccagact aaattcacta tcgccacttt tattggcgat 60

gaaaagatgt ttcgtgaagc cgtcgacgct tataaaaaat ggatattaat actgaaactg 120

10 agatcaagca aaagcattca ctaa 144

REIVINDICACIONES

1. Una célula anfitriona bacteriana que comprende un fago genéticamente modificado en la que
- 5 - se inserta un sistema de expresión, dicho sistema de expresión comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica una proteína, dicha proteína que induce adicionalmente la expresión de una biomolécula de interés, y
- se suprimen los genes int, S, R, Rz, Xis, y
- 10 en la que dicho fago genéticamente modificado se integra en el genoma de dicha célula anfitriona bacteriana, y
en la que el fago es el fago lambda, el fago 434, el fago phi80, el fago phi81, el fago HK97, o el fago P21.
2. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con la reivindicación 1, en la que se inactiva adicionalmente el gen Q.
3. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en la que el promotor comprendido en el sistema de expresión es inducible.
- 15 4. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el sistema de expresión es el sistema de expresión T7.
- 20 5. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que dicho fago es uno de los fagos P11 o P13, en la que
- 25 - P11 comprende la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Xis y Int, y
- P13 comprende la secuencia NC_001416 en la que se suprimen las secuencias de codificación de los genes S, R, Rz, Q, Xis y Int.
- 30 6. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que la célula anfitriona bacteriana es una enterobacteria, preferiblemente E. coli, más preferiblemente BL21.
7. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, comprende adicionalmente la inactivación de por lo menos uno de los genes tonA, galK, araB, araA, lon, ompT, rcsA, hsdR, mrr, endA y recA.
- 35 8. La célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende la inserción del gen ccdB.
9. Un kit que comprende la célula anfitriona bacteriana de acuerdo con la reivindicación 8 y un plásmido que comprende el gen ccdA.
- 40 10. Un proceso para preparar la célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende infectar una célula anfitriona bacteriana con un fago genéticamente modificado en el que
- 45 - se inserta un sistema de expresión, dicho sistema de expresión comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica una proteína, dicha proteína que induce adicionalmente la expresión de una biomolécula de interés,
- se suprimen los genes int, S, R, Rz, Xis, y
- el fago es el fago lambda, el fago 434, el fago phi80, el fago phi81, el fago HK97, o el fago P21, y
utilizar un fago ayudante para complementación.
- 50 11. Un proceso para producir una biomolécula de interés, que comprende
- 55 - cultivar una célula anfitriona bacteriana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que dicha célula anfitriona comprende la secuencia de ácidos nucleicos de la biomolécula de interés,
- expresar dicha biomolécula de interés.

FIG. 1