19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 700 243**

51 Int. Cl.:

A61K 39/295 (2006.01)
A61K 39/17 (2006.01)
A61K 39/255 (2006.01)
A61K 39/265 (2006.01)
C12N 15/869 (2006.01)
C12N 7/01 (2006.01)
C12N 15/86 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

- 86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **19.10.2012 PCT/EP2012/070728**
 87 Fecha y número de publicación internacional: **25.04.2013 WO13057236**
 96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **19.10.2012 E 12775246 (7)**
 97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **10.10.2018 EP 2768964**

54 Título: **Construcciones del virus de la enfermedad de Marek recombinantes no patógenas que codifican antígenos del virus de la laringotraqueitis infecciosa y del virus de la enfermedad de Newcastle**

30 Prioridad:

21.10.2011 US 201161549844 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
14.02.2019

73 Titular/es:

**INTERVET INTERNATIONAL B.V. (100.0%)
 Wim de Körverstraat 35
 5831 AN Boxmeer, NL**

72 Inventor/es:

**COOK, STEPHANIE;
 MORSEY, MOHAMAD;
 PETERSEN, GARY y
 SONDERMEIJER, PAULUS JACOBUS ANTONIUS**

74 Agente/Representante:

VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

Observaciones:

Véase nota informativa (Remarks, Remarques o Bemerkungen) en el folleto original publicado por la Oficina Europea de Patentes

ES 2 700 243 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Construcciones del virus de la enfermedad de Marek recombinantes no patógenas que codifican antígenos del virus de la laringotraqueitis infecciosa y del virus de la enfermedad de Newcastle

5

Campo de la invención

La presente invención se refiere a construcciones novedosas recombinantes multivalentes del virus de la enfermedad de Marek no patógenas que codifican y expresan antígenos de la proteína del virus de la laringotraqueitis infecciosa y del virus de la enfermedad de Newcastle, y su uso en vacunas de aves de corral.

10

Antecedentes de la invención

Los virus patógenos de las aves de corral no solo debilitan a los pollos, sino que también son costosos para los criadores de pollos porque la mayoría de las enfermedades resultantes son contagiosas y la industria avícola depende en gran medida de las instalaciones de cría confinadas a gran escala. La vacunación de pollos jóvenes es a menudo el único medio viable para combatir estos virus. Aunque las vacunas virales de aves de corral atenuadas o inactivadas siguen siendo importantes en el mercado, en los últimos años se han gastado recursos significativos en el desarrollo de vacunas que contienen construcciones virales recombinantes que expresan antígenos de proteínas virales patógenas. Además, se han realizado esfuerzos sustanciales para construir vectores del virus de la enfermedad de Marek no patógenos recombinantes (rMDV_{np}) multivalentes estables y eficaces que expresan genes extraños de múltiples patógenos virales. Dichas vacunas multivalentes servirían para minimizar el número de inyecciones administradas a los pollitos y, reducirían, de ese modo las molestias y el estrés en el pollito vacunado, así como reducir significativamente los costos de mano de obra y materiales. La vacunación con dichas construcciones multivalentes únicas también sería preferente a las vacunas multivalentes rMDV_{np} alternativas que contienen múltiples construcciones recombinantes monovalentes rMDV_{np}, ya que estas vacunas alternativas, al menos hasta la fecha, han dado como resultado la protección contra solo un único patógeno viral. El fracaso de dichas vacunas alternativas es presumiblemente debido a una de las construcciones monovalentes rMDV_{np} multiplicando las otras construcciones rMDV_{np} monovalentes, evitando de este modo que estas otras construcciones rMDV_{np} monovalentes induzcan una respuesta inmune significativa. En cualquier caso, a pesar de los esfuerzos sustanciales que se realizaron en el pasado para construir vectores rMDV_{np} recombinantes multivalentes estables y eficaces que expresan genes extraños de múltiples patógenos virales hasta ahora, dichos esfuerzos han resultado insatisfactorios.

15

20

25

30

Una enfermedad del virus de las aves de corral que se puede controlar mediante la vacunación es la enfermedad de Marek. La enfermedad de Marek es una enfermedad patógena que afecta negativamente a los pollos en todo el mundo.

35

La enfermedad de Marek se produce predominantemente en pollos jóvenes entre los 2 y 5 meses de edad. Los signos clínicos incluyen: parálisis progresiva de una o más de las extremidades, falta de coordinación debido a la parálisis de las patas, caída de la extremidad debido a la participación del ala y una posición de la cabeza más baja debido a la participación de los músculos del cuello. En casos agudos, puede resultar la depresión severa. También se puede desarrollar atrofia bursal y tímica.

40

El agente etiológico para la enfermedad de Marek es el virus de la enfermedad de Marek serotipo 1 (MDV1), un virus asociado a las células que tiene un genoma de ADN de doble soporte. MDV1 es un herpesvirus alfa aviar linfotrópico que: (i) infecta a los linfocitos B, que pueden resultar en la citólisis, y (ii) infecta a los linfocitos T latentes, que pueden inducir linfoma de linfocitos T. Relacionado estrechamente con la cepa virulenta de MDV1, el virus de la enfermedad de Marek serotipo 2 (MDV2), anteriormente conocido como virus de herpes de Gallid 3, es una cepa de MDV atenuada de forma natural que ha demostrado tener poca o ninguna patogenicidad en pollos [Petherbridge *et al.*, J Métodos virológicos 158: 11-17 (2009)]. SB-1 es una cepa específica de MDV2 que ha demostrado ser útil en vacunas contra MDV1 [véase, por ejemplo, Murthy y Calnek, Infección e inmunidad 26 (2) 547-553 (1979)].

45

50

Otro herpesvirus alfa estrechamente relacionado, el virus de la enfermedad de Marek serotipo 3 (MDV3), más ampliamente conocido como herpesvirus de los pavos (HVT), es un virus no patógeno de los pavos domésticos [véase, por ejemplo, Kingham *et al.*, J. of General Virology 82: 1123- 1135 (2001)]. Dos cepas de HVT comúnmente usadas son la cepa PB1 y la cepa FC126. Considerando que, HVT también es no patógeno en pollos, induce una respuesta inmune protectora de larga duración en pollos contra MDV1. En consecuencia, el HVT se ha usado en vacunas de aves de corral contra el MDV1 virulento durante muchos años, generalmente en combinación con SB-1, que es más virémico que el HVT, pero se considera menos seguro. Como alternativa, cuando las aves son desafiadas con cepas de MDV1 particularmente virulentas, el HVT se puede combinar con la vacuna de Rispen. La vacuna de Rispen es un aislado que se originó a partir de una cepa de MDV1 levemente virulenta que posteriormente se debilitó aún más por el pasaje celular. La cepa de Rispen, sin embargo, conserva cierta virulencia hacia líneas de pollos altamente susceptibles.

55

60

La secuencia del genoma completo de HVT ha sido divulgada [Afonso *et al.*, J. Virology 75 (2): 971-978 (2001)], y como la mayoría de los herpesvirus alfa, HVT posee un número significativo de sitios potenciales de inserción no esenciales [véase por ejemplo, el documento US 5.187.087; el documento US 5.830.745; el documento US 5.834.305;

65

el documento US 5.853.733; el documento US 5.928.648; el documento US 5.961.982; el documento US 6.121.043; el documento US 6.299.882 B1]. También se ha demostrado que el HVT es susceptible de modificación genética y, por lo tanto, se ha usado como un vector recombinante durante muchos años [documento WO 87/04463]. En consecuencia, se ha informado que los vectores HVT recombinantes expresan genes extraños que codifican antígenos de, por ejemplo, el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), [Sondermeijer *et al.*, *Vaccine*, 11: 349-358 (1993); Reddy *et al.*, *Vaccine*, 14: 469-477 (1996)], el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBDV), [Darteil *et al.*, *Virology*, 211: 481-490 (1995); Tsukamoto *et al.*, *J. of Virology* 76 (11): 5637-5645 (2002)], y el virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV) [Johnson *et al.*, *Avian Disease*, 54(4): 1251-1259 (2010); documento WO 92/03554; documento US 6.875.856]. También se conoce la secuencia genómica completa de MDV2 [véase, GenBank acc. n.º: AB049735.1, y Petherbridge *et al.*, *supra*]. La organización genómica del MDV2 es muy similar a la de HVT, con la región US en particular, siendo idéntica a la de HVT [véase, Kingham *et al.*, *supra*].

Además, se ha construido un virus quimérico recombinante, conocido como el novedoso herpesvirus aviar (NAHV), en el que las regiones específicas del genoma de HVT se reemplazaron por las regiones correspondientes del genoma de MDV1. El NAHV también se ha usado para expresar genes extraños que codifican antígenos de otros virus de aves de corral [documento US 5.965.138; documento US 6.913.751].

Al igual que el MDV, el virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV) es un herpesvirus alfa que afecta negativamente a los pollos en todo el mundo [Fuchs *et al.*, *Veterinary Research* 38: 261-279 (2007)]. ILTV causa enfermedad respiratoria aguda en pollos, que se caracteriza por depresión respiratoria, jadeo y expectoración de exudado con sangre. La replicación viral se limita a las células del tracto respiratorio, donde en la tráquea la infección da lugar a la erosión y hemorragia del tejido.

La enfermedad de Newcastle es otra enfermedad altamente contagiosa y debilitante de los pollos. El agente etiológico para la enfermedad de Newcastle es el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV). NDV pertenece a la orden de los Mononegavirales y está en la familia de *Paramyxoviridae*. Los virus de la enfermedad de Newcastle tienen un genoma de ARN monocatenario de sentido negativo no segmentado.

NDV se ha agrupado en tres patotipos distintos de acuerdo con su virulencia. La infección de las aves de corral por las cepas lentógenas no patógenas de NDV es esencialmente asintomática. En contraste directo, las cepas NDV mesogénicas (patógenas medias) y velogénicas (altamente patógenas) causan enfermedades exhaustivas que pueden ser fatales. La mayoría de los tipos de NDV infectan el sistema respiratorio y/o el sistema nervioso, y pueden provocar jadeo y tortícolis.

El virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBDV), también llamado virus de la enfermedad de Gumboro, es el agente causante de la enfermedad infecciosa de la bolsa. El IBDV causa una infección viral aguda y altamente contagiosa del tejido linfóide de un pollo, cuyo objetivo principal es el órgano inmunológico esencial del ave: la bolsa de Fabricio. La tasa de morbilidad en aves susceptibles es alta, con una rápida pérdida de peso y tasas de mortalidad de moderadas a altas. Los pollitos que se recuperan de la enfermedad pueden tener deficiencias inmunes debido a la destrucción de (o partes de) la bolsa de Fabricio. Esto los hace particularmente vulnerables a infecciones secundarias.

IBDV es un miembro de la familia *Bimaviridae*. Los virus en esta familia tienen un genoma que consiste en dos segmentos (A y B) de ARN bicatenario. Existen dos serotipos de IBDV, el serotipo 1 y 2, que pueden diferenciarse mediante pruebas de neutralización de virus (NV). Se ha demostrado que los virus del serotipo 1 son patógenos para los pollos, mientras que los virus del serotipo 2 solo causan enfermedades subagudas en los pavos. Históricamente, los virus IBDV del serotipo 1 consistían en un solo tipo que ahora se conoce como virus IBD "clásico". Más recientemente, han surgido las llamadas cepas de IBDV "variante". Las cepas clásicas y variantes de IBDV se pueden identificar y distinguir mediante una prueba de neutralización de virus usando un estudio de panel de anticuerpos monoclonales, o por RT-PCR [Wu *et al.*, *Avian Diseases*, 51: 515-526 (2007)]. Las cepas IBDV clásicas bien conocidas incluyen, D78, Faragher 52/70 y STC, mientras que 89/03 es una cepa variante bien conocida. Muchas vacunas IBDV vivas o inactivadas están disponibles en el mercado, por ejemplo, una vacuna viva como NOBILIS[®] Gumboro D78 (MSD Animal Health).

Como se ha indicado anteriormente, debido a que el HVT puede actuar como un antígeno que proporciona una protección significativa contra la enfermedad de Marek y como un vector recombinante, actualmente se usa como un vector de plataforma para vacunas multivalentes tales como Innovax[®]-ILT (comercializada por Merck Animal Health), que protege contra ILTV; e Innovax[®]-ND-SB (comercializada por Merck Animal Health) y Vectormune[®] HVT-NDV (comercializada por Ceva), que protegen contra el NDV. Sin embargo, notablemente, hasta ahora, ninguna vacuna multivalente que comprende un HVT recombinante que codifica antígenos de más de un patógeno ha demostrado ser estable y eficaz, incluso aunque dichas vacunas se habían sugerido hace más de quince años [véase, por ejemplo, el documento US 5.965.138]. De hecho, Innovax[®]-ILT contiene el único HVT recombinante que comprende dos genes extraños, es decir, ILTV gD e ILTV gI, que ha demostrado ser seguro, eficaz y estable. Sin embargo, estos dos genes extraños son del mismo patógeno y, además, se superponen de forma natural y deben expresarse conjuntamente con el fin de permitir una inmunización adecuada contra ILTV.

Los documentos US 5.965.138 y US 5.853.733 son miembros de la misma familia de patentes y describen

5 construcciones de vectores de MDV no patógenos que comprenden una o más inserciones heterólogas, que incluyen NDV-F e ILTV gI/gD. Las inserciones heterólogas también se insertan en diferentes regiones genómicas. Sin embargo, ninguna de estas patentes de EE. UU. proporciona datos sobre la estabilidad genética, ni demuestra una reducción real a la práctica como una vacuna eficaz. Además, muchas de las construcciones de vectores mencionadas nunca se hicieron realmente. Más importante aún, aunque estas patentes tienen una fecha de prioridad que es anterior a la presente invención por casi 20 años, hasta ahora, nadie pudo colocar genes de más de un patógeno extraño en el mismo vector de MDV y producir con éxito una construcción estable que proporcione protección contra más de uno de esos patógenos extraños.

10 El documento WO00/61736 describe esencialmente el mismo tema que el documento US 5.965.138 y el documento US 5.853.733, y también tiene las mismas desventajas de no poder proporcionar una divulgación habilitadora para vacunas seguras, estables y eficaces.

15 El documento US 6.033.670 describe el uso de ILTV como un vector recombinante para inserciones de genes heterólogos, pero no divulga los resultados sobre la estabilidad, la expresión y su uso en una vacuna eficaz. Además, ILTV es un virus de aves de corral completamente diferente al MDV.

20 En consecuencia, a pesar de las claras ventajas de las construcciones estables, multivalentes y recombinantes de MDV_{np} que pueden expresar eficazmente antígenos extraños de dos o más patógenos diferentes y los esfuerzos sustanciales para diseñarlos, hasta ahora, no se han recibido. Por lo tanto, existe una clara necesidad de superar el fallo colectivo de la industria, mediante la construcción de vectores de MDV_{np} novedosos, estables y recombinantes que se pueden usar en vacunas multivalentes como el único activo para proteger contra dos o más patógenos de virus de aves de corral no MDV1 diferentes.

25 La cita de cualquier referencia en el presente documento no debe interpretarse como una admisión de que dicha referencia está disponible como "técnica anterior" para la presente solicitud.

Sumario de la invención

30 En consecuencia, la presente invención proporciona un herpesvirus recombinante multivalente estable y eficaz de pavos (rHVT) para su uso como un vector para expresar la proteína gD y gI del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV), así como la proteína de fusión del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV F), tal como se define en las reivindicaciones.

35 El rHVT comprende un primer ácido nucleico insertado en un primer sitio no esencial en el genoma de rHVT y un segundo ácido nucleico insertado en un segundo sitio no esencial en el genoma de rHVT. El primer ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos que codifica ILTV gD y una secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gI.

40 El segundo ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína F de NDV. En realizaciones específicas de este tipo, el primer ácido nucleico comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 16 y el segundo ácido nucleico comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 15.

45 En determinadas realizaciones, el primer sitio no esencial del rMDV_{np} es el sitio US2 y el segundo sitio no esencial del rMDV_{np} es el sitio UL7/8. En el contexto de la invención, el rMDV_{np} es un rHVT.

50 En otros aspectos de la divulgación, el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial del rMDV_{np} son los mismos. En realizaciones específicas de este tipo, el primer ácido nucleico y el segundo ácido nucleico se construyen realmente como parte de la misma molécula de ADN, que se inserta en un sitio no esencial del rMDV_{np}. Dicha molécula de ADN puede ser un casete de expresión que codifica una proteína gD del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV), una proteína gI del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV) y una proteína F del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV). En realizaciones particulares de este tipo, la molécula de ADN comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 17. En el contexto de la invención, el rMDV_{np} es un rHVT.

55 En consecuencia, en realizaciones particulares, el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial del rMDV_{np} son el sitio US2. En otras realizaciones, el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial del rMDV_{np} son el sitio UL54.5. En el contexto de la invención, el rMDV_{np} es un rHVT.

60 Las secuencias de nucleótidos que codifican la proteína gD de ILTV, la proteína gI de ILTV y la proteína F de NDV pueden estar operativamente bajo el control de promotores exógenos, es decir, promotores que no se encuentran de forma natural en el MDV_{np}. En determinadas realizaciones, estas tres secuencias de nucleótidos están operativamente bajo el control de diferentes promotores, es decir, la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV está operativamente bajo el control de un primer promotor, la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gI de ILTV está operativamente bajo el control de un segundo promotor y la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV está operativamente bajo el control de un tercer promotor, siendo diferentes el primer promotor, el segundo promotor y el tercer promotor. En realizaciones particulares, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica

la proteína gD de ILTV es el promotor ILVL gD endógeno. En determinadas realizaciones, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gl de ILTV es el promotor ILTV gl endógeno. En realizaciones particulares de este tipo, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV es el promotor ILTV gD endógeno y el promotor para la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gl de ILTV es el promotor ILTV gl endógeno.

En determinados aspectos de la divulgación, al menos uno de los promotores unido operativamente a una secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV, la proteína gl de ILTV o la proteína F de NDV es el promotor temprano inmediato del citomegalovirus humano (hCMV IE). En realizaciones particulares de este tipo, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV es el promotor hCMV IE. En aspectos específicos de la divulgación, al menos uno de los promotores unido operativamente a una secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV, la proteína gl de ILTV o la proteína F de NDV es el promotor gpX del virus de la pseudorabia (PRV). En aspectos relacionados de la divulgación, al menos uno de los promotores unido operativamente a una secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV, la proteína gl de ILTV o la proteína F de NDV es el promotor del gen de beta-actina de pollo. En realizaciones específicas, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV es el promotor hCMV IE, el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV es el promotor ILTV gl endógeno y el promotor de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gl de ILTV es el promotor ILTV gl endógeno.

En determinados aspectos de la divulgación, un rMDV_{np} de la presente invención que incluye inserciones de secuencias de nucleótidos que codifican la proteína gD de ILTV, la proteína gl de ILTV, y la proteína F de NDV también incluye una o más secuencias terminadoras de la transcripción exógenas. En aspectos específicos de este tipo, una secuencia terminadora de la transcripción está corriente abajo de la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV. En aspectos particulares de la divulgación, las secuencias de nucleótidos que codifican la proteína gD de ILTV y la proteína gl de ILTV comparten una secuencia terminadora de la transcripción y la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV tiene otra.

En aspectos particulares de la divulgación, al menos una de las secuencias terminadoras de la transcripción comprende una secuencia de poliadenilación sintética. En aspectos relacionados, al menos una de las secuencias terminadoras de la transcripción comprende una secuencia de poliadenilación de la timidina quinasa del virus de herpes simplex (TK de HSV). En el contexto de la invención, el rMDV_{np} es un rHVT.

También se describe un ácido nucleico recombinante que comprende en la dirección 5' a 3' en el siguiente orden (i) un promotor gD del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV), (ii) una secuencia de codificación para la proteína gD de ILTV, (iii) un promotor ILTV gl, (iv) una secuencia de codificación para la proteína gl de ILTV, (v) un promotor temprano inmediato de citomegalovirus humano (hCMV IE), (vi) una secuencia de codificación para la proteína F de NDV, y (vii) una secuencia terminadora de la transcripción. En un ejemplo particular, el ácido nucleico recombinante comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 17.

También se describe un rMDV_{np} en el que un ácido nucleico recombinante de la presente invención se ha insertado en un sitio de inserción no esencial del rMDV_{np}. En determinados aspectos de este tipo, el rMDV_{np} incluye una inserción en un sitio no esencial que comprende un ácido nucleico recombinante que comprende en la dirección 5' a 3' en el siguiente orden (i) un promotor gD del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV), (ii) una secuencia de codificación para la proteína gD de ILTV, (iii) un promotor ILTV gl, (iv) una secuencia de codificación para la proteína gl de ILTV, (v) un promotor temprano inmediato de citomegalovirus humano (hCMV IE), (vi) una secuencia de codificación para la proteína F de NDV, y (vii) una secuencia terminadora de la transcripción. En aspectos específicos, también pueden incluirse secuencias de nucleótidos intermedias, tales como enlazadores, secuencias espaciadoras y/o secuencias de codificación extrañas, véase el Ejemplo 1 a continuación. En un ejemplo particular, el rHVT comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 17 insertada en un sitio no esencial. En realizaciones particulares de estos tipos, el sitio no esencial es el sitio US2. En otras realizaciones de este tipo, el sitio no esencial es el sitio UL54.5. En aún otras realizaciones de este tipo, el sitio no esencial es el sitio UL7/8. En otros ejemplos más de este tipo, el sitio no esencial es el sitio US10.

Se describen métodos para fabricar un rMDV_{np} de la presente divulgación. En determinados aspectos, se construye un ácido nucleico heterólogo que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína gD de ILTV, una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína gl de ILTV, y una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína F de NDV. El ácido nucleico heterólogo se inserta luego en un sitio no esencial de un rMDV_{np} de la presente divulgación. En determinados aspectos, el ácido nucleico heterólogo es un casete de expresión. En ejemplos particulares de este tipo, el casete de expresión comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 17. En otros ejemplos, se construye un primer ácido nucleico heterólogo que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína gD de ILTV y una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína gl de ILTV; y se construye un segundo ácido nucleico heterólogo que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína F de NDV. El primer ácido nucleico heterólogo se inserta en un sitio US2 de un rMDV_{np} y el segundo ácido nucleico heterólogo se inserta en un sitio alternativo no esencial del rMDV_{np}. En determinados aspectos, dichos ácidos nucleicos heterólogos son casetes de expresión. En ejemplos particulares de este tipo, el primer ácido nucleico heterólogo comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 16 y el segundo ácido nucleico comprende la secuencia de

nucleótidos de la SEQ ID NO: 15. En ejemplos específicos, el método de fabricación de un rMDV_{np} es un método para fabricar un rHVT.

La presente divulgación proporciona además composiciones inmunogénicas y/o vacunas que comprenden cualquier rMDV_{np} como se describe. En el contexto de la invención, el rMDV_{np} es un rHVT. En ejemplos alternativos, el rMDV_{np} es un rMDV2. Además, la presente divulgación describe métodos para ayudar en la protección de las aves de corral contra una enfermedad causada por ILTV y/o NDV y/o MDV1 mediante la administración de dicha vacuna y/o composición inmunogénica como se describe. En ejemplos específicos, dichos métodos ayudan en la protección de un pollo. Una vacuna de la presente invención como se define en las reivindicaciones puede administrarse por vía subcutánea o *in ovo*.

En consecuencia, en un aspecto, la presente invención proporciona composiciones inmunógenas y/o vacunas estables, seguras y eficaces que comprenden un rHVT de la presente invención como se define en las reivindicaciones. La presente divulgación también describe composiciones inmunogénicas y/o vacunas que comprenden cualquier rMDV_{np} de la divulgación que se combina adicionalmente con un antígeno adicional de NDV, ILTV y/o MDV para mejorar y expandir la inmunogenicidad proporcionada. Además, la presente divulgación también describe composiciones inmunogénicas y/o vacunas que comprenden cualquier rMDV_{np} de la presente divulgación que se combina adicionalmente con un antígeno para un patógeno distinto de MDV, ILTV o NDV. En un ejemplo particular de este tipo, el antígeno es un antígeno del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBDV). En un ejemplo más particular, el antígeno del IBDV es un IBDV vivo moderado. En determinados ejemplos, el IBDV vivo moderado es una variante del IBDV. La presente divulgación también describe métodos para ayudar en la protección de las aves de corral contra una enfermedad causada por ILTV y/o NDV y/o MDV1 y/o IBDV mediante la administración de dicha vacuna y/o composición inmunogénica a las aves de corral (por ejemplo, pollos). En ejemplos particulares de este tipo, una vacuna de la presente divulgación se administra por vía subcutánea. En otros ejemplos, una vacuna de la presente divulgación se administra *in ovo*.

En determinadas realizaciones, las composiciones inmunogénicas y/o vacunas de la presente invención comprenden un rHVT que comprende como una inserción en su sitio US2 de un ácido nucleico recombinante que comprende 5' a 3': (i) un promotor gD del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV); (ii) una secuencia de codificación para la proteína gD de ILTV; (iii) un promotor ILTV gl; (iv) una secuencia de codificación para la proteína gl de ILTV; (v) un promotor temprano inmediato de citomegalovirus humano (hCMV IE); así como una secuencia de codificación para la proteína de fusión del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV F); y (vii) una secuencia terminadora de la transcripción. En realizaciones particulares de este tipo, las composiciones inmunogénicas y/o vacunas comprenden además un virus de la enfermedad de la bolsa infeccioso vivo moderado (IBDV). En determinadas realizaciones, el IBDV vivo moderado es una variante del IBDV. En realizaciones más particulares, el IBDV es 89/03. En realizaciones aún más particulares de este tipo, el ácido nucleico recombinante tiene la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 17.

La presente divulgación también describe composiciones inmunogénicas y/o vacunas que comprenden cualquier rMDV_{np} de la presente divulgación combinado con un antígeno adicional de NDV, ILTV o NDV y un patógeno distinto de MDV, ILTV o NDV.

Estos y otros aspectos de la presente invención se comprenderán mejor en referencia a los dibujos.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un dibujo esquemático del genoma HVT (FC126), que consiste en una región larga única (UL) y una región corta única (US), cada una indicada por líneas rectas y flanqueada por regiones repetidas, indicadas como recuadros. Debajo del esquema del genoma, hay una barra que indica la ubicación de los fragmentos de digestión de la enzima de restricción BamHI, en relación con la posición del genoma y la nomenclatura de letras asociada con cada fragmento. (Al fragmento más grande se le dio la letra "A", al siguiente más grande se le dio la letra "B", y así sucesivamente). Las posiciones de cada fragmento subgenómico clonado (y su designación) usadas para reconstruir HVT (FC126) o los virus rHVT/NDV/ILT se indican debajo del mapa de restricción de BamHI. El asterisco (*) indica la posición de los sitios de inserción: UL7/UL8 en 1196-05.1; UL54.5 en 1332-29.4; US2 en 1332-47.A2 o 1317-15.1-1.

La Figura 2 es un dibujo esquemático de seis HVT recombinantes diferentes, que representan los genes insertados en la estructura HVT y el sitio de su inserción. Innovax-LT es un rHVT que incluye un casete de expresión que codifica los genes ILTV gD e ILTV gl insertados en el sitio UL54.5 del rHVT. Innovax-ND es un rHVT que incluye un casete de expresión que codifica el gen de fusión de NDV insertado en el sitio US10 del rHVT. 1348-34C es un rHVT que incluye un casete de expresión que codifica los genes ILTV gD e ILTV gl insertados en el sitio UL54.5 del rHVT, y un casete de expresión que codifica el gen de fusión NDV insertado en el sitio US10 del rHVT. 1332-62E es un rHVT que incluye un casete de expresión que codifica los genes ILTV gD, ILTV gl y el NDV de fusión insertados en el sitio US2 del rHVT. 1317-46 es un rHVT que incluye un casete de expresión que codifica los genes ILTV gD e ILTV gl insertados en el sitio US2, y un casete de expresión que codifica el gen de fusión NDV insertado entre UL7 y UL8 (es decir, el sitio UL7/8) del rHVT. 1332-70B es un rHVT que incluye un casete de expresión que

codifica los genes ILTV gD, ILTV gI y el NDV de fusión insertados en el sitio UL54.5 del rHVT.

Descripción detallada de la invención

5 La presente invención supera el fracaso de la industria anterior para poder construir vectores rMDV_{np} que contienen antígenos extraños y pueden proteger contra dos o más patógenos de virus de aves de corral proporcionando vectores MDV_{np} recombinantes únicos que codifican y expresan antígenos de ILTV y NDV, y que protegen contra la enfermedad de Marek, la enfermedad de Newcastle y el virus de la laringotracheitis infecciosa. En realizaciones particulares, un rHVT de la presente invención codifica y expresa antígenos extraños de ILTV y NDV solamente, y puede ayudar en la
10 protección contra la enfermedad de Marek, la enfermedad de Newcastle y el virus de la laringotracheitis infecciosa.

Antes de la presente invención, ya se había construido un vector HVT que contenía un gen NDV insertado en la región US10. Se demostró que este vector HVT-NDV es estable y que expresa niveles suficientes del producto del gen NDV correspondiente, la proteína F de NDV, para proteger a los pollos vacunados contra un desafío con NDV virulento. Además, ya se había construido un vector HVT que contenía un par de genes ILTV insertados en la región UL54.5 de HVT. Se demostró que este vector HVT-ILTV es estable y que expresa niveles suficientes de los productos génicos de ILTV correspondientes, las proteínas gI y gD de ILTV, para proteger a los pollos vacunados contra un desafío con ILTV virulento.
15

20 En consecuencia, se diseñó una construcción HVT multivalente para proteger tanto contra NDV como ILTV basándose en las construcciones exitosas anteriores, *es decir*, insertando el gen NDV-F en el sitio US10 e insertando los genes ILTV gD y gI en el sitio UL54.5 [véase, 1348-34C en la Figura 2]. Inesperadamente, sin embargo, tras efectuar pases de esta construcción en cultivo de tejidos, el virus recombinante perdió su capacidad para expresar las proteínas ILTVgD, ILTVgI y NDV F. Esto demostró ser cierto con una serie de construcciones rHVT recombinantes duplicadas. De hecho, estos virus recombinantes eran inestables e inadecuados para su posterior desarrollo como vacunas. Estos hallazgos demuestran que el diseño de un único vector rHVT multivalente que puede expresar de manera estable tanto la proteína NDV F como las proteínas ILTVgD e ILTVgI no es un proceso simple que pueda extrapolarse de la información existente. De hecho, si dichos vectores rHVT multivalentes estables y eficaces fueran posibles en lo más mínimo, su diseño debía basarse en un conjunto impredecible de interacciones complejas que implicaban
25 mínimamente la relación entre los sitios de inserción usados y los genes extraños a insertar. Hasta ahora, dicho diseño de construcciones de rHVT no era fácilmente predecible a partir de la técnica conocida.

Por lo tanto, la presente invención, proporciona vectores rHVT recombinantes en los que se han insertado dos genes de ILTV y un gen de NDV. En una realización particular de la presente invención, los tres genes se insertaron en la región US2 del genoma de HVT. Tras la vacunación de una gallina o un huevo de gallina con este rHVT, las células del huésped inmunizado expresaron las proteínas codificadas por los genes insertados. Además, las proteínas NDV e ILTV expresadas por el rHVT estimularon una respuesta inmune que protegió a los pollos vacunados contra la enfermedad causada por NDV e ILTV. En consecuencia, dichos vectores rHVT pueden usarse para proporcionar protección contra infecciones tanto por NDV como por ILTV. Anteriormente, se necesitaban dos vectores rHVT separados para protegerse contra estos dos virus, a saber, uno para la protección contra ILTV y el otro para la
35 protección contra NDV.

Por lo tanto, la presente invención es ventajosa con respecto a los métodos actuales porque proporciona protección simultánea contra ILTV y NDV mediante la inoculación de aves de corral y/o huevos de aves de corral con un solo HVT recombinante. En particular, esto permite que se administren vacunas adicionales a través de la vía *in ovo*, porque hay un límite en cuanto a la cantidad de volumen que se puede inyectar en un huevo, y ahorra aún más en los costos de fabricación porque solo se necesita uno en lugar de dos vectores. Además, esto puede permitir que se incluya un antígeno adicional en la vacuna, como un IBDV vivo, por ejemplo, la cepa 89/03.
45

50 Con el fin de comprender más completamente la presente invención, se proporcionan las siguientes definiciones. El uso de términos singulares por conveniencia en la descripción no pretende de ninguna manera ser tan limitante. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a una composición que comprende "un polipéptido" incluye una referencia a uno o más de dichos polipéptidos.

Como se usa en este documento, un "virus de la enfermedad de Marek no patógeno" o "MDV_{np}" o "npMDV" es un virus en la familia del MDV que muestra poca o ninguna patogenicidad en aves de corral. El término "MDV_{np}" incluye MDV de origen natural que han sido pasados o manipulados de otra manera similar, pero no incluye construcciones virales en las que una región específica del genoma de un serotipo de MDV se reemplaza por la región correspondiente de un serotipo de MDV diferente para formar un virus quimérico, tal como el novedoso herpesvirus aviar (NAHV). En el contexto de la presente invención, el MDV_{np} es un HVT. En otros ejemplos, el MDV_{np} es un MDV2. En ejemplos particulares de este tipo, el MDV2 es SB1.
55

Como se usa en el presente documento, un MDV_{np} que ha sido modificado genéticamente para codificar una secuencia de nucleótidos heteróloga (por ejemplo, un gen extraño) se define como un "MDV_{np}" recombinante o "rMDV_{np}".

Como se usa en el presente documento, un "sitio no esencial" es un sitio en el genoma de MDV_{np} en el que una inserción de una secuencia de nucleótidos heteróloga en ese sitio no evita que el MDV_{np} se replique en una célula huésped. Los sitios no esenciales generalmente se identifican por el gen en el que residen, por ejemplo, el sitio US2, o una región entre dos genes, por ejemplo, el sitio UL7/8.
60
65

Como se usa en el presente documento, el término "aves de corral" puede incluir pollos, pavos, patos, gansos, codornices y faisanes.

Como se usa en el presente documento, una "vacuna" es una composición que es adecuada para la aplicación a un animal (incluidos, en determinados ejemplos, seres humanos, mientras que en otros ejemplos no son específicamente para seres humanos) que comprenden uno o más antígenos normalmente combinados con un vehículo farmacéuticamente aceptable tal como un líquido que contenga agua, que al administrarse al animal induce una respuesta inmune lo suficientemente fuerte como para ayudar mínimamente en la protección contra una enfermedad clínica que surge de una infección con un microorganismo de tipo silvestre, *es decir*, lo suficientemente fuerte como para ayudar en la prevención de la enfermedad clínica, y/o prevención, mejora o curación de la enfermedad clínica.

Como se usa en el presente documento, una "vacuna multivalente" es una vacuna que comprende dos o más antígenos diferentes. En un ejemplo particular de este tipo, la vacuna multivalente estimula el sistema inmunológico del receptor contra dos o más agentes patógenos diferentes.

Como se usa en el presente documento, la expresión "ayudas en la protección" no requiere una protección completa contra cualquier indicación de infección. Por ejemplo, "ayudas en la protección" puede significar que la protección es suficiente para que, después del desafío, los síntomas de la infección subyacente se reduzcan al menos, y/o que una o más de las causas o mecanismos celulares, fisiológicas, o bioquímicas subyacentes que causan los síntomas se reduzcan y/o eliminen. Se entiende que "reducido", como se usa en este contexto, significa en relación con el estado de la infección, incluido el estado molecular de la infección, no solo el estado fisiológico de la infección.

Como se usa en el presente documento, un "adyuvante" es una sustancia que puede favorecer o amplificar la cascada de eventos inmunológicos, lo que lleva en última instancia a una mejor respuesta inmunológica, *es decir*, la respuesta corporal integrada a un antígeno. En general, no se requiere un adyuvante para que se produzca la respuesta inmunológica, pero favorece o amplifica esta respuesta.

Como se usa en el presente documento, la expresión "farmacéuticamente aceptable" se usa adjetivamente para significar que el nombre modificado es apropiado para su uso en un producto farmacéutico. Cuando se usa, por ejemplo, para describir un excipiente en una vacuna farmacéutica, caracteriza al excipiente como compatible con los otros ingredientes de la composición y no desventajosamente perjudicial para el receptor deseado.

Como se usa en el presente documento, "administración sistémica" es la administración en el sistema circulatorio del cuerpo (que comprende el sistema cardiovascular y linfático), afectando así al cuerpo en su totalidad en lugar de a un locus específico como el tracto gastrointestinal (por ejemplo, mediante la administración oral o rectal) y el sistema respiratorio (por ejemplo, mediante la administración intranasal). La administración sistémica se puede realizar, por ejemplo, mediante la administración en el tejido muscular (intramuscular), en la dermis (intradérmica o transdérmica), debajo de la piel (subcutánea), debajo de la mucosa (submucosa), en las venas (intravenosa), etc.

Como se usa en el presente documento, la expresión "administración parenteral" incluye inyecciones subcutáneas, inyecciones submucosas, inyecciones intravenosas, inyecciones intramusculares, inyecciones intradérmicas e infusión.

El término "aproximadamente" se usa indistintamente con el término "alrededor de" y significa que un valor está dentro del veinticinco por ciento del valor indicado, es decir, un péptido que contiene "aproximadamente" 100 restos de aminoácidos puede contener entre 75 y 125 restos de aminoácidos.

Como se usa en el presente documento, el término, "polipéptido" se usa indistintamente con los términos "proteína" y "péptido" e indica un polímero que comprende dos o más aminoácidos conectados por enlaces peptídicos. El término "polipéptido" como se usa en el presente documento incluye un fragmento o segmento significativo, y abarca un tramo de restos de aminoácidos de al menos aproximadamente 8 aminoácidos, generalmente al menos aproximadamente 12 aminoácidos, normalmente al menos aproximadamente 16 aminoácidos, preferentemente al menos aproximadamente 20 aminoácidos, y, en aspectos particularmente preferentes, al menos aproximadamente 30 o más aminoácidos, por ejemplo, 35, 40, 45, 50, etc. Dichos fragmentos pueden tener extremos que comienzan y/o terminan en prácticamente todas las posiciones, por ejemplo, que comienzan en los restos 1, 2, 3, etc., y que terminan en, por ejemplo, 155, 154, 153, etc., en todas las combinaciones prácticas.

Opcionalmente, un polipéptido puede carecer de determinados restos de aminoácidos que están codificados por un gen o por un ARNm. Por ejemplo, un gen o una molécula de ARNm puede codificar una secuencia de restos de aminoácidos en el extremo N de un polipéptido (es decir, una secuencia de señal) que se escinde y, por lo tanto, puede no ser parte de la proteína final.

Como se usa en el presente documento, la expresión "fragmento antigénico" con respecto a una proteína particular (por ejemplo, un antígeno de proteína) es un fragmento de esa proteína (incluidos los fragmentos grandes que faltan de tan solo un único aminoácido de la proteína de longitud completa) que es antigénico, *es decir*, capaz de interactuar específicamente con una molécula de reconocimiento de antígeno del sistema inmunológico, como una inmunoglobulina (anticuerpo) o un receptor de antígeno de linfocitos T. Por ejemplo, un fragmento antigénico de una proteína de fusión NDV, es un fragmento de esa proteína de fusión que es antigénico. Preferentemente, un antigénico es inmunodominante para el reconocimiento de anticuerpos y/o receptores de linfocitos T.

Como se usa en el presente documento, una secuencia de aminoácidos es 100 % "homóloga" a una segunda secuencia de aminoácidos si las dos secuencias de aminoácidos son idénticas, y/o difieren solo en sustituciones neutras o conservativas como se define a continuación. En consecuencia, una secuencia de aminoácidos es aproximadamente un 80 % "homóloga" a una segunda secuencia de aminoácidos si aproximadamente el 80 % de las dos secuencias de aminoácidos son idénticas, y/o difieren solo en sustituciones neutras o conservativas.

Los restos de aminoácidos funcionalmente equivalentes a menudo pueden ser sustituidos por restos dentro de la secuencia que resulta en una sustitución de aminoácidos conservativa. Dichas alteraciones definen la expresión "una

sustitución conservativa" como se usa en el presente documento. Por ejemplo, uno o más restos de aminoácidos dentro de la secuencia pueden ser sustituidos por otro aminoácido de polaridad similar, que actúa como un equivalente funcional, lo que resulta en una alteración silenciosa. Las sustituciones de un aminoácido dentro de la secuencia pueden seleccionarse de entre otros miembros de la clase a la que pertenece el aminoácido. Por ejemplo, los aminoácidos no polares (hidrófobos) incluyen alanina, leucina, isoleucina, valina, prolina, fenilalanina, triptófano y metionina. Los aminoácidos que contienen estructuras de anillos aromáticos son fenilalanina, triptófano y tirosina. Los aminoácidos neutros polares incluyen glicina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina y glutamina. Los aminoácidos cargados positivamente (básicos) incluyen arginina, lisina e histidina. Los aminoácidos cargados negativamente (ácidos) incluyen ácido aspártico y ácido glutámico. No se esperará que dichas alteraciones afecten el peso molecular aparente determinado por la electroforesis en gel de poliacrilamida o el punto isoeléctrico.

Las sustituciones conservativas particularmente preferentes son: Lys para Arg y viceversa, de manera que se puede mantener una carga positiva; Glu para Asp y viceversa de manera que se pueda mantener una carga negativa; Ser para Thr de manera que se pueda mantener un --OH libre; y Gln para Asn de manera que se pueda mantener un NH₂ libre. Los aminoácidos también se pueden colocar en los siguientes grupos de similitud: (1) prolina, alanina, glicina, serina y treonina; (2) glutamina, asparagina, ácido glutámico y ácido aspártico; (3) histidina, lisina y arginina; (4) cisteína; (5) valina, leucina, isoleucina, metionina; y (6) fenilalanina, tirosina y triptófano.

En un aspecto relacionado, dos secuencias de ADN altamente homólogas pueden identificarse por su propia homología, o la homología de los aminoácidos que codifican. Dicha comparación de las secuencias se puede realizar usando el software convencional disponible en los bancos de datos de secuencia. En un ejemplo particular, dos secuencias de ADN altamente homólogas codifican secuencias de aminoácidos que tienen aproximadamente 80 % de identidad, más preferentemente aproximadamente 90 % de identidad e incluso más preferentemente aproximadamente 95 % de identidad. Más particularmente, dos secuencias de aminoácidos altamente homólogas tienen aproximadamente 80 % de identidad, incluso más preferentemente aproximadamente 90 % de identidad e incluso más preferentemente aproximadamente 95 % de identidad.

Como se usa en el presente documento, el porcentaje de identidad de secuencia de ADN y proteína se puede determinar usando un software como MacVector v9, disponible en el mercado en Accelrys (Burlington, Massachusetts) y el algoritmo Clustal W con los parámetros predeterminados de alineación y los parámetros predeterminados para la identidad. Véase, por ejemplo, Thompson, *et al.*, 1994. *Nucleic Acids Res.* 22:4673-4680. ClustalW se puede descargar libremente para las plataformas Dos, Macintosh y Unix de, por ejemplo, EMBL, el Instituto Europeo de Bioinformática. El enlace de descarga actual se encuentra en <http://www.ebi.ac.uk/clustalw/>. Estos y otros programas disponibles también se pueden usar para determinar la similitud de secuencia usando los mismos parámetros predeterminados o análogos.

Como se usa en el presente documento, los términos "polinucleótido", o un "ácido nucleico" o una "molécula de ácido nucleico" se usan indistintamente e indican una molécula que comprende nucleótidos que incluyen, pero sin limitación, ARN, ADNc, ADN genómico e incluso secuencias de ADN sintético. Los términos también se contemplan para abarcar moléculas de ácido nucleico que incluyen cualquiera de los análogos de base conocidos de ADN y ARN.

Una "secuencia codificante" de ácido nucleico o una "secuencia que codifica" una proteína o péptido particular, es una secuencia de nucleótidos que se transcribe y traduce a un polipéptido *in vitro* o *in vivo* cuando se coloca bajo el control de elementos reguladores adecuados.

Los límites de la secuencia de codificación se determinan mediante un codón de inicio en el extremo 5' y un codón de parada de traducción en el extremo 3'. Una secuencia de codificación puede incluir, pero sin limitación, secuencias procarióticas, ADNc de ARNm eucariótico, secuencias de ADN genómico de ADN eucariótico (por ejemplo, aviar) e incluso secuencias de ADN sintético. Una secuencia de terminación de la transcripción se puede ubicar 3' de la secuencia de codificación.

"Conectado operativamente" se refiere a una disposición de elementos en la que los componentes descritos de este modo están configurados para realizar su función habitual. Por lo tanto, los elementos de control unidos operativamente a una secuencia de codificación son capaces de efectuar la expresión de la secuencia de codificación. Los elementos de control no necesitan ser contiguos con la secuencia de codificación, mientras funcionen para dirigir la expresión de los mismos. Por lo tanto, por ejemplo, puede haber secuencias sin traducir aún transcritas entre un promotor y la secuencia de codificación y el promotor todavía puede considerarse "unido operativamente" a la secuencia de codificación.

Como se usa en el presente documento, la expresión "secuencia terminadora de la transcripción" se usa indistintamente con la expresión "elemento regulador de la poliadenilación" y es una secuencia que generalmente se encuentra corriente abajo de una región de codificación de ADN y que puede ser necesaria para la terminación completa de la transcripción de esa secuencia codificante de ADN.

Como se usa en el presente documento, un "casete de expresión" es un ácido nucleico recombinante que comprende mínimamente un promotor y una secuencia de codificación heteróloga unida operativamente a ese promotor. En muchos de estos ejemplos, el casete de expresión comprende además una secuencia terminadora de la transcripción.

En consecuencia, la inserción de un casete de expresión en un sitio no esencial del genoma de rMDV_{np} puede conducir a la expresión de la secuencia de codificación heteróloga por el rMDV_{np}. En el contexto de la invención el rMDV_{np} es un rHVT.

Una "secuencia de nucleótidos heteróloga" como se usa en el presente documento es una secuencia de nucleótidos que se añade a una secuencia de nucleótidos mediante métodos recombinantes para formar un ácido nucleico que no se forma naturalmente en la naturaleza. En ejemplos específicos, una "secuencia de nucleótidos heteróloga" puede codificar un antígeno de proteína tal como la proteína F de NDV, la proteína gI de ILTV o la proteína gD de ILTV. Las secuencias de nucleótidos heterólogas también pueden codificar proteínas de fusión (por ejemplo, quiméricas). Además, una secuencia de nucleótidos heteróloga puede codificar péptidos y/o proteínas que contienen propiedades reguladoras y/o estructurales. En otros ejemplos de este tipo, una secuencia de nucleótidos heteróloga puede codificar una proteína o péptido que funciona como un medio para detectar la proteína o péptido codificado por la secuencia de nucleótidos después de que se expresa el ácido nucleico recombinante. En aún otro aspecto, la secuencia de nucleótidos heteróloga puede funcionar como un medio para detectar una secuencia de nucleótidos. Una secuencia de nucleótidos heteróloga puede comprender secuencias no codificantes que incluyen sitios de restricción, sitios reguladores, promotores y similares.

La inserción de un ácido nucleico que codifica un antígeno en un vector rMDV_{np} se logra fácilmente cuando los extremos tanto del ácido nucleico como del vector comprenden sitios de restricción compatibles. Si esto no se puede hacer, puede ser necesario modificar los extremos de la secuencia de nucleótidos y/o el vector mediante la digestión de los salientes de ácido nucleico monocatenario (por ejemplo, salientes de ADN) generados por la escisión de endonucleasas de restricción para producir extremos romos, o para lograr el mismo resultado rellenando los extremos monocatenarios con una polimerasa adecuada. Como alternativa, se pueden producir los sitios deseados, por ejemplo, mediante la ligadura de secuencias de nucleótidos (enlazadores) en los extremos. Dichos enlazadores pueden comprender secuencias de oligonucleótidos específicas que definen los sitios de restricción deseados. Los sitios de restricción también se pueden generar mediante el uso de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP). [Véase, por ejemplo, Saiki *et al.*, Science 239: 487-491 (1988)]. El vector escindido y los fragmentos de ADN también pueden modificarse, si es necesario, mediante la eliminación de la colas homopoliméricas.

Antígenos de proteínas y ácidos nucleicos que codifican los antígenos de proteínas

El gen ILTV gD parece codificar una glicoproteína de 434 aminoácidos de longitud que tiene un peso molecular de 48.477 daltons, aunque otros han sugerido que un codón de inicio corriente abajo, que conduce a una proteína ILTV gD que comprende solo 377 restos de aminoácidos, es el verdadero codón de inicio [Wild *et al.*, Virus Genes 12: 104-116 (1996)]. El gen ILTV gI codifica una glicoproteína de 362 aminoácidos de longitud que tiene un peso molecular de 39.753 daltons [documento US 6.875.856]. Los ácidos nucleicos que codifican variantes naturales y/o procedentes de laboratorio de la ILTV gD e ILTV gI pueden sustituirse por los ejemplificados actualmente.

En realizaciones particulares de la presente invención, un rHVT comprende un ácido nucleico recombinante (por ejemplo, un casete de expresión) que codifica una proteína ILTV gD que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2 o un fragmento antigénico de la misma. En realizaciones relacionadas, el rHVT comprende un ácido nucleico recombinante que codifica una proteína ILTV gD que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene más del 90 % y/o más del 95 % y/o más del 98 % y/o más del 99 % de identidad con la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 2. En realizaciones particulares, la proteína ILTV gD está codificada por la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 1.

En determinadas realizaciones de la presente invención, un rHVT comprende un ácido nucleico recombinante (por ejemplo, un casete de expresión) que codifica una proteína ILTV gI que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4 o un fragmento antigénico de la misma. En realizaciones relacionadas, el rHVT comprende un ácido nucleico recombinante que codifica una proteína ILTV gI que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene más del 90 % y/o más del 95 % y/o más del 98 % y/o más del 99 % de identidad con la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 4. En realizaciones particulares, la proteína ILTV gI está codificada por la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 3.

El gen de la proteína NDV F codifica la llamada proteína de "fusión". Un gen de la proteína NDV F ejemplificado por la presente invención se obtuvo de NDV Clone 30, una cepa de vacuna lentogénica de NDV común. Los ácidos nucleicos que codifican variantes naturales y/o procedentes de laboratorio del gen de la proteína F serían igualmente aplicables, ya sea para el NDV lentogénico, mesogénico o velogénico, ya que la propia secuencia del gen de la proteína F está altamente conservada en estos diferentes patotipos del NDV. En realizaciones particulares de la presente invención, un rHVT comprende un ácido nucleico recombinante (por ejemplo, un casete de expresión) que codifica una proteína de fusión NDV que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6 o un fragmento antigénico de la misma. En realizaciones relacionadas, el rHVT comprende un ácido nucleico recombinante que codifica una proteína NDF F que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene más del 90 % y/o más del 95 % y/o más del 98 % y/o más del 99 % de identidad con la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 6. En realizaciones específicas, la proteína de fusión NDV está codificada por la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 5. En determinadas realizaciones de la presente invención, un rHVT comprende un ácido nucleico recombinante (por ejemplo, un casete de expresión) que codifica una proteína de fusión NDV que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID

NO: 8 o un fragmento antigénico de la misma. En realizaciones relacionadas, un rHVT comprende un ácido nucleico recombinante que codifica una proteína NDF F que comprende una secuencia de aminoácidos que tiene más del 90 % y/o más del 95 % y/o más del 98 % y/o más del 99 % de identidad con la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 8. En realizaciones particulares, la proteína de fusión NDV está codificada por la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 7.

Promotores y elementos reguladores de la poliadenilación

Se pueden usar muchos promotores alternativos para dirigir la expresión de un gen heterólogo que codifica un antígeno de proteína o un fragmento antigénico del mismo en un rMDV_{np} de la presente divulgación. Ejemplos incluyen el promotor gpx del virus de la pseudorabia (PRV) [véase, el documento WO 87/04463], el promotor LTR del virus del sarcoma de Rous, el promotor del gen temprano de SV40, el promotor gD ILTV, el promotor gl ILTV [véase, por ejemplo, el documento US 6.183.753 B1], el promotor del gen temprano inmediato del citomegalovirus humano (hCMV IE1) [documento US 5.830.745; documento US 5.980.906] y el promotor del gen de la beta-actina del pollo [patente EP 1 298 139 B1]. Ejemplos más específicos, como se ejemplifica en el presente documento, incluyen el promotor hCMV IE de la cepa Towne que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 12, un promotor hCMV IE truncado que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 11, un promotor ILTV gD que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 9, y un promotor ILTV gl que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 10.

La inclusión de un elemento regulador de poliadenilación corriente abajo de una región de codificación de ADN se requiere a menudo para terminar la transcripción de la secuencia de ADN de codificación. En consecuencia, muchos genes comprenden un elemento regulador de la poliadenilación en el extremo corriente abajo de su secuencia de codificación. Muchos de dichos elementos reguladores se han identificado y se pueden usar en un rMDV_{np} de la presente divulgación. Ejemplos específicos de elementos reguladores de poliadenilación como se ejemplifican en el presente documento, incluyen una señal de poliadenilación sintética que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 13, y la señal de poliadenilación de HSV timidina quinasa que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID NO: 14.

Vacunas y composiciones inmunogénicas

La presente divulgación se refiere al uso del MDV_{np} recombinante, las moléculas de ácido nucleico usadas para construir el MDV_{np}, o las células huésped para cultivarlos o cualquier combinación de las mismas, todas de acuerdo con la presente divulgación para la fabricación de una vacuna para aves de corral. En consecuencia, la presente invención proporciona vacunas y/o composiciones inmunogénicas que incluyen un rHVT recombinante multivalente como se define en las reivindicaciones. Dichas vacunas pueden usarse para ayudar en la prevención y/o prevenir la enfermedad de Newcastle y/o la enfermedad de Marek y/o enfermedades asociadas con infecciones por ILTV. Una vacuna de acuerdo con la presente invención puede usarse para tratamiento profiláctico y/o terapéutico, y por lo tanto puede interferir con el establecimiento y/o con la progresión de una infección y/o sus síntomas clínicos de enfermedad.

Un MDV_{np} recombinante de la presente divulgación se puede cultivar por cualquier número de medios actualmente practicados en el campo. Por ejemplo, un MDV_{np} recombinante de la presente divulgación se puede cultivar mediante el uso de cultivos *in vitro* de células de pollo primarias, véase, por ejemplo, los ejemplos a continuación en los que se usaron células de fibroblastos de embrión de pollo (CEF). Los CEF se pueden preparar mediante tripsinización de embriones de pollo. Los CEF también pueden colocarse en monocapas y luego infectarse con el MDV_{np}. Este proceso en particular se puede aumentar a escala fácilmente a la producción de tamaño industrial.

Por lo tanto, un aspecto adicional de la divulgación se refiere a un método para la preparación de la vacuna de acuerdo con la divulgación que comprende las etapas de infectar células huésped con un MDV_{np} recombinante de la presente divulgación, recoger las células huésped infectadas y luego mezclar las células huésped infectadas recolectadas con un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Los métodos adecuados para la infección, el cultivo y la recolección son bien conocidos en la técnica y se describen y ejemplifican en el presente documento.

Normalmente, las células huésped infectadas se recolectan mientras están todavía intactas para obtener el MDV_{np} recombinante en su forma asociada a la célula. Estas células se pueden tomar en una composición portadora adecuada para proporcionar estabilización para el almacenamiento y la congelación. Las células infectadas pueden llenarse en ampollas de vidrio, que se sellan, se congelan y se almacenan en nitrógeno líquido. En consecuencia, en determinados ejemplos de la presente divulgación, las vacunas y/o las composiciones inmunogénicas se almacenan congeladas y, en consecuencia, comprenden un criopreservante, tal como dimetilsulfóxido (DMSO), para preservar las células infectadas congeladas.

Como alternativa, cuando el MDV_{np} recombinante es un HVT recombinante, se puede aislar de su célula huésped, por ejemplo, a través del tratamiento con ultrasonidos al final del cultivo, y luego se recoge en un estabilizador, y se seca por congelación (liofiliza) para un almacenamiento estable o se reduce de otra manera el volumen de líquido, para el almacenamiento, y luego se reconstituye en un diluyente líquido antes o en el momento de la administración. Dicha

reconstitución se puede lograr usando, por ejemplo, agua de grado de vacuna. En determinadas realizaciones, una parte liofilizada de una vacuna multivalente puede comprender uno o más antígenos y el diluyente puede comprender uno o más antígenos diferentes.

- 5 En ejemplos particulares, una vacuna de la presente invención (o una porción de la misma) puede estar en forma liofilizada, por ejemplo, como comprimidos y/o esferas que se producen mediante un método descrito en el documento WO 2010/125084. En particular, se hace referencia a los ejemplos, de la página 15, línea 28 a la página 27, línea 9 del documento WO 2010/125084, que describen un método para producir dichos comprimidos/esferas de desintegración rápida. Dichas formas liofilizadas se pueden disolver fácilmente en un diluyente, para permitir la
10 administración sistémica de la vacuna.

Las vacunas y las composiciones inmunogénicas pueden, pero no necesariamente incluyen, tampones fisiológicamente compatibles y solución salina y similares, así como adyuvantes farmacéuticamente aceptables. Los adyuvantes pueden ser útiles para mejorar la respuesta inmune y/o aumentar la estabilidad de las preparaciones de vacunas. Los adyuvantes se describen normalmente como estimuladores no específicos del sistema inmunológico, pero también pueden ser útiles para dirigirse a brazos específicos del sistema inmunitario. Uno o más compuestos que tienen esta actividad pueden añadirse a la vacuna. Por lo tanto, las vacunas particulares de la presente invención pueden comprender además un adyuvante. Ejemplos de compuestos químicos que pueden usarse como adyuvantes incluyen, pero sin limitación, compuestos de aluminio (por ejemplo, hidróxido de aluminio), aceites metabolizables y no metabolizables, aceites minerales que incluyen derivados de oleato de manida en solución de aceite mineral (por ejemplo, MONTANIDE ISA 70 de Seppic SA, Francia) y aceites minerales ligeros como DRAKEOL 6VR, polímeros de bloque, ISCOM (complejos inmunoestimulantes), vitaminas y minerales (incluidos, pero sin limitación: vitamina E, vitamina A, selenio y vitamina B12) y CARBOPOL®.

- 25 Otros adyuvantes adecuados, que a veces se han denominado estimulantes inmunológicos, incluyen, pero sin limitación: citocinas, factores de crecimiento, quimiocinas, sobrenadantes de cultivos celulares de linfocitos, monocitos, células de órganos linfoides, preparaciones celulares y/o extractos de plantas, bacterias o parásitos (preparaciones de *Staphylococcus aureus* o lipopolisacáridos) o mitógenos. En general, un adyuvante se administra al mismo tiempo que un rHVT de la presente invención. Sin embargo, los adyuvantes pueden administrarse también o como alternativa
30 dentro de un período de dos semanas antes de la vacunación, y/o durante un período de tiempo después de la vacunación, es decir, mientras que el antígeno, por ejemplo, un MDV_{np} recombinante persista en los tejidos.

Las vacunas y/o composiciones inmunogénicas de la presente invención pueden administrarse mediante cualquier vía como *in ovo*, mediante administración parenteral, incluyendo inyección intramuscular, inyección subcutánea, inyección intravenosa, inyección intradérmica, por escarificación, mediante administración oral o mediante cualquier
35 combinación de las mismas.

Además, el MDV_{np} recombinante multivalente de la presente divulgación se puede usar y/o combinar con antígenos de NDV, ILTV y/o MDV adicionales para mejorar y expandir la inmunogenicidad proporcionada, y/o antígenos para otros patógenos con el fin de proporcionar protección inmunitaria contra otros patógenos. Estos antígenos adicionales pueden ser microorganismos completos vivos o muertos, otros vectores recombinantes, homogenados celulares, extractos, proteínas o cualquier otro derivado similar, siempre que no interfieran negativamente con la seguridad, la estabilidad y la eficacia de la vacuna de acuerdo con la presente invención.

La combinación de un MDV_{np} recombinante multivalente de la presente invención con un antígeno adicional de MDV, NDV y/o ILTV puede ser ventajoso en aquellos casos en los que prevalecen cepas de campo muy virulentas de MDV, NDV o ILTV, por ejemplo, en una región geográfica particular. En este sentido, la combinación de un MDV_{np} recombinante multivalente de la presente invención con un MDV1, MDV2 o HTV incluye la cepa Rispens (MDV1), la cepa SB1 (MDV2), la cepa FC-126 (HTV) y/o la cepa PB1 (HTV). Para mejorar la respuesta contra el NDV, el MDV_{np} recombinante multivalente puede combinarse con una cepa de vacuna NDV, como la cepa C2 de la vacuna del NDV vivo moderado.

Ejemplos de otros microorganismos que pueden usarse como antígenos junto con el MDV_{np} recombinante multivalente de la presente invención incluyen: (i) virus tales como el virus de la bronquitis infecciosa, adenovirus, el virus del síndrome de la caída del huevo, el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa, el virus de la anemia de pollo, el virus de la encefalomiелitis aviar, el virus de la viruela aviar, el virus de la rinotraqueitis del pavo, el virus de la peste del pato (enteritis viral del pato), el virus de la viruela de la paloma, el virus de la leucosis aviar, el neumovirus aviar y el reovirus, (ii) bacterias, como *Escherichia coli*, *Salmonella spec.*, *Omitobacterium rhinotracheale*, *Haemophilis paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Erysipelas spec.*, *Mycoplasma spec.* y *Clostridium spec.*, (iii) parásitos como *Eimeria spec.*, y (iv) hongos, como *Aspergillus spec.* En ejemplos particulares de la presente divulgación, se puede combinar un MDV_{np} recombinante de la presente divulgación con una cepa de la vacuna del IBDV vivo moderado tal como D78 (cepa intermedia clonada), PBG98, Cu-1, ST-12 (una cepa intermedia), o 89-03 (una cepa de la variante de Delaware viva) en una vacuna multivalente. Muchas de estas cepas se usan en vacunas
60 comerciales.

La vacuna de combinación se puede hacer de varias formas, incluida la combinación del MDV_{np} recombinante de la presente divulgación con preparaciones de virus, o bacterias, u hongos, o parásitos, o células huésped, o una mezcla de cualquiera y/o todas estas. En ejemplos particulares, los componentes para dicha vacuna combinada se producen oportunamente por separado y luego se combinan y rellenan en el mismo recipiente de vacuna.

65 Como se ha descrito anteriormente, una vacuna de acuerdo con la invención se puede usar ventajosamente para proporcionar protección inmune segura y efectiva en aves de corral a una enfermedad múltiple, mediante una sola

inoculación a muy temprana edad o *in ovo*. Como alternativa, como resultará evidente para cualquier experto en la técnica de las vacunas de aves de corral, las combinaciones descritas anteriormente también podrían incluir programas de vacunación en los que el MDV_{np} recombinante multivalente de la presente divulgación y el antígeno adicional no se apliquen simultáneamente; *por ejemplo*, el MDV_{np} recombinante puede aplicarse *in ovo*, y la NDVC2 y/o la cepa de IBDV (por ejemplo, 89/03) podrían aplicarse en una fecha/hora posterior.

En consecuencia, las vacunas de la presente invención pueden administrarse al sujeto aviar en una dosis única o en dosis múltiples. Por ejemplo, una vacuna de la presente invención se puede aplicar el día de la eclosión y/o *in ovo* en el día 16-18 (día de embrión) DE. Cuando se administran dosis múltiples, pueden administrarse al mismo tiempo o secuencialmente, de una manera y tiempo compatibles con la formulación de la vacuna, y en una cantidad que sea inmunológicamente efectiva. Por lo tanto, una vacuna de la presente invención puede servir eficazmente como una vacuna de sensibilización, que luego puede seguirse y amplificarse mediante una vacuna de refuerzo de la vacuna idéntica, o con una preparación de vacuna diferente, por ejemplo, una vacuna de virus completo clásica adyuvada e inactivada.

El volumen por dosis de una vacuna de la presente invención se puede optimizar de acuerdo con la vía de aplicación prevista: la inoculación *in ovo* se aplica comúnmente con un volumen entre 0,05 y 0,5 ml/huevo, y la inyección parenteral se realiza comúnmente con un volumen entre 0,1 y 1 ml/aviar. En cualquier caso, la optimización del volumen de dosis de la vacuna está dentro de las capacidades del experto en la técnica.

Tabla de secuencia

SEQ ID NO:	Descripción	Tipo
1	Glicoproteína ILTV gD	ácido nucleico
2	Glicoproteína ILTV gD	aminoácido
3	Glicoproteína ILTV gl	ácido nucleico
4	Glicoproteína ILTV gl	aminoácido
5	Proteína NDV F (Clon 30)	ácido nucleico
6	Proteína NDV F (Clon 30)	aminoácido
7	Proteína NDV F (B1 Hitchner)	ácido nucleico
8	Proteína NDV F (B1 Hitchner)	aminoácido
9	Promotor ILTV gD	ácido nucleico
10	Promotor ILTV gl	ácido nucleico
11	Promotor hCMV IE (truncado)	ácido nucleico
12	Promotor hCMV IE (cepa Towne)	ácido nucleico
13	Señal de poliadenilación sintética	ácido nucleico
14	Señal de poliadenilación HSV TK	ácido nucleico
15	Inserción IE-NDV F	ácido nucleico
16	Inserción ILTV	ácido nucleico
17	Inserción ILTV/IE-NDV	ácido nucleico

La presente invención puede entenderse mejor con referencia a los siguientes ejemplos no limitantes, que se proporcionan como ejemplos ilustrativos de la presente invención. Los siguientes ejemplos se presentan con el fin de ilustrar de manera más completa las realizaciones de la invención.

Ejemplos

Ejemplo 1

CONSTRUCCIÓN DE VECTORES DE VIRUS RECOMBINANTES HTV/NDV/ILTV

La capacidad de generar herpesvirus por cotransfección de fragmentos subgenómicos superpuestos clonados se demostró por primera vez para el virus de la pseudorabia [van Zijl *et al.*, J. Virology 62: 2191-2195 (1988)]. Este procedimiento se empleó posteriormente para construir vectores HVT recombinantes [véase, el documento U.S. 5.853.733, con respecto a la metodología divulgada sobre la construcción de vectores HVT recombinantes] y se usó para construir los vectores HVT/NDV/ILTV recombinantes de la presente invención. En este método, todo el genoma de HVT se clona en vectores bacterianos como varios fragmentos subgenómicos grandes superpuestos construidos utilizando técnicas de ADN recombinante convencionales [Maniatis *et al.*, (1982) *Molecular Cloning*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York (1982); y Sambrook *et al.*, *Molecular Cloning*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York (1989)]. Se obtuvo una biblioteca de cósmidos de la cepa FC126 de HVT a partir de ADN viral cizallado en el vector cósmido, pWE15 (Stratagene, ahora Agilent Technologies de Santa Clara, CA). Además, se aislaron varios fragmentos grandes de ADN genómico mediante digestión de restricción con la enzima, BamHI, y se clonaron en pWE15 o en el vector plásmido pSP64 (Promega, Madison WI).

Como se describe en el documento US 5.853.733, la cotransfección de estos fragmentos en células de fibroblastos de embrión de pollo (CEF) da como resultado la regeneración del genoma de HVT mediada por recombinación homóloga a través de las regiones superpuestas de los fragmentos. Si una inserción se obtiene por ingeniería directamente en uno o más de los fragmentos subgenómicos antes de la cotransfección, este procedimiento da como resultado una alta frecuencia de virus que contienen la inserción. Se requieren cinco clones subgenómicos superpuestos para generar FC126 HTV, y sirvieron como base para crear todos los virus recombinantes HVT/NDV/ILTV.

Construcción de HVT/NDV/ILTV 1332-62.E1: La regeneración de cósmidos para HVT/NDV/ILTV 1332-62.E1 se realizó esencialmente como se describe en el documento US 5.853.733 [por ejemplo, la Figura 8 del documento US 5.853.733; redibujado, al menos en parte, en la Figura 1, en el presente documento]. Para permitir integraciones en la región US del genoma FC126 HVT, la región cubierta por el cósmido n.º 378-50 en el documento US 5.853.733, ahora se proporcionó a partir de tres plásmidos más pequeños: pSY640 y 556-60.6, y un plásmido de transferencia (1332-47.A2), superpuesto a estos dos, y que contienen los casetes de expresión ILTV/NDV en el locus del gen US2.

El conjunto de siete construcciones linealizadas: 3 cósmidos y 4 plásmidos se transfectan todos juntos en CEF, usando un protocolo de transfección de CaCl₂ convencional y la reserva de virus resultante se purificó en placa una vez.

Construcción de HVT/NDV/ILTV 1332-70.B1: La regeneración de cósmidos para HVT/NDV/ILTV 1332-70.B1 se realizó esencialmente como se describe en el documento US 5.853.733 [por ejemplo, la Figura 8 del documento US 5.853.733; redibujado, al menos en parte, en la Figura 1, en el presente documento]. Para permitir integraciones en la región UL54.5 del genoma FC126 HVT, la región cubierta por el cósmido n.º 407-32.1C1 en el documento US 5.853.733, ahora se proporcionó a partir de tres plásmidos más pequeños: 672-01.A40 y 672-07.C40, y un plásmido de transferencia (1332-29.4), superpuesto a estos dos, y que contienen los casetes de expresión ILTV/NDV en el locus del gen UL54.5.

El conjunto de siete construcciones linealizadas: 4 cósmidos y 3 plásmidos se transfectan todos juntos en CEF, usando un protocolo de transfección de CaCl₂ convencional y la reserva de virus resultante se purificó en placa una vez.

Construcción de HVT/NDV/ILTV 1317-46.A1-1: La regeneración de cósmidos para HVT/NDV/ILTV 1317-46.A1-1 se realizó esencialmente como se describe en el documento US 5.853.733 [por ejemplo, la Figura 8 del documento US 5.853.733; redibujado, al menos en parte, en la Figura 1, en el presente documento]. Para permitir integraciones en la región US del genoma FC126 HVT, la región cubierta por el cósmido n.º 378-50 en el documento US 5.853.733, ahora se proporcionó a partir de tres plásmidos más pequeños: pSY640 y 556-60.6, y un plásmido de transferencia (1317-15.1-1), superpuesto a estos dos, y que contienen los casetes de expresión ILTV insertados en el locus del gen US2. La inserción en un segundo sitio dentro del genoma de FC126 HVT se realizó reemplazando la región UL cósmida n.º 407-32.2C3 en el documento US 5.853.733 con el cósmido de transferencia (1196-05.1), que contiene el casete de expresión NDV insertado entre los genes HVT UL7 y UL8.

El conjunto de siete construcciones: 1 cósmido sin cortar (1196-05.1), los 2 cósmidos linealizados restantes y 4 plásmidos linealizados se transfectaron todos juntos en CEF, usando un protocolo de transfección de CaCl₂ convencional y la reserva de virus resultante se purificó en placa una vez.

Descripción de los fragmentos subgenómicos para generar FC126HTV:

CLON SUBGENÓMICO 407-32.2C3. El cósmido 407-32.2C3 contiene una región de aproximadamente 40.170 pares de bases de ADN de HVT genómico [extremo izquierdo-pos. 39.754; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI F', L, P, N1, E, D y 2.092 pares de bases del fragmento B.

CLON SUBGENÓMICO 172-07.BA2. El plásmido 172-07.BA2 contiene una región de 25.931 pares de bases de ADN de HVT genómico. Se construyó mediante la clonación del fragmento HVT BamHI B [pos. 37.663 a 63.593; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866] en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI).

CLON SUBGENÓMICO 407-32.5G6. El cósmido 407-32.5G6 contiene una región de 39.404 pares de bases de ADN de HVT genómico [pos. 61.852-101.255; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI H, C, Q, K1, M, K2, más 1.742 pares de bases del fragmento B y 3.880 pares de bases del fragmento J.

CLON SUBGENÓMICO 407-32.1C1. El cósmido 407-32.1C1 contiene una región de 37.444 pares de bases de ADN de HVT genómico [pos. 96.095-133.538; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI J, G, I, F, O, más 1.281 pares de bases del fragmento K2 y 6.691 pares de bases del fragmento A.

CLON SUBGENÓMICO 378-50. El cósmido 378-50 contiene una región de 28.897 pares de bases de ADN de HVT genómico [véase la Figura 8 del documento US 5.853.733; redibujado, al menos en parte, en la Figura 1, en el presente documento]. Se construyó mediante la clonación del fragmento HVT BamHI A [pos. 126848-155744; Afonso *et al.*,

2001, *supra*; Acc. n.º AF291866] en el cósmido pWE15.

Fragmentos de inserción adicional para generar HVT/NDV/ILTV 1332-62.E1:

5 CLON SUBGENÓMICO 1332-47.A2. El plásmido de inserción 1332-47.A2 contiene un fragmento EcoRI de 7311 pares de bases de la región corta única de HVT [pos. 136880-144190; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866], clonado en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI). Insertado en un sitio Stul único dentro del gen US2 HVT [pos. 140540/140541, Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866, entre los restos de aminoácidos 124 y 125] hay 2
10 elementos: un fragmento SaI-HindIII de 3563 pares de bases de ILTV, cepa de desafío NVSL, lote n.º 83-2 [pos. 10532-14094; Wild *et al.*, Virus Genes 12: 104-116 (1996); Acc. n.º U28832], que codifica los genes de longitud completa para la glucoproteína D (gD) y la glicoproteína I (gl), más las regiones de codificación parcial de la glucoproteína E (aminoácidos 1-101) y ORF5 (aminoácidos 734-985); y un casete de expresión que consiste en el promotor HCMV IE, el NDV, la cepa de clone 30, el gen de fusión (F), seguido de una señal de poliadenilación sintética. Los genes ILTV gD, ILTV gl y NDV F se transcriben en la dirección opuesta en relación con el gen HVT US2.

15 CLON SUBGENÓMICO pSY640. El plásmido pSY640 contiene una región de aproximadamente 13.600 pares de bases de ADN de HVT genómico [pos. 126848-140540; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866] procedente del fragmento A de BamHI. Para generar este plásmido, se clonó en la región del ADN ubicada corriente arriba del gen US2, que comienza en el sitio Stul ubicado en el gen US2 y que continúa hasta el final del fragmento BamHI A, en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI).

20 CLON SUBGENÓMICO 556-60.6. El plásmido 556-60.6 contiene una región de aproximadamente 12.500 pares de bases de ADN HVT genómico procedente del fragmento A de BamHI [pos. 143300 a pos. 155744 aproximado, Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. Para generar este plásmido, se clonó la región de ADN ubicada corriente abajo del gen US2 que comienza en el sitio Stul ubicado en el gen US2 y que continúa hasta el final del fragmento BamHI A en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI), y luego se trató con exonucleasa para "masticar" desde el sitio Stul de 150 pb, y se volvió a clonar en el vector plásmido pBR322.

Fragmentos de inserción adicional para generar HVT/NDV/ILTV 1332-70.B1:

30 CLON SUBGENÓMICO 1332-29.4 El plásmido 1332-29.4 contiene una región de 8.636 pares de bases de ADN de HVT genómico procedente de la región única larga [pos. 109489-118124; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866], clonado en un derivado del plásmido pNEB193 (*Aat*I-*Pvu*II eliminado). Está flanqueado por los sitios *Asc*I e incluye los fragmentos *Bv*HI HVT I, S, más 1337 pares de bases del fragmento G y 1177 pares de bases del fragmento F. Insertado en un sitio *Xho*I dentro del marco de lectura abierto HVT UL54.5 [pos. 111240/111241, Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866, entre los restos de aminoácidos 21 y 22] hay 2 elementos: un fragmento SaI-HindIII de 3563 pares de bases de ILTV, cepa de desafío NVSL, lote n.º 83-2 [pos. 10532-14094; Wild *et al.* 1996, *supra*; Acc. n.º U28832], que codifica los genes de longitud completa para la glucoproteína D (gD) y la glicoproteína I (gl), más las regiones de codificación parcial de la glucoproteína E (aminoácidos 1-101) y ORF5 (aminoácidos 734-985); y un casete de expresión que consiste en el promotor HCMV IE, el NDV, la cepa de clone 30, el gen de fusión (F), seguido de una señal de poliadenilación sintética. Los genes ILTV gD, ILTV gl y NDV F se transcriben en la dirección opuesta en relación con el gen HVT UL54.5.

45 CLON SUBGENÓMICO 672-01.A40 El plásmido 672-01 A40 contiene una región de 14.731 pares de bases de ADN de HVT genómico procedente de la región única larga [pos. 96095-110825; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866], clonado en un derivado del plásmido pNEB193. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI G, J y 1281 pares de bases de K2.

50 CLON SUBGENÓMICO 672-07.C40 El plásmido 672-07.C40 contiene una región de 12.520 pares de bases de ADN de HVT genómico procedente de la región única larga [pos. 116948-129467; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866], clonado en un derivado del plásmido pNEB193. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI F, O y 2620 pares de bases de A.

Fragmentos de inserción adicional para generar HVT/NDV/ILTV 1317-46.A1-1:

55 CLON SUBGENÓMICO 1196-05.1. El cósmido 1196-05.1 contiene una región de aproximadamente 40.170 pares de bases de ADN de HVT genómico [extremo izquierdo-pos. 39.754; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866] clonado en el cósmido pWE15. Esta región incluye fragmentos HVT BamHI F, L, P, N1, E, D y 2.092 pares de bases del fragmento B. Además, un casete de expresión que codifica el gen de fusión (F) del NDV, incluido el promotor HCMV IE y el HSV TK y elementos reguladores de la poliadenilación se insertó en una región no codificante entre los genes HVT UL7 y UL8 dentro del fragmento E de BamHI [pos. 20030-20035; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. El gen NDV F se transcribe en la misma dirección que el HVT UL7.

65 CLON SUBGENÓMICO 1317-15.1-1. El plásmido 1317-15.1-1 contiene un fragmento EcoRI de 7311 pares de bases de la región corta única de HVT [pos. 136880-144190; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866], clonado en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI). Además, un fragmento SaI-HindIII de 3563 pares de bases de ILTV, cepa de desafío NVSL, lote n.º 83-2 [pos. 10532-14094; Wild *et al.*, 1996, *supra*; Acc. n.º U28832], que codifica los genes

de longitud completa para la glucoproteína D (gD) y la glicoproteína I (gI), más las regiones de codificación parcial de la glicoproteína E (aminoácidos 1-101) y ORF5 (aminoácidos 734-985) se clonaron en un sitio *Stul* único dentro del gen US2 HVT [pos. 140540/140541, Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866, entre los restos de aminoácidos 124 y 125]. Los genes ILTV gD y gI y se transcriben en la dirección opuesta en relación con el gen HVT US2.

CLON SUBGENÓMICO pSY640. El plásmido pSY640 contiene una región de aproximadamente 13.600 pares de bases de ADN de HVT genómico [pos. 126848-140540; Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866] procedente del fragmento A de BamHI. Para generar este plásmido, se clonó en la región del ADN ubicada corriente arriba del gen US2, que comienza en el sitio *Stul* ubicado en el gen US2 y que continúa hasta el final del fragmento BamHI A, en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI).

CLON SUBGENÓMICO 556-60.6. El plásmido 556-60.6 contiene una región de aproximadamente 12.500 pares de bases de ADN HVT genómico procedente del fragmento A de BamHI [pos. 143300 a pos. 155744 aproximado, Afonso *et al.*, 2001, *supra*; Acc. n.º AF291866]. Para generar este plásmido, se clonó la región de ADN ubicada corriente abajo del gen US2 que comienza en el sitio *Stul* ubicado en el gen US2 y que continúa hasta el final del fragmento BamHI A en el plásmido pSP64 (Promega, Madison WI), y luego se trató con exonucleasa para "masticar" desde el sitio *Stul* de 150 pb, y se volvió a clonar en el vector plásmido pBR322.

Protocolo de transfección de CaCl₂ convencional: Los CEF secundarios se siembran en placas de cultivo de 6 pocillos y se incubaron a 38 °C con 5 % de CO₂ durante 24 horas y se forman monocapas confluentes. Para cada pocillo se mezcló una cantidad total de 0,25 µg de ADN de cósmidos y plásmidos en tampón Hepes y se añadió CaCl₂ 125 mM gota a gota hasta que la precipitación fue inminente. Esta mezcla se añadió a la monocapa de células CEF y se incubó durante 2 a 3 horas. Se eliminó el sobrenadante y se añadió una capa de glicerol al 15 %, y se mantuvo en las células durante 1 minuto. Luego, esto se eliminó, se lavó con PBS y se añadió medio de cultivo fresco y las células se incubaron durante 5 días. A continuación, las células se recogieron mediante tripsinización y las células de las placas individuales se sembraron cada una en monocapas nuevas de células CEF en placas de 10 cm y se incubaron hasta alcanzar un 50-90 % de CPE. A continuación, las células transfectadas amplificadas se recogieron mediante tripsinización y diluciones de 10⁻² a 10⁻⁴ se colocaron en placas de 10 cm con monocapas de CEF y se incubaron. Al día siguiente, las placas se cubrieron con agar y se aislaron varias placas individuales de HVT/NDV/ILTV y se amplificaron en CEF.

Ejemplo 2

LA VACUNA RECOMBINANTE HVT/NDV/ILTV PROTEGE A LOS POLLITOS DE UN DÍA CONTRA EL DESAFÍO DEL VIRUS DE LA LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA

Dos vacunas, una que comprendía HVT/NDV/ILTV-1332-62E1 y la otra, que comprendía 1332-70B1, se evaluaron para determinar su eficacia en la protección de pollos de un desafío del virus de la laringotraqueitis infecciosa. HVT/NDV/ILTV-1332-62E1 es un rHVT en el que la estructura FC126 HVT comprende la secuencia de ácido nucleico de la SEQ ID NO: 17 insertada en el sitio de US2 (véase, el Ejemplo 1 anterior). HVT/NDV/ILTV-1332-70B1 es un rHVT en el que la estructura FC126 HVT comprende la secuencia de ácido nucleico de la SEQ ID NO: 17 insertada en el sitio de UL54.5 (véase, el Ejemplo 1 anterior).

Las preparaciones de vacuna para ambas reservas de virus se prepararon a partir de reservas que se pasaban a través de células de cultivo de tejido de fibroblastos de embrión de pollo, al menos 8 veces, y se preparó una preparación adicional de 11 pasadas de cultivo de tejido y se probó para 1332-62E1.

Las vacunas se administraron a pollitos recién nacidos, libres de antígeno específico (SPF) por vía subcutánea. Las aves fueron desafiadas a las cuatro semanas de edad con el virus virulento de desafío ILTV por vía intratraqueal y se observaron durante 10 días en busca de signos clínicos de la enfermedad. La incidencia de la enfermedad en estos pollitos se comparó con los controles que recibieron una vacuna comercial recombinante HVT/ILTV (Innovax®-ILT, de Merck Animal Health) o ninguna vacuna. El Código Federal de Registro (9CFR) requiere que al menos el 80 % de las aves de control no vacunadas muestren signos clínicos para que una prueba sea válida, y al menos el 90 % de las aves vacunadas deben permanecer libres de signos clínicos para que se considere que proporcionan protección satisfactoria. Los resultados de este estudio se proporcionan en la Tabla 1 a continuación. Ambas vacunas recombinantes duales proporcionaron protección contra un desafío de ILTV virulento.

Tabla 1

Eficacia de la vacuna multivalente HVT/NDV/ILTV contra un desafío de ILTV virulento						
Grupo	Vacuna	Dosis*	Signos clínicos**	Mortalidad**	Resultados clínicos y de necropsia**	% de protección
1	1332-62. E 8 pasadas	2170	1/36	1/36	1/36 = 2,8 %	97,2 %
2	1332-62. E 11 pasadas	1409	0/36	0/36	0/36 = 0 %	100 %

	pasadas					
3	1332-70. B 8 pasadas	2483	3/36	2/36	3/36 = 8,3 %	91,7 %
4	Innovax®-ILT	2200	0/24	0/24	0/24 = 0 %	100 %
5a	Controles desafiados	NA	10/10	9/10	10/10 = 100 %	0 %
5b	Controles desafiados no	NA	0/10	0/10	0/10	NA

*La dosis se describe como unidades formadoras de placa (ufp)/volumen de dosis de 0,2 ml.

**Los resultados se dan como el número de aves positivas por número total de aves (n.º de positivos/total).

Ejemplo 3

5 LA VACUNA RECOMBINANTE HVT/NDV/ILTV PROTEGE A LOS POLLITOS DE UN DÍA CONTRA EL DESAFÍO DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Los pollitos libres de antígeno específico (SPF) de un día o los embriones de 19 días se vacunaron con una vacuna recombinante, HVT/NDV/ILTV-1332-62E1, nivel de pasadas de cultivo de tejidos 11, o una vacuna comercial recombinante HVT/NDV (Innovax®-ND, comercializada por Merck Animal Health) y luego se desafiaron a las cuatro semanas de edad con el virus de desafío virulento de la enfermedad de Newcastle (ND), cepa Texas-GB, por vía intramuscular. Después de un período de observación de 14 días, en los que las aves fueron puntuadas por signos clínicos de la enfermedad de Newcastle, la incidencia de la enfermedad en cada grupo de pollitos se comparó con los controles no vacunados. El Código Federal de Registro (9CFR) requiere que al menos el 80 % de las aves de control no vacunadas muestren signos clínicos para que una prueba sea válida, y al menos el 90 % de las aves vacunadas deben permanecer libres de signos clínicos para que se considere que una vacuna proporciona una protección satisfactoria. Los resultados de este estudio indican que la vacuna HVT/NDV/ILTV 1332-62E1 recombinante proporcionó una protección satisfactoria contra ND por ambas vías de administración.

Tabla 2

Eficacia de la vacuna multivalente HVT/NDV/ILTV contra un desafío de NDV virulento							
Grupo	Vacuna	Dosis*	Vía	N.º de aves	Signos clínicos	Mortalidad**	% de protección
1a	1332-62. E 11 pasadas	2160	<i>in ovo</i>	31	0/31 = 0 %	0/31 = 0 %	100 %
1b	1332-62. E 11 pasadas	2010	SC	31	0/31 = 0 %	0/31 = 0 %	100 %
2a	Innovax®-ND	2046	<i>in ovo</i>	32	3/32 = 9,4 %	2/31 = 6,3 %	90,6 %
2b	Innovax®-ND	1872	SC	32	1/32 = 3 %	1/32 = 3 %	96,9 %
3	Diluyente de Marek	NA	SC	12	12/12 = 100 %	12/12 = 100 %	0 %

*La dosis se describe como unidades formadoras de placa (ufp)/volumen de dosis (dosis de 0,2 ml/SC, dosis de 0,1 ml/*in ovo*).

**Los resultados se dan como el número de aves positivas por número total de aves (n.º de positivos/total).

Ejemplo 4

25 LA VACUNA RECOMBINANTE HVT/NDV/ILTV PROTEGE A LOS POLLITOS DE UN DÍA CONTRA EL DESAFÍO DEL VIRUS DE LA LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA Y EL DESAFÍO DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Una vacuna, HVT/NDV/ILT-1317-46.1-1, se evaluó para determinar su eficacia en la protección de pollos contra el desafío del virus de la laringotraqueitis infecciosa o el desafío del virus de la enfermedad de Newcastle. HVT/NDV/ILTV-1317-46.1-1 es un rHVT en el que la estructura FC126 HVT comprende la secuencia de ácido nucleico de la SEQ ID NO: 16 insertada en el sitio de US2 y la secuencia de ácido nucleico de la SEQ ID NO: 15 insertada en el sitio UL7/8, es decir, entre los genes UL7 y UL8 de HVT, (véase, el Ejemplo 1 a continuación). La preparación de la vacuna se preparó a partir de una reserva que se pasaba a través de células de cultivo de tejido de fibroblastos de embrión de pollito 15 veces.

35 Las vacunas se administraron a pollitos recién nacidos, libres de antígeno específico (SPF) por vía subcutánea. Las aves fueron luego desafiadas a las cuatro semanas de edad con el virus de desafío virulento de la laringotraqueitis infecciosa por vía intratraqueal y se observaron durante 10 días en busca de signos clínicos de la enfermedad, o se desafiaron con el virus virulento de la enfermedad de Newcastle, cepa Texas-GB, por vía intramuscular y se observaron durante 14 días. La incidencia de la enfermedad en estos pollitos se comparó con los controles que

recibieron una vacuna comercial recombinante HVT/ILTV , una vacuna HVT/ND o ninguna vacuna. El Código Federal de Registro (9CFR) requiere que al menos el 80 % de las aves de control no vacunadas muestren signos clínicos para que una prueba sea válida, y al menos el 90 % de las aves vacunadas deben permanecer libres de signos clínicos para que se considere que proporcionan protección satisfactoria. Los resultados de este estudio se proporcionan en la Tabla 3 a continuación. La vacuna HVT/NDV/ILT proporcionó una protección satisfactoria contra el desafío de NDV. Sin embargo, en este estudio preliminar, la protección proporcionada por esta construcción contra un desafío virulento de ILTV no alcanzó los requisitos federales, sí brindó una protección sustancial.

Tabla 3

Eficacia de la vacuna multivalente HVT/NDV/ILTV contra un desafío de NDV y ILTV virulento						
Grupo de tratamiento	Dosis*	N.º de aves	Resultados después del desafío			
			ILT		NDV	
			N.º de positivos/total**	% de protección	N.º de positivos/total**	% de protección
HVT/NDV/ILT 1317-46 (p15)	1356	20	4/20 = 20 %	80%	0/19 = 0 %	100 %
Innovax®-ILT	1740	20	1/20 = 5 %	95 %	-----	-----
Innovax®-ND	1836	20	-----	-----	0/20 = 0 %	100 %
Placebo	NA	10	10/10 = 100 %	0 %	8/8 = 100 %	0 %

*La dosis se describe como unidades formadoras de placa (ufp)/volumen de dosis de 0,2 ml. **Los resultados se dan como el número de aves positivas (signos clínicos y mortalidad) por número total de aves (n.º de positivos/total).

Ejemplo 5

HVT/ND/ILTV RECOMBINANTE EN COMBINACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE LA BOLSA 89/03 EN UNA VACUNA CONTRA UN VIRUS DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BOLSA

Los grupos de pollos de un día (SPF Leghorn) se inocularon con HVT/NDV/ILTV-1332-62E1 combinado con la vacuna IBDV 89/03 en el momento de su uso. Un grupo separado de pollitos fueron vacunados con solo la vacuna contra el IBDV a 3,5 log₁₀TCID₅₀ por dosis. Los pollos fueron desafiados a las 4 semanas de edad con la variante de desafío E IBDV. A los 10 días posteriores al desafío, las aves se sometieron a eutanasia y se examinaron para determinar su peso corporal/bolsa y lesiones graves consecuentes con la enfermedad de la bolsa. Los resultados se analizaron para determinar su aceptabilidad según los requisitos aplicables de 9CFR 113.331.

IBDV 89/03 es un producto con licencia que se usa en la industria avícola para proteger las aves contra las cepas clásicas y variantes del virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa. La dosis objetivo para la vacuna contra el IBDV 89/03 fue de 3,5 log₁₀ TCID₅₀ por dosis de 0,2 ml. La dosis objetivo para HVT/NDV/ILT fue de 3000 UPF por dosis de 0,2 ml. Para lograr las dosis objetivo en el volumen final del diluyente de la vacuna, la vacuna HVT/NDV/ILTV-1332-62E1 se diluyó para contener 6000 UPF en 0,2 ml, que es el doble de la dosis objetivo. La vacuna 89/03 se diluyó para contener 3,8 log₁₀ TCID₅₀, que es el doble de la dosis objetivo. Para el grupo 1, la vacuna combinada se preparó combinando volúmenes iguales de la vacuna HVT/NDV/ILTV-1332-62E1 y la vacuna 89/03. Para el grupo 2, que recibió solo la vacuna 89/03, se añadió un volumen igual de diluyente. Los pollos de un día en cada grupo de tratamiento recibieron 0,2 ml de la vacuna respectiva o placebo por vía subcutánea (SC) (véase la Tabla 4).

Tabla 4

DISEÑO EXPERIMENTAL						
Grupo	N.º	Vacuna	Dosis HVT- (89/03)	Variante E IBDV		
				Desafío		Necropsia
				Edad	N.º de aves	
1	45	HVT/NDV/ILT + 89/03	3000- (3,5 log ₁₀ TCID ₅₀)	4 semanas	≥40	10 días después del desafío
2	45	89/03	NA- (3,5 log ₁₀ TCID ₅₀)	4 semanas	≥40	10 días después del desafío
3	45	Controles desafiados con placebo	---	4 semanas	≥40	10 días después del desafío
4	30	Controles sin desafío de placebo	---	---	≥25	10 días después del desafío

Al eclosionar, los pollitos en cada uno de los grupos de tratamiento de vacunas se marcaron con un conjunto de

números de etiquetas aleatorios asignados mediante el programa de aleatorización de EXCEL. Además, las aves extraídas de cada corral a los 7 días posteriores al desafío para el examen histológico de las bolsas se determinaron al azar mediante el programa de aleatorización de EXCEL.

5 Los pollitos fueron desafiados a las cuatro semanas de edad con el virus de desafío de la variante E IBDV. Cada pollo recibió 0,06 ml que contienen aproximadamente 102,2 de EID50 por dosis mediante gotas para los ojos. A los siete días posteriores al desafío, se eliminaron 6-9 aves de cada grupo para la evaluación histológica de las bolsas individuales (véase la Tabla 5). Las muestras de bolsa se recolectaron de cada pollo desafiado con cuidado para recolectar el tejido que no había sido aplastado o apretado por las pinzas. La muestra de tejido se colocó en un
10 recipiente individual de formalina al 10 %.

La bolsa de cada pollo desafiado con el virus IBD-Var E se registró como negativa o positiva para atrofia bursal, lesiones macroscópicas totales y/o agotamiento de linfocitos según lo determinado por el examen histológico. Las lesiones de bolsa incluyeron hemorragia macroscópica, edema/exudados, color crema/amarillo, estrías o atrofia grave.
15 La atrofia de bolsa se midió pesando individualmente cada pollo al gramo más cercano. Las bolsas se pesaron individualmente a la centésima de gramo más cercana. Se calcularon las relaciones de peso corporal/bolsa para cada ave que empleaba la fórmula, relación PB/PC: (Peso de la bolsa ÷ entre el peso corporal) x 1000. Una relación de peso de bolsa a peso corporal de más de 2 desviaciones estándar del control desafiado se considera negativa y protectora de la enfermedad de la bolsa infecciosa. Los resultados de este estudio mostraron que los grupos de
20 tratamiento de vacunas 1 y 2 eran negativos para IBD (es decir, no eran estadísticamente diferentes del control sin desafío con placebo) lo que indica que ambas vacunas fueron eficaces y que demuestra además que no hubo interferencia de la protección proporcionada por la cepa 89/03 de la vacuna contra el desafío del IBDV debido a la construcción HVT/NDV/ILT recombinante que también está presente en la vacuna multivalente (véase la Tabla 5).

25

Tabla 5

Día 7 DATOS DE NECROPSIA PARA EL DESAFÍO DE LA VARIANTE E IBDV			
Grupo	N.º	Vacuna	Relación PB/PC media de la bolsa
1	9	HVT/NDV/ILT + 89/03	5,464
2	9	89/03	5,715
3	9	Controles desafiados con placebo	1,874 (DE+0,641)**
4	6	Controles sin desafío de placebo	5,838

** 2 DE del control es estadísticamente diferente.

Ejemplo 6

SECUENCIAS

30

Las siguientes secuencias se han usado en las construcciones a modo de ejemplo de rHVT. Las secuencias de codificación proporcionadas a continuación incluyen codones de parada individuales, que pueden reemplazarse fácilmente con codones de parada alternativos sin modificar las propiedades de los antígenos de proteína que codifican las secuencias de codificación.

35

Glicoproteína ILTV gD, secuencia de codificación (SEQ ID NO: 1)

ATGCACCGTCCTCATCTCAGACGGCACTCGCGTTACTACGCGAAAGGAGAGGTGCTTAACAAACACAT
GGATTGCGGTGAAAACGGTGCTGCTCAGGCGCAGCTGTATTTACTCTTTTCTGGACTTGTGTGTCAGGA
TTATGCGGGAGCATATCTGCTTTGTACGCAACGCTATGGACCGCCATTTATTTTTGAGGAATGCTTTT
TGGACTATCGTACTGCTTTCTTCTTTCGCTAGCCAGAGCACCGCCCGTCACGTACGACTACATTTT
AGGCCGTCGCGCGCTCGACGCGCTAACCATAACCGCGGTTGGCCGTATAACAGATACCTCACTAGGG
TATCAAGAGGCTGCGACGTTGTGCGAGCTCAACCCGATTTCTAACGTGGACGACATGATATCGGCGGCC

AAAGAAAAGAGAAGGGGGGCCCTTTTCGAGGCCTCCGTCGTCTGGTTCTACGTGATTAAGGGCGACGA
 CGGCGAGGACAAGTACTGTCCAATCTATAGAAAAGAGTACAGGGAATGTGGCGACGTACAACCTGCTAT
 CTGAATGCGCCGTTCAATCTGCACAGATGTGGGCAGTGGACTATGTTCCCTAGCACCCCTTGTATCGCGA
 AATGGCGCGGGACTGACTATATTCTCCCCACTGCTGCGCTCTCTGGCCAATACTTGCTGACCCTGAA
 AATCGGGAGATTTGCGCAAACAGCTCTCGTAACTCTAGAAGTTAACGATCGCTGTTTAAAGATCGGGT
 CGCAGCTTAACTTTTTACCCTCGAAATGCTGGACAACAGAACAGTATCAGACTGGATTTCAAGGCGAA
 CACCTTTATCCGATCGCAGACACCAATACACGACACGCGGACGACGTATATCGGGGATACGAAGATAT
 TCTGCAGCGCTGGAATAATTTGCTGAGGAAAAAGAAATCCTAGCGCGCCAGACCCTCGTCCAGATAGCG
 TCCCAGCAAGAAATTTCCGCTGTAACCAAGAAAGCGGAAGGGCGCACCCCGGACGCAGAAAGCAGCGAA
 AAGAAGGCCCTCCAGAAAGACTCGGAGGACGACATGCAGGCAGAGGCTTCTGGAGAAAATCCTGCCGC
 CCTCCCCGAAGACGACGAAGTCCCCGAGGACACCGAGCACGATGATCCAAACTCGGATCCTGACTATT
 ACAATGACATGCCCGCGTGATCCCCGGTGGAGGAGACTACTAAAAGTTCTAATGCCGTCTCCATGCC
 ATATTGCGCGGCTTCGTAGCCTGCGCGTTCGCGCTCGTGGGGCTACTGGTTTGAGCATCGTAAAATG
 CGCGCTAGCTAA

Glicoproteína ILTV gD (SEQ ID NO: 2)

MHRPHLRHRSRYAKGEVLNKHMDCGGKRCCSGAAVFTLFWTCVIRIMREHICFVRNAMDRHLFLRNAF
 WTIVLLSSFASQSTAAVTYDYILGRRALDALTIPAVGPYNRYLTRVSRGCDVVELNPI SNVDDMI SAA
 KEKEKGGPFASVWFYVIKGGDDGEDKYCPIYRKEYRECGDVQLLSECAVQSAQMWAVDYVPSTLVSR
 NGAGLTI FSPPTAALSQYLLTLKI GRFAQTALVTLEVNDRCLKIGSQLNFLPSKWTTEQYQTFQGE
 HLYPIADTNTRHADDVYRGYEDILQRWNNLLRKKNPSPAPDRPDSVPQEI PAVTKKAEGRTPDAESSE
 KKAPPEDSEDDMQAEASGENPAALPEDEVPEDTEHDDPNSDPDYNDMPAVI PVEETTKSSNAVSMP
 IFAAFVACAVALVGLLVWSIVKCARS

5

Glicoproteína ILTV gI, secuencia de codificación (SEQ ID NO: 3)

ATGGCATCGCTACTTGAACTCTGGCTCTCCTTGCCGCGACGCTCGCACCCCTTCGGCGCGATGGGAAT
 CGTGATCACTGGAAATCACGTCTCCGCCAGGATTGACGACGATCACATCGTGATCGTTCGCGCCTCGCC
 CCGAAGCTACAATTCAGTGCAGCTATTTTTTCATGCCTGGCCAGAGACCCACAAACCCTACTCAGGA
 ACCGTCCGCGTCGCGTTTTCGGTCTGATATAACAAACCAGTGTACCAGGAACCTTAGCGAGGAGCGCTT
 TGAAAATTGCACTCATCGATCGTCTTCTGTTTTTGTGGCTGTAAAGTGACCGAGTACACGTTCTCCG
 CCTCGAACAGACTAACCGGACCTCCACACCCGTTTAAAGTCACTATAACGAAATCCTCGTCCGAACGAC
 AGCGGGATGTTCTACGTAATTGTTTCGGCTAGACGACACCAAAGAACCATTGACGTCTTCGCGATCCA
 ACTATCGGTGTATCAATTCGCGAACACCGCCGCGACTCGCGGACTCTATTCCAAGGCTTCGTGTGCGA
 CCTTCGGATTACCTACCGTCCAACCTTGAGGCCTATCTCAGGACCGAGGAAAGTTGGCGCAACTGGCAA
 GCGTACGTTGCCACGGAGGCCACGACGACCAGCGCCGAGGCGACAACCCCGACGCCCGTCACTGCAAC
 CAGCGCCTCCGAACTTGAAGCGGAACACTTTACCTTTCCCTGGCTAGAAAATGGCGTGGATCATTACG
 AACCGACACCCGCAAACGAAAAATCAAACGTTACTGTCCGTCTCGGGACAATGAGCCCTACGCTAATT
 GGGGTAACCGTGGCTGCCGTGAGCGCAACGATCGGCCTCGTCATTGTAATTTCCATCGTACCAG
 AAACATGTGCACCCCGCACCGAAAATTAGACACGGTCTCGCAAGACGACGAAGAACGTTCCCAAACCTA
 GAAGGGAATCGCGAAAATTTGGACCCATGGTTGCGTGCGAAATAACAAGGGGGCTGACCAGGATAGT
 GAACTTGTGGAACCTGGTTGCGATTGTTAACCCGTCTGCGCTAAGCTCGCCCGACTCAATAAAAATGTG
 A

10

Glicoproteína ILTV gII (SEQ ID NO: 4)

MASLLGTLALLAATLAPFGAMGIVITGNHVSARIDDDHIVIVAPRPEATIQLQLFFMPGQRPHKPYS
 TVRVAFRSDITNQCQYQELSEERFENCTHRSSSVFVGCKVTEYTFASNRLTGPPHPFKLIRNRPND
 SGMFYVIVRLDDTKEPIDVFAIQLSVYQFANTAATRGLYSKASCRFTFGLPTVQLEAYLRTEESWRNWQ
 AYVATEATTTSAEATTPVTATSASELEAEHFTFPWLENGVDHYEPTPANENSNVTVRLGTMSPTLI
 GVTVAAVVSATIGLVIVISIVTRNMCTPHRKLDTVSQDDEERSQTRRESRKFGPMVACEINKGADQDS
 ELVELVAIVNPSALSSPDSIKM

15

Proteína NDV F, secuencia de codificación (SEQ ID NO: 5): clone 30

ATGGGCCCCAGACCTTCTACCAAGAACCAGTACCTATGATGCTGACTGTCCGAGTCGCGCTGGTACT
 GAGTTGCATCTGTCCGGCAAACCTCCATTGATGGCAGGCCTCTTGCGGCTGCAGGAATTGTGGTTACAG
 GAGACAAAGCCGTCAACATATACACCTCATCCCAGACAGGATCAATCATAGTTAAGCTCCTCCCGAAT
 CTGCCCAAGGATAAGGAGGCATGTGCGAAAGCCCCCTTGGATGCATACAACAGGACATTGACCACTTT
 GCTCACCCCCCTTGGTGACTCTATCCGTAGGATACAAGAGTCTGTGACTACATCTGGAGGGGGGAGAC
 AGGGGCGCCTTATAGGCGCCATTATTGGCGGTGTGGCTCTTGGGGTTGCAACTGCCGCACAAATAACA
 GCGGCCCGCAGCTCTGATACAAGCCAAACAAAATGCTGCCAACATCCTCCGACTTAAAGAGAGCATTGC
 CGCAACCAATGAGGCTGTGCATGAGGTCACTGACGGATTATCGCAACTAGCAGTGGCAGTTGGGAAGA
 TGCAGCAGTTTGTAAATGACCAATTTAATAAAAACAGCTCAGGAATTAGACTGCATCAAAATTGCACAG
 CAAGTTGGTGTAGAGCTCAACCTGTACCTAACCGAATTGACTACAGTATTCGGACCACAAATCACTTC
 ACCTGCTTTAAACAAGCTGACTATTCAGGCACCTTACAATCTAGCTGGTGGAAATATGGATTACTTAT
 TGACTAAGTTAGGTGTAGGGAACAATCAACTCAGCTCATTAATCGGTAGCGGCTTAATCACCGGTAAC
 CCTATTCTATACGACTCACAGACTCAACTCTTGGGTATACAGGTAACCTTACCTTCAGTCGGGAAGCT
 AAATAATATGCGTGCCACCTACTTGGAAACCTTATCCGTAAGCACAACCAGGGGATTTGCCTCGGCAC
 TTGTCCCAAAAGTGGTGACACAGGTCCGTTCTGTGATAGAAGAACTTGACACCTCATACTGTATAGAA
 ACTGACTTACATTTATATTGTACAAGAATAGTAACGTTCCCTATGTCCCCTGGTATTTATTCCCTGCTT
 GAGCGGCAATACGTCCGCCCTGTATGTACTCAAAGACCGAAGGCGCACTTACTACACCATACATGACTA
 TCAAAGGTTTCAGTCATCGCCAACCTGCAAGATGACAACATGTAGATGTGTAACCCCCGGGTATCATA
 TCGCAAAACTATGGAGAAGCCGTGTCTCTAATAGATAAACAATCATGCAATGTTTTATCCTTAGGCGG
 GATAACTTTAAGGCTCAGTGGGGAATTCGATGTAACCTTATCAGAAGAATATCTCAATACAAGATTCTC
 AAGTAATAATAACAGGCAATCTTGATATCTCAACTGAGCTTGGGAATGTCAACAACCTCGATCAGTAAT
 GCTTTGAATAAGTTAGAGGAAAGCAACAGAAAACCTAGACAAAGTCAATGTCAAACCTGACTAGCACATC
 TGCTCTCATTACCTATATCGTGTTGACTATCATATCTCTTGTTTTTGGTATACTTAGCCTGATTCTAG
 CATGCTACCTAATGTACAAGCAAAGGCGCAACAAAAGACCTTATTATGGCTTGGGAATAATACTCTA
 GATCAGATGAGAGCCACTACAAAATGTGA

5 Proteína NDV F (SEQ ID NO: 6): clone 30

MGPRPSTKNPVPMLLTVRVALVLSICPANSIDGRPLAAAGIVVTGDKAVNIYTSSQTGSIIVKLLPN
 LPKDKEACAKAPLDAYNRLLTLLTPLGDSIRRIQESVTTSGGGRQGRIGAIIGGVALGVATAAQIT
 AAAALIQAQONAANILRLKESIAATNEAVHEVTDGLSQLAVAVGKMQQFVNDQFNKTAQELDCIKIAQ
 QVGVELNLYLTELTTVFGPQITSPALNKLTIQALYNLAGGNMDYLLTKLGVGNQQLSSLIGSLITGN
 PILYDSQTQLLGIQVTLPSVGKLNMRATYLETLVSTTRGFASALVPKVVTQVGSVIEELDTSYCIE
 TDLHLYCTRIVTFPMSPGIYSCLSGNTSACMYSKTEGALTPYMTIKGSVIANCKMTTCRCVNPPGII
 SQNYGEAVSLIDKQSCNVLSLGGITLRLSGEFDVTYQKNISIQDSQVIITGNLDISTELGNVNNSISN
 ALNKLEESNRKLDKVNKLTSTALITYIVLTIISLVFGILSLILACYLQKKAQQKTLWLGNNTL
 DQMRATTKM

Proteína NDV F, secuencia de codificación (SEQ ID NO: 7): (B1 Hitchner)

ATGGATCGATCCCGGTTGGCGCCCTCCAGGTGCAGGATGGGCTCCAGACCTTCTACCAAGAACCAGC
 ACCTATGATGCTGACTATCCGGGTCGCGCTGGTACTGAGTTGCATCTGTCCGGCAAACCTCCATTGATG
 GCAGGCCTCTTGCACTGCAGGAATTGTGGTTACAGGAGACAAAGCAGTCAACATATACACCTCATCC
 CAGACAGGATCAATCATAAGCTCCTCCCGAATCTGCCAAAGGATAAGGAGGCATGTGCGAAAGC
 CCCCTTGGATGCATACAACAGGACATTGACCACTTTGCTCACCCCTTGGTGACTCTATCCGTAGGA
 TACAAGAGTCTGTGACTACATCTGGAGGGGGGAGACAGGGGCGCCTTATAGGCGCCATTATTGGCGGT
 GTGGCTCTTGGGGTTGCAACTGCCGCACAAATAACAGCGGCCGAGCTCTGATACAAGCCAAACAAAA
 TGCTGCCAACATCCTCCGACTTAAAGAGAGCATTGCCGCAACCAATGAGGCTGTGCATGAGGTCAGTG
 ACGGATTATCGCAACTAGCAGTGGCAGTTGGGAAGATGCAGCAGTTCGTTAATGACCAATTTAATAAA
 ACAGCTCAGGAATTAGACTGCATCAAAAATTGCACAGCAAGTTGGTGTAGAGCTCAACCTGTACCTAAC
 CGAATCGACTACAGTATTCGGACCACAAATCACTTCACCTGCCTTAAACAAGCTGACTATTAGGCAC
 TTTACAATCTAGCTGGTGGGAATATGGATTACTTATTGACTAAGTTAGGTATAGGGAACAATCAACTC
 AGCTCATTAAATCGGTAGCGGCTTAATCACCGGTAACCCTATTCTATACGACTCACAGACTCAACTCTT
 GGGTATACAGGTAACCTACCTTCAGTCGGGAACCTAAATAATATGCGTGCCACCTACTTGGAAACCT
 TATCCGTAAGCACAAACCAGGGGATTTGCCTCGGCACTTGTCCAAAAGTGGTGACACGGGTGGTCT

GTGATAGAAGAACTTGACACCTCATACTGTATAGAACTGACTTAGATTTATATTGTACAAGAATAGT
 AACGTTCCCTATGTCCCCTGGTATTTACTCCTGCTTGAGCGGCAATACATCGGCCTGTATGTACTCAA
 AGACCGAAGGCGCACTTACTACACCATATATGACTATCAAAGGCTCAGTCATCGCTAACTGCAAGATG
 ACAACATGTAGATGTGTAAACCCCGGGTATCATATCGCAAAACTATGGAGAAGCCGTGTCTCTAAT
 AGATAACAATCATGCAATGTTTTATCCTTAGGCGGGATAACTTTAAGGCTCAGTGGGGAATTCGATG
 TAACTTATCAGAAGAATATCTCAATACAAGATTCTCAAGTAATAATAACAGGCAATCTTGATATCTCA
 ACTGAGCTTGGGAATGTCAACAACCTCGATCAGTAATGCCTTGAATAAGTTAGAGGAAAGCAACAGAAA
 ACTAGACAAAAGTCAATGTCAAACCTGACCAGCACATCTGCTCTCATTACCTATATCGTTTTGACTATCA
 TATCTCTTGTTTTTGGTATACTTAGCCTGATTCTAGCATGCTACCTAATGTACAAGCAAAGGCGCAA
 CAAAAGACCTTATTATGGCTTGGGAATAATACCCTAGATCAGATGAGAGCCACTACAAAATGTGA

5

Proteína NDV F (SEQ ID NO: 8): (B1 Hitchner)

MDRSRLAPSRCRMGRPSTKNPAPMMLTIRVALVLSCICPANSIDGRPLAAAGIVVTGDKAVNIYTSS
 QTGSIIVKLLPNLPKDKEACAKAPLDAYNRTLTTLLTPLGDSIRRIQESVTTSGGGRQRLIGAIIGG
 VALGVATAAQITAAAALIQAKQNAANILRLKESIAATNEAVHEVTDGLSQLAVAVGKMQQFVNDQFNK
 TAQELDCIKIAQQVGVNELNLYLTESTTVFGPQITSPALNKLTIQALYNLAGGNMDYLLTKLIGINNQL
 SSLIGSLITGNPILYDSQTQLLGIQVTLPSVGNLNNMRATYLETLSVSTTRGFASALVPKVVTRVGS
 VIEELDTSYCIETDLDLYCTRIIVTFPMSPGIYSLSGNTSACMYSKTEGALTPYMTIKGSVIANCKM
 TTCRCVNPPGIIISQNYGEAVSLIDKQSCNVLSLGGITLRLSGEFVQKNISIQDSQVIIITGNLDIS
 TELGNVNSISNALNKLEESNRKLDKVNKLTSTSAITYIVLTIISLVFGILSLILACYLMYKQKAQ
 QKTLWLGNNTLDQMRATTKM

10

Promotor ILTV gD (SEQ ID NO: 9)

AAACAGCTGTAACAGAGTAACCGATGGAAGAACATCGGTCCAGCTAATGTGCCTGTCGTGCACGAG
 CCATTCTCCGGAACCTTACTGTCTTTTCGACACGTCTCTTATAGCGAGGGAAAAAGATATCGCGCCAG
 AGTTATACTTTACCTCTGATCCGCAAACGGCATACTGCACAATAACTCTGCCGTCCGGCGTTGTTCCG
 AGATTGCAATGGAGCCTTAATAATGTTTCACTGCCGGAATATTTGACGGCCACGACCGTTGTTTCGCA
 TACCGCTGGCCAAAGTACAGTGTGGAAGAGCAGCGGAGAGCAGGCGAGGCGTGGATTTCTGGCCGGG
 GAGGCAATATATACGAATGCACCGTCTCATCTCAGACGGCACTCGCGTTACTACGCGAAAGGAGAGG
 TGCTTAACAAACACATGGATTGCGGTGAAACGGTGTGCTCAGGCGCAGCTGTATTCACTCTTTTC
 TGGACTTGTGTCAGGATTATGCGGGAGCATATCTGCTTTGTACGCAACGCT

15

Promotor ILTV gl (SEQ ID NO: 10)

TGACTATTACAATGACATGCCCGCCGTGATCCCGGTGGAGGAGACTACTAAAAGTTCTAATGCCGTCT
 CCATGCCCATATTCGCGGCGTTCGTAGCCTGCGCGGTGCGCTCGTGGGGCTACTGGTTTGGAGCATC
 GTAAAATGCGCGCGTAGCTAATCGAGCCTAGAATAGGTGGTTTCTTCTACATGCCACGCCTCAGCT
 CATAATATAAATCACATGGAATAGCATAACCAATGCCTATTCATTGGGACGTTTCGAAAAGC

5 **Promotor hCMV IE (SEQ ID NO: 11): (truncado)**

CGCGCCAGGTCAATTCCCTGGCATTATGCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTA
 CATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGAT
 AGCGGTTTGACTCACGGGATTTCCAAGTCTCCACCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTGGCAC
 CAAAATCAACGGGACTTCCAAAATGTCGTAACAACCTCCGCCCATTTGACGCAAATGGGCGGTAGCGT
 GTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCGTTTAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCC
 ACGCTGTTTTGACCTCCATA

Promotor hCMV IE (SEQ ID NO: 12): (Cepa Towne)

10

GTGAATAATAAATGTGTGTTTGTCCGAAATACGCGTTTGAGATTTCTGTCCCGACTAAATTCATGTC
 GCGCGATAGTGGTGTATCGCCGATAGAGATGGCGATATTGGAAAAATCGATATTTGAAAATATGGC
 ATATTGAAAATGTCGCCGATGTGAGTTTCTGTGTAACCTGATATCGCCATTTTTCCAAAAGTTGATTTT

TGGGCATACGCGATATCTGGCGATACGCTTATATCGTTTACGGGGGATGGCGATAGACGCCTTTGGTG
 ACTTGGGCGATTCTGTGTGTCGAAATATCGCAGTTTCGATATAGGTGACAGACGATATGAGGCTATA
 TCGCCGATAGAGGCGACATCAAGCTGGCACATGGCCAATGCATATCGATCTATAACATTGAATCAATAT
 TGGCCATTAGCCATATTATTATTGGTTATATAGCATAAATCAATATTGGCTATTGGCCATTGCATAC
 GTTGTATCCATATCATAATATGTACATTTATATTGGCTCATGTCCAACATTACCGCCATGTTGACATT
 GATTATTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTC
 CGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCGCCATTGACGTC
 AATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATT
 TACGGTAAACTGCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTC
 AATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCA
 GTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTG
 GATAGCGGTTTGACTCACGGGATTTCCAAGTCTCCACCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTGGTGG
 CACCAAAATCAACGGGACTTCCAAAATGTCGTAACAACCTCCGCCCATTTGACGCAAATGGGCGGTAG
 GCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCGTTTAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCC
 ATCCACGCTGTTTTGACCTCCATAGAAGACACCGG

15 **Señal de poliadenilación sintética (SEQ ID NO: 13)**

GGAATTCTAGATCCCACGTCCTATTGTATACTCTATATTATACTCTATGTTATACTCTGTAATCCTA
 CTAATAAACGTGTCACGCCTGTGAAACCGTACTAAGTCTCCCGTGTCTTCTTATCACCATCAGGTGA
 CATCCTCGCCAGGCTGTCAATCATGCCGGTATCGATTCCAGTAGCACCGGCCCCACGCTGACAACCC
 ACTCTTGCAGCGTTAGCAGCGCCCCTCTTAACAAGCCGACCCCAACAGCGTCGCGGTTACTAACACT
 CCTCTCCCC

Señal de poliadenilación HSV TK (SEQ ID NO: 14)

20

GGGAGATGGGGGAGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGC
 AATAAAAAGACAGAATAAACGCACGGGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCCGGTCCCAG
 GGCTGGCACTCTGTGCATACCCACCGAGACCCCATTTGGGACCAATACGCCCGGTTTTCTTCTTTTC
 CCCACCCCAACCCCAAGTTTCGGGTGAAGGCCAGGGCTCGCAGCCAACGTGCGGGCGGCAAGCCCTG
 CCATAGCCACGGGCCCCGTGGGTTAGGGACGGGGTCCCCCATGGGGAATGGTTTATGGTTTCGTGGGG
 TTATTATTTTGGGCGTTGCGTGGGGTTCAGGTCCACGACTGGACTGAGCAGACAGACCCATGGTTTTTG
 GATGGCCTGGGCATGGACCGCATGTACTGGCGCGACACGAACACCGGGCGTCTGTGGCTGCCAAACAC
 CCCCACCCCAAAAACCACCGCGCGGATTTCTGGCGCCGCGGACG

ES 2 700 243 T3

Inserción de casete IE-NDV F (virus 1317-46) (SEQ ID NO: 15): (3593 pb)

TAATTAACCCGGGAAGCTTGCATGCCTGCAGTGAATAATAAAATGTGTGTTTGTCCGAAATACGCGTT
TGAGATTTCTGTCCCGACTAAATTCATGTCGCGCGATAGTGGTGTATCGCCGATAGAGATGGCGAT
ATTGGAAAAATCGATATTTGAAAATATGGCATATTGAAAATGTGCGCCGATGTGAGTTTCTGTGTAAC
GATATCGCCATTTTTCCAAAAGTTGATTTTTGGGCATACGCGATATCTGGCGATACGCTTATATCGTT
TACGGGGGATGGCGATAGACGCCTTTGGTGACTTGGGCGATTCTGTGTGTGCGCAAATATCGCAGTTTC
GATATAGGTGACAGACGATATGAGGCTATATCGCCGATAGAGGCGACATCAAGCTGGCACATGGCCAA
TGCATATCGATCTATACATTGAATCAATATTGGCCATTAGCCATATTATTCATTGGTTATATAGCATA
AATCAATATTGGCTATTGGCCATTGCATACGTTGTATCCATATCATAATATGTACATTTATATTGGCT
CATGTCCAACATTACCGCCATGTTGACATTGATTATTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGG
TCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCTGGCTG
ACCGCCAACGACCCCGCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGA
CTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTAT
CATATGCCAAGTACGCCCCATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCTGGCATTATGCCCAGTA
CATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGA
TGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCAC
CCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACAAAATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAA
CTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCGTT

TAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCCACGCTGTTTTGACCTCCATAGAAGACACCGGGAC
 CATGGATCGATCCCGGTGGCGCCCTCCAGGTGCAGGATGGGCTCCAGACCTTCTACCAAGAACCAG
 CACCTATGATGCTGACTATCCGGGTGCGCTGGTACTGAGTTGCATCTGTCCGGCAAACCTCCATTGAT
 GGCAGGCCCTTGCAGCTGCAGGAATTGTGGTTACAGGAGACAAAGCAGTCAACATATACACCTCATC
 CCAGACAGGATCAATCATAGTTAAGCTCCTCCCGAATCTGCCAAAGGATAAGGAGGCATGTGCGAAAG
 CCCCCTTGGATGCATACAACAGGACATTGACCACTTTGCTCACCCCCCTTGGTGACTCTATCCGTAGG
 ATACAAGAGTCTGTGACTACATCTGGAGGGGGGAGACAGGGGGCGCCTTATAGGCGCCATTATTGGCGG
 TGTGGCTCTTGGGGTTGCAACTGCCGCACAAATAACAGCGGCCGCAGCTCTGATACAAGCCAAACAAA
 ATGCTGCCAACATCCTCCGACTTAAAGAGAGCATTGCCGCAACCAATGAGGCTGTGCATGAGGTCCT
 GACGGATTATCGCAACTAGCAGTGGCAGTTGGGAAGATGCAGCAGTTCGTTAATGACCAATTTAATAA
 AACAGCTCAGGAATTAGACTGCATCAAATTTGCACAGCAAGTTGGTGTAGAGCTCAACCTGTACCTAA
 CCGAATCGACTACAGTATTCGGACCACAAATCACTTCACCTGCCTTAAACAAGCTGACTATTCAGGCA
 CTTTACAATCTAGCTGGTGGGAATATGGATTACTTATTGACTAAGTTAGGTATAGGGAACAATCAACT
 CAGCTCATTAATCGGTAGCGGCTTAATCACCGGTAACCCTATTCTATACGACTCACAGACTCAACTCT
 TGGGTATACAGGTAACCTTACCTTCAGTCGGGAACCTAAATAATATGCGTGCCACCTACTTGGAAACC
 TTATCCGTAAGCACAACCAGGGGATTTGCCTCGGCACCTGTCCCAAAGTGGTGACACGGGTGCGTTC
 TGTGATAGAAGAACTTGACACCTCATACTGTATAGAACTGACTTAGATTTATATTGTACAAGAATAG
 TAACGTTCCCTATGTCCCCTGGTATTTACTCCTGCTTGAGCGGCAATACATCGGCCTGTATGTACTCA
 AAGACCGAAGGCGCACTTACTACACCATATATGACTATCAAAGGCTCAGTCATCGCTAACTGCAAGAT
 GACAACATGTAGATGTGTAACCCCCCGGGTATCATATCGCAAACTATGGAGAAGCCGTGTCTCTAA
 TAGATAAAACAATCATGCAATGTTTTATCCTTAGGCGGGATAACTTTAAGGCTCAGTGGGGAATTCGAT
 GTAACCTTATCAGAAGAATATCTCAATACAAGATTCTCAAGTAATAATAACAGGCAATCTTGATATCTC
 AACTGAGCTTGGGAATGTCAACAACCTCGATCAGTAATGCCTTGAATAAGTTAGAGGAAAGCAACAGAA
 AACTAGACAAAGTCAATGTCAAACCTGACCAGCACATCTGCTCTCATTACCTATATCGTTTTGACTATC
 ATATCTCTTGTTTTTTGGTATACTTAGCCTGATTCTAGCATGCTACCTAATGTACAAGCAAAAGGCGCA
 ACAAAGACCTTATTATGGCTTGGGAATAATACCCTAGATCAGATGAGAGCCACTACAAAATGTGAA
 CACAGATGAGGAACGAAGGTTTCCCTAATAGTAATTTGTGTGAAAGTTCTGGTAGTCTGTGAGTTCGG
 AGAGTTAAGAAAAAACCACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTGGGTACGATCCTCTAGAGTC
 GGGAGATGGGGGAGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGACAATAACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGC
 AATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGGTGTTGGGTGCTTTGTTCAATAACGCGGGGTTCCGGTCCCAG
 GGCTGGCACTCTGTGATACCCACCGAGACCCCATTGGGACCAATACGCCCGGTTTCTTCCCTTTTC
 CCCACCCCAACCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCCGGGCGGCAAGCCCTG
 CCATAGCCACGGGCCCCGTGGGTAGGGACGGGGTCCCCCATGGGGAATGGTTTATGGTTCGTGGGGG
 TTATTATTTTGGGCGTTGCGTGGGGTCAGGTCCACGACTGGACTGAGCAGACAGACCCATGGTTTTTG
 GATGGCCTGGGCATGGACCGCATGTACTGGCGCGACACGAACACCGGGCGTCTGTGGCTGCCAAACAC
 CCCCACCCCAAAAACCACCGCGGGATTTCTGGCGCCGCGGACGTGCACTTAAT

Secuencia de inserción de ILTV (SEQ ID NO: 16) (fragmento *Sall* - *HindIII* de 3563 bp):

gTCGACGGCAGAGTCGCAGACGCCCTATTGGACGTCAAATTTGTAGAGGTGAAGTTTTCAAACGATG
 GCGAAGTAACGGCGACTTGCCTTTCCACCGTCAAATCTCCCTATAGGGTAGAACTAATTTGGAAAGTA
 GACCTCGTAGATGTAATGGATGAAATTTCTGGGAACAGTCCCGCCGGGGTTTTTAACAGTAATGAGAA
 ATGGCAGAAACAGCTGTACTACAGAGTAACCGATGGAAGAACATCGGTCCAGCTAATGTGCCCTGTCGT
 GCACGAGCCATTCTCCGGAACCTTACTGTCTTTTCGACACGTCTCTTATAGCGAGGGAAAAAGATATC
 GCGCCAGAGTTATACTTTACCTCTGATCCGCAAACGGCATACTGCACAATAACTCTGCCGTCCGGCGT
 TGTTCCGAGATTGCAATGGAGCCTTAATAATGTTTCACTGCCGGAATATTTGACGGCCACGACCGTTG
 TTTTCGCATACCGCTGGCCAAAGTACAGTGTGGAAGAGCAGCGGAGAGCAGGCGAGGCGTGGATTTCT
 GGCCGGGGAGGCAATATATACGAATGCACCGTCTCATCTCAGACGGCACTCGCGTTACTACGCGAAA
 GGAGAGGTGCTTAACAAACACATGGATTGCGGTGGAACCGGTGCTGCTCAGGCGCAGCTGTATTAC
 TCTTTTCTGGACTTGTGTCAGGATTATGCGGGAGCATATCTGCTTTGTACGCAACGCTATGGACCGCC
 ATTTATTTTGGAGGAATGCTTTTTGGACTATCGTACTGCTTTCTTCCCTTCGCTAGCCAGAGCACCGCC
 GCCGTACGTACGACTACATTTTAGGCCGTGCGCGCTCGACGCGTAACCATAACGGCGGGTTGGCCC
 GTATAACAGATACCTCACTAGGGTATCAAGAGGCTGCGACGTTGTGAGCTCAACCCGATTTCTAACG
 TGGACGACATGATATCGGCGGCCAAAGAAAAGAGAAGGGGGCCCTTTCGAGGCCTCCGTGCTG
 TTCTACGTGATTAAGGGCGACGACGGCGAGGACAAGTACTGTCCAATCTATAGAAAAGAGTACAGGGA

ATGTGGCGACGTACAACCTGCTATCTGAATGCGCCGTTCAATCTGCACAGATGTGGGCAGTGGACTATG
TTCCTAGCACCCCTTGTATCGCGAAATGGCGCGGGACTGACTATATTTCTCCCCACTGCTGCGCTCTCT
GGCCAATACTTGTGACCCCTGAAAATCGGGAGATTTGCGCAAACAGCTCTCGTAACTCTAGAAGTTAA
CGATCGCTGTTTTAAAGATCGGGTCGCAGCTTAACTTTTTTACCCTCGAAATGCTGGACAACAGAACAGT
ATCAGACTGGATTTCAAGGCGAACACCTTTATCCGATCGCAGACACCAATACACGACACGCGGACGAC
GTATATCGGGGATACGAAGATATTCTGCAGCGCTGGAATAATTTGCTGAGGAAAAAGAATCCTAGCGC
GCCAGACCCTCGTCCAGATAGCGTCCCGCAAGAAAATTTCCGCTGTAACCAAGAAAGCGGAAGGGCGCA
CCCCGGACGCAGAAAGCAGCGAAAAGAAGGCCCTCCAGAAGACTCGGAGGACGACATGCAGGCAGAG
GCTTCTGGAGAAAATCCTGCCGCCCTCCCCGAAGACGACGAAGTCCCCGAGGACACCGAGCACGATGA
TCCAAACTCGGATCCTGACTATTACAATGACATGCCCGCCGTGATCCCGGTGGAGGAGACTACTAAA
GTTCTAATGCCGTCTCCATGCCCATATTCGCGGGCTTCGTAGCCTGCGCGGTGCGGCTCGTGGGGCTA
CTGGTTTGGAGCATCGTAAAATGCGCGCGTAGCTAATCGAGCCTAGAATAGGTGGTTTTCTTCTTACAT
GCCACGCCCTCACGCTCATAATATAAAATCACATGGAATAGCATAACCAATGCCTATTCATTGGGACGTT
GAAAAGCATGGCATCGCTACTTGGAACTCTGGCTCTCCTTGCCGCGACGCTCGCACCCCTTCGGCGCGA
TGGAATCGTGATCACTGGAAATCACGTCTCCGCCAGGATTGACGACGATCACATCGTGATCGTTCGCG
CCTCGCCCCGAAGCTACAATTCAACTGCAGCTATTTTTTTCATGCCTGGCCAGAGACCCCAAAACCCTA
CTCAGGAACCGTCCGCGTCGCGTTTTCGGTCTGATATAACAAACCAGTGCTACCAGGAACCTTAGCGAGG
AGCGCTTTGAAAATTGCACTCATCGATCGTCTTCTGTTTTTGTGCGCTGTAAAGTGACCGAGTACACG
TTCTCCGCCTCGAACAGACTAACCGGACCTCCACACCCGTTTAAAGTCACTATACGAAATCCTCGTCC
GAACGACAGCGGGATGTTCTACGTAATTGTTTCGGCTAGACGACACCAAAGAACCATTGACGTCTTCG
CGATCCAATATCGGTGTATCAATTCGCGAACACCGCCGCGACTCGCGGACTCTATTCCAAGGCTTCG
TGTCGCACCTTCGGATTACCTACCGTCCAACCTTGAGGCCTATCTCAGGACCGAGGAAAGTTGGCGCAA
CTGGCAAGCGTACGTGTCACGAGGACGACGACCAGCGCCGAGGCGACAACCCCGACGCCCGTCA
CTGCAACCAGCGCCTCCGAACCTGAAGCGGAACACTTTACCTTTCCCTGGCTAGAAAATGGCGTGGAT
CATTACGAACCGACACCCGCAAACGAAAATTCAAAACGTTACTGTCCGTCTCGGGACAATGAGCCCTAC
GCTAATTTGGGGTAACCGTGGCTGCCGTGAGCGCAACGATCGGCCTCGTCAATTGTAATTTCCATCG
TCACCAGAAACATGTGCACCCCGCACCGAAAATTAGACACGGTCTCGCAAGACGACGAAGAACGTTCC
CAAACCTAGAAGGGAATCGCGAAAATTTGGACCCATGGTTGCGTGCGAAATAACAAGGGGGCTGACCA
GGATAGTGAACCTTGTGGAACCTGGTTGCGATTGTTAACCCGTCTGCGCTAAGCTCGCCCGACTCAATAA
AAATGTGATTAAGTCTGAATGTGGCTCTCCAATCATTTCGATTCTCTAATCTCCAATCCTCTCAAAA
GGGGCAGTATCGGACACGGACTGGGAGGGCGTACACGATAGTTATATGGTACAGCAGAGGCCCTCTGA
ACACTTAGGAGGAGAATTCAGCCGGGAGAGCCCTGTTGAGTAGGCTTGGGAGCATATTGCAGGATG
AACATGTTAGTGATAGTTCTCGCCTCTTGTCTTGCAGCGCTAACTTTTGCAGCGGACACGCTCCTCTT
TTTGGAAAGGCACTCAGGCTGTCTCGGGGAAGATGATCCAGAAACGTTCCGGAAGGGACTGTAATCA
AATGGACAAAAGTCTCGGAAACGCGTGCAAGATGAAGGCGGCCGATGTCTGCTCTTCGCCTAACTAT
TGCTTTTCATGATTTAATTTACGACGGAGGAAAGAAAGACTGCCCGCCCGGGACCCCTGTCTGCAA
CCTGGTAATTTTACTAAAGCGCGGCGAAAgctt

Inserción de casete de expresión dual (SEQ ID NO: 17): 5920 pb

gTCGACGGCAGAGTCGCAGACGCCCTATTGGACGTCAAATTTGTAGAGGTGAAGTTTTCAAACGATG
GCGAAGTAACGGCGACTTGCCTTTCCACCGTCAAATCTCCCTATAGGGTAGAAACTAATTGGAAAGTA
GACCTCGTAGATGTAATGGATGAAATTTCTGGGAACAGTCCCAGGGGGTTTTTAAACAGTAATGAGAA
ATGGCAGAAACAGCTGTACTACAGAGTAACCGATGGAAGAACATCGGTCCAGCTAATGTGCCTGTCTG
GCACGAGCCATTCTCCGGAACCTTACTGTCTTTTCGACACGTCTCTTATAGCGAGGGAAAAAGATATC
GCGCCAGAGTTATACTTTACCTCTGATCCGCAAACGGCATACTGCACAATAACTCTGCCGTCCGGCGT
TGTTCCGAGATTCGAATGGAGCCTTAATAATGTTTCACTGCCGGAATATTTGACGGCCACGACCCTTG
TTTCGCATACCGCTGGCCAAAGTACAGTGTGGAAGAGCAGCGGAGAGCAGGCGAGGCGTGGATTTCT
GGCCGGGAGGCAATATATACGAATGCACCGTCTCATCTCAGACGGCACTCGCGTTACTACGCGAAA
GGAGAGGTGCTTAACAAACACATGGATTGCGGTGGAAAACGGTGCTGCTCAGGCGCAGCTGTATTAC
TCTTTTCTGGACTTGTGTGTCAGGATTATGCGGGAGCATATCTGCTTTGTACGCAACGCTATGGACCGCC
ATTTATTTTGGAGGAATGCTTTTGGACTATCGTACTGCTTTCTTCTTCCCTTCGCTAGCCAGAGCACCGCC
GCCGTACGTACGACTACATTTTAGGCCGTGCGCGCTCGACGCGCTAACCATACCGGCGGTTGGCC
GTATAACAGATACCTCACTAGGGTATCAAGAGGCTGCGACGTTGTGAGCTCAACCCGATTTCTAACG

5

ES 2 700 243 T3

TGGACGACATGATATCGGCGGCCAAAGAAAAGAGAAGGGGGCCCTTTTCGAGGCCTCCGTCTGTGG
TTCTACGTGATTAAGGGCGACGACGCGGAGGACAAGTACTGTCCAATCTATAGAAAAGAGTACAGGGA
ATGTGGCGACGTACAACCTGCTATCTGAATGCGCCGTTCAATCTGCACAGATGTGGGCAGTGGACTATG
TTCCCTAGCACCCCTTGTATCGCGAAATGGCGCGGGACTGACTATATTTCTCCCCACTGCTGCGCTCTCT
GGCCAATACTTGCTGACCCTGAAAATCGGGAGATTTGCGCAAACAGCTCTCGTAACTCTAGAAGTTAA
CGATCGCTGTTTTAAAGATCGGGTCGCAGCTTAACTTTTTACCGTCGAAATGCTGGACAACAGAACAGT
ATCAGACTGGATTTCAAGGCGAACACCTTTATCCGATCGCAGACACCAATACACGACACGCGGACGAC
GTATATCGGGGATACGAAGATATTCTGCAGCGCTGGAATAATTTGCTGAGGAAAAAGAATCCTAGCGC
GCCAGACCCTCGTCCAGATAGCGTCCCGCAAGAAAATCCCGCTGTAACCAAGAAAAGCGGAAGGGCGCA
CCCCGGACGCAGAAAGCAGCGAAAAGAAGGCCCTCCAGAAGACTCGGAGGACGACATGCAGGCAGAG
GCTTCTGGAGAAAATCCTGCCGCCCTCCCCGAAGACGACGAAGTCCCCGAGGACACCGAGCAGATGA
TCCAAACTCGGATCCTGACTATTACAATGACATGCCCGCCGTGATCCCGGTGGAGGAGACTACTAAAA
GTTCTAATGCCGTCTCCATGCCCATATTGCGGGCGTTTCGTAGCCTGCGCGGTGCGGCTCGTGGGGCTA
CTGGTTTGGAGCATCGTAAAATGCGCGCGTAGCTAATCGAGCCTAGAATAGGTGGTTTCTTCTTACAT
GCCACGCCTCACGCTCATAATATAAATCACATGGAATAGCATAACCAATGCCTATTCATTGGGACGTTT
GAAAAGCATGGCATCGCTACTTGGAACTCTGGCTCTCCTTGCCGCGACGCTCGCACCCCTTCGGCGCGA
TGGGAATCGTGATCACTGGAAATCACGTCTCCGCCAGGATTGACGACGATCACATCGTGATCGTTCGCG
CCTCGCCCCGAAGCTACAATTCAACTGCAGCTATTTTTTCATGCCTGGCCAGAGACCCACAAAACCTTA
CTCAGGAACCGTCCGCGTCGCGTTTTCGGTCTGATATAACAAACCAGTGCTACCAGGAACCTTAGCGAGG
AGCGCTTTGAAAATGCACTCATCGATCGTCTTCTGTTTTTTGTCGGCTGTAAAGTGACCGAGTACACG
TTCTCCGCTCGAACAGACTAACCGGACCTCCACACCCGTTTAAAGTCACTATAACGAAATCCTCGTCC
GAACGACAGCGGGATGTTCTACGTAATTGTTTCGGCTAGACGACACCAAAGAACCATTGACGTCTTCG
CGATCCAACATATCGGTGTATCAATTCGCGAACACCGCCGCGACTCGCGGACTCTATTCCAAGGCTTCG
TGTCGCACCTTCGGATTACCTACCGTCCAACCTTGAGGCCTATCTCAGGACCGAGGAAAGTTGGCGCAA
CTGGCAAGCGTACGTTGCCACGGAGGCCACGACGACCAGCGCCGAGGCGACAACCCCGACGCCCGTCA
CTGCAACCAGCGCCTCCGAACCTGAAGCGGAACACTTTACCTTTCCCTGGCTAGAAAATGGCGTGGAT
CATTACGAACCGACACCCGCAAACGAAAATTCAAAACGTTACTGTCCGTCTCGGGACAATGAGCCCTAC
GCTAATTGGGGTAACCGTGGCTGCCGTCTGTGAGCGCAACGATCGGCCTCGTCATTTGTAATTTCCATCG
TCACCAGAAACATGTGCACCCCGCACCGAAAATTAGACACGGTCTCGCAAGACGACGAAGAACGTTCC
CAAAC TAGAAGGGAATCGCGAAAATTTGGACCCATGGTTGCGTGCGAAATAAACAAGGGGGCTGACCA
GGATAGTGAACCTTGTGGAACCTGGTTGCGATTGTTAACCCGTCTGCGCTAAGCTCGCCCGACTCAATAA
AAATGTGATTAAGTCTGAATGTGGCTCTCCAATCATTTTCGATTCTCTAATCTCCCAATCCTCTCAAAA
GGGGCAGTATCGGACACGGACTGGGAGGGGCGTACACGATAGTTATATGGTACAGCAGAGGCCTCTGA
ACACTTAGGAGGAGAATTCAGCCGGGGAGAGCCCTGTTGAGTAGGCTTGGGAGCATATTGCAGGATG
AACATGTTAGTGATAGTTCTCGCCTCTTGTCTTGCAGCGCTAACTTTTGCAGCGGACACGTCCTCTT
TTTGGAAAGGCACTCAGGCTGTCTCGGGGAAGATGATCCCAGAAAACGTTCCGGAAGGGACTGTAATCA
AATGGACAAAAGTCTGCGGAACGCGTGCAAGATGAAGGCGGCCGATGTCTGCTCTTCGCCTAACTAT
TGCTTTTCATGATTTAATTTACGACGGAGGAAAGAAAAGACTGCCCGCCGCGGGACCCCTGTCTGCAAA
CCTGGTAATTTTACTAAAGCGCGGGCGAAAGCTTCGCGCCAGGTCAATTCCTGGCATTATGCCCAGTA
CATGACCTTATGGGACTTTTCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGA
TGCGGTTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTTGACTCACGGGGATTTCGAAGTCTCCAC
CCCATTGACGTCAATGGGAGTTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAA
CTCCGCCCATTTGACGCAATGGGCGGTAGCGTGTACGGTGGGAGTCTATATAAGCAGAGCTCGTTT
AGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCCACGCTGTTTTGACCTCCATAGAAGACACCGGTTGC
GCCGCCACCATGGGCCCCAGACCTTCTACCAAGAACCAGTACCTATGATGCTGACTGTCCGAGTCGC
GCTGGTACTGAGTTGCATCTGTCCGGCAAACCTCCATTGATGGCAGGCCTCTTGCAGGCTGCAGGAATTG
TGTTACAGGAGACAAAGCCGTCAACATATAACCTCATCCCAGACAGGATCAATCATAGTTAAGCTC
CTCCGAATCTGCCCAAGGATAAAGGAGGCATGTGCGAAAGCCCCCTTGGATGCATACAACAGGACATT
GACCACTTTGCTCACCCCTTGGTGACTCTATCCGTAGGATAACAAGAGTCTGTGACTACATCTGGAG
GGGGGAGACAGGGGCGCCTTATAGGCGCCATTATTGGCGGTGTGGCTCTTGGGGTTGCAACTGCCGCA
CAAATAACAGCGGCCGAGCTCTGATACAAGCCAAACAAAATGCTGCCAACATCCTCCGACTTAAAGA
GAGCATTGCCGCAACCAATGAGGCTGTGCATGAGGTCACCTGACGGATTATCGCAACTAGCAGTGGCAG
TTGGGAAGATGCAGCAGTTTGTAAATGACCAATTTAATAAAACAGCTCAGGAATTAGACTGCATCAAA
ATTGCACAGCAAGTTGGTGTAGAGCTCAACCTGTACCTAACCGAATTGACTACAGTATTCCGACCACA
AATCACTTACCTGCTTTAAACAAGCTGACTATTACAGGCACTTTACAATCTAGCTGGTGGAAATATGG

ATTACTTATTGACTAAGTTAGGTGTAGGGAACAATCAACTCAGCTCATTAATCGGTAGCGGCTTAATC
 ACCGGTAACCCCTATTCTATACGACTCACAGACTCAACTCTGGGTATACAGGTAACCTACCTTCAGT
 CGGGAAGCTAAATAATATGCGTGCCACCTACTTGGAAACCTTATCCGTAAGCACACCAGGGGATTG
 CCTCGGCACTTGTCCCAAAAGTGGTGACACAGGTTCGGTCTGTGATAGAAGAAGTTGACACCTCATA
 TGTATAGAACTGACTTACATTTATATTTGTACAAGAATAGTAACGTTCCTATGTCCCCTGGTATTTA
 TTCCTGCTTGAGCGGCAATACGTTCGGCCTGTATGTACTCAAAGACCGAAGGCGCACTTACTACACCAT
 ACATGACTATCAAAGGTTTCAGTCATCGCCAAGTGAAGATGACAACATGTAGATGTGTAAACCCCCCG
 GGTATCATATCGCAAAACTATGGAGAAGCCGTGTCTCTAATAGATAAACAATCATGCAATGTTTTATC
 CTTAGGCGGGATAACTTTAAGGCTCAGTGGGGAATTCGATGTAACCTTATCAGAAGAATATCTCAATAC
 AAGATTCTCAAGTAATAATAACAGGCAATCTTGATATCTCAACTGAGCTTGGGAATGTCAACAACCTCG
 ATCAGTAATGCTTTGAATAAGTTAGAGGAAAGCAACAGAAAAGTTAGACAAAAGTCAATGTCAAACCTGAC
 TAGCACATCTGCTCTCATTACCTATATCGTGTGACTATCATATCTCTTGTGTTTTGGTATACTTAGCC
 TGATTCTAGCATGCTACCTAATGTACAAGCAAAAGGCGCAACAAAAGACCTTATTATGGCTTGGGAAT
 AATACTCTAGATCAGATGAGAGCCACTACAAAATGTGAGGATCTCTCGAGGAATTCTAGATCCCACG
 TCACTATTGTATACTCTATATTATACTCTATGTTATACTCTGTAATCCTACTCAATAAACGTGTCACG
 CCTGTGAAACCGTACTAAGTCTCCCGTGTCTTCTTATCACCATCAGGTGACATCCTCGCCCAGGCTGT
 CAATCATGCCGGTATCGATTCCAGTAGCACCGGCCCCACGCTGACAACCCACTCTGTCAGCGTTAGCA
 GCGCCCCTCTTAACAAGCCGACCCACCAGCGTTCGCGGTTACTAACACTCCTCTCCCCGACCTGCAA
 CTAGT

5 El alcance de la presente invención no debe limitarse a las realizaciones específicas descritas en el presente documento. De hecho, diversas modificaciones de la invención, además de las descritas en el presente documento, serán evidentes para los expertos en la técnica a partir de la descripción anterior. En el sentido más amplio, la invención es como se define en las reivindicaciones adjuntas.

10 Se entiende además que todos los tamaños de bases o los tamaños de aminoácidos, y todos los valores de pesos moleculares o masas moleculares, proporcionados para los ácidos nucleicos o polipéptidos son aproximados, y se proporcionan para la descripción.

LISTADO DE SECUENCIAS

- 15 <110> Intervet International BV Cook, Stephanie Morsey, Mohamad Petersen, Gary Sondermeijer, Paulus JA
- <120>CONSTRUCCIONES DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE MAREK RECOMBINANTES NO PATÓGENAS QUE CODIFICAN ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA Y DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
- 20 <130> 2011.029-US-PCT
- <150> 61/549.844
- <151> 21/10/2011
- 25 <160> 17
- <170> PatentIn versión 3.5
- 30 <210> 1
- <211> 1305
- <212> ADN
- <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa
- 35 <400> 1

ES 2 700 243 T3

atgcaccgtc ctcatctcag acggcactcg cgttactacg cgaaaggaga ggtgcttaac 60
 aaacacatgg attgcggtgg aaaacggtgc tgctcaggcg cagctgtatt cactcttttc 120
 tggacttgtg tcaggattat gcgggagcat atctgctttg tacgcaacgc tatggaccgc 180
 catttatttt tgaggaatgc tttttggact atcgtactgc tttcttcctt cgctagccag 240
 agcaccgccg ccgtcacgta cgactacatt ttaggccgtc gcgcgctcga cgcgctaacc 300
 ataccggcgg ttggcccgta taacagatac ctactaggg tatcaagagg ctgcgacgtt 360
 gtcgagctca acccgatttc taacgtggac gacatgatat cggcggccaa agaaaaagag 420
 aagggggggc ctttcgaggc ctccgctcgtc tggttctacg tgattaaggg cgacgacggc 480
 gaggacaagt actgtccaat ctatagaaaa gagtacaggg aatgtggcga cgtacaactg 540
 ctatctgaat gcgccgttca atctgcacag atgtgggcag tggactatgt tcctagcacc 600
 cttgtatcgc gaaatggcgc gggactgact atattctccc ccaactgctgc gctctctggc 660
 caatacttgc tgaccctgaa aatcgggaga tttgcgcaa cagctctcgt aactctagaa 720
 gttaacgatc gctgtttaaa gatcgggtcg cagcttaact ttttaccgtc gaaatgctgg 780
 acaacagaac agtatcagac tggatttcaa ggcgaacacc tttatccgat cgcagacacc 840
 aatacacgac acgcggacga cgtatatcgg ggatacgaag atattctgca gcgctggaat 900
 aatttgctga ggaaaaagaa tcctagcgcg ccagaccctc gtccagatag cgtcccgcaa 960
 gaaattcccg ctgtaaccaa gaaagcggaa gggcgcaccc cggacgcaga aagcagcgaa 1020
 aagaaggccc ctccagaaga ctccggaggac gacatgcagg cagaggcttc tggagaaaat 1080
 cctgccgccc tccccgaaga cgacgaagtc cccgaggaca ccgagcacga tgatccaaac 1140
 tcggatcctg actattacaa tgacatgccc gccgtgatcc cggaggagga gactactaaa 1200
 agttctaatag ccgtctccat gcccatattc gggcggttcg tagcctgcgc ggtcgcgctc 1260
 gtggggctac tggtttgag catcgtaaaa tgccgcgcta gctaa 1305

5 <210> 2
 <211> 434
 <212> PRT
 <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa

10 <400> 2

ES 2 700 243 T3

Met His Arg Pro His Leu Arg Arg His Ser Arg Tyr Tyr Ala Lys Gly
 1 5 10 15

Glu Val Leu Asn Lys His Met Asp Cys Gly Gly Lys Arg Cys Cys Ser
 20 25 30

Gly Ala Ala Val Phe Thr Leu Phe Trp Thr Cys Val Arg Ile Met Arg
 35 40 45

Glu His Ile Cys Phe Val Arg Asn Ala Met Asp Arg His Leu Phe Leu
 50 55 60

Arg Asn Ala Phe Trp Thr Ile Val Leu Leu Ser Ser Phe Ala Ser Gln
 65 70 75 80

Ser Thr Ala Ala Val Thr Tyr Asp Tyr Ile Leu Gly Arg Arg Ala Leu
 85 90 95

Asp Ala Leu Thr Ile Pro Ala Val Gly Pro Tyr Asn Arg Tyr Leu Thr
 100 105 110

Arg Val Ser Arg Gly Cys Asp Val Val Glu Leu Asn Pro Ile Ser Asn
 115 120 125

Val Asp Asp Met Ile Ser Ala Ala Lys Glu Lys Glu Lys Gly Gly Pro
 130 135 140

Phe Glu Ala Ser Val Val Trp Phe Tyr Val Ile Lys Gly Asp Asp Gly
 145 150 155 160

Glu Asp Lys Tyr Cys Pro Ile Tyr Arg Lys Glu Tyr Arg Glu Cys Gly
 165 170 175

Asp Val Gln Leu Leu Ser Glu Cys Ala Val Gln Ser Ala Gln Met Trp
 180 185 190

ES 2 700 243 T3

Ala Val Asp Tyr Val Pro Ser Thr Leu Val Ser Arg Asn Gly Ala Gly
 195 200 205

Leu Thr Ile Phe Ser Pro Thr Ala Ala Leu Ser Gly Gln Tyr Leu Leu
 210 215 220

Thr Leu Lys Ile Gly Arg Phe Ala Gln Thr Ala Leu Val Thr Leu Glu
 225 230 235 240

Val Asn Asp Arg Cys Leu Lys Ile Gly Ser Gln Leu Asn Phe Leu Pro
 245 250 255

Ser Lys Cys Trp Thr Thr Glu Gln Tyr Gln Thr Gly Phe Gln Gly Glu
 260 265 270

His Leu Tyr Pro Ile Ala Asp Thr Asn Thr Arg His Ala Asp Asp Val
 275 280 285

Tyr Arg Gly Tyr Glu Asp Ile Leu Gln Arg Trp Asn Asn Leu Leu Arg
 290 295 300

Lys Lys Asn Pro Ser Ala Pro Asp Pro Arg Pro Asp Ser Val Pro Gln
 305 310 315 320

Glu Ile Pro Ala Val Thr Lys Lys Ala Glu Gly Arg Thr Pro Asp Ala
 325 330 335

Glu Ser Ser Glu Lys Lys Ala Pro Pro Glu Asp Ser Glu Asp Asp Met
 340 345 350

Gln Ala Glu Ala Ser Gly Glu Asn Pro Ala Ala Leu Pro Glu Asp Asp
 355 360 365

Glu Val Pro Glu Asp Thr Glu His Asp Asp Pro Asn Ser Asp Pro Asp
 370 375 380

Tyr Tyr Asn Asp Met Pro Ala Val Ile Pro Val Glu Glu Thr Thr Lys
 385 390 395 400

Ser Ser Asn Ala Val Ser Met Pro Ile Phe Ala Ala Phe Val Ala Cys
 405 410 415

Ala Val Ala Leu Val Gly Leu Leu Val Trp Ser Ile Val Lys Cys Ala
 420 425 430

Arg Ser

ES 2 700 243 T3

<210> 3
 <211> 1089
 <212> ADN
 <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa

5

<400> 3
 atggcatcgc tacttggaac tctgggtctc cttgccgcga cgctcgcacc cttcggcgcg 60
 atgggaatcg tgatcactgg aatcacgtc tccgccagga ttgacgacga tcacatcgtg 120
 atcgtcgcgc ctcgccccga agctacaatt caactgcagc tatttttcat gcctggccag 180
 agaccccaca aaccctactc aggaaccgtc cgcgctcgcgt ttcgggtctga tataacaaac 240
 cagtgtctacc aggaacttag cgaggagcgc tttgaaaatt gcaactcatcg atcgtcttct 300
 gtttttgtcg gctgtaaagt gaccgagtac acgttctccg cctcgaacag actaaccgga 360
 cctccacacc cgtttaagct cactatacga aatcctcgtc cgaacgacag cgggatgttc 420
 tacgtaattg ttcggctaga cgacaccaa gaaccattg acgtcttcgc gatccaacta 480
 tcggtgtatc aattcgcgaa caccgcccgc actcgcggac tctattcaa ggcttcgtgt 540
 cgcaccttcg gattacctac cgtccaactt gaggcctatc tcaggaccga ggaaagtgg 600
 cgcaactggc aagcgtacgt tgccacggag gccacgacga ccagcgcga ggcgacaacc 660
 ccgacgcccg tcaactgcaac cagcgcctcc gaacttgaag cggaaactt tacctttccc 720
 tggctagaaa atggcgtgga tcattacgaa ccgacacccg caaacgaaaa ttcaaactgtt 780
 actgtccgtc tcgggacaat gagccctacg ctaattgggg taaccgtggc tgccgtcgtg 840
 agcgcaacga tcggcctcgt cattgtaatt tccatcgtca ccagaaacat gtgcaccccg 900
 caccgaaaat tagacacggt ctcgcaagac gacgaagaac gttcccaaac tagaagggaa 960
 tcgcgaaaat ttggacccat ggttgcggtgc gaaataaaca agggggctga ccaggatagt 1020
 gaacttgtgg aactggttgc gattgttaac ccgtctgcgc taagctcgcc cgactcaata 1080
 aaaatgtga 1089

10

<210> 4
 <211> 362
 <212> PRT
 <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa

15

<400> 4
 Met Ala Ser Leu Leu Gly Thr Leu Ala Leu Leu Ala Ala Thr Leu Ala
 1 5 10 15
 Pro Phe Gly Ala Met Gly Ile Val Ile Thr Gly Asn His Val Ser Ala
 20 25 30
 Arg Ile Asp Asp Asp His Ile Val Ile Val Ala Pro Arg Pro Glu Ala

ES 2 700 243 T3

Val Ile Ser Ile Val Thr Arg Asn Met Cys Thr Pro His Arg Lys Leu
 290 295 300

Asp Thr Val Ser Gln Asp Asp Glu Glu Arg Ser Gln Thr Arg Arg Glu
 305 310 315 320

Ser Arg Lys Phe Gly Pro Met Val Ala Cys Glu Ile Asn Lys Gly Ala
 325 330 335

Asp Gln Asp Ser Glu Leu Val Glu Leu Val Ala Ile Val Asn Pro Ser
 340 345 350

Ala Leu Ser Ser Pro Asp Ser Ile Lys Met
 355 360

- <210> 5
- <211> 1662
- <212> ADN
- <213> Virus de la enfermedad de Newcastle

5

<400> 5

atgggccccca gaccttctac caagaaccca gtacctatga tgctgactgt ccgagtcgcg 60

ctggactga gttgcatctg tccggcaaac tccattgatg gcaggcctct tgcggctgca 120

ggaattgtgg ttacaggaga caaagccgtc aacatataca cctcatccca gacaggatca 180

atcatagtta agctcctccc gaatctgccc aaggataagg aggcattgtgc gaaagcccc 240

ttggatgcat acaacaggac attgaccact ttgctcacc cccttgggta ctctatccgt 300

aggatacaag agtctgtgac tacatctgga ggggggagac aggggcgcct tataggcgcc 360

attattggcg gtgtggctct tggggttgca actgccgcac aaataacagc ggccgcagct 420

ctgatacaag ccaaacaaaa tgctgccaac atcctccgac ttaaagagag cattgccgca 480

accaatgagg ctgtgcatga ggtcactgac ggattatcgc aactagcagt ggagttggg 540

aagatgcagc agtttggtta tgaccaattt aataaacagc ctcaggaatt agactgcatc 600

aaaattgcac agcaagttgg tgtagagctc aacctgtacc taaccgaatt gactacagta 660

ttcggaccac aaatcacttc acctgcttta aacaagctga ctattcaggc actttacaat 720

ctagctggtg gaaatatgga ttacttattg actaagttag gtgtagggaa caatcaactc 780

agctcattaa tcggtagcgg cttaatcacc ggtaacccta ttctatacga ctcacagact 840

caactcttgg gtatacaggt aactctacct tcagtcggga agctaaataa tatgcgtgcc 900

acctacttgg aaaccttata cgtaagcaca accaggggat ttgcctcggc acttgtccca 960

aaagtgggta cacaggctgg ttctgtgata gaagaacttg acacctcata ctgtatagaa 1020

actgacttac atttatattg tacaagaata gtaacgttcc ctatgtcccc tggatattat 1080

tcctgcttga gcggcaatac gtcggcctgt atgtactcaa agaccgaagg cgcacttact 1140

10

ES 2 700 243 T3

acaccataca tgactatcaa aggttcagtc atcgccaact gcaagatgac aacatgtaga 1200
 tgtgtaaacc ccccgggtat catatcgcaa aactatggag aagccgtgtc tctaatagat 1260
 aaacaatcat gcaatgtttt atccttaggc gggataactt taaggctcag tggggaattc 1320
 gatgtaactt atcagaagaa tatctcaata caagattctc aagtaataat aacaggcaat 1380
 cttgatatct caactgagct tgggaatgtc aacaactoga tcagtaatgc tttgaataag 1440
 ttagaggaaa gcaacagaaa actagacaaa gtcaatgtca aactgactag cacatctgct 1500
 ctccattacct atatcgtggt gactatcata tctcttgttt ttggtatact tagcctgatt 1560
 ctagcatgct acctaagtga caagcaaaag gcgcaacaaa agaccttatt atggcttggg 1620
 aataatactc tagatcagat gagagccact acaaaaatgt ga 1662

5

<210> 6
 <211> 553
 <212> PRT
 <213> Virus de la enfermedad de Newcastle

<400> 6

Met	Gly	Pro	Arg	Pro	Ser	Thr	Lys	Asn	Pro	Val	Pro	Met	Met	Leu	Thr
1				5					10					15	
Val	Arg	Val	Ala	Leu	Val	Leu	Ser	Cys	Ile	Cys	Pro	Ala	Asn	Ser	Ile
			20					25					30		
Asp	Gly	Arg	Pro	Leu	Ala	Ala	Ala	Gly	Ile	Val	Val	Thr	Gly	Asp	Lys
		35					40					45			
Ala	Val	Asn	Ile	Tyr	Thr	Ser	Ser	Gln	Thr	Gly	Ser	Ile	Ile	Val	Lys
	50					55					60				
Leu	Leu	Pro	Asn	Leu	Pro	Lys	Asp	Lys	Glu	Ala	Cys	Ala	Lys	Ala	Pro
65					70					75					80
Leu	Asp	Ala	Tyr	Asn	Arg	Thr	Leu	Thr	Thr	Leu	Leu	Thr	Pro	Leu	Gly
				85					90					95	
Asp	Ser	Ile	Arg	Arg	Ile	Gln	Glu	Ser	Val	Thr	Thr	Ser	Gly	Gly	Gly
			100					105					110		
Arg	Gln	Gly	Arg	Leu	Ile	Gly	Ala	Ile	Ile	Gly	Gly	Val	Ala	Leu	Gly
		115					120					125			
Val	Ala	Thr	Ala	Ala	Gln	Ile	Thr	Ala	Ala	Ala	Ala	Leu	Ile	Gln	Ala
	130					135						140			

10

ES 2 700 243 T3

Lys Gln Asn Ala Ala Asn Ile Leu Arg Leu Lys Glu Ser Ile Ala Ala
 145 150 155 160

Thr Asn Glu Ala Val His Glu Val Thr Asp Gly Leu Ser Gln Leu Ala
 165 170 175

Val Ala Val Gly Lys Met Gln Gln Phe Val Asn Asp Gln Phe Asn Lys
 180 185 190

Thr Ala Gln Glu Leu Asp Cys Ile Lys Ile Ala Gln Gln Val Gly Val
 195 200 205

Glu Leu Asn Leu Tyr Leu Thr Glu Leu Thr Thr Val Phe Gly Pro Gln
 210 215 220

Ile Thr Ser Pro Ala Leu Asn Lys Leu Thr Ile Gln Ala Leu Tyr Asn
 225 230 235 240

Leu Ala Gly Gly Asn Met Asp Tyr Leu Leu Thr Lys Leu Gly Val Gly
 245 250 255

Asn Asn Gln Leu Ser Ser Leu Ile Gly Ser Gly Leu Ile Thr Gly Asn
 260 265 270

Pro Ile Leu Tyr Asp Ser Gln Thr Gln Leu Leu Gly Ile Gln Val Thr
 275 280 285

Leu Pro Ser Val Gly Lys Leu Asn Asn Met Arg Ala Thr Tyr Leu Glu
 290 295 300

Thr Leu Ser Val Ser Thr Thr Arg Gly Phe Ala Ser Ala Leu Val Pro
 305 310 315 320

Lys Val Val Thr Gln Val Gly Ser Val Ile Glu Glu Leu Asp Thr Ser
 325 330 335

Tyr Cys Ile Glu Thr Asp Leu His Leu Tyr Cys Thr Arg Ile Val Thr
 340 345 350

Phe Pro Met Ser Pro Gly Ile Tyr Ser Cys Leu Ser Gly Asn Thr Ser
 355 360 365

Ala Cys Met Tyr Ser Lys Thr Glu Gly Ala Leu Thr Thr Pro Tyr Met
 370 375 380

Thr Ile Lys Gly Ser Val Ile Ala Asn Cys Lys Met Thr Thr Cys Arg
 385 390 395 400

ES 2 700 243 T3

Cys Val Asn Pro Pro Gly Ile Ile Ser Gln Asn Tyr Gly Glu Ala Val
 405 410 415

Ser Leu Ile Asp Lys Gln Ser Cys Asn Val Leu Ser Leu Gly Gly Ile
 420 425 430

Thr Leu Arg Leu Ser Gly Glu Phe Asp Val Thr Tyr Gln Lys Asn Ile
 435 440 445

Ser Ile Gln Asp Ser Gln Val Ile Ile Thr Gly Asn Leu Asp Ile Ser
 450 455 460

Thr Glu Leu Gly Asn Val Asn Asn Ser Ile Ser Asn Ala Leu Asn Lys
 465 470 475 480

Leu Glu Glu Ser Asn Arg Lys Leu Asp Lys Val Asn Val Lys Leu Thr
 485 490 495

Ser Thr Ser Ala Leu Ile Thr Tyr Ile Val Leu Thr Ile Ile Ser Leu
 500 505 510

Val Phe Gly Ile Leu Ser Leu Ile Leu Ala Cys Tyr Leu Met Tyr Lys
 515 520 525

Gln Lys Ala Gln Gln Lys Thr Leu Leu Trp Leu Gly Asn Asn Thr Leu
 530 535 540

Asp Gln Met Arg Ala Thr Thr Lys Met
 545 550

<210> 7
 <211> 1698
 <212> ADN
 <213> Virus de la enfermedad de Newcastle

<400> 7

atggatcgat cccggttggc gccctccagg tgcaggatgg gctccagacc ttctaccaag 60
 aaccagcac ctatgatgct gactatccgg gtcgcgctgg tactgagttg catctgtccg 120
 gcaaactcca ttgatggcag gcctcttgca gctgcaggaa ttgtggttac aggagacaaa 180
 gcagtcaaca tatacacctc atcccagaca ggatcaatca tagttaagct cctcccgaat 240
 ctgccaaagg ataaggaggc atgtgcgaaa gccccttgg atgcatacaa caggacattg 300
 accactttgc tcacccccct tgggtgactct atccgtagga tacaagagtc tgtgactaca 360
 tctggagggg ggagacaggg ggcgcttata ggcgccatta ttggcgggtg ggctcttggg 420
 gttgcaactg ccgcacaaat aacagcggcc gcagctctga tacaagccaa acaaaatgct 480

5

10

ES 2 700 243 T3

gccaacatcc tccgacttaa agagagcatt gccgcaacca atgaggctgt gcatgaggtc 540
 actgacggat tatcgcaact agcagtggca gttgggaaga tgcagcagtt cgттаатgac 600
 caatttaata aaacagctca ggaattagac tgcатcaaaa ttgcacagca agttgggtga 660
 gagctcaacc tgtacctaac cgaatcgact acagtattcg gaccacaaat cacttcacct 720
 gccttaaaca agctgactat tcaggcactt tacaatctag ctgggtgggaa tatggattac 780
 ttattgacta agttagggtat agggaacaat caactcagct cattaatcgg tagcgggtta 840
 atcaccggta accctattct atacgactca cagactcaac tcttgggtat acaggtaact 900
 ctaccttcag tcgggaacct aaataatatg cgtgccacct acttggaac cttatccgta 960
 agcacaacca ggggatttgc ctcggcactt gtcccaaaag tggtgacacg ggtcggttct 1020
 gtgatagaag aacttgacac ctcatactgt atagaaactg acttagattt atattgtaca 1080
 agaatagtaa cgttccctat gtcccctggt atttactcct gcttgagcgg caatacatcg 1140
 gcctgtatgt actcaaagac cgaaggcgca cttactacac catatatgac tatcaaaggc 1200
 tcagtcatcg ctaactgcaa gatgacaaca tgtagatgtg taaaccccc gggtatcata 1260
 tcgcaaaact atggagaagc cgtgtctcta atagataaac aatcatgcaa tgttttatcc 1320
 ttaggcggga taactttaag gctcagtggg gaattcgatg taacttatca gaagaatac 1380
 tcaatacaag attctcaagt aataataaca ggcaatcttg atatctcaac tgagcttggg 1440
 aatgtcaaca actcgatcag таатgccttg aataagttag aggaaagcaa cagaaaacta 1500
 gacaaagtca atgtcaaact gaccagcaca tctgctctca ttacctatat cgttttgact 1560
 atcatatctc ttgtttttgg tatacttagc ctgattctag catgctacct aatgtacaag 1620
 caaaaggcgc aacaaaagac cttattatgg cttgggaata ataccctaga tcagatgaga 1680
 gccactacaa aatgtga 1698

<210> 8
 <211> 565
 <212> PRT
 <213> Virus de la enfermedad de Newcastle

5

<400> 8

Met Asp Arg Ser Arg Leu Ala Pro Ser Arg Cys Arg Met Gly Ser Arg
 1 5 10 15

Pro Ser Thr Lys Asn Pro Ala Pro Met Met Leu Thr Ile Arg Val Ala
 20 25 30

Leu Val Leu Ser Cys Ile Cys Pro Ala Asn Ser Ile Asp Gly Arg Pro
 35 40 45

10

Leu Ala Ala Ala Gly Ile Val Val Thr Gly Asp Lys Ala Val Asn Ile

ES 2 700 243 T3

50						55						60					
Tyr	Thr	Ser	Ser	Gln	Thr	Gly	Ser	Ile	Ile	Val	Lys	Leu	Leu	Pro	Asn		
65					70					75					80		
Leu	Pro	Lys	Asp	Lys	Glu	Ala	Cys	Ala	Lys	Ala	Pro	Leu	Asp	Ala	Tyr		
				85					90					95			
Asn	Arg	Thr	Leu	Thr	Thr	Leu	Leu	Thr	Pro	Leu	Gly	Asp	Ser	Ile	Arg		
			100					105					110				
Arg	Ile	Gln	Glu	Ser	Val	Thr	Thr	Ser	Gly	Gly	Gly	Arg	Gln	Gly	Arg		
		115						120				125					
Leu	Ile	Gly	Ala	Ile	Ile	Gly	Gly	Val	Ala	Leu	Gly	Val	Ala	Thr	Ala		
	130					135					140						
Ala	Gln	Ile	Thr	Ala	Ala	Ala	Ala	Leu	Ile	Gln	Ala	Lys	Gln	Asn	Ala		
145					150					155					160		
Ala	Asn	Ile	Leu	Arg	Leu	Lys	Glu	Ser	Ile	Ala	Ala	Thr	Asn	Glu	Ala		
				165					170					175			
Val	His	Glu	Val	Thr	Asp	Gly	Leu	Ser	Gln	Leu	Ala	Val	Ala	Val	Gly		
			180					185					190				
Lys	Met	Gln	Gln	Phe	Val	Asn	Asp	Gln	Phe	Asn	Lys	Thr	Ala	Gln	Glu		
		195					200					205					
Leu	Asp	Cys	Ile	Lys	Ile	Ala	Gln	Gln	Val	Gly	Val	Glu	Leu	Asn	Leu		
	210					215					220						
Tyr	Leu	Thr	Glu	Ser	Thr	Thr	Val	Phe	Gly	Pro	Gln	Ile	Thr	Ser	Pro		
225					230					235					240		
Ala	Leu	Asn	Lys	Leu	Thr	Ile	Gln	Ala	Leu	Tyr	Asn	Leu	Ala	Gly	Gly		
				245					250					255			
Asn	Met	Asp	Tyr	Leu	Leu	Thr	Lys	Leu	Gly	Ile	Gly	Asn	Asn	Gln	Leu		
			260					265					270				
Ser	Ser	Leu	Ile	Gly	Ser	Gly	Leu	Ile	Thr	Gly	Asn	Pro	Ile	Leu	Tyr		
		275					280					285					
Asp	Ser	Gln	Thr	Gln	Leu	Leu	Gly	Ile	Gln	Val	Thr	Leu	Pro	Ser	Val		
	290					295					300						

ES 2 700 243 T3

Gly Asn Leu Asn Asn Met Arg Ala Thr Tyr Leu Glu Thr Leu Ser Val
 305 310 315 320

Ser Thr Thr Arg Gly Phe Ala Ser Ala Leu Val Pro Lys Val Val Thr
 325 330 335

Arg Val Gly Ser Val Ile Glu Glu Leu Asp Thr Ser Tyr Cys Ile Glu
 340 345 350

Thr Asp Leu Asp Leu Tyr Cys Thr Arg Ile Val Thr Phe Pro Met Ser
 355 360 365

Pro Gly Ile Tyr Ser Cys Leu Ser Gly Asn Thr Ser Ala Cys Met Tyr
 370 375 380

Ser Lys Thr Glu Gly Ala Leu Thr Thr Pro Tyr Met Thr Ile Lys Gly
 385 390 395 400

Ser Val Ile Ala Asn Cys Lys Met Thr Thr Cys Arg Cys Val Asn Pro
 405 410 415

Pro Gly Ile Ile Ser Gln Asn Tyr Gly Glu Ala Val Ser Leu Ile Asp
 420 425 430

Lys Gln Ser Cys Asn Val Leu Ser Leu Gly Gly Ile Thr Leu Arg Leu
 435 440 445

Ser Gly Glu Phe Asp Val Thr Tyr Gln Lys Asn Ile Ser Ile Gln Asp
 450 455 460

Ser Gln Val Ile Ile Thr Gly Asn Leu Asp Ile Ser Thr Glu Leu Gly
 465 470 475 480

Asn Val Asn Asn Ser Ile Ser Asn Ala Leu Asn Lys Leu Glu Glu Ser
 485 490 495

Asn Arg Lys Leu Asp Lys Val Asn Val Lys Leu Thr Ser Thr Ser Ala
 500 505 510

Leu Ile Thr Tyr Ile Val Leu Thr Ile Ile Ser Leu Val Phe Gly Ile
 515 520 525

Leu Ser Leu Ile Leu Ala Cys Tyr Leu Met Tyr Lys Gln Lys Ala Gln
 530 535 540

Gln Lys Thr Leu Leu Trp Leu Gly Asn Asn Thr Leu Asp Gln Met Arg
 545 550 555 560

ES 2 700 243 T3

Ala Thr Thr Lys Met
565

5	<210> 9 <211> 527 <212> ADN <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa						
	<400> 9						
	aaacagctgt actacagagt aaccgatgga agaacatcgg tccagctaata gtgcctgtcg						60
	tgcacgagcc attctccgga accttactgt cttttcgaca cgtctcttat agcgagggaa						120
	aaagatatcg cgccagagtt atactttacc tctgatccgc aaacggcata ctgcacaata						180
	actctgccgt ccggcgttgt tccgagattc gaatggagcc ttaataatgt ttcactgccg						240
	gaatatttga cggccacgac cgttgtttcg cataaccgctg gccaaaagtac agtgtggaag						300
	agcagcgcga gagcagggcga ggcgtggatt tctggccggg gaggcaatat atacgaatgc						360
	accgtcctca tctcagacgg cactcgcggt actacgcgaa aggagaggtg cttaaacaaac						420
	acatggattg cgggtggaaaa cgggtgctgct caggcgcagc tgtattcact cttttctgga						480
10	cttgtgtcag gattatgcgg gagcatatct gctttgtacg caacgct						527
15	<210> 10 <211> 264 <212> ADN <213> Virus de la laringotraqueitis infecciosa						
	<400> 10						
	tgactattac aatgacatgc ccgccgtgat cccgggtggag gagactacta aaagttctaa						60
	tgccgtctcc atgcccataat tcggggcggt cgtagcctgc gcggtcgcgc tcgtggggct						120
	actggtttgg agcatcgtaa aatgcgcgcg tagctaatacg agcctagaat aggtggtttc						180
	ttcctacatg ccacgcctca cgctcataat ataaatcaca tggaatagca taccaatgcc						240
20	tattcattgg gacgttcgaa aagc						264
25	<210> 11 <211> 360 <212> ADN <213> Citomegalovirus humano						
	<400> 11						
	cgcgccaggt caattccctg gcattatgcc cagtacatga ccttatggga ctttcctact						60
	tggcagtaca tctacgtatt agtcatcgct attaccatgg tgatgcggtt ttggcagtac						120
	atcaatgggc gtggatagcg gtttgactca cggggatttc caagtctcca cccattgac						180
	gtcaatggga gtttgttttg gcacaaaaat caacgggact ttccaaaaatg tcgtaacaac						240
	tccgccccat tgacgcaaat gggcggtagc gtgtacgggtg ggaggtctat ataagcagag						300
30	ctcgttttagt gaaccgtcag atcgcctgga gacgccatcc acgctgtttt gacctccata						360

ES 2 700 243 T3

<210> 12
 <211> 1191
 <212> ADN
 <213> Citomegalovirus humano

5

<400> 12

```

gtgaataata aaatgtgtgt ttgtccgaaa tacgcgtttg agatttctgt cccgactaaa      60
ttcatgtcgc gcgatagtgg tgtttatcgc cgatagagat ggcgatattg gaaaaatcga      120
tatttgaaaa tatggcatat tgaaaatgtc gccgatgtga gtttctgtgt aactgatatc      180
gccatthttc caaaagttga tttttgggca tacgcgatat ctggcgatac gcttatatcg      240
tttacggggg atggcgatag acgcctttgg tgacttgggc gattctgtgt gtcgcaaata      300
tcgcagtttc gatataggtg acagacgata tgaggctata tcgccgatag aggcgacatc      360
aagctggcac atggccaatg catatcgcac tatacattga atcaatattg gccattagcc      420
atattattca ttggttatat agcataaatc aatattggct attggccatt gcatacgttg      480
tatccatatc ataatatgta catttatatt ggctcatgtc caacattacc gccatgttga      540
cattgattat tgactagtta ttaatagtaa tcaattacgg ggtcattagt tcatagccca      600
tatatggagt tccgcgttac ataacttacg gtaaattggcc cgcctggctg accgcccac      660
gacccccgcc cattgacgtc aataatgacg tatgttccca tagtaacgcc aatagggact      720
ttccattgac gtcaatgggt ggagtattta cggtaaaactg cccacttggc agtacatcaa      780
gtgtatcata tgccaagtac gccccctatt gacgtcaatg acggtaaatg gcccgcttg      840
cattatgcc agtacatgac cttatgggac tttcctactt ggcagtacat ctacgtatta      900
gtcatcgcta ttaccatggt gatgcggttt tggcagtaca tcaatgggag tggatagcgg      960
tttgactcac ggggatttcc aagtctccac cccattgacg tcaatgggag tttgttttg      1020
caccaaatc aacgggactt tccaaaatgt cgtaacaact ccgccccatt gacgcaaatg      1080
ggcggtaggc gtgtacggtg ggaggtctat ataagcagag ctcgtttagt gaaccgtcag      1140
atcgctgga gacgccatcc acgctgtttt gacctccata gaagacaccg g      1191
    
```

10 <210> 13
 <211> 281
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

15 <220><223> Secuencia sintética

<400> 13

```

ggaattctag atcccacgtc actattgtat actctatatt atactctatg ttatactctg      60
taatcctact caataaacgt gtcacgcctg tgaaaccgta ctaagtctcc cgtgtcttct      120
    
```

20

ES 2 700 243 T3

	tatcaccatc aggtgacatc ctgcgccagg ctgtcaatca tgccggatc gattccagta	180
	gcaccggccc cagcgtgaca acccactott gcagcgtag cagcgcccct cttaacaagc	240
	cgacccccac cagcgtcgcg gttactaaca ctctctccc c	281
	<210> 14	
	<211> 523	
5	<212> ADN	
	<213> virus del herpes simple	
	<400> 14	
	gggagatggg ggaggctaac tgaaacacgg aaggagacaa taccggaagg aacccgcgct	60
	atgacggcaa taaaagaca gaataaacg cacgggtgtt gggcgtttg ttcataaacg	120
	cggggttcgg tcccagggtt ggcactctgt cgatacccca ccgagacccc attgggacca	180
	atacggccgc gtttcttctt tttccccacc ccaaccccca agttcgggtg aaggcccagg	240
	gctcgcagcc aacgtcgggg cggcaagccc tgccatagcc acgggccccg tgggttaggg	300
	acgggggtccc ccatggggaa tggtttatgg ttcgtggggg ttattatattt gggcgttgcg	360
	tggggtcagg tccacgactg gactgagcag acagaccat ggtttttgga tggcctgggc	420
	atggaccgca tgtactggcg cgacacgaac accgggcgctc tgtggctgcc aaacaccccc	480
10	gacccccaaa aaccaccgcg cggatttctg gcgccgccgg acg	523
	<210> 15	
	<211> 3593	
15	<212> ADN	
	<213> Secuencia artificial	
	<220><223> Inserción de casete de expresión	
	<400> 15	
20	taattaaccg ggaagcttg catgcctgca gtgaataata aatgtgtgt ttgtccgaaa	60
	tacgcgtttg agatttctgt cccgactaaa ttcattgctgc gcgatagtgg tgtttatcgc	120
	cgatagagat ggcgatattg gaaaaatcga tatttgaaaa tatggcatat tgaaaatgtc	180
	gccgatgtga gtttctgtgt aactgatatc gccatttttc caaaagttga tttttgggca	240
	tacgcgatat ctggcgatac gcttatatcg tttacggggg atggcgatag acgcctttgg	300
	tgacttgggc gattctgtgt gtcgcaaata tcgcagtttc gatataggtg acagacgata	360
	tgaggctata tcgccgatag aggcgacatc aagctggcac atggccaatg catatcgatc	420
	tatacattga atcaatattg gccattagcc atattattca ttggttatat agcataaatc	480
	aatattggct attggccatt gcatacgttg tatccatatc ataatatgta catttatatt	540
	ggctcatgtc caacattacc gccatggtga cattgattat tgactagtta ttaatagtaa	600
	tcaattacgg ggtcattagt tcatagccca tatatggagt tccgcgttac ataacttacg	660

ES 2 700 243 T3

gtaaattggcc	cgcttggtg	accgcccac	gacccccgc	cattgacgtc	aataatgacg	720
tatgttccca	tagtaacgcc	aatagggact	ttccattgac	gtcaatgggt	ggagtattta	780
cggtaaactg	cccacttggc	agtacatcaa	gtgtatcata	tgccaagtac	gccccctatt	840
gacgtcaatg	acggtaaagt	gcccgcctgg	cattatgccc	agtacatgac	cttatgggac	900
tttcctactt	ggcagtacat	ctacgtatta	gtcatcgcta	ttaccatggt	gatgcggttt	960
tggcagtaca	tcaatgggcg	tggatagcgg	tttgactcac	ggggatttcc	aagtctccac	1020
cccattgacg	tcaatgggag	tttgttttgg	cacccaaaatc	aacgggactt	tccaaaatgt	1080
cgtaacaact	ccgccccatt	gacgcaaatg	ggcggtaggc	gtgtacggtg	ggaggctctat	1140
ataagcagag	ctcgtttagt	gaaccgtcag	atcgccctgga	gacgccatcc	acgctgtttt	1200
gacctccata	gaagacaccg	ggaccatgga	tcgatcccgg	ttggcgcctc	ccagggtcag	1260
gatgggctcc	agaccttcta	ccaagaacct	agcacctatg	atgctgacta	tccgggtcgc	1320
gctggtactg	agttgcatct	gtccggcaaa	ctccattgat	ggcaggcctc	ttgcagctgc	1380
aggaattgtg	gttacaggag	acaaagcagt	caacatatac	acctcatccc	agacaggatc	1440
aatcatagtt	aagctcctcc	cgaatctgcc	aaaggataag	gaggcatgtg	cgaaagcccc	1500
cttggtatgca	tacaacagga	cattgaccac	tttgcctacc	ccccttgggtg	actctatccg	1560
taggatacaa	gagtctgtga	ctacatctgg	aggggggaga	caggggcgcc	ttataggcgc	1620
cattattggc	ggtgtggctc	ttggggttgc	aactgccgca	caaataacag	cggccgcagc	1680
tctgatacaa	gccaaacaaa	atgctgccaa	catcctccga	cttaaagaga	gcattgccgc	1740
aaccaatgag	gctgtgcatg	aggtcactga	cggattatcg	caactagcag	tggcagttgg	1800
gaagatgcag	cagttcgтта	atgaccaatt	taataaaaca	gctcaggaat	tagactgcat	1860
caaaattgca	cagcaagttg	gtgtagagct	caacctgtac	ctaaccgaat	cgactacagt	1920
attcggacca	caaatcactt	cacctgcctt	aaacaagctg	actattcagg	cactttacaa	1980
tctagctggt	gggaatatgg	attacttatt	gactaagtta	ggtatagggg	acaatcaact	2040
cagctcatta	atcggtagcg	gcttaatcac	cggtaaccct	attctatacg	actcacagac	2100
tcaactcttg	ggtatacagg	taactctacc	ttcagtcggg	aacctaaata	atatgcgtgc	2160
cacctacttg	gaaaccttat	ccgtaagcac	aaccagggga	tttgcctcgg	cacttgtccc	2220
aaaagtgggtg	acacgggtcg	gttctgtgat	agaagaactt	gacacctcat	actgtataga	2280
aactgactta	gatttatatt	gtacaagaat	agtaacgttc	cctatgtccc	ctggatttta	2340
ctcctgcttg	agcggcaata	catcggcctg	tatgtactca	aagaccgaag	gcgcacttac	2400
tacaccatat	atgactatca	aaggctcagt	catcgctaac	tgcaagatga	caacatgtag	2460
atgtgtaaac	ccccgggta	tcatatcgca	aaactatgga	gaagccgtgt	ctctaataga	2520
taaacaatca	tgcaatgttt	tatccttagg	cgggataact	ttaaggctca	gtggggaatt	2580

ES 2 700 243 T3

cgatgtaact tatcagaaga atatctcaat acaagattct caagtaataa taacaggcaa 2640
tcttgatata tcaactgagc ttgggaatgt caacaactcg atcagtaatg ccttgaataa 2700
gtagaggaa agcaacagaa aactagacaa agtcaatgtc aaactgacca gcacatctgc 2760
tctcattacc tatatcgttt tgactatcat atctcttggt tttggtatac ttagcctgat 2820
tctagcatgc tacctaattgt acaagcaaaa ggcgcaacaa aagaccttat tatggcttgg 2880
gaataatacc ctagatcaga tgagagccac tacaaaaatg tgaacacaga tgaggaacga 2940
aggtttccct aatagtaatt tgtgtgaaag ttctggtagt ctgtcagttc ggagagttaa 3000
gaaaaaaaaa aaaccccccc cccccccccc cccccccct gggtagcatc ctctagagtc 3060
gggagatggg ggaggctaac tgaaacacgg aaggagacaa taccggaagg aaccgcgct 3120
atgacggcaa taaaaagaca gaataaaacg cacgggtggt gggtagtttg ttcataaacg 3180
cggggttcgg tcccagggct ggcactctgt cgatacccca ccgagacccc attgggacca 3240
atacgcccgc gtttcttctt tttccccacc ccaaccccca agttcgggtg aaggcccagg 3300
gctcgcagcc aacgtcgggg cggcaagccc tgccatagcc acgggccccg tgggttaggg 3360
acgggggtccc ccatggggaa tggtttatgg ttcgtggggg ttattatttt gggcgttgcg 3420
tggggtcagg tccacgactg gactgagcag acagacccat ggtttttgga tggcctgggc 3480
atggaccgca tgtactggcg cgacacgaac accgggcgct tgtggctgcc aaacaccccc 3540
gacccccaaa aaccaccgcg cggatttctg gcgccgccgg acgtcagactt aat 3593

<210> 16

<211> 3569

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220><223> Inserción de casete de expresión

10 <400> 16

gtcgcagggca gagtcgcaga cgcacctatt ggacgtcaaa attgtagagg tgaagttttc 60
aaacgatggc gaagtaacgg cgacttgctt ttccaccgctc aaatctccct atagggtaga 120
aactaattgg aaagtagacc tcgtagatgt aatggatgaa atttctggga acagtcccgc 180
cggggttttt aacagtaatg agaaatggca gaaacagctg tactacagag taaccgatgg 240
aagaacatcg gtccagctaa tgtgcctgtc gtgcacgagc cattctccgg aaccttactg 300
tcttttcgac acgtctctta tagcgagggga aaaagatata gcgccagagt tatactttac 360
ctctgatccg caaacggcat actgcacaat aactctgccg tccggcgttg ttccgagatt 420
cgaatggagc cttaataatg tttcactgcc ggaatatttg acggccacga ccgttgtttc 480
gcataccgct ggccaaagta cagtgtggaa gagcagcgcg agagcaggcg aggcgtggat 540

ES 2 700 243 T3

ttctggccgg ggaggcaata tatacgaatg caccgtcctc atctcagacg gcaactcgcgt 600
 tactacgcga aaggagaggt gcttaacaaa cacatggatt gcggtggaaa acggtgctgc 660
 tcaggcgcag ctgtattcac tcttttctgg acttgtgtca ggattatgcg ggagcatatc 720
 tgctttgtac gcaacgctat ggaccgccat ttatTTTTga ggaatgcttt ttggactatc 780
 gtactgcttt cttccttcgc tagccagagc accgccgccg tcacgtacga ctacatttta 840
 ggccgtcgcg cgctcgacgc gctaaccata ccggcggttg gcccgataa cagatacctc 900
 actagggtat caagaggctg cgacgttgtc gagctcaacc cgatttctaa cgtggacgac 960
 atgatatcgg cggccaaaga aaaagagaag gggggccctt tcgaggcctc cgctcgtctgg 1020
 ttctacgtga ttaagggcga cgacggcgag gacaagtact gtccaatcta tagaaaagag 1080
 tacagggaat gtggcgacgt acaactgcta tctgaatgcg ccgttcaatc tgcacagatg 1140
 tgggcagtgg actatgttcc tagcaccctt gtatcgcgaa atggcgcggg actgactata 1200
 ttctccccca ctgctgcgct ctctggccaa tacttgtgta ccctgaaaat cgggagatTT 1260
 gcgcaaacag ctctcgtaac tctagaagtt aacgatcgtc gtttaaagat cgggtcgcag 1320
 cttacttttt taccgtcga aatgctggaca acagaacagt atcagactgg atttcaaggc 1380
 gaacaccttt atccgatcgc agacaccaat acacgacacg cggacgacgt atatcgggga 1440
 tacgaagata ttctgcagcg ctggaataat ttgctgagga aaaagaatcc tagcgcgcca 1500
 gaccctcgtc cagatagcgt cccgcaagaa attcccgtg taaccaagaa agcggaaagg 1560
 cgcaccccg gacgagaaag cagcgaaaag aaggcccctc cagaagactc ggaggacgac 1620
 atgcaggcag aggcttctgg agaaaatcct gccgccctcc ccgaagacga cgaagtcccc 1680
 gaggacaccg agcacgatga tccaaactcg gatcctgact attacaatga catgcccgcc 1740
 gtgatcccg tggaggagac tactaaaagt tctaatagccg tctccatgcc catattcgcg 1800
 gcgttcgtag cctgcgcggt cgcgctcgtg gggctactgg tttggagcat cgtaaaatgc 1860
 gcgcgtagct aatcgagcct agaatagggtg gtttcttctc acatgccacg cctcacgctc 1920
 ataataaaa tcacatggaa tagcatacca atgcctattc attgggacgt tcgaaaagca 1980
 tggcatcgtc acttggaaact ctggctctcc ttgccgcgac gctcgcaccc ttcggcgcga 2040
 tgggaatcgt gatcactgga aatcacgtct ccgccaggat tgacgacgat cacatcgtga 2100
 tcgtcgcgcc tcgccccgaa gctacaattc aactgcagct atTTTTcatg cctggccaga 2160
 gacccacaa accctactca ggaaccgtcc gcgtcgcggt tcggtctgat ataacaacc 2220
 agtgctacca ggaacttagc gaggagcgtc ttgaaaattg cactcatcga tcgtcttctg 2280
 tttttgtcgg ctgtaaagtg accgagtaca cgttctccgc ctcgaaacaga ctaaccggac 2340
 ctccacacc gtttaagctc actatacga atcctcgtcc gaacgacagc gggatgttct 2400
 acgtaattgt tcggctagac gacaccaaag aaccattga cgtcttcgcg atccaactat 2460

ES 2 700 243 T3

cgggtgatca attcgcgaac accgccgcga ctgcgggact ctattccaag gcttcgtgtc 2520
 gcaccttcgg attacctacc gtccaacttg aggccatct caggaccgag gaaagttggc 2580
 gcaactggca agcgtacgtt gccacggagg ccacgacgac cagcgccgag gcgacaacc 2640
 cgacgcccgt cactgcaacc agcgcctccg aacttgaagc ggaacacttt acctttccct 2700
 ggctagaaaa tggcgtggat cattacgaac cgacaccgc aaacgaaaat tcaaactgta 2760
 ctgtccgtct cgggacaatg agccctacgc taattggggg aaccgtggct gccgtcgtga 2820
 gcgcaacgat cggcctcgtc attgtaattt ccatcgtcac cagaaacatg tgcaccccg 2880
 accgaaaatt agacacggtc tcgcaagacg acgaagaacg ttcccaaact agaagggat 2940
 cgcgaaaatt tggaccatg gttgcgtgcg aaataaaca gggggctgac caggatagt 3000
 aacttgtgga actggttgcg attgttaacc cgtctgcgt aagctcgccc gactcaataa 3060
 aatgtgatt aagtctgaat gtggctctcc aatcatttcg attctctaatt ctcccaatcc 3120
 tctcaaaagg ggcagtatcg gacacggact gggagggcg tacacgatag ttatatggta 3180
 cagcagaggc ctctgaacac ttaggaggag aattcagccg gggagagccc ctgttgagta 3240
 ggcttgggag catattgcag gatgaacatg ttagtgatag ttctgcctc ttgtcttgcg 3300
 cgcctaactt ttgcgacgcg acacgtcctc tttttggaag gcaactcaggc tgcctcggg 3360
 gaagatgatc ccagaaacgt tccggaaggg actgtaatca aatggacaaa agtcctgcg 3420
 aacgcgtgca agatgaaggc ggccgatgtc tgctcttcgc ctaactattg ctttcatgat 3480
 ttaatttacg acggaggaaa gaaagactgc ccgcccgcg gaccctgtc tgcaaacctg 3540
 gtaattttac taaagcgcgg cgaaagctt 3569

<210> 17

<211> 5921

5 <212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220><223> Inserción de casete de expresión

10 <400> 17

gtcgacggca gagtcgcaga cgcccctatt ggacgtcaaa attgtagagg tgaagttttc 60
 aaacgatggc gaagtaacgg cgacttgcgt ttccaccgtc aaatctccct atagggtaga 120
 aactaattgg aaagtagacc tcgtagatgt aatggatgaa atttctggga acagtcccgc 180
 cggggttttt aacagtaatg agaaatggca gaaacagctg tactacagag taaccgatgg 240
 aagaacatcg gtccagctaa tgtgcctgtc gtgcacgagc cattctccgg aaccttactg 300
 tcttttcgac acgtctctta tagcgagggg aaaagatata gcgccagagt tatactttac 360
 ctctgatccg caaacggcat actgcacaat aactctgccg tccggcgttg ttccgagatt 420

ES 2 700 243 T3

cgaatggagc cttaataatg tttcactgcc ggaatatttg acggccacga ccgttgtttc 480
 gcataccgct ggccaaagta cagtgtggaa gagcagcgcg agagcaggcg aggcgtggat 540
 ttctggccgg ggaggcaata tatacgaatg caccgtcctc atctcagacg gcaactcgct 600
 tactacgcga aaggagaggt gcttaacaaa cacatggatt gcggtggaaa acggtgctgc 660
 tcaggcgcag ctgtattcac tcttttctgg acttgtgtca ggattatgcg ggagcatatc 720
 tgctttgtac gcaacgctat ggaccgccat ttatttttga ggaatgcttt ttggactatc 780
 gtactgcttt cttccttcgc tagccagacg accgccgccg tcacgtacga ctacatttta 840
 ggccgtcgcg cgctcgacgc gctaaccata ccggcggttg gcccgataaa cagatacctc 900
 actagggat caagaggctg cgacgtgtgc gagctcaacc cgatttctaa cgtggacgac 960
 atgatatcgg cggccaaaga aaaagagaag gggggccctt tcgaggcctc cgtcgtctgg 1020
 ttctacgtga ttaagggcga cgacggcgag gacaagtact gtccaatcta tagaaaagag 1080
 tacagggat gtggcgacgt acaactgcta tctgaatgcg ccggttcaatc tgcacagatg 1140
 tgggcagtgg actatggtcc tagcaccctt gtatcgcgaa atggcgcggg actgactata 1200
 ttctcccca ctgctgcgct ctctggccaa tacttgtgtga ccctgaaaat cgggagattt 1260
 gcgcaaacag ctctcgtaac tctagaagtt aacgatcgct gtttaaagat cgggtcgcag 1320
 cttaactttt taccgtcgaa atgctggaca acagaacagt atcagactgg atttcaaggc 1380
 gaacaccttt atccgatcgc agacaccaat acacgacacg cggacgacgt atatcgggga 1440
 tacgaagata ttctgcagcg ctggaataat ttgctgagga aaaagaatcc tagcgcgcca 1500
 gaccctcgtc cagatagcgt cccgcaagaa attcccgtg taaccaagaa agcgggaagg 1560
 cgcaccccg gacgagaaag cagcgaagaa aaggcccctc cagaagactc ggaggacgac 1620
 atgcaggcag aggcttctgg agaaaatcct gccgccctcc ccgaagacga cgaagtcccc 1680
 gaggacaccg agcacgatga tccaaactcg gatcctgact attacaatga catgcccgcc 1740
 gtgatcccgg tggaggagac tactaaaagt tctaattgcc tctccatgcc catattcgcg 1800
 gcgttcgtag cctgcgcggt cgcgctcgtg gggctactgg tttggagcat cgtaaaatgc 1860
 gcgcgtagct aatcgagcct agaatagtg gtttcttctc acatgccacg cctcacgctc 1920
 ataataaaa tcacatggaa tagcatacca atgcctattc attgggacgt tcgaaaagca 1980
 tggcatcgt acttggaaact ctggetctcc ttgccgcgac gctcgcaccc ttcggcgcca 2040
 tgggaatcgt gatcactgga aatcacgtct ccgccaggat tgacgacgat cacatcgtga 2100
 tcgtcgcgcc tcgccccgaa gctacaattc aactgcagct atttttcatg cctggccaga 2160
 gacccacaa accctactca ggaaccgtcc gcgtcgcgct tcggtctgat ataacaacc 2220
 agtgctacca ggaacttagc gaggagcgt ttgaaaattg cactcatcga tcgtcttctg 2280
 tttttgtcgg ctgtaaagt accgagtaca cgttctccgc ctcgaacaga ctaaccggac 2340

ES 2 700 243 T3

ctccacacc	gtttaagctc	actatacgaa	atcctcgtcc	gaacgacagc	gggatgttct	2400
acgtaattgt	tcggctagac	gacaccaaag	aaccattga	cgtcttcgcg	atccaactat	2460
cggtgtatca	attcgcaac	accgccgga	ctcgggact	ctattccaag	gcttcgtgtc	2520
gcaccttcgg	attacctacc	gtccaacttg	aggcctatct	caggaccgag	gaaagttggc	2580
gcaactggca	agcgtacgtt	gccacggagg	ccacgacgac	cagcgccgag	gcgacaaccc	2640
cgacgcccg	cactgcaacc	agcgcctccg	aacttgaagc	ggaacacttt	acctttccct	2700
ggctagaaaa	tggcgtggat	cattacgaac	cgacaccgac	aaacgaaaat	tcaaacgtta	2760
ctgtccgtct	cgggacaatg	agccctacgc	taattgggg	aaccgtggct	gccgtcgtga	2820
gcgcaacgat	cggcctcgtc	attgtaattt	ccatcgtcac	cagaaacatg	tgcacccgac	2880
accgaaaatt	agacacggtc	tcgcaagacg	acgaagaacg	ttcccaaact	agaagggaat	2940
cgcgaaaatt	tggacccatg	gttgcgtgcg	aaataaaca	gggggctgac	caggatagt	3000
aacttgtgga	actggttgcg	attgttaacc	cgtctgcgct	aagctcggcc	gactcaataa	3060
aatgtgatt	aagtctgaat	gtggctctcc	aatcatttcg	attctcta	ctcccaatcc	3120
tctcaaaagg	ggcagtatcg	gacacggact	gggagggg	tacacgatag	ttatatggta	3180
cagcagaggc	ctctgaacac	ttaggaggag	aattcagccg	gggagagccc	ctgttgagta	3240
ggcttgggag	catattgcag	gatgaacatg	ttagtgatag	ttctcgcctc	ttgtcttgcg	3300
cgcctaactt	ttgcgacgcg	acacgtcctc	tttttggag	gcactcaggc	tgtcctcggg	3360
gaagatgatc	ccagaaacgt	tccggaagg	actgtaatca	aatggacaaa	agtcctgcgg	3420
aacgcgtgca	agatgaaggc	ggccgatgtc	tgctcttcgc	ctaactattg	ctttcatgat	3480
ttaatttacg	acggaggaaa	gaaagactgc	ccgcccgcgg	gacccctgtc	tgcaaacctg	3540
gtaattttac	taaagcgcgg	cgaaagcttc	gcccaggtc	aattccctgg	cattatgccc	3600
agtacatgac	cttatgggac	tttcctactt	ggcagtacat	ctacgtatta	gtcatcgcta	3660
ttaccatggt	gatgcggttt	tggcagtaca	tcaatggg	tggatagcgg	tttgactcac	3720
ggggatttcc	aagtctccac	cccattgacg	tcaatgggag	tttgttttgg	caccaaaatc	3780
aacgggactt	tccaaaatgt	cgtaacaact	ccgcccatt	gacgcaaatg	ggcggtagcg	3840
tgtacgggtg	gaggtctata	taagcagagc	tcgtttagt	aaccgtcaga	tcgcctggag	3900
acgccatcca	cgctgttttg	acctccatag	aagacaccgg	ttgcgccgcc	accatgggcc	3960
ccagaccttc	taccaagaac	ccagtacct	tgatgctgac	tgtccgagtc	gcgctggtac	4020
tgagttgcat	ctgtccggca	aactccattg	atggcaggcc	tcttgcggct	gcaggaattg	4080
tggttacagg	agacaaagcc	gtcaacatat	acacctc	ccagacagga	tcaatcatag	4140
ttaagctcct	cccgaatctg	ccaaggata	aggaggcatg	tgcgaaagcc	cccttggatg	4200

ES 2 700 243 T3

catacaacag gacattgacc actttgctca ccccccttgg tgactctatc cgtaggatac 4260
 aagagtctgt gactacatct ggagggggga gacaggggcg ccttataggc gccattattg 4320
 gcggtgtggc tcttgggggtt gcaactgccg cacaaataac agcggccgca gctctgatac 4380
 aagccaaaca aaatgctgcc aacatcctcc gacttaaaga gagcattgcc gcaaccaatg 4440
 aggctgtgca tgaggctact gacggattat cgcaactagc agtggcagtt gggaaagatgc 4500
 agcagtttgt taatgaccaa ttaataaaa cagctcagga attagactgc atcaaaattg 4560
 cacagcaagt tgggtgtagag ctcaacctgt acctaaccga attgactaca gtattcggac 4620
 cacaaatcac ttcacctgct ttaaacaagc tgactattca ggcactttac aatctagctg 4680
 gtggaaatat ggattactta ttgactaagt taggtgtagg gaacaatcaa ctcagctcat 4740
 taatcggtag cggcttaatc accggttaacc ctattctata cgactcacag actcaactct 4800
 tgggtataca ggtaactcta ccttcagtcg ggaagctaaa taatatgCGT gccacctact 4860
 tggaaacctt atccgtaagc acaaccaggg gatttgccctc ggcacttgtc ccaaaagtgg 4920
 tgacacaggt cggttctgtg atagaagaac ttgacacctc atactgtata gaaactgact 4980
 tacatttata ttgtacaaga atagtaacgt tccctatgtc ccctgggtatt tattcctgct 5040
 tgagcggcaa tacgtcggcc tgtatgtact caaagaccga aggcgcactt actacaccat 5100
 acatgactat caaaggttca gtcactcgca actgcaagat gacaacatgt agatgtgtaa 5160
 accccccggg tatcatatcg caaaactatg gagaagccgt gtctctaata gataaacaat 5220
 catgcaatgt tttatcctta ggcgggataa ctttaaggct cagtggggaa ttcgatgtaa 5280
 cttatcagaa gaatatctca atacaagatt ctcaagtaat aataacaggc aatcttgata 5340
 tctcaactga gcttgggaat gtcaacaact cgatcagtaa tgctttgaaat aagttagagg 5400
 aaagcaacag aaaactagac aaagtcaatg tcaaactgac tagcacatct gctctcatta 5460
 cctatatcgt gttgactatc atatctcttg tttttggat acttagcctg attctagcat 5520
 gctaccta at gtacaagcaa aaggcgcaac aaaagacctt attatggctt gggaaataata 5580
 ctctagatca gatgagagcc actacaaaaa tgtgaggatc tctcgaggaa ttctagatcc 5640
 cacgtcacta ttgtatactc tatattatac tctatgttat actctgtaat cctactcaat 5700
 aaacgtgtca cgcctgtgaa accgtactaa gtctcccgtg tcttcttata accatcaggt 5760
 gacatcctcg cccaggctgt caatcatgcc ggtatcgatt ccagtagcac cggccccacg 5820
 ctgacaacc actcttgag cgttagcagc gcccctctta acaagccgac ccccaccagc 5880
 gtcgCGGTta ctaacactcc tctccccgac ctgcaactag t 5921

REIVINDICACIONES

- 5 1. Un virus de la enfermedad de Marek no patógeno (rMDV_{np}) que comprende un primer ácido nucleico insertado en un primer sitio no esencial en el genoma de rMDV_{np} y un segundo ácido nucleico insertado en un segundo sitio no esencial en el genoma de rMDV_{np};
- 10 en donde el primer ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína gD del virus de la laringotraqueitis infecciosa (ILTV) y una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína ILTV gl; en donde segundo ácido nucleico comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de fusión del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV F);
- 15 en donde el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial son el sitio US2 o el sitio UL54.5, o como alternativa, el primer sitio no esencial es el sitio US2 y el segundo sitio no esencial está entre los genes UL7 y UL8; y en donde el rMDV_{np} es un herpesvirus recombinante de pavos (rHVT).
- 20 2. El rHVT de la reivindicación 1, en el que el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial son el sitio US2.
3. El rHVT de la reivindicación 1, en el que el primer sitio no esencial y el segundo sitio no esencial son el sitio UL54.5.
4. El rHVT de la reivindicación 1, en el que el primer sitio no esencial es el sitio US2 y el segundo sitio no esencial está entre los genes UL7 y UL8.
- 25 5. El rHVT de las reivindicaciones 1-4, en el que la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gD de ILTV está operativamente bajo el control de un primer promotor, la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína gl de ILTV está operativamente bajo el control de un segundo promotor y la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína F de NDV está operativamente bajo el control de un tercer promotor.
- 30 6. El rHVT de la reivindicación 5, en el que el primer promotor es el promotor ILTV gD endógeno, el segundo promotor en el promotor ILTV gl endógeno y el tercer promotor es el promotor temprano inmediato del citomegalovirus humano (hCMV IE).
7. Una vacuna que comprende el rHVT de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6.
8. La vacuna de la reivindicación 7, que comprende además un virus de la enfermedad de la bolsa infecciosa vivo moderado (IBDV).
- 35 9. La vacuna de la reivindicación 8, en la que el IBDV vivo moderado es la cepa 89/03.

FIGURA I

FIGURA 2