

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 701 091**

51 Int. Cl.:

C12N 15/85 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **06.07.2011** **E 15188915 (1)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **12.09.2018** **EP 3026117**

54 Título: **Elemento de ADN que tiene actividad de aumento de expresión de un gen exógeno**

30 Prioridad:

07.07.2010 JP 2010154782

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

20.02.2019

73 Titular/es:

**DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (100.0%)
3-5-1, Nihonbashi- Honcho
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP**

72 Inventor/es:

**NISHIMIYA, DAISUKE y
INOUE, TATSUYA**

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

ES 2 701 091 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Elemento de ADN que tiene actividad de aumento de expresión de un gen exógeno

Campo técnico

5 La presente invención se refiere a una célula hospedadora de mamífero cuya capacidad para segregar una proteína exógena se ha aumentado usando un vector de expresión de un gen exógeno que tiene un elemento de ADN y a un procedimiento para producir la proteína exógena usando la célula hospedadora.

Técnica antecedente

10 Debido al desarrollo de las técnicas de recombinación genética, se ha expandido rápidamente el mercado de productos farmacéuticos proteicos tales como proteínas terapéuticas y fármacos de anticuerpos. En particular, los fármacos de anticuerpos tienen una alta especificidad y no producen una reacción inmunitaria adversa incluso cuando se administran al cuerpo humano y por lo tanto, el desarrollo de los mismos se ha llevado a cabo activamente.

15 Como célula hospedadora en la que se produce una proteína farmacéutica tipificada por un fármaco de anticuerpo puede usarse un microorganismo, una célula de insecto, animal o vegetal, una célula de animal o vegetal transgénica, o similares. Con el fin de que la proteína farmacéutica tenga actividad biológica o inmunogenicidad, es esencial la modificación post-traducciona tal como el plegado o la glucosilación y por lo tanto no será adecuado un microorganismo en el que no se pueda llevar a cabo una complicada modificación post-traducciona o una planta que tenga una estructura de glucanos diferente como célula hospedadora que funcione como biorreactor. El uso de una célula de mamífero cultivada, tal como una célula CHO, que sea de una especie estrechamente relacionada con los seres humanos es convencional actualmente, considerando que dicha célula tenga una estructura de glucanos similar a la de los seres humanos y que sea segura, y que pueda llevarse a cabo la modificación post-traducciona usando dicha célula.

20 En los casos en los que se usa una célula de mamífero cultivada como célula hospedadora, existe los problemas de que la velocidad de crecimiento es baja, la productividad es baja, el coste es alto, etc., en comparación con un microorganismo o similar (véase el documento no de patente 1). Además, con el fin de usar un producto farmacéutico proteico en un ensayo clínico, es necesario administrar una gran cantidad del producto. Por lo tanto, la falta de capacidad de producción del mismo también es un problema en todo el mundo. Por consiguiente, con el fin de mejorar la productividad de un gen exógeno en una célula de mamífero en cultivo, se han llevado a cabo hasta ahora muchos estudios de promotores, amplificadores, marcadores de selección farmacológicos, técnicas de amplificación genética y de modificación de cultivos, y similares. Sin embargo, la situación actual es que no se ha establecido aún un sistema capaz de aumentar la expresión génica uniformemente. Como una de las causas de la baja productividad de una proteína exógena, se considera un "efecto de posición" (véase el documento no de patente 2). Cuando un gen exógeno se introduce en una célula hospedadora, se integra aleatoriamente en el genoma cromosómico del hospedador y la transcripción del gen exógeno se ve afectada en gran medida por el ADN que se encuentra alrededor de la región donde se ha integrado el gen exógeno. Un efecto de posición se ve afectado por factores tales como el sitio de inserción, el número de copias, la estructura, etc. del gen exógeno, sin embargo es muy difícil controlar el sitio de inserción en el cromosoma.

35 Con el fin de resolver el problema, se han identificado recientemente secuencias de polinucleótidos reguladoras (también conocidas como elementos de ADN) tales como la región de control del locus (LCR), la región de anclaje del armazón/matriz (S/MAR), un aislante, el elemento ubicuo de apertura de cromatina (UCOE), y un anti-represor (elemento STAR) (véanse los documentos no de patente 3 a 6). La LCR no es necesaria para abrir la estructura de cromatina en un locus génico endógeno. Sin embargo, la LCR es un elemento regulador de la transcripción que tiene la capacidad de abrir la estructura de cromatina alrededor del ADN donde se ha integrado el gen exógeno y de remodelar un amplio tramo de cromatina cuando se usa junto con la unidad de expresión de un gen exógeno y se dice que necesita una región rica en AT (véase el documento no de patente 7).

40 El elemento de ADN mencionado anteriormente tipificado por la LCR se usa a menudo en combinación con un promotor, se sabe que en los casos en los que se usa el elemento de ADN en combinación con un promotor, el nivel de expresión de un gen exógeno aumenta en comparación con los casos en los que solamente se usa el promotor. Sin embargo, hasta ahora se han comunicado muy pocos tipos de elementos de ADN, y los distintos mecanismos que contribuyen al aumento de la expresión de un gen exógeno son diferentes entre sí. Además, incluso si se usan en combinación un elemento de ADN y un promotor, no se producen cantidades suficientes de una proteína terapéutica bajo el control del elemento de ADN y el promotor. Por lo tanto, no se puede decir que se haya adquirido un conocimiento suficiente de un elemento de ADN que sea capaz de aumentar la productividad de una proteína exógena.

55 El documento no de patente 8 desvela la secuencia completa de un clon BAC de *Homo sapiens* de 139722 nucleótidos.

El documento de patente 1 y el documento no de patente 9 desvelan una secuencia de ADN genómico de *Homo*

sapiens de 170489 nucleótidos.

Por consiguiente, un objetivo de la invención es proporcionar un procedimiento para aumentar la producción de una proteína exógena para su uso en un producto farmacéutico proteico usando un elemento de ADN que tenga una alta actividad de aumento de la expresión de un gen exógeno en una célula hospedadora tal como una célula de mamífero en cultivo.

Listado de citas

Documento de patente

Documento de patente 1: US 2007/161003

Bibliografía no de patente

- 10 BNP 1: Florian M. Wurm. (2004) Production of recombinant protein therapeutics in cultivated mammalian cells. Nat. Biotechnol. 22(11): 1393-1398
 BNP 2: Ted H. J. Kwaks y Arie P. Otte. (2006) Employing epigenetics to augment the expression of therapeutic proteins in mammalian cells. TRENDS in Biotechnol. 24(3): 137-142
 15 BNP 3: Pierre-Alain Girod, Duc-Quang Nguyen y col. (2007) Genome-wide prediction of matrix attachment regions that increase gene expression in mammalian cells. Nat. Methods. 4(9): 747-753
 BNP 4: Adam C. Bell, Adam G. West, Gary Felsenfeld (2001) Insulators and Boundaries: Versatile Regulatory Elements in the Eukaryotic Genome, Science 291: 447-450
 BNP 5: Steven Williams, Tracey Mustoe y col. (2005) CpG-island fragments from the HNRPA2B1/CBX3 genomic locus reduce silencing and enhance transgene expression from the hCMV promoter/enhancer in mammalian cells. BMC Biotechnol. 5(17): 1-9
 20 BNP 6: Arie P. Otte, Ted H. J. Kwaks y col. (2007) Various Expression-Augmenting DNA Elements Benefit from STAR-Select, a Novel High Stringency Selection System for Protein Expression. Biotechnol. Prog. 23: 801-807
 BNP 7: Qiliang Li, Kenneth R. Peterson, Xiangdong Fang y George Stamatoyannopoulos, (2002) Locus control regions, Blood 100(9): 3077-3086
 25 BNP 8: BASE DE DATOS EMBL [en línea] 11 de septiembre de 2001 (11-09-2001), "Homo sapiens BAC clone RP11-152F13 from 4, complete sequence", recuperado del número de registro EBI EM_STD: AC093770. N.º de registro de la base de datos AC093770.
 BNP 9: BASE DE DATOS Geneseq [en línea] 5 de marzo de 2009 (5-3-2009), "Human hD7-063 genomic DNA sequence, SEQ ID 56.", recuperado del número de registro EBI GSN: AUL93993, Registro de la base de datos n°
 30 AUL93993.

Sumario de la invención

Problemas técnicos

Como se ha descrito anteriormente, aún no hay muchos tipos de elementos ADN que sean secuencias de polinucleótidos reguladoras y además, hay pocos elementos de ADN entre ellos que sean altamente eficaces en potenciar la expresión de un gen exógeno. Un objeto de la invención es proporcionar un procedimiento para conseguir una alta expresión de manera estable en una célula de mamífero usando un elemento de ADN que aumenta la activación de la transcripción estando acompañado por un cambio en la estructura de cromatina alrededor de un locus génico en el que se ha introducido una unidad de expresión de un gen exógeno, etc.

Solución al problema

Los presentes inventores han hecho estudios exhaustivos con el fin de resolver los problemas anteriores y como resultado, descubrieron que la productividad y secreción de una proteína exógena que se va a expresar puede mejorarse usando uno o más de los tipos específicos de elementos de ADN en una célula de mamífero en cultivo, y de esta manera, completaron la invención.

Es decir, la invención incluye las siguientes invenciones.

- 45 (1) Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias.
- (2) Un polinucleótido que comprende al menos 3000, 200 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias en el que el polinucleótido es un fragmento parcial de la SEC ID N°: 3 y tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.
- 50 (3) Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que tiene una homología de 95 % o más o de 99 % o más con la secuencia del polinucleótido de acuerdo con los puntos (1) o (2) y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.
- (4) Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias

del polinucleótido de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (1) a (3) y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.

(5) Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que contiene:

- al menos una de las secuencias de polinucleótidos de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (1) a (3); y

5 - al menos uno de:

(a) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias, secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;

10 (b) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias, secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;

(c) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias, secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;

15 (d) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias, secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;

y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.

(6) Un vector que comprende un elemento de ADN que tiene la secuencia de polinucleótido de:

20 (i) un polinucleótido de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (1) a (5);

(ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias en el que cada secuencia de polinucleótido es un fragmento parcial de la SEC ID N°:3 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno; o

25 (7) Un vector de acuerdo con el punto (6), en que el vector es un vector de expresión de un gen exógeno que comprende además un gen exógeno, y en el que el elemento de ADN está posicionado con respecto al gen exógeno de una manera funcionalmente eficaz.

30 (8) El vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con el punto (7), en el que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína multimérica, o una proteína hetero-multimérica.

(9) El vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con el punto (8), en el que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína hetero-multimérica y es un anticuerpo o un fragmento funcional del mismo.

(10) Una célula transformada dentro de la que:

a) se han introducido el vector de acuerdo con el punto (6) y un gen exógeno, o

35 b) se ha introducido el vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (7) a (9).

(11) La célula transformada de acuerdo con el punto (10), en la que la célula es una célula en cultivo procedente de un mamífero, en la que la célula cultivada es una célula que se selecciona entre el grupo que consiste en células COS-1, células 293, y células CHO.

40 (12) La célula transformada de acuerdo con los puntos (10) u (11), en la que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína multimérica o una proteína hetero-multimérica.

(13) La célula transformada de acuerdo con el punto (12), en la que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína hetero-multimérica y es un anticuerpo o un fragmento funcional del mismo.

45 (14) Un procedimiento para producir una proteína caracterizado porque comprende cultivar la célula transformada de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (10) a (13) y obtener la proteína codificada por el gen exógeno a partir del producto del cultivo resultante.

(15) Un procedimiento para potenciar la expresión de un gen exógeno en una célula transformada dentro de la que se ha introducido un gen exógeno o un vector de expresión de un gen exógeno, caracterizado porque usa:

- (i) un polinucleótido de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (1) a (5);
 (ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias en el que cada secuencia de polinucleótido es un fragmento parcial de la SEQ ID N°:3 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno;
 (iii) un vector de acuerdo con el punto (6) o un vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (7) a (9).

(16) El uso de:

- (i) el polinucleótido de acuerdo con uno cualquiera de los puntos (1) a (5);
 (ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias en el que cada secuencia de polinucleótido es un fragmento parcial de la SEQ ID N°:3 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno; o
 (iii) un vector de acuerdo con el punto (6),

para potenciar la expresión de un gen exógeno en una célula transformada.

Efectos ventajosos de la invención

De acuerdo con la invención, al introducir un vector de expresión de un gen exógeno usando un elemento de ADN en una célula hospedadora de mamífero, se puede potenciar significativamente la expresión de un gen exógeno para una proteína terapéutica, un anticuerpo o similar.

Breve descripción de los dibujos

[Fig. 1] La Fig. 1 muestra un gráfico en el que se confirma por amplificación de una región de GAPDH que en una muestra sometida a ChIP-on-chip se inmunoprecipitó la cromatina específicamente con un anticuerpo anti-histona H3 acetilada.

[Fig. 2] La Fig. 2 es una vista esquemática de un vector de expresión SEAP en el que se ha insertado un elemento de ADN.

[Fig. 3] La Fig. 3 es un gráfico que muestra la expresión de SEAP bajo el control de un promotor de CMV en una línea celular CHO que expresa establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A2, A7, A18, B5 o C14. Se confirmaron los efectos de los elementos A2, A7, A18, B5 y C14 sobre el potenciamiento de la expresión.

[Fig. 4] La Fig. 4 comprende dos gráficos que muestran la expresión de SEAP bajo el control de un promotor EF-1 α o SV40 en una línea celular CHO que expresa establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A2 o A7. Se confirmaron los efectos de los elementos A2 y A7 sobre la potenciación de la expresión.

[Fig. 5] La Fig. 5 es una vista esquemática de un vector de expresión de anticuerpo (co-expresión del gen X de cadena pesada y cadena ligera de anticuerpo) en el que se ha insertado un elemento de ADN.

[Fig.6] La Fig. 6 comprende dos gráficos que muestran los niveles de secreción (medidos mediante un procedimiento ELISA) de un anticuerpo bajo el control de un promotor CMV o EF-1 α en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A7. Se confirmó el efecto del elemento de ADN A7 sobre la potenciación de la expresión.

[Fig. 7] La Fig. 7 es una tabla que muestra las longitudes de secuencia del elemento de ADN A2 y de secuencias relacionadas.

[Fig.8] La Fig. 8 comprende tres gráficos que muestran la expresión de SEAP en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A2 o una secuencia relacionada. Se confirmaron los efectos del elemento de ADN A2 y de las secuencias relacionadas sobre la potenciación de la expresión.

[Fig. 9] La Fig. 9 es una tabla que muestra las longitudes de secuencia del elemento de ADN A7 y de secuencias relacionadas.

[Fig. 10] La Fig. 10 comprende tres gráficos que muestran la expresión de SEAP en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A7 o una secuencia relacionada. Se confirmaron los efectos del elemento de ADN A7 y secuencias relacionadas sobre la potenciación de la expresión.

[Fig. 11] La Fig. 11 es una tabla que muestra las longitudes de secuencia de un elemento de ADN A18 y de secuencias relacionadas.

[Fig. 12] La Fig. 12 es un gráfico que muestra la expresión de SEAP en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A18 o una secuencia relacionada. Se confirmaron los efectos del elemento de ADN A18 y secuencias relacionadas sobre la potenciación de la expresión.

[Fig. 13] La Fig. 13 es una tabla que muestra las longitudes de secuencia de un elemento de ADN B5 y de secuencias relacionadas.

[Fig. 14] La Fig. 14 es un gráfico que muestra la expresión de SEAP en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN B5 o una secuencia relacionada. Se confirmaron los efectos del elemento de ADN B5 y secuencias relacionadas sobre el aumento de la expresión.

[Fig. 15] La Fig. 15 es una tabla que muestra las longitudes de secuencia de un elemento de ADN C14 y de secuencias relacionadas.

[Fig. 16] La Fig. 16 es un gráfico que muestra la expresión de SEAP en una línea celular CHO que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN C14 o una secuencia relacionada. Se confirmaron los efectos del elemento de ADN C14 y secuencias relacionadas sobre el aumento de la expresión.

[Fig. 17] La Fig. 17 es un gráfico que muestra la expresión de SEAP en una línea celular HEK293 que expresaba establemente sin un elemento de ADN o con un elemento de ADN A2, A7, A18, B5, o C14. Se confirmaron los efectos de los elementos de ADN A2, A7, A18, B5, y C14 sobre el aumento de la expresión en células HEK293.

[Fig. 18] La Fig. 18 es una vista que muestra los nucleótidos del punto de partida y final basándose en la secuencia de longitud completa de un elemento de ADN A2, A7, o A18.

[Fig. 19] La Fig. 19 es una vista que muestra los nucleótidos del punto de partida y final basándose en la secuencia de longitud completa de un elemento de ADN B5 o C14.

Descripción de las realizaciones

En lo sucesivo, la invención se describirá específicamente en referencia a los ejemplos. Sin embargo, estos ejemplos no limitan el ámbito técnico de la invención. Los plásmidos, enzimas de restricción, enzimas de modificación de ADN y similares que se van a usar en los ejemplos de la invención son productos disponibles en el comercio y pueden usarse de acuerdo con procedimientos comunes. Además, los procedimientos que se usan para la clonación de ADN, determinación de secuencias de polinucleótidos, transformación de una células hospedadoras, cultivo de una célula hospedadora transformada, aislamiento de un anticuerpo a partir de una solución de cultivo obtenida, purificación de un anticuerpo y similares también son bien conocidos por los expertos en la técnica o están disponibles en la bibliografía.

El término "gen" tal como se usa en el presente documento incluye no solo el ADN, sino también el ARNm del mismo, el ADNc y el ARN del mismo.

El término "polinucleótido" tal como se usa en el presente documento se usa con el mismo significado que ácido nucleico y también incluye ADN, ARN, sondas, oligonucleótidos y cebadores.

Los términos "polipéptido" y "proteína" tal como se usan en el presente documento se usan sin distinción.

La expresión "expresión génica" tal como se usa en el presente documento se refiere a un fenómeno en el que se transcribe un ARNm a partir de un gen y/o a un fenómeno en el cual se traduce una proteína a partir del ARNm.

La expresión "gen exógeno" tal como se usa en el presente documento se refiere a un gen que se introduce artificialmente en una célula hospedadora.

La expresión "proteína exógena" tal como se usa en el presente documento se refiere a una proteína codificada por el gen exógeno.

La expresión "unidad de expresión génica" tal como se usa en el presente documento se refiere a un polinucleótido que tiene, en la dirección de la fase de lectura de la transcripción, al menos una región promotora, un gen exógeno y una región de terminación de la transcripción (señal de adición de poli(A)).

La expresión "actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno" tal como se usa en el presente documento se refiere a la actividad de potenciar la producción de una proteína exógena en una célula hospedadora creando un ambiente ventajoso para la transcripción y traducción del ADN alrededor de la unidad de expresión génica que contiene un gen exógeno y que mejora significativamente la eficacia de la transcripción y traducción.

La expresión "elemento de ADN" tal como se usa en el presente documento se refiere a un polinucleótido que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno en los casos en los que el polinucleótido se localiza en la vecindad de una unidad de expresión génica o en un vector de expresión de un gen exógeno que contiene una unidad de expresión génica.

La expresión "fragmento funcional de un anticuerpo" tal como se usa en el presente documento se refiere a un fragmento parcial de un anticuerpo que tiene una actividad de unión a antígeno y que incluye Fab, F(ab')₂, y similares. Sin embargo, la expresión no se limita a estas moléculas siempre que el fragmento tenga una afinidad de unión por un antígeno.

1. Elemento de ADN que se usa para potenciar la expresión de un gen exógeno

Tal como se muestra en el ejemplo 1, se puede obtener un elemento de ADN de acuerdo con la invención usando la

interacción entre la histona H3 acetilada y el ADN genómico. En general, se dice que la acetilación de histonas (H3 y H4) se asocia con la activación de la transcripción, y se han defendido dos teorías principales. Una teoría es que la acetilación de histonas se asocia con un cambio en la conformación del nucleosoma de tal modo que las colas de histonas se acetilan, neutralizándose eléctricamente de esta manera, lo que da como resultado un debilitamiento de las interacciones ADN-histona (Mellor J. (2006) Dynamic nucleosomes and gene transcription. Trends Genet. 22(6): 320-329). La otra teoría es que la acetilación de las histonas se asocia con el reclutamiento de varios factores de transcripción (Nakatani Y. (2001) Histone acetylases - versatile players. Genes Cells. 6(2): 79-86). En cualquiera de las dos teorías, hay una elevada posibilidad de que la acetilación de las histonas se asocie con la activación de la transcripción y llevando a cabo la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) usando un anticuerpo anti-histona H3 acetilada, es posible concentrar un elemento de ADN que interactúe con la histona H3 acetilada.

En la presente invención, A18 es un ejemplo de un elemento de ADN que se va a usar para aumentar la expresión de un gen exógeno. El A18 se localiza en la región desde 111275976a 111284450 del cromosoma 4 humano y es una secuencia de polinucleótido de 8475pb, que tiene un contenido de AT del 62,54 %. La secuencia de polinucleótido de A18 está representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias.

A2, A7, B5 y C14 son ejemplos de elementos de ADN similares. A2 está localizado en la región desde 80966429 a 80974878 del cromosoma humano 15 y es una secuencia de polinucleótido de 8450 pb, que tiene un contenido de AT del 62,2 %. La secuencia de polinucleótido de A2 se representa por la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias.

A7 está localizado en la región desde 88992123 a 89000542 del cromosoma 11 humano y es una secuencia de polinucleótido de 8420 pb, que tiene un contenido de AT del 62,52 %. La secuencia de polinucleótido de A7 está representada por la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias.

B5 se localiza en la región desde 143034684 a 143043084 del cromosoma 1 humano y es una secuencia de polinucleótido de 8401 pb, que tiene un contenido de AT del 66,37 %. La secuencia de polinucleótido de B5 está representada por la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias.

Finalmente, C14 se localiza en la región desde 46089056 a 46097482 del cromosoma 11 humano y es una secuencia de polinucleótido de 8427 pb, que tiene un contenido de AT del 63,81 %. La secuencia de polinucleótido de C14 está representada por la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias.

En la invención, la actividad de aumento de la expresión de un gen exógeno del elemento de ADN se puede ensayar usando la actividad de una proteína codificada por un gen indicador tal como SEAP como índice. En los casos en los que de la actividad de una proteína indicadora en presencia del elemento de ADN aumenta, preferentemente el doble o más, más preferentemente el cuádruple o más, aún más preferentemente el quintuple o más en comparación con el caso en el que no está presente el elemento de ADN, se puede determinar que el elemento de ADN tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno. Incluso en los casos en los que la actividad aumenta al doble o más, se espera esto reduzca la escala del cultivo celular y el tiempo de cultivo celular, y como resultado, es posible aumentar el rendimiento y reducir el coste del cultivo celular. Si aumenta el rendimiento, entonces es posible suministrar de manera estable una proteína exógena para su uso como agente farmacéutico. Además, si se reduce el coste del cultivo celular, se reduce el coste de la proteína exógena que se usa como agente farmacéutico, y también se reduce la carga financiera sobre los pacientes a quienes se va a administrar la proteína exógena.

En la invención, se puede usar el elemento de ADN A18 solo, y pueden usarse dos o más copias del elemento de ADN A18. Como alternativa, puede usarse al menos un elemento de ADN A18 en combinación con al menos uno de los diferentes tipos de elementos de ADN anteriores.

A2, A7, B5 y C14 son ejemplos preferidos de diferentes tipos de elementos de ADN para su uso en la invención en combinación con el elemento de ADN A18.

El elemento de ADN que se va a usar tal como se ha descrito anteriormente puede ser una secuencia de polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que tiene una homología del 95 % o más respecto de cualquiera de las secuencias de polinucleótidos representadas por las SEC ID N°: 1 a 5 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno. La homología del 95 % o más es más preferentemente una homología del 99 % o más. La búsqueda de homología de secuencia de polinucleótido puede llevarse a cabo, por ejemplo, en la Base de datos de ADN de Japón o similares usando un programa tal como FASTA o BLAST.

El elemento de ADN que para su uso tal como se ha descrito anteriormente puede ser un elemento de ADN que hibride con un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido complementaria a un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido seleccionada entre el grupo que consiste en las secuencias de polinucleótidos representadas por las SEC ID N°: 1 a 5 en condiciones rigurosas y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.

La expresión "condiciones rigurosas" tal como se usa en el presente documento se refiere a condiciones en las que se forma lo que se denomina un híbrido específico pero no se forma un híbrido no específico. Por ejemplo, son condiciones rigurosas ejemplares las condiciones en las que hibrida una hebra complementaria de un ácido nucleico

que consiste en una secuencia de polinucleótido que tiene una elevada homología, es decir, una secuencia de polinucleótido que tiene una homología del 95 % o más, más preferentemente del 99 % o más respecto de una secuencia de polinucleótido seleccionada entre el grupo que consiste en las secuencias nucleotídicas representadas por las SEC ID N°: 1 a 5 y en las que no hibrida una hebra complementaria de un ácido nucleico que comprende una secuencia de polinucleótido que tenga menor homología. Para ser más específicos, se pueden ejemplificar condiciones en las que la concentración de sal sódica sea de 15 a 750 mM, preferentemente de 50 a 750 mM, más preferentemente de 300 a 750 mM, la temperatura sea de 25 a 70 °C, preferentemente de 50 a 70 °C, más preferentemente de 55 a 65 °C, y la concentración de formamida sea del 0 al 50 %, preferentemente del 20 al 50 %, más preferentemente del 35 al 45 %. Además, se pueden ejemplificar como condiciones rigurosas, condiciones para el lavado de un filtro tras la hibridación en las que la concentración de sal de sodio sea generalmente de 15 a 600 mM, preferentemente de 50 a 600 mM, más preferentemente de 300 a 600 mM, y la temperatura sea de 50 a 70 °C, preferentemente de 55 a 70 °C, más preferentemente de 60 a 65 °C.

Un experto en la técnica puede obtener fácilmente un gen homólogo con referencia a Molecular Cloning (Sambrook, J. y col., Molecular Cloning: a Laboratory Manual 2ª ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 10 Skyline Drive Plainview, NY (1989)) o similar. Además, la homología de la secuencia de polinucleótido mencionada anteriormente se puede determinar con una búsqueda con FASTA o una búsqueda con BLAST de la misma manera.

La introducción de una mutación (eliminación, sustitución y/o adición) en la secuencia de polinucleótido mencionada anteriormente se puede llevar a cabo mediante un procedimiento conocido en este campo técnico tal como un procedimiento Kunkel o un procedimiento dúplex con espacios, o basándose en este procedimiento. Por ejemplo, se puede usar un kit de introducción de mutación usando un procedimiento de mutagénesis de sitio dirigido (por ejemplo, Mutant-K (fabricado por TaKaRa Bio, Inc.), Mutant-G (fabricado por TaKaRa Bio, Inc.), o un kit LA PCR *in vitro* de la serie Mutagenesis (fabricado por TaKaRa Bio, Inc.)), o similares. Dicho polinucleótido mutado se puede usar también como el elemento de ADN de la invención.

Como el elemento de ADN de la invención, se puede usar un fragmento parcial que comprenda al menos 3000 o al menos 2000 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias. Los ejemplos de dichos fragmentos parciales incluyen: A18-1 a A18-4 que son fragmentos parciales de A18. También se desvelan en el presente documento A2-1 a A2-17 que son fragmentos parciales de A2; A7-1 a A7-18 que son fragmentos parciales de A7; B5-1 a B5-6 que son fragmentos parciales de B5; y C14-1 a C14-14 que son fragmentos parciales de C14. Sin embargo, el elemento de ADN no está limitado a estos fragmentos parciales siempre que tenga una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.

En la invención, puede usarse cualquiera de los fragmentos de A18 anteriores solo y también se pueden usar dos o más copias de un tipo de los fragmentos parciales de A18. Como alternativa, se pueden usar en combinación dos o más tipos diferentes de los fragmentos parciales de A18. Además, se puede usar en combinación una secuencia de longitud completa y/o un fragmento parcial del elemento de ADN A18 mencionado anteriormente. Además, se puede usar al menos una secuencia de longitud completa y/o un fragmento parcial del elemento de ADN A18 en combinación con al menos una secuencia de longitud completa y/o un fragmento parcial de diferentes elementos de ADN.

En cuanto a las secuencias de polinucleótido de los respectivos fragmentos de A2, A2-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5401 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 2700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 2200 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 3700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 5000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4001 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-15 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-16 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; y A2-17 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias.

En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de A7, A7-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 601 a 3600 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3601 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de

5 secuencias; A7-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3401 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 4500 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3600 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-15 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-16 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-17 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; y A7-18 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias.

20 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de A18, A18-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5040 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; A18-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1001 a 6002 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; A18-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 7000 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; y A18-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3000 a 7000 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias.

Los puntos de inicio y terminación de los respectivos fragmentos de A2, A7 y A18 se exponen también en la Figura 18.

30 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de B5, B5-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 4001 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3200 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2491 a 5601 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5373 a 8401 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 901 a 4001 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; y B5-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4001 a 7000 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias.

40 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de C14, C14-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 4015 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4020 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 6011 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4939 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2994 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4020 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2994 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; y C14-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias.

Los puntos de inicio y terminación de los respectivos fragmentos de B5 y C14 también se exponen en la Figura 19.

55 2. Adquisición del polinucleótido

En la invención, se puede obtener un polinucleótido que contiene un gen exógeno que codifica una proteína exógena cuya producción va a aumentar, lo que se describirá más adelante, por procedimientos comunes como se describen a continuación. Por ejemplo, dicho polinucleótido puede aislarse explorando una biblioteca de ADNc procedente de células o tejidos que expresan el gen exógeno usando una sonda de ADN que se sintetiza basándose en un fragmento del gen exógeno. El ARNm se puede preparar por procedimientos que se usan comúnmente en

este campo técnico. Por ejemplo, las células o tejidos se tratan con un reactivo de guanidina, un reactivo de fenol, etc., obteniendo de esta manera el ARN total, y a partir de este, se obtiene el poli(A) + ARN (ARNm) mediante un procedimiento en columna de afinidad usando una columna de celulosa oligo (dT) o una columna de Sepharose-poli U que contiene Sepharose 2B como portador, o similares, o mediante un procedimiento discontinuo. Además, también se puede fraccionar el poli(A) + ARN por centrifugación en gradiente de densidad de sacarosa o similares. Luego, se sintetiza un ADNc monocatenario usando el ARNm obtenido de esta manera como molde, y también usando cebadores dT y una transcriptasa inversa. A partir del ADNc de cadena sencilla que se obtiene de esta manera, se sintetiza un ADNc de doble cadena usando una ADN polimerasa I, ADN ligasa, RNasa H, y similares. El ADNc de doble cadena sintetizado de esta manera se trunca usando ADN polimerasa T4, seguido de la unión a un adaptador (tal como el adaptador EcoRI), fosforilación, y similares, y el ADN resultante se incorpora en un fago lambda tal como el λ gt11 para conseguir un empaquetamiento in vivo, de esta manera se puede preparar una biblioteca de ADNc. También es posible usar una biblioteca de ADNc usando un vector plásmido distinto de fagos lambda. A partir de entonces, se puede seleccionar un clon que contenga el ADN diana (un clon positivo) a partir de la biblioteca de ADNc.

En los casos en los que el elemento de ADN mencionado anteriormente que se va a usar para aumentar la producción de una proteína o un polinucleótido que contiene un gen exógeno se aísla a partir de ADN genómico, o en el que se aísla un polinucleótido que contiene las regiones promotoras y de terminación a partir de ADN genómico, de acuerdo con un procedimiento común (Molecular Cloning (1989), Methods in Enzymology 194 (1991)), se extrae el ADN genómico de una línea celular de un organismo para usarse como fuente de recolección y se selecciona y aísla un polinucleótido. La extracción del ADN genómico se puede llevar a cabo de acuerdo con, por ejemplo, el procedimiento de Cryer y col. (Methods in Cell Biology, 12, 39-44 (1975)) o el procedimiento de P. Philippsen y col. (Methods Enzymol., 194, 169-182 (1991)).

El elemento de ADN diana o el polinucleótido que contiene un gen exógeno se puede obtener también, por ejemplo, por el procedimiento PCR (PCR Technology. Henry A. Erlich, Atocckton press (1989)). En la amplificación de un polinucleótido usando el procedimiento PCR, se usan 20 o 30meros de ADN monocatenarios sintéticos como cebadores y se usa el ADN genómico como molde. El gen amplificado se usa después de confirmarse la secuencia de polinucleótido del gen. Como molde para la PCR, se puede usar una biblioteca de ADN genómico tal como un cromosoma bacteriano artificial (BAC).

Por otra parte, el polinucleótido que contiene un gen exógeno cuya secuencia no se conoce se puede obtener (a) preparando una biblioteca génica de acuerdo con un procedimiento común, y (b) seleccionando un polinucleótido deseado de la biblioteca génica que se ha preparado y amplificando el polinucleótido. La biblioteca génica se puede preparar por digestión parcial del ADN cromosómico que se obtiene mediante un procedimiento común a partir de una línea celular de un organismo que se va a usar como fuente de recolección usando una enzima de restricción adecuada para el fragmento de ADN cromosómico, uniendo los fragmentos obtenidos en un vector adecuado, e introduciendo el vector en un hospedador adecuado. La biblioteca génica se puede preparar también por extracción del ARNm de las células, sintetizando el ADNc a partir de ARNm, uniendo el ADNc a un vector adecuado, e introduciendo el vector en un hospedador adecuado. Como vector para su uso en dicha preparación, también se puede usar un plásmido que se sepa en general que es un vector para la preparación de la biblioteca génica, un vector de fago, un cósmido o similares. Como hospedador que se va a transformar o transfectar se puede usar un hospedador adecuado para el tipo de vector mencionado anteriormente. El polinucleótido que contiene el gen exógeno se selecciona de la biblioteca génica mencionada anteriormente mediante un procedimiento de hibridación de colonias, un procedimiento de hibridación en placas, o similares, usando una sonda marcada que contiene una secuencia específica para el gen exógeno.

Además, el polinucleótido que contiene el gen exógeno también se puede producir mediante síntesis química total. Por ejemplo, el gen se puede sintetizar mediante un procedimiento en el que se preparan y se hibridan dos pares de oligonucleótidos complementarios, un procedimiento en el que se unen varias hebras de ADN hibridadas por una ADN ligasa, un procedimiento en el que se preparan varios polinucleótidos parcialmente complementarios y los huecos se rellenan por PCR o similares.

La determinación de una secuencia de polinucleótido se puede llevar a cabo por una técnica convencional, por ejemplo, un procedimiento dideoxi (Sanger y col., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 74, 5463-5467, (1977)), o similares. Además, la determinación anterior de una secuencia de polinucleótido también se puede llevar a cabo fácilmente usando un kit de secuenciación disponible en el comercio o similar.

3. Vector de expresión de un gen exógeno, vector de elemento

Como vector de expresión de un gen exógeno de la invención, se proporciona un vector que contiene un elemento de ADN del tipo A18 mencionado anteriormente, dos o más copias de un elemento de ADN del tipo A18 mencionado anteriormente en combinación, o al menos uno de elemento de ADN del tipo A18 mencionados anteriormente en combinación con al menos uno de los diferentes tipos de elementos de ADN y que contienen además una unidad de expresión de un gen exógeno. Cuando se expresa un gen exógeno en una célula hospedadora usando el vector de expresión de un gen exógeno mencionado anteriormente, el elemento de ADN se puede situar inmediatamente cadena arriba o cadena abajo de la unidad de expresión génica, o se puede localizar en una posición lejana de la

unidad de expresión génica. Además, se puede usar un vector de expresión de un gen exógeno que contenga una diversidad de dichos elementos de ADN. De hecho, el elemento de ADN se puede insertar tanto en orientación directa como inversa con respecto a la unidad de expresión génica.

5 Además, como un vector que se usa en la invención, también se incluye un vector que contiene un elemento de ADN del tipo A18 mencionado anteriormente, dos o más copias de un tipo del elemento de ADN 18 mencionado anteriormente, dos o más diferentes tipos del elemento de ADN A18 mencionado anteriormente en combinación, o al menos uno de los tipos de elemento de ADN A18 en combinación con al menos uno de los diferentes tipos de elementos de ADN diferentes y que no contenga una unidad de expresión génica (de aquí en adelante denominado también "vector de elemento"). Dicho vector de elemento se puede usar en combinación con el vector de expresión de un gen exógeno mencionado anteriormente que contiene el elemento de ADN o un vector de expresión de un gen exógeno que no contiene un elemento de ADN y solamente contiene la unidad de expresión de un gen exógeno. Permitiendo la coexistencia del vector de elemento con el vector de expresión de un gen exógeno, la expresión de un gen exógeno aumenta en comparación con los casos en los que se usa solo el vector de expresión de un gen exógeno, por lo tanto, la combinación de los vectores mencionados anteriormente también se incluye en el vector de expresión de un gen exógeno de la invención.

15 El gen que codifica la proteína exógena no está limitado particularmente, sin embargo, los ejemplos del mismo incluyen los genes indicadores tales como el de la fosfatasa alcalina secretora (SEAP), la proteína verde fluorescente (GFP), y luciferasa; varios genes de enzimas tales como el gen de la α -amilasa, y el gen de la α -galactosidasa; genes de varios interferones que son útiles farmacéuticamente y proteínas fisiológicamente activas tales como el interferón α y el interferón γ ; genes de varias interleucinas tales como IL-1 e IL-2; varios genes de citocinas tales como un gen de eritropoyetina (EPO) y un gen de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF); genes de factores de crecimiento; y genes de anticuerpos. Estos genes se pueden obtener mediante cualquier procedimiento.

20 La invención es particularmente eficaz en relación con una proteína que sea altamente hidrófoba y una proteína que sea difícil de producir y secretar debido a su formación compuesta. Por lo tanto, las proteínas exógenas mencionadas anteriormente incluyen una proteína multimérica tal como un heteromultímero que es un anticuerpo o un fragmento funcional del mismo. El "fragmento funcional de un anticuerpo" se refiere a un fragmento parcial de un anticuerpo que tiene actividad de unión a antígeno y que incluye Fab, F(ab')₂, Fv, scFv, diacuerpos, anticuerpos lineales, anticuerpos poliespecíficos formados a partir de fragmentos de anticuerpo, y similares. El fragmento funcional de un anticuerpo también incluye al Fab' que es un fragmento monovalente de una región variable de un anticuerpo que se obtiene tratando el F(ab')₂ en condiciones reductoras. Además, estos fragmentos funcionales incluyen no solamente un fragmento obtenido mediante el tratamiento de una molécula de una proteína de anticuerpo de longitud completa con una enzima adecuada, sino también una proteína producida en una célula hospedadora adecuada usando un gen de anticuerpo modificado genéticamente.

25 La unidad de expresión génica tiene, en la dirección de la fase de lectura de transcripción, al menos una región promotora, un gen exógeno, y una región de terminación de la transcripción (señal de adición de poli(A)). El promotor que se puede usar en el presente documento puede ser un promotor de expresión constitutivo o un promotor de expresión inducible. Los ejemplos de promotor de expresión constitutivo incluyen varios promotores naturales tales como un promotor temprano de SV40, un promotor de adenovirus E1A, un promotor de CMV (citomegalovirus), un promotor EF-1 α (factor-1 α de elongación humano), un promotor de HSP70, un promotor MT, un promotor de RSV, un promotor de UBC, y un promotor actina, y promotores artificiales (de fusión) tales como un promotor SR α y un promotor CAG. Además, la secuencia de adición de poli(A) puede ser una secuencia que tiene la actividad de provocar la terminación de la transcripción para la transcripción a partir del promotor, y puede ser una secuencia de un gen igual o diferente al del promotor.

30 Es necesario usar un promotor fuerte con el fin de aumentar la producción de una proteína exógena. Sin embargo, cuando se intenta producir una proteína que sea difícil que se pliegue o una proteína que sea difícil de secretar usando un promotor altamente activo, la proteína puede no llegar a secretarse. Esto es debido a que cuando la proteína se produce en una cantidad que excede la capacidad del ribosoma en el que se lleva a cabo la traducción y la del retículo endoplásmico donde se lleva a cabo el plegamiento y la secreción, la proteína producida en exceso se desnaturaliza, se acumula y se ubiquitina en las células, y luego se degrada en los proteosomas. Por consiguiente, es preferible que se seleccione adecuadamente un promotor que pueda alcanzar un nivel de expresión tal que la proteína no se desnaturalice o agregue o que la cantidad de la proteína resultante no exceda la capacidad de secreción. Como alternativa, el promotor se usa ajustando (por ejemplo, disminuyendo) la actividad del promotor. Entre las proteínas multiméricas, una molécula que forma un heteromultímero es susceptible del efecto descrito anteriormente y en particular una molécula, tal como un anticuerpo, que es un heterotetrámero. Un anticuerpo tiene dos moléculas de cadena pesada y dos moléculas de cadena ligera que se asocian entre sí y por lo tanto, con el fin de asociar adecuadamente las moléculas, el nivel de expresión de las mismas es un factor importante.

35 Además, el vector de expresión de un gen exógeno y el vector de elemento de la invención pueden contener cada uno un marcador de selección para seleccionar un transformante. Se puede seleccionar un transformante, por ejemplo, mediante el uso de un marcador de resistencia a un fármaco que dé lugar a resistencia a un fármaco tal como cerulenina, aureobasidina, zeocina, canavanina, cicloheximida, higromicina, puromicina, blasticidina,

tetraciclina, kanamicina, ampicilina o neomicina. Además, también se puede seleccionar un transformante cuando se usa como marcador un gen que da lugar a resistencia a disolventes tales como etanol, resistencia a la presión osmótica de glicerol, de una sal, o similares, la resistencia a un ion metálico tal como el ion cobre, o similares.

5 El vector de expresión de un gen exógeno y el vector de elemento de la invención pueden ser cada uno un vector que no se incorpora en el ADN cromosómico. En general, el vector de expresión de un gen exógeno se transfecta en una célula hospedadora y entonces se incorpora aleatoriamente en el cromosoma. Sin embargo, usando un componente constituyente procedente de un virus de mamífero tal como un virus de simio 40 (SV40), un papilomavirus (BPV, HPV), o EBV, se puede usar el vector como un vector episómico que es auto-replicable en la célula hospedadora transfectada. Por ejemplo, se puede usar un vector que contiene un origen de replicación (oriP) 10 procedente de SV40 y una secuencia que codifica un gran antígeno T de SV40 que es un factor trans-actuante, un vector que contiene un oriP procedente de EBV y una secuencia que codifica EBNA-1, o similares. El efecto del elemento de ADN se puede expresar por la actividad de aumento de la expresión del gen exógeno independientemente del tipo de vector o de la presencia o ausencia de la incorporación del mismo en el cromosoma.

4. Célula transformada

15 La célula transformada de la invención es una célula transformada en la que se ha introducido el vector de expresión de un gen exógeno descrito en el artículo "3" anterior que contiene el elemento de ADN descrito en el artículo "1". Como vector de expresión de un gen exógeno, se puede introducir solamente un vector de expresión de un gen exógeno que contenga un elemento de ADN (a), o se pueden introducir en combinación un vector de expresión de un gen exógeno que contiene un elemento de ADN y también un vector de elemento descrito en el artículo "3" 20 anterior (B). Como alternativa, se pueden introducir en combinación un vector de expresión de un gen exógeno que no contiene un elemento de ADN y un vector elemento (C).

La expresión de un gen exógeno en una célula hospedadora usando la combinación anterior de (B) o (C) se puede llevar a cabo, por ejemplo, según el procedimiento de Girod y col. (*Biotechnology and Bioengineering*, 91, 2-11 (2005)) y el procedimiento de Otte y col. (*Biotechnol. Prog.*, 2007, 23, 801-807 (2007)).

25 Los ejemplos de la célula hospedadora que se va a transformar incluyen células eucariotas, incluyendo los ejemplos preferidos de las mismas células de mamífero, incluyendo los ejemplos más preferidos células procedentes de seres humanos, ratones, ratas, hámsteres, monos, o ganado. Los ejemplos de dichas células de mamífero incluyen las células COS-1, células 293, y células CHO (CHO-K1, DG44, CHO dhfr-, CHO-S), sin embargo, la célula hospedadora no se limita a estas.

30 En la invención, se puede usar cualquier procedimiento para introducir el vector de expresión en la célula hospedadora siempre que el procedimiento permita que gen introducido esté presente de manera estable en la célula hospedadora y se exprese en la misma de manera adecuada. Los ejemplos del método que se usa generalmente incluyen un procedimiento de fosfato cálcico (Ito y col., (1984) *Agric. Biol. Chem.*, 48, 341), un procedimiento de electroporación (Becker, D. M. y col., 1990; *Methods. Enzymol.*, 194, 182-187), un procedimiento de esferoplastos (Creggh y col., *Mol. Cell. Biol.*, 5, 3376 (1985)), un procedimiento de acetato de litio (Itoh, H. (1983) 35 *J. Bacteriol.* 153, 163-168), y un procedimiento de lipofección.

5. Procedimiento para producir proteína exógena

En la invención, se puede producir una proteína exógena mediante el cultivo de la célula transformada descrita en el artículo "4" anterior, en la que se ha introducido un gen que codifica la proteína exógena usando el vector descrito en el artículo "3" anterior mediante un procedimiento conocido, la recogida de la proteína del producto del cultivo 40 resultante, seguido de la purificación de la proteína. La expresión "producto del cultivo" tal como se usa en el presente documento se refiere a células cultivadas o a un homogenado celular además de a un sobrenadante del cultivo. De hecho, puede seleccionarse como proteína exógena que puede producirse usando la célula transformada descrita en el artículo "4" anterior, no solo una proteína monomérica, sino también una proteína multimérica. En los casos en los que se produce una proteína hetero-multimérica formada de una pluralidad de diferentes subunidades, es necesario introducir una pluralidad de genes que codifican estas subunidades en la célula hospedadora que se describe en el artículo "4" anterior, respectivamente. 45

El procedimiento para el cultivo de la célula transformada se puede llevar a cabo de acuerdo con procedimientos convencionales para cultivar células hospedadoras.

50 En los casos en que la célula transformada sea una célula de mamífero, la célula se cultiva en condiciones, por ejemplo, de 37 °C, y un 5 % o un 8 % de CO₂ durante un tiempo de cultivo de aproximadamente 24 a 1000 horas. El cultivo se puede llevar a cabo por medio de cultivo discontinuo, cultivo de alimentación discontinua, cultivo continuo y similares en condiciones estáticas, de agitación, removido o aireación.

La confirmación del producto de expresión del gen que codifica la proteína exógena a partir del producto de cultivo (solución de cultivo) mencionado anteriormente se puede llevar a cabo por SDS-PAGE, análisis de Western, ELISA o similares. Con el fin de aislar y purificar la proteína producida, se puede usar un procedimiento de purificación y aislamiento de proteínas convencional. Tras completar el cultivo, en los casos en los que la proteína diana se 55

produce en células, se homogenizan las células usando un homogeneizador ultrasónico, una prensa de French, un homogeneizador de Manton-Gaulin, Dinomil, o similar, obteniendo de esta manera la proteína diana. Además, en los casos en los que se produce la proteína diana fuera de las células, la solución el cultivo se usa como tal, o se eliminan las células por centrifugación o similar. A continuación se recoge la proteína diana por extracción o similar usando un disolvente orgánico y luego se aísla y purifica la proteína diana usando técnicas tales como varias técnicas de cromatografía (cromatografía hidrófoba, cromatografía de fase inversa, cromatografía de afinidad, cromatografía de intercambio iónico, etc.), filtración en gel usando un tamiz molecular y electroforesis usando un gel de poliacrilamida o similar solo o en combinación según las necesidades.

Los procedimientos de cultivo mencionados anteriormente y los procedimientos de purificación son solo a modo de ejemplo, y los procedimientos no se limitan a estos. La secuencia de aminoácidos del producto genético purificado se puede confirmar por una técnica de análisis de aminoácidos conocida, tal como la determinación de secuencia de aminoácidos automatizada usando el procedimiento de degradación de Edman.

6. Procedimiento para producir una proteína de anticuerpo

Como proteína hetero-multimérica que se va a producir usando el procedimiento de producción descrito en el artículo "5" anterior, puede ejemplificarse una proteína de anticuerpo. La proteína de anticuerpo es una proteína tetramérica que comprende dos moléculas de polipéptido de cadena pesada y dos moléculas de polipéptido de cadena ligera. Por consiguiente, para obtener dicha proteína de anticuerpo en un estado que mantenga la afinidad de unión a antígeno, es necesario introducir ambos genes de cadena pesada y ligera en la célula transformada descrita en el artículo "4" anterior. En este caso, las unidades de expresión génica de la cadena pesada y ligera pueden estar presentes en el mismo vector de expresión o en diferentes vectores de expresión.

Como anticuerpo que se va a producir en la invención, puede ejemplificarse un anticuerpo preparado mediante la inmunización de un animal experimental, tal como un conejo, un ratón o una rata con un antígeno deseado. Además, también puede ejemplificarse como el anticuerpo que se va a producir en la invención un anticuerpo quimérico y un anticuerpo humanizado obtenido mediante el uso del anticuerpo anteriormente mencionado como material de partida. Además, también se incluye como anticuerpo que se va a producir en la invención un anticuerpo humano obtenido usando un animal modificado genéticamente o un procedimiento de presentación en fagos.

El gen de anticuerpo que se va a usar para la producción del anticuerpo no está limitado a un gen de anticuerpo que tenga una secuencia de polinucleótido específica, siempre que la combinación de polipéptido de cadena pesada y polipéptido de cadena ligera que se van a transcribir y traducir a partir del gen de anticuerpo tenga la actividad de unión a una proteína antigénica dada.

Además, no es necesario que el gen de anticuerpo codifique la molécula de longitud completa del anticuerpo, puede usarse un gen que codifica un fragmento funcional del anticuerpo. Dicho gen que codifica un fragmento funcional del mismo puede obtenerse modificando genéticamente un gen que codifica la molécula de longitud completa de la proteína de anticuerpo.

7. Procedimiento de producción de otras proteínas exógenas

Los ejemplos de proteínas exógenas que se van a producir usando el procedimiento de producción de la invención incluyen, además de los anticuerpos mencionados anteriormente, varias proteínas procedentes de seres humanos y no humanos, fragmentos funcionales de las mismas, y productos modificados de las mismas. Los ejemplos de dichas proteínas y similares incluyen hormonas peptídicas tales como el péptido natriurético auricular (ANP), péptido natriurético cerebral (BNP), péptido natriurético tipo C (CNP), vasopresina, somatostatina, hormona de crecimiento (GH), insulina, oxitocina, grelina, leptina, adiponectina, renina, calcitonina, osteoprotegerina, y factor de crecimiento insulínico (IGF); citocinas tales como interleucinas, quimiocinas, interferón, factores de necrosis tumoral (tales como TNF- α , TNF- β , y la superfamilia de TNF), factores de crecimiento nerviosos (tales como NGF), factores de crecimiento celular (tal como EGF, FGF, PDGF, HGF, y TGF), factores de crecimiento hematopoyético (tales como CSF, G-CSF, y eritropoyetina), y adipocina; receptores tales como los receptores de TNF; enzimas tales como lisozima, proteasas, proteinasas, y peptidasas; fragmentos funcionales de las mismas (fragmentos que tienen la totalidad o parte de la actividad biológica de la proteína original), y proteínas de fusión que comprenden cualquiera de estas proteínas. Sin embargo, las proteínas no se limitan a estas.

Ejemplos

En lo sucesivo, la invención se describirá específicamente en referencia a los ejemplos. Sin embargo, estos ejemplos no limitan el ámbito técnico de la invención. Los plásmidos, enzimas de restricción, enzimas de modificación de ADN, y similares que se van a usar en los ejemplos de la invención son productos disponibles en el mercado y se pueden usar según procedimientos comunes. Además, los procedimientos que se usan para la clonación de ADN, la determinación de la secuencia de polinucleótido, la transformación de una célula hospedadora, el cultivo de una célula hospedadora transformada, la recogida de una proteína a partir del producto de cultivo resultante, la purificación de una proteína y similares también son bien conocidos por los expertos en la técnica o se pueden encontrar en la bibliografía.

Ejemplo 1

Extracción del elemento de ADN

(1-1) Inmunoprecipitación de cromatina usando un anticuerpo anti-histona H3 acetilada

5 Se llevó a cabo una ChIP usando un anticuerpo anti-histona H3 acetilada usando EZ ChIP (Upstate) de acuerdo con el siguiente procedimiento. De hecho, a menos que se indique lo contrario, se usaron productos de Upstate como anticuerpos, tampones y similares en el siguiente procedimiento.

10 En primer lugar, se cultivaron células 293F (Invitrogen) usando Medio 293 FreeStyle™ GIBCO (marca registrada) (Invitrogen) en condiciones de 37 °C y un 8 % de CO₂, seguido de centrifugación (1000 rpm, 5 min, a temperatura ambiente), por la que se recogieron las células en fase de crecimiento. Después se fijaron 2 x 10⁷ células en un medio que contenía un 1 % de formaldehído durante 10 minutos, se añadió al mismo 10 x de glicina, seguido de incubación a temperatura ambiente durante 5 minutos. Tras la centrifugación (3000 rpm, 5 min, 4 °C), se retiró el sobrenadante, y se añadió PBS al sedimento celular para suspender las células. Entonces, la suspensión celular se centrifugó de nuevo para retirar el PBS, y a continuación se añadió un tampón de lisis SDS al sedimento celular para suspender y lisar las células. Cada muestra que se obtenía por lisis celular se sometió a fragmentación de ADN usando un homogeneizador ultrasónico (BRANSON) mientras se enfriaba la muestra con agua helada, y se añadió a la misma un tampón de dilución que contenía un cóctel inhibidor de proteasas y proteína G inmovilizada en agarosa. La mezcla resultante se sometió a rotación a 4 °C durante 1 hora, seguido de centrifugación, y luego se recolectó el sobrenadante. Posteriormente, se añadieron al mismo 10 µg de IgG normal de conejo o de un anticuerpo α-acetil histona H3, seguido de rotación durante una noche a 4 °C. A la solución resultante, se añadió proteína G inmovilizada en agarosa y la mezcla resultante se sometió a rotación a 4 °C durante 1 hora, seguido de centrifugación, y luego se recolectó el sedimento. El sedimento obtenido de esta manera se lavó dos veces en tampón de lavado de complejo inmunitario bajo en sal, dos veces con tampón de lavado de complejo inmunitario alto en sal, dos veces con tampón de lavado de complejo inmunitario LiCl, y finalmente cuatro veces con tampón TE. Luego se añadió al mismo un tampón de elución (que contenía 20 µl de hidrógeno carbonato sódico 1M, 10 µl de SDS, y 170 µl de agua estéril). Tras 30 minutos, se centrifugó la mezcla, y se recogió el sobrenadante.

25 Posteriormente, se añadieron 5 M de cloruro sódico al sobrenadante y la mezcla resultante se calentó durante una noche a 65 °C. Después se añadió a la misma RNasa A, y la mezcla resultante se incubó a 37 °C durante 30 minutos. Luego se añadió a la misma 0,5 M de EDTA, 1 M de Tris-HCl y Proteinasa K, y la mezcla resultante se incubó a 45 °C durante 2 horas.

30 Finalmente se añadieron a la misma los Reactivos A, B y C en una cantidad 5 veces mayor que la de la solución obtenida por el tratamiento con Proteinasa K, seguido de centrifugación (10000 rpm, 30 seg, a temperatura ambiente) usando un filtro Spin. Por el que se purificó el ADN de la inmunoprecipitación de cromatina.

(1-2) Análisis de micromatriz

35 Mediante el uso del kit GenomePlex Complete Whole Genome Amplification (WGA, amplificación de genoma completo) (Sigma), se amplificó cada muestra de ChIP obtenida en (1-1). El procedimiento fue de acuerdo con el protocolo de Sigma adjunto en el kit.

40 Con el fin de confirmar la ChIP, usando 320 ng de cada ADN amplificado por WGA como molde, y usando también los siguientes cebadores y SYBR (marca registrada) Premix Ex Taq™ (Tiempo real perfecto) (TAKARA), se amplificó un gen interno de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) por el procedimiento de PCR (95 °C durante 5 s y 60 °C durante 20 s x 45 ciclos). De hecho, el GAPDH es un gen constitutivo que se va a usar como control positivo para confirmar si se había enriquecido el elemento de ADN mediante ChIP y se llevó a cabo el procedimiento PCR usando cebadores unidos al EZ ChIP (Upstate).

5'-TACTAGCGGTTTTACGGGCG-3'
5'-TCGAACAGGAGGAGCAGAGAGCGA-3'

45 Tal como se muestra en la Fig. 1, se confirmó que GAPDH estaba amplificado específicamente en la muestra sometida a inmunoprecipitación con un anticuerpo anti-histona H3 acetilada. Cada una de las muestras de ADN amplificado por WGA se sometió a análisis de micromatriz (NimbleGen) para llevar a cabo la inmunoprecipitación de cromatina sobre chip (ChIP-on-chip). "ChIP-on-chip" es una técnica para identificar cada elemento de ADN sometiendo cada ADN enriquecido en (1-1) a análisis de micromatriz.

50 (1-3) Extracción del elemento de ADN

Basándose en los resultados del análisis ChIP-on-chip que se obtienen en (1-2), se extrajeron 5 secuencias que tienen un contenido en AT del 62 % o más.

A2: cromosoma 15 (80966429 a 80974878)
A7: cromosoma 11 (88992123 a 89000542)
55 A18: cromosoma 4 (111275976 a 111284450)

B5: cromosoma 1 (143034684 a 143043084)
 C14: cromosoma 11 (46089056 a 46097482)

Ejemplo 2

Efecto del elemento de ADN usando la expresión de fosfatasa alcalina secretora (SEAP) como índice

5 (2-1) Construcción de un vector de expresión de SEAP

Utilizando el pSEAP2-control (Clontech) como molde, se amplificó el gen SEAP mediante el procedimiento PCR (94 °C durante 30 s y 68 °C durante 2 min x 40 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus- (TOYOBO).

5'-AAAGCTAGCATGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGGGCC-3'
 5'-AAAAGATCTTCATGTCTGCTCGAAGCGGCCGGCCGC-3'

10 Posteriormente, el fragmento de SEAP amplificado se separó por electroforesis en gel de agarosa y se recortó del gel, seguido de purificación usando un kit de extracción de Gel QIAquick (Qiagen). El fragmento de ADN obtenido de esta manera se usó como inserción. La inserción se digirió con las enzimas de restricción NheI y BgIII, y se digirió el vector pIRES hyg3 (Clontech) con las enzimas de restricción NheI y BamHI. Los fragmentos de ADN resultantes se sometieron a electroforesis en gel de agarosa para separar los fragmentos diana, respectivamente y los fragmentos
 15 diana se recortaron del gel, seguido de purificación. Luego, se llevó a cabo una reacción de ligadura y transformación. La reacción de ligadura se llevó a cabo usando el sistema de ligadura de ADN LigaFast Rapid (Promega). La transformación se llevó a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, se descongelaron células JM109 competentes (TAKARA) congeladas, y se añadieron 10 µl de una solución obtenida tras la reacción de ligadura a una solución de las células descongeladas y la mezcla resultante se dejó en reposo en hielo durante 30
 20 minutos. A continuación, se aplicó un choque térmico (42 °C, 45 seg) a la mezcla, y se enfrió la mezcla en hielo durante 5 minutos. A esta suspensión celular se le añadió 1 ml de medio LB y la mezcla resultante se agitó a 37 °C durante 1 hora. Posteriormente se emplacó la mezcla sobre una placa LB que contenía 0,1 mg/ml de ampicilina, y se incubó la placa a 37 °C durante 14 a 16 horas. A continuación, por lisis alcalina, se recolectó un plásmido diana de las colonias cultivadas en la placa LB. Finalmente, se determinó la secuencia de polinucleótido de SEAP en el
 25 plásmido que se obtuvo por lisis alcalina, de esta manera se construyó el pCMV/SEAP ires Hygro.

(2-2) Clonación del elemento de ADN

Posteriormente, se clonó cada uno de los elementos de ADN extraídos en el ejemplo 1 en el vector de expresión de SEAP que se obtuvo en (2-1) usando el kit BAC SUBCLONING (Gene Bridges) a partir de un cromosoma bacteriano artificial (BAC) que contenía una secuencia de polinucleótido que se correspondía con cada uno de los elementos de
 30 ADN.

En primer lugar, el pCMV/SEAP ires Hygro obtenido en (2-1) se digirió con la enzima de restricción SpeI durante varias horas, seguido de precipitación en etanol y el precipitado se disolvió en agua estéril. Utilizando el vector digerido con SpeI como molde, se llevó a cabo el procedimiento PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s y 68 °C durante 10 min x 30 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus- (TOYOBO).

35 A2D:

5'-GGAAATTGAGAAGTATCATTACACAACAGTACCACAAACATGAAATAAATGTGGAT
 CCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2R:

40 5'-CTCATTCTGTGGGTTGTCAATTTCACTTCCTTGATGCTATCCTTTCAAGCAAAATC
 CTAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

A7D:

5'-CTTATTTTCTAAGTAGTATAGACTTAATTGTGAGAACAAAATAAAACTTGGATC
 CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A7R:

45 5'-CTCTTCCCATTCTCATTGGAATCTACTTCAAAGGTTTACCATACTAAGACCTAG
 TCAATAATCAATGTCAACG-3'

A18D:

5'-CGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTCGA
 TCCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

50 A18R:

5'-CATACAGAAGCCAGTTTGAAGTCTGAGACCTCACTCCATTTCTTACAAGTTATGCC
TAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

B5D:

5 5'-ACCGTTTTATATTGTTTAAGCATTTCCTAGACATATTTGGCTACAAATCTAGATC
CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

B5R:

5'-GATCCTTAGGGGGGCTGATTATATAAAAAAATAGAAATGTAGTCTTAGATGAAACC
TAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14D:

10 5'-CACAAAGTTCACCTGTCAAGGCCAGGTGATGAGGCCACACATGCCCGGACCTTGA
TCCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

C14R:

5'-CAAAACCTCATCTCTACTGAAAATAGAAAATTAGCTGGGCGTGGTGGCAGGTGCC
CTAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

15 Tras confirmarse la amplificación por electroforesis en gel de agarosa usando una porción de la solución de reacción, el resto de la solución de reacción se sometió a precipitación en etanol. El precipitado se disolvió en agua estéril, y la solución resultante se usó para la transformación de ADN.

Posteriormente, se llevó a cabo la preparación de *Escherichia coli* para la transformación.

Los clones de BAC que correspondían a las 5 secuencias extraídas en el ejemplo 1 son los siguientes.

Secuencia extraída	Clon de BAC correspondiente
A2	RP11-152F13
A7	RP11-643G5
A18	RP11-115A14
B5	RP11-640M9
C14	RP11-702F3

20 10 µl del BAC mencionado anteriormente (Advanced Geno Techs Co.) que se habían descongelado, se inocularon en 1 ml de un medio (que contenía cloranfenicol a una concentración final de 15 µg/ml) y se incubaron durante una noche a 37 °C. Se transfirieron 30 µl de la solución de cultivo a 1,4 ml de un medio (que contenía cloranfenicol a una concentración final de 15 µg/ml) y se incubaron a 37 °C durante 2 horas. Se repitió dos veces una centrifugación y lavado con agua estéril, y se suspendieron las células en 20 µl de agua estéril. Se añadieron en una cubeta enfriada (0,1 cm) 1 µl de pRED/ET (Gene Bridges) y *Escherichia coli*, seguido de electroporación (1350 V, 10 µF). Después, se añadió a esto 1 ml de medio SOC, y la mezcla resultante se incubó a 30 °C durante 70 minutos. Se emplacaron 100 µl de la solución de cultivo en una placa LB (que contenía tetraciclina y cloranfenicol a concentraciones finales de 3 µg/ml y 15 µg/ml, respectivamente), y se incubó una noche a 30 °C. Se transfirieron 30 µl de la solución de cultivo a 1,4 ml de un medio (que contenía tetraciclina y cloranfenicol a concentraciones finales de 3 µg/ml y 15 µg/ml, respectivamente), y se incubaron a 30 °C durante 2 horas. Luego, se añadieron a la misma 50 µl de L-arabinosa al 10 %, y se llevó a cabo una incubación adicional a 37 °C durante 1 hora. A continuación se repitió dos veces un lavado con agua estéril, y se añadieron las *Escherichia coli* que se suspendieron en 30 µl de agua estéril y 1 µl del ADN para la transformación a una cubeta enfriada (0,1 cm), seguido de electroporación 1350 V, 10 µF). Luego, se añadió a esto 1 ml de medio SOC, y la mezcla resultante se incubó a 37 °C durante 90 minutos. La cantidad total de la solución de cultivo se emplacó en una placa LB (que contenía 100 µg/ml de ampicilina), y la placa se incubó. A continuación se obtuvo el plásmido diana por lisis alcalina. Finalmente, se confirmaron la secuencia del plásmido que se obtuvo y los sitios de la enzima de restricción del mismo, por lo que se construyó el plásmido diana. El vector construido se muestra en la Fig. 2.

(2-3) Evaluación usando la expresión de SEAP como índice

40 Se evaluó cada plásmido construido en (2-2) usando la célula hospedadora CHO-K1 (ATCC) y el reactivo de transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen)

Se llevó a cabo la selección con antibióticos con higromicina a 800 µg/ml durante aproximadamente 2 semanas

comenzando 2 días tras la transfección, por lo que se estableció una línea celular policlonal que expresaba establemente. La línea celular establecida de esta manera se sometió a un remplazo de medio el día antes de la medición, y se sembraron un número determinado de células en una placa de 24 pocillos (IWAKI). A las 24 horas tras poner las células en las placas, se recolectó el sobrenadante, y se midió la actividad de SEAP. La actividad de SEAP en el sobrenadante del cultivo se midió usando el Ensayo de Fosfatasa Alcalina Segregada indicadora SensoLyte™ pNPP (ANASPEC).

Los resultados medidos se muestran en la Fig. 3. Cuando la actividad de SEAP del control sin elemento se normalizó a 1, la actividad SEAP en el sobrenadante del cultivo de la línea celular CHO que expresaba establemente que tenía el elemento de ADN A2, A7, A18, B5 o C14 mostraba un valor numérico cinco veces mayor o más que el del control. Basándose en los resultados, se confirmó que los 5 tipos de elementos de ADN aumentan drásticamente la expresión de SEAP. De hecho, las secuencias de polinucleótidos de los 5 tipos de elementos de ADN anteriores se representan en las SEC ID N°: 1 a 5 del listado de secuencias, respectivamente.

Ejemplo de referencia 1

Generalidad de promotores que se va a usar en combinación

El promotor para el vector que se usa en la evaluación de los elementos de ADN del ejemplo 2 era un promotor de CMV, y de esta manera se estudió en el ejemplo de referencia 1 el uso de elementos de ADN en combinación con otros promotores generales.

(1-1) Construcción del vector de expresión de SEAP usando promotores EF-1 α y SV40

Utilizando el pSEAP2-control (Clontech) como molde, se amplificó el gen SEAP por el procedimiento PCR (94 °C durante 30 s y 68 °C durante 2 min x 40 ciclos) usando los cebadores descritos en (2-1) y KOD-plus-. El SEAP amplificado se preparó como una inserción de la misma manera que en (2-1). La inserción se digirió con las enzimas de restricción NheI y BglII, y se digirió un vector pIRES puro3 (Clontech) con las enzimas de restricción NheI y BamHI, y se construyó el pCMV/SEAP ires Puro de la misma manera que en (2-1).

Posteriormente, usando el PEF1/V5-His A (Invitrogen) como molde, se amplificó un promotor EF-1 α por el procedimiento PCR (94 °C durante 15 seg, 60 °C durante 30 seg, y 68 1C durante 2 min x 30 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus-.

5'-AAAAGTATCCCTAGCCAGCTTGGGTGGTACCAAGC-3'
5'-AAAAGTATCCCTAGCCAGCTTGGGTGGTACCAAGC-3'

Utilizando el pCMV/SEAP ires Puro construido anteriormente como vector, se llevó a cabo la digestión con las enzimas de restricción SpeI y EcoRV para el vector y el promotor, y se construyó el pEF/SEAP ires Puro de acuerdo con el procedimiento descrito en (2-1).

De manera similar, usando el pcDNA3.1+ (Invitrogen) como molde, se amplificó un promotor de SV40 por el procedimiento PCR (94 °C durante 15 s, 60 °C durante 30 s, y 68 1C durante 1 min x 30 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus.

5'-AAAAGTATCCCTAGCCAGCTTGGGTGGTACCAAGC-3'
5'-AAAGATATCAGCTTTTTGCAAAGCCTAGGCCTC-3'

Utilizando el pCMV/SEAP ires Puro construido anteriormente como vector, se llevó a cabo la digestión con las enzimas de restricción SpeI y EcoRV para el vector y el promotor, y se construyó el pSV40/SEAP ires Puro de acuerdo con el procedimiento descrito en (2-1).

(1-2) Clonación del elemento de ADN A2 o A7

Posteriormente, se llevó a cabo la clonación del elemento de ADN A2 o A7 usando el pEF/SEAP ires Puro y pSV40/SEAP ires Puro construidos (en el ejemplo de referencia 1-1) como estructuras básicas.

Primero se digirieron el pEF/SEAP ires Puro y el pSV40/SEAP ires Puro con la enzima de restricción SpeI durante varias horas, seguido de precipitación en etanol, y el precipitado se disolvió en agua estéril. Utilizando los respectivos vectores digeridos con SpeI como moldes, se preparó el ADN para la transformación por el procedimiento PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s, y 68 °C durante 10 min x 30 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus.

A2 (EF/D):

5'-GGAAATTGAGAAGTATCATTACACAACAGTACCACAAACATGAAATAAATGTGCTA
GTCAGAGAGGAATCTTTGCAGC-3'

A2 (SV40/D):

5'-GGAAATTGAGAAGTATCATTACACAACAGTACCACAAACATGAAATAAATGTGCTA

GTCTGTGGAATGTGTGTCAGTTAG-3'

A2 (EF y SV40/R) :

5'-CTCATTCTGTGGGTTGTCATTTCACTTCCTTGATGCTATCCTTTCAAGCAAAATT
TTAAAACCTTTATCCATCTTTGCA-3'

5 A7 (EF/D):

5'-CTTATTTTCTAAGTAGTATAGACTTAATTGTGAGAACAAAATAAAAACCTTGCTAG
TCAGAGAGGAATCTTTGCAGC-3'

A7 (SV40/D):

10 5'-CTTATTTTCTAAGTAGTATAGACTTAATTGTGAGAACAAAATAAAAACCTTGCTAG
TCTGTGGAATGTGTGTCAGTTAG-3'

A7 (EF y SV40/R):

5'-CTCTCCCATTTCTCATTTGAATCTACTTCAAAAGGTTTACCATACTAAGAAGCTAG
TTTTAAAACCTTTATCCATCTTTGCA-3'

15 Utilizando el ADN preparado de esta manera para la transformación y el BAC transfectado con pRed/ET, se clonó el elemento de ADN A2 o A7 en el vector descrito en el ejemplo de referencia 1-1. La construcción del vector se muestra en la Fig. 2. De hecho, el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en (2-2).

(1-3) Evaluación usando la expresión de SEAP como índice

Cada plásmido construido en el ejemplo de referencia 1-2, se evaluó usando la célula hospedadora CHO-K1 (ATCC) y el reactivo de transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen).

20 Se llevó a cabo una selección por antibiótico con puromicina a 8 µg/ml durante aproximadamente 2 semanas comenzando a los 2 días tras la transfección, de esta manera se estableció una línea celular policlonal que expresaba establemente. La línea celular establecida de esta manera se sometió a una sustitución del medio el día antes de la medición, y se sembró un número determinado de células en una placa de 24 pocillos. A las 24 horas tras colocar las células en la placa, se recolectó el sobrenadante, y se midió la actividad SEAP. La actividad de SEAP en el sobrenadante del cultivo se midió usando el Ensayo Indicador de Fosfatasa Alcalina segregada pNPP SensoLyte™ (ANASPEC).

30 Los resultados de la medición se muestran en la Fig. 4. Cuando la actividad de SEAP del control sin elemento se normalizaba a 1, el elemento de ADN A2 o A7 mostraba un efecto de aumento de la expresión tal que la actividad de SEAP era mayor en dos veces o más en el caso del uso del promotor EF-1α, y mayor en cuatro veces o más en el caso del uso del promotor SV40 que el del control. Basándose en los resultados, se confirmó que estos elementos de ADN muestran el efecto de aumento de expresión de un gen exógeno cuando se usa en combinación con un promotor general.

Ejemplo de referencia 2

Evaluación usando la expresión de anticuerpo como índice

35 (2-1) Construcción de un vector pEF6KCL de expresión de cadena ligera humana

Utilizando el plásmido pEF6/V5-HisB (Invitrogen) como molde, se obtuvo un fragmento de ADN entre la posición 2174 (inmediatamente cadena abajo de BGHpA) y la posición 2958 (SmaI) (un fragmento de ADN que contiene un origen de replicación f1 y un promotor y origen de SV40, de aquí en adelante denominado "fragmento A", estando la secuencia de polinucleótido del fragmento A representada por la SEC ID N°: 6 del listado de secuencias) por el procedimiento PCR usando los siguientes cebadores y KOD-plus-.

40 5'-CCACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAAGC-3'
5'-AAACCCGGGAGCTTTTTGCAAAAGCCTAGG-3'

45 El fragmento A obtenido y un fragmento de ADN que contenía una secuencia de ADN que codifica una señal secretora de cadena κ humana, una región constante de cadena κ humana, y una señal de adición de poli(A) humana (de aquí en adelante denominado "fragmento B") se unieron por PCR de solapamiento. El fragmento de ADN que se obtuvo de esta manera en la que se ligaron el fragmento A y el fragmento B, se digirió con enzimas de restricción KpnI y SmaI, y el fragmento resultante se unió al plásmido pEF6/V5-HisB (Invitrogen) que se digirió con las enzimas de restricción KpnI y SmaI, por lo que se construyó un vector de expresión de cadena ligera humana pEF6KCL que tiene una secuencia de señal, un sitio de clonación, una región constante de cadena κ humana, y una secuencia de señal de adición de poli(A) humana cadena abajo del promotor EF-1α.

50

El fragmento de ADN que se obtiene por escisión del pEF6KCL obtenido por el procedimiento mencionado anteriormente con las enzimas de restricción KpnI y SmaI se unió al pEF1/myc-HisB (Invitrogen) que se digirió con KpnI y SmaI, seguido de la transformación por lisis alcalina, y su confirmación de secuencia, por lo que se construyó el plásmido pEF1KCL.

5 (2-2) Construcción del vector de expresión de cadena pesada humana pEF1FCCU

Un fragmento de ADN (la secuencia de polinucleótido de este fragmento de ADN está representada por la SEC ID N°: 7 en el listado de secuencias) que contenía una secuencia de ADN que codificaba una secuencia de señal de IgG1 humana y una secuencia de aminoácidos de una región constante se digirieron con las enzimas de restricción NheI y PmeI, y el fragmento resultante se unió a un plásmido pEF1KCL que se digirió con NheI y PmeI, por lo que se construyó un vector de expresión de cadena pesada humana pEF1FCCU que tenía una secuencia de señal, un sitio de clonación, una región constante de cadena pesada humana, y una secuencia de señal de adición de poli(A) humana cadena abajo del promotor EF-1 α .

(2-3) Construcción de un vector de expresión del gen X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN#)

15 Uniendo el vector de expresión de cadena L o cadena H construido en el ejemplo de referencia 2-1 o en el ejemplo de referencia 2-2, se construyó un vector de expresión de anticuerpo humanizado sencillo (pEF_LHN (que carece de región variable)).

20 Se añadió un sitio de enzima de restricción Sall por el procedimiento de PCR a ambos extremos de la unidad de expresión génica desde cadena arriba del promotor a cadena abajo del poli(A) del pEF1KCL. Se llevaron a cabo entonces la electroforesis en gel, el recorte de un fragmento de ADN deseado del gel, y la purificación del fragmento de ADN, preparando de este modo la inserción. Digiriendo el pEF1FCCU construido en el ejemplo de referencia 2-2 con la enzima de restricción Sall, se linealizó el vector y el sitio de Sall localizado cadena arriba de la unidad de expresión génica. Entonces, el vector linealizado se unió con la inserción anterior, seguido de transformación, lisis alcalina, y confirmación de secuencias, construyendo de esta manera un vector de expresión de anticuerpo humanizado sencillo (pEF_LHN (que carece de región variable)).

Posteriormente, se introdujeron los siguientes oligonucleótidos en un sitio AatII del vector PEF_LHN (que carece de región variable).

5'-CGCGGCCGCACTAGTGACGT-3'
5'-CACTAGTGCGGCCGCGACGT-3'

30 Los respectivos oligonucleótidos se diluyeron hasta 5 pmol, y usando la T4 polinucleótido cinasa (TAKARA), se permitió que se produjera una reacción a 37 °C durante 1 hora. Luego, se añadió a esto 10 x de tampón (TAKARA), y se llevó a cabo la hibridación a 96 °C durante 1 min a temperatura ambiente. Estos oligonucleótidos y el vector pER_LHN que se había digerido con la enzima de restricción AatII se unieron, seguido de transformación, lisis alcalina, y confirmación de secuencia, construyéndose así el pEF_LHN# (que carece de región variable).

35 Mediante la integración de la región variable del gen X de anticuerpo humanizado en el vector universal construido anteriormente (pEF_LHN# (que carece de región variable)), se completó la construcción de un vector único de expresión del gen X de anticuerpo humanizado (gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN#).

En primer lugar, usando los siguientes cebadores y KOD-plus-, se amplificó una región variable de cadena L del gen X de anticuerpo humanizado por el procedimiento de PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s, y 68 °C durante 1 min x 30 ciclos). Región variable de cadena L:

5'-AAACATATGGCGACATCCAGATGAC-3'
5'-AAACGTACGCTTGATCTCCACCTTGG-3'

45 El fragmento de región variable de cadena L amplificado y el vector universal (pEF_LHN# (que carece de región variable)) se digirieron con las enzimas de restricción NdeI y BsiWI, seguido de electroforesis en gel de agarosa, recorte de un fragmento deseado del gel, purificación, reacción de ligadura, transformación, lisis alcalina, y confirmación de secuencia, por lo que se integró la región variable de cadena L en el vector. De la misma manera, usando los siguientes cebadores y KOD-plus-, se amplificó la región variable de cadena H del gen X de anticuerpo humanizado por el procedimiento PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s, y 68 °C durante 1 min x 30 ciclos).

Región variable de cadena H:

50 5'-AAAGCTGAGCCAGGTGCAGCTGCAGG-3'
5'-AAAGCTGAGCTCACGGTCACCAGGGTTC-3'

55 El fragmento de región variable de la cadena H y el vector que tenía insertada la región variable de cadena L en él se digirieron con la enzima de restricción BlnI, seguido de electroforesis en gel de agarosa, recorte de un fragmento deseado del gel, purificación, reacción de ligadura, transformación, lisis alcalina, y confirmación de secuencia, se integró de esta manera la región variable de la cadena H en el vector y se construyó un vector de expresión del gen

X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN#).

(2-4) Construcción de un vector de expresión de un gen X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN#)

5 Utilizando el vector de expresión del gen X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN#) construido en (2-3) como estructura básica de vector, se construyó otro vector de expresión del gen X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN#) sustituyendo el promotor de acuerdo con el siguiente procedimiento.

Utilizando pIRES puro3 como molde, se amplificó un fragmento del promotor CMV por el procedimiento PCR (94 °C durante 30 s y 68 °C durante 3 min x 40 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus-.

10 Cadena arriba de la cadena H:

5'-CTTTTGCAAAAAGCTTCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCC-3'
5'-TTCATGGTGGCGCTAGCCCGCAGATATCGATCCGAGCTCGGTA-3'

Cadena arriba de la cadena L:

5'-TGACGTGACAAGCTTCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCC-3'

15 5'-CTGGATGTGCCATATGCGCCGGAGATCCACAGCAGCAGGGAGATGAACACCTGG

GTCTGCAGCACCATGGTGGCGCTAGCCCGCAGATATCGATCCGAGCTCGGTA-3'

A la solución de reacción de PCR se le añadió la enzima de restricción DpnI, y se permitió que se produjera la reacción a 37 °C durante 1 hora, seguido de purificación usando un kit Cleanup reaction miniElute (Qiagen), por lo que se preparó una muestra para su uso en In-Fusion. Mientras tanto, se digirió el gen X de anticuerpo humanizado/pEF-LHN# con las enzimas de restricción HindIII, NheI, y FseI, seguido de electroforesis en gel de agarosa, separando de esta manera dos grandes fragmentos entre los fragmentos resultantes. Cada uno de los fragmentos se recortó del gel, y se extrajo el ADN del gel, preparando de esta manera una muestra para su uso en el kit de clonación PCR Advantage In-Fusión™ (TAKARA), seguido de la transformación, lisis alcalina, y confirmación de secuencia, construyendo de esta manera un vector de expresión del gen X de un anticuerpo humano sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN#).

(2-5) Clonación de un elemento de ADN A7

Se seleccionó A7 de entre los 5 tipos de elementos de ADN que se confirmó que tenían un efecto de aumento de la expresión de SEAP, y se clonó en un vector de expresión de anticuerpo.

30 De la misma manera que en (2-2), usando cada uno de los vectores de expresión del gen X de anticuerpo humanizado sencillo (gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN# y gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN#) digeridos con la enzima de restricción NotI como molde, se preparó el ADN para la transformación por el procedimiento de PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s, y 68 °C durante 11 min x 30 ciclos) que se llevó a cabo usando los siguientes cebadores y KOD-plus-.

Gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN# D:

35 5'-CTCTTCCCATTCTCATTTGAATCTACTTCAAAGGTTTACCATACTAAGACTCGA
GGCACTAGTGACGTCAGGTGGCACT-3'

Gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN# R:

5'-CTCTTCCCATTCTCATTTGAATCTACTTCAAAGGTTTACCATACTAAGAGCACT
AGTGACGTCAGGTGGCACTTTTCGG-3'

40 Gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN# D:
Se usó el gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN#D
Gen X de anticuerpo humanizado/pCMV_LHN# R:
Se usó el gen X de anticuerpo humanizado/pEF_LHN# R.

45 Utilizando el ADN preparado anteriormente para la transformación y el BAC transfectedo con pRed/ET, se clonó el elemento de ADN A7 en los vectores de expresión del gen X de anticuerpo humanizado sencillo que se describen en el ejemplo de referencia 2-3. La construcción del vector se muestra en la Fig. 5. De hecho, se llevó a cabo el procedimiento de acuerdo con el procedimiento descrito en (2-2).

(2-6) Evaluación usando la expresión de anticuerpo como índice

Cada plásmido que se construyó en el ejemplo de referencia 1-5, se evaluó usando la célula hospedadora CHO-K1

(ATCC) y el reactivo de transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen).

Se llevó a cabo la selección por antibiótico con Geneticina (Roche) a 800 µg/ml durante aproximadamente 2 semanas comenzando 2 días después de la transfección, estableciendo de esta manera una línea celular policlonal que expresaba establemente. La línea celular establecida de esta manera se sometió a sustitución del medio el día antes de la medición, y se sembró un número determinado de células en una placa de 24 pocillos. A las 24 horas tras la colocación en placas de las células, se recolectó el sobrenadante del cultivo, y se midió el nivel de expresión del anticuerpo en el sobrenadante del cultivo por el procedimiento ELISA. De hecho, el ELISA se llevó a cabo de la siguiente manera. Se añadieron 100 µl del sobrenadante del cultivo libre de células a cada pocillo de una placa de 96 pocillos revestidos con un anti-cadena ligera kappa a 50 ng/pocillo, y se incubó la placa a 37 °C durante 1 hora. Posteriormente, se retiró la muestra (sobrenadante del cultivo), y cada pocillo se lavó con 200 µl de PBS-Tween (0,05 %). Luego, se añadieron 100 µl de IgG (Fc) anti-humano marcada con HRP a cada pocillo y la placa se incubó a 37 °C durante 1 hora adicional. A continuación, se retiró la IgG (Fc) anti-humana marcada con HRP, y se lavó cada pocillo con PBS-Tween (0,05 %). Luego se reveló el color usando un kit ABTS (Nacalai) de sustrato POD, y se midió la absorbancia a una longitud de onda determinada de 405 nm. Para la dilución de la anti-cadena ligera kappa, la IgG (Fc) anti-humano y la muestra, se usó PBS-Tween (0,05 %). Utilizando la IgG humana diluida en serie a 12 ng, 6 ng, 3 ng, 0,75 ng, 0,375 ng, y 0,1875 ng como referencia, se calculó la concentración de la muestra.

Los resultados se muestran en la Fig. 6. Se confirmó que la muestra que tenía el elemento de ADN A7 tenía un efecto mayor de aumento de producción de anticuerpo en comparación con un control sin elemento cuando se usaba el promotor EF-1α o el promotor CMV en el vector de expresión de anticuerpo.

20 Ejemplo 3

Longitud de la secuencia que muestra actividad de aumento de expresión de un gen exógeno

(3-1) Clonación de elementos de ADN que tienen diferentes longitudes de secuencia

Basándose en la longitud de secuencia que se usa en el ejemplo 2, se construyeron vectores que contenían cada uno de los elementos de ADN pero tenían diferentes longitudes de secuencia.

Los detalles de los elementos de ADN que tenían diferentes longitudes de secuencia que fueron diseñados basándose en la longitud completa de cada elemento de ADN A2, A7, A18, B5 y C14 se muestran en las Figs. 7, 9, 11, 13, 15, 18 y 19 respectivamente. El pCMV/SEAP ires Hygro descrito en (2-1) se digirió con la enzima de restricción SpeI durante varias horas, seguido de precipitación en etanol, y se disolvió el precipitado en agua estéril. Utilizando el vector digerido con SpeI como molde, se preparó el ADN para la transformación por el procedimiento PCR (94 °C durante 15 s, 55 °C durante 30 s, y 68 °C durante 10 min x 30 ciclos) usando los siguientes cebadores y KOD-plus-. Utilizando el ADN preparado de esta manera para la transformación y el correspondiente BAC transfectado con pRed/ET, cada elemento de ADN que tenía una diferente longitud de secuencia se clonó en el pCMV/SEAP ires Hygro descrito en (2-1). La construcción del vector se muestra en la Fig. 2. De hecho, el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en (2-2).

35 A2-1D:

5'-CATGCACAGATTAGCCATTTAGTACTTACTAAATCAAACCTCAATTTCTGAAGTCT
AGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-1R:

40 5'-CTCATTCTGTGGGTTGTCATTTCACTTCCTTGATGCTATCCTTTCAAGCAAAATT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-2D:

5'-ACACTGGTCAAAGGGACAGGTCATTGTTATGCTGGCAATGCAGGCTGCTGAAAAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-2R:

45 5'-ACTGTAGCTTCTTATTTTTTACCTGCAGTGCATTCCTGTAAAAGTAGTGTGGAGT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-3D:

5'-CTGGAAATTGAGAAGTATCATTACACAACAGTACCACAAACATGAAATAAATGTGC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

50 A2-3R:

ES 2 701 091 T3

5'-CCAAGCTTGTCCAACCGCGCCTGCAGGCTGCATGCAGCCTGTGAAGGCTTTGAT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-4D:

5 5'-TCAATCATTATCAATTTTATCTTCAAAGTCCCTCACTTCAGGGAGATGATATAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-4R:

5'-ATATATAAAAGTTCATGTATATATAAAATCATGCAATACACGGCCTTTTGTGACT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-5D:

10 5'-CGCATAAAAGGAAAAGCATCCTTAAAATAAACACCATCAATGGCTCCTCGGTGGC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-5R:

Se usó A2-4R.

15 A2-6D:

5'-GGGAGGCTACAGCTTGCCTCTCTAACCCTAAAAGGCATGACCCTCCTCAAAGCT
AGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-6R:

Se usó A2-4R.

20 A2-7D:

5'-TCTGGCTTCCCTGGGCCACGCTGGAAGAAGAATTGTCTTGCGCCACACATAAAAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-7R:

25 5'-AGCTGATTTTTACGTTAAATGTAACATGTAAAGAAATATATGTGTGTTTTAGAT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-8D:

5'-GTGAAGAGGAGGAGATGTCAAATTCAAAGTCTTAAATGATGTAGTTTTAAGTAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A2-8R:

30 5'-ATGACACTTGATATTGTTGTTTATATTGCTGGTTAGTATGTGCCTTCATTTACCT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A2-9D:

Se usó A2-6D.

A2-9R:

35 Se usó A2R.

A2-10D:

Se usó A2-2D.

A2-10R:

40 Se usó A2-7R.

A2-11D:

Se usó A2-8D.

A2-11R:

Se usó A2-2R.

A2-12D:

45 Se usó A2-2D.

A2-12R:

Se usó A2-4R.

A2-13D:

Se usó A2-8D.

ES 2 701 091 T3

A2-13R:
Se usó A2-7R.
A2-14D:
Se usó A2D.
5 A2-14R:
Se usó A2-2R.
A2-15D:
Se usó A2-2D.
10 A2-15R:
Se usó A2R.
A2-16D:
Se usó A2-8D.
A2-16R:
Se usó A2-4R.
15 A2-17D:
Se usó A2D.
A2-17R:
Se usó A2-7R.
A7-1D:
20 5'-AAAAACAAAACCTGGAGTAAACAAGATGAATTGTTTTAATAGAGGCACTGTATTAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'
A7-1R:
5'-ATACAATGTTCCATGTATTCTGTGCCTGAACCTATGCAGCTGATGTAGCTGAAGT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'
25 A7-2D:
5'-GATCTTATTTTCTAAGTAGTATAGACTTAATTGTGAGAACAAAATAAAAACCTTGC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'
A7-2R:
30 5'-TGTTGTTTTTCAGCCACTAAGTTTGAGGTGATTTGTTCTGGCAGTCCTAGGAAACT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'
A7-3D:
Se usó A7-2D.
A7-3R:
35 5'-AGCCTACACTACCCTTTGCAGCCTTTGGTAACTATCCTTCTGCTGTCTACCTCCT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'
A7-4D:
5'-AGGAGCTCCTGAATGAAGGACATCACTCAGCTGTGTTAAGTATCTGGAACAATAC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'
A7-4R:
40 5'-GACATAAAATGTAAGATATGATATGCTATGTAAGATATGATACCTGCCTTAAAT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'
A7-5D:
5'-CACTGCTTGATACTTACTGTGGACTTTGAAAATTATGAATGTGTGTGTGTGTGTC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'
45 A7-5R:
5'-CAATTACATTCCAGTGATCTGCTACTTAGAATGCATGACTGAACTCCTGGGTGGT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'
A7-6D:
50 5'-TTATTTTGAAGAGAAAACCTCCTGGTCCCACTTAAAATCCTTTCTTGTTCCTCAAGC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

ES 2 701 091 T3

A7-6R:

5'-AAGCAGTGTGTGTTTACCTGCATGTGTATGTGAATTA ACTCTGTTCCCTGAGGCAT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

A7-7D:

5 5'-ATTGCATGTTCTCATTATTTGTGGGATGTAAAAATCAAACAATAGAACGTATC
TAGTTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A7-7R:

5'-TTGGGAGGCCGCGCAGCTGGTAGATCACTTGAGGCCACGAATTTGACACCAGCAGGT
CAATAATCAATGTCAACGCGTATAT-3'

10 A7-8D:
Se usó A7-1D.

A7-8R:
Se usó A7R.

15 A7-9D:
Se usó A7-7D.

A7-9R:
Se usó A7-5R.

20 A7-10D:
Se usó A7-4D.

A7-10R:
Se usó A7-7R.

25 A7-11D:
Se usó A7-6D.

A7-11R:
Se usó A7-4R.

30 A7-12D:
Se usó A7-2D.

A7-12R:
Se usó A7-6R.

35 A7-13D:
Se usó A7-7D.

A7-13R:
Se usó A7R.

40 A7-14D:
Se usó A7-4D.

A7-14R:
Se usó A7-5R.

45 A7-15D:
Se usó A7-6D.

A7-15R:
Se usó A7-7R.

50 A7-16D:
Se usó A7-2D.

A7-16R:
Se usó A7-4R.

A7-17D:
Se usó A7-4D.

A7-17R:
Se usó A7R.

A7-18D:

Se usó A7-6D.
A7-18R
Se usó A7-5R.

A18-1:

55 5'-ATCCCCTGCTCTGCTAAAAAGAATGGATGTTGACTCTCAGGCCCTAGTTCTTGA
TCCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A18-1R:

ES 2 701 091 T3

Se usó A18R.

A18-2D:

5'-CTAAAGTGCTGGGATTACAGGCATAAGCCACCGTGCCCGGCTGGAGCATTGGGAT
CCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

5

A18-2R:

5'-ACTACTTACACATTTTCGAGTTTTAAATAAGGCGTTCAATATAGAGTGAACACCTA
GTCAATAATCAATGTCAACG-3'

A18-3D:

10

5'-CAGGCATAAGCCACCGCACCCGGCCACCCCTTACTAATTTTTAGTAACGTGATC
CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

A18-3R:

5'-CTGATTGACTTTGACCTCTGCTTTCCAACCTTGCCCCAAAGAAAGTTAGTCACCT
AGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

15

A18-4D:

Se usó A18-3D.

A18-4R:

5'-TTCAATGAAACAAGCTCTGTGAGGCTCATTTGTACCCATTTTGTTCAGTACTGCC
TAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

B5-1D:

20

5'-ACATACCCAGAGACACTGAGAGAGACAGACAGACAGTAAACAGAGGAGCAGATC
CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

B5-1R:

Se usó B5R.

B5-2D:

25

5' -GCTCAATTGTATCTTATGAAAACAATTTTTCAAATAAAAACAAGAGATATGATCC
TATTAATAGTAATCAATTACG-3'

B5-2R:

Se usó B5R.

B5-3D:

30

5'-CCTGTGCTGAATACCGTCTGCATATGTATAGGAAAGGGTAACTCAGCAGGGATC
CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

B5-3R:

5' -TATGTGAATGGAATAAAATAATCAAGCTTGTTAGAATTGTGTTTCATAATGACCC
TAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

35

B5-4D:

Se usó B5D.

B5-4R:

5'-GAAAGTCTACAATTTTTTCAGTTTTAAATGGTATTTATTTGTAACATGTACCCTA
GTCAATAATCAATGTCAACG-3'

40

B5-5D:

Se usó B5-1D.

B5-5R:

5'-CAAAGATGAAGGATGAGAGTGACTTCTGCCTTCATTATGTTATGTGTTTCATATCC
TAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

45

B5-6D:

ES 2 701 091 T3

5'-CAGTGAATTATTCACCTTTGTCTTAGTTAAGTAAAAATAAAATCTGACTGTGATCC
TATTAATAGTAATCAATTACG-3'

B5-6R:

5 5'-GAACAGACAGGTGAATGAGCACAGAGGTCATTTGTAAACCGTTTGTGGTTAGCCT
AGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14-1D:

5'-CTTTTTGGCTTCTGTGTTTAAAGTTATTTTTCCCTAGGCCACAAACAGAGTCGA
TCCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

C14-1R:

10 5'-AACCTTGGAAAAATTCTGTTGTGTTTAGAAGCATGTACCAATCTATCACTCCTAG
TCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14-2D:

5'-CTATTCAGTCTGTAGGATGAAAAAGTTAATAACACCCTGAGAGGTTTCGATCC
TATTAATAGTAATCAATTACG-3'

15 C14-2R:

5'-CCTTAGATTAGTTTATTGTATTTTTATCAGCTACTATAAGGTTTACACACCCTA
GTCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14-3D:

20 5'-CAAGACCCTCAAATTCAAATTTCTTTATCTTGCTGTAGCACCTCCTGCGAT
CCTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

C14-3R:

5'-GGAGGGGATAGGAAGGGGATGAGGCCTAACAGGTTGATGATCTAGGCTTTACCTA
GTCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14-4D:

25 5'-CTCAAAAAGGAGATAATTCAGCCCCTCGCCTTAAAGAATCCCTATCAAGTGATC
CTATTAATAGTAATCAATTACG-3'

C14-4R:

Se usó C14-1R.

C14-5D:

30 5'-CGCTTGAACCTGGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCACGCCGTTGGATCC
TATTAATAGTAATCAATTACG-3'

C14-5R:

Se usó C14-1R.

C14-6D:

35 Se usó C14-4D.

C14-6R:

5'-TTAACTTTTTATCCTACAGACAGTGAATAGTAAAGCTTTCTGTGAAGACATACC
CTAGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

C14-7D:

40 Se usó C14-2D.

C14-7R:

Se usó C14-1R.

C14-8D:

45 Se usó C14-3D.

C14-8R:

5'-AAATTATTTCTGGTGGGCAATATTAGAATATGGGGAATGTTTGTCTGAGCCT
AGTCAATAATCAATGTCAACG-3'

- C14-9D:
Se usó C14-4D.
C14-9R:
Se usó C14-3R.
5 C14-10D:
Se usó C14-2D.
C14-10R:
Se usó C14R.
C14-11D:
10 Se usó C14-3D.
C14-11R:
Se usó C14-2R.
C14-12D:
Se usó C14-4D.
15 C14-12R:
Se usó C14-8R.
C14-13D:
Se usó C14-3D.
C14-13R:
20 Se usó C14-1R.
C14-14D:
Se usó C14-4D.
C14-14R:
Se usó C14-2R.
- 25 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de A2, A2-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5401 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 2700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 2200 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 3700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 5000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4001 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3700 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2801 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-15 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5800 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; A2-16 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 701 a 7000 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias; y A2-17 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 8450 de la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias.
- En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de A7, A7-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 601 a 3600 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3601 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3401 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 4500 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3600 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-15 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2401 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-16 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de

los nucleótidos 3401 a 8420 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; A7-17 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 6400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias; y A7-18 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1501 a 7400 de la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias.

5 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de A18, A18-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5040 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; A18-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1001 a 6002 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; A18-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2001 a 7000 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias; y A18-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 3000 a 7000 de la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias.

10 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de B5, B5-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 4001 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 3200 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2491 a 5601 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 5373 a 8401 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; B5-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 901 a 4001 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias; y B5-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4001 a 7000 de la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias.

15 En cuanto a las secuencias de polinucleótidos de los respectivos fragmentos de C14, C14-1 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 4015 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-2 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-3 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4020 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-4 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-5 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 6011 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-6 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4939 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-7 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-8 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2994 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-9 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 4020 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-10 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1 a 5014 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-11 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-12 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 2994 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; C14-13 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 960 a 7119 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias; y C14-14 se corresponde con la secuencia de polinucleótido de los nucleótidos 1987 a 8141 de la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias.

Los puntos de inicio y final de los respectivos fragmentos de la secuencia de longitud completa se muestran también en las Figs. 18 y 19.

(3-2) Evaluación de los elementos de ADN que tienen diferentes longitudes de secuencia

40 Cada plásmido construido en (3-1) se evaluó usando la célula hospedadora CHO-K1 (ATCC) y el reactivo de transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen).

45 De la misma manera que en (2-3), se llevó a cabo una selección por antibiótico con higromicina tras la transfección, estableciendo de esta manera una línea celular policlonal que expresaba establemente. La línea celular establecida de esta manera se sometió a sustitución del medio el día antes de la medición, y se sembró un número determinado de células en una placa de 24 pocillos. A las 24 horas tras la colocación en placa de las células, se recolectó el sobrenadante del cultivo y se midió la actividad de SEAP.

50 Los resultados de la medición se muestran en las Fig. 8, 10, 12, 14 y 16. Se confirmó que no solo el elemento de ADN de longitud completa, sino también los clones que tenían una longitud de secuencia más corta que el de longitud completa tenían un efecto de aumento de la expresión. Basándose en los resultados, se confirmó que los elementos de ADN A2, A7, A18, B5, y C14 tienen una actividad de aumento de la expresión de un gen exógeno incluso en los casos en los que tienen una longitud de secuencia más corta que el de longitud completa. Sin embargo, muestran el mayor efecto cuando la longitud de secuencia es la longitud completa.

Ejemplo 4

Efecto del uso de células hospedadoras distintas a la línea celular CHO

55 Se usó una línea celular CHO como la línea celular en la evaluación de los Ejemplos 2 y 3 y en los ejemplos de Referencia 1 y 2 Sin embargo, en el ejemplo 4 se seleccionó una línea celular HEK293 como una línea celular distinta a la línea celular CHO. La línea celular HEK293 se sometió a cultivo estático a 37 °C en presencia de un 5 % de CO₂ usando un medio DMEM (Invitrogen) que contenía un 10 % de FCS, y se sembró un número determinado de

- células en una placa de 6 pocillos el día antes de la transfección. Con el fin de evaluar el vector de expresión de SEAP que contenía cada uno de los elementos de ADN que se construyeron en los ejemplos de referencia 1-2, se llevó a cabo la transfección usando cada plásmido y el reactivo de transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen). Se llevó a cabo la selección por antibiótico con higromicina durante aproximadamente 2 semanas comenzando 2 días tras la transfección, estableciendo una línea celular policlonal que expresaba establemente. La línea celular establecida de esta manera se sometió a sustitución del medio el día antes de la medición y se sembró un número determinado de células en placas de 24 pocillos. A las 24 horas tras la colocación de las células en placas, se recolectó el sobrenadante del cultivo, y se midió la actividad de SEAP. La actividad de SEAP en el sobrenadante del cultivo se midió usando el Ensayo Indicador de Fosfatasa Alcalina Segregada pNPP SensoLyte™ (ANASPEC).
- 5
- 10 Los resultados de la medición se muestran en la Fig. 17. De la misma manera que en el ejemplo 1, se confirmó que cada elemento era también altamente eficaz en el aumento de la expresión de un gen exógeno (SEAP) en la línea celular HEK293.

Aplicabilidad industrial

- 15 Al introducir un vector de expresión de un gen exógeno usando el elemento de ADN de acuerdo con la invención en células hospedadoras de mamífero, es posible mejorar la productividad de un gen exógeno de una proteína terapéutica, de un anticuerpo o similares.

LISTADO DE SECUENCIAS

- <110> DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
- <120> Elemento de ADN que tiene la actividad de aumento de la expresión de un gen exógeno
- 20 <130> PN797479EPB
- <150> JP2010-154782
- <151> 07-07-2010
- <150> EP11743651.9
- <151> 06-07-2011
- 25 <160> 7
- <170> PatentIn versión 3.4
- <210> 1
- <211> 8450
- <212> ADN
- 30 <213> *Homo sapiens*
- <400> 1

ES 2 701 091 T3

attttgcttg aaaggatagc atcaaggaag tgaaatgaca acccacagaa tgagagataa 60
 tttttgcaaa tcatgtatct gataagggac ctgtagtcag aatatgcaaa gaacccttac 120
 aattcaataa gacaacccaa tttaaaaaca ggcaaaggat gtgaataggc atttctccaa 180
 agatacggaa aaacggocaa taagcacata aaaagatgct caaaatcatt tgccatttgg 240
 gaaatgcaat caaaaccaca atgaggtatc acttcaogcc cattaggggtg gctatagatc 300
 agaaagtcag ataacatgtg ttggcaagca catggaaaca ctgaagtcc tacaactgc 360
 tggtaggaat gtaaaatggt gcagccactg tggaaaacag tttccaatt tctcaaaatg 420
 ttaaacacag ttatcataca cccaagcaat totactctta ggtatatacc caagagaaat 480
 gaaaacatat gtcttcacca gaacttgctg ttcacagcag cattatgcat aatagaccaa 540
 aagtggaaac aactcaactg cccatcaact ggtgaatgga taagtaaaat gtgatgtaac 600
 cagtcattgg actgtcattc attaataaaa agaacaaggt actgattcat gttctaacat 660
 gagtgaatct tgaaaacact atgotaaatt aaagaagcca gtcacaaaag gccgtgtatt 720
 gcatgatttt atatatatcat gaacttttat atatatataa ttatatatat tatatataat 780
 tttatatata taaatttcta tatataaata tataaaatca tatatatgat atatattttt 840
 tcatatacat catatatatt tacaanaaatt atatatcata tatcatatga tatatgagat 900
 atatatcatg atatatatga tatatgatat atatcatatg agatatatga tatcatgaga 960
 tatatgatat catatgatat atatgatata gatatcatat gatatatata taatatatat 1020
 atgatagata tattatatat gatagatatg atagatatca tattatatat gatagatatg 1080
 atagatatca tattatatat gatagatatata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1140
 gatatcatat tatatatgat agatatgata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1200

ES 2 701 091 T3

gatatcatat tatatatgat agatatgata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1260
gatatcatat tatatatgat agatatgata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1320
gatatcatat tatatatgat agatatgata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1380
gatatcatat tatatatgat agatatgata gatatcatat tatatatgat agatatgata 1440
gatatcatat tatatatgat atcatatata taccacatac atcatatata catcatatat 1500
acatcatata tatcatacat atatatgaac tttccagaat aggtatatca ataaagacag 1560
gaagtataca agtggttgcc acagcctgag aggagcaggg aatggtgagt gactgctaata 1620
ggatatggca ctttttttg gggtgatga aaatgttctg gtcagacaat ggcaattaca 1680
aaactgtata cacacgaaaa accaaagaat cacacacttt aaaagggagg atttagctcg 1740
gcatggtggc atgcgcctgt actcccagtt actcgggagg ctgaagcagg actgcttaga 1800
gccaggact tcaaggctgc agcgagctat gatcgctcca ctgcactcca acaaggatga 1860
cagtgcgaga cccgttttct aaataataat aataataata ataataaata acccaaggta 1920
cccagttcac atgcaaaacc actggtaaac ataaattatc tccaagtaat ctagaagaa 1980
aatgagcaca taagacgtct tctaaaaaca cacatatatt tctttacatg ttacatttaa 2040
cgtaaaaatc agctatgcag aagttacatg aacattttat gttggaaagg taaatgacta 2100
ttattaatac agaatggtta agtacattta tgtttttatg tacaaaacgca taaaaggaaa 2160
agcatcctta aaataaacac catcaatggc tcctcgggtg tcacaaaaca aaatcctcac 2220
acctttgtct tccttcacaa ttgagcttta tccacctttt caggcttata tcccattatt 2280
acctgacaca aacttgggtg ggccagagtt tccactgacc atccccgac tattcatcca 2340
acactatgtt cactgcctcc cattcctgac catttgctt ttgtcttcaa ctaattctgg 2400
ggacgttttg tccaaataaa tgatccatat tcttgaaggc tggaatcaag tcctattaca 2460
aatatatttt ctccacctct ccagagcata gcaaccagc atctactggc ctctcacagc 2520
tctaaccatc cacaacccta agctggcttc tcatcaaacy ggtacttttc accacccaaa 2580
ttcaattaat tcaactctac aataatgaag aatagtcgcc tacagcctac cttttccagc 2640
cttgattcaa tcatttatca attttatctt caaagtccct cacttcaggg agatgatata 2700
tcagctttca cccagagtcc taaagaaaac agcactcttg ccaatgacat agtgccacct 2760
agtggaaca taaggtaaat cacagtggca gtagaaggat ctccacacta cttttacagc 2820
aatgcactgc aggtaaaaaa taagaagcta cagtactggt tggcaggaca atttgtttca 2880
tacgtgcata ctatcgccct gactaaatta actcgcaagt cttacaggta ttatttgttt 2940
tcagttccat gcacagatta gccatttagt acttactaaa tcaaactcaa tttctgaagt 3000
gtcttacacc aatatattca tgcacatatg gttaaaattt tccttgagga tctatcatgt 3060

ES 2 701 091 T3

gagagtgtgg cttattataa caagtaaaca gaacaaataa atacaaaatg aaaagaaatc 3120
gtatgattta ctgcgatata agggagcttg ttgtggatta agtttcatga cccaggacac 3180
tgaacagaa atggaataaa tgagaataaa attaaaagtt gtcatacaaaa atatagaagc 3240
catctaaaga cctaggtgtc aagcatagct ctatgagtac aatcccgtgc ctgagattac 3300
catatgccc a gctgtatgct atacactaag agatttagga aggaagcggg gtcagggatt 3360
gaccccagac tccatctttt caagtgggga agaaagatct tccgattgaa aaataaaggc 3420
aaaaaaggct tcaccgtcac agaagtttca acaaccaaca ggatatttaa aacagttatc 3480
aaagcaaac cattgtatgt tcacttacat tttacatag tccctcaaac tcacaaaatg 3540
ctgtttactc agggacttct tccggcttta ctaggagacc tggaaagtga cgggaggatt 3600
gcaagggacc actagaaccc tcttctcaa tccccctct ctgagaaggg aggctacagc 3660
ttgcctctct aaccactaaa aggcattgacc ctctcaaaag ttaatagccg gattccctga 3720
tagatatttt cactaaatga attctcataa aactctcact aagatttaga gaaggcttcc 3780
agggttgaat tcctgaacat taagaacagc atgtttttta aaagttaac ttggtgattg 3840
gaccaggact tcacttaggc tatgaatgct cagaatggta ggtcctttac caaacagett 3900
gagtttgtgt ataaagtgat ctcatcctct taagagtcag agaaacagaa ccaagcgact 3960
tcactataat ttgatctgag gaagtttctt actcacaata ggtaaatgaa ggcacatact 4020
aaccagcaat ataaacaaca atatcaagtg tcattcacac atgcaaaaaa cagacaaaat 4080
cccaaactct gtgttctaac aaatcgcaa aacctcacta acaataaatt gaaatgacca 4140
aatgtttgg a ctgaaaagca atgccttggg agcctagcca tgcctaactc aaataacaga 4200
accatctcga tgttaaaatc ctacagatc aagctgtgta tgtctcgggt caagacttcg 4260
ccaaaagca gtgagcacac acttaagagg gaaaaaatct acctcagcct cctaaatgca 4320
atcatctcta cacgagttgc agggcccaag ctccaacgtg ttctgctgga caacgcagta 4380
gaaagctgac aagcaggtgg ccttcccaca ctgactgaac cacctccatg cccatgtcca 4440
ttcattttct tggccacccc atgtgctata acagacctcc tggctcaggg cactctttcc 4500
ttcctgactg ccttcaacta atgactttgt acttttaggt gcaaaaatta tctgcagaaa 4560
tccacactga aaaccaagct tgagaaaggc agcaataacc aacattttta caagaagaac 4620
aaggtaata tcaagcccat cagattcaaa tagcaagcat ggatgaaaat gaaagattga 4680
aaggcttgag tgccttctta atgtattaaa tatccattta atttacaatt aagctcactg 4740
tgctcactgg ccttttaate agctttccag gtccctgctca gacttgccta ggacatggga 4800
atgaaagaac ctatacattt atggaccaat ctaccttaac taacttgtca agtgttcctg 4860
catcaagcag aagaaacatc agtgaaactg atacaggaat taacccttg ttaatccata 4920
aaacttaag gagcgggatc caatcttctg gcttccctgg gccacgctgg aagaagaatt 4980

ES 2 701 091 T3

gtcttgcgcc acacataaaa tacacgaaca ctaataatag ctgctaagct ttaaaaaaat 5040
 tgcaaaaaag gaaaatctca taatTTTTTg tttgttTgta ggtggagcct cactctgtca 5100
 cccagggcgg agtgcagtgg caccatcttg gctcactgca acctctgcct cctgggttca 5160
 agccattctc ctgcctcagc ctccccagta gctgggatga taggcgtgtg ccaccatgcc 5220
 cagctaattt tcgtatTTTT agtagagacg gggtttcacc atgttggcca ggctggctc 5280
 aaactcctga cctcaggtga tccaccacc tcggcctccc aaagtgtgg gattacaggt 5340
 gtgagccacc gtgcccggcc aatgttttaa gaacgtttac gaatttTgat tgggccacat 5400
 tcaaagcctt cacaggctgc atgcagcctg caggccggg ttggacaagc ttggattaga 5460
 gaaatctaca gagacaaact agtgacttag tagccctctg atagctcatg atttgcaaga 5520
 aacttaggat gactatgtgt aaagaccaca aacatcaatt taactgaatg gttcccgcc 5580
 cactggaatg aggaagctga gcaaactcag aggactctaa gaaagggctg atgtcatctg 5640
 aactgttcgg aattataaac tcctctaaac atgtttcaaa gccagaactt gtaggagttg 5700
 ttctgatata cggattaaaa gagggatgac aaagtgtctg tccccacac tggTcaaagg 5760
 gacaggtcat tgttatgctg gcaatgcagg ctgctgaaaa gaatgtatct gtcaaaagta 5820
 atcaaagtaa tgaccccaga aggctccaga aacagactgg taaattcagg ttgctttcag 5880
 acttccacaa tgctggcaca caaggggaaa gacaaaacta acatttacag agcattatat 5940
 ttgatattac atttaatccc cattaaaaaag atactatTtc cogtttTcact agtgaaaaag 6000
 ttgatctTtc aaaggttaaa ttatttaaca ccaaggtcaa agggtaagtt ggagagacca 6060
 gattcaaac cagtctgaca ttaaacaatg tgttttcccc ccacatcgtc tcctgctaatt 6120
 aaactcaaat ctaaaaaactg acttgcccta caccttgagc cccatcctac aaactctccc 6180
 tgacgttatt aattcagctg tcactgtgca cctacaacgt gccagacacc atactcctca 6240
 aactctgta ggcacagaag gaacagataa aaatccctac ctTcatagat attattctag 6300
 gggtaacaca ggtaaaataa acattaaaat agttttcaca tagtagcaaa ttccatatag 6360
 caaaataaaa cagaagaagg aatagcaaat gagggagatg cctctttaa catgggtgctg 6420
 agggaaggcc tccctgagaa agatatcatt tccccaaaa ataaaaaagc aagtaataga 6480
 aaaaacaggt aaaaggtgtt ctagacactt aaacctgcca cattgagaac tcagggttct 6540
 gatgcaaac ctgcctgcat agaatgcatt aacttatttt tatacattta aacaaacaaa 6600
 ctctacttaa gaactgtgtt ctaaaggaag gagcatatta caggaaggca atttttggTc 6660
 agagtagaca cacttaaaaa ctaaacctat tgaaagacca agaacaactg aaagtctttg 6720
 ctttTgcaga tttttgacca aaaggaaaat taaagaaaca cacogtgccc atccaatgat 6780
 ttcaccaagg aattttaaga gagaaaatcc tacttcttcc tcaccocagta gccagtgaaa 6840

ES 2 701 091 T3

tgactgagca aattcacaag ttcactgggg ctgctttcat gtaacacagg gacaacacat 6900
 gacagacaca gtggaacct acaggttgcc tagtatttga aagactgtga agaggaggag 6960
 atgtcaaaat tcaaagtctt aaatgatgta gttttaagta tgttcagcaa tttcaccact 7020
 cagtagtaaa gccagctaca gttgaaagca atcagaaatt tgaggggtgt gaaataagca 7080
 gaagcacaga agttaaggat ttgtattctt cccacatttt ccactttatt ttatactgct 7140
 gagaaaaaac aaatttaata gttttctgct gtataagaga gacacattca ctttatgtca 7200
 cagtaagagt cactcaattt taatacaact atctcaatgt ataaattaac attctcccc 7260
 ctgcccacac atagtaagtc tcttatgatg ttgctgatta gagaagcaaa agttgccgct 7320
 acaattctct tcttgcattt taatataaac aatcatcagt cttttcttca tagagtgcag 7380
 tgtgggcact atcatcagaa tgtaccagca ctgggtgtgc aaagtttaca aagattagca 7440
 agagcaaaaag tgttgagatt tttgaaattc atgctgctgc aaagaagtat gtaaaaactc 7500
 actcaccata gaggaccaca cagaaactca ggcatgaagt tatatggctg tgtgagtgg 7560
 ttgggagaag gaacggaaag cacttccacc aacctatatg cctgagcaaa ttaatgcaaa 7620
 acctcagaag ctacaaaaa gtttatctac ctaaattaa attggtgtcc acagcagtag 7680
 ccagcaaaat gcctgcgaag cgcaaagtgg taaatatattt agggctctgta ggtcatatgg 7740
 tctctgttaa acaatatgta aatgaatggg tgtggctgtg ttccaataaa acttcattta 7800
 taaaaagagg cagcatggta catccagtca gcaagctata atgtaccaac ccccggctta 7860
 aactaacca aatacctctt aataagccaa agaaactgtg tctcttagg ccggaagcgg 7920
 tggctcacac ctataatccc agcattttgg gaggcagagg cggggagatc acctgaggtc 7980
 aggagtttga gaccatcctg gccaacatgg tgaaaccta tttctactaa aaatacaaaa 8040
 attagccagg cgtgctggcg ggcgcctgta atgccaaacta ctggggaggc tgaagcacga 8100
 gaatcgcttg aaccagagg gacagaggtg cagcgagcct agatcacgcc attgcactcc 8160
 agcctgggca acaagagaga aactccgtct caaaaaaaaa aaaggaata aaagtataca 8220
 aagtgaaaac aaagaaatta aactgcctt atttgccagt gacattactg tctatgcaca 8280
 aaattccaaa aatctacaaa aaagcttcta gtactaaaaa tgagtttagc aaggtttag 8340
 aatccaaggt cagcatataa cataaaatca ccttctata tactagcaat caccaactgg 8400
 aaattgagaa gtatcattca caacagtacc acaaacatga aataaatgtg 8450

<210> 2
 <211> 8420
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*

5

<400> 2

tcttagtatg gtaaaccttt tgaagtagat tcaaatgaga atgggaagag agaaaagga 60

ES 2 701 091 T3

gagaagcaac ataagaaatc tcttttaagg aattttatat agagagaaac agaggaatca 120
gttgatagtt ggaaattatt ttaaagaaaa tgggttattt taaagaaaa aggtattaca 180
acatgtttgc actattgtgg gaataatcaa gttgagacag aaaattattt ttaaggaag 240
agtctaattg ctgaagtgaa agagaatgaa tgagaccctg tgcataagtg tgatcagata 300
ggagcatgta cagctcaagt aagaacagga agaaagagac aataaacatg tacagatagg 360
atgggctggg cgatgtgggt gtgaaaagac atgcgagtta ttactgatta cttctatttc 420
cccagtgaaa taggaagcca ggttcataaa ccaaaatgaa gaggagcgag gcagtattgg 480
aagttcagga aaagtaatag gtgtaaaaat atgtaaagta gaattaccag ggagtatgaa 540
gatacatttc caattaagga tgaagaattt aaagtgaggc cagccaatac cctgctttg 600
cttcagctac atcagctgca taggttcagg cacagaatac atggaacatt gtatttaaat 660
agggcctgga ttttcaaaaa gtaacacaat gaagaagaga gatgcaaggc tatttgaggg 720
tgtttggtgg agagattgta aatatttagc taagtaagaa ggggactgca aattttagtg 780
gtataaagga atgaggaaaa gtgtaaacac agtgggggtca aagaatgttt ggagccaagg 840
cactagaggc aattagctga aatgtaggt gattattggg gagtgacatg gtttaaatga 900
aaagtataga aggggtacaat tatccatcat gaaaagttct aggggtacaac taagatctga 960
gtagctgaag tagaatgaaa gtagaatgga cctttccata tccagccagg ttcagtgaca 1020
gaaggttagg aaacaaatta taaaccactt gagagaacat atcccctaag ttgtttttgc 1080
tatttttctt tcagcatata tttgttgaa tgccaactat gttcagttca attaatatgg 1140
gcttcttaaa taagggctcc agcactggat aatcctgcca tttattttga tacattccat 1200
cctgctgctc agatctattg gcatctacag gatgtctttt gagaagatgg gcattcacat 1260
ccctatgtcc tagcaaatth ccaactcaga aaaccacatt aggcttctct atatatcttc 1320
caactatttc aatggaaaat acaattctct gatttcttcc tatgatattt atcaaagaga 1380
atggtgcctg ccagttctag ggtgggggaa ctcaatacaa atcaccaacc tttagatgac 1440
accctgtctt caaagtgctt tcaaagtctg gcagaaaaaa agtaccaggt ggctataaga 1500
ccaccagga gttcagtcac gcattctaag tagcagatca ctggaatgta attggctagt 1560
gagttcattt tactcttctc ttcttggta catggtaccg cccttgacc ctgcaagttc 1620
tctttcccag acttacaag catgttctct tgaattcgtt ctctttttaa attcacacag 1680
tcttaatgat tcttctttca caagagtctt tcaactctac aattcagttc aagtcatcca 1740
catgcttatt atgagcaagg gtctgggact taggggaaaa ggggaataaaa agatgaatga 1800
aatgtgatcc ctgcagttca agagcttgct gtgaaaagg aagtttgct tacattgcct 1860
ccctaatacc ttggctaggc cagaacagaa tattgtctaa aacctctca cgtcagcagt 1920
cctctggggg ggtgactgga agtagaattt aaacaaaaat ataattgaca cataataatt 1980

ES 2 701 091 T3

gtgcatactt ataggggtaca atctgatggt tcgatatgtg tttaaattggg tgcattgtgt 2040
 aatgatcaaaa ttgaggtaat ttatccacca ccttgaagag agatttttca atatttctcat 2100
 tgcgaagaag caggaatttt tagcagacaaa ctgagatgct tcttggtcac actaagtcat 2160
 tctgacgatg gatttacata acttggtggt ttttttgtgt gtgtgttttt gagacagagt 2220
 cttactttgt cgactaggct gaagtgcagt ggcacaatct cggctcactg caacctccac 2280
 ctcccgggtt caaacgattc tcctgcctca gcctcctgag tagctgggat tacaggtgca 2340
 tgcaactagg cctggctaata ttttatattt ttaatacaga tgggatttca ccatgttggc 2400
 cctgctgggtg tcaaattcgt ggcctcaagt gatctaccag ctgcggcctc ccaaagtgca 2460
 gggattacag gtgtgagaca ccaagcctgg tacatttaca tttcttatct ggatctttcc 2520
 tttagtaagt gctaaggaat cctacttccc ccaatatttt ttcctatttc aatgttttag 2580
 catgtatcat gttactactt tgcagacatt tgattttccc ctttgtttac tgtaaagtat 2640
 atttttatag cctttgtaat agaagtattc taaaatctgc ctgcaaccta tctttctgac 2700
 tctgcatttt aggaataat tctctgttgt ggaatgaaaa aaaaaacaga gcctgtggag 2760
 tcagagatct catttcaaat tatagttatc cctaggaata aatctgagtg acaggtagta 2820
 tagtataata ataagtataa agctatgggt aaggaaaact caacaacctt atctgtaaat 2880
 tgggatgaca acagcctacg tcaaaaaaat gtgaaggtaa atgagataat gtaaggctga 2940
 tacttagtaa gcaattttaa aacacccaaa aaactattgc catgattact ctacttactc 3000
 tattttctca tgctccagge aaatgaacta ctaatgaccc aggggtcctt cccattctc 3060
 ttcttcacaa ggaaatattc tctctctgtg tgctgtttat taaaatctac tgcccctttt 3120
 agaagccttt ccagatcatc ccatggccaa gaacgatcgc tgcttcctct tctttacata 3180
 cagatgtttt tctcctgctt gacaattatt tttgtgcaat tattttcctt ttgattgtgt 3240
 ttttaatgtc cccccacccc caaattttc cagactgttt gctccacgag agaggagacc 3300
 atcatctctg tgctcacctg tgtatgacca gtatcctgag gagtggctgt tacataatta 3360
 catcaggcac tcaataaaaa tttgatgaat aaacactgga ttttaaggca ggtatcatat 3420
 cttacatagc atatcatatc ttacatttta tgtccctcac ataaatacca cagagtgaag 3480
 tatatgacag ataaggctcat ttctcttgat aagtacatag tccagtctga aacagatatg 3540
 ccaaaaaaaaa acaaaactgg agtaaacaaag atgaattggt ttaatagagg cactgtatta 3600
 gtttcctagg actgccagaa caaatcaoct caaacttagt ggctgaaaac aacaaaaatt 3660
 tattgtctca cagttataga tgttagaagt ataaaattaa ggtgtcagtg ggattggttc 3720
 cttctggggg ctgtggaaga gaatctgtcc caagccttca cactgtaaag tacagtactg 3780
 gagggatagg acttcaactt gctctatctc agatagagag gagccatttg ttgtgaattg 3840

ES 2 701 091 T3

agaagagggg tatgttgaat ccataataag cacataaaaa cttggctggt tcataggaga 3900
 agtaacatgt ttccagctct agtaaaaaac aaattgaagt ggcctataaa aaggtacaga 3960
 gtacgacaga atgaaaaata aatgaacaag aatacagaga ggatgtggtta aattatcatg 4020
 tttcccta atgttattgg aactaaatg gtattagaat ttttatcaa taataattct 4080
 aaactgttgc aattgaaaga atatattaag tgggtgttata tgagaagtgc cagggcattc 4140
 tcatttctgt ccaatgggag aaacattttc gtttgagacc tccgtgaata atacagtctt 4200
 ttagttagga gagctgcatt ttgagtggg caggcagaat ggcgatctct caccacaca 4260
 aacactaaga tagagagaga cagagacaga gacagagaca gcagagagag acagagaaag 4320
 gaagtacagg tactcagata gagataagcc atttcttgac attaagaaat aaagtagaat 4380
 ccattggagg gaaataaaac tgcctcagga acagagttaa ttcacatata catgcaggta 4440
 aacacacact gcttgatact tactgtggac tttgaaaatt atgaatgtgt gtgtgtgtgt 4500
 gtgtgtacat tcagccctcc atatccatgg attttgcatt cacagattca accaaccatg 4560
 aattaaaaa atttggaat aacaaacatt aaaatataac aatacaacaa taaaaataat 4620
 acaataaaaa aatatagtgt aacaactggt tacatagcat gtatgttga ttaagtagta 4680
 taaatctaga gattacttaa tgtataccag aggatgcata ggctatatgc aaatactatg 4740
 ccactttaa ctgataagaa cagatactaa acttcatctt agccaaaagt cagagaaaca 4800
 atataactat gccattttac ataagggact tgagctgagc atcctcagat ttcagtatct 4860
 ttggagttcc tggaaacaat tccttgtttt atatatatat atgtgtgtgt atatatatat 4920
 atatatatac acacatatat atatatatat atatatgata gctactgagt gacaggtgat 4980
 attataccat accacttgtc actcagtagc tgtatatgca tatgtatata tatacatata 5040
 catatatgtg tgtatgtgta tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtatg ctgtctttcc 5100
 tcggtatcac aggggaattgg agatatatat attcttttca gtacaaaaaa aattgaacac 5160
 agatgggtat ggtaccagaa cagaaggtaa agacacatga aaaaaattg caacaacatg 5220
 aatggaactg gagatcatta ttgaggaga aataatccag gcacagaaa acaagcattt 5280
 tattatttta ggtgaaagac aaacatttta ttttaggtga aataatccag gcacagaaag 5340
 acaaacattg catgtttctca tttatttgtg ggatgtaaaa atcaaaacaa tagaacgtat 5400
 ggaggtagac agcagaagga tagttaccaa aggctgcaaa gggtagtga ggctttgagg 5460
 gtgaggtggg gatggttatt ggtacaaaa aatagttaga aagaataaat aatatctagt 5520
 atttaatagc acaacaggtt gactatagtc aaaataacat aattgtacaa tttaaatatg 5580
 aaattaata tatatacaag actagaacac caagttgaat gactccagct tgcgaaaccc 5640
 acattgatca ccatgcttgc cccaaggga gctgtacaat gtctggctcg tccagaaccc 5700
 catcatttat cactagcaat ctattgtcca taatcatggt taaattaata gcattttaa 5760

ES 2 701 091 T3

ggtacaaata ttttttaaaa aacaaataat tatttaattc gcctttttaa agcttttttaa 5820
 aaacgttttt aaaaactttt ttaaagtcoct gaggactatt ttcttttaag tgctcagtta 5880
 cagagctcca tatattgggc tatgatagcc ttacctgatt cttgccaaga atctagtgcc 5940
 cagaaaatgc aaatacaaag taagcaactg aaaaataaac aaataagttg gaggtatgct 6000
 acctgttgaa atatgacctc gcgcaaacac ctatgccact tgcttatgaa atcatatagg 6060
 ttttcggtgt gcagttttga ctgaatgagg gagtttacgc tggaccacaa gggggcccct 6120
 ctgtcaataa cgtactccat ttgtgtatta agtcaaaaat gaaatggaag agaaaagaaa 6180
 catcgatgac cccaagtctc ttttaattgaa tggaggtaaa agggaaacaa cgaatgagaa 6240
 aagtactctg cctttttaag aatcttgcct tcacattcoct gatgaagtta tttttcctcc 6300
 tctcaactgat tcccatttca ctctattaca tagcacctgt tccccagga gctcctgaat 6360
 gaaggacatc actcagctgt gttaagtatc tggacaataa aatatactag tttcaatgtc 6420
 taggctatgg gtattccttt ttactgaagg tatgacatat agctgcccag gcctgactaa 6480
 attaatagta ataataatta ataatggcaa atttttattc tattaagtta cttggcttga 6540
 cttgtagaaa tagcaacatt catctgaaat gccccctcoct acacttatgt ctaaggacaa 6600
 atcccacata caccacagat aacttcattt tacatgtttt attctgttac caaactaaat 6660
 ttttatcata tagtctgttg ctcaactgaac tottcagtaa ttctcaacat accatgtaaa 6720
 gcattaagca cagttccaac acagagcaaa tgagcaataa ctgttagtta ttataacatt 6780
 attatgtggt ttcagtgcct taaaccactg gtctgatacc tagcccaaca ttctattaaa 6840
 ccacataatc cagttgaata atatatgata atataataaa atggcgataa gtgctaaata 6900
 tccagataga aacacagatg gaatcagaca gctttcccaa gaaatagaga aaatagtaga 6960
 taggcgatct aggcctaagc actctaagca gaagctaagt tatcacagga tatcttggca 7020
 atctgtggca cgtgaaccct tttcttctgg agtctggaac tatgttgcaa ctctcacttt 7080
 ctccctatct agagactcag tttgttcoct tgtgattatc agcagttgag aaatccttag 7140
 acctctgaa aggactactt tttaaattta tatatataat atttaaaata catatcttta 7200
 tatataatat atatttaaat atataatatt taaattaata tatattttaa tatataatat 7260
 ttaaaattaat atatatttaa ataaataaat ttatatttaa atatataata attaaaatat 7320
 atttttaatg aacagagagt aaaggattat tttgaagaga aactoctggt tcccacttaa 7380
 aatcctttct tgtttccaag tttttcaaat ggagccctct ttaccagctt gccccctcag 7440
 agataagctg tccccctact tattcagatc tgagatctga aaacattcoct tttcctgtga 7500
 gttcagctag gacaaagatg gagctttttg ataaaatttg gcaaacacat tttttaaaga 7560
 tgaaaatttt taaaaattga aaaaaaaca tttatagaaa gagacttcta atccaaattt 7620

ES 2 701 091 T3

aacttctcaa actatgtttt gacoggctag cataatgttt cagtctttct ggagaatgcc 7680
 ccttgaaact gttttcttct acacaacttc ctcttttctt tgactttcc tgctctggaa 7740
 gggaagaaca ggaagaggac agatcaaatt actcaagagg aaggacaaga aataaggaac 7800
 caaattatca acaattggag aaagaaagct gatgtcagta tcatttcata tatgattatg 7860
 tcagagtcag gtggataagc caatcctggt gaatagcata cttttcctgc tactcctgaa 7920
 gggtaaagag gtctttctct taaaaagccg tctagctag taatcttaca ggtgcaaaaa 7980
 gcttgtttct atgttatttc ttagtaactc aaaatactc taaagttata catattatga 8040
 aagtactaca gtcacagtgc tgagaaaagg agtaaataag acaatgtata taaaaaact 8100
 tggctcagcc cctggctctg tggttgataa atattaagtt agtattcatt attattataa 8160
 tttccaaaga gtccattaaa agatatagaa gaagggaggc agcaataaca ctaagagaaa 8220
 attccattat ctccaactat ttatcctcta gcccaaaata attgccatta gaaagagcaa 8280
 ctttaacaaa aattttaagt tgcaatagat gttcaacttt aatccatcc cagaaaaatt 8340
 tctaacaaaa ggagcataga agatttgatc ttattttcta agtagtatag acttaattgt 8400
 gagaacaaaa taaaaacttg 8420

<210> 3
 <211> 8475
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*

5

<400> 3

gcataacttg taagaaatgg agtgaggtct cagttcaaac tggcttctgt atgacttcaa 60
 agccaaagtc agcaacttag aaggcaaaaa ttataattta gttggcaaat acgagaaaag 120
 gtcagaaaaca catgaaatga agctcaatag gaacacttac agggtagcag ggtagtagcc 180
 tagggaaaaa agtcagacac taaaattggt taaataggta agttcaaggg acaggtaaag 240
 accttagtgg gtaagaagcc aatcagcaga cgaactgcaa gcaagcactg tctctcttct 300
 ccttctgtct cctctttag taactgacca caattaaggc tgcctagggg aataatgaag 360
 taatcctcct attatcagca atggtctgat ccagtgccag gcaccacaga caacttgggtg 420
 ttcagagaag atccttcaag atgaacaaag ggtcaaaata aaaaattcta gaagagagaa 480
 gactgatcac aatttaaatgt aaggcttga aggaactgat ctctaccttc cttaacatct 540
 caagaacttc ctcaagattca ttggatgttg agtgtgtgtg agtctagtag aaaaatgaat 600
 tttgtttct taacttggat atgtgattag gatgttaata attaagtctg ggctaattatt 660
 gaaggtatct tatgatgggc ttcttaaagc attgatcaca aagactgcat gttcataaac 720
 tgagctgcac ttgttaggat tctagatgtt tgaaatttct tgtgttattt tggctcaga 780
 tttctagaca aattttctca aattcctatt tcaacttttg acatatcatg agtgactcaa 840

ES 2 701 091 T3

atgtttgcc ttgagtcgga aacacccag cattaggaat aggcacataa acataatact 900
 tcaagcttca gatttaagct caattataaa gtgtttaaag gctgtgctga tagttcttct 960
 gagtagaatt cctacaacta tgggtttgtc tataataaaa tgttcactct atattgaacg 1020
 ccttatttaa aactcgaaat gtgtaagtag taataaagaa aatatgtcct cctgtaacca 1080
 aagctaggac cgattacatg ttcacttgac tgacagatac aatcacctat attaggagca 1140
 atcagcactt ccttacaaac taacaacttg agatgtagtg ttcccattgg ctatgaagat 1200
 tttctttatt tactcagaat agtctgtagg atctgccagc tgcccctgat tataaccagct 1260
 gcacccaatg atcacagtga acattatfff acattctaaa taactggtgc aaggtgagcc 1320
 atggttttct gagtttccta tcacctttgt gtttcaggtc ctcaaagtgt aatttgtaaa 1380
 gctgctgttt caggcaaaac taacaaaatt agcatctaat caataacat actatgtcca 1440
 cccatatcct ataacacaga agtaggggaa gagtgagaaa ggtggaagtg gagaaataga 1500
 ggcccaaaaa gaaagtttta tcacaggaat atctagatgt cttctgggat tgtctgttaa 1560
 agagctgtga cactcatata aatgcagaat tactctcttt cttccttgtt ggttagaagg 1620
 ccaagggtgc catggtaata ctaccaaaaca tatatcaaag cttggcagga aaaatggtac 1680
 cttcagaaat tttataatct gatatcaaat aggtcaagaa atataataaa actagtttct 1740
 ttggtttcct tagaaacctg gaaaacttta aattagaaac ttagaaagct ttaaatacaga 1800
 ctttgtagtt aaaaaaggaa attttagttc cttccagcat tagaattccg tgattctctg 1860
 actctgagcc tggattaat ctagcccagc tgagtggaaa cttaagtaac tagctggttg 1920
 ctttagtga tcttccactt tatggctgct tccgcctaag aagttcatca tctgtactta 1980
 ctttctttgg ggcaaagtcg tgactaactt tctttggggc aaagttgaa agcagaggtc 2040
 aaagtcaatc agaaatggga caaactcact tctactgcc tggggaaggg gccattttca 2100
 gtagccctt ttcaagatta gtttcattca agatttgata agctgtttg actttactat 2160
 agatcttatt atccatgtca gttaagtta tgcttccact aatctatct gaattcaaaa 2220
 ggtaaaaagc taatgctcag tcttatcaga tttatcttat ttattaatag aatgtggatt 2280
 tttttaagca tataacaata atagtaatga taggaccata aatgtggatg gctctttaca 2340
 agtcactaac attacataaa ttcctcaaca acacactctg aggcataac aaacttttag 2400
 aaataacaca attggctacg gaactccagc catctagctt catgggctcc cactttaatt 2460
 tcaaaacaac agaactgtgc acattcattt acatgattag ggcagagctt aactgtatct 2520
 catgtagcac ctacatcatt cttcagacaa acttattgcc ttttacagac aagaaaactg 2580
 gggctcaaaa aaggacttgc ttataactgg ctaataaaga ggaactctgg gttcaaagtg 2640
 agtccaatc tttcttccac ccacagctt tgctaaagtc attacagaaa tgcataagagc 2700
 agttcttcca cgttattgct taggtttcta aagagcagtg acctaataca acatgctcta 2760

ES 2 701 091 T3

taatttatta ctgatttaac tatttcaacta aggattcaact ttttaactttt aacttgtaaa 2820
 tatgtctaataaacaccact gaaatagcaa cctctttctt catggccttg tggttgtaaa 2880
 gcaagctagt aatatatgtc tgtggatttg tgctaataaaa gttctataca cctcattaat 2940
 tccacaaaatc ctactgggta tttcttatct gccagatcct acgctaggta ctggatacac 3000
 agtactgaac aaaatgggta caaatgagcc tcacagagct tgtttcattg aaaagcagag 3060
 agatacacac taatcaacaa attaatagta acacactacg atgtgttttg aaggaaaatt 3120
 agagcatcaa agagacggtg ttagcaggtg gaggggagct cttttagatg gagaatgaga 3180
 atgcctccct aaagacatgg gaataaattg agatcacaaa aatgagaaa tagccagcct 3240
 tgagaagagc agaaggaaga acattcaaag gaaaagaaaag tgcatactgg aaagcctgaa 3300
 cactagagtt tgggtgatgt aaggagctga gcaatggtoa cttgtgtgat aagatgtgtg 3360
 gatgtggggt ggggggcagg ggtgagtccc acgcagctct taagtgtgtc ctcagactcc 3420
 tgtggtttcc atcagccaca acctgaataa ctgtgtggta atccaaaaat gattacagat 3480
 taaacatata aaaatatcat tacacccata gtacctaagc caaggacaca gtattctatc 3540
 ttttcaatga agatctgcat gaagtaaaaat tattatataat aatttttaggt attgatatag 3600
 atacatcagt ggatagatat agatatgtgt ctctgggata gaaaaaagtt ttaaagggat 3660
 attaaaagtt cttatcttgc agggttgaag attgtggcaa ctttcatttc tttttaattt 3720
 taagaaaaaa gtggtattat gggggattag catgtttgtg ggtatatgta tatttttaat 3780
 taaaaaataa acaacaaaat gaaaacgttt ttcttctatg aaagcctaata aagaagaaat 3840
 ttcagctggt ttaacttagg gagctaaaaa catcaaatcc aagaatgttc tctggaactg 3900
 agctcaatac atttttatth gagtaagaat tggatacatt tccatccct tggggctcca 3960
 gtctgtcaat attttacttt tcagcgataa aaagacacat gtagataatc acagtgacct 4020
 cagtaacttt ccttctctta ttttaagttta ttttatttct atcgtagttt tccctgtaa 4080
 agatthtttc tttttgctta catatataat tttagagaat aacaatgcac acacaaaaaa 4140
 ttcctcttgt tctgctagac ctggactttt totctaataat atatctocat tttttgtctt 4200
 ttttcagacg tattttggaa gcaaaggaga gaattgctat atagctgaot tctcttctc 4260
 atcaacagtg ttttaacagt ttttaagcaa aagtcagctt tgtttatcta agatthtttt 4320
 tgetgycatt taacctacc ctgcctcccc tttcccaagt ccacttcagc caacctctca 4380
 ttcgacaggt accaccctct aacataactg aaataatgtc taccattact ggatcttgct 4440
 agcaaagaat ctcaaatttt cccacttgggt tgtaaattat tttgtaatct ctagtgttta 4500
 aggtgcgctt gtccatctca atcccctccc tggcaggaca ccttacagaa cctaccctt 4560
 aactagtca ttaagcacca tcagggacgg atggctgtgt cactggtctg tttggtattc 4620

ES 2 701 091 T3

cctactgata ctaccatgtg gtgattatct atgacttccc taatccctgg ctgccttagc 4680
tgggactggc tgacatgctt ctgaggttgc cgctggcttt acagtccttt actgcccagc 4740
ccactttgga gataggcagg gctagtactt ttctatataa gccccaaac ttgactttgt 4800
gtttcacagt aggtgaaaaa gttgggtctc ttttctttta cttttctttc cacaagatga 4860
taaagctagg ggaagcctgt ggacatgggt tattttctgca actgcaatga ttgattgggtg 4920
cttcctgctg cttacttctt aaactttgtg ctgagtgtca gatccctagc agtttctatc 4980
cctgctctg ctaaaaaaga atggatgttg actctcaggc cctagttctt ttaattaaa 5040
ttgtattttt gttatcatta ttattattat tattttgaga tggggtctta ctctgtogcc 5100
caggctgaag tgcagtggtg caatcacagc tcaactgtttt agcctcctga gtagctggga 5160
ctacaagcgt catgccacca tgcttctttt taatttttta aatgggtttt ctgccttcaa 5220
ttctaagcac ttctcaattg taaccaagag ataatacttt ttatgaattc ttaaagttat 5280
caacagatac tcaaagtttt agcaaagtct aatgatatt aagcttgtcc ttattgccc 5340
agtgaactca atgactattt gtttaattgca accaagggtc attttttaaa tgaatatata 5400
ttattattat atatataata ttaaggtcct caaataccta aaagtttagc aaaatctaaa 5460
taatattgtg catattcttt tattactgta ttagtccgtt ttcattgttg tgataaagac 5520
ataccaaga ctgggcaatt taaaaagaa agaggttcac tggactcaca gttccacgtg 5580
gctggggagg cctcacatc acggcagctt acgggattgt tgagaaatga cacttctcaa 5640
gctggggcta aactatctct gtggtagttg ttctgattca agtattgaat tggttttttt 5700
tgtttttttt gagatggagt ttctgtcttg ttgccaggc tggagtgcaa tggcacgata 5760
tcagctcacc gcaacctctg cctcccgggt tcaagtgatt ctctgcttc agcctcccaa 5820
gtagctggga ctacagggcat gagccaccac acccagctaa ttttgtatth tttagtagaga 5880
catggtttct ccatgttggg caggctggtc tcaaactccc aacctcaggt gatccacctg 5940
ccttggcctc ctaaagtgtc gggattacag gcataagcca ccgtgcccgg ctggagcatt 6000
ggtatataaa agctgcctag gtaactctaa cctttggccc catacatctg aaggatacct 6060
acaatgcacc tgaaaaatgc aactgaaaca gtagttccct gggaccacac actcagaaag 6120
gggtgtatc aggagatcta gggaccagga ggggtggaaga cctaaggcag cactacagat 6180
gatggagaaa aaccactgg ggaggggcga tcctaacctt gagaatcact gagatcatgc 6240
agaagtatth gatcctacag cattaatatt gtattgtatt gtattagat atatatatag 6300
tgtatatata tagtattagt atatatattg tattgtatta gcatatatat actaattgta 6360
ttgtattgta tttatatata tagtattgta ttagtatata tatacagtat atatgtatat 6420
atactaatac aatgtactaa tacaatacaa taccatatat atatacacta acacaataca 6480
attagtatat atatatatat atatactaact acaatacaat actatatata tactaataca 6540

ES 2 701 091 T3

atatatacat atatactcac caagacatat tagtggctctg atgtctggct gccacactca 6600
 tttttacct tcagctctgc tctaccaa atcatttggt tctgggatct ttgcagtcca 6660
 aggaacttca tccttgatat cccaccocct actaactttt ttttttttt ttttttttga 6720
 gacggagtct cgctgtgtca cccaggctgg agtgcagtgg tgtgatctcg gctcactgca 6780
 agctccacct cctgggatca caccattctc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggacta 6840
 caggtgcccc ccaccacacc aggctaagt tttaccgtgt tagcaaggat ggtctcgatc 6900
 tctgacctc atgatccatc cgccctggcc tcctaaagtg ctgggattac aggcataagc 6960
 caccgcacc gccaccocct tactaatttt tagtaacgtc caaggattaa aggaaatttg 7020
 ccttacctat ttaacaggaa tcaacagggt taatctcact ccccttctaa aaataattta 7080
 taaacattgc agacaatctc atctatccct gtctaaactg tgtggaatta ctgccattta 7140
 atgtaatcag tctactcatt tagtttgcc t aaggaatttt tgaaaaaaca gttaaatgaa 7200
 tgacttaatg gaataaccag gaagttgaag tctccaatag taagaatgaa ctcttgctct 7260
 ctggataatc aaatgggtcc ttccctcctc aggtagatca tgccatttcc tcacttacac 7320
 tgaacaggta aacaacataa ttactgactt caacttctag ttaattcctt cttttatcac 7380
 tgagtatcct ttggctggga gttttgttg ctatgctgcc attttttcta gttatcacag 7440
 tcctataaca taccaatcct tcaatataac tcatctttaa attgtggttt taccttctca 7500
 agaagttatt aattatgcca gtgctaaatc ttctaaaatg attgttgact tgttgattag 7560
 ccccatgca attccctct cccgtccctc agcacgtaag gaatggccct ttgcttactt 7620
 ccacagatcc ttaaatctac cagttagaag ctaatagcct acctctctac caggaaggaa 7680
 ctgtgggctg gaacataata catgttgact tataatttct tagaaaattg tgtgagaaac 7740
 atcaaaactcc tgattccagg atatgccaaa gacacatcat taaaaagcaa aacaaaacaa 7800
 aacaaacctc atttgacgtt gctagtagtg gcatatttca tcaagatcag ctcaaataaa 7860
 tagaagtgag attttcacac aaattagact gtagtgcttt ttttttaac ttatctttac 7920
 catatgattt ttaacggtaa aaaaaatcgt ttgagatatt agatgtataa tatttatcat 7980
 ccaattactt cattagttca atcttttttc aatggcgctc ctgcatctga gaataaggtc 8040
 agaaaatttc atgttctgat ttcatgctga ttttcagaag aaaaatgtta gttttgtata 8100
 gaataaccca tcctaagaaa tacatttctt attatatttc ttatottata tttottagga 8160
 caatgagcta ttcaaagggt gatgataacc agcaccatca gtcagcatta tctaagaata 8220
 agaactctgy tttctacata cagacctcct aaaaaggaac ctacacttaa caggattccc 8280
 caggcaattt ggatgcacat taaagcttga gcaacactgc attagaaagt tagttttcca 8340
 tcacaaaaac agtaacaaaa ggaatataaa gtaagttact ttaataatat aagaagaggg 8400

ES 2 701 091 T3

gcaggccggg cgcagtggt cagcctgta atcccagcac tttgggaggc tgaggcgggt 8460

ggatcacctg aggtc 8475

<210> 4
 <211> 8401
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*
 <400> 4

5

tttcatctaa gactacattt ctattgtttt atataatcag cccccctaag atcaacatgt 60
 ccacattttt tggcaaagac aaagcctact gatttcagga tcattatttt cctttttcaa 120
 aagcacaaaac ccaaactgag aaataaatca agagaaattc tccttttttc tatgctaatt 180
 tagaagtaga gtctttattht cttttcaaac ccaaagagaa tcagacatac aatatgaatt 240
 tatctacttt cgcttgctca gactgagagg aaagattaat attttcaggc tgttagtcaa 300
 aactgttcat tcaaatatta ttttaataaaa tccaagaacc agctaaaaag tcgcttaagc 360
 taagaaacct tcaccagcct catgggaaat tgtgtacagt tttccactag aatagcctat 420
 aatgcttac tgaaaatgtc taagttcata tcttggtaac taacatttta attcaatctg 480
 cagaataata tatgottcct tagtgctaag atatgaatat tagaggcatt ctttcttaaa 540
 atttctattht agttatactt tcacaaataa ctatataata ttaaaattct gcatgtggca 600
 taaaacatat tttaatggag aaggtaatgt gtagggagtt tatttctggt tgctattaga 660
 acttgtgtht attcttggtt aaaaaactg cagattaca catagaaaa aacaaaagta 720
 tgttgatata ctcttacagt agaagataaa gagtagttct aaatttagaa aggaaaaata 780
 aatatacaca gtgaaaatat gtgtcagtga gatgttaatc aaagatcaac tattgctgag 840
 accagcaata ttaaattcct gcacaattac tcatattata atgagaattt taaaaagaaa 900
 atatgaacac ataacataat gaaggcagaa gtcactetca tccttcatct ttgtattccc 960
 aattcaggaa gctggtatag tatcttcatt ataattacta ttcaacaaac atttgtaaaa 1020
 tgaatgaata aggaatgaat gatgagaaaa atgataaaca tctccctctg tctcctggga 1080
 gttaactgca ctactttcct ttaaatttaa ttaatoctca atgtccttgt aaaaatagcca 1140
 aagggaaaat gtatttacat tactctaaat attgatgcaa tctacaaaaa gtgttaaaaa 1200
 acttctcaa agtaaaaa atgttcacaa tccagctagg ataaaaggat taaatcatt 1260
 tctaggttag agggotttca attagagccc ctgctgcatt aaccatggga actcatctca 1320
 ctctcttcat gatggagccc tgagtgttgc tgctaactctg tactctacca ttctaattgct 1380
 ttttaaggtt cttttcagcc cttcctctc gtaatccaca aatctgaga ccaaggcatt 1440
 ttttgggtca gtcctaattt caagcattct atcctgcct ccccaaatga actcacactt 1500
 attagacat atgttcctat attagttcag gaagggggaa aaaatgttaa tcacacttgt 1560

ES 2 701 091 T3

atataagaga tcatagaaaa acagtttact aacctgtgaa aataccattc attctctggt 1620
tacctctggt ccacagctaa gcaatcagca ggatataaat gtaccctatg ttcactattc 1680
agtattcata agtatactac ttatgaattg gaaatctgac acaacattta catgacctaa 1740
ttttgaaaaat ttaaaatagt gtaaggcccc taggcttaat tttacagggg aaagattaaa 1800
gggacacaag caaacatata ttctctctct gtgctgtggg aacttggtaa ttttttgact 1860
taaaatattt gatacttaaa atgccaaact tctacatttc tgcaagtaaca aggcagttat 1920
catattgaat accatttctt tctctccagt aagtagagtt aatattagca catgaactga 1980
aaatattaag tgattataaa aacgtccaaa taaattcatt aaaatttagc ttggcaaaat 2040
gttagtttca tgttcttggg agaagtcctt ttatatttat attcaaatga aatgaacaat 2100
ttacaagcaa aggaaatggc atcaaatatt tcacaccctg cctcccaagg tgtattgatt 2160
catgcttttt gctcagatct aggtttctcc actcaggaaa agaggagaat gtaoccatac 2220
ttgggaaaaac aagtttccga tggcacagct ttgatcaaac agcaaaattc tatccatcta 2280
tgtattgcca tctgacagta tgacaaatgg tcccatgtgc gatattcaca ctgcattgca 2340
gtcaaacctg taagtcaaag gatatgaaat aatagtaact atacattaag cacagaagaa 2400
aatgaaacaa acaaaaaggt tttaaaccaa ccaaaaatat gtcttatttt ggatgttcta 2460
tatgttctta cattctctca ggtcttttgt gtcattatga acacaattct aacaagcttg 2520
attattttat ttccattcac atattacagg caacaagctg aaaaagtaga acgggggtgta 2580
gagagacagg acaaagtaca gattagggct tgaagtgcc ctgaccagtc gacagcaacc 2640
acatggaata atgactcatg tgcattaatg atcacactaa atgatatttg tttttttacc 2700
tagtcoctca actgacagct taaagaactt caggttgttc tgattcttga gcctcctcta 2760
cagcttcaga gaggactttc attttatttt ggatcaaatg ctccacaact agttgaaact 2820
ggaattaaat tttatatgaa gttcctagat gatttaaagc tgtaagaaga agaataatga 2880
atcataagaa aacttgctgc tacagatata aaaaaggaat gttaccatcc ctcatgctaa 2940
tccttttcat tttaaataaa caggatctaa aaaaaataat gctgggaagt cctaaccaca 3000
tcaagaatgc ctgagatcag tgaccagggg aaccttccag aatggatgaa atagacccaa 3060
agctgaattc acctaatttt agggccaaaa acccaaaaaa caaaacaaga ccaaaaaaat 3120
cttcagatac tgggagaaca aatctcaatt gctcaattgt atcttatgaa aacaattttt 3180
caaaaataaaa caagagatat ttaagattca ttaagttctt gtcatttcaa attttaagaa 3240
aaatattttc taatggaatt acatatattt atatgattct tctagttata tccatggtaa 3300
taaatactct tttcagttgg aaataaaacc catttgtgct atattattag ggaaaatatac 3360
tacataaatt agtttttaat ttaactaaag tctatctttt gaattcataa gcataaaatt 3420
ttaaccactt gcaaaattta taacacactt aaggtagtca gatgccttgt caagtagttt 3480

ES 2 701 091 T3

aacaaaagtg attttcacct gtttgtttta ataacagtgc atcgatttta tgaaaatcag 3540
 gcatgccctc gggctcctaac aaagtatacg aagctgaatg gatctatgcc aatatgccca 3600
 gattttactt tctgagtctg attttatact tctgtcctct ttcttaccac atggcttcca 3660
 gtatcactta cagactaacc cttcaaaaagg agaaggctaa gttactaaca tttggaaggc 3720
 ttatgaaagt gaagcatagt tatgagccag caatgttttt atttagggaa tgtgtgcaaa 3780
 ccatacactt aagcaagctc tggggaatga gagttggggg gaatcaactc ttttatttgc 3840
 taattggtat ttcttttaa agatagagtt cttccagatt ttaactgtgt taatagttac 3900
 tctagaaaaa ttggagattt gtgtgcatat attttatggt gtaaacagac acatacccag 3960
 agacactgag agagacagac agacagtaaa cagaggagca ctaaccacaa acggtttaca 4020
 aatgacctct gtgctcattc acctgtctgt tccccacctt gccttttata gcaactatag 4080
 caacagccat gagagtcatg gtggaaagaa ataaaataaa attaaaaaat cctggaagct 4140
 tgtaagaat gtgagcaaaag gggaggaagt tgtgaaaaaa atgaataaag ggcaccgatc 4200
 cagagtattg aagaaggcag agtggagagc ctagtaatga gtatctggta cccagtatc 4260
 ctctcccaca gaatctgtac agctctccgt ttatgacagt ttaaacttaa tttaaattat 4320
 caaacagaca ctttcctcaa acatataaat gatgaggcag ttcattcagg ctgtatgtat 4380
 aaagttgttc cagccacctt tttctaattg cttctctata tcttttacct ggagacaatg 4440
 agagatttgc ttaggacaat ttgactgtaa tttagaagta ggaaatggga agtatttghta 4500
 tcttcttgc ctaactcaca ttagttactc aagtaagcat ttcttccgtt attgcatttt 4560
 cctgattaca agttttatgt tttctctaaa acacatatca aaagaaatgt cctaagcact 4620
 atgcaggggg aagccatgac atttatccac cactgtcagc aaaaacatga acttagccct 4680
 caacagaata tttcacttca ttctagtgtc acctctgcgt cacctgcact ggagtcacca 4740
 cttgcctgtt gggtaagacc aggatgcacc gctgaaataa aaaggggtca gacaatacaa 4800
 gaaaagccag tagaaattgc caaatgtatc agaatacaca caggttttct aaggatatgg 4860
 cccaagagga aggtcttaga gcccaccctg aaacaggatt tttgacttca cagataaatt 4920
 atttaatttt caataacaca attcaattaa agaaagggaa atacaaggct aaacaaataa 4980
 gaaatgaaga caaaaaccca acctttcaaa tctaaagaaa ataatctggt ttaaagacac 5040
 agatgaagat caggaaccca aaacagaaga aaggaaaggc aattaacgct ggcatctgat 5100
 aacaacgaaa agtatggagt ctggagaatc gctagactct aaaaattata aaggttttaga 5160
 cttggacttt gtacactgaa gaaaagaaaa ctgcatgcat ttatactgac caatgtacac 5220
 tattgctgct ttttaacttt tgtgtatatg tagggtagat ttttttttaa gtgaaagcaa 5280
 gcttattaag aaagtaaaag aataaaaagg tggcttctcc ataggcagaa aactagcgtg 5340

ES 2 701 091 T3

gtttttttat tagaaattgt tattcaataa tagtacatgt taaaaataaa taccatttta 5400
 aactgaaaaa attgtagact ttcaaatcag ttaggggtgg caccctaaaa aagggcattt 5460
 tttcccctta gtctccttgt tcatgttgct cacacaaga aatgggctaa tgctatgaat 5520
 aataataaca aacactgcct tctgtcaggc cctgtgctga ataccgctctg catatgtata 5580
 ggaaagggtt aactcagcag gtcttgtttg cccagactct gtacatttcc aagaaaggtc 5640
 tgcccttagg actggtcctt ggccagctcc tggagaatga gctctcagct ttagaaaaat 5700
 tctatctgct aagaatagtt ttgcatgtct caggctcttg gccacaaaat atcagtttaa 5760
 tcagatgggt tatgttaaca agtatgattt atggcaaaaa tagatctcta atctccattt 5820
 ctctctcata tatctatatt tatctatcca tatatatgta cctatatata tcaaatatga 5880
 agatatgttt atagcaattg catataaata gagagatagt atgtagtagg aagagagaca 5940
 tagatattat tcttcatttt agaatgttat cttggtagt ttaaaaggaa aaacttaaga 6000
 tgtgttgcaa ttgcagtatg agtttcagggt atgtacatgt tatgtgtgtg tgtgagagac 6060
 acacacaaac acatttcaaa catgttttat gtttaagctc aatattcaaa cacagaaata 6120
 taacatctat tottaatatg ttttatgtaa gtacagcagc agcattatta aatactgtat 6180
 ttctatggtg attgaaaatt agtaggcaga gaatttttgt aatggttcctt aataattttt 6240
 gtaatagtaa atgattactt tttgtttagt atagttttat aatctataca tgaataaagt 6300
 ggatatttct attcatatag aatgtgatt tactctcatg tacttatcta catgctaaaa 6360
 ccataagtta tcaattttag ttctgtgcca aggcactttt actgaataaa aataatcagc 6420
 taattttata ttttctgat tcaaatttat atgcccgtgt aatggtccgg ggtttttttt 6480
 ttaatttct gtaaatacaga atattcagat gttgaaaaag tctttgcctt cagatttaaa 6540
 agataccttt gaaatgtagc atatccaaa atgcaacca gaggctggca atgtcaacat 6600
 tttctgttt taaaaaacct cttatgaaaa ctattgccat actaaatttt ttacttgctg 6660
 atgacttaca gctggaaagg attctgtaca tataagacat caaatattga ggatactgga 6720
 acttttaaat taatggcaaa gaaagtcaac aaaggaagtt catatgaaat caaactagta 6780
 atatgattac aaaaaaaaaa gtttaaaatt tttcttgccc ccagtcttat catttctgag 6840
 ccaaatacaa ttctatcgaa atcacctgaa actgaaatca ccattctagg ctggttttcc 6900
 cataaagatg gactgctcca aaaagaggaa tcaagaaaga atttggctca cagtgaatta 6960
 ttcactttgt cttagttaag taaaaataaa atctgactgt taactacaga aatcatttca 7020
 aattctgtgg tgataataaa gtaatgacca cttttcagct ggagggacta acttcttttt 7080
 ttttttctg gcatatatag ctgtggtaca ttttaagtgt aaatgatgac tgcacagct 7140
 tatatccatg gagcagattt tagcattcag cttgggtctc ccagtcaata tctacagctc 7200
 tcttcttaag gagatcgatg acacagatac atacagacta acaaatgtga taccaataat 7260

ES 2 701 091 T3

caagaattca ctcagttaag attttgocca ctgatttcca cacaagaaac ctagaattta 7320
 ctgatttctt gtgcctgtga ggctccactc atttccctga atcacaaaag ctacagagta 7380
 tttagataga aatataccta ctcttaacat gaaccatttt aaatatatgt attactgtgt 7440
 ccacaggagt acactttaa gcagggactt cactcttcaa tctctccaat cacgtgttac 7500
 ctaaagtggc atgtggttcc ctaaagctta ataactgaca ttgccttaa aaaggggttt 7560
 gcttcccagc taatgtggaa aaagtctgaa aaatgatttt aaatctttca ctaaatttct 7620
 catttggtca cgtggaggaa aatgatttca ccaaatagat actctcatta attttttaat 7680
 gtaatttatc aaagaaatga aatattttaga taaattccag atttccocca ccatgagctt 7740
 ctccgaaagt atactccatc acagactgct cactaagaag ctctactgca gtcaaagtga 7800
 ccgaatttaa ggggacataa tgactacttc tgctacacag aacattatc catctctaac 7860
 acttccctat gagatggaag acggacttct aatcaggtac cagagagggc tctgccaaact 7920
 tcagggcttt gatgaataag aatgggtgag agcgcctcctc ataaatgaat tcagtataac 7980
 tgagtgagaa agtgagagaa ccagagaaat aaatcctcat gtagaaaatt taggggtatg 8040
 aaatgcaaaa tgccagttaa ccaaagcttt ctttgtcata aagcaacttc tataaaaatt 8100
 gctgaaaata aattcttcat ggotcaatgt gaatcagtaa tttccatctc tattacactg 8160
 ttgtttacc caaaactatt tttaatgact aagactcaga gtttgcaga gtgttttcca 8220
 caaaacaact gttttgagat actccagatc tgtaatcaag taagtctgaa aaaccccaaa 8280
 tacctcactc acctcttggg tatgcataaa gcacactaat atataacggt ctaaaaagcc 8340
 aatcattaaa accgttttat attgtttaag catttcttag acatatttgg ctacaaatct 8400
 a 8401

<210> 5
 <211> 8427
 <212> ADN
 <213> *Homo sapiens*

5

<400> 5
 gcacctgcca ccacgcccag ctaattttct attttcagta gagatgaggt tttgccatgt 60
 tggccaggct ggtctcgaac tcttgacctc aggtgatcca cccgcctcag cctaccaaag 120
 agctgggatt acaggcgtga gccaccgcgc ctggccatat taacaaattt taaatcacia 180
 ctatgtgggg ggggaggcta gtattattac agcagattgg tttgctatat aaacaagtac 240
 tttaaaaaat atttcttggg ccaggcgtgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg 300
 gaggccgagg tgggcagatc acttgaggcc aagagttaag agaccagcct ggccaacatg 360
 gtgaaacccc atctctacta aaaatataac aattagccag gcatggaggt gcatgcctgt 420
 aattccagct gctcagaggg ctgaggcatg agaactgctg gatcctggga ggcagaggtt 480

ES 2 701 091 T3

gcagtgagct gatattgctc cactgcactc catatccagc ctgggcaaca tggcaagact 540
 ccgtctcaaa taaataaata aataaataaa taaaactaaa ggcagagttt tcttaataa 600
 acatggtagc cctcagcaac aatattgtaa gaactcctcg caagagaaaa agctggaata 660
 agatactggc taagcaagta agaaaggcac tgccttgctt ctgcatacat tcaaactaag 720
 acatatacat tgcagcttac acttacatth tccaatatcc ccaggcatcc ctttcccttc 780
 tcaaacagcc aaaaggaacc agccatgcaa ataaaaatac aagttcaaga gcctaaaaga 840
 agtcagtgtc ctaaaagaga aaattaatgt aaagaattaa gattttttga aactacactt 900
 tctttctggg gctgtttact ggctccaat acatcaatcc tgtaacactg tgaactacag 960
 tgatagattg gtacatgctt ctaaacacaa cagaatthtt ccaaggttac atacactgta 1020
 acaaaagggg cattttgcag catcttattt tccttaatca actagtttg atattctaac 1080
 agtgcaaca ttgtaacaa taaatthtca ttacctttg aactttctga agtcaaccaa 1140
 aggcttggtg tatggatgca atgagtacta gacaggcaga gctgaatact agtcaaaata 1200
 ttcagttact ggtgtgatag tccttttggg ggcatacatc acttagggag aaactgaggt 1260
 gcaaggacat tttacacaca gcaaaaacat tctcaggaat ttgtcacatc attaccataa 1320
 gccaaaaatc tcaaggtctt agaacagcct gagcttctga tcaaattata ttgtaaaaag 1380
 agaggaaaaa aatgtgaagc gtgctattht ttaaaataac agtaactact actactgctg 1440
 ctgctgctaa ttctaaacgt ttactgagcc cttattatgt gccaaagcacc gtgctaggta 1500
 cgtcataga tthtaacaat taatccctgt aacaaccctc tgatattagt taataaaatt 1560
 aaagtagaat cctcaccaaa aaaatthtaa cthtccaat aaaaatataa ataaattatt 1620
 aaagacattt cacctctthc tctgcctcag actacattht caagtattaa atthacacta 1680
 aaaccacatt taththcag agttccagtt aaagcgtaca gatattcaag atgthgacaa 1740
 ttattacaga agaatcacag aactctgaaa ttaaaactg gcacagaaaa ccttccatcc 1800
 aaccttacgg aacaactatc cccatthtaa aaaaaagga acagcatata taccaggctt 1860
 gataataaga ggcttctcat gcccacacta gcaatgaatg atgccataat tataaagaga 1920
 cctgtatcgc cacatgcata aaaataatth acatctgcta agtcaagtht tcaatatatt 1980
 atthtgtgtg taaaccttat agtagctgat aaaaaataca ataaactaat ctaaggtaaa 2040
 ctaaaacact aggttgtht tgaagactca cthttagaatt tgagcagcat aataatcata 2100
 atattagtaa tcaaactact tagcagaaag thcttagagg gctgggaagc tgtgtataat 2160
 aaaatggagc agacaagaag gaagggttht ccgtactgth taaatcaact acaggtccca 2220
 gcatgcagtg ctctaactctg aagthtaagca aaaactgcaa tgcatactgg gacttgtagt 2280
 aagtaacca cgttatcaca gcaagthtca agaaagtctg aactatctag cacaatthga 2340

ES 2 701 091 T3

ctatatctta ttatcagagt ctaatcaaat ttaatcaaa tttgtatggt ctctgatgtg 2400
gcacacagtt tctctagcac ataccgaaa aagtatcaat atttagacca acattttcac 2460
attagaaaaa tcttacgtag gagaagcaca gaaaaaaatg ctgaaaagc aaaaaaactt 2520
gatgaataaa aatatataatt tttgaaatag ttttttaaaag tttgaatgga tccatttcaa 2580
cattctctaa tcctccccc caaaaagttt aattgttttg gccgggcgcg gtggctcacg 2640
cctgtaatcc caacacttta ggaggctgag gcggggtgaat tacgagatca agagatcgag 2700
accatcctgg ccaacatggt gaaacctct ctactaaaaa tacaaaaatt agttgggctg 2760
ggtggcgcac gcctgtagtc ccagctactc aggaggctga gacaggagaa ttgcttgaac 2820
ctgggaggtg gaggctgcag tgagctaata tcgcaccact gcactccagc ctggtgacag 2880
tgtgagattc attctcaaaa aaaaaaaaaa aaaaagttaa attgttttaa caggttgctt 2940
ttaaacaatt attcaagatg tattttataa ataatttttc ttgaagaaaa ttctcagaag 3000
caaacattcc ccatattcta atattgccca ccaggaaata atttttttag taatacgcac 3060
acaccccatc acaaaaaaca acaaaaaaca ctgaagttct gcttttgtca agtccttact 3120
caatatttat gccctccatt cctcacctct aattccctac acacacacac acacacgcac 3180
acatccccac acacacacgc ttctacaaag aacacttaga aaaacagtat tccaactaca 3240
agcccacttc tctcatccac tgacctctc tgaaaacaca aaagattttt taagctatca 3300
gtaacacgtc caaacacaag ctgataagtt tgagctagaa tttacatata tacagttgct 3360
acacaccctc ctattttctg caagtctgtg gaaggaggct gggaaagaac taagtgcaat 3420
ctgcatcagg aggcctaaca caggtggtgg gttattttca ggcaacagca ccttcacaaa 3480
catgttttgg aatatagtcc aagaaattcc taacaaggaa agataagctg gcacacaaat 3540
ttaacgcaat ccagctaaaa atcatctgca acacatgcta ctacatttca ccataaaagt 3600
gacgggctac tataaaggat ttgaagcttc gtcaatacaa catactgtcc ataaggccag 3660
agatagcagt tgccatggtt actataccca cttttatcag gaaattactg tcattacccc 3720
aaagttttgg gtacttattt aaaatttaa aaaaacacac acaatttagg gttctgactg 3780
ttaattgagt gaaataatca actactgttt gatttgtaag tatgtcgctt tggagatgca 3840
catggttaac aataacttga tctgcagcag aaaaaaaatc aattccttcc tgctgctcct 3900
tctcctcaag tactgacagt ttgtattctc aatgcagcca aaacaataaa acaaaaaccca 3960
tctttttggc ttctgtgttt aagttatttt tcccctaggc ccacaaacag agtcaaaata 4020
aagcctagat catcaacctg ttaggcctca tccccttcc atcccctcca tactggttca 4080
ctttcttgac tacttagaaa aggcagaaaa catttctgta actgattcca aagtatagaa 4140
aagaatagtt gccttcaact gagatatttt caccaaagtc ttttttattt actttttttt 4200
taaggcaggg agaggggaga gacttgcagg gtactgaaag ggagaagtgg aggagtattc 4260

ES 2 701 091 T3

aaattgccac acaagtctag tgtaagaaag ttgctttaga agagtccaaa ggatggctga 4320
 acctcacata taatttctaa aagctttgga agagttcacc ataattttta gactgaattg 4380
 agggacaagt aatagaaaag ttattcataa agtctacttc aacattttta caaaagataa 4440
 ctattcaaaa atttaacaca catataagaa ttatacgaaa gcctacaaaa tagtatggcc 4500
 acatatacac acaaacatac aaagtagaaa acataagcta ttttaagaaat aattatctac 4560
 aataaattca atgcaatggt aacatattat ctctttttta aaaaatcgca aagcagcaaa 4620
 aacatacacc tgagaaaatt aatgtgatca aaacgttaaa gaattcttag gcctataaaa 4680
 aaagcccatg tacaaaagct cctgagaagt caacataaat cattaatatt tcccagcaca 4740
 aaataatag aaaattcaaa catgtttcaa gaaatcagtt ctagatatag atataaaaga 4800
 attccattaa aggtcagaga cctaaaactt taattccttc ccttctctgt ttgaatagta 4860
 attaaataca aaagccttca gcaataaaat actaaggata caaaatttaa aagcacatta 4920
 atataagctt aacttcagta tgtcttcaca gaaagcttta ctattcaactg tctgtaggat 4980
 gaaaaagtta ataacaccct gagaggtttc atttttatct aaacagttaa gtgtttttct 5040
 caccgttcac agaagcaagt ttctatattt actttctaaa gggggcaatt tcaaaagaat 5100
 agtcacttct aaaatttaag atactatacc ttttgatagg ctcataaaca cagggttctt 5160
 aattatctat attttacttt aaaatgtttc tattccaaat ttgtgagcag agtttataag 5220
 aaagctgaaa ctcaaggctt taaacttttg ggttattttt acacaaaaat atttcagtgc 5280
 actcctctag atttgagtag tcaattcctt gtgcacctt ctaaaataga aaaacaaaaa 5340
 tgatatatcc atatatacct aatactaaca catacagata tacatctttt tcaactgtgaa 5400
 acaagcttga aagcttttagg cagtaagaat ttttcagaaa gttagcagag tcagtcaaaa 5460
 cattcaaaac ttgaaccatg acatctgtta ctctgtcaat aagagtctat agaagaatca 5520
 gggaaacttac atactcacta aaatcaacta ctatcacatc acatcaatgg agaaatgaag 5580
 aaaaactgta ataggggaca tacaattcac aggatcttca aaagggaaaa tgatcttttt 5640
 ttttttttta aattatgaga aactgactag gcagcatttt ttcaaaagca gcttcaaaac 5700
 tataacaaag acatttttgg taaccacagc agtattttaa aaacaaaaat ttaggccggg 5760
 cgtggtggct cacgcctata atcccagcac tttgggaggc caaggcaggt ggatcacctg 5820
 agtcaggagt tcaagaccag cctgaccaac atggtgatac cccgtctcta ctcaaaatac 5880
 aaaacttagc cgggcgtagt ggcggacacc tctataatca cagctactca ggaggctgag 5940
 aggcaggaga atcgcttgaa cctgggaggc agaggttgca gtgagccgag atcacgccgt 6000
 tgcactccag cctgggaaac agagcgagac tccgtctcaa aaaataaaaa aataaaaaaa 6060
 ctatagtgtc cagggtgcac tttaaatgta ttactttctc aactgatatg gaaaaagtta 6120

ES 2 701 091 T3

gcatttaaag acagaagctt ctgtccatgt attaattagt tacctatctc aacaacttaa 6180
tattctgcatg ctttcttacc atttatgaag aacttttata tgtattatct catttggtct 6240
tactgagaaa acagtatfff gcctacaaaa tagacaaaat tcaaagcaga tttatcaaac 6300
tttctagcat ccccaaattt ttaaaacttc gacacaaaac tttacaagca accacagtgg 6360
catgatattt tcagtataa tcaattcacc taacactaac agagtttcaa aggaccatgt 6420
gctataaatg ctatgaaact gttaaagtag ctatattcat ctttatgcag ttactgttac 6480
atcaacaatg acctaccact gatacaactt gacttacagt tcaagaatct cagtctttgc 6540
aggctaactt aagtacatca accatatgta tttataaagc cgagtgccta aaaattgatc 6600
tatattagaa tcatagtctg taaatccgag gggaaaaaac tacaagaagt ctaaaatttt 6660
ttcaacacac tatacccctt tccaaaatct caactactct ataccctatt tgtattaata 6720
ttatagggat gataacaagg cttaaagccc taaatcatac caactacttt tgtttataac 6780
aattacaaat aattttttta aatacatgct caacatccca ctcatcaaca caagactaat 6840
tccccttcca aataaaataa ttctaaacag tgctctgtac caagggccag aatccttata 6900
ctatccgcaa tcgcacatct actttgtaca gtcaaagact tcactttcaa gtagcaaaca 6960
ttatttatga atggaatttt taaatggact tactcaaaat ctttctggaa ctttaagggtg 7020
ttaatcctgt tgcttagctg aagctaagca gagctgtaat aagtagcaag accctcaaaa 7080
ttcaaaaatt tcctttatct tgctgtagca cctcctgctg gatagcattt agagatcttc 7140
atgtaagcag aagaagagta tttcagaggc agctccttcc agaagactga ataggaaaaa 7200
ggatggaccc ttcaaagcta aaagaaatag gccccatcca tcacttatac cttctaaaaa 7260
tacaatttag ccaggttagg tgtctttttc atctattact actccagttc cacaaagact 7320
tgctcagtc caaaatacaa catgcttaa taaagcctgc aaaattgtct aaaaactaag 7380
ttaaaaagca ttcaatagca cccaagcaaa acactttatt atgggcagcc aagcaatgtc 7440
agtcaaaactg taaatactat tatgttacca aaagcaaaag tctgatgtta aaaaaaaaaa 7500
aaaaaaaaagcc cctggaatat tcgtaacatg ttagccagat gtttgtgttt tgagaacttt 7560
gtgcactatt actatgctct tcacttaagg atagttgtac atctacaaac gttttaagta 7620
cagaaaatttt tttataaaca ttagcataac tgtacacaaa atttcctctt tgccatgaaa 7680
agataggtcc tgggatttga aatgtatftt ttcagacatt tttaatgacc ccctaaaata 7740
aactagtttt aagcccacaa caccgattcc ataaacaagt aaagacagaa gaagagaata 7800
agaaggaact taccaaaatt aaaatgaata atagtatttc cagtaaaaat gtagtaacag 7860
tttccaacaa tgctgtaaac caataaatt gtgaaactta aaaaaggaag gagggggcca 7920
gtcttcaaag accaaaagca aagctgacct atttatttct attgcttaga gtgaacacca 7980
gatgtaaaaa aatatcataa aactgaaaa gtacgcttac atggtttagc ctcaatttca 8040

ES 2 701 091 T3

gtacccttac caggcoctca ataaagctac agatggtggt gagaactcgc tcaaaaagga 8100
 gataattcca gccoctcgcc ttaaagaatc cctatcaagt gaacctgtga aaagacttcc 8160
 ttcccagagt gcacaactgc tttaaaaaaa aaaaactttc atcagcccaa attaacttga 8220
 ttctaataatt caactatcca ttatttatat ataaatgttc ttcctctctt aactttccca 8280
 gctcgagcat ctacattcct gacaccgact attagcaaaa atgcacaact ccttccccag 8340
 ctatggggca aatctttgaa atctgaaaca cagccacaaa gttcactgtc aaggccaggt 8400
 gatgaggccc acacatgccc ggacctt 8427

<210> 6
 <211> 1704
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

5

<220>
 <223> Fragmento A

<400> 6

ggtaccaccc aagetggcta ggtaagcttg ctagcgccac catggtgctg cagaccagc 60
 tgttcatctc cctgctgctg tggatctccg gcgcatatgg cgatatcgtg atgattaaac 120
 gtacgggtggc cgccccctcc gtgttcatct tccccccctc cgacgagcag ctgaagtccg 180
 gcaccgcctc cgtgggtgctc ctgctgaata acttctacc cagagaggcc aaggtgcagt 240
 ggaaggtgga caacgcctg cagtccggga actcccagga gagcgtgacc gagcaggaca 300
 gcaaggacag cacctacagc ctgagcagca ccctgacct gagcaagcc gactacgaga 360
 agcacaaggt gtacgcctgc gaggtgacct accaggccct gagctcccc gtcaccaaga 420
 gcttcaacag gggggaggtg taggggcccc tttaaacggg tggcatccct gtgacctc 480
 cccagtgcct ctctggccc tggagttgc cactccagtg cccaccagcc ttgtcctaatt 540
 aaaattaagt tgcatcattt tgtctgacta ggtgtccttc tataatatta tgggggtgag 600
 gggggtgcta tggagcaagg ggcaagttgg gaagacaacc tgtagggcct ggggggtcta 660
 ttgggaacca agctggagtg cagtggcaca atcttggctc actgcaatct cgcctcctg 720
 ggttcaagcg attctcctgc ctcagcctcc cgagttgttg ggattccagg catgcatgac 780
 caggctcacc taatttttgt ttttttgta gagacggggt ttcacccatatt tggccaggct 840
 ggtctccaac tcctaactc aggtgatcta cccaccttg cctcccaaat tegtgggatt 900
 acaggcgtga accactgctc cacgcgccct gtagcggcgc attaagcgcg gcgggtgtgg 960
 tggttacgag cagcgtgacc gctacacttg ccagcgcct agcgcgccct ccttccgctt 1020
 tcttccctc cttctcgcg acgttcgcg gotttcccgc tcaagctcta aatcgggggc 1080
 tccctttagg gttccgattt agtgctttac ggcaacctca ccccaaaaaa cttgattagg 1140
 gtgatggttc acgtagtggg ccatcgccct gatagacggt ttttcgccct ttgacgttgg 1200
 agtccacggt ttttaatagt ggactctgt tccaaactgg aacaacactc aacctatct 1260
 cggctctattc ttttgattta taagggattt tgccgatttc ggcctatttg ttaaaaaatg 1320
 agctgattta acaaaaattt aacgcgaatt aattctgtgg aatgtgtgct agttaggggtg 1380
 tggaaagtcc ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc toaattagtc 1440
 agcaaccagg tgtggaaagt cccagcctc cccagcaggc agaagtatgc aaagcatgca 1500
 tctcaattag tcagcaacca tagtcccgc cctaactccg cccatcccgc ccctaactcc 1560
 gccagttcc gccattctc cgccccatgg ctgactaatt ttttttattt atgcagaggc 1620
 cgagcccgcc tctgctctg agctattcca gaagttagta ggaggctttt ttggaggcct 1680
 aggcttttgc aaaaagctcc cggg 1704

ES 2 701 091 T3

<210> 7
 <211> 1120
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

5 <220>
 <223> señal de IgG1 humana + constante de IgG1 humana

<400> 7

```

tgctagcgcc accatgaaac acctgtgggt cttcctcctg ctggtggcag ctcccagatg      60
gggtgctgagc caggtgcaat tgtgcaggcg gttagctcag cctccaccaa gggcccaagc     120
gtcttcccc tggcaccctc ctccaagagc acctctggcg gcacagccgc cctgggctgc     180
ctggtcaagg actacttccc cgaacccgtg accgtgagct ggaactcagg cgccctgacc     240
agcggcgtgc acaccttccc cgctgtcctg cagtctcag gactctactc cctcagcagc     300
gtggtgaccg tgccctccag cagcttgggc acccagacct acatctgcaa cgtgaatcac     360
aagcccagca acaccaaggt ggacaagaga gttgagccca aatcttgtga caaaactcac     420
acatgcccac cctgcccagc acctgaactc ctggggggac cctcagtctt cctcttcccc     480
ccaaaacca aggacacct catgatctcc cggaccctg aggtcacatg cgtggtggtg     540
gacgtgagcc acgaagacc tgaggtcaag ttcaactggt acgtggacgg cgtggaggtg     600
cataatgcc aagaaaagcc ccgggaggag cagtacaaca gcacgtaccg ggtggtcagc     660
gtectaccg tectgcacca ggactggctg aatggcaagg agtacaagtg caaggtctcc     720
aaciaagccc tcccagcccc catcgagaaa accatctcca aagccaaagg ccagccccgg     780
gaaccacagg tgtacacct gcccccattc cgggaggaga tgaccaagaa ccaggtcagc     840
ctgacctgcc tgggtcaaagg cttctatccc agcgacatcg ccgtggagtg ggagagcaat     900
ggccagcccc agaacaacta caagaccacc cctcccgtgc tggactccga cggtccttc     960
ttcctctaca gcaagctcac cgtggacaag agcaggtggc agcagggcaa cgtcttctca    1020

tgctccgtga tgcatgagge tctgcacaac cactacacc agaagagcct ctccctgtct    1080
cccggcaaat gagatatcgg gcccgtttaa acgggtggca                                1120
    
```

REIVINDICACIONES

1. Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias.
- 5 2. Un polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias, en el que el polinucleótido es un fragmento parcial de la SEC ID N°: 3 y tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.
3. Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que tiene una homología del 95 % o más o del 99 % o más respecto de la secuencia de polinucleótido del polinucleótido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.
- 10 4. Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.
5. Un polinucleótido que consiste en una secuencia de polinucleótido que contiene:
 - 15 - al menos una de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3; y
 - al menos uno de
 - 20 (a) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 1 en el listado de secuencias, una secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;
 - (b) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 2 en el listado de secuencias, una secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;
 - 25 (c) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 4 en el listado de secuencias, una secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos; y/o
 - (d) una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 5 en el listado de secuencias, una secuencia que tiene una homología del 95 % o más respecto de la misma o un fragmento parcial de cualquiera de las dos;

y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno.

- 30 6. Un vector que comprende un elemento de ADN que tiene la secuencia de polinucleótido de:
 - (i) un polinucleótido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5;
 - (ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno;
 - 35
- 7. Un vector de acuerdo con la reivindicación 6, en el que el vector es un vector de expresión de un gen exógeno que comprende además un gen exógeno, y en el que el elemento de ADN se posiciona con respecto al gen exógeno de una manera funcionalmente eficaz.
- 40 8. El vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con la reivindicación 7, en el que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína multimérica o una proteína hetero-multimérica.
- 9. El vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con la reivindicación 8, en el que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína hetero-multimérica y es un anticuerpo o un fragmento funcional del mismo.
- 10. Una célula transformada en la que:
 - 45 a) se ha introducido el vector de acuerdo con la reivindicación 6 y un gen exógeno, o
 - b) se ha introducido el vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9.
- 11. La célula transformada de acuerdo con la reivindicación 10, en la que la célula es una célula cultivada procedente de un mamífero preferentemente en la que la célula cultivada es una célula que se selecciona de entre el grupo que consiste en células COS-1, células 293, y células CHO.
- 50 12. La célula transformada de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, en la que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína multimérica o una proteína hetero-multimérica.

13. La célula transformada de acuerdo con la reivindicación 12, en la que la proteína codificada por el gen exógeno es una proteína hetero-multimérica y es un anticuerpo o un fragmento funcional del mismo.

5 14. Un procedimiento de producción de una proteína **caracterizado porque** comprende cultivar la célula transformada de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13 y obtener la proteína codificada por el gen exógeno a partir del producto de cultivo resultante.

15. Un procedimiento para potenciar la expresión de un gen exógeno en una célula transformada en la que se ha introducido un gen exógeno o un vector de expresión de un gen exógeno, **caracterizado porque** usa:


- 10 (i) un polinucleótido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5;
(ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno; o
(iii) un vector de acuerdo con la reivindicación 6 o un vector de expresión de un gen exógeno de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9.

15 16. El uso de:


- 20 (i) el polinucleótido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5;
(ii) un polinucleótido que comprende una secuencia de polinucleótido que contiene dos o más de las secuencias de polinucleótido del polinucleótido que comprende al menos 3000, 2000 o 1500 nucleótidos consecutivos de una secuencia de polinucleótido representada por la SEC ID N°: 3 en el listado de secuencias y que tiene una actividad de potenciar la expresión de un gen exógeno; o
(iii) un vector de acuerdo con la reivindicación 6,

para potenciar la expresión de un gen exógeno en una célula transformada.

【Fig.1】




【Fig.2】




GOI: Gen de interés (SEAP)


【Fig.3】




【Fig.4】



【Fig.5】




【Fig.6】



【Fig.7】

ID	Localización de inicio	Localización final	Longitud (pb)
A2	80966429	80974878	8450
A2-1	80966429	80969428	3000
A2-2	80969229	80972228	3000
A2-3	80971829	80974878	3050
A2-4	80967129	80969128	2000
A2-5	80967129	80968628	1500
A2-6	80967129	80970128	3000
A2-7	80968429	80971428	3000
A2-8	80970429	80973428	3000
A2-9	80966429	80970128	3700
A2-10	80968429	80972228	3800
A2-11	80969229	80973428	4200
A2-12	80967129	80972228	5100
A2-13	80968429	80973428	5000
A2-14	80969229	80974878	5650
A2-15	80966429	80972228	5800
A2-16	80967129	80973428	6300
A2-17	80968429	80974878	6450




【Fig.8】



【Fig.9】

ID	Localización de inicio	Localización final	Longitud (pb)
A7	88992123	89000542	8420
A7-1	88992723	88995722	3000
A7-2	88995723	89000542	4820
A7-3	88997523	89000542	3020
A7-4	88995523	88998522	3000
A7-5	88993623	88996622	3000
A7-6	88996523	88999522	3000
A7-7	88994523	88997522	3000
A7-8	88992123	88995722	3600
A7-9	88993623	88997522	3900
A7-10	88994523	88998522	4000
A7-11	88995523	88999522	4000
A7-12	88996523	89000542	4020
A7-13	88992123	88997522	5400
A7-14	88993623	88998522	4900
A7-15	88994523	88999522	5000
A7-16	88995523	89000542	5020
A7-17	88992123	88998522	6400
A7-18	88993623	88999522	5900


【Fig.10】



【Fig.11】

ID	Localización de inicio	Localización final	Longitud (pb)
A18	111275976	111284450	8475
A18-1	111275976	111281015	5040
A18-2	111276976	111281977	5002
A18-3	111277976	111282975	5000
A18-4	111278975	111282975	4001


【Fig.12】



【Fig.13】

ID	Localización de inicio	Localización final	Longitud (pb)
B5	143034684	143043084	8401
B5-1	143034684	143038684	4001
B5-2	143034684	143037883	3200
B5-3	143037174	143040284	3111
B5-4	143040056	143043084	3029
B5-5	143035584	143038684	3101
B5-6	143038684	143041683	3000


【Fig.14】




【Fig.15】

ID	Localización de inicio	Localización final	Longitud (pb)
C14	46089056	46097482	8427
C14-1	46090015	46093070	3056
C14-2	46091042	46094069	3028
C14-3	46093075	46096174	3100
C14-4	46090015	46097196	7182
C14-5	46090015	46095066	5052
C14-6	46093994	46097196	3203
C14-7	46090015	46094069	4055
C14-8	46092049	46096174	4126
C14-9	46093075	46097196	4122
C14-10	46089056	46094069	5014
C14-11	46091042	46096174	5133
C14-12	46092049	46097196	5148
C14-13	46090015	46096174	6160
C14-14	46091042	46097196	6155

【Fig.16】



【Fig.17】



【Fig.18】

Los puntos de inicio y final basándose en la secuencia de longitud completa del elemento de ADN A2			Los puntos de inicio y final basándose en la secuencia de longitud completa del elemento de ADN A7			Los puntos de inicio y final basándose en la secuencia de longitud completa del elemento de ADN A18		
	Punto de inicio	Punto final		Punto de inicio	Punto final		Punto de inicio	Punto final
A2	1	8450	A7	1	8420	A18	1	8475
A2-1	1	3000	A7-1	601	3600	A18-1	1	5040
A2-2	2801	5800	A7-2	3601	8420	A18-2	1001	6002
A2-3	5401	8450	A7-3	5401	8420	A18-3	2001	7000
A2-4	701	2700	A7-4	3401	6400	A18-4	3000	7000
A2-5	701	2200	A7-5	1501	4500			
A2-6	701	3700	A7-6	4401	7400			
A2-7	2001	5000	A7-7	2401	5400			
A2-8	4001	7000	A7-8	1	3600			
A2-9	1	3700	A7-9	1501	5400			
A2-10	2001	5800	A7-10	2401	6400			
A2-11	2801	7000	A7-11	3401	7400			
A2-12	701	5800	A7-12	4401	8420			
A2-13	2001	7000	A7-13	1	5400			
A2-14	2801	8450	A7-14	1501	6400			
A2-15	1	5800	A7-15	2401	7400			
A2-16	701	7000	A7-16	3401	8420			
A2-17	2001	8450	A7-17	1	6400			
			A7-18	1501	7400			

【Fig.19】

Los puntos de inicio y final basándose en la secuencia de longitud completa del elemento de ADN
B5

	Punto de inicio	Punto final
B5	1	8401
B5-1	1	4001
B5-2	1	3200
B5-3	2491	5601
B5-4	5373	8401
B5-5	901	4001
B5-6	4001	7000

Los puntos de inicio y final basándose en la secuencia de longitud completa del elemento de ADN
C14

	Punto de inicio	Punto final
C14	1	8427
C14-1	960	4015
C14-2	1987	5014
C14-3	4020	7119
C14-4	960	8141
C14-5	960	6011
C14-6	4939	8141
C14-7	960	5014
C14-8	2994	7119
C14-9	4020	8141
C14-10	1	5014
C14-11	1987	7119
C14-12	2994	8141
C14-13	960	7119
C14-14	1987	8141