19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 719 837**

51 Int. Cl.:

A61K 35/74	(2015.01)
A61K 9/00	(2006.01)
A61K 9/19	(2006.01)
A61K 9/48	(2006.01)
A23L 33/135	(2006.01)
A61P 1/10	(2006.01)
A61P 1/12	(2006.01)
A61P 31/04	(2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

- 86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **13.07.2017 PCT/GB2017/052076**
- 87 Fecha y número de publicación internacional: **18.01.2018 WO18011593**
- 96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **13.07.2017 E 17742523 (8)**
- 97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **06.03.2019 EP 3313421**

54 Título: **Composiciones que comprenden una cepa bacteriana de Blautia hydrogenotrophica para su uso en el tratamiento de infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal**

30 Prioridad:

13.07.2016 GB 201612190
20.09.2016 GB 201616018
20.09.2016 GB 201616016
06.03.2017 GB 201703548
06.03.2017 GB 201703552

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
16.07.2019

73 Titular/es:

4D PHARMA PLC (100.0%)
5th floor, 9 Bond Court
Leeds, LS1 2JZ, GB

72 Inventor/es:

CROUZET, LAUREEN;
HABOUZIT, CHLOE y
BERNALIER-DONADILLE, ANNICK

74 Agente/Representante:

IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

ES 2 719 837 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCION

Composiciones que comprenden una cepa bacteriana de *Blautia hydrogenotrophica* para su uso en el tratamiento de infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal

5

CAMPO TÉCNICO

Esta invención se encuentra en el campo de las composiciones que comprenden cepas bacterianas aisladas del tracto digestivo de mamíferos y el uso de tales composiciones en el tratamiento de enfermedades, como se define en las reivindicaciones.

10

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Se cree que el intestino humano es estéril en el útero, pero está expuesto a una gran variedad de microbios maternos y ambientales inmediatamente después del nacimiento. Después de eso, se produce un período dinámico de colonización y sucesión microbiana, que está influenciado por factores como el modo de administración, el entorno, la dieta y el genotipo del huésped, todos los cuales influyen en la composición de la microbiota intestinal, particularmente durante la vida temprana. Posteriormente, la microbiota se estabiliza y se vuelve del tipo adulto [i]. La microbiota intestinal humana contiene más de 1500 filotipos diferentes dominados en niveles de abundancia por dos divisiones bacterianas principales (*phyla*), los Bacteroidetes y los Firmicutes [ii-iii]. Las relaciones simbióticas con éxito que surgen de la colonización bacteriana del intestino humano han producido una amplia variedad de funciones metabólicas, estructurales, protectoras y otras beneficiosas. Las actividades metabólicas mejoradas del intestino colonizado aseguran que los componentes de la dieta por lo demás no digeribles se degraden con la liberación de subproductos proporcionando una importante fuente de nutrientes para el huésped y beneficios adicionales para la salud. De manera similar, la importancia inmunológica de la microbiota intestinal es bien reconocida y se ejemplifica en animales libres de gérmenes que tienen un sistema inmunitario deteriorado que se reconstituye funcionalmente después de la introducción de bacterias comensales [iv-vi].

15

20

25

Se han documentado cambios dramáticos en la composición de la microbiota en trastornos gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Por ejemplo, los niveles de la bacteria del grupo XIVa de *Clostridium* y el grupo XI de *Clostridium* (*F. prausnitzii*) se reducen en pacientes con EII, mientras que los números de *E. coli* aumentan, sugiriendo un cambio en el equilibrio de simbioses y patobioses dentro del intestino [vii-xi].

30

35

En reconocimiento del efecto potencial positivo que ciertas cepas bacterianas pueden tener en el intestino animal, se han propuesto varias cepas para su uso en el tratamiento de diversas enfermedades (ver, por ejemplo, [xii-xv]). Se han propuesto una serie de cepas, que incluyen principalmente cepas de *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*, para su uso en el tratamiento de varios trastornos intestinales (ver [xvi] para una revisión). Las cepas del género *Blautia* también se han propuesto para su uso en la modulación del equilibrio microbiano del ecosistema digestivo en pacientes con SII (WO 01/85187). Sin embargo, la relación entre diferentes cepas bacterianas y diferentes enfermedades, y los efectos precisos de las cepas bacterianas particulares en el intestino y a nivel sistémico y en cualquier tipo particular de enfermedades, están pobremente caracterizadas.

40

45

Hay un requisito para que los efectos potenciales de las bacterias intestinales se caractericen de tal manera que se puedan desarrollar nuevas terapias que usen bacterias intestinales.

La US 2010/0247489 describe el uso de nutrientes minerales para tratar trastornos digestivos. La US'789 propone también, opcionalmente, usar numerosos géneros diferentes de bacterias, incluyendo *Enterobacteriaceae*, para prevenir y reducir la formación de gases en el colon, por lo que este documento sugiere que el aumento de *Enterobacteriaceae spp.* en el tracto gastrointestinal pueden emplearse para tratar ciertas enfermedades. La US'789 no trata ningún método para reducir las *Enterobacteriaceae spp.*

50

La WO 2016/086206 sugiere que pueden usarse bacterias en el orden Clostridiales, incluyendo las *Enterbacteriaceace spp.*, para tratar o prevenir la disbiosis. No hay ninguna sugerencia en la WO'206 de que reducir el nivel de *Enterbacteriaceace spp.* en el tracto gastrointestinal pueda usarse para tratar enfermedades, ni ninguna sugerencia sobre cómo se podría conseguir una reducción del nivel de *Enterbacteriaceace spp.*

55

La WO 2012/142605 propone que puede ser posible tratar una serie de enfermedades diferentes con una combinación de microorganismos. La WO'605 sugiere un gran número de posibles especies bacterianas que podrían emplearse, pero no hay ninguna explicación en la WO'605 sobre cómo podría usarse cualquiera de las especies bacterianas propuestas para tratar cualquiera de las enfermedades propuestas.

60

SUMARIO DE LA INVENCION

Los inventores han desarrollado nuevas terapias para tratar y prevenir enfermedades asociadas con

65

Enterobacteriaceae, en particular *E. coli*. En particular, los inventores han identificado que las cepas bacterianas del género *Blautia* pueden ser eficaces para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal. Como se describe en los ejemplos, la administración oral de composiciones que comprenden *Blautia hydrogenotrophica* puede reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, incluyendo *E. coli*, y puede tratar o prevenir enfermedades asociadas con *Enterobacteriaceae* o *E. coli*. Por lo tanto, en una primera realización, la invención proporciona una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO:5, para su uso en un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* patógenas en el tracto gastrointestinal.

En realizaciones preferidas de todos los aspectos de la invención, las *Enterobacteriaceae* son *E. coli*. La cepa bacteriana es de *Blautia hydrogenotrophica* como se define en las reivindicaciones y es preferiblemente la bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294.

En realizaciones preferidas, la invención proporciona una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia*, para su uso en un método para tratar o prevenir una enfermedad asociada con infección por *Enterobacteriaceae*, como infección por *E. coli*, como se define en las reivindicaciones. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de infección por *Enterobacteriaceae*, como infección por *E. coli*.

En realizaciones preferidas adicionales, las composiciones de la invención, como se definen en las reivindicaciones, son para su uso en la reducción del nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, preferiblemente el nivel de *E. coli*, en el tratamiento o prevención del SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal.

Los inventores han desarrollado nuevas terapias para tratar y prevenir la diarrea. En particular, los inventores han identificado que las cepas bacterianas del género *Blautia* pueden ser eficaces para reducir la diarrea. Como se describe en los ejemplos, la administración oral de composiciones que comprenden *Blautia hydrogenotrophica* puede reducir la diarrea en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable (SII).

La cepa bacteriana en la composición es de *Blautia hydrogenotrophica*. También se pueden usar cepas estrechamente relacionadas, como las cepas bacterianas que tienen una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la secuencia ARNr 16s de la cepa bacteriana de *Blautia hydrogenotrophica*. Preferiblemente, la cepa bacteriana tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la SEQ ID NO:5. Lo más preferible, la cepa bacteriana en la composición es la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294.

En ciertas realizaciones, la composición de la invención es para administración oral. La administración oral de las cepas de la invención puede ser eficaz para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal. Además, la administración oral es conveniente para los pacientes y los practicantes médicos, y permite el suministro y/o la colonización parcial o total del intestino.

En ciertas realizaciones, la composición de la invención comprende uno o más excipientes o portadores farmacéuticamente aceptables.

En ciertas realizaciones, la composición de la invención comprende una cepa bacteriana que se ha liofilizado. La liofilización es una técnica eficaz y conveniente para preparar composiciones estables que permiten el suministro de bacterias, y se muestra que proporciona composiciones eficaces en los ejemplos.

En ciertas realizaciones, la invención proporciona un producto alimenticio que comprende la composición como se ha descrito anteriormente.

La divulgación proporciona una composición de vacuna que comprende la composición como se ha descrito anteriormente.

Además, la invención proporciona un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal y tratar o prevenir de este modo enfermedades asociadas con *Enterobacteriaceae*, que comprende administrar una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia*, como se define en las reivindicaciones.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Figura 1: Medición de la población de BH por qPCR, que muestra un aumento de BH en los días 14 y 28 para ratas HMI con SII que recibieron el liofilizado de BH.

Figura 2: Estudio de dosificación en ratas HIM - cuantificación por RT-PCR de *B. hydrogenotrophica* en muestras fecales de ratas HIM sanas que recibieron diferentes concentraciones de la especie bacteriana.

5 **Figura 3:** Tiempo de tránsito de *B. hydrogenotrophica* después de la administración oral (10^9 /día) a ratas HIM sanas.

10 **Figura 4:** Comparación de los niveles de *B. hydrogenotrophica* encontrados en muestras fecales y cecales de ratas HIM sanas (cuantificación RT-PCR) después de 14 días de administración - *B. hydrogenotrophica* administrada a 10^{10} /día/rata.

15 **Figura 5:** Efecto de la administración de *B. hydrogenotrophica* sobre la composición de la microbiota fecal de ratas asociadas con microbiota humana sana. Administración de 10^{10} *B. hydrogenotrophica*/día durante 14 días (resultados de 2 microbiota fecales humanas sanas (20 ratas HIM) - análisis de qPCR).

Figura 6: Impacto de la administración de *B. hydrogenotrophica* sobre las poblaciones microbianas en ratas SII-HIM.

20 **Figura 7a:** Cambio en los niveles de *Blautia hydrogenotrophica* en microbiota del paciente durante y después del tratamiento con Blautix.

Figura 7b: Cambio en los niveles de *Enterobacteriaceae* en microbiota del paciente durante y después del tratamiento con Blautix.

25 **Figura 8:** resultados de Cmax de la prueba de aliento de hidrógeno para el día 1, día 2, día 15 y día 16 para pacientes con SII tratados con Blautix (**Figura 8a**) y pacientes con SII tratados con placebo (**Figura 8b**). La **Figura 8c** es un gráfico que compara el porcentaje de pacientes tratados con Blautix con una reducción de hidrógeno entre la media de los días 15 y 16 y la media de los días 1 y 2 con el porcentaje de pacientes tratados con placebo con una reducción de hidrógeno entre estos puntos temporales.

30 **Figura 9a:** Datos emparejados de la prueba de aliento no corregida con hidrógeno y corregida con hidrógeno para el día 1 y el día 15 para pacientes con SII tratados con Blautix; **Figura 9b:** gráfico que compara los resultados de la prueba de aliento no corregida con hidrógeno medios para el día 1 y el día 15 para el grupo de tratamiento con Blautix; **Figura 9c:** gráfico que compara los resultados de la prueba de aliento corregida con hidrógeno medios para el día 1 y el día 15 para el grupo de tratamiento con Blautix.

35 **Figura 10a:** Datos emparejados de la prueba de aliento no corregida con hidrógeno y corregida con hidrógeno para el día 1 y el día 15 para pacientes con SII tratados con placebo; **Figura 10b:** gráfico que compara los resultados de la prueba de aliento no corregida con hidrógeno medios para el día 1 y el día 15 para el grupo de placebo; **Figura 10c:** gráfico que compara los resultados de la prueba de aliento corregida con hidrógeno medios para el día 1 y el día 15 para el grupo de placebo.

40 **Figura 11:** Gráficos que comparan los resultados de la prueba de aliento de hidrógeno medios del día 1 y el día 15 para el grupo de tratamiento con Bautix (Verum) y el grupo de placebo (**Figura 11a:** hidrógeno no corregido; **Figura 11b:** hidrógeno corregido).

Figura 12: Evaluación de qPCR de la población de *B. hydrogenotrophica* en muestras fecales de ratas SII-HMA tratadas o no con una composición que comprende *B. hydrogenotrophica* (BlautiX) durante 28 días.

50 **Figura 13:** Enumeración de bacterias en muestras fecales de rata SII HMA después de la administración de *B. hydrogenotrophica* (BlautiX) frente a solución de control.

Figura 14: Cambios en los síntomas del paciente durante el período de dosificación (días 1-16) del ensayo clínico de Fase I.

55 **Figura 15 :** Cambios en los síntomas del paciente durante el período de reposo del ensayo clínico de Fase I.

DIVULGACIÓN DE LA INVENCION

60 *Cepas bacterianas*

Las composiciones de la invención comprenden una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO:5. Los ejemplos demuestran que las bacterias de esta especie son útiles para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, en particular *E. coli*. Las cepas bacterianas son de la especie *Blautia hydrogenotrophica*. La más

preferida es la bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294.

Las especies de *Blautia* son bacterias no móviles de reacción Gram positiva, que pueden ser o cocoides u ovoides y son todas anaerobios obligados que producen ácido acético como el producto final principal de la fermentación de la glucosa [xvii]. La *Blautia* puede aislarse del intestino humano, aunque la *B. producta* se aisló de una muestra de septicemia.

La *Blautia hydrogenotrophica* (anteriormente conocida como *Ruminococcus hydrogenotrophicus*) se ha aislado de los intestinos de los mamíferos, es estrictamente anaeróbico, y metaboliza H₂/CO₂ a acetato, que puede ser importante para la nutrición y la salud humana. El tipo de cepa de *Blautia hydrogenotrophica* es S5a33 = DSM 10507 = JCM 14656. El número de acceso de GenBank para la secuencia del gen ARNr 16S de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* S5a36 es X95624.1 (divulgada en la presente como SEQ ID NO: 5). Esta cepa de *Blautia hydrogenotrophica* ejemplar se describe en [xvii] y [xviii]. La cepa S5a33 y la cepa S5a36 corresponden a dos subclones de una cepa aislada de una muestra fecal de un sujeto sano. Muestran morfología, fisiología y metabolismo idénticos y tienen secuencias de ARNr 16S idénticas. Por tanto, en algunas realizaciones, la *Blautia hydrogenotrophica* para su uso en la invención tiene la secuencia ARNr 16S de la SEQ ID NO:5.

La bacteria *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507 y también con el número de acceso DSM 14294 se probó en los ejemplos y también es referida en la presente como cepa BH. La cepa BH se depositó en la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen [Colección de microorganismos alemana] (Mascheroder Weg 1b, 38124 Braunschweig, Alemania) el 26 de enero de 1996 como "*Ruminococcus hydrogenotrophicus*" con el número de acceso DSM 10507 y también con el número de acceso DSM 14294 como "S5a33" el 14 de mayo de 2001. El depositante fue el INRA Laboratoire de Microbiologie CR de Clermont-Ferrand/Theix 63122 Saint Genes Champanelle, Francia. La propiedad de los depósitos ha pasado a 4D Pharma Plc mediante cesión.

También se espera que las cepas bacterianas estrechamente relacionadas con la cepa probada en los ejemplos sean eficaces para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, en particular *E. coli*. En ciertas realizaciones, la cepa bacteriana para su uso en la invención tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la secuencia de ARNr 16s de una cepa bacteriana de *Blautia Hydrogenotrophica*. Preferiblemente, la cepa bacteriana para su uso en la invención tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la SEQ ID NO:5.

También se espera que las cepas bacterianas que son biotipos de la bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 sean eficaces para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, en particular *E. coli*. Un biotipo es una cepa estrechamente relacionada que tiene características fisiológicas y bioquímicas iguales o muy similares.

Las cepas que son biotipos de una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 y que son adecuadas para su uso en la invención pueden identificarse secuenciando otras secuencias de nucleótidos para una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294. Por ejemplo, se puede secuenciar sustancialmente el completo genoma y una cepa de biotipo para su uso en la invención puede tener por lo menos un 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% de identidad de secuencia en por lo menos un 80% de su genoma completo (por ejemplo, en por lo menos el 85%, 90%, 95% o 99%, o en todo su genoma). Por ejemplo, en algunas realizaciones, una cepa de biotipo tiene por lo menos un 98% de identidad de secuencia en por lo menos un 98% de su genoma o por lo menos un 99% de identidad de secuencia en un 99% de su genoma. Otras secuencias adecuadas para su uso en la identificación de cepas de biotipo pueden incluir hsp60 o secuencias repetitivas como BOX, ERIC, (GTG)₅ o REP o [xx]. Las cepas de biotipo pueden tener secuencias con por lo menos el 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% de identidad de secuencia con la secuencia correspondiente de una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294. En algunas realizaciones, una cepa de biotipo tiene una secuencia con por lo menos un 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% de identidad de secuencia con la secuencia correspondiente de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada como DSM 10507/14294 y comprende una secuencia de ARNr 16S eso es por lo menos un 99% idéntica (por ejemplo, por lo menos el 99,5% o por lo menos el 99,9% idéntica) a la SEQ ID NO:5. En algunas realizaciones, una cepa de biotipo tiene una secuencia con por lo menos un 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% de identidad de secuencia con la secuencia correspondiente de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada como DSM 10507/14294 y tiene la secuencia ARNr 16S de la SEQ ID NO:5.

Alternativamente, las cepas que son biotipos de una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 y que son adecuadas para su uso en la invención pueden identificarse usando el depósito del número de acceso DSM 10507/14294 y análisis de fragmentos de restricción y/o análisis de PCR, por ejemplo, usando polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados fluorescentes (FAFLP) e identificación de elementos de ADN repetitivos (rep)-PCR, o realización de perfiles de proteínas, o secuenciación de ADNr 16S o 23s parcial. En realizaciones preferidas, tales técnicas pueden usarse para identificar otras cepas de *Blautia hydrogenotrophica*.

En ciertas realizaciones, las cepas que son biotipos de una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 y que son adecuadas para su uso en la invención son cepas que proporcionan el mismo patrón que una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 cuando se analizan por análisis de restricción de ADN ribosómico amplificado (ARDRA), por ejemplo, cuando se usa la enzima de restricción Sau3AI (para métodos ejemplares y orientación, ver, por ejemplo, [xxi]). Alternativamente, las cepas de biotipo se identifican como cepas que tienen los mismos patrones de fermentación de carbohidratos que una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294.

Otras cepas de *Blautia* que son útiles en las composiciones y métodos de la invención, como los biotipos de una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294, pueden identificarse usando cualquier método o estrategia apropiada, incluyendo los ensayos descritos en los ejemplos. Por ejemplo, las cepas para su uso en la invención pueden identificarse cultivando bacterias y administrándolas a ratas para probarlas en el ensayo de distensión. En particular, las cepas bacterianas que tienen patrones de crecimiento, tipo metabólico y/o antígenos de superficie similares a una bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 pueden ser útiles en la invención. Una cepa útil tendrá una actividad moduladora de la microbiota comparable a la cepa DSM 10507/14294. En particular, una cepa de biotipo provocará efectos comparables en *Enterobacteriaceae* a los efectos mostrados en los ejemplos, que pueden identificarse usando los protocolos de cultivo y administración descritos en los Ejemplos.

Una cepa particularmente preferida de la invención es la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294. Esta es la cepa de BH ejemplar probada en los ejemplos y que demostró ser eficaz para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, en particular *E. coli*. Por lo tanto, la invención proporciona una célula, tal como una célula aislada, de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294, o un derivado de la misma, para su uso en terapia, en particular para las enfermedades descritas en la presente.

Un derivado de la cepa depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 puede ser una cepa hija (progenie) o una cepa cultivada (subclonada) de la original. Un derivado de una cepa de la invención puede modificarse, por ejemplo, a nivel genético, sin eliminar la actividad biológica. En particular, una cepa derivada de la invención es terapéuticamente activa. Una cepa derivada tendrá una actividad moduladora de la microbiota comparable a la cepa DSM 10507/14294 original. En particular, una cepa derivada provocará efectos comparables sobre las *Enterobacteriaceae* a los efectos mostrados en los Ejemplos, que pueden identificarse usando los protocolos de cultivo y administración descritos en los Ejemplos. Un derivado de la cepa DSM 10507/14294 será generalmente un biotipo de la cepa DSM 10507/14294.

Las referencias a las células de la cepa *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 abarcan cualquier célula que tenga las mismas características de seguridad y eficacia terapéutica que las cepas depositadas con el número de acceso DSM 10507/14294, y tales células están abarcadas por la invención.

En realizaciones preferidas, las cepas bacterianas en las composiciones de la invención son viables y capaces de colonizar parcial o totalmente el intestino.

Usos terapéuticos

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para uso en la reducción del nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal. Los niveles aumentados de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal están asociados con numerosas afecciones y enfermedades patológicas, y los ejemplos demuestran que las composiciones de la invención pueden ser eficaces para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal.

En realizaciones preferidas de todos los aspectos de la invención, las *Enterobacteriaceae* son *E. coli*. Por lo tanto, preferiblemente las composiciones de la invención son para su uso en la reducción del nivel de *E. coli* en el tracto gastrointestinal.

En ciertas realizaciones, las *Enterobacteriaceae* son una cepa patógena, como *E. coli* O157:H7, O104:H4, O121, O26, O103, O111, O145, O104:H21 o O104:H4.

En realizaciones alternativas, las *Enterobacteriaceae* son una cepa comensal o no patógena. Los niveles aumentados de tales *Enterobacteriaceae* pueden contribuir a afecciones como el SII y la enfermedad de Crohn, y los ejemplos demuestran que las composiciones de la invención pueden tener un efecto reductor sobre las *Enterobacteriaceae* en el contexto del SII.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de una enfermedad asociada con infección por *Enterobacteriaceae*, como infección por *E. coli*. En ciertas

realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal. En tales realizaciones, las *Enterobacteriaceae* pueden ser una cepa patógena.

5 En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de una enfermedad asociada con niveles aumentados de *Enterobacteriaceae*, como *E. coli*. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal. En tales realizaciones, las *Enterobacteriaceae* pueden ser una cepa comensal o no patógena.

10 En algunas realizaciones, la patogénesis de la enfermedad o afección afecta al intestino. En algunas realizaciones, la patogénesis de la enfermedad o afección no afecta al intestino. En algunas realizaciones, la patogénesis de la enfermedad o afección no está localizada en el intestino. En algunas realizaciones, el tratamiento o la prevención tienen lugar en un sitio distinto del intestino. En algunas realizaciones, el tratamiento o la prevención tienen lugar en el intestino y también en un sitio distinto del intestino. En ciertas realizaciones, la enfermedad o afección es sistémica.

15 En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de la infección por *Enterobacteriaceae*, como infección por *E. coli*. En realizaciones preferidas, las composiciones de la invención son para su uso en el tratamiento o prevención de infección del tracto gastrointestinal, y en particular el ciego. En tales realizaciones, las *Enterobacteriaceae* pueden ser una cepa patógena.

20 En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en las heces en el sujeto. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en una muestra de heces del sujeto. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en el intestino distal del sujeto. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en el ciego. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en el colon. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en el recto. En algunas realizaciones, el nivel de *Enterobacteriaceae* se reduce en el intestino delgado.

25 En realizaciones preferidas, la invención proporciona una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO:5, para su uso en el tratamiento de infecciones causadas por *Enterobacteriaceae* patógenas.

30 En realizaciones preferidas, la invención proporciona una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO:5, para su uso en el tratamiento de la infección por *E. coli*.

35 En realizaciones preferidas, las composiciones de la invención son para su uso en la reducción del nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, preferiblemente el nivel de *E. coli*, en el tratamiento o prevención de una enfermedad asociada con niveles aumentados de *Enterobacteriaceae*, tales como SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal. Se sabe que las *Enterobacteriaceae*, y en particular *E. coli*, son desencadenantes potenciales, o se sabe que exacerban, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa [xxii-xxiv], por lo que el efecto mostrado en los ejemplos para las composiciones de la invención puede ser beneficioso en el tratamiento de estas afecciones.

40 En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en la reducción del nivel de SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal reduciendo el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal.

45 En realizaciones preferidas, las composiciones de la invención comprenden la bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 y son para su uso en la reducción del nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, o más preferiblemente SII. En realizaciones adicionales preferidas, las composiciones de la invención comprenden la bacteria depositada con el número de acceso DSM 10507/14294 y son para su uso en el tratamiento o la prevención de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional o, lo más preferible, SII reduciendo el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal.

50 En ciertas realizaciones, la composición se administra en combinación con un antibiótico como una fluoroquinolona, azitromicina, ciprofloxacina o rifaximina. En ciertas realizaciones, la composición se administra en combinación con un tratamiento de deshidratación como una solución de rehidratación oral. La composición de la invención puede administrarse al mismo tiempo que el tratamiento con antibiótico o de deshidratación, o secuencialmente con el tratamiento con antibiótico o de deshidratación.

55 En ciertas realizaciones, las composiciones son para su uso en pacientes que muestran, o se espera que muestren, niveles aumentados de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, cuando se comparan

con un sujeto sano, o una población de sujetos sanos.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención son para su uso en un método para tratar, prevenir o reducir la colonización del tracto gastrointestinal por *Enterobacteriaceae*.

En algunas realizaciones, la composición de la invención es para su uso en un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal en un sujeto que tiene un nivel aumentado de hidrógeno en su aliento en relación con un sujeto sano. En algunas realizaciones, la composición de la invención es para uso en la reducción del nivel de hidrógeno en el aliento de un sujeto que muestra o se espera que muestre un nivel aumentado de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal. El sujeto es preferiblemente un sujeto diagnosticado con SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal y/o una infección provocada por *Enterobacteriaceae* patógenas, por ejemplo, *E. coli*. Los ejemplos muestran que el tratamiento con una composición de la invención reduce el nivel de hidrógeno detectado en las pruebas de aliento de hidrógeno. Por consiguiente, los niveles de hidrógeno se evalúan preferiblemente usando una prueba de aliento de hidrógeno. La prueba de aliento de hidrógeno es bien conocida en la técnica y, por lo tanto, los expertos sabrán cómo realizar dicha prueba. En algunas realizaciones, al paciente se le administra lactulosa como el sustrato para la prueba.

La prueba de aliento de hidrógeno también es una herramienta útil para monitorizar la eficacia o la eficacia probable de reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* y de tratamiento o prevención usando una composición de la invención. Por ejemplo, una reducción en el nivel de hidrógeno detectado en el aliento de un sujeto después del tratamiento con una composición de la invención puede indicar que el tratamiento tiene un efecto reductor, terapéutico o preventivo. Por consiguiente, en algunas realizaciones, los métodos y usos de la invención comprenden además monitorizar el nivel de hidrógeno en el aliento de un sujeto durante y/o después del tratamiento con una composición de la invención y, por lo tanto, evaluar la eficacia o la eficacia probable de reducción, tratamiento o prevención. Por ejemplo, los niveles de hidrógeno se pueden monitorizar una o más veces (por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o más de 4), por ejemplo, incluso antes del tratamiento, al comienzo del tratamiento, durante el tratamiento, al final del tratamiento y/o después del tratamiento, como se desee. En algunas realizaciones, el nivel de hidrógeno en el aliento del sujeto al final y/o después del período de dosificación (durante el que se administra la composición al sujeto) se compara con el nivel al comienzo y/o antes del período de dosificación y una reducción en el nivel indica la eficacia o eficacia probable de la reducción, tratamiento o prevención. Por ejemplo, en realizaciones en las que el período de dosificación es de 16 días, puede ser deseable tomar mediciones en el día 1 y el día 16, o por ejemplo en el día 1, el día 2, el día 15 y el día 16. En algunas realizaciones, se toman varias mediciones y se obtiene la media de esas mediciones (por ejemplo, la media del día 1 y el día 2 y la media del día 15 y el día 16). En algunas realizaciones, una reducción de por lo menos 40 ppm en el Cmax de nivel de hidrógeno indica que la reducción, tratamiento o prevención es eficaz o probable que sea eficaz. En algunas realizaciones, el nivel de hidrógeno en el aliento del sujeto se mide solo una vez, por ejemplo, al final o después del tratamiento, y el descubrimiento de que el nivel está en o cerca de un nivel predeterminado es indicativo de que la reducción, el tratamiento o la prevención es probable que haya sido eficaz. La prueba de aliento de hidrógeno es un ensayo estándar y por tanto los niveles predeterminados se conocen en la técnica se conocen.

El tratamiento o la prevención pueden referirse, por ejemplo, a un alivio de la gravedad de los síntomas o una reducción en la frecuencia de las exacerbaciones o el rango de desencadenantes que son un problema para el paciente.

Los niveles de *Enterobacteriaceae* pueden detectarse en las heces de un paciente, usando técnicas estándar, como las técnicas de qPCR usadas en los ejemplos.

Modos de administración

Preferiblemente, las composiciones de la invención han de administrarse al tracto gastrointestinal para permitir el suministro y/o la colonización parcial o total del intestino con la cepa bacteriana de la invención. Generalmente, las composiciones de la invención se administran por vía oral, pero pueden administrarse por vía rectal, intranasal o bucal o sublingual.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención pueden administrarse como una espuma, como un spray o un gel.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención pueden administrarse como un supositorio, como un supositorio rectal, por ejemplo, en forma de un aceite de teobroma (manteca de cacao), grasa dura sintética (por ejemplo, suppicire, witepsol), glicero-gelatina, polietilenglicol, o composición de jabón de glicerina.

En ciertas realizaciones, la composición de la invención se administra al tracto gastrointestinal a través de un tubo, como un tubo nasogástrico, tubo orogástrico, tubo gástrico, tubo de yeyunostomía (tubo J), gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), o un puerto como un puerto de pared torácica que proporciona acceso al estómago,

yeyuno y otros puertos de acceso adecuados.

5 Las composiciones de la invención pueden administrarse una vez, o pueden administrarse secuencialmente como parte de un régimen de tratamiento. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención han de administrarse diariamente. Los ejemplos demuestran que la administración diaria proporciona colonización con éxito y beneficios clínicos.

10 En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención se administran regularmente, como diariamente, cada dos días o semanalmente, durante un período de tiempo prolongado, como durante por lo menos una semana, dos semanas, un mes, dos meses, seis meses., o un año. Los ejemplos demuestran que la administración de BH puede no dar como resultado una colonización permanente de los intestinos, por lo que la administración regular durante períodos de tiempo prolongados puede proporcionar mayores beneficios terapéuticos.

15 En algunas realizaciones, las composiciones de la invención se administran durante 7 días, 14 días, 16 días, 21 días o 28 días o no más de 7 días, 14 días, 16 días, 21 días o 28 días. Por ejemplo, en algunas realizaciones, las composiciones de la invención se administran durante 16 días.

20 En ciertas realizaciones de la invención, el tratamiento de acuerdo con la invención se acompaña de una evaluación de la microbiota intestinal del paciente. El tratamiento puede repetirse si no se logra el suministro de y/o la colonización parcial o total con la cepa de la invención, de tal manera que no se observa eficacia, o el tratamiento puede cesar si el suministro y/o la colonización parcial o total tienen éxito y se observa eficacia.

25 En ciertas realizaciones, la composición de la invención puede administrarse a un animal gestante, por ejemplo, un mamífero como un humano para prevenir niveles elevados de desarrollo de *Enterobacteriaceae* en su hijo en el útero y/o después de que nazca.

30 Las composiciones de la invención pueden administrarse a un paciente al que se la han diagnosticado niveles elevados de *Enterobacteriaceae* o una enfermedad o afección asociada con niveles elevados de *Enterobacteriaceae*, o que se ha identificado como que tiene riesgo de niveles elevados de *Enterobacteriaceae*. Las composiciones también pueden administrarse como una medida profiláctica para prevenir el desarrollo de niveles elevados de *Enterobacteriaceae* en un paciente sano.

35 Las composiciones de la invención pueden administrarse a un paciente que se ha identificado que tiene una microbiota intestinal anormal. Por ejemplo, el paciente puede tener una colonización reducida o ausente por parte de *Blautia*, y en particular *Blautia hydrogenotrophica*, *Blautia stercoris* o *Blautia wexlerae*.

Las composiciones de la invención pueden administrarse como un producto alimenticio, como un suplemento nutricional.

40 Generalmente, las composiciones de la invención son para el tratamiento de seres humanos, aunque pueden usarse para tratar animales incluyendo mamíferos monogástricos como aves de corral, cerdos, gatos, perros, caballos o conejos. Las composiciones de la invención pueden ser útiles para mejorar el crecimiento y el rendimiento de los animales. Si se administra a animales, se puede usar alimentación forzada oral.

45 En algunas realizaciones, el sujeto al que se va a administrar la composición es un humano adulto. En algunas realizaciones, el sujeto al que se va a administrar la composición es un niño humano.

Composiciones

50 Generalmente, la composición de la invención comprende bacterias como se define en las reivindicaciones. En realizaciones preferidas de la invención, la composición se formula en forma secada por congelación. Por ejemplo, la composición de la invención puede comprender gránulos o cápsulas de gelatina, por ejemplo cápsulas de gelatina dura, que comprenden una cepa bacteriana de la invención.

55 Preferiblemente, la composición de la invención comprende bacterias liofilizadas. La liofilización de bacterias es un procedimiento bien establecido y la orientación relevante está disponible, por ejemplo, en las referencias [xxv-xxvii]. Los ejemplos demuestran que las composiciones de liofilizado son particularmente eficaces.

60 Alternativamente, la composición de la invención puede comprender un cultivo bacteriano activo vivo. Los ejemplos demuestran que los cultivos de las bacterias de la invención son terapéuticamente eficaces.

65 En algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención no se ha inactivado, por ejemplo, no se ha inactivado por calor. En algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención no se ha matado, por ejemplo, no se ha matado por calor. En algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención no se ha atenuado, por ejemplo, no se ha atenuado por calor. Por ejemplo, en

algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención no se ha matado, inactivado y/o atenuado. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención está viva. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención es viable. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención es capaz de colonizar parcial o totalmente el intestino. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cepa bacteriana en la composición de la invención es viable y capaz de colonizar parcial o totalmente el intestino.

En algunas realizaciones, la composición comprende una mezcla de cepas bacterianas vivas y cepas bacterianas que se han matado.

En realizaciones preferidas, la composición de la invención se encapsula para permitir el suministro de la cepa bacteriana al intestino. La encapsulación protege a la composición de la degradación hasta el suministro en la localización deseada mediante, por ejemplo, la ruptura con estímulos químicos o físicos, como la presión, la actividad enzimática o la disgregación física, que pueden desencadenarse por cambios en el pH. Se puede usar cualquier método de encapsulación apropiado. Las técnicas de encapsulación ejemplares incluyen atrapamiento dentro de una matriz porosa, unión o adsorción en superficies de portadores sólidos, auto-agregación por floculación o con agentes de reticulación, y contención mecánica detrás de una membrana microporosa o una microcápsula. La orientación sobre la encapsulación que puede ser útil para preparar composiciones de la invención está disponible, por ejemplo, en las referencias [xxviii-xxix].

La composición puede administrarse por vía oral y puede estar en forma de un comprimido, cápsula o polvo. Se prefieren los productos encapsulados porque las *Blautia* son anaerobias. Pueden incluirse otros ingredientes (como la vitamina C, por ejemplo), como captadores de oxígeno y sustratos prebióticos para mejorar el suministro y/o la colonización parcial o total y la supervivencia *in vivo*. Alternativamente, la composición probiótica de la invención puede administrarse por vía oral como un producto alimenticio o nutricional, como un producto lácteo fermentado a base de leche o suero de leche, o como un producto farmacéutico.

La composición puede formularse como un probiótico.

Una composición de la invención incluye una cantidad terapéuticamente eficaz de una cepa bacteriana de la invención. Una cantidad terapéuticamente eficaz de una cepa bacteriana es suficiente para ejercer un efecto beneficioso sobre un paciente. Una cantidad terapéuticamente eficaz de una cepa bacteriana puede ser suficiente para dar como resultado el suministro y/o la colonización parcial o total del intestino del paciente.

Una dosis diaria adecuada de la bacteria, por ejemplo para un humano adulto, puede ser de aproximadamente 1×10^3 a aproximadamente 1×10^{11} unidades formadoras de colonias (UFC); por ejemplo, de aproximadamente 1×10^7 a aproximadamente 1×10^{10} UFC; en otro ejemplo, de aproximadamente 1×10^6 a aproximadamente 1×10^{10} UFC; en otro ejemplo, de aproximadamente 1×10^7 a aproximadamente 1×10^{11} UFC; en otro ejemplo, de aproximadamente 1×10^8 a aproximadamente 1×10^{10} UFC; en otro ejemplo, de aproximadamente 1×10^8 a aproximadamente 1×10^{11} UFC.

En ciertas realizaciones, la dosis de la bacteria es por lo menos de 10^9 células por día, como por lo menos 10^{10} , por lo menos 10^{11} , o por lo menos 10^{12} células por día.

En ciertas realizaciones, la composición contiene la cepa bacteriana en una cantidad de aproximadamente 1×10^6 a aproximadamente 1×10^{11} UFC/g, con respecto al peso de la composición; por ejemplo, de aproximadamente 1×10^8 a aproximadamente 1×10^{10} UFC/g. La dosis puede ser, por ejemplo, 1 g, 3 g, 5 g y 10 g.

Típicamente, un probiótico, como la composición de la invención, se combina opcionalmente con por lo menos un compuesto prebiótico adecuado. Un compuesto prebiótico es generalmente un carbohidrato no digerible, como un oligo- o polisacárido, o un alcohol de azúcar, que no se degrada ni se absorbe en el tracto digestivo superior. Los prebióticos conocidos incluyen productos comerciales como inulina y transgalacto-oligosacáridos.

En ciertas realizaciones, la composición probiótica de la presente invención incluye un compuesto prebiótico en una cantidad de aproximadamente el 1 a aproximadamente el 30% en peso, con respecto al peso total de la composición (por ejemplo, del 5 al 20% en peso). Los carbohidratos pueden seleccionarse del grupo que consiste de: fructo- oligosacáridos (o FOS), fructo-oligosacáridos de cadena corta, inulina, isomalt-oligosacáridos, pectinas, xilo-oligosacáridos (o XOS), quitosan-oligosacáridos (o COS), beta -glucanos, almidones modificados y resistentes de goma arábiga, polidextrosa, D-tagatosa, fibras de acacia, algarroba, avena y fibras de cítricos. En un aspecto, los prebióticos son los fructo-oligosacáridos de cadena corta (por simplicidad mostrados en la presente a continuación como FOSs-c.c); tales FOSs-c.c no son carbohidratos digeribles, obtenidos generalmente mediante la conversión de la azúcar de remolacha y que incluyen una molécula de sacarosa a la que se unen tres moléculas de glucosa.

Las composiciones de la invención pueden comprender excipientes o portadores farmacéuticamente

aceptables. Ejemplos de tales excipientes adecuados se pueden encontrar en la referencia [xxx]. Los portadores o diluyentes aceptables para uso terapéutico son bien conocidos en la técnica farmacéutica y se describen, por ejemplo, en la referencia [xxxi]. Los ejemplos de portadores adecuados incluyen lactosa, almidón, glucosa, metilcelulosa, estearato de magnesio, manitol, sorbitol y similares. Los ejemplos de diluyentes adecuados incluyen etanol, glicerol y agua. La elección del portador, excipiente o diluyente farmacéutico puede seleccionarse con respecto a la vía de administración prevista y la práctica farmacéutica estándar. Las composiciones farmacéuticas pueden comprender como, o además del portador, excipiente o diluyente, cualquier aglutinante(s), lubricante(s), agente(s) de suspensión, agente(s) de recubrimiento, agente(s) de solubilización. Los ejemplos de aglutinantes adecuados incluyen almidón, gelatina, azúcares naturales como glucosa, lactosa anhidra, lactosa de flujo libre, beta-lactosa, edulcorantes de maíz, gomas naturales y sintéticas como acacia, tragacanto o alginato de sodio, carboximetilcelulosa y polietilenglicol. Los ejemplos de lubricantes adecuados incluyen oleato de sodio, estearato de sodio, estearato de magnesio, benzoato de sodio, acetato de sodio, cloruro de sodio y similares. En la composición farmacéutica se pueden proporcionar conservantes, estabilizantes, colorantes e incluso agentes aromatizantes. Los ejemplos de conservantes incluyen benzoato de sodio, ácido sórbico, cisteína y ésteres de ácido p-hidroxibenzoico, por ejemplo, en algunas realizaciones el conservante se selecciona de benzoato de sodio, ácido sórbico y ésteres de ácido p-hidroxibenzoico. También pueden usarse antioxidantes y agentes de suspensión. Un ejemplo adicional de un portador adecuado es la sacarosa. Un ejemplo adicional de un conservante es la cisteína.

Las composiciones de la invención pueden formularse como un producto alimenticio. Por ejemplo, un producto alimenticio puede proporcionar un beneficio nutricional además del efecto terapéutico de la invención, tal como en un suplemento nutricional. De manera similar, un producto alimenticio puede formularse para mejorar el sabor de la composición de la invención o para hacer que la composición sea más atractiva para consumir al ser más similar a un artículo alimenticio común, en lugar de a una composición farmacéutica. En ciertas realizaciones, la composición de la invención se formula como un producto a base de leche. El término "producto a base de leche" significa cualquier producto a base de leche o suero de leche líquido o semisólido que tenga un contenido de grasa variable. El producto a base de leche puede ser, por ejemplo, leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, leche desnatada, leche entera, leche recombinada a partir de leche en polvo y suero de leche sin ningún procesamiento, o un producto procesado, como yogur, leche cuajada, cuajada, leche agria, leche entera agria, leche de mantequilla y otros productos de leche agria. Otro grupo importante incluye las bebidas lácteas, como las bebidas de suero de leche, las leches fermentadas, las leches condensadas, las leches para bebés o niños; leches con sabores, helados; alimentos que contienen leche como los dulces.

En algunas realizaciones, las composiciones de la invención, como se define en las reivindicaciones, comprenden una o más cepas bacterianas del género *Blautia* y no contienen bacterias de ningún otro género, o que comprenden solo cantidades mínimas o biológicamente irrelevantes de bacterias de otro género.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención, como se definen en las reivindicaciones, contienen una única cepa o especie bacteriana y no contienen ninguna otra cepa o especie bacteriana. Tales composiciones pueden comprender solo cantidades mínimas o biológicamente irrelevantes de otras cepas o especies bacterianas. Tales composiciones pueden ser un cultivo que está sustancialmente libre de otras especies de organismos. En algunas realizaciones, tales composiciones pueden ser un liofilizado que está sustancialmente libre de otras especies de organismos.

En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención, como se definen en las reivindicaciones, comprenden una o más cepas bacterianas del género *Blautia*, por ejemplo, una *Blautia hydrogenotrophica*, y no contienen ningún otro género bacteriano, o que comprenden solo cantidades mínimas o biológicamente irrelevantes de bacterias de otro género. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden *Blautia hydrogenotrophica*, y no contienen ninguna otra especie bacteriana, o comprenden solo cantidades mínimas o biológicamente irrelevantes de bacterias de otra especie. En ciertas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden una única cepa de *Blautia hydrogenotrophica*, y no contienen ninguna otra cepa o especie bacteriana, o comprenden solo cantidades mínimas o biológicamente irrelevantes de bacterias de otra cepa o especie.

En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden más de una cepa o especie bacteriana. Por ejemplo, en algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden más de una cepa de la misma especie (por ejemplo, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 o 45 cepas) y, opcionalmente, no contienen bacterias de ninguna otra especie. En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden menos de 50 cepas de la misma especie (por ejemplo, menos de 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 o 3 cepas), y, opcionalmente, no contienen bacterias de ninguna otra especie. En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden 1-40, 1-30, 1-20, 1-19, 1-18, 1-15, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 2-50, 2-40, 2-30, 2-20, 2-15, 2-10, 2-5, 6-30, 6-15, 16-25, o 31-50 cepas de la misma especie y, opcionalmente, no contienen bacterias de ninguna otra especie. En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden más de una especie dentro del mismo género (por ejemplo, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 35 o 40 especies), y, opcionalmente, no contienen bacterias de ningún otro género. En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden menos de 50 especies dentro del mismo género (por ejemplo, menos de 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 o 3 especies), y, opcionalmente, no

contienen bacterias de ningún otro género. En algunas realizaciones, las composiciones de la invención comprenden 1-50, 1-40, 1-30, 1-20, 1-15, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 2-50, 2-40, 2-30, 2-20, 2-15, 2-10, 2-5, 6-30, 6-15, 16-25, o 31-50 especies dentro del mismo género y, opcionalmente, no contienen bacterias de ningún otro género. La invención comprende cualquier combinación de lo anterior.

5 En algunas realizaciones, la composición comprende un consorcio microbiano. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la composición comprende la cepa bacteriana *Blautia hydrogenotrophica* como se define en las reivindicaciones como parte de un consorcio microbiano. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cepa bacteriana de *Blautia hydrogenotrophica* está presente en combinación con una o más (por ejemplo, por lo menos 2, 3, 4, 5, 10, 10 15 o 20) otras cepas bacterianas de otros géneros con las que puede vivir simbióticamente *In vivo* en el intestino. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la composición comprende una cepa bacteriana de *Blautia hydroneotrophica* en combinación con una cepa bacteriana de un género diferente. En algunas realizaciones, el consorcio microbiano comprende dos o más cepas bacterianas obtenidas de una muestra de heces de un solo organismo, por ejemplo, un humano. En algunas realizaciones, el consorcio microbiano no se encuentra junto a la naturaleza. Por ejemplo, en algunas realizaciones, el consorcio microbiano comprende cepas bacterianas obtenidas de muestras de heces de por lo menos dos organismos diferentes. En algunas realizaciones, los dos organismos diferentes son de la misma especie, por ejemplo, dos humanos diferentes. En algunas realizaciones, los dos organismos diferentes son un humano infante y un humano adulto. En algunas realizaciones, los dos organismos diferentes son un mamífero humano y uno no humano.

20 En algunas realizaciones, la composición de la invención comprende adicionalmente una cepa bacteriana que tiene las mismas características de seguridad y eficacia terapéutica que la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294, pero que no es la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* depositada con el número de acceso DSM 10507/14294, o que no es una *Blautia hydrogenotrophica* o que no es una *Blautia*.

25 En algunas realizaciones en las que la composición de la invención comprende más de una cepa, especie o género bacteriano, las cepas, especies o géneros bacterianos individuales pueden ser para administración separada, simultánea o secuencial. Por ejemplo, la composición puede comprender la totalidad de más de una cepa, especie o género bacteriano, o las cepas, especies o géneros bacterianos pueden almacenarse por separado y administrarse por separado, simultánea o secuencialmente. En algunas realizaciones, las más de una cepa, especie o género bacteriano se almacenan por separado, pero se mezclan entre sí antes del uso.

30 En algunas realizaciones, la cepa bacteriana para su uso en la invención se obtiene de heces humanas adultas. En algunas realizaciones en las que la composición de la invención comprende más de una cepa bacteriana, todas las cepas bacterianas se obtienen de heces humanas adultas o si hay otras cepas bacterianas, están presentes solo en cantidades mínimas. Las bacterias pueden haberse cultivado después de obtenerse de heces adultas humanas y usarse en una composición de la invención.

35 En algunas realizaciones, la una o más cepas bacterianas de *Blautia* es/son el único agente(s) terapéuticamente activo en una composición de la invención. En algunas realizaciones, la(s) cepa(s) bacteriana(s) en la composición es/son el único agente(s) terapéuticamente activo en una composición de la invención.

40 Las composiciones para su uso de acuerdo con la invención pueden o no requerir aprobación de comercialización.

45 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que dicha cepa bacteriana se liofiliza. En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que dicha cepa bacteriana se seca por pulverización. En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que la cepa bacteriana se liofiliza o se seca por pulverización y en la que está viva. En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que la cepa bacteriana se liofiliza o se seca por pulverización y en la que es viable. En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que la cepa bacteriana se liofiliza o se seca por pulverización y en la que es capaz de colonizar parcial o totalmente el intestino. En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que la cepa bacteriana se liofiliza o se seca por pulverización y en la que es viable y capaz de colonizar parcial o totalmente el intestino.

50 En algunos casos, la cepa bacteriana liofilizada o secada por pulverización se reconstituye antes de la administración. En algunos casos, la reconstitución es mediante el uso de un diluyente descrito en la presente.

55 Las composiciones de la invención pueden comprender excipientes, diluyentes o portadores farmacéuticamente aceptables.

60 En ciertas realizaciones, la invención proporciona una composición farmacéutica que comprende: una cepa bacteriana como se define en las reivindicaciones; y un excipiente, portador o diluyente farmacéuticamente

65

5 acceptable; en la que la cepa bacteriana está en una cantidad suficiente para reducir los niveles de *Enterobacteriaceae* y/o tratar un trastorno asociado con niveles elevados de *Enterobacteriaceae* cuando se administra a un sujeto con necesidad de ello; y en donde el trastorno está asociado con niveles elevados de *Enterobacteriaceae*, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional o, más preferiblemente, SII o diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal.

10 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en donde la cantidad de la cepa bacteriana es de aproximadamente 1×10^3 a aproximadamente 1×10^{11} unidades formadoras de colonias por gramo con respecto a un peso de la composición.

15 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en donde la composición se administra a una dosis de 1 g, 3 g, 5 g o 10 g.

20 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en donde la composición se administra mediante un método seleccionado del grupo que consiste de oral, rectal, subcutáneo, nasal, bucal y sublingual.

25 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, que comprende un portador seleccionado del grupo que consiste de lactosa, almidón, glucosa, metilcelulosa, estearato de magnesio, manitol y sorbitol.

30 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, que comprende un diluyente seleccionado del grupo que consiste de etanol, glicerol y agua.

35 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, que comprende un excipiente seleccionado del grupo que consiste de almidón, gelatina, glucosa, lactosa anhidra, lactosa de flujo libre, beta-lactosa, edulcorante de maíz, acacia, tragacanto, alginato de sodio, carboximetilcelulosa, polietilenglicol, oleato de sodio, estearato de sodio, estearato de magnesio, benzoato de sodio, acetato de sodio y cloruro de sodio.

40 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, que comprende además por lo menos uno de un conservante, un antioxidante y un estabilizante.

45 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, que comprende un conservante seleccionado del grupo que consiste de benzoato de sodio, ácido sórbico y ésteres de ácido p-hidroxibenzoico.

50 En ciertas realizaciones, se proporciona la composición farmacéutica de la invención, en donde la composición no comprende ningún mineral, o más específicamente, no comprende ningún metal con un número atómico mayor que 33, por ejemplo, en donde la composición no comprende ningún mineral del grupo que consiste de selenio, molibdeno, tungsteno, compuestos de selenio, compuestos de molibdeno y compuestos de tungsteno.

55 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en la que dicha cepa bacteriana está liofilizada.

60 En ciertas realizaciones, la invención proporciona la composición farmacéutica anterior, en donde cuando la composición se almacena en un recipiente sellado a aproximadamente 4° C o aproximadamente 25° C y el recipiente se coloca en una atmósfera que tiene un 50% de humedad relativa, por lo menos el 80% de la cepa bacteriana medida en unidades formadoras de colonias, permanece después de un período de por lo menos aproximadamente 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 1,5 años, 2 años, 2,5 años o 3 años.

65 En algunas realizaciones, la composición de la invención se proporciona en un recipiente sellado que comprende una composición como se describe en la presente. En algunas realizaciones, el recipiente sellado es una bolsita o una botella. En algunas realizaciones, la composición de la invención se proporciona en una jeringuilla que comprende una composición como se describe en la presente.

La composición de la presente invención puede, en algunas realizaciones, proporcionarse como una formulación farmacéutica. Por ejemplo, la composición puede proporcionarse como un comprimido o cápsula. En algunas realizaciones, la cápsula es una cápsula de gelatina ("gel-cap").

60 En algunas realizaciones, las composiciones de la invención se administran por vía oral. La administración oral puede involucrar tragar, de tal manera que el compuesto se introduzca en el tracto gastrointestinal y/o la administración bucal, lingual o sublingual por medio de la cual el compuesto se introduce en el torrente sanguíneo directamente desde la boca.

65 Las formulaciones farmacéuticas adecuadas para administración oral incluyen tapones sólidos,

5 micropartículas sólidas, semisólidos y líquidos (incluyendo sistemas de múltiples fases o dispersos) como comprimidos; cápsulas blandas o duras que contienen multi- o nanopartículas, líquidos (por ejemplo, soluciones acuosas), emulsiones o polvos; grageas (incluyendo las rellenas de líquido); goma de mascar; geles; formas de dosificación de dispersión rápida; películas; óvulos; espráis y parches bucales/mucoadhesivos.

10 En algunas realizaciones, la formulación farmacéutica es una formulación entérica, es decir, una formulación gastro-resistente (por ejemplo, resistente al pH gástrico) que es adecuada para el suministro de la composición de la invención al intestino mediante administración oral. Las formulaciones entéricas pueden ser particularmente útiles cuando la bacteria u otro componente de la composición es sensible al ácido, por ejemplo, propenso a la degradación en condiciones gástricas.

15 En algunas realizaciones, la formulación entérica comprende un recubrimiento entérico. En algunas realizaciones, la formulación es una forma de dosificación con recubrimiento entérico. Por ejemplo, la formulación puede ser un comprimido con recubrimiento entérico o una cápsula con recubrimiento entérico, o similar. El recubrimiento entérico puede ser un recubrimiento entérico convencional, por ejemplo, un recubrimiento convencional para un comprimido, cápsula o similar para administración oral. La formulación puede comprender un recubrimiento de película, por ejemplo, una capa de película delgada de un polímero entérico, por ejemplo, un polímero insoluble en ácido.

20 En algunas realizaciones, la formulación entérica es intrínsecamente entérica, por ejemplo, gastro-resistente sin la necesidad de un recubrimiento entérico. Por tanto, en algunas realizaciones, la formulación es una formulación entérica que no comprende un recubrimiento entérico. En algunas realizaciones, la formulación es una cápsula hecha de un material termo-gelificante. En algunas realizaciones, el material termo-gelificante es un material celulósico, como metilcelulosa, hidroximetilcelulosa o hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC). En algunas realizaciones, la cápsula comprende una cáscara que no contiene ningún polímero formador de película. En algunas realizaciones, la cápsula comprende una cáscara y la cáscara comprende hidroxipropilmetilcelulosa y no comprende ningún polímero formador de película (por ejemplo, ver [xxxii]). En algunas realizaciones, la formulación es una cápsula intrínsecamente entérica (por ejemplo, Vcaps® de Capsugel).

30 En algunas realizaciones, la formulación es una cápsula blanda. Las cápsulas blandas son cápsulas que, debido a las adiciones de ablandadores, como, por ejemplo, glicerol, sorbitol, maltitol y polietilenglicoles, presentes en la cáscara de la cápsula, tienen una cierta elasticidad y suavidad. Las cápsulas blandas pueden producirse, por ejemplo, a base de gelatina o almidón. Las cápsulas blandas a base de gelatina están disponibles comercialmente de varios proveedores. Dependiendo del método de administración, como por ejemplo, por vía oral o rectal, las cápsulas blandas pueden tener varias formas, pueden ser, por ejemplo, redondas, ovaladas, oblongas o en forma de torpedo. Las cápsulas blandas pueden producirse mediante procesos convencionales, como, por ejemplo, el proceso de Scherer, el proceso de Accogel o el proceso de gotitas o soplado.

40 **Métodos de cultivo**

Las cepas bacterianas para su uso en la presente invención pueden cultivarse usando técnicas de microbiología estándar como se detalla, por ejemplo, en las referencias [xxxiii-xxxv].

45 El medio sólido o líquido usado para el cultivo puede ser, por ejemplo, agar YCFA o medio YCFA. El medio YCFA puede incluir (por 100 ml, valores aproximados): Casitona (1,0 g), extracto de levadura (0,25 g), NaHCO₃ (0,4 g), cisteína (0,1 g), K₂HPO₄ (0,045 g), KH₂PO₄ (0,045 g), NaCl (0,09 g), (NH₄)₂SO₄ (0,09 g), MgSO₄ · 7H₂O (0,009 g), CaCl₂ (0,009 g), resazurina (0,1 mg), hemina (1 mg), biotina (1 µg), cobalamina (1 µg), ácido *p*-aminobenzoico (3 µg), ácido fólico (5 µg) y piridoxamina (15 µg).

50 **General**

55 La puesta en práctica de la presente invención empleará, a menos que se indique lo contrario, métodos convencionales de química, bioquímica, biología molecular, inmunología y farmacología, dentro de los conocimientos de la técnica. Tales técnicas se explican completamente en la literatura. Ver, por ejemplo, referencias [xxxvi- xliii], etc.

El término "comprende" abarca "incluye" así como "consiste", por ejemplo una composición "que comprende" X puede consistir exclusivamente de X o puede incluir algo adicional, por ejemplo X + Y.

60 El término "aproximadamente" en relación con un valor numérico x es opcional y significa, por ejemplo, x ± 10%.

65 La palabra "sustancialmente" no excluye "completamente", por ejemplo, una composición que está "sustancialmente libre" de Y puede estar completamente libre de Y. Cuando sea necesario, la palabra "sustancialmente" puede omitirse de la definición de la invención.

Las referencias a un porcentaje de identidad de secuencia entre dos secuencias de nucleótidos significa que, cuando se alinean, ese porcentaje de nucleótidos es el mismo en la comparación de las dos secuencias. Esta alineación y el porcentaje de homología o identidad de secuencia pueden determinarse usando programas de software conocidos en la técnica, por ejemplo, los descritos en la sección 7.7.18 de la ref. [xliv]. Una alineación preferida se determina por el algoritmo de búsqueda de homología de Smith-Waterman usando una búsqueda de huecos afines con una penalización de apertura de hueco de 12 y una penalización de extensión de hueco de 2, una matriz BLOSUM de 62. El algoritmo de búsqueda de homología de Smith-Waterman se divulga en la ref. [xliv].

A menos que se indique específicamente, un proceso o método que comprende numerosos pasos puede comprender pasos adicionales al principio o al final del método, o puede comprender pasos intermedios adicionales. Además, los pasos pueden combinarse, omitirse o realizarse en un orden alternativo, si es apropiado.

En la presente se describen varias realizaciones de la invención. Se apreciará que las características especificadas en cada realización pueden combinarse con otras características especificadas, para proporcionar realizaciones adicionales. En particular, las realizaciones resaltadas en la presente como adecuadas, típicas o preferidas pueden combinarse entre sí (excepto cuando sean mutuamente excluyentes).

MODOS PARA LLEVAR A CABO LA INVENCION

Ejemplo 1 - Administración de inóculos bacterianos en ratas que albergan microbiota intestinal de SII

Resumen

Las ratas se inocularon con la microbiota fecal de un sujeto con SII humano. A las ratas se les administró luego composiciones que comprenden cepas bacterianas de acuerdo con la invención y se analizó la colonización por *Blautia hydrogenotrophica*.

Cepa

Cepa de *Blautia hydrogenotrophica* (BH) DSM 10507/14294.

Composiciones y administración.

Liofilizado de BH: administrado por alimentación forzada oral
Solución de control administrada por alimentación forzada oral.

Ratas

Inoculadas con microbiota intestinal humana de un sujeto con SII.

Diseño del estudio

Día -14 - ratas inoculadas con microbiota intestinal humana de un sujeto con SII
Días 0 a 28 - dosis diaria de liofilizado de BH, o solución de control
Días 0, 14 y 28 - qPCR de la población de BH en muestras fecales

Resultados

La Figura 1 presenta los resultados de un análisis de qPCR de la población de BH en muestras fecales de ratas a las que se administró una solución de control (SII) o liofilizado de BH (SII + BH). Se observó un aumento en la población de BH en los días 14 y 28 en ratas que recibieron el liofilizado de BH, lo que confirma la colonización con éxito.

Conclusiones

La administración de composiciones que comprenden *Blautia hydrogenotrophica* llevo a una colonización con éxito.

Ejemplo 2 - administración de liofilizado bacteriano a ratas sanas y efecto sobre Enterobacteriaceae

Se estudiaron los efectos de la administración de un liofilizado de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* (BH) DSM 10507/14294 en ratas HIM sanas y los resultados se informan en las Figuras 2-5. Detalles adicionales sobre los experimentos se proporcionan más arriba en las descripciones de las figuras. La Figura 2 muestra que una dosis apropiada para BH en ratas es de 10^9 células por día o más. La figura 3 muestra que en estos experimentos

BH no colonizó permanentemente el tracto digestivo de la rata. La figura 4 muestra que la BH se encuentra principalmente en el ciego. Sorprendentemente, la Figura 5 muestra que la administración de BH induce una reducción estadísticamente significativa de *Enterobacteriaceae* en heces de rata como se detecta por qPCR.

5 Ejemplo 3 - Administración de liofilizado bacteriano en un modelo de rata de SII

Se investigaron más a fondo los efectos de la administración de un liofilizado de la cepa de *Blautia hydrogenotrophica* (BH) DSM 10507/14294 sobre un modelo de rata con SII. Se inoculó a ratas libres de gérmenes con muestras fecales de pacientes de C-SII (con estreñimiento) o con U-SII (sin alterar). Los resultados se informan en la Figura 6 y detalles adicionales sobre los experimentos se proporcionan más arriba en las descripciones de las figuras. La Figura 6 confirma que la administración del liofilizado de BH provoca una reducción estadísticamente significativa en las *Enterobacteriaceae*, que es principalmente *E. coli*. Como era de esperar, también se observa un aumento en BH.

15 Ejemplo 4 - Comparación de *Blautia hydrogenotrophica* de la microbiota de los pacientes

Se realizó un ensayo clínico de Fase I en el que se administró *Blautia hydrogenotrophica* ("Blautix", cepa depositada con el número de acceso DSM 10507/14294) a pacientes humanos con síndrome de intestino irritable (SII). A los pacientes se les administró Blautix durante un período de dosificación (días 1-16), siendo el período de reposo siendo el día 19-23. Se encontró el Blautix tanto seguro como bien tolerado. La *Blautia hydrogenotrophica* (Blautix) de la microbiota del paciente se midió el día 1, el día 16 y al final del estudio (EOS) con los siguientes resultados:

Tabla 1:

Paciente	Tratamiento	Blautix día 1		Blautix día 16		Blautix EOS	
		Media	SD	Media	SD	Media	SD
Placebo	Sano	4.30E + 07	8.40E + 07	4.79E + 07	7.63E + 07	3.59E + 07	6.23E + 07
Blautix	Sano	2.92E + 07	2.25E + 07	6.35E + 07	1.02E + 08	2.58E + 07	3.34E + 07
Placebo	SII	3.58E + 07	3.45E + 07	2.44E + 07	3.13E + 07	2.09E + 07	2.47E + 07
Blautix	SII	3.17E + 07	6.28E + 07	8.53E + 07	1.57E + 08	3.71E + 07	5.56E + 07

El análisis muestra tendencias en los niveles de *Blautia hydrogenotrophica* en muestras de heces de pacientes (ver Figura 7a). Los participantes que reciben Blautix tienen niveles aumentados de bacterias en sus muestras de heces después del período de dosificación (día 16). Esto demuestra el suministro con éxito de Blautix al intestino. Los niveles vuelven a la normalidad después del período de reposo (Fin del estudio; EOS). Por tanto, Blautix no coloniza permanentemente el intestino una vez que cesa la dosificación. Ambas observaciones concuerdan con el modelo pre-clínico.

40 Ejemplo 5 - Comparación de *Enterobacteriaceae* de la microbiota de los pacientes.

Las *Enterobacteriaceae* de la microbiota de los pacientes también se midieron durante el ensayo clínico de Fase I el día 1, el día 16 y al final del estudio con los siguientes resultados:

Paciente	Tratamiento	Enterobacteriaceae Día 1		Enterobacteriaceae Día 16		Enterobacteriaceae EOS	
		Media	SD	Media	SD	Media	SD
Placebo	Sano	5.89E + 08	1.00E + 09	3.32E + 08	6.26E + 08	2.85E + 08	4.28E + 08
Blautix	Sano	9.96E + 08	1.06E + 09	4.87E + 08	6.64E + 08	2.70E + 08	3.76E + 08
Placebo	SII	7.85E + 08	1.28E + 09	3.01E + 08	4.92E + 08	2.45E + 09	2.45E + 09
Blautix	SII	8.38E + 09	1.96E + 10	1.12E + 09	1.45E + 09	6.17E + 08	9.91E + 08

El análisis muestra tendencias en los niveles de *Enterobacteriaceae* en muestras de heces de pacientes (ver Figura 7b). Los pacientes con SII tratados con Blautix tuvieron una reducción de las *Enterobacteriaceae*. Esto es consistente con las observaciones del modelo preclínico.

60 Ejemplo 6 - Resultados de la prueba de aliento de hidrógeno

Los niveles de hidrógeno del aliento son un biomarcador de la actividad Blautix - MoA implica el metabolismo de H₂ endógeno para producir acetato. A los sujetos humanos se les administró lactulosa y se muestrearon los niveles de hidrógeno (H₂) (Cmax) en cuatro puntos temporales: día 1, día 2, día 15 y día 16. Los resultados no corregidos con hidrógeno se convirtieron a resultados corregidos con hidrógeno.

Algunos pacientes se excluyeron del análisis. Hubo tres razones por las que un sujeto no se incluyó en el análisis de la prueba de aliento de hidrógeno: 1) Produjeron un resultado de prueba de aliento de hidrógeno CMAX de <20 en uno de los cuatro días de muestreo y, por lo tanto, se consideró que no habían respondido a la prueba; 2) Eran productores de metano (entendido como que producían más metano que hidrógeno en la prueba de aliento), esto afecta la respuesta del hidrógeno; y/o 3) hubo un valor aberrante obtenido en la prueba de aliento de hidrógeno (232 ppm). Los sujetos 3.12 (Blautix), 3.24 (Blautix), 4.07 (Blautix) fueron excluidos como no respondedores. Los sujetos 3.03 (Blautix) y 3.08 (Placebo) fueron excluidos como productores de metano (4.07, mencionado como excluido anteriormente, también era un productor de metano). El sujeto 4.09 (Placebo) se excluyó debido a un valor aberrante.

Los resultados del análisis de hidrógeno corregido desde el final del período de dosificación (día 15/16) se compararon con los del valor de referencia (día 1/2). 10 de los 12 pacientes (83%) que recibieron Blautix tuvieron una reducción en los niveles de hidrógeno durante este período (Figura 8a y 8c). Por el contrario, 3 de 6 (50%) pacientes que recibieron placebo tuvieron niveles de hidrógeno reducidos (Figura 8b y 8c).

La Figura 9 muestra los resultados de hidrógeno no corregidos y corregidos para el grupo de tratamiento con Blautix (Verum) junto con un análisis estadístico de los resultados. Se encontró que los valores medios tanto de H₂ no corregido como corregido difieren entre el día 1 y el día 15. Después de 13,5 días de tratamiento, se detectó una disminución estadísticamente significativa ($p < 0,05$) de H₂ en Cmax de la prueba de aliento después de la estimulación con lactulosa. Por el contrario, para el grupo placebo, se encontró que la media era equivalente para el día 1 y el día 15 ($p > 0,05$) (Figura 10). Por lo tanto, la media para el grupo de tratamiento (también referido como el grupo VERUM), disminuye entre el día 1 y el día 15, mientras que la media para el grupo de placebo es equivalente entre el día 1 y el día 15 tanto para los resultados de hidrógeno no corregidos como para los resultados de hidrógeno corregidos (Figura 11).

Ejemplo 7 - Pruebas de estabilidad

Una composición descrita en la presente que contiene por lo menos una cepa bacteriana descrita en la presente se almacena en un recipiente sellado a 25° C o 4° C y el recipiente se coloca en una atmósfera que tiene un 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 90% o 95% de humedad relativa. Después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 1,5 años, 2 años, 2,5 años o 3 años, permanecerá por lo menos el 50%, 60%, 70%, 80% o 90% de la cepa bacteriana como se mide en unidades formadoras de colonias determinadas por protocolos estándar.

Ejemplo 8 - La capacidad de *B. hydrogenotrophica* para alterar la microbiota en el modelo de rata asociado a microbiota humana (rata HMA)

Resumen

Se inocularon grupos de 16 ratas libres de gérmenes (que comprenden 8 ratas en el grupo control y 8 ratas en el grupo de tratamiento) con la microbiota fecal de un sujeto con SII humano (ratas SII-HMA). Se llevaron a cabo tres experimentos sucesivos usando muestras fecales de 3 pacientes con SII diferentes. Otros dos grupos de ratas ($n = 10$) se inocularon con muestras fecales de sujetos sanos ($n = 2$ sujetos; 2 grupos de ratas HMA sanas) como control. Por tanto, había 24 ratas asociadas con microbiota de SII (control), 24 ratas asociadas con microbiota de SII tratadas con Blautix y 20 ratas asociadas con microbiota sana. La mitad de las ratas SII-HMA se administraron durante 28 días con una composición que comprende la cepa bacteriana de *B. hydrogenotrophica* de acuerdo con la invención, mientras que la otra mitad de los animales recibió una solución de control. El día 28 después de la administración, se analizaron los niveles de microorganismos de la microbiota fecal, que se habían encontrado previamente afectados en pacientes con SII.

Cepa

Cepa de *Blautia hydrogenotrophica* (BH) DSM 10507^T/14294.

Composición y administración

El liofilizado de BH se suspendió en solución mineral estéril a una concentración de 10¹⁰ bacterias por ml. Dos ml de esta suspensión se administraron diariamente por rata SII-HMA, por alimentación forzada oral, durante un período de 28 días.

La solución de control fue la solución mineral estéril que se administró diariamente (2 ml por rata) por alimentación forzada oral al grupo de control de ratas SII-HMA.

Ratas

Se inocularon ratas Fisher macho libres gérmenes (de 10 semanas de edad) con microbiota fecal humana de un sujeto con SII (ratas SII-HMA). Se inocularon dieciséis ratas con el mismo inóculo fecal humano. Se realizaron tres experimentos sucesivos con muestras fecales de tres sujetos con SII diferentes. Otros dos grupos de ratas se inocularon con una muestra fecal de 2 sujetos sanos (grupos de control de sensibilidad normal).

Diseño del estudio

Día -14 - Inoculación de ratas libres de gérmenes con microbiota fecal humana.
 Días 0 a 28 - Dosis diaria de liofilizado de BH (grupo de ensayo) o solución de control (grupo de control) mediante alimentación forzada oral
 Días 0, 14 y 28 - Recogida de muestras fecales para análisis microbiano: qPCR para evaluar la población de BH y otros grupos comensales de microorganismos y enumeración de grupos funcionales de microorganismos usando medios selectivos y método estrictamente anaeróbico.

Resultados

La **Figura 12** presenta los resultados del análisis qPCR de la población de *B. hydrogenotrophica* en muestras fecales de ratas SII-HMA que recibieron una solución de control o liofilizado de BH. Se observó un aumento significativo en la población de BH al final del período de administración (D 28) en ratas que recibieron el liofilizado de BH, lo que confirma la administración con éxito de BH en el colon.

La **Figura 13** informa sobre el efecto de la administración de *B. hydrogenotrophica* sobre ciertos microorganismos en la microbiota fecal, que anteriormente se había encontrado afectada en pacientes con SII. El nivel de especies de *Enterobacteriaceae* disminuyó después de la administración de *B. hydrogenotrophica*.

Conclusiones

La administración de *Blautia hydrogenotrophica* dio como resultado a una reducción de las *Enterobacteriaceae*.

Ejemplo 9 - Cambios en los síntomas de los pacientes durante el ensayo clínico de Fase I

Se realizó un ensayo clínico de Fase I en el que se administró *Blautia hydrogenotrophica* ("Blautix", cepa depositada con el número de acceso DSM 10507 y también con el número de acceso DSM 14294) a pacientes humanos que tenían síndrome del intestino irritable (SII). A los pacientes se les administró Blautix durante un período de dosificación (días 1-16), siendo el período de reposo siendo el día 19-23. Se encontró que el Blautix era tanto seguro como bien tolerado. Se monitorizaron cuatro síntomas, de los cuales uno era diarrea. El estudio registró si los pacientes experimentaron una mejora, ningún cambio o empeoramiento de cada uno de estos síntomas. Los resultados de los pacientes a los que se administró Blautix se compararon con los obtenidos usando pacientes a los que se les administró un placebo. Los síntomas fueron monitorizados en tres puntos temporales: día 1, día 15/16 y al final del estudio. Los resultados se muestran en las Figuras 14 y 15.

Cuando los síntomas informados por los pacientes en el día 16 se compararon con los valores de referencia del día 1, el 82% de los 17 pacientes con SII que recibieron Blautix informaron de una mejora en los síntomas (Figura 14). La mejora de los síntomas, de los cuales uno era diarrea, apoya el uso de Blautix para tratar o prevenir la diarrea.

El 50% de los pacientes que recibieron placebo informaron de una mejora de los síntomas (Figura 14). Las altas tasas de respuesta al placebo son un fenómeno establecido en los estudios clínicos de SII. El Xifaxan se aprobó recientemente para tratar el SII en base a mejoras mucho más pequeñas que el placebo (ver: <http://www.accessdata.fda.gov/spl/data/5ab6fceb-4d22-4480-81fc-8bc28c16770d/5ab6fceb-4d22-4480-81fc-8bc28c16770d.xml>).

Se espera un empeoramiento de los síntomas al finalizar el estudio (día 19-23) en comparación con los síntomas presentes tras finalizar la dosificación (día 16) en base a las enseñanzas presentadas en el presente. Este empeoramiento de los síntomas se observó en el ensayo clínico de Fase I: el 41% de los pacientes con SII informaron de un empeoramiento de los síntomas después del cese de la dosificación con Blautix (Figura 15). El empeoramiento de los síntomas, uno de los cuales es la diarrea, después del cese de la dosificación con Blautix, también apoya el uso de Blautix para tratar o prevenir la diarrea.

Secuencias

SEQ ID NO: 1 (gen de ARN 16S ribosómico de la cepa GAM6-1 de *Blautia stercoris*, secuencia parcial - HM626177)

ES 2 719 837 T3

1 tgcaagtcga gcgaagcgct tacgacagaa ccttcggggg aagatgtaag ggactgagcg
 61 gcgagcgggt gagtaacgag tgggtaacct gcctcataca gggggataac agttggaaac
 121 ggctgctaata accgcataag cgcacgggat cgcatagatac agtgtgaaaa actccgggtgg
 5 181 tatgagatgg acccgcgtct gattagctag ttggaggggt aacggcccac caaggcgagc
 241 atcagtagcc ggctgagag ggtgaacggc cacattggga ctgagacacg gccagactc
 301 ctacgggagg cagcagtgag gaatattgca caatggggga aaccctgatg cagcgacgcc
 10 361 gcgtgaagga agaagtatct cggatagtaa acttctatca gcagggaaga aaatgacggt
 421 acctgactaa gaagccccgg ctaactacgt gccagcagcc gcggaatac gtagggggca
 481 agcgttatcc ggatttactg ggtgtaaagg gagcgtagac ggaagagcaa gtctgatgtg
 15 541 aaaggctggg gcttaacccc aggactgcat tggaaactgt ttttcttgag tgccggagag
 601 gtaagcggaa ttcctagtgt agcggtgaaa tgcgtagata ttaggaggaa caccagtggc
 661 gaagcgggct tactggacgg taactgacgt tgaggctcga aagcgtgggg agcaaacagg
 20 721 attagatacc ctggtagtcc acgcgtaaa cgatgaatac taggtgttg ggagcaaagc
 781 tcttcgggtgc cgcagcaaac gcaataagta tccacactgg ggagtacgtt cgcaagaatg
 841 aaactcaaag gaattgacgg ggaccgcac aagcggtgga gcatgtggtt taattcgaag
 901 caacgcgaag aacctacca agtcttgaca tcgatctgac cggttcgtaa tggaaacctt
 25 961 ccttcgggac agagaagaca ggtggtgcat ggttgctgct agctcgtgct gtgagatggt
 1021 gggttaagtc ccgcaacgag cgcaaccctc atcctcagta gccagcaggt gaagctgggc
 1081 actctgtgga gactgccagg gataacctgg aggaaggcgg ggacgacgct aaatcatcat
 30 1141 gcccttatg atttgggcta cacacgtgct acaatggcgt aaacaaaggg aagcgagccc
 1201 gcgaggggga gcaaatccca aaaataacgt cccagttcgg actgcagtct gcaactcgac
 1261 tgcacgaagc tggaatcgct agtaatcgag aatcagaatg tcgcggtgaa tacgttcccg
 35 1321 ggtctgtgac acaccgcccg tcacaccatg ggagtcagta acgcccgaag tc

SEQ ID NO:2 (gen de ARN 16S ribosómico de la cepa WAL 14507 de *Blautia wexlerae*, secuencia parcial - EF036467)

40 1 caagtgcgaac ggaattant ttattgaaac ttcggctgat ttaatttaat tctagtggcg
 61 gacgggtgag taacgcgtgg gtaacctgcc ttatacaggg ggataacagt cagaaatggc
 121 tgctaatacc gcataagcgc acagagctgc atggctcagt gtgaaaaact ccggtggtat
 45 181 aagatggacc cgcgttggat tagcttgttg gtggggtaac ggcccacaa ggcgacgatc
 241 catagccggc ctgagagggg gaacggccac attgggactg agacacggcc cagactccta
 301 cgggaggcag cagtggggaa tattgcacaa tgggggaaac cctgatgcag cgacgccgag
 361 tgaaggaaga agtatctcgg tatgtaaact tctatcagca ggaagatag tgacggtacc
 50 421 tgactaagaa gccccggcta actacgtgcc agcagccgag gtaatacgtg gggggcaagc
 481 gttatccgga tttactgggt gtaaaggag cgtagacggg gtggcaagtc tgatgtgaaa
 541 ggcatgggct caacctgtgg actgcattgg aaactgtcat acttgagtgc cggaggggta
 55 601 agcgggaattc ctagtgtagc ggtgaaatgc gtagatatta ggaggaacac cagtggcgaa
 661 ggcggttac tggacggtaa ctgacgttga ggctcgaag cgtggggagc aaacaggatt
 721 agataccctg gtagtccacg ccgtaaacga tgaataacta ggtgtcgggt ggcaaagcca
 60
 65

781 ttcggtgccg tcgcaaacgc agtaagtatt ccacctgggg agtacgttcg caagaatgaa
 841 actcaaagga attgacgggg acccgcacaa gcggtggagc atgtggttta attcgaagca
 901 acgcgaagaa ccttaccaag tcttgacatc cgcctgaccg atccttaacc ggatctttcc
 5 961 ttcgggacag gcgagacagg tgggtgcatgg ttgtcgtcag ctcgtgctgt gagatggttg
 1021 gttaagtccc gcaacgagcg caaccctat cctcagtagc cagcatttaa ggtgggact
 1081 ctggggagac tgccagggat aacctggagg aaggcgggga tgacgtcaaa tcatcatgcc
 10 1141 ccttatgatt tgggctacac acgtgctaca atggcgtaaa caaagggag cgagattgtg
 1201 agatggagca aatcccaaaa ataacgtccc agttcggact gtagtctgca acccgactac
 1261 acgaagctgg aatcgctagt aatcgcgat cagaatgccg cggatgaatac gttcccgggt
 15 1321 cttgtacaca ccgccgtca caccatggga gtcagtaacg cccgaagta gtgacctaac
 1381 tgcaaagaag gagctgccga aggccgggacc gatgactggg gtgaagtcgt aacaaggt

SEQ ID NO:3 (Secuencia de ARNr 16S de consenso para cepa 830 de *Blautia stercoris*)

20 TTTKGTCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAGCGAAGCGCTTACGACAGAACCTT
 CGGGGGAAGATGTAAGGGACTGAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGTAACCTGCCTCATAACGGGGGATAACA
 GTTGGAAAACGGCTGCTAATACCGCATAAGCGCACAGTATCGCATGATACAGTGTGAAAACTCCGGTGGTATGAGAT
 25 GGACCCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGA
 ACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAA
 CCCTGATGCAGCGACGCCGCTGAAGGAAGAAGTATCTCGGTATGTAAACTTCTATCAGCAGGGAAGAAAATGACGG
 TACCTGACTAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTT
 30 ACTGGGTGTAAAAGGAGCGTAGACGGAAGAGCAAGTCTGATGTGAAAGGCTGGGGCTTAACCCAGGACTGCATTGG
 AAACTGTTTTTCTTGAGTGCCGGAGAGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAA
 CACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGAGCAAACAGGATTAGAT
 35 ACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGGTGTTGGGGAGCAAAGCTCTTCGGTGCCGCAGCAAACGCAA
 TAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAG
 CATGTGGTTTTATTTCGAAGCAACGCGAAGAACCCTTACCAAGTCTTGACATCGATCTGACCGGTTTCGTAATGGAACCTT
 40 TCCTTCGGGACAGAGAAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCACAA
 CGAGCGCAACCCCTATCGTACAGTACGAGGTAAGCTGGGCACCTGAGGAGACTGCCAGGGATAACCTGGAGG
 AAGCGGGGACGACGTCAAATCATCATGCCCTTATGATTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGG
 AAGCGAGCCCCGCGAGGGGGAGCAAATCCCAAAAATAACGTCCCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGA
 45 AGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGTCTTGTACACACCGCCCGTCAC
 ACCATGGGAGTCAGTAACGCCGAAGTCAGTGACCCAACCTTAGGGAGGGAGCTGCCGAAGGCGGGATTGATAACTG
 GGGTGAAGTCTAGGGGGT

SEQ ID NO:4 (secuencia de ARNr 16S de consenso para la cepa MRX008 de *Blautia wexlerae*)

TTCATTGAGACTTCGGTGGATTTAGATTCTATTTCTAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGTAACCTGCCTTAT
 55 ACAGGGGGATAACAGTCAGAAATGGCTGCTAATACCGCATAAGCGCACAGAGCTGCATGGCTCAGTGTGAAAACTC
 CGGTGGTATAAGATGGACCCGCTTGGATTAGCTTGTGGTGGGGTAACGGCCACCAAGGCGACGATCCATAGCCG
 GCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTTGGGACTGAGACACGGCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTG
 CACAATGGGGGAAACCTGATGCAGCGACGCCGCTGAAGGAAGAAGTATCTCGGTATGTAAACTTCTATCAGCAGG
 60 GAAGATAGTGACGGTACCTGACTAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGTAATACGTAGGGGGCAAG

65

CGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGTGTGGCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGCTCAACCT
 GTGGACTGCATTGGAACTGTCATACTTGAGTGCCGGAGGGGTAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTA
 5 GATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGGTAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGC
 AAACAGGATTAGATAACCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGGTGTCNNGGGAGCATGGCTCTTCGGTG
 CCGTCGCAAACGCAGTAAGTATTCACCTGGGGAGTACGTTGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCC
 GCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCGCCTGACCGA
 10 TCCTTAACCGGATCTTTCCTTCGGGACAGGCGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTGCTGAGATGTT
 GGGTTAAGTCCCACAACGAGCGCAACCCCTATCCTCAGTAGCCAGCATTTAAGGTGGGCACTCTGGGGAGACTGCCA
 GGGATAACCTGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTATGATTTGGGCTACACACGTGCTACAAT
 15 GCGTAAACAAAAGGAAGCGAGATCGTGAGATGGAGCAAATCCCAAAAATAACGTCCAGTTCGGACTGTAGTCTGC
 AACCCGACTACACGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGAATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTA
 CACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCAGTAACGCCCGAAGTCAGTGACCTAACTGCAAAGAAGGAGCTGCCGAA

20 SEQ ID NO:5 (gen de ARN ribosómico 16S de la cepa S5a36 de *Blautia hydrogenotrophica*, secuencia parcial - X95624.1)

1 gatgaacgct ggcggcgtgc ttaacacatg caagtcgaac gaagcgatag agaacggaga
 25 61 tttcggttga agttttctat tgactgagtg gcgacgggt gagtaacgcy tgggtaacct
 121 gccctataca gggggataac agttagaaat gactgctaata accgcataag cgcacagctt
 181 cgcatagaagc ggtgtgaaaa actgaggtgg tataggatgg acccgcttg gattagctag
 241 ttggtgaggt aacggcccac caaggcgacg atccatagcc ggcctgagag ggtgaacggc
 30 301 cacattggga ctgagacacg gcccaactc ctacgggagg cagcagtggy gaatattgca
 361 caatggggga aaccctgatg cagcgacgcc gcgtgaagga agaagtatct cggtatgtaa
 421 acttctatca gcaggaaga aagtgacggt acctgactaa gaagccccgg ctaattacgt
 35 481 gccagcagcc gcgtaatac gtaaggggca agcgttatcc ggatltactg ggtgtaaagg
 541 gagcgtagac ggtttggcaa gtctgatgtg aaaggcatgg gctcaacctg tggactgcat
 601 tggaaactgt cagacttgag tgccggagag gcaagcggaa ttcctagtgt agcggtgaaa
 40 661 tgcgtagata ttaggaggaa caccagtggc gaaggcggcc tgctggacgg taactgacgt
 721 tgaggctcga aagcgtgggg agcaaacagg attagatacc ctggtagtcc acgctgtaaa
 781 cgatgaatac taggtgtcgg gtggcaaagc cttcgggtgc cgcagcaaac gcaataagta
 841 ttcccacctg gggagtacgt tcgcaagaat gaaactcaa ggaattgacg gggacccgca
 45 901 caagcggtyg agcatgtggt ttaattcgaa gcaacgcgaa gaaccttacc aaatcttgac
 961 atccctctga ccgggaagta atgttccctt ttcttcggaa cagaggagac aggtggtgca
 1021 tggttgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt tgggttaagt cccgcaacga gcgcaaccct
 50 1081 tattcttagt agccagcagg tagagctggg cactctaggg agactgccag ggataacctg
 1141 gaggaaggtg gggatgacgt caaatcatca tgccccctat gatttgggct acacacgtgc
 1201 tacaatggcg taaacaaagg gaagcgaagg ggtgacctgg agcaaatctc aaaaataacg
 55 1261 tctcagttcg gattgtagtc tgcaactcga ctacatgaag ctggaatcgc tagtaatcgc
 1321 gaatcagaat gtcgcggtga atacgttccc gggctcttga cacaccgcc gtcacacat
 1381 gggagtcagt aacgcccga gtcagtgacc caaccnaaag gagggagctg ccgaaggtg
 60 1441 gactgataac tggggtga

REFERENCIAS

- [i] Spor et al. (2011) Nat Rev Microbiol. 9(4):279-90.
 [ii] Eckburg et al. (2005) Science. 10;308(5728):1635-8.
 65 [iii] Tap et al. (2009), Environ Microbiol, 11(10):2574-84.

- [iv] Macpherson et al. (2001) *Microbes Infect.* 3(12):1021-35
 [v] Macpherson et al. (2002) *Cell Mol Life Sci.* 59(12):2088-96.
 [vi] Mazmanian et al. (2005) *Cell* 15;122(1):107-18.
 [vii] Frank et al. (2007) *PNAS* 104(34):13780-5.
 5 [viii] Scanlan et al. (2006) *J Clin Microbiol.* 44(11):3980-8.
 [ix] Kang et al. (2010) *Inflamm Bowel Dis.* 16(12):2034-42.
 [x] Machiels et al. (2013) *Gut.* 63(8):1275-83.
 [xi] Lopetuso et al. (2013), *Gut Pathogens*, 5: 23
 [xii] WO 2013/050792
 10 [xiii] WO 03/046580
 [xiv] WO 2013/008039
 [xv] WO 2014/167338
 [xvi] Lee and Lee (2014) *World J Gastroenterol.* 20(27): 8886-8897.
 [xvii] Liu et al. (2008) *Int J Syst Evol Microbiol* 58, 1896-1902.
 15 [xviii] Bernalier et al. (1996) *Arch. Microbiol.* 166 (3), 176-183.
 [xix] Masco et al. (2003) *Systematic and Applied Microbiology*, 26:557-563.
 [xx] Srutková et al. (2011) *J. Microbiol. Methods*, 87(1):10-6.
 [xxi] Darfeuille-Michaud et al. (2004) *Gastroenterology* 127(2):412-21.
 20 [xxii] Strus et al. (2015) *Cent Eur J Immunol.*40(4):420-30.
 [xxiii] Petersen et al. (2015) *Scand J Gastroenterol.*;50(10):1199-207.
 [xxiv] Miyamoto-Shinohara et al. (2008) *J. Gen. Appl. Microbiol.*, 54, 9-24.
 [xxv] Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols, ed. por Day and McLellan, Humana Press.
 [xxvi] Leslie et al. (1995) *Appl. Environ. Microbiol.* 61, 3592-3597.
 [xxvii] Mitropoulou et al. (2013) *JNutr Metab.* (2013) 716861.
 25 [xxviii] Kailasapathy et al. (2002) *Curr Issues Intest Microbiol.* 3(2):39-48.
 [xxix] *Handbook of Pharmaceutical Excipients*, 2ª Edición, (1994), Editado por A Wade and PJ Weller
 [xxx] *Remington's Pharmaceutical Sciences*, Mack Publishing Co. (A. R. Gennaro edit. 1985)
 [xxxi] US 2016/0067188
 [xxxii] *Handbook of Microbiological Media*, Cuarta Edición (2010) Ronald Atlas, CRC Press.
 30 [xxxiii] *Maintaining Cultures for Biotechnology and Industry* (1996) Jennie C. Hunter-Cevera, Academic Press
 [xxxiv] Strobel (2009) *Methods Mol Biol.* 581:247-61.
 [xxxv] Gennaro (2000) *Remington: The Science and Practice of Pharmacy*. 20ª edición, ISBN: 0683306472.
 [xxxvi] *Molecular Biology Techniques: An Intensive Laboratory Course*, (Ream et al., eds., 1998, Academic Press).
 35 [xxxvii] *Methods In Enzymology* (S. Colowick and N. Kaplan, eds., Academic Press, Inc.)
 [xxxviii] *Handbook of Experimental Immunology*, Vols. I-IV (D.M. Weir and C.C. Blackwell, eds, 1986, Blackwell Scientific Publications)
 [xl] Sambrook et al. (2001) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 3ª edición (Cold Spring Harbor Laboratory Press).
 40 [xli] *Handbook of Surface and Colloidal Chemistry* (Birdi, K.S. ed., CRC Press, 1997)
 [xlii] Ausubel et al. (eds) (2002) *Short protocols in molecular biology*, 5ª edición (Current Protocols).
 [xliii] *PCR (Introduction to Biotechniques Series)*, 2ª ed. (Newton & Graham eds., 1997, Springer Verlag)
 [xliv] *Current Protocols in Molecular Biology* (F.M. Ausubel et al., eds., 1987) Suplemento 30
 [xlv] Smith & Waterman (1981) *Adv. Appl. Math.* 2: 482-489.

45

LISTADO DE SECUENCIAS

50

<110> 4D PHARMA PLC

<120> COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS BACTERIANAS

<130> P068687WO

55

<141> 2017-03-06

<150> GB 1612190.7

<151> 2016-07-13

60

<150> GB 1616018.6

<151> 2016-09-20

<150> GB 1616016.0

<151> 2016-09-20

65

<150> GB 1703548.6
 <151> 2017-03-06

5 <150> GB 1703552.8
 <151> 2017-03-06

<160> 5

10 <170> SeqWin2010, versión 1.0

<210> 1
 <211> 1372
 <212> ADN
 <213> *Blautia stercoris*

15 <400> 1

18	tgcaagtcga	gcgaagcgct	tacgacagaa	ccttcggggg	aagatgtaag	ggactgagcg	60
19	gcfgacgggt	gagtaacgcg	tgggtaacct	gcctcataca	gggggataac	agttggaaac	120
20	ggctgctaata	accgcataag	cgcacgggat	cgcatgatac	agtgtgaaaa	actccgggtg	180
21	tatgagatgg	accgcgctct	gattagctag	ttggaggggt	aacggcccac	caaggcgacg	240
22	atcagtagcc	ggcctgagag	ggtgaacggc	caattggga	ctgagacacg	gcccagactc	300
23	ctacgggagg	cagcagtggg	gaatattgca	caatggggga	aaccctgatg	cagcgacgcc	360
24	gcgtgaagga	agaagtatct	cggtatgtaa	acttctatca	gcaggggaaga	aaatgacggg	420
25	acctgactaa	gaagccccgg	ctaactacgt	gccagcagcc	gcggtataac	gtagggggca	480
26	agcgttatcc	ggatttactg	ggtgtaaagg	gagcgtagac	ggaagagcaa	gtctgatgtg	540
27	aaaggctggg	gcttaacccc	aggactgcat	tggaaactgt	ttttcttgag	tgccggagag	600
28	gtaagcggaa	ttcctagtgt	agcggtgaaa	tgcgtagata	ttaggaggaa	caccagtggc	660
29	gaaggcggct	tactggacgg	taactgacgt	tgaggctcga	aagcgtgggg	agcaaacagg	720
30	attagatacc	ctggtagtcc	acgccgtaaa	cgatgaatac	taggtgttgg	ggagcaaagc	780
31	tcttcggtgc	cgcagcaaac	gcaataagta	ttccacctgg	ggagtacggt	cgcaagaatg	840
32	aaactcaaag	gaattgacgg	ggacccgcac	aagcggtgga	gcatgtggtt	taattcgaag	900
33	caacgcgaag	aaccttacca	agtcttgaca	tcgatctgac	cggttcgtaa	tggaaccttt	960
34	ccttcgggac	agagaagaca	ggtggtgcat	ggttgtcgtc	agctcgtgtc	gtgagatggt	1020
35	gggttaagtc	ccgcaacgag	cgcaaccctt	atcctcagta	gccagcaggt	gaagctgggc	1080
36	actctgtgga	gactgccagg	gataacctgg	aggaagcggg	ggacgacgtc	aatcatcat	1140
37	gccccttatg	atctgggcta	cacacgtgct	acaatggcgt	aaacaaagg	aagcgagccc	1200
38	gcgaggggga	gcaaatccca	aaaataacgt	cccagttcgg	actgcagtct	gcaactcgac	1260
39	tgcacgaagc	tggaatcgct	agtaatcgcg	aatcagaatg	tcgcggtgaa	tacgttccc	1320
40	ggtcttgtac	acaccgcccc	tcacaccatg	ggagtcagta	acgcccgaag	tc	1372

45 <210> 2
 <211> 1438
 <212> ADN
 <213> *Blautia wexlerae*

50 <220>
 <221> n
 <222> 19
 <223> 'n' es a, c, g o t

55 <400> 2

60

65

	caagtcgaac	gggaattant	ttattgaaac	ttcggtcgat	ttaatttaat	tctagtggcg	60
	gacgggtgag	taacgcgtgg	gtaacctgcc	ttatacaggg	ggataacagt	cagaaatggc	120
	tgctaatacc	gcataagcgc	acagagctgc	atggctcagt	gtgaaaaact	ccgggtggtat	180
5	aagatggacc	cgcggtggat	tagcttggtg	gtggggtaac	ggcccaccaa	ggcgacgatc	240
	catagccggc	ctgagagggt	gaacggccac	attgggactg	agacacggcc	cagactccta	300
	cgggaggcag	cagtggggaa	tattgcacaa	tgggggaaac	cctgatgcag	cgacgcccg	360
	tgaaggaaga	agtatctcgg	tatgtaaact	tctatcagca	gggaagatag	tgacgggtacc	420
	tgactaagaa	gccccggcta	actacgtgcc	agcagcccg	gtaatacgtg	gggggcaagc	480
10	gttatccgga	tttactgggt	gtaaagggag	cgtagacggg	gtggcaagtc	tgatgtgaaa	540
	ggcatgggct	caacctgtgg	actgcattgg	aaactgtcat	acttgagtgc	cggaggggta	600
	agcggaaattc	ctagtgtagc	ggtgaaatgc	gtagatatta	ggaggaacac	cagtggcgaa	660
	ggcggcttac	tggacggtaa	ctgacgttga	ggctcgaaag	cgtggggagc	aaacaggatt	720
	agataccctg	gtagtccacg	ccgtaaacga	tgaataacta	ggtgtcgggt	ggcaaagcca	780
15	ttcggtgccg	tcgcaaacgc	agtaagtatt	ccacctgggg	agtacgttcg	caagaatgaa	840
	actcaaagga	attgacgggg	acccgcacaa	gcgggtggagc	atgtggttta	attcgaagca	900
	acgcgaagaa	ccttaccga	tcttgacatc	cgctgaccg	atccttaacc	ggatctttcc	960
	ttcgggacag	gcgagacagg	tgggtgatgg	ttgtcgtcag	ctcgtgtcgt	gagatggtgg	1020
20	gttaagtccc	gcaacgagcg	caaccctat	cctcagtagc	cagcatttaa	ggtgggact	1080
	ctggggagac	tgccagggat	aacctggagg	aaggcgggga	tgacgtcaaa	tcatcatgcc	1140
	ccttatgatt	tgggctacac	acgtgctaca	atggcgtaaa	caaaggggaag	cgagattgtg	1200
	agatggagca	aatcccaaaa	ataacgtccc	agttcggact	gtagtctgca	acccgactac	1260
	acgaagctgg	aatcgctagt	aatcgcggat	cagaatgccg	cgggtaatac	gttccccgggt	1320
25	cttgtacaca	ccgcccgtca	caccatggga	gtcagtaacg	cccgaagtca	gtgacctaac	1380
	tgcaaaagaag	gagctgccga	aggcgggacc	gatgactggg	gtgaagtctg	aacaaggt	1438

30 <210> 3
 <211> 1481
 <212> ADN
 <213> *Blautia stercoris*

35 <220>
 <221> k
 <222> 4
 <223> 'k' es g o t

<400> 3

40	tttkgtctgg	ctcaggatga	acgctggcgg	cgtgcttaac	acatgcaagt	cgagcgaagc	60
	gcttacgaca	gaaccttcgg	gggaagatgt	aagggactga	gcgccggacg	ggtgagtaac	120
	gcgtgggtaa	cctgcctcat	acagggggat	aacagttgga	aacggctgct	aataccgcat	180
	aagcgcacag	tatcgcatga	tacagtgtga	aaaactccgg	tggtatgaga	tggaaccgcg	240
45	tctgattagc	tagttggagg	ggtaacggcc	caccaaggcg	acgatcagta	gcccgcctga	300
	gaggggtaac	ggccacattg	ggactgagac	acggcccaga	ctcctacggg	aggcagcagt	360
	ggggaatatt	gcacaatggg	ggaaaccctg	atgcagcgac	gccgcgtgaa	ggaagaagta	420
	tctcggtatg	taaacttcta	tcagcagggg	agaaaatgac	ggtacctgac	taagaagccc	480
	cggctaacta	cgtgccagca	gccgcggtaa	tacgtagggg	gcaagcgtta	tccggattta	540
50	ctgggtgtaa	agggagcgtg	gacggaagag	caagtctgat	gtgaaaggct	ggggcttaac	600
	cccaggactg	cattggaaac	tgtttttctt	gagtgccgga	gaggtaaagc	gaattcctag	660
	tgtagcggtg	aatgcgtag	atattaggag	gaaccaccag	ggcgaaggcg	gcttactgga	720
	cggtaactga	cgttgaggct	cgaaagcgtg	gggagcaaac	aggattagat	accctggtag	780
	tccacgccgt	aaacgatgaa	tactaggtgt	tggggagcaa	agctcttcgg	tgccgcagca	840
55	aacgcaataa	gtattccacc	tggggagtac	gttcgcaaga	atgaaactca	aaggaattga	900
	cggggacccg	cacaagcggg	ggagcatgtg	gtttattcga	agcaacgcga	agaacctaac	960
	caagtcttga	catcgatctg	accggttcgt	aatggaacct	ttccttcggg	acagagaaga	1020
	caggtggtgc	atggtgtcgt	tcagctcgtg	ctcgtgagatg	ttgggttaag	tcccgcacag	1080
	agcgcgaacc	ctatcgtcag	tagccagcag	gtaaagctgg	gcactctgag	gagactgcca	1140
60	gggataacct	ggaggaaggc	ggggacgacg	tcaaatcatc	atgccctta	tgatttgggc	1200

65

	tacacacgtg	ctacaatggc	gtaaacaaaag	ggaagcgagc	ccgcgagggg	gagcaaatcc	1260
	caaaaataac	gtcccagttc	ggactgcagt	ctgcaactcg	actgcacgaa	gctggaatcg	1320
	ctagtaatcg	cgaatcagaa	tgtcgcgggtg	aatacgttcc	cgggtcttgt	acacaccgcc	1380
5	cgtcacacca	tgggagtcag	taacgcccga	agtcagtgac	ccaaccttag	ggagggagct	1440
	gccgaaggcg	ggattgataa	ctgggggtgaa	gtctaggggg	t		1481
	<210> 4						
	<211> 1384						
	<212> ADN						
10	<213> <i>Blautia wexlerae</i>						
	<220>						
	<221> n						
	<222> 749						
15	<223> 'n' es a, c, g o t						
	<400> 4						
20	ttcattgaga	cttcggtgga	tttagattct	atctctagtg	gcgagcgggt	gagtaacgcg	60
	tggttaacct	gccttataca	gggggataac	agtcagaaat	ggctgcta	accgcataag	120
	cgcacagagc	tgcatggctc	agtgtgaaaa	actccggtgg	tataagatgg	acccgcgctg	180
	gattagcttg	ttggtgggg	aacggcccac	caaggcgacg	atccatagcc	ggcctgagag	240
	ggtgaacggc	caattggga	ctgagacacg	gcccagactc	ctacgggagg	cagcagtggg	300
25	gaatattgca	caatggggga	aaccctgatg	cagcgacgcc	gcgtgaagga	agaagtatct	360
	cggtatgtaa	acttctatca	gcaggaaga	tagtgacggt	acctgactaa	gaagccccgg	420
	ctaactacgt	gccagcagcc	gcggtataac	gtagggggca	agcgttatcc	ggatttactg	480
	ggtgtaaagg	gagcgtagac	ggtgtggcaa	gtctgatgtg	aaaggcatgg	gctcaacctg	540
	tggactgcat	tggaaactgt	catacttgag	tgccggaggg	gtaagcggaa	ttcctagtgt	600
30	agcgggtaa	tgcgtagata	ttaggaggaa	caccagtggc	gaaggcggct	tactggacgg	660
	taactgacgt	tgaggctcga	aagcgtgggg	agcaaacagg	attagatacc	ctggtagtcc	720
	acgccgtaaa	cgatgaatac	taggtgtcng	gggagcatgg	ctcttcggtg	ccgtcgcaaa	780
	cgcagtaagt	attccacctg	gggagtacgt	tcgcaagaat	gaaactcaa	ggaattgacg	840
	gggacccgca	caagcgggtg	agcatgtggt	ttaattcgaa	gcaacgcgaa	gaaccttacc	900
35	aagtcttgac	atccgcctga	ccgatcctta	accggatctt	tccttcggga	caggcgagac	960
	aggtggtgca	tggttgtcgt	cagctcgtgt	ctgagatgt	tgggttaagt	cccgcaacga	1020
	gcgcaacccc	tatcctcagt	agccagcatt	taaggtgggc	actctgggga	gactgccagg	1080
	gataaacctgg	aggaaggcgg	ggatgacgtc	aaatcatcat	gccccttatg	atctgggcta	1140
40	cacacgtgct	acaatggcgt	aaacaaagg	aagcgagatc	gtgagatgga	gcaaatccca	1200
	aaaataacgt	cccagttcgg	actgtagtct	gcaacccgac	tacacgaagc	tggaatcgct	1260
	agtaatcgcg	gatcagaatg	ccgcggtgaa	tacgttcccg	ggtcttgtac	acaccgcccg	1320
	tcacaccatg	ggagtcagta	acgcccgaag	tcagtgacct	aactgcaaag	aaggagctgc	1380
	cgaa						1384
45	<210> 5						
	<211> 1458						
	<212> ADN						
50	<213> <i>Blautia hydrogenotrophica</i>						
	<220>						
	<221> n						
	<222> 1416						
55	<223> 'n' es a, c, g o t						
	<400> 5						
60							
65							

	gatgaacgct	ggcggcgtgc	ttaacacatg	caagtcgaac	gaagcgatag	agaacggaga	60
	tttcggttga	agttttctat	tgactgagtg	gcggacgggt	gagtaacgcg	tgggtaacct	120
	gccctataca	gggggataac	agttagaaat	gactgctaata	accgcataag	cgcacagctt	180
5	cgcatgaagc	ggtgtgaaaa	actgaggtgg	tataggatgg	acccgcgttg	gattagctag	240
	ttggtgaggt	aacggccac	caaggcgacg	atccatagcc	ggcctgagag	ggtgaacggc	300
	cacattggga	ctgagacacg	gccc aaactc	ctacgggagg	cagcagtggg	gaatattgca	360
	caatggggga	aaccctgatg	cagcgacgcc	gcgtgaagga	agaagtatct	cggtatgtaa	420
	acttctatca	gcaggggaaga	aagtgacggg	acctgactaa	gaagccccgg	ctaattacgt	480
10	gccagcagcc	gcggtataac	gtaaggggca	agcgttatcc	ggatttactg	ggtgtaaagg	540
	gagcgtagac	ggtttggcaa	gtctgatgtg	aaaggcatgg	gctcaacctg	tggactgcat	600
	tggaaactgt	cagacttgag	tgccggagag	gcaagcggaa	ttcctagtgt	agcggtgaaa	660
15	tgcgtagata	ttaggaggaa	caccagtggc	gaaggcggcc	tgctggacgg	taactgacgt	720
	tgaggctcga	aagcgtgggg	agcaaacagg	attagatacc	ctggtagtcc	acgctgtaaa	780
	cgatgaatac	taggtgtcgg	gtggcaaagc	cattcgggtc	cgcagcaaac	gcaataagta	840
	ttcccacctg	gggagtacgt	tcgcaagaat	gaaactcaaa	ggaattgacg	gggacctgca	900
	caagcgggtg	agcatgtggt	ttaattcgaa	gcaacgcgaa	gaaccttacc	aaatcttgac	960
20	atccctctga	ccgggaagta	atgttccctt	ttcttcggaa	cagaggagac	aggtggtgca	1020
	tggttgtcgt	cagctcgtgt	cgtgagatgt	tggtttaaagt	cccgcaacga	gcgcaacctt	1080
	tattcttagt	agccagcagg	tagagctggg	caactctagg	agactgccag	ggataacctg	1140
	gaggaagggt	gggatgacgt	caaatcatca	tgccccttat	gatttgggct	acacacgtgc	1200
	tacaatggcg	taaacaaagg	gaagcgaagg	ggtgacctgg	agcaaactc	aaaaataacg	1260
25	tctcagttcg	gattgtagtc	tgcaactcga	ctacatgaag	ctggaatcgc	tagtaatcgc	1320
	gaatcagaat	gtcgcgggtga	atacgttccc	gggtcttgta	cacaccgccc	gtcacacccat	1380
	gggagtcagt	aacgcccga	gtcagtgacc	caaccnaaag	gagggagctg	ccgaagggtg	1440
	gactgataac	tggggtga					1458
30							

REIVINDICACIONES

- 5 1. Una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO: 5, para su uso en un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* patógenas en el tracto gastrointestinal.
2. La composición para el uso de la reivindicación 1, en la que las *Enterobacteriaceae* son *E. coli*.
- 10 3. La composición para el uso de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la composición es para su uso en un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* en el tracto gastrointestinal en el tratamiento o prevención del SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dispepsia funcional, diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal.
- 15 4. La composición para el uso de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la composición es para su uso en el tratamiento o prevención de diarrea, gastroenteritis, infección del tracto urinario o meningitis neonatal.
- 20 5. Una composición que comprende una cepa bacteriana del género *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO: 5, para su uso en el tratamiento de infecciones provocadas por *Enterobacteriaceae* patógenas en el tracto gastrointestinal.
- 25 6. La composición para el uso de la reivindicación 5, en donde la infección provocada por *Enterobacteriaceae* patógenas es una infección por *E. coli*.
7. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en la que la cepa bacteriana tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la SEQ ID NO:5 o que tiene la secuencia de ARNr 16s de la SEQ ID NO:5.
- 30 8. La composición para el uso de la reivindicación 1, en donde la composición comprende una cepa bacteriana de la especie *Blautia hydrogenotrophica* que tiene una secuencia de ARNr 16s que es por lo menos un 95% idéntica a la SEQ ID NO:5, para su uso en un método para reducir el nivel de *Enterobacteriaceae* patógenas en el tracto gastrointestinal en un sujeto diagnosticado con SII.
- 35 9. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en donde la composición es para administración oral.
- 40 10. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en donde la composición comprende uno o más excipientes o portadores farmacéuticamente aceptables.
- 45 11. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en donde la cepa bacteriana está liofilizada.
12. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en donde la cepa bacteriana es viable.
13. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, en donde la composición comprende una única cepa.
- 50 14. La composición para el uso de cualquier reivindicación anterior, que comprende la cepa bacteriana *Blautia hydrogenotrophica* como parte de un consorcio microbiano.
- 55 15. Un producto alimenticio que comprende la composición de cualquier reivindicación anterior, para el uso de cualquier reivindicación anterior.
- 60
- 65

FIG. 1

Medición de población de BH mediante q-PCR

FIG. 2

B. hydrogenotrophica administrada ($\log_{10}$ por ml)

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 6

FIG. 7a

FIG. 7b

FIG. 8a Blautix 10/12 muestra reducción en hidrógeno (83%)

	DIA 1	DIA 2	MEDIA	DIA 15	DIA 16	MEDIA	DIF	
ID de Paciente	CIMAX	CIMAX	CIMAX	CIMAX	CIMAX	CIMAX	CIMAX	
3.02	123.0	94.0	108.5	34.0	74.0	54.0	-54.5	
3.04	70.0	32.0	51.0	25.0	46.0	35.5	-15.5	
3.05	163.0	116.0	139.5	167.0	111.0	139.0	-0.5	
3.07	71.0	69.0	70.0	46.0	80.0	63.0	-7.0	
3.09	121.0	76.0	98.5	66.0	65.0	65.5	-33.0	
3.11	75.0	98.0	86.5	128.0	76.0	102.0	15.5	
3.13	118.0	41.0	79.5	85.0	59.0	72.0	-7.5	
3.15	155.0	99.0	127.0	63.0	87.0	75.0	-52.0	
3.17	134.0	210.0	172.0	139.0	107.0	123.0	-49.0	
3.19	72.0	53.0	62.5	87.0	85.0	86.0	23.5	
3.21	144.0	139.0	141.5	75.0	126.0	100.5	-41.0	
3.22	59.0	71.0	65.0	55.0	34.0	44.5	-20.5	
Media	108.8	91.5	100.1	80.8	79.2	80.0	-20.1	
SD	37.3	48.4		43.5	26.7		26.2	
Mediana	119.5	85.0		70.5	78.0		-18.0	
	Pacientes con reducción en H ₂							10 (83%)

FIG. 8b Placebo 3/6 muestra reducción en hidrógeno (50%)

ID de Paciente	DIA 1	DIA 2	MEDIA	DIA 15	DIA 16	MEDIA	DIF
	CIMAX	CIMAX		CIMAX	CIMAX		CIMAX
3.06	126.0	91.0	108.5	86.0	131.0	108.5	0.0
3.10	124.0	168.0	146.0	107.0	88.0	97.5	-48.5
3.14	55.0	79.0	67.0	53.0	68.0	60.5	-6.5
3.16	98.0	123.0	110.5	123.0	151.0	137.0	26.5
3.23	58.0	113.0	85.5	79.0	99.0	89.0	3.5
4.13	58.0	69.0	63.5	25.0	38.0	31.5	-32.0
MEDIA	86.5	107.2	96.8	78.8	95.8	87.3	-9.5
SD	33.8	36.0	31.2	35.7	41.2	37.0	26.8
MEDIANA	78.0	102.0	97.0	82.5	93.5	93.3	-3.3
							3 (50%)

Pacientes con reducción en H₂

FIG. 8c

FIG. 9b

No corregido con hidrógeno

FIG. 9c

Corregido con hidrógeno

FIG. 10b

Placebo no corregido con hidrógeno

FIG. 10c

Placebo corregido con hidrógeno

FIG. 11a

	DIA 1	DIA 15	N
Grupo VERUM	79.7	58.5	14
Grupo PLACEBO	61.7	60	7

Hidrógeno No corregido

FIG. 11b

	DIA 1	DIA 15	N
Grupo VERUM	96.4	75	14
Grupo PLACEBO	82	75.9	7

Hidrógeno Corregido

FIG. 12

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15