19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 741 138**

51 Int. Cl.:

A61K 35/76 (2015.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 35/761 (2015.01)
A61K 35/763 (2015.01)
A61K 35/766 (2015.01)
A61K 35/768 (2015.01)
C12N 7/00 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **17.09.2007 E 14193656 (7)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **08.05.2019 EP 2839837**

54 Título: **Rhabdovirus oncolítico de Farmington**

30 Prioridad:

15.09.2006 US 844726 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

10.02.2020

73 Titular/es:

**CHILDREN'S HOSPITAL OF EASTERN ONTARIO
RESEARCH INSTITUTE INC. (100.0%)
401 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8L1, CA**

72 Inventor/es:

STOJDL, DAVID F.

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

ES 2 741 138 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Rhabdovirus oncolítico de Farmington

Antecedentes de la invención**I. Campo de la invención**

- 5 Esta divulgación se refiere en general a la virología y la medicina. En ciertos aspectos, la divulgación se refiere a virus oncolíticos, particularmente rhabdovirus oncolíticos no VSV y rhabdovirus oncolíticos que comprenden una glicoproteína no de VSV.

II. Antecedentes

- 10 Se ha demostrado que varios virus se replican y matan una amplia variedad de células tumorales *in vitro* (virus Sindbis (Unno y col., 2005); virus Sendai (Kinoh y col., 2004); virus Coxsackie (Shafren y col., 2004); virus del herpes simple (Mineta y col., 1995); Parvovirus (Abschuetz y col., 2006); Adenovirus (Heise y col., 2000); virus de polio (Gromeier y col., 2000); virus de la enfermedad de Newcastle (Sinkovics y Horvath, 2000); virus de la estomatitis vesicular (Stojdl y col., 2000); virus del sarampión (Grote y col., 2001); Reovirus (Coffey y col., 1998); Retrovirus (Logg y col., 2001); Vaccinia (Timiryasova y col., 1999); y gripe (Bergmann y col., 2001)). Además, se ha
15 demostrado que dichos virus son eficaces en el tratamiento de modelos de cáncer en animales.

Se ha demostrado que el virus de la estomatitis vesicular (VSV), un rhabdovirus bien conocido y bien estudiado destruye las líneas celulares tumorales en experimentos de cultivo celular, y se ha demostrado su eficacia en una variedad de modelos de cáncer en roedores (Stojdl y col., 2000; Stojdl y col., 2003). Sin embargo, el VSV no destruye todas las células cancerosas.

- 20 Travassos da Rosa y col. (Emerg Infect Dis. 2002 jun; 8(6):614-618) informaron del aislamiento de dos rhabdovirus. Uno de estos se denominó virus Farmington y se propuso que era un nuevo miembro del género Vesiculovirus. El virus infectaba aves y ratones, así como células renales de mono en cultivo.

- 25 Césaire y col. (Oncogene. 2006 Jan 19;25(3):349-358) investigaron la capacidad del VSV para lisar linfocitos T humanos primarios infectados con un virus linfotrópico T tipo 1 (HTLV-1) de pacientes con leucemia de linfocitos T de adulto (ATL). Los autores informaron de que las células ATL primarias *ex vivo* eran permisivas para el VSV y sufrían oncólisis de una manera dependiente del tiempo. La infección por VSV no mostraba replicación vírica ni oncólisis en células no leucémicas infectadas con el HTLV-1 de pacientes con paraparesia espástica tropical/mielopatía asociada a HTLV-1 (HAM/TSP), ni en linfocitos T CD4(+) intactos de individuos normales ni en muestras celulares *ex vivo* de pacientes con leucemia linfocítica crónica (CCL).

Sumario de la invención

- 30 Varios rhabdovirus identificados últimamente son mucho más eficaces en la destrucción de cánceres particulares o líneas celulares de cáncer que el VSV. También el VSV y los mutantes atenuados de VSV son neurovirulentos y producen patología del SNC en roedores y primates. Varios rhabdovirus no infectan el SNC (es decir, el Muir Springs y Bahía Grande: Kerschner y col., 1986), y se ha demostrado un perfil de seguridad más aceptable. Además, las
35 terapias basadas en los nuevos rhabdovirus se pueden utilizar para tratar cánceres del SNC, tanto primarios como secundarios. El rhabdovirus de la divulgación (y/u otros agentes oncolíticos) se pueden utilizar sucesivamente para derivar la respuesta inmunitaria del huésped contra un virus terapéutico particular. Esto permitiría una terapia prolongada y mejora la eficacia.

- 40 La presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un rhabdovirus oncolítico Farmington para su uso en medicina humana. Dicho rhabdovirus posee propiedades para destruir células tumorales *in vitro* e *in vivo*.

- 45 Como se utiliza en el presente documento, un rhabdovirus no VSV incluirá uno o más de los siguientes virus o variantes de los mismos: virus Arajas, virus Chandipura, virus Cocal, virus Isfahan, virus Maraba, virus Piry, virus Alagoas de la estomatitis vesicular, virus BeAn 157575, virus Boteke, virus Calchaqui, virus Eel Americano, virus Gray Lodge, virus Jurona, virus Klamath, virus Kwatta, virus La Joya, virus Malpais Spring, virus Mount Elgon bat, virus Perinet, virus Tupaia, Farmington, virus Bahía Grande, virus Muir Springs, virus Reed Ranch, virus Hart Park, virus Flanders, virus Kamese, virus Mosqueiro, virus Mossuril, virus Barur, virus Fukuoka, virus Kern Canyon, virus Nkolbisson, virus Le Dantec, virus Keuraliba, virus Connecticut, virus New Minto, virus Sawgrass, virus Chaco, virus Sena Madureira, virus Timbo, virus Almpiwar, virus Aruac, virus Bangoran, virus Bimbo, virus Bivens Arm, virus Blue
50 crab, virus Charleville, virus Coastal Plains, virus DakArK 7292, virus Entamoeba, virus Garba, virus Gossas, virus Humpty Doo, virus Joinjakaka, virus Kannamangalam, virus Kolongo, virus Koolpinyah, virus Kotonkon, virus Landjia, virus Manitoba, virus Marco, virus Nasoule, virus Navarro, virus Ngaingan, virus Oak-Valey, virus Obodhiang, virus Oita, virus Ouango, virus Parry Creek, virus Rio Grande cichlid, virus Sandjimba, virus Sigma, virus Sripur, virus Sweetwater Branch, virus Tibrogargan, virus Xiburema, virus Yata, Rhode Island, virus Adelaide River, virus
55 Berrimah, virus Kimberley, o virus de la fiebre efímera bovina. En ciertos aspectos, rhabdovirus no VSV puede

referirse al supergrupo de Dimarhabdovirus (definidos como rhabdovirus capaces de infectar células tanto de insecto como de mamífero). En aspectos específicos, el rhabdovirus es no VSV. En aspectos particulares el rhabdovirus no VSV es un virus Carajas, virus Maraba, Farmington, virus Muir Springs, y/o virus Bahia grande, incluyendo variantes de los mismos.

5 Las composiciones para su uso en la invención pueden incluir un segundo virus terapéutico, al como un virus oncolítico. Oncolítico se refiere normalmente a un agente que es capaz de destruir, lisar o detener el crecimiento de una célula cancerosa. En términos de un virus oncolítico el término se refiere a un virus que puede replicarse hasta cierto grado en una célula cancerosa, causan la muerte, lisis o detención del crecimiento de células cancerosas y normalmente tienen efectos tóxicos mínimos sobre las células no cancerosas. Un segundo virus incluye, pero no se limita a un adenovirus, un virus vaccinia, un virus de la enfermedad de Newcastle, un alfavirus, un parvovirus, un herpesvirus, un rhabdovirus no VSV y similares. En otros aspectos, la composición es una composición farmacéuticamente aceptable. La composición también puede incluir un segundo agente anticáncer, tal como un quimioterápico, radioterápico o inmunoterápico.

15 El virus oncolítico Farmington para su uso de acuerdo con la presente invención se puede utilizar en procedimientos que incluyen el tratamiento de un paciente de cáncer, en el que se va a administrar una cantidad eficaz de una composición de virus Farmington al sujeto.

20 En ciertos aspectos de la divulgación una célula puede estar comprendida en un paciente y puede ser una célula hiperproliferativa, neoplásica, precancerosa, cancerosa, metastática. De acuerdo con la divulgación, un rhabdovirus no VSV para su uso en un procedimiento de tratamiento del cáncer se puede administrar a un paciente que tiene una célula susceptible de destruirse por al menos un rhabdovirus no VSV o un régimen o composición terapéuticos que incluyen un rhabdovirus no VSV. La administración de composiciones terapéuticas se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más veces con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más rhabdovirus no VSV o rhabdovirus no VSV recombinante, solo o en distintas combinaciones. La composición que se administra puede tener 10^1 , 10^2 , 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 , 10^7 , 10^8 , 10^9 , 10^{10} , 10^{11} , 10^{12} , 10^{13} , 10^{14} , o más partículas víricas o unidades formadoras de placas (ufp). La administración puede ser intraperitoneal, intravenosa, intraarterial, intramuscular, intradérmica, subcutánea, o administración intranasal. En ciertos aspectos, las composiciones se administran por vía sistémica particularmente por administración intravascular, que incluye la inyección, perfusión y similares. Los procedimientos pueden comprender adicionalmente la administración de una segunda terapia anticáncer, tal como un segundo virus terapéutico. En aspectos particulares un virus terapéutico puede ser un virus oncolítico, más particularmente un rhabdovirus no VSV. En otros aspectos, un segundo agente anticáncer es un quimioterápico, un radioterápico, un inmunoterápico, cirugía o similares.

Otros aspectos de la divulgación se exponen a lo largo de la presente solicitud. Cualquier aspecto expuesto con respecto a un aspecto de la divulgación también se aplica a otros aspectos de la divulgación, y viceversa.

35 Los términos "inhibición", "reducción", o "prevención" o cualquier variación de estos términos, cuando se utilizan en las reivindicaciones y/o la memoria descriptiva incluye cualquier disminución medible o inhibición completa para conseguir un resultado deseado. Los resultados deseados incluyen, pero no se limitan a paliar, reducir, enlentecer, o erradicación de una afección cancerosa o hiperproliferativa, así como una mejora de la calidad o extensión de la vida.

40 El uso de la palabra "un" o "una" cuando se utilizan en conjunción con la expresión "que comprende" en las reivindicaciones y/o la memoria descriptiva puede significar "uno", pero también es consistente con el significado de "uno o más", "al menos uno", y "uno o más de uno".

A lo largo de la presente divulgación, el término "aproximadamente" se utiliza para indicar que un valor incluye la desviación típica del error para el dispositivo o procedimiento que se va a emplear para determinar el valor.

45 El uso del término "o" en las reivindicaciones se utiliza con el significado de "y/o" a menos de que se indique explícitamente para referirse solo a las alternativas o las alternativas sean mutuamente excluyentes, aunque la divulgación soporta una definición que se refiera solamente a alternativa e "y/o".

50 Como se utiliza en la presente memoria descriptiva y las reivindicaciones, las palabras "que comprenden" (y cualquier forma de comprender tal como "comprende" y "comprender"), "que tiene" (y cualquier forma de tener, tal como "tienen" o "tiene"), "que incluye" (y cualquier forma de incluir, tal como "incluye" e "incluir") o "que contiene" (y cualquier forma de contener, tal como "contiene" y "contener") son inclusivas y de extremos abiertos y no excluye elementos o etapas adicionales no mencionados del procedimiento.

Otros objetivos, características y ventajas de la presente divulgación se volverán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada. Se debería entender, sin embargo, que la descripción detallada y los ejemplos específicos, aunque indican aspectos específicos de la divulgación se dan solo a modo de ilustración.

55 **Descripción de los dibujos**

Los siguientes dibujos forman parte de la presente memoria descriptiva y se incluyen para demostrar adicionalmente

ciertos aspectos de la presente invención. La invención se puede entender mejor en referencia a uno o más de esto dibujos en combinación con la descripción detallada de realizaciones específicas que se presenta en el presente documento.

5 **FIG. 1.** Relaciones filogenéticas entre los rhabdovirus basada en un alineamiento GDE de una región relativamente conservada de la proteína N (119 aminoácidos), y utilizando el virus paramyxovirus 1 de la para influenza humana (HPIV-1) como el ajeno. El árbol se generó por el procedimiento de unión de vecinos y los valores de arranque (indicados por cada nodo de una rama) se estimaron utilizando 1000 réplicas del árbol. Las longitudes de las ramas son proporcionales a las distancias genéticas. La barra de escala corresponde a sustituciones por sitio de aminoácido cortesía de H. Badrane y P.J. Walker).

10 **FIG. 2.** Sumario del ensayo de destrucción de células tumorales *in vitro*. Las células del panel celular NCI 60 se infectaron durante 96 horas con una serie de diluciones de distintos virus. Se ensayó la viabilidad celular utilizando tinción con cristal violeta para detectar células viables restantes. Se calculó la CE_{50} a partir de las curvas de destrucción celular resultante y se resumen en formato de tabla. Por claridad, los valores de la CE_{50} se habían convertido a un valor de 1-7 como se describe en la leyenda. Además, se ha utilizado el sombreado para indicar el intervalo de CE_{50} a (es decir, de más oscuro a más claro representa los valores de la mayor CE_{50} hasta la menor CE_{50}). Los virus se abreviaron de la siguiente manera: MS = Muir Springs, BG = Bahia Grande, NGG = Ngaingan, TIB = Tibrogargan, FMT = Farmington, MRB = Maraba, CRJ = Carajas, VSVHR = cepa HR del virus de estomatitis vesicular y VV = virus Vaccinia JX-963. Estos datos demuestran que no todos los rhabdovirus son igualmente oncolíticos, de hecho, rhabdovirus estrechamente relacionados se comportan de manera muy diferente sobre las mismas líneas celulares tumorales. Por lo tanto, actualmente no hay un procedimiento para predecir que rhabdovirus tienen un potencial oncolítico. Es necesario el ensayo empírico para identificar los virus que sean buenos candidatos oncolíticos.

15 **FIG. 3A-3B.** Productividad de rhabdovirus sobre líneas celulares tumorales. Se infectaron líneas celulares de glioblastoma humano SNB19 y carcinoma de pulmón humano NCI H226 con distintos virus oncolíticos tales como el VSV que comprende una proteína G heteróloga, más particularmente un rhabdovirus no VSV. En otros aspectos, un segundo agente anticáncer es un quimioterápico, un radioterápico, un inmunoterápico, cirugía o similares.

20 Otros aspectos de la divulgación se exponen a lo largo de la presente solicitud. Cualquier aspecto que se expone con respecto a un aspecto de la divulgación se aplica a otros aspectos de la divulgación también, y viceversa. Los aspectos de las secciones Descripción detallada y Ejemplos se entiende que son aspectos no limitantes de la divulgación que son aplicables a todos los aspectos de la divulgación.

25 Los términos “inhibición”, “reducción” o “prevención” o cualquier variación de estos términos, cuando se utilizan en las reivindicaciones y/o la memoria descriptiva incluye cualquier disminución o inhibición completa para conseguir un resultado deseado. Los resultados deseados incluyen, pero no se limitan a paliar, reducir, enlentecer, o erradicar una afección cancerosa o hiperproliferativa, así como una mejor calidad o extensión de la vida.

30 El uso de la palabra “un” o “una” cuando se utilizan en conjunción con la expresión “que comprende” en las reivindicaciones y/o la memoria descriptiva puede significar “uno”, pero también es consistente con el significado de “uno o más”, “al menos uno”, y “uno o más de uno”.

A lo largo de la presente divulgación, el término “aproximadamente” se utiliza para indicar que un valor incluye la desviación típica del error para el dispositivo o procedimiento que se va a emplear para determinar el valor.

35 El uso del término “o” en las reivindicaciones se utiliza con el significado de “y/o” a menos de que se indique explícitamente para referirse solo a las alternativas o las alternativas sean mutuamente excluyentes, aunque la divulgación soporta una definición que se refiera solamente a alternativa e “y/o”.

40 Como se utiliza en la presente memoria descriptiva y las reivindicaciones, las palabras “que comprenden” (y cualquier forma de comprender tal como “comprende” y “comprender”), “que tiene” (y cualquier forma de tener, tal como “tienen” o “tiene”), “que incluye” (y cualquier forma de incluir, tal como “incluye” e “incluir”) o “que contiene” (y cualquier forma de contener, tal como “contiene” y “contener”) son inclusivas y de extremos abiertos y no excluye elementos o etapas adicionales no mencionados del procedimiento.

45 Otros objetivos, características y ventajas de la presente divulgación se volverán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada. Se debería entender, sin embargo, que la descripción detallada y los ejemplos específicos, aunque indican aspectos específicos de la divulgación se dan solo a modo de ilustración.

Descripción de los dibujos

50 Los siguientes dibujos forman parte de la presente memoria descriptiva y se incluyen para demostrar adicionalmente ciertos aspectos de la presente invención. La invención se puede entender mejor en referencia a uno o más de esto dibujos en combinación con la descripción detallada de realizaciones específicas que se presenta en el presente documento.

FIG. 1. Relaciones filogenéticas entre los rhabdovirus basada en un alineamiento GDE de una región relativamente conservada de la proteína N (119 aminoácidos), y utilizando el virus paramyxovirus 1 de la para influenza humana (HPIV-1) como el ajeno. El árbol se generó por el procedimiento de unión de vecinos y los valores de arranque (indicados por cada nodo de una rama) se estimaron utilizando 1000 réplicas del árbol. Las longitudes de las ramas son proporcionales a las distancias genéticas. La barra de escala corresponde a sustituciones por sitio de aminoácido cortesía de H. Badrane y P.J. Walker).

FIG. 2. Sumario del ensayo de destrucción de células tumorales *in vitro*. Las células del panel celular NCI 60 se infectaron durante 96 horas con una serie de diluciones de distintos virus. Se ensayó la viabilidad celular utilizando tinción con cristal violeta para detectar células viables restantes. Se calculó la CE_{50} a partir de las curvas de destrucción celular resultante y se resumen en formato de tabla. Por claridad, los valores de la CE_{50} se habían convertido a un valor de 1-7 como se describe en la leyenda. Además, se ha utilizado el sombreado para indicar el intervalo de CE_{50} a (es decir, de más oscuro a más claro representa los valores de la mayor CE_{50} hasta la menor CE_{50}). Los virus se abreviaron de la siguiente manera: MS = Muir Springs, BG = Bahía Grande, NGG = Ngaingan, TIB = Tibrogargan, FMT = Farmington, MRB = Maraba, CRJ = Carajas, VSVHR = cepa HR del virus de estomatitis vesicular y VV = virus Vaccinia JX-963. Estos datos demuestran que no todos los rhabdovirus son igualmente oncolíticos, de hecho, rhabdovirus estrechamente relacionados se comportan de manera muy diferente sobre las mismas líneas celulares tumorales. Por lo tanto, actualmente no hay un procedimiento para predecir que rhabdovirus tienen un potencial oncolítico. Es necesario el ensayo empírico para identificar los virus que sean buenos candidatos oncolíticos.

FIG. 3A-3B. Productividad de rhabdovirus sobre líneas celulares tumorales. Se infectaron líneas celulares de glioblastoma humano SNB19 y carcinoma de pulmón humano NCI H226 con distintos rhabdovirus ($MOI = 3$) y se monitorizaron a lo largo del tiempo en cuanto a la producción de virus mediante el ensayo de placas. Los datos muestran que no todos los rhabdovirus tienen la misma capacidad para replicarse en estas líneas celulares tumorales. Las células NCI H226 revela una gran disparidad de productividad vírica no produciendo nada el virus Bahía Grande mientras que el virus Maraba era capaz de producir copiosos viriones infecciosos.

FIG. 4. Esquema del sistema de rescate para recuperar rhabdovirus recombinantes a partir de una forma de ADN plasmídico. En este ejemplo, el virus Maraba se había clonado en un ADN plasmídico entre el promotor T7 y una secuencia de ribozima del virus de la Hepatitis D. Se infectaron células A549 con virus vaccinia que expresaba T7 y luego posteriormente se transfectaron con un vector de genoma de Maraba modificado para que expresara GFP. Los viriones rescatados se purificaron y se utilizaron entonces para infectar células Vero durante 24 horas, dando como resultado la expresión de GFP en estas células cuando se visualizaban por microscopía de fluorescencia.

FIG. 5. Bioselección de cepas mejoradas de rhabdovirus oncolíticos. Los rhabdovirus son casi una especie. Bahía Grande no es neuropatogénico, pero tiene la capacidad para destruir células de glioblastoma humano. Los inventores contemplaron mejorar su virulencia manteniendo su selectividad por las células cancerosas. Para mejorar la virulencia de un rhabdovirus contra una célula tumoral, los inventores seleccionaron virus mutantes que tuvieran aumentada la capacidad de replicación en una línea celular de glioblastoma humano. En resumen, se infectaron 5×10^5 células SNB19 con $2,5 \times 10^6$ partículas víricas, dando una MOI de 5. El inóculo inicial tenía un volumen de 200 μ l y se dejó que infectaran durante 1 hora antes de lavarse las células 10 veces con PBS. El último lavado se analizó en cuanto a partículas víricas mediante el ensayo de placas para asegurar una retirada apropiada de los virus introducidos. En puntos de tiempo crecientes se recolectó el sobrenadante completo y se reemplazó con medio reciente. El medio recolectado se utilizó para infectar nuevas células para la amplificación y se analizaron por el ensayo de placas en cuanto a la presencia de partículas víricas. Para el primer pasaje, las recolecciones se hicieron a las 4, 8, 12 y 24 hpi (horas post infección) hasta el momento inicial en que se determinó la liberación vírica. Los virus de los puntos de tiempo más tempranos se amplificaron hasta una población de 10^6 y entonces se volvieron a pasar.

FIG. 6. Bioselección de cepas mejoradas de rhabdovirus oncolíticos. En este ejemplo, el virus de Bahía Grande se sometió a hasta 6 ciclos repetidos de bioselección. La cepa parental (WT) junto con los pasajes 4-6 se monitorizaron en cuanto a la producción de virus en las células SNB19 a las 4, 6 y 8 horas post infección. Una mejora clara y progresiva de la velocidad de replicación inicial de virus era evidente durante las rondas crecientes de bioselección. MRB = Maraba se incluye como un ejemplo de la replicación vírica rápida y deseable en la línea celular cancerosa.

FIG. 7. El Bahía Grande P13 se sometió a 13 rondas de bioselección. Este virus demostró una replicación vírica mejorada no solo en el glioblastoma humano utilizado durante el protocolo de bioselección, sino en un glioblastoma humano no relacionado y en una línea celular de carcinoma ovárico humano. Esto demuestra que los rhabdovirus pueden bioseleccionarse para mejorar sus propiedades oncolíticas y estas mejoras son eficaces en otros cánceres diferentes.

FIG. 8. Se infectaron por vía intracraneal ratones Balb/c con los virus indicados y se monitorizaron en cuanto a la morbilidad y/o mortalidad. Tanto el VSV de tipo silvestre (cepa HR) como la cepa mutante delta M512 de VSV eran extremadamente neurotóxicos, demostrando parálisis de extremidades posteriores dentro de días de la

infección, mientras que los virus Bahía Grande y Muir Springs no presentaban neurotoxicidad. Bahía Grande P6 es una cepa bioseleccionada de Bahía Grande con una replicación mejorada en células de glioblastoma humano. Esta cepa tampoco presentaba neurotoxicidad, demostrando que los rhabdovirus se pueden bioseleccionar para mejorar la virulencia en células tumorales mientras mantienen su perfil de seguridad en el tejido sano normal.

5 **FIG. 9.** Eficacia *in vivo* de los rhabdovirus Maraba y Carajas en comparación con Chandipura y WT VSV y delata 51 VSV. Se establecieron tumores 4T1 (que expresan luciferasa de luciérnaga) en ratones hembra Balb/C de 5-8 semanas de edad inyectando 10^6 células tumorales en la glándula mamaria posterior izquierda. Después de una semana, se inyectó a los ratones los días 1 y 2 (cada dosis = 10^7 ufp de WT VSV, $\Delta 51$ GFP VSV, Maraba o Chandipura; o 10^8 ufp de Carajas). Las respuestas tumorales se midieron por creación de imágenes de
10 bioluminiscencia utilizando un IVIS 200 (Xenogen) (medida en fotones/s/cm²).

FIG. 10. Infectividad de VSV G-menos pseudotipado con proteína G de Isfahan y G de VSV.

FIG. 11. Una curva de crecimiento en una etapa de los virus VSV WT, Isfahan y RVR IsfG1.

FIG. 12. El RVR que comprende una proteína G de Isfahan se mantiene oncolítico. Se evaluaron las citotoxicidades del virus Isfahan, VSV d51 y RVR IsfG1 sobre distintas líneas celulares.

15 **FIG. 13A-13C.** El RVR que comprende Isf G1 es un virus capaz de escapar a la respuesta inmunitaria contra VSV *in vivo*. Se utilizó la detección de luciferasa *in vivo* para determinar la cantidad de virus en los ratones inoculados con RVR IsfG1 o VSV. La **FIG. 13A**, es la detección *in vivo* de virus recombinante inyectado en ratones intactos. La **FIG. 13B**, es la detección *in vivo* de VSV inyectado en ratones inmunizados con VSV. La **FIG 13C**, es la detección *in vivo* del virus RVR IsfG1 recombinante inyectado en ratones inmunizados con VSV.

20 **FIG. 14.** Rendimientos de virus de tumores infectados. Se infectaron tumores con virus recombinante o VSV en presencia o ausencia de inmunización con VSV (como se indica) los datos en los gráficos muestran la cantidad de virus que resulta de la infección del tumor.

FIG. 15. Una curva de crecimiento en una etapa de VSV WT, virus Chandipura y RVR_{cha}G¹. Los resultados muestran que el recombinante produce la misma cantidad de virus que el VSV.

25 **FIG. 16.** Citotoxicidad de VSV WT, virus Chandipura y RVR_{cha}G¹. Los resultados muestran que recombinante es tan citotóxico como el VSV.

FIG. 17. Una curva de crecimiento en una etapa de VSV WT, virus Maraba y RVR_{Mar}G¹. Los resultados muestran que el título de virus recombinante era mayor que el de VSV a las 48 y 72 h.

30 **FIG. 18.** Citotoxicidad de VSV WT, virus Maraba y RVR_{Mar}G¹. Los resultados muestran que tanto el maraba como el RVR_{Mar}G¹. Son citotóxicos en líneas celulares tumorales y son en general más citotóxicos para las células tumorales que el VSV WT.

Descripción detallada de la invención

Los aspectos de la divulgación se basan en la destrucción por un rhabdovirus no VSV o rhabdovirus pseudotipado de varias clases o tipos de células cancerosas, que son resistentes a la destrucción por VSV. Algunas de las
35 ventajas de estos rhabdovirus oncolíticos y rhabdovirus recombinantes incluyen las siguientes: (1) Son raros los anticuerpos contra los rhabdovirus inventivos o no existen en la mayoría de las poblaciones del mundo. (2) los rhabdovirus se replican más rápidamente que otros virus oncolíticos tales como adenovirus, reovirus, sarampión, parvovirus, retrovirus y VSH. (3) Los rhabdovirus crecen con altos títulos y se pueden filtrar a través de un filtro de 0,2 micrómetros. (4) Los rhabdovirus oncolíticos y los recombinantes de los mismos tienen un intervalo de
40 huéspedes amplio, capaz de infectar muchos tipos diferentes de células cancerosas y no están limitados por receptores sobre una célula particular (por ejemplo, como el coxsackie, sarampión, adenovirus). (5) El rhabdovirus de la invención se presta a modificación genética. (6) El rhabdovirus también tiene un ciclo de vida citoplásmica y no se integra en el material genético de una célula huésped, lo que da lugar a un perfil de seguridad más favorable.

I. Familia *Rhabdoviridae* (Rhabdovirus)

45 Los rhabdovirus arquetipo son los virus de la rabia y la estomatitis vesiculosa (VSV), el más estudiado de esta familia de virus. Aunque estos virus comparten morfologías similares, son muy diferentes en su ciclo vital, intervalo de huéspedes y patología. Rhabdoviridae es una familia de virus con forma de bala que tienen genomas de ARN en sentido (-) no segmentados. Hay más de 250 rhabdovirus conocidos por infectar mamíferos, peces, insectos y plantas. La familia se divide en al menos 5 géneros: (1) Lyssavirus: incluyendo el virus de la rabia, otros virus de
50 mamífero, algunos virus de insecto; (2) Vesiculovirus: que incluyen el virus de la estomatitis vesicular (VSV); (3) Ephemerovirus: que incluyen el virus de la fiebre efímera bovina (vertebrados); (4) Citorhabdovirus: que incluye el virus amarillo necrótico de la lechuga (plantas); y (5) Nucleorhabdovirus: que incluyen el virus enano amarillo de la patata (plantas). También se ha sugerido que existe un supergrupo de rhabdovirus denominado Dimarthdovirus que incluye una variedad de rhabdovirus que infecta tanto mamíferos como insectos.

La familia Rhabdoviridae incluye, pero no se limitan a: virus Arajas, virus Chandipura, (AF128868 / gi:4583436, AJ810083 / gi:57833891, AY871800 / gi:62861470, AY871799 / gi:62861468, AY871798 / gi:62861466, AY871797 / gi:62861464, AY871796 / gi:62861462, AY871795 / gi:62861460, AY871794 / gi:62861459, AY871793 / gi:62861457, AY871792 / gi:62861455, AY871791 / gi:62861453), virus Cocal (AF045556 / gi:2865658), Isfahan virus (AJ810084 / gi:57834038), virus Maraba (SEQ ID NO:1-6), virus Carajas (SEQ ID NO:7-12, AY335185 / gi:33578037), virus Piry (D26175 / gi:442480, Z15093 / gi:61405), virus de estomatitis vesicular Alagoas, virus BeAn 157575, virus Boteke, virus Calchaqui, virus Eel American, virus Gray Lodge, virus Jurona, virus Klamath, virus Kwatta, virus La Joya, virus Malpais Spring, virus Mount Elgon bat (DQ457103 / gi:91984805), virus Perinet (AY854652 / gi:71842381), virus Tupaia (NC_007020 / gi:66508427), Farmington, virus Bahia Grande (SEQ ID NO:13-18), virus Muir Springs, virus Reed Ranch, virus Hart Park, virus Flanders (AF523199 / gi:25140635, AF523197 / gi:25140634, AF523196 / gi:25140633, AF523195 / gi:25140632, AF523194 / gi:25140631, AH012179 / gi:25140630), virus Kamese, virus Mosqueiro, virus Mossuril, virus Barur, virus Fukuoka (AY854651 / gi:71842379), virus Kern Canyon, virus Nkolbisson, virus Le Dantec (AY854650 / gi:71842377), virus Keuraliba, virus Connecticut, virus New Minto, virus Sawgrass, virus Chaco, virus Sena Madureira, virus Timbo, virus Almpiwar (AY854645 / gi:71842367), virus Aruac, virus Bangoran, virus Bimbo, virus Bivens Arm, virus Blue crab, virus Charleville, virus Coastal Plains, virus DakArk 7292, virus Entamoeba, virus Garba, virus Gossas, virus Humpty Doo (AY854643 / gi:71842363), virus Joinjakaka, virus Kannamangalam, virus Kolongo (DQ457100 / gi:91984799 nucleoprotein (N) mRNA, partial cds); virus Koolpinyah, virus Kotonkon (DQ457099 / gi:91984797, AY854638 / gi:71842354); virus Landjia, virus Manitoba, virus Marco, virus Nasoule, virus Navarro, virus Ngaingan (AY854649 / gi:71842375), virus Oak-Vale (AY854670 / gi:71842417), virus Obodhiang (DQ457098 / gi:91984795), virus Oita (AB116386 / gi:46020027), virus Ouango, virus Parry Creek (AY854647 / gi:71842371), virus Rio Grande cichlid, virus Sandjimba (DQ457102 / gi:91984803), Sigma virus (AH004209 / gi:1680545, AH004208 / gi:1680544, AH004206 / gi:1680542), virus Sripur, virus Sweetwater Branch, virus Tibrogargan (AY854646 / gi:71842369), virus Xiburema, virus Yata, Rhode Island, virus Adelaide River (U10363 / gi:600151, AF234998 / gi:10443747, AF234534 / gi:9971785, AY854635 / gi:71842348), virus Berrimah (AY854636 / gi:71842350), virus Kimberley (AY854637 / gi:71842352), o de la fiebre efimera bovina (NC_002526 / gi:10086561).

Ciertos serotipos sin asignar incluyen (1) el grupo Bahía Grande (virus Bahía Grande (BGV), virus Muir Springs (MSV), virus Reed Ranch (RRV); (2) virus del grupo Hart Park (Flanders virus (FLAV), virus Hart Park (HPV), virus Kamese (KAMV), virus Mosqueiro (MQOV), virus Mossuril (MOSV); (3) grupo del virus Kern Canyon (virus Barur (BARV), virus Fukuoka (FUKAV), virus Kern Canyon (KCV), virus Nkolbisson (NKOV); (4) Grupo Le Dantec (virus Le Dantec (LDV), virus Keuraliba (KEUV), (5) grupo Sawgrass (virus Connecticut (CNTV), virus New Minto (NMV), virus Sawgrass (SAWV); (6) Grupo Timbo (virus Chaco (CHOV), virus Sena Madureira (SMV), virus Timbo (TIMV); y (7) otros virus sin asignar (virus Almpiwar (ALMV), virus Aruac (ARUV), virus Bangoran (BGNV), virus Bimbo (BBOV), virus Bivens Arm (BAV), virus Blue crab (BCV), virus Charleville (CHVV), virus Coastal Plains (CPV), virus DakArk 7292 (DAKV-7292), virus Entamoeba (ENTV), virus Garba (GARV), virus Gossas (GOSV), virus Humpty Doo (HDOOV), Joinjakaka virus (JOIV), Kannamangalam virus (KANV), Kolongo virus (KOLV), Koolpinyah virus (KOOLV), virus Kotonkon (KOTV), virus Landjia (LJAV), virus Manitoba (MNTBV), virus Marco (MCOV), Ngaingan, virus Nasoule (NASV), virus Navarro (NAVV), virus Ngaingan (NGAV), virus Oak-Vale (OVRV), virus Obodhiang (OBOV), virus Oita (OITAV), virus Ouango (OUAV), virus Parry Creek (PCRV), virus Rio Grande cichlid (RGRCV), virus Sandjimba (SJBV), virus Sigma [X91062] (SIGMAV), virus Sripur (SRIV), virus Sweetwater Branch (SWBV), virus Tibrogargan (TIBV), virus Xiburema (XIBV), virus Yata (YATAV).

Los aspectos de la divulgación pueden incluir, pero no se limita a rhabdovirus no VSV seleccionados o rhabdovirus pseudotipados basados en su crecimiento en líneas celulares, falta de o una mínima toxicidad en ratones adultos (animales), falta o mínima toxicidad en ratones lactantes (animales).

45 **A. Genoma rhabdovírico**

Normalmente el genoma del rhabdovirus tiene aproximadamente de 11-15 kb con un líder 3' de 50 nucleótidos y una región no traducida 5' de aproximadamente 60 nucleótidos de un ARN vírico en sentido (-) (vARN). Normalmente, el vARN del rhabdovirus tiene 5 genes que codifican 5 proteínas. Los rhabdovirus tienen una señal de poliadenilación conservada al final de cada gen y una corta región intergénica entre cada uno de los 5 genes. Todos los rhabdovirus contienen 5 genes que codifican la proteína de la nucleocápside (N), Fosfoproteína (P, también denominada NS), proteína de la matriz (M), glicoproteína (G), y proteína grande (L). Normalmente, estos genes se ordenan en el vARN en sentido negativo de la siguiente manera: 3'-N-P-M-G-(X)-L-5'. El orden de los genes es importante ya que dicta la proporción de proteínas sintetizadas. Cualquier modificación del genoma de un rhabdovirus incluye normalmente al menos cinco dominios de transcripción para mantener la capacidad de infectar y replicarse a altos niveles. Los rhabdovirus tiene una ARN polimerasa para la transcripción de más ARNm en sentido. El gen X no existe en todos los rhabdovirus. El gen X codifica una proteína no estructural que se encuentra en el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa de los peces (DQ164103 / gi:76262981; DQ164102 / gi:76262979; DQ164101 / gi:76262977; DQ164100 / gi:76262975; DQ164099 / gi:76262973; AB250935 / gi:112821165; AB250934 / gi:112821163; AB250933 / gi:112821161; AB250932 / gi:112821159; AB250931 / gi:112821157; AB250930 / gi:112821155; AB250929 / gi:112821153; AB250928 / gi:112821151; AB250927 / gi:112821149, que describen la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína G), una glicoproteína no estructural del virus de la fiebre efimera bovina y un pseudogén en el virus de rabia. El gen extra (X) se ha encontrado en diferentes localizaciones del genoma de rhabdovirus. Las síntesis de proteína M en las células infectadas es citopático para la célula, y

eventualmente da como resultado la muerte celular.

La transmisión del rhabdovirus varía dependiendo del virus/huésped, pero la mayoría se transmite por contacto directo – por ejemplo, la transmisión de rabia por mordedura de un animal o un insecto vector. Existe un periodo de incubación largo *in vivo*, pero esto no se refleja en la cinética de replicación vírica en cultivo. Las espículas de la proteína G se unen a los receptores en la superficie de las células huésped y los virus entran en la célula por endocitosis y se fusionan con la membrana de la vesícula con la mediación de la proteína G.

Sin intentar quedar limitados por una teoría en particular, se cree que las moléculas del receptor para los rhabdovirus son fosfolípidos más que proteínas específicas. La replicación rhabdovírica se produce en el citoplasma – tanto la proteína L y NS son necesarias para la transcripción – no funcionan solas. Se producen cinco ARNm monocistronicos, protegidos en el extremo 5' y poliadenilados en el extremo 3' y cada uno contiene la secuencia líder desde el extremo 3' del vARN en el extremo 5' del mensaje. Estos ARNm se producen por transcripción secuencial de las ORF en el genoma vírico y no se ha demostrado que la secuencia intergénica sea responsable de la terminación y reinicio de la transcripción por la polimerasa entre cada gen, produciéndose así transcripciones diferentes.

El vARN de la progenie se produce a partir de un intermediario en sentido (+). El genoma se replica por el complejo polimerasa L + P (como en la transcripción), pero también son necesarios factores de la célula del huésped adicionales. Es característico de los rhabdovirus que estos eventos se produzcan en una parte del citoplasma que actúa como una 'fábrica' de virus y aparece como un cuerpo de inclusión citoplásmico característico.

B. Variantes de proteínas víricas

En ciertos aspectos, un rhabdovirus o rhabdovirus no VSV comprenderá una variante de una o más de las proteínas N, P, M, G y/o L. En ciertos aspectos de la divulgación estas variantes de proteínas víricas pueden estar comprendidas en una composición proteínica que se definen adicionalmente con posterioridad. Las composiciones proteínicas incluyen partículas víricas y otras composiciones que tienen uno o más componentes proteicos víricos. Estas variantes de polipéptido se pueden modificar o seleccionar para una modificación en una o más características fisiológicas o biológicas, tal como intervalo de células huésped, especificidad de células huésped, toxicidad para las células u órganos no diana, replicación, citotoxicidad para una célula diana, destrucción de células cancerosas, éstasis de células cancerosas, infectividad, parámetros de fabricación, tamaño de partícula vírica, estabilidad de las partículas víricas, aclaramiento *in vivo*, inmunorreactividad, y similares. Estas variantes polipeptídicas se pueden modificar utilizando una variedad de metodologías conocidas en la técnica, incluyendo distintas técnicas de mutagénesis descritas posteriormente.

C. Rhabdovirus recombinantes

Los rhabdovirus recombinantes se pueden producir (1) completamente utilizando ADNc o (2) con una combinación de ADNc transfectados en una célula auxiliar, o (3) con ADNc transfectados en una célula que se infectan adicionalmente con un rhabdovirus recombinante infeccioso o no infeccioso. Utilizando cualquiera de estos procedimientos (por ejemplo, minivirus, línea celular auxiliar, o transfección solo de ADNc), los componentes mínimos necesarios son una molécula de ARN que contenga las señales cis-actuantes para (1) la encapsidación del ARN genómico (o antígenómico) por la proteína N del rhabdovirus, y (2) la replicación de un equivalente de ARN genómico o antígenómico (intermediario replicante).

Por elemento replicante o replicón, los inventores quieren decir una cadena de ARN que contenga mínimamente en los extremos 5' y 3' la secuencia líder y la secuencia remolque de un rhabdovirus. En el sentido genómico el líder está en el extremo 3' y el remolque está en el extremo 5'. Cualquier ARN situado entre estas dos señales de replicación ser replicará a su vez. Las regiones líder y remolque deben contener adicionalmente los elementos cis-actuantes mínimos con fines de encapsidación por la proteína N y para la unión de la polimerasa que son necesarios para iniciar la transcripción y replicación.

Para la preparación de rhabdovirus modificados uno minivirus que contenga el gen G también contendría una región líder y una región remolque y un gen G con las señales apropiadas de inicio y terminación para la producción de un ARNm de proteína G. Si el minivirus comprende adicionalmente un gen M, deben estar presentes también las señales apropiadas de inicio y terminación para la producción del ARNm de la proteína M.

Para cualquier gen contenido dentro del genoma modificado del rhabdovirus, el gen estaría flanqueado por las señales apropiadas de inicio y terminación de la transcripción, que es un gen que normalmente no se codifica por un rhabdovirus aislados de la naturaleza o que contiene la región codificante de rhabdovirus en una posición, forma o contexto que normalmente no se encuentra, por ejemplo, una proteína G quimérica.

Para producir rhabdovirus modificados "no-infecciosos", el rhabdovirus modificado puede tener elementos mínimos de replicón y las proteínas N, P y L y debe contener el gen M (un ejemplo es la construcción ΔG o G-menos, que ha perdido la región codificante de la proteína G). Esto produce partículas víricas que brotan de la célula pero que son partículas no infecciosas. Para producir partículas "infecciosas", las partículas víricas deben comprender adicionalmente proteínas que puedan mediar la unión de la partícula vírica y la fusión, tal como mediante el uso de

una proteína de enganche o ligando de receptor. El ligando de receptor nativo de rhabdovirus es la proteína G.

Una "célula adecuada" o "célula huésped" significa cualquier célula que permita la unión del rhabdovirus recombinante.

5 Par preparar partículas víricas infecciosas, se infecta primero una línea celular apropiada (por ejemplo, células BHK) con virus vaccinia VTF7-3 (Fuerst y col., 1986) o un equivalente que codifica la ARN polimerasa T7 u otras polimerasas de bacteriófago adecuada tal como las polimerasas T3 o SP6 (véase Usdin y col., 1993 o Rodríguez y col., 1990). Las células se transfectan entonces con ADNc individuales que contienen los genes que codifican las proteínas G, N, P y L de rhabdovirus. Estos ADNc proporcionarán las proteínas para construir una partícula de rhabdovirus recombinante. Las células se pueden transfectar por cualquier procedimiento conocido en la técnica (por ejemplo, liposomas, electroporación, etc.).

10 También se transfectan en una línea celular un "ADNc policistrónico" que contenga el equivalente de ARN genómico de rhabdovirus. Si se pretende que la partícula de rhabdovirus recombinante infecciosa sea lítica en la célula infectada, entonces los genes que codifican las proteínas N, P, M y L deben estar presentes, así como cualquier segmento de ácido nucleico heterólogo. Si no se pretende que la partícula de rhabdovirus recombinante infecciosa sea lítica, entonces el gen que codifica la proteína M no se incluye en el ADN policistrónico. Por "ADNc policistrónico" se quiere decir un ADNc que comprende al menos unidades de transcripción que contengan los genes que codifican las proteínas N, P y L. El ADN policistrónico de rhabdovirus recombinante puede contener también un gen que codifique una variante de proteína o fragmento polipeptídico de la misma, o un ácido nucleico terapéutico. De manera alternativa, cualquier proteína asociada inicialmente con la particular vírica producida primero o fragmento de la misma se puede suministrar en trans.

15 Otro aspecto que se contempla es un ADN policistrónico que comprende un gen que codifica una proteína indicadora o proteína fluorescente (por ejemplo, una proteína fluorescente verde y sus derivados, β -galactosidasa, fosfatasa alcalina, luciferasa, cloranfenicol acetiltransferasa, etc.), los genes N-P-L o N-P-L-M, y/o una proteína de fusión o un ácido nucleico terapéutico. Otro ADN policistrónico contemplado puede contener un gen que codifica una variante proteica, un gen que codifica un indicador, un ácido nucleico terapéutico, y/o cualquiera de los genes N-P-L o los genes N-P-L-M.

20 La primera etapa en la generación de un rhabdovirus recombinante es la expresión de un ARN que es un equivalente genómico o antígenómico de un ADNc. Luego ese ARN se empaqueta en la proteína N y luego se replica mediante las proteínas p/l. El virus así producido se puede recuperar. Si la proteína G está ausente del ARN genómico recombinante, normalmente se suministra en trans. Si están ausentes las proteínas G y M, entonces ambas se suministran en trans.

25 Para la preparación de partículas de "rhabdovirus no infeccioso", el procedimiento puede ser el mismo que anteriormente, excepto que el ADNc policistrónico transfectado en las células contendría solo los genes N, P y L de rhabdovirus. El ADNc policistrónico de partículas de rhabdovirus no infeccioso pueden contener adicionalmente un gen que codifique una proteína indicadora o un ácido nucleico terapéutico. Para una descripción adicional con respecto a los procedimientos de producción de un rhabdovirus recombinante que carezca del gen codificante de la proteína G, véase Takada y col. (1997).

1. Cultivo de células para producir virus

30 Las células transfectadas se incuban habitualmente durante al menos 24 h a la temperatura deseada, habitualmente aproximadamente de 37. Para las partículas víricas no infecciosas, se recolectó el sobrenadante y las partículas víricas aisladas. Para las partículas víricas infecciosas, el sobrenadante que contiene el virus se recolecta y se transfiere a nuevas células. Las nuevas células se incuban durante aproximadamente 48 horas, y se recolecta el sobrenadante.

2. Purificación del rhabdovirus recombinante

35 Los términos "aislamiento" o "aislar" un rhabdovirus significa el proceso de cultivo y purificación de las partículas víricas de manera que permanecen muy pocos desechos celulares. Un ejemplo sería tomar el sobrenadante que contiene el virión y pasarlo a través de un filtro con un tamaño de poro de 0,1-0,2 micrómetros (por ejemplo, Millex-GS, Millipore) para retirar el virus y los desechos celulares. De manera alternativa, se pueden purificar los viriones utilizando un gradiente, tal como un gradiente de sacarosa. Las partículas de rhabdovirus recombinante se pueden aglomerar y resuspender en cualquier excipiente o vehículo que se desee. Los títulos se pueden determinar por inmunofluorescencia indirecta utilizando anticuerpos específicos para las proteínas particulares.

3. Procedimientos de producción de rhabdovirus recombinantes utilizando ADNc y un minivirus o una línea celular auxiliar

40 Tanto los "minivirus" como las "células auxiliares" (también conocidas como "líneas celulares auxiliares") proporcionan la misma cosa: proporcionar una fuente de proteína de rhabdovirus para el ensamblaje de viriones de rhabdovirus. Un ejemplo de un minivirus de rhabdovirus es el minivirus VSV, que expresa solo la proteína G y M,

como informan Stillman y col., (1995). Los virus auxiliares y los minivirus se utilizan como procedimientos para proporcionar proteínas de rhabdovirus que no se producen a partir del ADN transfectado que codifica los genes de proteínas de rhabdovirus.

5 Cuando se utiliza un minivirus, las células se infectan con un virus vaccinia como se ha descrito anteriormente para los fines de proporcionar la ARN polimerasa T7. El ARN policistrónico deseado, y los plásmidos que contienen los genes N, P y L se transfectan en las células. La mezcla de transfección se retira después de aproximadamente 3 h y se infectan las células con el minivirus con una multiplicidad de infección (m.o.i.) de aproximadamente 1. El minivirus aporta las proteínas G y/o M omitidas. El ARN policistrónico transfectado en la célula dependerá de si se quiere un rhabdovirus recombinante infeccioso o no infeccioso.

10 De manera alternativa, se podría utilizar un minivirus para proporcionar los genes N, P y L. El minivirus se podría utilizar también para producir la proteína M además de N, P y L. El minivirus también puede producir la proteína G.

15 Cuando se utiliza una línea celular auxiliar, los genes que codifican las proteínas de rhabdovirus omitidas se producen por la línea celular auxiliar. La línea celular auxiliar tiene las proteínas N, P, L y G para la producción de partículas de rhabdovirus recombinantes que no codifican la proteína G de tipo silvestre. Las proteínas se expresan a partir de genes o ADN que no son parte del genoma vírico recombinante. Estos plásmidos u otro sistema de vectores se incorporan establemente en el genoma de la línea celular. Las proteínas se producen entonces a partir del genoma celular y no a partir de un replicón en el citoplasma. La célula auxiliar puede entonces transfectarse con un ADN policistrónico y ADNc plasmídicos que contienen los otros genes de rhabdovirus que no expresa el virus auxiliar. El ARN policistrónico que se utilice dependerá de si se desea un rhabdovirus recombinante infeccioso o no infeccioso. De otra manera, se consigue el suministro los productos genéticos omitidos (por ejemplo, G y/o M) como se ha descrito anteriormente.

II. COMPOSICIONES VÍRICAS

25 La presente divulgación se refiere a un rhabdovirus que tiene ventajas en el estudio y tratamiento de células hiperproliferativas o neoplásicas (por ejemplo, células cancerosas) y afecciones hiperproliferativas o neoplásicas (por ejemplo, el cáncer) en un paciente. Las enseñanzas descritas posteriormente proporcionan distintos ejemplos de protocolos para implementar un virus Farmington para su uso en la invención como se define en las reivindicaciones y las composiciones para su uso en la invención como se define en las reivindicaciones. Proporcionan el entorno para la generación de virus mutantes o variantes por medio del uso de bioselección o tecnología de ADN o ácido nucleico recombinante.

30 A. Composiciones proteínicas

35 Las composiciones proteínicas de la invención incluyen las partículas víricas y composiciones que incluyen las partículas víricas, así como polipéptidos aislados. En ciertos aspectos se generan o aíslan rhabdovirus oncolíticos pseudotipados o VSV (rhabdovirus que lisan, destruyen o retrasan el crecimiento de células cancerosas). En ciertos aspectos, los rhabdovirus se modificarán para que incluyan variantes polipeptídicas de proteínas de rhabdovirus (N, P, M, G y/o L) y/o ácidos nucleicos terapéuticos que codifiquen polipéptidos terapéuticos. Otros aspectos incluyen el aislamiento de rhabdovirus que carecen de uno o más polipéptidos o proteínas funcionales. En otras realizaciones, la presente invención se refiere al virus de Farmington para su uso como se define en las reivindicaciones. Además, se contempla su uso en combinación con o incluido en composiciones proteínicas como parte de una formulación farmacéuticamente aceptable

40 Como se utiliza en el presente documento, una "proteína" o un "polipéptido" se refiere a una molécula que comprende un polímero de restos de aminoácido. En algunos aspectos, se emplea una versión de tipo silvestre de una proteína o polipéptido, sin embargo, en muchas realizaciones de la divulgación, todo o parte de una proteína o polipéptido vírico está ausente o alterado de manera que haga que el virus sea más útil para el tratamiento de un paciente. Los términos descritos anteriormente se pueden utilizar de manera intercambiable en el presente documento. Una "proteína modificada" o "polipéptido modificado" o "una variante de proteína" o "una variante de polipéptido" se refiere a una proteína o polipéptido cuya estructura química o secuencia de aminoácidos está alterada con respecto a la de tipo silvestre o a una proteína o polipéptido de referencia. En algunos aspectos, una proteína o polipéptido modificado tiene al menos una actividad o función modificada (reconociendo que las proteínas o polipéptidos pueden tener múltiples actividades o funciones). La actividad o función modificada puede reducirse, disminuir, eliminarse, aumentarse, mejorarse, o alterarse de alguna otra manera (tal como la especificidad de infección) con respecto a la actividad o función de una proteína o polipéptido de tipo silvestre, o las características del virus que contiene dicho polipéptido. Se contempla que una proteína o polipéptido modificado puede alterarse con respecto a una actividad o función mientras se mantiene la actividad o función de tipo silvestre o inalterada en otros aspectos. De manera alternativa, una proteína puede ser completamente no funcional o su secuencia de ácidos nucleicos equivalente puede haberse alterado de manera que el polipéptido no se vuelva a expresar más, esté truncado, o exprese una secuencia de ácido nucleico diferentes como resultado de un cambio de fase u otra modificación.

En ciertos aspectos, el tamaño de una proteína o polipéptido recombinante puede comprender, pero no se limita , 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 o más restos de moléculas de aminoácido, y cualquier intervalo derivado de esto. Se contempla que los polipéptidos se pueden modificar por truncado, haciéndolos más cortos que sus formas correspondientes sin alterar o por fusión o intercambio de dominios pueden dar lugar a una proteína alterada más larga.

10 Como se utiliza en el presente documento, una "molécula de aminoácido" se refiere a cualquier aminoácido, derivado de aminoácido, mimético de aminoácido como conocerá un experto habituado en la técnica. En ciertos aspectos, los restos de la molécula proteínica es secuencial, sin ninguna molécula no amino que interrumpa la secuencia de restos de moléculas de aminoácido. En otros aspectos la secuencia puede comprender uno o más restos de moléculas no amino. En aspectos particulares, la secuencia de restos de molécula proteínica se puede interrumpir por uno o más restos de molécula no amino. En consecuencia, la expresión "composición proteínica" engloba secuencias de moléculas de amino que comprende al menos uno de los 20 aminoácidos comunes de las proteínas sintetizadas naturalmente, o al menos un aminoácido modificado o inusual.

20 Las composiciones proteínicas se pueden producir por cualquier técnica conocida por los expertos en la técnica, incluyendo la expresión de proteínas, polipéptidos, o péptidos mediante técnicas de biología molecular, el aislamiento de los compuestos proteínicos de fuentes naturales, o síntesis química de materiales proteínicos. Las secuencias de nucleótidos y polipéptidos de distintos genes o genomas de rhabdovirus se habían desvelado previamente, y se pueden encontrar en bases de datos computarizadas conocidas por los expertos habituados en la técnica. Una de dichas bases de datos es el GenBank del Centro Nacional de información Biotecnológica y las bases de datos GenPept, a las que se puede acceder mediante internet en nc-bi.nlm.nih.gov/. Las regiones codificantes de estos genes y virus conocidos se pueden amplificar y/o expresar utilizando las técnicas desveladas en el presente documento o como es sabido por los expertos habituados en la técnica.

B. Aspectos funcionales

30 Cuando la presente solicitud se refiere a la función o actividad de proteínas o polipéptidos víricos, quiere decir que se refiere a la actividad o función de esa proteína o polipéptido vírico en condiciones fisiológicas, a menos de que se especifique otra cosa. Por ejemplo, la proteína G está implicada en la especificidad y la eficacia de unión y la infección de tipos celulares particulares. La determinación de qué moléculas poseen esta actividad se puede conseguir utilizando ensayos familiares a los expertos en la técnica, tales como ensayos de infectividad, ensayos de unión proteica, ensayos de placas y similares.

C. Variantes de polipéptidos víricos

35 Las variantes de secuencia de aminoácidos de los polipéptidos de la presente divulgación pueden ser variantes de sustitución, inserción o eliminación. Una mutación en un gen que codifica una polipéptido vírico puede afectar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 o más aminoácidos no contiguos o contiguos (es decir, segmentos) de un polipéptido en comparación con un polipéptido de tipo silvestre o sin altera u otro polipéptido de referencia. Se pueden identificar distintos polipéptidos codificados por rhabdovirus en referencia a los números de acceso del GenBank y las entradas en la base de datos pública relacionada para cada uno de los virus desvelados en el presente documento.

45 Las variantes de eliminación carecen de uno o más restos de la proteína nativa, sin alterar o de tipo silvestre. Se pueden eliminar restos individuales, o se pueden eliminar todo o parte de un dominio (tal como un dominio catalítico o de unión). Un codón de parada se puede introducir (por sustitución o inserción) en una secuencia de ácido nucleico codificante para generar una proteína truncada. Los mutantes de inserción normalmente implican la adición de material en un punto no terminal del polipéptido, un tipo específico de inserción es un polipéptido quimérico que incluye porciones homólogas o similares de una proteína relacionada en lugar de los restos. También se pueden generar adiciones terminales, normalmente llamadas proteínas de fusión.

55 Las variantes de sustitución normalmente contienen el intercambio de un aminoácido por otro en uno o más sitios dentro de la proteína, y se pueden diseñar para modular una o más propiedades del polipéptido, con o sin la pérdida de otras funciones o propiedades. Las sustituciones pueden ser conservadoras, es decir, un aminoácido se sustituye por otro con una forma y carga similares. Las sustituciones conservadoras se conocen bien en la técnica e incluyen, por ejemplo, los cambios de: alanina por serina; arginina por lisina; asparagina por glutamina o histidina; aspartato por glutamato; cisteína por serina; glutamina por asparagina; glutamato por aspartato; glicina por prolina; histidina por asparagina o glutamina; isoleucina por leucina o valina; leucina por valina o isoleucina; lisina por arginina; metionina por leucina o isoleucina; fenilalanina por tirosina, leucina o metionina; serina por treonina; treonina por

serina; triptófano por tirosina; tirosina por triptófano o fenilalanina; y valina por isoleucina o leucina. De manera alternativa, las sustituciones pueden ser no conservadoras de manera que afectan a la función o actividad del polipéptido. Los cambios no conservadores implican normalmente la sustitución de un resto con otro que sea distinto químicamente, tal como un aminoácido polar o con carga por un aminoácido no polar o sin carga, y viceversa.

- 5 La expresión “codón funcionalmente equivalente” se utiliza en el presente documento para referirse a codones que codifican el mismo aminoácido, tal como los seis codones para la arginina o serina, y también se refiere a codones que codifican aminoácidos biológicamente equivalentes (véase la Tabla 1, a continuación).

Tabla 1. Tabla de codones

Aminoácidos			Codones
Alanina	Ala	A	GCA GCC GCG GCU
Cisteína	Cys	C	UGC UGU
Ácido aspártico	Asp	D	GAC GAU
Ácido glutámico	Glu	E	GAA GAG
Fenilalanina	Phe	F	UUC UUU
Glicina	Gly	G	GGA GGC GGG GGU
Histidina	His	H	CAC CAU
Isoleucina	Ile	I	AUA AUC AUU
Lisina	Lys	K	AAA AAG
Leucina	Leu	L	UUA UUG CUA CUC CUG CUU
Metionina	Met	M	AUG
Asparagina	Asn	N	AAC AAU
Prolina	Pro	P	CCA CCC CCG CCU
Glutamina	Gln	Q	CAA CAG
Arginina	Arg	R	AGA AGG CGA CGC CGG CGU
Serina	Ser	S	AGC AGU UCA UCC UCG UCU
Treonina	Thr	T	ACA ACC ACG ACU
Valina	Val	V	GUA GUC GUG GUU
Triptófano	Trp	W	UGG
Tirosina	Tyr	Y	UAC UAU

- 10 También se entenderá que las secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos pueden incluir restos adicionales, tal como aminoácidos adicionales en el extremo N o C o secuencias 5' o 3', y seguir siendo esencialmente como los que se exponen en el presente documento, incluyendo los que tienen una cierta actividad biológica. La adición de secuencias terminales se aplica particularmente a las secuencias de ácido nucleico que puede, por ejemplo, incluir distintas secuencias no codificantes flanqueando las partes 5' o 3' de la región codificante o que pueden incluir distintas secuencias internas, es decir, intrones, que se conoce que existen dentro de los genes.

- 15 Lo siguiente es una exposición basándose en el cambio de aminoácidos de una proteína N, P, L o G para crear una molécula equivalente, o incluso mejorada. Por ejemplo, se pueden sustituir ciertos aminoácidos por otros aminoácidos en una estructura proteica sin apreciar pérdida de capacidad de unión interactiva con estructuras tales como, por ejemplo, regiones de unión al antígeno de anticuerpos o sitios de unión en moléculas de sustrato. Como es la capacidad interactiva y la naturaleza de una proteína lo que define esa actividad funcional biológica de la
- 20 proteína, se pueden hacer ciertas sustituciones de aminoácidos en una secuencia proteica y en su secuencia de ADN codificante subyacente, y, no obstante, producir una proteína con propiedades parecidas. Por lo tanto, los inventores contemplan que se pueden hacer distintos cambios en las secuencias de ADN de los rhabdovirus sin apreciar una pérdida de actividad o utilidad biológica de interés, como se expone posteriormente.

- 25 Al hacer dichos cambios, se puede considerar el índice hidropático de los aminoácidos. La importancia del índice hidropático de los aminoácidos para dar una función a una proteína se conoce en general en la técnica (Kyte y Doolittle, 1982). Se acepta que el carácter hidropático relativo del aminoácido contribuye a la estructura secundaria

de la proteína resultante, que a su vez define la interacción de la proteína con otras moléculas, por ejemplo, enzimas, sustratos, receptores, ADN, anticuerpos, antígenos, y similares.

También se entiende en la técnica que la sustitución de aminoácidos similares se puede hacer eficazmente basándose en la hidrofilia. La patente de EE. UU. 4.554.101, establece que el mayor promedio local de hidrofilia de una proteína, que dependerá de la hidrofilia de sus aminoácidos adyacentes, se correlaciona con una propiedad biológica de una proteína. Como se detalla en la Patente de EE. UU. 4.554.101, se han asignado los siguientes valores de hidrofilia a los restos de aminoácido: arginina (+3,0); lisina (+3,0); aspartato (+3,0 ± 1); glutamato (+3,0 ± 1); serina (+0,3); asparagina (+0,2); glutamina (+0,2); glicina (0); treonina (-0,4); prolina (-0,5 ± 1); alanina (0,5); histidina (-0,5); cisteína (-1,0); metionina (-1,3); valina (-1,5); leucina (-1,8); isoleucina (-1,8); tirosina (2,3); fenilalanina (-2,5); triptófano (-3,4). Se entiende que un aminoácido se puede sustituir por otro que tenga un valor de hidrofilia similar y seguir produciendo una proteína biológicamente equivalente e inmunológicamente equivalente. En dichos cambios la sustitución de aminoácidos cuyos valores de hidrofilia están dentro de 62 se prefieren, los que están dentro de 61 son particularmente preferidos, y los que están dentro de 60,5 son incluso más particularmente preferidos.

Como se ha señalado anteriormente, las sustituciones de aminoácidos se basan en general en la relativa similitud de los sustituyentes de cadenas laterales del aminoácido, por ejemplo, su hidrofobia, hidrofilia, carga, tamaño y similares. Las sustituciones ejemplares que tienen en consideración las distintas características anteriores son bien conocidas por los expertos e incluyen: arginina y lisina; glutamato y aspartato; serina y treonina; glutamina y asparagina; y valina, leucina, e isoleucina.

III. MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO

La presente divulgación incluye polinucleótidos que se pueden aislar de células que son capaces de expresar todo o parte de un proteína o polipéptido vírico. En algunos aspectos de la divulgación, se refiere a todo o partes del genoma vírico que se ha mutado o alterado específicamente para generar un polipéptido vírico o virus, por ejemplo, un polipéptido rhabdovírico o virus pseudotipado o no VSV, con ciertas propiedades y/o características. Los polinucleótidos pueden codificar un péptido o polipéptido que contenga todo o parte de una secuencia de aminoácidos heteróloga o vírica o se modifican de manera que no codifiquen dicho polipéptido vírico o que codifiquen un polipéptido que tenga al menos una función o actividad añadida, aumentada, reducida, añadida, disminuida o ausente. Las proteínas recombinantes se pueden purificar a partir de células de expresión para obtener proteínas activas. Los miembros del genoma de rhabdovirus se pueden encontrar con los números de acceso al GenBank en la base de datos del NCBI o bases de datos similares.

A. Polinucleótidos que codifican proteínas nativas o modificadas

Como se utiliza en el presente documento "ARN, ADN, o segmento de ácido nucleico" se refiere a un ARN, ADN o molécula de ácido nucleico que se ha aislado libre del ADN genómico total u otros contaminantes. Por lo tanto, un segmento de ácido nucleico que codifica un polipéptido se refiere a un segmento de ácido nucleico que contiene secuencias de tipo silvestre, polimórficas, o que codifican polipéptidos mutantes que se han aislado de, o se han purificado libres de, ácidos nucleicos genómicos. Se incluye dentro de la expresión "segmento de ácido nucleico" los polinucleótidos, segmentos de ácido nucleico menores de un polinucleótido, y vectores recombinantes, que incluyen, por ejemplo, plásmidos, cósmidos, fagos, virus, y similares.

Como se utiliza en la presente solicitud, la expresión "polinucleótidos rhabdovíricos" se puede referir a una molécula de ácido nucleico rhabdovírica pseudotipada o no VSV que codifica al menos un polipéptido rhabdovírico no VSV. En ciertos aspectos el polinucleótido se ha aislado libre de otros ácidos nucleicos. De manera similar, un "polinucleótido de virus Maraba, virus Carajas, virus Muir Springs y/o virus Bahía Grande" se refiere a una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido de virus Maraba, virus Carajas, virus Muir Springs y/o virus Bahía Grande que se ha aislado de otros ácidos nucleicos. Un "genoma rhabdovírico" o un "genoma vírico de virus Maraba, virus Carajas, virus Muir Springs y/o virus Bahía Grande" se refiere a una molécula de ácido nucleico VSV o no VSV que se puede proporcionar a una célula huésped para obtener una partícula vírica, en presencia o ausencia de un virus auxiliar o regiones codificantes complementarias que suministren otros factores en trans. El genoma puede haber sido mutado o no en comparación con un virus de tipo silvestre o no alterado.

El término "ADNc" pretende referirse a un ADN que se prepara utilizando un ARN como matriz. Puede haber veces en las que se prefiera la secuencia genómica completa o parcial.

También se contempla que un polipéptido particular de una especie determinada puede estar representada por variantes naturales que tienen secuencias de ácidos nucleicos ligeramente diferentes, que, no obstante, codifiquen la misma proteína (véase, la Tabla 1 anteriormente).

De manera similar, un polinucleótido que codifica un polipéptido aislado o purificado de tipo silvestre o modificado se refiere a un segmento de ADN que incluye un polipéptido de tipo silvestre o mutante que codifica secuencias y, en ciertos aspectos, secuencias reguladoras, sustancialmente aisladas de otros genes de origen natural o secuencias codificantes de proteínas. A este respecto, el término "gen" se utiliza por simplicidad para referirse a una unidad de ácido nucleico que codifica una proteína, polipéptido, o péptido (incluyendo cualquier secuencia necesaria para la

transcripción apropiada, la modificación postraducciona, o localización). Como entenderán los expertos en la técnica, este término funcional incluye secuencias genómicas, secuencias de ADNc, y segmentos de ácido nucleico modificado más pequeños que expresen o se puedan adaptar para que expresen proteínas, polipéptidos, dominios, péptidos, proteínas de fusión, y mutantes. Una ácido nucleico que codifica todo o parte de un polipéptido nativo o modificado puede contener un ácido nucleico contiguo de: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 441, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1100, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, o más pares de bases.

En aspectos particulares, la divulgación se refiere a segmentos de ácido nucleico aislados y vectores recombinantes que incorporan secuencias de ácido nucleico que codifican un polipéptido rhabdovírico de tipo silvestre o mutante que incluye dentro de su secuencia de aminoácidos una secuencia de aminoácidos contigua de acuerdo con, o esencialmente que se corresponde con un polipéptido nativo. El término "recombinante" se puede utilizar en conjunción con un polipéptido o el nombre de un polipéptido específico, y se refiere en general a un polipéptido producido por una molécula de ácido nucleico que se ha modificado *in vitro* o que es el producto replicado de dicha molécula.

En otros aspectos, la divulgación se refiere a segmentos de ácido nucleico aislados y vectores recombinantes que incorporan secuencias de ácido nucleico que codifican un polipéptido o péptido que incluye dentro de su secuencia de aminoácidos una secuencia de aminoácidos contigua de acuerdo con, o que se corresponde esencialmente con uno o más polipéptidos rhabdovíricos.

Los segmentos de ácido nucleico que se utilizan en la presente divulgación, independientemente de la longitud de la propia secuencia codificante, se pueden combinar con otras secuencias de ácido nucleico, tales como promotores, señales de poliadenilación, sitios de enzimas de restricción, sitios de clonación múltiple, otros segmentos codificantes, y similares, de manera que su longitud total puede variar considerablemente. Por lo tanto, se contempla que se puede utilizar un fragmento de ácido nucleico casi de cualquier longitud, estando limitada la longitud total preferentemente por la facilidad de preparación y el uso del protocolo de ácido nucleico recombinante que se pretenda.

Se contempla que las construcciones de ácido nucleico de la presente divulgación pueden codificar polipéptidos de longitud completa a partir de cualquier fuente o codificar una versión truncada o modificada de los polipéptidos, por ejemplo, un polipéptido rhabdovírico truncado, de manera que la transcripción de la región codificante represente la versión truncada. La transcripción truncada puede entonces traducirse en una proteína truncada. De manera alternativa, una secuencia de ácido nucleico puede codificar una secuencia de polipéptido de longitud completa con secuencias codificantes heterólogas adicionales, por ejemplo, para permitir la purificación de los polipéptidos, el transporte, secreción modificación postraducciona, o por sus beneficios terapéuticos tales como el direccionamiento o la eficacia. Como se ha tratado anteriormente, se puede añadir a la secuencia que codifica un polipéptido modificado un marcador u otro polipéptido heterólogo, en el que "heterólogo" se refiere a un polipéptido o segmento del mismo que no es el mismo que el polipéptido modificado ni se encuentra asociado o codificado por el virus de origen natural.

En un ejemplo no limitante, se pueden preparar una o más construcciones de ácido nucleico que incluyan un tramo contiguo de nucleótidos idéntico o complementario de un segmento vírico particular, tal como un gen rhabdovírico N, P, M, G o L. Una construcción de ácido nucleico puede tener al menos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 750.000, hasta al menos 1.000.000 nucleótidos de longitud, así como construcciones de tamaño mayor, hasta e incluyendo tamaños cromosómicos (incluyendo todas las longitudes intermedias e intervalos intermedios). Se entenderá fácilmente que "longitudes intermedias" e "intervalos intermedios" como se utilizan en el presente documento, significan cualquier longitud o intervalo incluido o entre los valores acotados (es decir, todos los números enteros incluidos y entre dichos valores).

Los segmentos de ácido nucleico que se utilizan en la presente divulgación engloban ácidos nucleicos modificados que codifican polipéptidos modificados. Dichas secuencias pueden aparecer como consecuencia de redundancia de codón y equivalencia funcional que se sabe que se produce naturalmente dentro de las secuencias de ácido nucleico y las proteínas así codificadas. De manera alternativa, se pueden crear proteínas o péptidos funcionalmente equivalentes mediante la aplicación de tecnología de ADN recombinante, en la que se pueden modificar cambios en la estructura proteica, basándose en consideraciones de las propiedades de los aminoácidos que se van a intercambiar. Los cambios diseñados por el ser humano se pueden introducir mediante la aplicación de técnicas de mutagénesis dirigida al sitio, por ejemplo, para introducir mejoras de la antigenicidad o la falta de la misma de la proteína, para reducir los efectos de toxicidad de la proteína *in vivo* a un sujeto al que se da la proteína, o para aumentar la eficacia de cualquier tratamiento que implique la proteína o un virus que comprenda dicha proteína.

En otros ciertos aspectos, la divulgación se refiere a segmentos aislados de ácido nucleico y vectores recombinantes que incluyen dentro de su secuencia una secuencia de ácido nucleico contigua de entre las que se muestran en las secuencias identificadas en el presente documento. Dichas secuencias, sin embargo, se pueden mutar para obtener un producto proteico cuya actividad se altera con respecto al de tipo silvestre.

5 También se entenderá que la presente divulgación no se limita a las secuencias de ácido nucleico o aminoácidos en particular de estas secuencias identificadas. Los vectores recombinantes y segmentos de ácido nucleico aislados pueden por lo tanto incluir de manera distinta regiones codificantes propias de rhabdovirus, regiones codificantes que tienen alteraciones o modificaciones seleccionadas en la región codificante básica, o pueden codificar polipéptidos mayores que no obstante incluyan regiones codificantes de rhabdovirus, o pueden codificar proteínas o péptido que tienen secuencias de aminoácidos variantes.

10 Los segmentos de ácido nucleico de la presente divulgación pueden codificar proteínas y péptidos de rhabdovirus que son funcionales biológicos equivalentes, o variantes o mutantes de rhabdovirus que aumentan el beneficio terapéutico del virus. Dichas secuencias pueden aparecer como consecuencia de la redundancia del codón y la equivalencia funcional que se sabe que existe de manera natural dentro de las secuencias de ácido nucleico y las proteínas codificadas. De manera alternativa, las proteínas o péptidos funcionalmente equivalentes se pueden crear mediante la aplicación de tecnología de ADN recombinante, en la que se pueden modificar cambios en la estructura de la proteína, basándose en consideraciones de las propiedades de los aminoácidos que se van a intercambiar. Los cambios diseñados por un ser humano se pueden introducir mediante la aplicación de técnicas de mutagénesis dirigida al sitio, por ejemplo, para introducir mejoras en la unión a las células cancerosas de una proteína vírica.

20 B. Mutagénesis de polinucleótidos rhabdovíricos

En distintos aspectos el polinucleótido de rhabdovirus se puede alterar o mutar. Las alteraciones o mutaciones pueden incluir inserciones, eliminaciones, mutaciones puntuales, inversiones y similares y pueden dar como resultado la modulación, activación y/o inactivación de ciertas proteínas o mecanismos moleculares, así como la alteración de la función, localización, o expresión de un producto genético, en particular dando lugar a un producto genético no funcional. Cuando se emplea, la mutagénesis de un polinucleótido que codifica todo o parte de un rhabdovirus se puede conseguir mediante una variedad de procedimientos mutagénicos convencionales (Sambrook y col., 2001). La mutación es el proceso por el que se producen cambios en la cantidad o estructura de un organismo. La mutación puede implicar la modificación de la secuencia de nucleótidos de un único gen, bloques de genes o genomas completos. Los cambios en genes únicos pueden ser la consecuencia de mutaciones puntuales que implican la retirada, adición o sustitución de una única base de nucleótido dentro de una secuencia de ADN, o pueden ser la consecuencia de cambios que implican la inserción o eliminación de un gran número de nucleótidos.

1. Mutagénesis aleatoria

a. Mutagénesis de inserción

35 La mutagénesis de inserción se basa en la inactivación de un gen mediante la inserción de un fragmento de ácido nucleico conocido. Debido a que implica la inserción de algún tipo de fragmento de ácido nucleico, las mutaciones generadas son en general de pérdida de función, más que mutaciones de ganancia de función. Sin embargo, hay varios ejemplos de inserciones que generan mutaciones de ganancia de función. Las mutagénesis de inserción se pueden conseguir utilizando técnicas de biología molecular convencionales.

b. Mutagénesis química

40 La mutagénesis química ofrece ciertas ventajas, tales como la capacidad de encontrar un intervalo completo de mutaciones con grados de gravedad fenotípica y es fácil y barata de llevar a cabo. La mayoría de los carcinógenos químicos producen mutaciones en el ADN. El benzo[a]pireno, N-acetoxi-2-acetil aminofluoreno y aflatoxina B1 producen transversiones GC a TA en células bacterianas y de mamífero. El benzo[a]pireno también puede producir sustituciones de bases tales como AT a TA. Los compuestos N-nitrosourea producen transiciones GC a AT. La alquilación de la posición O4 de la timina inducida por exposición a n-nitrosourea da como resultado transiciones de TA a CG.

c. Mutagénesis por radiación

50 Las moléculas biológicas se degradan por radiación ionizante. La adsorción de la energía incidente da lugar a la formación de iones y radicales libre, y la rotura de algunos enlaces covalentes. La susceptibilidad al daño por radiación aparece bastante variable entre las moléculas, y entre diferentes formas cristalinas de la misma molécula. Depende de la dosis acumulada total, y también sobre la tasa de dosis (ya que una vez que están presentes los radicales libres, el daño molecular que causan depende de su tasa de difusión natural y por lo tanto del tiempo real). El daño se reduce y controla enfriando la muestra cuanto sea posible. La radiación ionizante produce daño del ADN, generalmente proporcional a la tasa de dosis.

55 En la presente divulgación, la expresión "radiación ionizante" significa una radiación que comprende partículas o fotones que tienen suficiente energía o pueden producir suficiente energía para producir la ionización (ganancia o

pérdida de electrones). Una radiación ionizante preferida y ejemplar es una radiación-x. La cantidad de radiación ionizante necesaria en una célula determinada o para una molécula particular depende en general de la naturaleza de esa célula o molécula y la naturaleza de la diana de la mutación. Los medios para determinar una cantidad eficaz de radiación se conocen bien en la técnica.

5 d. Mutagénesis de exploración *in vitro*

La mutagénesis aleatoria también se puede introducir utilizando una PCR con tendencia al error. La tasa de mutagénesis se puede aumentar llevando a cabo la PCR en múltiples tubos con dilución de las matrices. Una técnica de mutagénesis particularmente útil es la mutagénesis por exploración de alanina en la que se sustituyen varios restos individualmente con el aminoácido alanina de manera que el efecto de pérdida de interacciones de cadenas laterales se puede determinar, mientras que se minimiza el riesgo de perturbaciones a gran escala en la conformación proteica (Cunningham y col., 1989).

La mutagénesis por saturación de exploración *in vitro* proporciona un procedimiento rápido para la obtención de una gran cantidad de información estructura-función, que incluye: (i) la identificación de restos que modula la especificidad de unión al ligando, (ii) un mejor entendimiento de la unión al aligando basándose en la identificación de los aminoácidos que mantienen la actividad y los que anulan la actividad en una localización determinada (iii) una evaluación de la plasticidad completa de un sitio activo o subdominio proteico, (iv) identificación de sustituciones de aminoácidos que dan como resultado un aumento de la unión.

2. Mutagénesis dirigida al sitio

La mutagénesis específica del sitio guiada por la estructura representa una herramienta potente para la disección y modificación de las interacciones proteína-ligando (Wells, 1996; Braisted y col., 1996). La técnica proporciona la preparación y ensayo de variantes de secuencia introduciendo uno más cambios de secuencia de nucleótidos en un ADN seleccionado.

C. Vectores

Para generar mutaciones en un genoma de rhabdovirus, se pueden codificar polipéptidos nativos y modificados mediante una molécula de ácido nucleico comprendida en un vector. El término "vector" se utiliza para referirse a una molécula de ácido nucleico portadora en la que se puede insertar una secuencia de ácido nucleico exógena para su introducción en una célula donde se pueda replicar. Una secuencia de ácido nucleico puede ser "exógena", que significa que es ajena a la célula en la que el vector se va a introducir o que la secuencia es homóloga a una secuencia de la célula, pero en una posición dentro del ácido nucleico de la célula huésped en la que el ácido nucleico no se encuentra comúnmente. Los vectores incluyen plásmidos, cósmidos, virus (bacteriófagos, virus de animales y virus vegetales), y cromosomas artificiales (por ejemplo, YAC). Un experto en la técnica estaría equipado para construir un vector mediante técnicas recombinantes convencionales, que se describen en Sambrook y col. (2001) y Ausubel y col. (1994).

Además de codificar el polipéptido modificado tal como la proteína N, proteína P, proteína M, proteína G o proteína L modificadas, un vector puede codificar secuencias polipeptídicas no modificadas tal como un marcador o molécula de direccionamiento. Los vectores útiles que codifican dichas proteínas de fusión incluyen vectores pIN (Inouye y col., 1985), vectores que codifican un tramo de histidina, y vectores pGEX, para su uso en la generación de proteínas de fusión solubles con glutatión S-transferasa (GST) para la purificación y separación o escisión posteriores. Una molécula de direccionamiento es la que dirige el polipéptido modificado a un órgano, tejido, célula u otra localización particular en el cuerpo de un sujeto. De manera alternativa, la molécula de direccionamiento altera el tropismo de un organismo, tal como un rhabdovirus por ciertos tipos celulares, por ejemplo, células cancerosas.

La expresión "vector de expresión" se refiere a un vector que contienen una secuencia de ácido nucleico que codifica al menos parte de un producto genético capaz de ser transcrito. En algunos casos las moléculas de ARN se traducen en una proteína, polipéptido o péptido. En otros casos, estas secuencias no se traducen, por ejemplo, en la producción de moléculas antisentido o ribozimas. Los vectores de expresión pueden contener una variedad de "secuencias de Control", que se refiere a secuencias de ácido nucleico necesarias para la transcripción y posiblemente traducción de una secuencia codificante unida operativamente en un organismo huésped particular. Además, para controlar las secuencias que gobiernan la transcripción y traducción, los vectores y vectores de expresión pueden contener secuencias de ácido nucleico que sirven para otras funciones, así como se describe infra.

1. Promotores y Amplificadores

Un "promotor" es una secuencia de control que es una región de una secuencia de ácido nucleico cuyo inicio y tasa de transcripción se controlan. Puede contener elementos genéticos que se unen a proteínas reguladoras y moléculas, tales como ARN polimerasa y otros factores de transcripción. Las frases "posicionadas operativamente", "emparejadas operativamente", "unidas operativamente", "bajo control", y "bajo el control transcripcional" significa que un promotor está en una localización funcional correcta y/u orientación en relación a una secuencia de ácido nucleico para controlar el inicio y/o expresión de esa secuencia. Un promotor se puede utilizar o no en conjunción

con un "amplificación", que se refiere a una secuencia reguladora cis-actuante implicada en la activación transcripcional de una secuencia de ácido nucleico.

Un promotor puede ser el que se asocia naturalmente con un gen o secuencia, como se puede obtener aislando las secuencias 5' no codificantes localizadas corriente arriba del segmento codificante y/o exón. Se puede hacer referencia a dicho promotor como "endógeno". De manera similar un amplificador puede asociarse naturalmente a una secuencia de ácido nucleico, que se localiza corriente abajo o corriente arriba de esa secuencia. De manera alternativa, se pueden conseguir ciertas ventajas posicionando el segmento de ácido nucleico codificante bajo el control de un promotor recombinante o heterólogo, que se refiere a un promotor que no se asocia normalmente con una secuencia de ácido nucleico en su entorno natural. Un amplificador recombinante o heterólogo se refiere también a un amplificador no asociado normalmente con una secuencia de ácido nucleico en su entorno natural. Dichos promotores y amplificadores pueden incluir promotores o amplificadores de otros genes, y promotores o amplificadores aislados de cualquier otra célula procariota, víricos o eucariota, y promotores o amplificadores que no son de "origen natural", es decir, que contienen diferentes elementos de diferentes regiones reguladoras, y/o mutaciones que alteran la expresión.

Además de producir las secuencias de ácido nucleico de promotores y amplificadores sintéticamente, las secuencias pueden producirse utilizando la clonación recombinante y/o tecnología de amplificación de ácidos nucleicos, incluyendo la PCR™, en conexión con las composiciones desveladas en el presente documento (véase la Patente de EE. UU. 4.683.202, Patente de EE. UU. 5.928.906). Además, se contemplan las secuencias de control que dirigen la transcripción y/o expresión de secuencias dentro de orgánulos no nucleares tales como mitocondrias, cloroplastos, y similares, que también se pueden emplear.

De manera natural, puede ser importante emplear un promotor y/o amplificador que dirija eficazmente la expresión del segmento de ADN en el tipo celular, órgano, y organismo escogido para la expresión. Los expertos en la técnica de biología molecular conocen en general el uso de promotores, amplificadores, y combinaciones de tipo celular para la expresión proteica, por ejemplo, véase Sambrook y col. (2001). Los promotores empleados pueden ser constitutivos, específicos del tejido, selectivo de la célula (es decir, más activo en un tipo celular en comparación con otro), inducible, y/o útil en las condiciones adecuadas para dirigir un alto nivel de expresión del segmento de ácido nucleico introducido, tal como sea ventajoso en la producción a gran escala de proteína y/o péptidos recombinantes. El promotor puede ser heterólogo y endógeno.

Se pueden emplear varios elementos/promotores, en el contexto de la presente invención, para regular la expresión de un gen. Esta lista no pretende ser exhaustiva de todos los elementos posibles implicados en la promoción de la expresión, sino simplemente, ser ejemplares de los mismos. también se proporcionan ejemplos de elementos inducibles, que son regiones de una secuencia de ácido nucleico que se puede activar en respuesta a un estímulo específico. El promotor/amplificador (Referencias incluyen: Cadena pesada de inmunoglobulina (Banerji y col., 1983; Gilles y col., 1983; Grosschedl y col., 1985; Atchinson y col., 1986, 1987; Imler y col., 1987; Weinberger y col., 1984; Kiledjian y col., 1988; Porton y col., 1990); cadena ligera de inmunoglobulina (Queen y col., 1983; Picard y col., 1984); Receptor de linfocitos T (Luria y col., 1987; Winoto y col., 1989; Redondo y col., 1990); HLA DQ α y/o DQ β (Sullivan y col., 1987); Interferón β (Goodbourn y col., 1986; Fujita y col., 1987; Goodbourn y col., 1988); Interleucina-2 (Greene y col., 1989); receptor de Interleucina-2 (Greene y col., 1989; Lin y col., 1990); MHC Clase II 5 (Koch y col., 1989); MHC Clase II HLA-DR α (Sherman y col., 1989); β -Actina (Kawamoto y col., 1988; Ng y col., 1989); creatina cinasa muscular (MCK) (Jaynes y col., 1988; Horlick y col., 1989; Johnson y col., 1989); Prealbúmina (Transtiretina) (Costa y col., 1988); Elastasa I (Omitz y col., 1987); Metalotioneína (MTII) (Karin y col., 1987; Culotta y col., 1989); Colagenasa (Pinkert y col., 1987; Angel y col., 1987); Albúmina (Pinkert y col., 1987; Tronche y col., 1989, 1990); α -Fetoproteína (Godbout y col., 1988; Campere y col., 1989); γ -Globina (Bodine y col., 1987; Perez-Stable y col., 1990); β -Globina (Trudel y col., 1987); c-fos (Cohen y col., 1987); c-HA-ras (Triesman, 1986; Deschamps y col., 1985); Insulina (Edlund y col., 1985); molécula de adhesión celular neural (NCAM) (Hirsh y col., 1990); α 1-Antitripaína (Latimer y col., 1990); H2B (TH2B) Histona (Hwang y col., 1990); Mouse y/o colágeno Tipo I (Ripe y col., 1989); proteínas reguladas por glucosa (GRP94 y GRP78) (Chang y col., 1989); Hormona de crecimiento de la rata (Larsen y col., 1986); Amiloide A sérico humano (SAA) (Edbrooke y col., 1989); Troponina I (TN I) (Yutzey y col., 1989); Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) (Pech y col., 1989); Distrofia muscular de Duchenne (Klamut y col., 1990); SV40 (Banerji y col., 1981; Moreau y col., 1981; Sleight y col., 1985; Firak y col., 1986; Herr y col., 1986; Imbra y col., 1986; Kadesch y col., 1986; Wang y col., 1986; Ondek y col., 1987; Kuhl y col., 1987; Schaffner y col., 1988); Polioma (Swartzendruber y col., 1975; Vasseur y col., 1980; Katinka y col., 1980, 1981; Tyndell y col., 1981; Dandolo y col., 1983; de Villiers y col., 1984; Hen y col., 1986; Satake y col., 1988; Campbell y col., 1988); Retrovirus (Kriegler y col., 1982, 1983; Levinson y col., 1982; Kriegler y col., 1983, 1984a, b, 1988; Bosze y col., 1986; Miksicek y col., 1986; Celander y col., 1987; Thiesen y col., 1988; Celander y col., 1988; Chol y col., 1988; Reisman y col., 1989); virus del papiloma (Campo y col., 1983; Lusky y col., 1983; Spandidos y Wilkie, 1983; Spalholz y col., 1985; Lusky y col., 1986; Cripe y col., 1987; Gloss y col., 1987; Hirochika y col., 1987; Stephens y col., 1987); virus de Hepatitis B (Bulla y col., 1986; Jameel y col., 1986; Shaul y col., 1987; Spandau y col., 1988; Vannice y col., 1988); virus de inmunodeficiencia humana (Muesing y col., 1987; Hauber y col., 1988; Jakobovits y col., 1988; Feng y col., 1988; Takebe y col., 1988; Rosen y col., 1988; Berkhout y col., 1989; Laspia y col., 1989; Sharp y col., 1989; Braddock y col., 1989); Citomegalovirus (CMV) (Weber y col., 1984; Boshart y col., 1985; Foecking y col., 1986); y virus de leucemia del mono Gibón (Holbrook y col., 1987; Quinn y col., 1989).

Los elementos inducibles (Elemento/inductor (Referencias)) incluyen: MT II/Éster de Forbol (TFA), metales pesados (Palmiter y col., 1982; Haslinger y col., 1985; Searle y col., 1985; Stuart y col., 1985; Imagawa y col., 1987, Karin y col., 1987; Angel y col., 1987b; McNeill y col., 1989); MMTV (virus del tumor mamaior de ratón)/Glucocorticoides (Huang y col., 1981; Lee y col., 1981; Majors y col., 1983; Chandler y col., 1983; Lee y col., 1984; Ponta y col., 1985; Sakai y col., 1988); p-Interferon/poli(rl)x, poli(rc) (Tavernier y col., 1983); Adenovirus 5 E2/EIA (Imperiale y col., 1984); Colagenasa/ Éster de Forbol (TPA) (Angel y col., 1987a); Estromelisin/Forbol Ester (TPA) (Angel y col., 1987b); SV40/Forbol Ester (TPA) (Angel y col., 1987b); Gen MX Murino /Interferón, virus de enfermedad de Newcastle (Hug y col., 1988); GRP78 Gene/A23187 (Resendez y col., 1988); α -2-Macroglobulina/IL-6 (Kunz y col., 1989); Vimentina/Suero (Rittling y col., 1989); Gen de MHC Clase I H-2Kb/Interferón (Blonar y col., 1989); HSP70/EIA, Antígeno T grande de SV40 (Taylor y col., 1989, 1990a, 1990b); Proliferina/ Éster de Forbol -TPA (Mordacq y col., 1989); Factor de necrosis tumoral/PMA (Hensel y col., 1989); y Gen α de la hormona estimulante de tiroides /Hormona tiroidea (Chatterjee y col., 1989).

La identidad de promotores o elementos específicos de tejido o selectivos de tejido (es decir, promotores que tienen una mayor actividad en una célula en comparación con otra), así como los ensayos para caracterizar su actividad, son bien conocidos por los expertos en la técnica. Ejemplos de dichas regiones incluyen el gen LIMK2 humano (Nomoto y col. 1999), gen del receptor 2 de somatostatina (Kraus y col., 1998), gen de unión al ácido retinoico del epidídimo murino (Lareyre y col., 1999), CD4 humano (Zhao-Emonet y col., 1998), alfa 2 (XI) colágeno de ratón (Tsumaki, y col., 1998), D1A gen receptor de dopamina (Lee, y col., 1997), Factor II de crecimiento tipo insulina (Wu y col., 1997), molécula-1 de adhesión celular de plaquetas humana (Almendro y col., 1996), y el promotor SM22a.

Los promotores víricos adicionales, promotores/amplificadores celulares y promotores/amplificadores inducibles que se pueden utilizar en combinación con la presente divulgación se enumeran en el presente documento. Adicionalmente, también se podría utilizar cualquier combinación de promotor/amplificador (como por la Base de datos de promotores de eucariotas EPDB) para dirigir la expresión de genes estructurales que codifican enzimas que procesan oligosacáridos, proteínas accesorias de plegamiento proteico, proteínas de marcador genético o una proteína heteróloga de interés. De manera alternativa, se puede emplear un promotor específico de tejido para la terapia genética del cáncer (Tabla 2) o el direccionamiento a tumores (Tabla 3) con las moléculas de ácido nucleico de la presente divulgación.

Tabla 2. Promotores específicos de tejido candidatos para la terapia genética

Promotor específico de tejido	Cánceres en los que el promotor es activo	Células normales en los que el promotor es activo
Antígeno carcinoembrionario (CEA)*	La mayoría de los carcinomas colorrectales; el 50 % de carcinomas de pulmón; un 40-50 % de carcinomas gástricos; la mayoría de los carcinomas pancreáticos; la mayoría de los carcinomas de mama	Mucosa colónica; mucosa gástrica; epitelio pulmonar; glándulas sudoríparas exocrinas; células testiculares
Antígeno específico de próstata (PSA)	La mayoría de los carcinomas de próstata	Epitelio prostático
Péptido vasoactivo intestinal (VIP)	La mayoría de los cánceres de pulmón de células no pequeñas	Neuronas; linfocitos; mastocitos; eosinófilos
Tensioactivo proteico A (SP-A)	Muchas células de adenocarcinomas de pulmón	Neumocitos tipo II; Clara
Homólogo achaete-scute humano (hASH)	La mayoría de los cánceres de pulmón de células pequeñas	Células neuroendocrinas de pulmón
Mucina-1 (MUC1)**	La mayoría de los adenocarcinomas (que se originan en cualquier tejido)	Células epiteliales glandulares en la mama y en tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario
Alfa-fetoproteína	La mayoría de los carcinomas hepatocelulares; posiblemente muchos cánceres testiculares	Hepatocitos (en ciertas condiciones); testículos
Albúmina	La mayoría de los carcinomas hepatocelulares	Hepatocitos
Tirosinasa	La mayoría de los melanomas	Melanocitos; astrocitos; células de Schwann; algunas neuronas

(continuación)

Promotor específico de tejido	Cánceres en los que el promotor es activo	Células normales en los que el promotor es activo
Proteína de unión a tirosina (TRP)	La mayoría de los melanomas	Melanocitos; astrocitos; células de Schwann; algunas neuronas
Queratina 14	Presumiblemente muchos carcinomas de células escamosas (por ejemplo, cánceres de cabeza y cuello)	Queratinocitos
EBV LD-2	Muchos carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello	Queratinocitos del tracto digestivo superior
Proteína ácida fibrilar glial (GFAP)	Muchos astrocitomas	Astrocitos
Proteína básica mielina (MBP)	Muchos gliomas	Oligodendrocitos
Enzima convertidora de angiotensina específica de los testículos (ECA específica de testículos)	Posiblemente muchos cánceres testiculares	Espermatocitos
Osteocalcina	Posiblemente muchos osteosarcomas	Osteoblastos

Tabla 3. Promotores candidatos para su uso con un direccionamiento específico de tejido de tumores

Promotor	Cánceres en los que el promotor está activo	Células normales en las que el promotor está activo
Promotor regulado E2F	Casi todos los cánceres	Células proliferativas
HLA-G	Muchos carcinomas colorrectales; muchos melanomas; posiblemente muchos otros cánceres	Linfocitos; monocitos; espermatocitos; trofoblastos;
FasL	La mayoría de los melanomas; muchos carcinomas pancreáticos; la mayoría de los astrocitomas; posiblemente muchos otros cánceres	Leucocitos activados; neuronas; células endoteliales; queratinocitos; células en tejidos inmunoprivilegiados; algunas células en los pulmones, ovarios, hígado, y próstata
Promotor regulado Myc	La mayoría de los carcinomas de pulmón (tanto de células pequeñas y no pequeñas); la mayoría de los carcinomas colorrectales	Células proliferativas (solo algunos tipos celulares); células epiteliales de mamífero (incluyendo no proliferativas)
MAGE-1	Muchos melanomas; algunos carcinomas de pulmón de células no pequeñas; algunos carcinomas de mama	Testículos
VEGF	El 70 % de todos los cánceres (sobre expresión constitutiva en muchos cánceres)	Células en los sitios de neovascularización (pero a diferencia de los tumores, la expresión es transitoria, menos fuerte, y nunca constitutiva)
bFGF	Presumiblemente muchos cánceres diferentes ya que la expresión de bFGF está inducida por condiciones de isquemia	Las células en los sitios de isquemia (pero a diferencia de los tumores, la expresión es transitoria, menos fuerte y nunca constitutiva)
COX-2	La mayoría de los carcinomas colorrectales; muchos carcinomas de pulmón; posiblemente muchos otros cánceres	Las células en el sitio de la inflamación

(continuación)

Promotor	Cánceres en los que el promotor está activo	Células normales en las que el promotor está activo
IL-10	La mayoría de los carcinomas colorrectales; muchos carcinomas de pulmón; muchos carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello; posiblemente otros muchos cánceres	Leucocitos
GRP78/BiP	Presumiblemente muchos cánceres diferentes, ya que la expresión de GRP78 está inducida por condiciones específicas del tumor.	Células en el sitio de isquemia
elementos CarG de Egr-1	Inducidos por radiación ionizante, concebible en la mayoría de los tumores al irradiarlos	Células expuestas a radiación ionizante; leucocitos

2. Señales de inicio de sitios internos de unión al ribosoma

También puede ser necesaria una señal de inicio para la traducción eficaz de secuencias codificantes. Estas señales incluyen el codón de inicio ATG o secuencias adyacentes. Puede que sea necesario proporcionar las señales de control traduccional exógenas, incluyendo el codón de inicio ATG. Un experto habituado en la técnica sería capaz fácilmente de determinar esto y proporcionar las señales necesarias. Se sabe bien que el codón de inicio debe estar “en fase” con la fase de lectura de la secuencia codificante deseada para asegurar la traducción de la inserción completa. Las señales de control traduccional exógenas y codones de inicio pueden ser naturales o sintéticos. La eficacia de la expresión puede aumentar mediante la inclusión de elementos amplificadores de la transcripción apropiados.

En ciertos aspectos de la divulgación, el uso de elementos de sitios internos de entrada en el ribosoma (IRES) se utilizan para crear mensajes multigenéticos o policistrónicos. Los elementos IRES son capaces de sobrepasar el modelo de exploración del ribosoma de traducción dependiente de la protección metilada 5' y comienza la traducción en sitios internos (Pelletier y Sonenberg, 1988). Se han descrito elementos IRES de dos miembros de la familia picornavirus (polio y encefalomiocarditis) (Pelletier y Sonenberg, 1988), así como un IRES de un mensaje de mamífero (Macejak y Sarnow, 1991). Los elementos IRES se pueden unir a fases de lectura abierta heterólogas. Se pueden transcribir múltiples fases de lectura abierta a la vez, cada una separada por un IRES, creando mensajes policistrónicos. Gracias al elemento IRES cada fase de lectura abierta es accesible a los ribosomas para una traducción eficaz. Se pueden expresar eficazmente múltiples genes utilizando un único promotor/amplificador para transcribir un único mensaje (véase las Patentes de EE. UU. 5.925.565 y 5.935.819).

3. Múltiples sitios de clonación

Los vectores pueden incluir un sitio de clonación múltiple (MCS), que es una región de ácido nucleico que contiene múltiples sitios de enzimas de restricción cualquiera de los cuales se puede utilizar junto con una tecnología recombinante convencional para digerir el vector (Véase Carbonelli y col., 1999, Levenson y col., 1998, y Cocea, 1997). “Digestión por enzimas de restricción” se refiere a la escisión catalítica de una molécula de ácido nucleico con una enzima que funciona solo en localizaciones específicas de la molécula de ácido nucleico. Muchas de estas enzimas de restricción están disponibles en el mercado. El uso de dichas enzimas se entiende ampliamente por los expertos en la técnica. Frecuentemente, se linealiza un vector o fragmento utilizando una enzima de restricción que corta dentro del MCS para permitir que se ligen secuencias externas al vector. “Ligadura” se refiere al proceso de formación de enlaces fosfodiéster entre dos fragmentos de ácido nucleico, que pueden ser contiguos entre ellos o no. Las técnicas que implican enzimas de restricción y reacciones de ligadura son bien conocidas por los expertos en la técnica de la tecnología recombinante.

4. Señales de terminación

Los vectores o construcciones de la presente invención comprenderán en general al menos una señal de terminación. Una “señal de terminación” o “terminador” está comprendido por secuencias de ARN implicadas en la terminación específica de una transcripción de ARN por una ARN polimerasa. Por tanto, en ciertos aspectos se contempla una señal de terminación que finaliza la producción de una transcripción de ARN. Un terminador puede ser necesario *in vivo* para conseguir niveles deseados de mensaje.

En los virus ARN de sentido negativo, incluyendo los rhabdovirus, la terminación se define por un motivo del ARN.

Los terminadores contemplados para su uso en la invención incluyen cualquier terminador de la transcripción conocido descrito en el presente documento o conocidos por los expertos habituados en la técnica, incluyendo, pero sin limitarse, por ejemplo, las secuencias de terminación de genes, tales como, por ejemplo, el terminador de la

hormona de crecimiento bovina o las secuencias de terminación víricas, tales como, por ejemplo, el terminador de SV40. En ciertos aspectos, la señal de terminación puede ser una falta de secuencia que se pueda transcribir o traducir, tal como debido a un truncado de secuencia.

5. Señales de poliadenilación

5 En la expresión, particularmente en la expresión en eucariotas, se incluirá normalmente una señal de poliadenilación para efectuar una poliadenilación apropiada de la transcripción. Se cree que naturaleza de la señal de poliadenilación no es crucial para la práctica satisfactoria de la divulgación y/o se puede utilizar cualquier secuencia. Los aspectos preferidos incluyen la señal de poliadenilación del SV40 y/o la señal de poliadenilación de la hormona de crecimiento bovina, que son convenientes y/o se sabe que funcionan bien en distintas células diana. La poliadenilación puede aumentar la estabilidad de la transcripción o puede facilitar el transporte citoplásmico.

6. Orígenes de replicación

15 Con el fin de propagar un vector en una célula huésped, puede contener uno o más orígenes de replicación (a menudo denominados "ori"), que es una secuencia de ácido nucleico que la que se inicia la replicación. De manera alternativa se puede emplear una secuencia que se replica autónomamente (ARS) si la célula huésped es una levadura.

7. Marcadores que se pueden seleccionar y explorar

20 En ciertos aspectos de la divulgación, las células que contienen una construcción de ácido nucleico de la divulgación se pueden identificar *in vitro* o *in vivo* incluyendo un marcador en el vector de expresión. Dichos marcadores darían lugar a un cambio identificable en la célula que permita la identificación fácil de las células que contienen el vector de expresión. En general, un marcador de selección es el que otorga una propiedad que permite la selección. Un marcador genético positivo es el que en presencia del marcador permite su selección, mientras que un marcador genético negativo es el que su presencia evita su selección. Un ejemplo de marcador genético positivo es un marcador de resistencia a fármacos.

25 Habitualmente la inclusión de un marcado genético de fármacos ayuda en la clonación e identificación de transformantes, por ejemplo, son útiles los genes que dan lugar a una resistencia a la neomicina, puromicina, higromicina, DHFR, GPT, zeocina e histidinol como marcadores genéticos. Además de los marcadores que dan lugar a un fenotipo que permite la discriminación de los transformantes basándose en la implementación de condiciones, también se contemplan otros tipos de marcadores incluyen los marcadores que puede explorarse tales como la GFP, cuya base es el análisis colorimétrico. De manera alternativa, se pueden utilizar marcadores que se pueden explorar tales como la timidina cinasa (tk) del virus del herpes simple o la cloranfenicol acetiltransferasa (CAT). Un experto en la técnica también conocería cómo emplear marcadores inmunológicos, posiblemente en conjunción con el análisis FACS. No se cree que el marcador que se utilice sea importante, a condición de que sea capaz de expresarse simultáneamente con el ácido nucleico que codifique un producto genético. Los ejemplos adicionales de marcadores que se pueden seleccionar y explorar son bien conocidos por el experto en la técnica.

35 D. Células huésped

40 Como se utiliza en el presente documento, los términos "célula", "línea celular", y "cultivo celular" se pueden utilizar de manera intercambiable. Todos estos términos incluyen también su progenie, que son todas y cada una de las generaciones siguientes. Se entiende que toda progenie puede no ser idéntica debido a mutaciones deliberadas o inadvertidas. En el contexto de la expresión de una secuencia de ácido nucleico heterólogo, una "célula huésped" se refiere a una célula procariota o eucariota, e incluyen cualquier organismo que se pueda transformar que sea capaz de replicar un vector y/o expresar un gen heterólogo codificado por un vector. Una célula huésped, puede utilizarse y se ha utilizado como receptor de vectores o virus (que no se califica como vector si no expresa polipéptidos exógenos). Una célula huésped puede estar "transfectada" o "transformada", que se refiere a un proceso por el que el ácido nucleico exógeno, tal como una secuencia que codifica una proteína modificada, se transfiere o introduce en la célula huésped. Una célula transformada incluye el sujeto celular primario y su progenie.

50 Las células huésped se puede derivar de procariotas o eucariotas, incluyendo células de levadura, células de insecto y células de mamífero, dependiendo de si el resultado deseado es la replicación del vector o la expresión de parte o todas las secuencias de ácido nucleico codificadas por el vector. Están disponibles numerosas líneas celulares y cultivos para su uso como células huésped, y se pueden obtener en la Colección Americana de Cultivos Tipo (ATCC), que es una organización que sirve como archivo de cultivos vivos y materiales genéticos (www.atcc.org). Un huésped apropiado puede determinarlo un experto en la técnica basándose en la estructura del vector y el resultado deseado. Por ejemplo, se puede introducir un plásmido o cósmido en una célula huésped procariota para la replicación de muchos vectores. Las células bacterianas utilizadas como células huésped para la replicación y/o expresión de un vector incluyen DH5 α , JM109, y KC8, así como varios huéspedes bacterianos disponibles en el mercado tales como células competentes SURE $^{\circledR}$ y SOLOPACK $^{\text{TM}}$ Gold Cells (STRATAGENE $^{\circledR}$, La Jolla, CA). De manera alternativa se podrían utilizar células bacterianas tales como *E. coli* LE392 como células huésped para virus fagos. Las células de levadura apropiadas incluyen *Saccharomyces cerevisiae*, *Saccharomyces pombe*, y *Pichia pastoris*.

Ejemplos de células huésped eucariotas para la replicación y/o expresión de un vector incluyen HeLa, NIH3T3, Jurkat, 293, Cos, CHO, Saos, y PC12. Muchas células huésped de distintos tipos celulares y organismos están disponibles y son conocidas por un experto en la técnica. De manera similar, se puede utilizar un vector vírico en conjunción con cualquier célula huésped eucariota o procariota, particularmente una que sea permisiva a la replicación o expresión del vector.

Algunos vectores pueden emplear secuencias de control que permitan que se replique o se exprese en células tanto procariotas como eucariotas. Un experto en la técnica entendería adicionalmente las condiciones en las que incubar todas las células huésped descritas anteriormente para mantenerlas y permitir la replicación de un vector. También se entienden y conocen técnicas y condiciones que permitirían la producción de vectores a gran escala, así como la producción de ácidos nucleicos codificados por los vectores y sus polipéptidos, proteínas, o péptidos equivalentes.

E. Sistemas de expresión

Existen numerosos sistemas de expresión que comprenden al menos todas o parte de las composiciones expuestas anteriormente. Los sistemas basados en procariotas y eucariotas pueden emplearse para su uso con la presente invención para producir secuencias de ácido nucleico, o sus polipéptidos, proteínas o péptidos equivalentes. Muchos de dichos sistemas están disponibles en el mercado y ampliamente.

El sistema insecto/baculovirus puede producir un alto nivel de expresión proteica de un segmento de ácido nucleico heterólogo, tal como se describe en las Patentes de EE. UU. 5.871.986 y 4.879.236, y se puede comprar, por ejemplo, con los nombres MAXBAC® 2.0 de INVITROGEN® y BACPACK™ BACULOVIRUS EXPRESSION SYSTEM de CLONTECH®.

Además de los sistemas de expresión desvelados de la invención, otros sistemas de expresión incluyen el STRATAGENE®'s COMPLETE CONTROL™ Inducible Mammalian Expression System, que implica un eceptotr inducible ecdysone sintético o su Sistema de Expresión pET, una sistema de expresión en *E. coli*. Otro ejemplo de un sistema de expresión inducible está disponible en INVITROGEN®, que tiene el sistema T-REX™ (expresión regulada por tetraciclina), un sistema de expresión en mamíferos inducible que utiliza un promotor CMV de longitud completa. INVITROGEN® también proporciona un sistema de expresión en levaduras llamado Sistema de Expresión metanólica en *Pichia*, que se ha diseñado para la producción a alto nivel de proteínas recombinantes en la levadura metilotrófica *Pichia methanolica*. Un experto en la técnica sabría como expresar un vector, tal como una construcción de expresión, para producir una secuencia de ácido nucleico o su polipéptido, proteína o péptido equivalente.

F. Detección de ácidos nucleicos

Además de su uso en el direccionamiento de la expresión de proteínas, polipéptidos y/o péptidos de poxvirus, las secuencias de ácido nucleico desveladas en el presente documento tienen una variedad de otros usos. Por ejemplo, son útiles como sondas o cebadores para las realizaciones que implican la hibridación de ácidos nucleicos. Se pueden utilizar en procedimientos de diagnóstico y exploración de la presente divulgación. La detección de ácidos nucleicos que codifican rhabdovirus o moduladores polipeptídicos de rhabdovirus están englobados en la divulgación.

1. Hibridación

El uso de una sonda o cebador de entre 13 y 100 nucleótidos, preferentemente entre 17 y 100 nucleótidos de longitud, o en algunos aspectos de la invención de hasta 1-2 kilobases o más de longitud, permite la formación de una molécula doble que es tanto estable como selectiva. Se prefieren generalmente las moléculas que tienen secuencias complementarias sobre tramos contiguos mayores de 20 bases de longitud, para aumentar la estabilidad y/o selectividad de las moléculas híbridas obtenidas. Se preferirá en general diseñar moléculas de ácido nucleico para la hibridación que tengan una o más secuencias complementarias de 20 a 30 nucleótidos, o incluso más largas si se desea. Dichos fragmentos se pueden preparar fácilmente, por ejemplo, sintetizando directamente el fragmento por medios químicos o introduciendo secuencias seleccionadas en vectores recombinantes para la producción recombinante.

En consecuencias, las secuencias de nucleótido de la divulgación pueden utilizarse por su capacidad para formar selectivamente moléculas dobles con tramos complementarios de ADN y/o ARN o proporcionar cebadores para la amplificación de ADN o ARN a partir de muestras. Dependiendo de la aplicación planeada, sería deseable emplear condiciones variables de hibridación para conseguir grados variables de selectividad de la sonda o cebadores para la secuencia diana.

Para las aplicaciones que necesitan una alta selectividad, se deseará normalmente emplear condiciones de alta rigurosidad para formar los híbridos. Por ejemplo, condiciones de relativamente baja salinidad y/o alta temperatura, tal como las provistas por aproximadamente un 0,02 M a aproximadamente 0,10 M de NaCl a temperaturas de aproximadamente 50 °C a aproximadamente 70 °C. Dichas condiciones de alta rigurosidad toleran pocas, si alguna, faltas de coincidencia entre la sonda o los cebadores y la matriz o cadena diana y serían particularmente adecuadas para el aislamiento de genes específicos o para la detección de transcripciones de ARNm específicas. Se aprecia en

general que las condiciones pueden dar más rigurosidad por la adición de cantidades crecientes de formamida.

Para ciertas aplicaciones, por ejemplo, mutagénesis dirigida al sitio, se aprecia que se prefieren condiciones de menor rigurosidad. En estas condiciones la hibridación puede producirse incluso entre las secuencias de cadenas de hibridación que no son perfectamente complementarias, sino que ha y faltas de coincidencia en una o más posiciones. Las condiciones pueden dar menos rigurosidad aumentando la concentración de sal y/o disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, las condiciones de rigurosidad media se podrían proporcionar con aproximadamente 0,1 a 0,25 M de NaCl a temperaturas de aproximadamente 37 °C a aproximadamente 55 °C, mientras que unas condiciones de baja rigurosidad se pueden proporcionar con aproximadamente 0,15 M a aproximadamente 0,9 M de sal, a temperaturas que varían desde aproximadamente 20 °C a aproximadamente 55 °C. Las condiciones de hibridación se pueden manipular fácilmente dependiendo de los resultados deseados.

En otros aspectos, la hibridación se puede conseguir en condiciones de, por ejemplo, 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 75 mM de KCl, 3 mM de MgCl₂, 1,0 mM de ditiotretitol, a temperaturas entre aproximadamente 20 °C a aproximadamente 37 °C. Otras condiciones de hibridación que se utilizan incluyen aproximadamente 10 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM de KCl, 1,5 mM de MgCl₂, a temperaturas que varían desde aproximadamente 40 °C a aproximadamente 72 °C.

En ciertos aspectos, sería ventajoso emplear ácidos nucleicos de secuencias definidas de la presente invención en combinación con un medio apropiado tal como un marcador, para la determinación de la hibridación. Se conocen en la técnica una amplia variedad de medios indicadores apropiados, que incluyen fluorescentes, radioactivos, enzimáticos u otros ligandos, tales como avidina/biotina, que son capaces de detectarse. En aspectos preferidos, se puede desear emplear un marcador fluorescente o un marcador enzimático tal como ureasa, fosfatasa alcalina o peroxidasa, en vez de un reactivo radioactivo u otro ambientalmente indeseable. En el caso de marcadores enzimáticos, se conocen sustratos indicadores colorimétricos que se pueden emplear para proporcionar un medio de detección que sea visible o detectable espectrofotométricamente, para identificar una hibridación específica con muestras que contengan ácidos nucleicos complementarios.

En general, se planea que las sondas o cebadores descritos en el presente documento serán útiles como reactivos en una solución de hibridación, como en una PCRTM, para la detección de la expresión de genes correspondientes, así como en aspectos que emplean una fase sólida. Aquí, el ensayo de ADN (o ARN) se adsorbe o se fija de otra manera a una matriz o superficie seleccionada. Este ácido nucleico de cadena sencilla fijado se somete entonces a hibridación con sondas seleccionadas en condiciones deseadas. Las condiciones seleccionadas dependerán de las circunstancias particulares (dependiendo, por ejemplo, del contenido en G+C, tipo de ácido nucleico diana, fuente del ácido nucleico, tamaño de la sonda de hibridación, etc.). La optimización de las condiciones de hibridación para una aplicación particular de interés es bien conocida por los expertos en la técnica. Después del lavado de las moléculas hibridadas para retirar las moléculas de sonda unidas no específicamente, se detecta la hibridación /o se cuantifica, determinando la cantidad de marcador unido. Los procedimientos de hibridación en fase sólida representativos se desvelan en las Patentes de EE. UU. 5.843.663. 5.900.481 y 5.919.626. Otros procedimientos de hibridación que se pueden utilizar en la práctica de la presente invención se desvelan en las Patentes de EE. UU. 5.849.481. 5.849.486 y 5.851.772.

2. Amplificación de ácidos nucleicos

Los ácidos nucleicos utilizados como matriz para la amplificación se pueden aislar de células, tejidos u otras muestras de acuerdo con metodologías convencionales (Sambrook y col., 2001). En ciertas realizaciones, se llevan a cabo análisis sobre homogenizados de células completas o tejidos o muestras de fluidos biológicos sin una purificación sustancial del ácido nucleico matriz. El ácido nucleico puede ser un ADN genómico o un ARN celular completo o fraccionado. Cuando se utiliza un ARN, puede que se desee convertir primero el ARN en un ADN complementario.

El término "cebador" como se utiliza en el presente documento, significa que engloba cualquier ácido nucleico que sea capaz de cebar la síntesis de un ácido nucleico que surge en un procedimiento dependiente de la matriz. Normalmente, los cebadores son oligonucleótidos de desde diez a veinte y/o treinta pares de bases de longitud, pero se pueden emplear secuencias más largas. Los cebadores se pueden proporcionar en forma de cadena doble y/o cadena sencilla, aunque se prefiere la forma de cadena sencilla.

Los pares de cebadores diseñados para hibridarse selectivamente con los ácidos nucleicos correspondientes a secuencias de los genes identificados en el presente documento se ponen en contacto con el ácido nucleico diana en condiciones que permitan la hibridación selectiva. Dependiendo de la aplicación deseada se pueden seleccionar condiciones de hibridación de alta rigurosidad que solo permitirá la hibridación a secuencias que sean completamente complementarias a los cebadores. En otros aspectos, la hibridación se puede producir con una rigurosidad reducida para permitir la amplificación de ácidos nucleicos que contengan una o más faltas de coincidencia con las secuencias de cebador. Una vez hibridado, el complejo cebador matriz se pone en contacto con una o más enzimas que facilitan la síntesis de ácido nucleico dependiente de la matriz. Se llevan a cabo múltiples rondas de amplificación, a las que también se hace referencia como "ciclos" hasta que se produce una suficiente cantidad del producto de amplificación.

Varios procedimientos dependientes de la matriz están disponibles para amplificar las secuencias de oligonucleótidos presentes en una matriz de muestra determinada. Uno de los procedimientos de amplificación mejor conocidos es la reacción en cadena de la polimerasa (a la que se hace referencia como PCR™) que se describe en detalle en las Patentes de EE. UU. 4.683.195. 4.683.202 y 4.800.159, y in Innis y col., 1988.

- 5 Se puede llevar a cabo un procedimiento de amplificación por PCR™ de transcriptasa inversa para cuantificar la cantidad de ARNm amplificado y son bien conocidos (véase Sambrook y col., 2001; documento WO 90/07641; y Patente de EE. UU. 5.882.864).

Otro procedimiento para la amplificación es la reacción en cadena de la ligasa ("LCR") desvelada en la Solicitud europea N.º 320 308. La Patente de EE. UU. 4.883.750 describe un procedimiento similar a la LCR para la unión de pares de sondas a una secuencia diana. También se puede utilizar un procedimiento basado en la PCR™ y ensayo de ligasa de oligonucleótidos (OLA) desvelado en la Patente de EE. UU. 5.912.148 Los procedimientos alternativos para la amplificación de secuencias de ácido nucleico que se pueden utilizar en la práctica de la presente invención se desvelan en las Patentes de EE. UU. 5.843.650. 5.846.709. 5.846.783. 5.849.546. 5.849.497. 5.849.547. 5.858.652. 5.866.366. 5.916.776. 5.922.574. 5.928.905. 5.928.906. 5.932.451. 5.935.825. 5.939.291 y 5.942.391, Solicitud GB N.º 2 202 328, y en la Solicitud PCT N.º PCT/US89/01025. La Qbeta replicasa, descrita en la Solicitud PCT N.º PCT/US87/00880, también se puede utilizar como un procedimiento de amplificación de la presente invención. La amplificación isotérmica como se describe en Walker y col. (1992) también se puede utilizar. Así como la Amplificación por desplazamiento de cadena (SDA), desvelada en la Patente de EE. UU. 5.916.779.

Otros procedimientos de amplificación de ácidos nucleicos incluyen sistemas de amplificación basados en la transcripción (TAS), que incluyen la amplificación basada en secuencia de ácido nucleico (NASBA) y 3SR (Kwoh y col., 1989; Solicitud PCT WO 88/10315). Solicitud europea N.º 329 822 desvela un procedimiento de amplificación de ácido nucleico que implica la síntesis cíclica de ARN de cadena sencilla ("ssARN"), ssADN, y ADN de cadena doble (dsADN), que se puede utilizar de acuerdo con la presente invención.

La solicitud PCT WO 89/06700 desvela un esquema de amplificación de ácido nucleico basado en la hibridación de una región promotora/secuencia cebadora con un ADN de cadena sencilla diana ("ssADN") seguido por la transcripción de muchas copias de ARN de la secuencia. Otros procedimientos de amplificación incluyen "RACE" y "PCR de un lado" (Frohman, 1990; Ohara y col., 1989).

3. Detección de ácidos nucleicos

A continuación de cualquier amplificación, puede ser deseable separar y/o aislar el producto de amplificación de la matriz y el exceso de cebadores. En un aspecto los productos de amplificación se separan por electroforesis en agarosa, agarosa-acrilamida, o en gel de poliacrilamida utilizando procedimientos convencionales (Sambrook y col., 2001).

La separación de ácidos nucleicos también se puede efectuar por técnicas cromatográficas conocidas en la técnica. Hay muchos tipos de cromatografía que se pueden utilizar en la práctica de la presente invención, incluyendo la adsorción, partición, intercambio iónico, hidroxilapatita, filtro molecular, fase inversa, columna, papel, capa fina y cromatografía de gases, así como HPLC.

Los procedimientos de visualización típicos incluyen la tinción de un gel con bromuro de etidio y la visualización de las bandas bajo luz UV. De manera alternativa, si los productos de amplificación están marcados íntegramente con nucleótidos marcados radio o fluorométricamente, los productos de amplificación separados se pueden exponer a una película de rayos X o visualizarse en un espectro de excitación apropiado.

En aspectos particulares, la detección es transferencia de Southern e hibridación con una sonda marcada. Las técnicas que implican la transferencia de Southern son bien conocidas por los expertos en la técnica (véase Sambrook y col., 2001). Un ejemplo de lo anterior se describe en la Patente de EE. UU. 5.279.721, que desvela un aparato y un procedimiento automático para la electroforesis y la transferencia de ácidos nucleicos.

Otros procedimientos de detección de ácidos nucleicos que se pueden utilizar en la práctica de la presente invención se desvelan en las Patentes de EE. UU. 5.840.873. 5.843.640. 5.843.651. 5.846.708. 5.846.717. 5.846.726. 5.846.729. 5.849.487. 5.853.990. 5.853.992. 5.853.993. 5.856.092. 5.861.244. 5.863.732. 5.863.753. 5.866.331. 5.905.024. 5.910.407. 5.912.124. 5.912.145. 5.919.630. 5.925.517. 5.928.862. 5.928.869. 5.929.227. 5.932.413 y 5.935.791.

4. Otros ensayos

Se pueden utilizar otros procedimientos para la exploración genética dentro del ámbito de la presente divulgación, por ejemplo, para detectar mutaciones en muestras de ácidos nucleicos genómicos, ADNc y/o ARN. Los procedimientos que se utilizan para detectar mutaciones puntuales incluyen la electroforesis en gel de gradiente desnaturizante ("DGGE"), análisis de polimorfismo de longitud del fragmento de restricción ("RFLP"), procedimientos de escisión química o enzimática, secuenciación directa de las regiones diana amplificadas por PCR™ (véase anteriormente), análisis de polimorfismos de conformación de cadena sencilla ("SSCP") y otros

procedimientos bien conocidos en la técnica. Un procedimiento de exploración para mutaciones puntuales se basa en la escisión por RNasa de malas coincidencias de pares de bases en ARN/ADN o ARN/ARN heterodúplex. Como se utiliza en el presente documento "mala coincidencia" se define como una región de uno o más nucleótidos no emparejados o mal emparejados en una molécula de cadena doble de ARN/ARN, ARN/ADN o ADN/ADN. Esta definición incluye por lo tanto las malas coincidencias debido a mutaciones de inserción/eliminación, así como mutaciones puntuales de bases múltiples o sencillas (por ejemplo, véase la Patente de EE. UU. 4.946.773. Los procedimientos alternativos para la detección de mutaciones de eliminación, inserción o sustitución que se pueden utilizar en la práctica de la presente invención se desvelan en las Patentes de EE. UU. 5.849.483. 5.851.770. 5.866.337. 5.925.525 y 5.928.870.

10 G. Procedimientos de transferencia genética

Los procedimientos adecuados para el suministro de ácido nucleico para efectuar la expresión de las composiciones de la presente divulgación se cree que incluyen virtualmente cualquier procedimiento por el cual un ácido nucleico (por ejemplo, un ADN o ARN incluyendo vectores víricos y no víricos) se puede introducir en un orgánulo, una célula, un tejido o un organismo, como se describe en el presente documento o como es conocido por un experto en la técnica. Dichos procedimientos incluyen, pero no se limitan a l suministro directo de ácido nucleico tal como por inyección (Patentes de EE. UU. 5.994.624. 5.981.274. 5.945.100. 5.780.448. 5.736.524. 5.702.932. 5.656.610. 5.589.466 y 5.580.859), incluyendo la microinyección (Harland y Weintraub, 1985; Patente de EE. UU. 5.789.215); electroporación (Patente de EE. UU. 5.384.253); por precipitación en fosfato de calcio (Graham y Van Der Eb, 1973; Chen y Okayama, 1987; Rippe y col., 1990); utilizando dextrano DEAE seguido por polietilenglicol (Gopal, 1985); por carga sónica directa (Fechheimer y col., 1987); por transfección mediada por liposomas (Nicolau y Sene, 1982; Fraley y col., 1979; Nicolau y col., 1987; Wong y col., 1980; Kaneda y col., 1989; Kato y col., 1991); por bombardeo con microproyectiles (Solicitudes PCT N.º WO 94/09699 y 95/06128; Patentes de EE. UU. 5.610.042; 5.322.783 5.563.055. 5.550.318. 5.538.877 y 5.538.880); por agitación con fibras de carburo de silicio (Kaepler y col., 1990; Patentes de EE. UU. 5.302.523 y 5.464.765); por transformación mediada por Agrobacterium (Patentes de EE. UU. 5.591.616 y 5.563.055); o por transformación de protoplastos mediada por PEEG (Omirulleh y col., 1993; Patentes de EE. UU. 4.684.611 y 4.952.500); por captación de ADN mediada por desecación/inhibición (Potrykus y col., 1985). Mediante la aplicación de técnicas tales como estas, se pueden transformar estable o transitoriamente orgánulos, células, tejidos u organismos.

H. Componentes y restos lipídicos

En ciertos aspectos, la presente invención se refiere a composiciones que comprenden uno o más lípidos asociados con un ácido nucleico, una molécula de aminoácido, tal como un péptido, u otro compuesto de molécula pequeña. En cualquiera de los aspectos expuestos en el presente documento, la molécula puede ser un polipéptido de rhabdovirus o un modulador polipeptídico de rhabdovirus, por ejemplo, un ácido nucleico que codifica todo o parte de un polipéptido de rhabdovirus, o alternativamente, una molécula de ácido nucleico que codifica todo o parte del modulador polipeptídico de rhabdovirus. Un lípido es una sustancia que es característicamente insoluble en agua y extraíble con un disolvente orgánico. Los compuestos distintos de los descritos específicamente en el presente documento se entienden por el experto en la técnica como lípidos, y están englobados en las composiciones y procedimientos de la presente divulgación. Un componente lipídico y no lipídico se pueden unir entre ellos sea covalente o no covalentemente.

Un lípido puede ser de origen natural o sintético (es decir, diseñado o producido por el ser humano). Sin embargo, un lípido normalmente es una sustancia biológica. Los lípidos biológicos se conocen bien en la técnica, e incluyen, por ejemplo, grasas neutras, fosfolípidos, fosfoglicéridos, esteroides, terpenos, glicoesfingolípidos, glucolípidos, sulfátidos, lípidos con ácidos grasos unidos por un éster y un éter y lípidos polimerizables, y combinaciones de los mismos.

Una molécula de ácido nucleico o molécula de aminoácido, tal como un péptido, asociado con un lípido se puede dispersar en una solución que contiene un lípido, disolverse con un lípido, emulsionarse con un lípido, mezclarse con un lípido, combinarse con un lípido, unirse covalentemente a un lípido, estar contenido como una suspensión en un lípido o asociarse de otra manera con un lípido. Un lípido o composición asociada con un virus/lípido de la presente invención no se limita a cualquier estructura en particular. Por ejemplo, pueden estar simplemente intercalados en una solución, posiblemente formando agregados que no son uniformes ni en tamaño ni en forma. En otro ejemplo, pueden estar presentes en una estructura bicapa, como micelas, o con una estructura "colapsada". En otro ejemplo no limitante, también se contempla un complejo lipofectamina (Gibco BRL)-poxvirus o Superfect (Qiagen)-virus.

En ciertos aspectos, una composición lipídica puede comprender aproximadamente un 1 %, aproximadamente un 2 %, aproximadamente un 3 %, aproximadamente un 4 %, aproximadamente un 5 %, aproximadamente un 6 %, aproximadamente un 7 %, aproximadamente un 8 %, aproximadamente un 9 %, aproximadamente un 10 %, aproximadamente un 11 %, aproximadamente un 12 %, aproximadamente un 13 %, aproximadamente un 14 %, aproximadamente un 15 %, aproximadamente un 16 %, aproximadamente un 17 %, aproximadamente un 18 %, aproximadamente un 19 %, aproximadamente un 20 %, aproximadamente un 21 %, aproximadamente un 22 %, aproximadamente un 23 %, aproximadamente un 24 %, aproximadamente un 25 %, aproximadamente un 26 %, aproximadamente un 27 %, aproximadamente un 28 %, aproximadamente un 29 %, aproximadamente un 30 %, aproximadamente un 31 %, aproximadamente un 32 %, aproximadamente un 33 %, aproximadamente un 34 %, aproximadamente un 35 %, aproximadamente un 36 %, aproximadamente un 37 %, aproximadamente un 38 %, aproximadamente un 39 %, aproximadamente un 40 %, aproximadamente un 41 %, aproximadamente un 42 %, aproximadamente un 43 %, aproximadamente un 44 %, aproximadamente un 45 %, aproximadamente un 46 %, aproximadamente un 47 %, aproximadamente un 48 %, aproximadamente un 49 %, aproximadamente un 50 %, aproximadamente un 51 %, aproximadamente un 52 %, aproximadamente un 53 %, aproximadamente un 54 %, aproximadamente un 55 %, aproximadamente un 56 %, aproximadamente un 57 %, aproximadamente un 58 %, aproximadamente un 59 %, aproximadamente un 60 %, aproximadamente un 61 %, aproximadamente un 62 %, aproximadamente un 63 %, aproximadamente un 64 %, aproximadamente un 65 %, aproximadamente un 66 %, aproximadamente un 67 %, aproximadamente un 68 %, aproximadamente un 69 %, aproximadamente un 70 %, aproximadamente un 71 %, aproximadamente un 72 %, aproximadamente un 73 %, aproximadamente un 74 %, aproximadamente un 75 %, aproximadamente un 76 %, aproximadamente un 77 %, aproximadamente un 78 %, aproximadamente un 79 %, aproximadamente un 80 %, aproximadamente un 81 %, aproximadamente un 82 %, aproximadamente un 83 %, aproximadamente un 84 %, aproximadamente un 85 %, aproximadamente un 86 %, aproximadamente un 87 %, aproximadamente un 88 %, aproximadamente un 89 %, aproximadamente un 90 %, aproximadamente un 91 %, aproximadamente un 92 %, aproximadamente un 93 %, aproximadamente un 94 %, aproximadamente un 95 %, aproximadamente un 96 %, aproximadamente un 97 %, aproximadamente un 98 %, aproximadamente un 99 %, aproximadamente un 100 %.

aproximadamente un 31 %, aproximadamente un 32 %, aproximadamente un 33 %, aproximadamente un 34 %, aproximadamente un 35 %, aproximadamente un 36 %, aproximadamente un 37 %, aproximadamente un 38 %, aproximadamente un 39 %, aproximadamente un 40 %, aproximadamente un 41 %, aproximadamente un 42 %, aproximadamente un 43 %, aproximadamente un 44 %, aproximadamente un 45 %, aproximadamente un 46 %, aproximadamente un 47 %, aproximadamente un 48 %, aproximadamente un 49 %, aproximadamente un 50 %, aproximadamente un 51 %, aproximadamente un 52 %, aproximadamente un 53 %, aproximadamente un 54 %, aproximadamente un 55 %, aproximadamente un 56 %, aproximadamente un 57 %, aproximadamente un 58 %, aproximadamente un 59 %, aproximadamente un 60 %, aproximadamente un 61 %, aproximadamente un 62 %, aproximadamente un 63 %, aproximadamente un 64 %, aproximadamente un 65 %, aproximadamente un 66 %, aproximadamente un 67 %, aproximadamente un 68 %, aproximadamente un 69 %, aproximadamente un 70 %, aproximadamente un 71 %, aproximadamente un 72 %, aproximadamente un 73 %, aproximadamente un 74 %, aproximadamente un 75 %, aproximadamente un 76 %, aproximadamente un 77 %, aproximadamente un 78 %, aproximadamente un 79 %, aproximadamente un 80 %, aproximadamente un 81 %, aproximadamente un 82 %, aproximadamente un 83 %, aproximadamente un 84 %, aproximadamente un 85 %, aproximadamente un 86 %, aproximadamente un 87 %, aproximadamente un 88 %, aproximadamente un 89 %, aproximadamente un 90 %, aproximadamente un 91 %, aproximadamente un 92 %, aproximadamente un 93 %, aproximadamente un 94 %, aproximadamente un 95 %, aproximadamente un 96 %, aproximadamente un 97 %, aproximadamente un 98 %, aproximadamente un 99 %, aproximadamente un 100 %, o cualquier intervalo derivado de estos, de un lípido particular, tipo de lípido, o un componente no lipídico tal como un fármaco, proteína, azúcar, ácido nucleico u otro material desvelado en el presente documento o como conoce un experto en la técnica. En un ejemplo no limitante, una composición lipídica puede comprender aproximadamente un 10 % a aproximadamente un 20 % de lípidos neutros, y aproximadamente de un 33 % a aproximadamente un 34 % de un cerebrósido, y aproximadamente un 1 % de colesterol. Por lo tanto, se contempla que las composiciones lipídicas de la presente divulgación pueden comprender cualquiera de los lípidos, tipos de lípido, u otros componentes en cualquier intervalo de combinaciones o porcentajes.

IV. FORMULACIONES FARMACÉUTICAS Y REGÍMENES DE TRATAMIENTO

En un aspecto de la presente divulgación, se contempla un procedimiento de tratamiento de una enfermedad hiperproliferativa o neoplásica, tal como el cáncer, mediante el suministro de un rhabdovirus no VSV, tal como el virus Maraba, virus Carajas, virus Muir Springs, y/o virus Bahía Grande. Ejemplos del cáncer contemplado por el tratamiento incluyen el cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer pancreático, cáncer de próstata, cáncer renal, cáncer de huesos, cáncer testicular, cáncer de cuello uterino, cáncer gastrointestinal, linfomas, lesiones preneoplásicas, lesiones preneoplásicas del pulmón, cáncer de colon, melanoma, cáncer de vejiga, y cualquier otro canceroso tumor que se pueda tratar, incluyendo los cánceres metastáticos o distribuidos sistémicamente.

Una cantidad eficaz de una composición farmacéutica, en general, se define como la cantidad suficiente para de manera detectable y repetida enlentece, mejora, reduce, minimiza, o limita la extensión de la enfermedad o sus síntomas. Se pueden aplicar definiciones más rigurosas, incluyendo la eliminación, erradicación o cura de la enfermedad.

Preferentemente, los pacientes tendrán una función adecuada de la médula ósea (definida como un recuento absoluto de granulocitos periféricos de $> 2.000 /\text{mm}^3$ y un recuento de plaquetas de $100.000/\text{mm}^3$), una función hepática adecuada (bilirrubina $< 1,5 \text{ mg/dl}$) y una función renal adecuada (creatinina $< 1,5 \text{ mg/dl}$).

A. Administración

Para destruir las células, inhibir el crecimiento celular, inhibir las metástasis, disminuir el tamaño del tumor o tejido, e invertir, parar o reducir de otra manera el fenotipo maligno de las células tumorales, utilizando los procedimientos y composiciones de la presente divulgación, generalmente se pondría en contacto una célula hiperproliferativa o neoplásica con una composición terapéutica tal como un virus o una construcción de expresión que codifique un polipéptido. Las vías de administración variarían, naturalmente, con la localización y naturaleza de la lesión, e incluyen, por ejemplo, la administración y formulación intradérmica, transdérmica, parenteral, intravascular, intravenosa, intramuscular, intranasal, subcutánea, regional, percutánea, intratraqueal, intraperitoneal, intraarterial, intravesical, intratumoral, por inhalación, perfusión, lavado, inyección directa, alimentaria, y oral.

Para efectuar un beneficio terapéutico con respecto a una enfermedad o afección vascular, se pone en contacto una célula vascular con el compuesto terapéutico. Cualquiera de las formulaciones y vías de administración expuestas con respecto al tratamiento o diagnóstico del cáncer también se pueden emplear con respecto a enfermedades y afecciones vasculares.

La inyección intratumoral, o inyección en el sistema vascular tumoral se contempla para tumores separados, sólidos accesibles. La administración local, regional o sistémica también se contempla, particularmente para los cánceres que se ha determinado que es probable que se diseminen sistémicamente. Las partículas víricas se pueden administrar durante al menos o como mucho en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inyecciones.

En el caso de una intervención quirúrgica, la presente divulgación puede utilizarse preoperativamente, para hacer que un tumor inoperable se someta a resección. De manera alternativa, la presente divulgación se puede utilizar en el momento de la cirugía, y/o después, para tratar la enfermedad residual o metastática. Por ejemplo, un lecho de tumor resecado se puede inyectar o perfundir con una formulación que comprende un polipéptido de rhabdovirus o un rhabdovirus, que puede tener o no una mutación, que sea ventajosa para el tratamiento del cáncer de células cancerosas. La perfusión puede continuar post-resección, por ejemplo, dejando un catéter implantado en el sitio de la cirugía. El tratamiento posquirúrgico periódico también se ha planeado.

También se puede aplicar la administración continua si fuera apropiado, por ejemplo, cuando el tumor se escinde y el lecho del tumor se trata para eliminar una enfermedad residual microscópica. El suministro mediante una jeringa o catéter se prefiere. Dicha perfusión continua puede tener lugar durante un periodo de tiempo de aproximadamente 1-2 horas, a aproximadamente 2-6 horas, a aproximadamente 6-12 horas, a aproximadamente 12-24 horas, a aproximadamente 1-2 días, a aproximadamente 1-2 semanas o más después del inicio del tratamiento. En general la dosis de la composición terapéutica mediante la perfusión continua será equivalente a la que se da mediante una inyección única o múltiples inyecciones, se ajusta durante un periodo de tiempo durante el que se produce la perfusión. Se contempla adicionalmente, que se puede utilizar la perfusión de una extremidad para administrar composiciones terapéuticas de la presente invención, particularmente en el tratamiento de melanomas y sarcomas.

Los regímenes de tratamiento pueden variar también, y a menudo dependen del tipo de tumor, localización del tumor, progresión de la enfermedad y salud y edad del paciente. Obviamente, ciertos tipos de tumor necesitarán un tratamiento más agresivo, mientras que, al mismo tiempo, ciertos pacientes no pueden tolerar muchos protocolos agotadores. El médico será el más adecuado para tomar dichas decisiones basándose en la eficacia y toxicidad conocidas (si hay) de las formulaciones terapéuticas.

En ciertos aspectos, el tumor que se va a tratar puede que no sea, al menos inicialmente, resecable. Los tratamientos con construcciones víricas terapéuticas pueden aumentar la operabilidad del tumor debido al encogimiento de los márgenes o por eliminación de ciertas partes particularmente invasivas. A continuación de los tratamientos puede ser posible la resección. Los tratamientos adicionales después de la resección servirán para eliminar la enfermedad microscópica residual en el sitio del tumor.

Un curso típico de tratamiento, para un tumor primario o un lecho post-escisión tumoral, implicará múltiples dosis. Un tratamiento de tumor primario típico implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, o más aplicaciones de dosis durante periodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas o más. Se puede repetir un régimen de dos semanas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis o más veces. Durante el curso de tratamiento, se puede reevaluar la necesidad de completar las dosis planeadas.

Los tratamientos pueden incluir "dosis unitarias". Una dosis unitaria se define como que contiene una cantidad predeterminada de una composición terapéutica. La cantidad que se va a administrar, y la vía y formulación en particular, están dentro de la técnica de los expertos en las técnicas clínicas. Una dosis unitaria no se necesita administrar como una inyección única, sino que puede comprender una infusión continua durante un periodo de tiempo fijado. La dosis unitaria de la presente invención puede describirse convenientemente en términos de unidades formadoras de placas (ufp) o partículas víricas para las construcciones víricas. Las dosis unitarias varían desde 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 , 10^7 , 10^8 , 10^9 , 10^{10} , 10^{11} , 10^{12} , 10^{13} ufp o pv y más. De manera alternativa, dependiendo del tipo de virus y el título alcanzable, se suministrarán 1 a 100, 10 a 50, 100-1000, o hasta aproximadamente 1×10^4 , 1×10^5 , 1×10^6 , 1×10^7 , 1×10^8 , 1×10^9 , 1×10^{10} , 1×10^{11} , 1×10^{12} , 1×10^{13} , 1×10^{14} , o 1×10^{15} o más partículas víricas (pv) infecciosas al paciente o las células del paciente.

B. Composiciones y formulaciones inyectables

El procedimiento preferido para el suministro de una construcción de expresión o virus que codifica todo o parte de un genoma rhabdovírico a las células cancerosas o tumorales en la presente divulgación es mediante inyección intravascular. Sin embargo, las composiciones farmacéuticas desveladas en el presente documento se pueden administrar de manera alternativa por vía intratumoral, parenteral, intravenosa, intraarterial, intradérmica, intramuscular, transdérmica o incluso intraperitoneal como se describe en las Patentes de EE. UU. 5,543,158, 5,641,515 y 5,399,363.

La inyección de construcciones de ácido nucleico se puede suministrar mediante jeringa o cualquiera otro procedimiento utilizado para la inyección de una solución a condición de que la construcción de expresión pueda pasar a través de un calibre de aguja determinado necesario para la inyección (por ejemplo, véase las Patentes de EE. UU. 5,846,233 y 5,846,225).

Las soluciones de los principios activos como base libre o sales aceptables farmacológicamente se pueden preparar en agua mezclada adecuadamente con un tensioactivo, tal como la hidroxipropilcelulosa. También se pueden preparar dispersiones en glicerol, polietilenglicoles líquidos y mezclas de los mismos y en aceites. En condiciones habituales de almacenamiento y uso estas preparaciones contienen un conservante para evitar el crecimiento de microorganismos. Las formas farmacéuticas adecuadas para el uso inyectable incluyen soluciones acuosas estériles o dispersiones y polvos estériles para la preparación extemporánea de soluciones inyectables estériles o dispersiones (Patente de EE. UU. 5,466,468) En todos los casos la forma debe ser estéril y debe ser fluida hasta el

punto de que se pueda suministrar fácilmente en una jeringa. Debe ser estable en condiciones de fabricación y almacenamiento y se debe conservar contra la acción contaminante de microorganismos, tales como bacterias y hongos. El vehículo puede ser un disolvente o medio de dispersión que contenga, por ejemplo, agua, etanol, poliol (por ejemplo, glicerol, propilenglicol, y polietilenglicol líquido, y similares), mezclas adecuadas de los mismos, y/o aceites vegetales. Se puede mantener la fluidez apropiada, por ejemplo, mediante el uso de un revestimiento, tal como lecitina, mediante el mantenimiento del tamaño necesario de partícula en el caso de la dispersión y mediante el uso de tensioactivos. La prevención de la acción de los microorganismos se puede llevar a cabo mediante distintos agentes antibacterianos y antifúngicos, por ejemplo, parabenos, clorbutanol, fenol, ácido sórbico, timerosal, y similares. En muchos casos, será preferible incluir agentes isotónicos, por ejemplo, azúcares o cloruro sódico. La absorción prolongada de las composiciones inyectables se puede llevar a cabo mediante el uso en las composiciones de agentes retardantes de la absorción, por ejemplo, monoestearato de aluminio y gelatina.

Para la administración parenteral en una solución acuosa, por ejemplo, la solución debería estar tamponada adecuadamente si es necesario y el diluyente líquido se hace isotónico primero con suficiente solución salina o glucosa. Estas soluciones acuosas particulares son especialmente adecuadas para la administración intravenosa, intramuscular, subcutánea, intratumoral, e intraperitoneal. En esta conexión, los medios acuosos estériles se pueden emplear son bien conocidos por los expertos en la técnica a la luz de la presente divulgación. Por ejemplo, una dosificación puede disolverse en 1 ml de solución de NaCl isotónica y añadirse a 1000 ml de fluido de hipodermoclasia o inyectarse en el sitio propuesto de infusión, (véase, por ejemplo, "Remington's Pharmaceutical Sciences" 15ª Edición, páginas 1035-1038 y 1570-1580). Se producirá necesariamente alguna variación de la dosificación dependiendo de la afección del sujeto que se va a tratar. La persona responsable de la administración determinará, en cada caso, la dosis apropiada para el sujeto individual. Además, para la administración humana las preparaciones deberían cumplir las convenciones de esterilidad, pirogenicidad, seguridad general y pureza que requieran los gobiernos de los países en los que se van a utilizar las composiciones.

Las composiciones desveladas en el presente documento se pueden formular en una forma neutra o salina. Las sales farmacéuticamente aceptables (formadas con el grupo amino libre de las proteínas) y que se forman con ácidos inorgánicos son, por ejemplo, del ácido clorhídrico o ácido fosfórico, o dichos ácidos orgánicos como el acético, oxálico, mandélico, y similares. Las sales formadas con los grupos carboxilo también se pueden derivar de bases inorgánicas, tales como el sodio, potasio, amonio, calcio, o hidróxidos férricos, y dichas bases orgánicas como isopropilamina, trimetilamina, histidina, procaína y similares. Al formularlas, las soluciones se administrarán de una manera compatible con la formulación de dosificación y en tal cantidad como sea terapéuticamente eficaz. Las formulaciones se administran fácilmente en una variedad de formas de dosificación tal como soluciones inyectables, cápsulas de liberación de fármacos y similares.

Como se utiliza en el presente documento, "vehículo" incluye todos y cada uno de los disolventes, medios de dispersión, excipientes, revestimientos, diluyentes, agentes antibacterianos y antifúngicos, agentes isotónicos y retardantes de la absorción tampones, soluciones portadoras, suspensiones, coloides y similares. El uso de dichos medios y agentes para las sustancias farmacéuticas activas es bien conocido en la técnica. Excepto en el caso de que cualquiera medio convencional o agentes sea incompatible con el principio activo, su uso en las composiciones terapéuticas está contemplado. Los principios activos suplementarios también se pueden incorporar en las composiciones.

La frase "farmacéuticamente aceptable" o "farmacológicamente aceptable" se refiere a entidades moleculares y composiciones que no producen una reacción alérgica o similar cuando se administra a un ser humano. La preparación de una composición acuosa que contiene una proteína como principio activo se entiende bien en la técnica. Normalmente dichas composiciones se preparan como inyectables, sea en soluciones líquidas o suspensiones; también se pueden preparar formas sólidas adecuadas para la solución, o la suspensión, en un líquido antes de la inyección.

C. Tratamientos de combinación

Los compuestos y procedimientos de la presente divulgación se pueden utilizar en el contexto de enfermedades/afecciones que incluyen el cáncer y la aterosclerosis. Con el fin de aumentar la eficacia de un tratamiento con las composiciones de la presente invención, tal como un rhabdovirus, puede que sea deseable combinar estas composiciones con otros agentes eficaces en el tratamiento de las enfermedades y afecciones. Por ejemplo, el tratamiento de un cáncer se puede implementar con compuestos terapéuticos de la presente invención y otras terapias anticáncer, tales como agentes anticáncer o cirugía.

Se pueden emplear distintas combinaciones; por ejemplo, un rhabdovirus no VSV, tal como el virus Maraba, virus Carajas, virus Muir Springs, y/o virus Bahía Grande, es "A" y la terapia anticáncer secundaria es "B", que puede incluir un segundo rhabdovirus:

A/B/A B/A/B B/B/A A/A/B A/B/B B/A/A A/B/B/B B/A/B/B

B/B/B/A B/B/A/B A/A/B/B A/B/A/B A/B/B/A B/B/A/A

B/A/B/A B/A/A/B A/A/A/B B/A/A/A A/B/A/A A/A/B/A

5 La administración de un virus terapéutico o construcciones víricas e la presente invención a un paciente seguirá los protocolos generales para la administración de esa terapia secundaria particular, teniendo en cuenta la toxicidad, si existe, del tratamiento vírico. Si se espera que los ciclos de tratamiento se repetirían según fuera necesario. también se contempla que distintas terapias convencionales, así como la intervención quirúrgica se puede aplicar en combinación con la terapia de células cancerosas o tumorales descrita.

1. Terapia anticáncer

10 Un agente "anticáncer" es capaz de afectar negativamente al cáncer en un sujeto, por ejemplo, destruyendo las células cancerosas, induciendo la apoptosis en las células cancerosas, reduciendo la tasa de crecimiento de las células cancerosas, reduciendo la incidencia o número de metástasis, reduciendo el tamaño tumoral, inhibición del crecimiento tumoral, reducción del suministro sanguíneo a un tumor o células cancerosas, promoviendo una respuesta inmunitaria contra las células cancerosa o un tumor, evitar o inhibir la progresión del cáncer, o aumentar la supervivencia de un sujeto con cáncer. Los agentes anticáncer incluyen agentes biológicos (bioterapia), agentes quimioterápicos, y agentes radioterápicos. Más generalmente, estas otras composiciones se proporcionarían en una cantidad eficaz combinada para destruir o inhibir la proliferación de la célula. Este proceso puede implicar poner en contacto las células con el virus o construcción vírica y los agentes o factores múltiples al mismo tiempo. Esto se puede conseguir poniendo en contacto la célula con una única composición o formulación farmacológica que incluye ambos agentes, o poniendo en contacto la célula con dos composiciones o formulaciones distintas, al mismo tiempo, en el que una composición incluye el virus y el otro incluye el segundo agente(s).

20 La resistencia de las células tumorales a los agentes quimioterápicos y radioterápicos representan un problema principal en la oncología clínica. Un objetivo de la investigación actual contra el cáncer es encontrar maneras para mejorar la eficacia de la quimio y radioterapia combinándolas con la terapia genética. Por ejemplo, el gen de la timidina cinasa (HS-tK) del herpes simple, cuando se suministra a tumores cerebrales mediante el sistema de vector retrovírico, se inducía satisfactoriamente una susceptibilidad al agente antivírico ganciclovir (Culver y col., 1992). En el contexto de la presente invención, se contempla que la terapia con poxvirus se podría utilizar de manera similar en conjunción con una intervención quimioterapéutica, radioterapéutica, inmunoterapéutica, u otras biológicas, además de otros agentes reguladores del ciclo celular o pro-apoptóticos.

30 De manera alternativa, la terapia vírica puede preceder o seguir al otro tratamiento en intervalos que varían desde minutos a semanas. En realizaciones en las que el otro agente y el virus se aplican por separado a la célula, se aseguraría en general que no expire un periodo de tiempo significativo entre el tiempo de cada suministro, de manera que el agente y el virus seguirían siendo capaces de ejercer ventajosamente un efecto combinado sobre la célula. En dichos casos, se contempla que se puede poner en contacto la célula con ambas modalidades dentro de aproximadamente 12-24 h entre ellas y, más preferentemente, dentro de aproximadamente 6-12 h entre ellas. En algunas situaciones, puede ser deseable extender el periodo de tiempo para el tratamiento significativamente, sin embargo, de un lapso de varios días (2, 3, 4, 5, 6 o 7) a varias semanas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8) entre las respectivas administraciones.

a. Quimioterapia

40 Las terapias del cáncer incluyen una variedad de terapias de combinación con tratamientos basados en químicos y radiación. Las quimioterapias de combinación incluyen, por ejemplo, cisplatino (CDDP), carboplatino, procarbazona, mecloretamina, ciclofosfamida, camptotecina, ifosfamida, melfalan, clorambucilo, busulfan, nitrosourea, dactinomicina, daunorrubicina, doxorubicina, bleomicina, plicamicina, mitomicina, etopósido (VP 16), tamoxifeno, raloxifeno, agentes de unión al receptor estrogénico, taxol, gemcitabina, navelbina, inhibidores de la farnesil-proteína transferasa, transplatino, 5-fluorouracilo, vincristina, vinblastina, y metotrexato. Temazolomida (una forma acuosa de DTIC), o cualquier variante análoga o derivada de los anteriores. La combinación de quimioterapia con terapia biológica se conoce como bioquimioterapia.

b. Radioterapia

50 Otros factores que causan un daño del ADN y que se han utilizado extensamente incluyen los que se conocen comúnmente como rayos γ , rayos X, haces de protones, y/o suministro dirigido de radioisótopos a las células tumorales. Otras formas de factores de daño del ADN también se contemplan tal como microondas y radiación UV. Es más probable que todos estos factores efectúen un amplio intervalo de daños sobre el ADN, sobre los precursores de ADN, sobre la replicación y reparación de ADN, y en el ensamblaje y mantenimiento de cromosomas. Los intervalos de dosificación varían para los rayos X desde dosis diarias de 50 a 200 roentgens durante periodos de tiempo prolongados (3 a 4 sem), a dosis únicas de 2000 a 6000 roentgens. Los intervalos de dosificación para radioisótopos varían ampliamente, y dependen de la semivida del isótopo, la fuerza y tipo de radiación emitida y la captación por las células neoplásicas.

55 Las expresiones "puestos en contacto" y "expuestos", cuando se aplican a una célula, se utilizan en el presente documento para describir el proceso por el cual una construcción terapéutica y un agente quimioterápico o

radioterápico se suministran en una célula diana o se colocan en yuxtaposición directa con la célula diana. Para conseguir la destrucción o estasis celular, ambos agentes se suministran a una célula en una cantidad eficaz combinada para destruir la célula o evitar que se divida.

c. Inmunoterapia

5 La inmunoterapia, en general, se basa en el uso de células inmunitarias y moléculas efectoras para dirigirse y destruir las células cancerosas. El efector inmunitario puede ser, por ejemplo, un anticuerpo específico para algún marcador de la superficie de una célula tumoral. El anticuerpo solo puede servir como un efector de terapia o puede reclutar otras células para efectuar actualmente la destrucción celular. El anticuerpo se puede conjugar también con un fármaco o toxina, (quimioterápico, radionúclido, cadena A de ricino, toxina colérica, toxina pertussis, etc.) y sirve simplemente como agente de direccionamiento. De manera alternativa, el efector puede ser un linfocito que tiene una molécula de superficie que interactúa sea directa o indirectamente, con una célula tumoral diana. Distintas células efectoras incluyen linfocitos T citotóxicos y linfocitos NK. La combinación de modalidades terapéuticas, es decir, actividad citotóxica directa e inhibición o reducción de ciertos rhabdovirus o polipéptidos de rhabdovirus proporcionarían un beneficio terapéutico en el tratamiento del cáncer.

15 La inmunoterapia también se puede utilizar como parte de una terapia combinada. La estrategia general para la terapia combinada se expone posteriormente. En un aspecto de la inmunoterapia. La célula tumoral debe tener algún marcador que sea posible direccionar, es decir que no esté presente en la mayoría de otras células, existen muchos marcadores tumorales y cualquiera de estos puede ser adecuado para el direccionamiento en el contexto de la presente invención. Los marcadores tumorales comunes incluyen el antígeno carcinoembrionario, antígeno específico de próstata, antígeno asociado a tumor urinario, antígeno fetal, tirosinasa (p97), gp68, TAG-72, HMFG, antígeno sialil de Lewis, MucA, MucB, PLAP, receptor estrogénico, receptor de laminina, erbB y p155. Los lisados de células tumorales también se pueden utilizar en la composición antigénica.

20 Un aspecto alternativo de la quimioterapia es combinar los efectos anticáncer con los efectos inmunoestimulantes. Las moléculas inmunoestimulantes incluyen: citocinas tales como IL-2, IL-4, IL-12, GM-CSF, IFN γ , quimiocinas tales como MIP-1, MCP-1, IL-8 y factores de crecimiento tales como el ligando FLT3. La combinación de moléculas inmunoestimulantes sea como proteínas o utilizando el suministro genético en combinación con un supresor tumoral se ha demostrado que aumenta los efectos antitumorales (Ju y col., 2000).

30 Como se ha expuesto anteriormente, los ejemplos de inmunoterapias actualmente en investigación o en uso son adyuvantes inmunitarios (por ejemplo, Mycobacterium bovis, Plasmodium falciparum, dinitroclorobenceno y compuestos aromáticos) (Patentes de EE. UU. 5.801.005 y 5.739.169; Hui y Hashimoto, 1998; Christodoulides y col., 1998), terapia con citocinas (por ejemplo, interferones α , β y γ ; IL-1, GM-CSF y TNF) (Bukowski y col., 1998; Davidson y col., 1998; Hellstrand y col., 1998); terapia genética (por ejemplo, TNF, IL-1, IL-2, p53) (Qin y col., 1998; Austin-Ward y Villaseca, 1998; Patentes de EE. UU. 5.830.880 y 5.846.945) y anticuerpos monoclonales (por ejemplo, anti-gangliósido GM2, anti-HER-2, anti-p185) (Pietras y col., 1998; Hanibuchi y col., 1998; Patente de EE. UU. 5.824.311). El herceptin (trastuzumab) es un anticuerpo monoclonal quimérico (de ratón-humano) que bloquea el receptor HER2-neu (Dillman, 1999). La terapia de combinación del cáncer con herceptin y quimioterapia ha demostrado que es más eficaz que las terapias individuales. Por lo tanto, se contempla que se pueden emplear una o más terapias anticáncer con las terapias relacionadas con rhabdovirus descritas en el presente documento.

(1) Inmunoterapia pasiva

40 Existen varias estrategias diferentes para la inmunoterapia pasiva del cáncer. Se pueden categorizar ampliamente en los siguientes: inyección de anticuerpos solos, inyección de anticuerpos acoplados a toxinas o agentes quimioterápicos; inyección de anticuerpos acoplados a isótopos radioactivos; inyección de anticuerpos anti-idiotípico; y finalmente, la purga de las células tumorales en la médula ósea.

45 Preferentemente, se emplean los anticuerpos monoclonales humanos en la inmunoterapia pasiva, ya que producen pocos efectos secundarios o ninguno en el paciente. Sin embargo, su aplicación está limitada de alguna manera por su escasez y hasta ahora solo se han administrado por vía intralesional. Los anticuerpos monoclonales humanos contra los antígenos gangliósidos se han administrado por vía intralesional a pacientes que padecen melanoma cutáneo recurrente (Irie y Morton, 1986). Se observó una regresión en seis de los diez pacientes, a continuación de inyecciones diarias o semanales. En otro estudio, se consiguió un éxito moderado con inyecciones intralesionales de dos anticuerpos monoclonales humanos (Irie y col., 1989).

Puede ser favorable administrar más de un anticuerpo monoclonal dirigido contra dos diferentes antígenos o incluso anticuerpo con múltiple especificidad de antígeno. Los protocolos de tratamiento también pueden incluir la administración de linfocinas u otros amplificadores inmunitarios como se describe por Bajorin y col. (1988). El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanos se describe con más detalla en la memoria descriptiva.

(2) Inmunoterapia activa

55 En la inmunoterapia activa, se administra un péptido, polipéptido o proteína antigénicos, o una composición celular tumoral alogénica o autóloga o "vacuna", en general con un adyuvante bacteriano distintivo (Ravindranath y Morton,

1991; Morton y col., 1992; Mitchell y col., 1990; Mitchell y col., 1993). En la inmunoterapia del melanoma, los pacientes que daban lugar a una alta respuesta de IgM a menudo sobrevivían mejor que los que no daban lugar o daban lugar a pocos anticuerpos IgM (Morton y col., 1992). Los anticuerpos IgM a menudo son anticuerpos transitorios y la excepción a la regla parece ser los anticuerpos anti-gangliósidos o anticarbohidratos.

5 (3) Inmunoterapia adoptiva

En la inmunoterapia adoptiva, los linfocitos circulantes del paciente, o los linfocitos infiltrados en el tumor, se aíslan *in vitro*, se activan con citocinas tales como la IL-2 o se transducen con genes de necrosis tumoral y se vuelven a administrar (Rosenberg y col., 1988; 1989). Para conseguir esto, se administraría a una animal o paciente humano una cantidad inmunológicamente eficaz de linfocitos activados en combinación con una composición peptídica antigénica con adyuvante incorporado como se describe en el presente documento. Los linfocitos activados serán más preferentemente células propias del paciente que se aislaron anteriormente de una muestra de sangre o del tumor y se activan (o "expanden") *in vitro*. Esta forma de inmunoterapia ha producido varios casos de regresión de melanoma y carcinoma renal, pero el porcentaje de los que responden era menor en comparación con los que no responden.

15 d. Genes

En otro ejemplo más, el tratamiento secundario es una terapia genética en la que un polinucleótido terapéutico se administra antes, después o al mismo tiempo que se administra un rhabdovirus. El suministro de un rhabdovirus en conjunción con un vector que codifica uno de los siguientes productos genéticos tendrán un efecto anticáncer combinado en los tejidos diana. De manera alternativa, el rhabdovirus puede modificarse como un vector vírico para incluir el polinucleótido terapéutico. Se engloban dentro de la invención una variedad de proteínas, algunas de las cuales se describen posteriormente. La Tabla 4 enumera distintos genes que pueden dirigirse para la terapia genética de alguna forma en combinación con la presente invención.

25 (1) Inductores de la proliferación celular

Las proteínas que inducen una proliferación celular se encuentran adicionalmente en distintas categorías dependiendo de la función. Lo que tienen en común todas estas proteínas es su capacidad para regular la proliferación celular. Por ejemplo, una forma de PDGF, el oncogén sis, es un factor de crecimiento secretado. Los oncogenes raramente aparecen a partir de genes que codifican factores de crecimiento, y actualmente, sis es el único factor de crecimiento oncogénico de origen natural conocido. En un aspecto de la presente divulgación se contempla que el ARNm antisentido dirigido a un inductor particular de proliferación celular se utiliza para evitar la expresión el inductor de proliferación celular.

35 (2) Inhibidores de proliferación celular

Los oncogenes supresores de un tumor funcionan para inhibir la proliferación celular excesiva. La inactivación de estos genes destruye su actividad inhibidora, dando como resultado una proliferación sin regular. Los supresores tumorales incluyen p53, p16 y C-CAM. Otros genes que se pueden emplear de acuerdo con la presente invención incluyen Rb, APC, DCC, NF-1, NF-2, WT-1, MEN-I, MEN-II, zacl, p73, VHL, MMAC1 / PTEN, DBCCR-1, FCC, rsk-3, p27, fusiones p27/p16, fusiones p21/p27, genes antitrombóticos (por ejemplo, COX-1, TFPI), PGS, Dp, E2F, ras, myc, neu, raf, erb, fins, trk, ret, gsp, hst, abl, E1A, p300, genes implicados en la angiogénesis (por ejemplo, VEGF, FGF, trombospondina, BAI-1, GDAIF, o sus receptores) y MCC.

40 (3) Reguladores de la muerte celular programada

La apoptosis o muerte celular programada, es un proceso esencial para el desarrollo embrionario normal. Mantenimiento de la homeostasis en tejidos adultos, y supresión de la carcinogénesis (Kerr y col., 1972). La familia Bcl-2 de proteínas y proteasas tipo ICE se ha demostrado que son reguladores importantes y efectores de apoptosis en otros sistemas. La proteína Bcl-2, descubierta en asociación con el linfoma folicular, tiene un papel importante en el control de la apoptosis y aumento de la supervivencia celular en respuesta a diversos estímulos apoptóticos (Bakhshi y col., 1985; Cleary y Sklar, 1985; Cleary y col., 1986; Tsujimoto y col., 1985; Tsujimoto y Croce, 1986). La proteína Bcl-2 evolucionariamente conservada se reconoce ahora como un miembro de una familia de proteínas relacionadas que puede categorizarse como agonistas de muerte o antagonistas de muerte.

Como consecuencia de su descubrimiento, se ha demostrado que la Bcl 2 actúa para suprimir la muerte celular desencadenada por una variedad de estímulos. También es aparente ahora que hay una familia Bcl 2 de proteínas reguladoras de la muerte celular que comparen homologías estructurales y de secuencia. Se ha demostrado que estos miembros de la familia diferentes poseen funciones similares a la Bcl 2 (por ejemplo, BclXL, BclW, BclS, Mcl-1, A1, Bfl-1) o actúan contra la función de Bcl 2 y promueven la muerte celular (por ejemplo, Bax, Bak, Bik, Bim, Bid, Bad, Harakiri).

55 e. Cirugía

Aproximadamente el 60 % de personas con cáncer se someterá a cirugía de algún tipo, lo que incluye cirugía

preventiva, diagnóstica o de estadificación, curativa o paliativa. La cirugía curativa es un tratamiento del cáncer que se puede utilizar en conjunción con otras terapias, tales como el tratamiento de la presente divulgación, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia genética, inmunoterapia y/o terapias alternativas.

5 La cirugía curativa incluye la resección en la que todo o parte del tejido cancerosos se retira físicamente se escinde y/o se destruye. La resección tumoral se refiere a la retirada física de al menos parte de un tumor. Además de la resección del tumor, el tratamiento por cirugía incluye la cirugía por láser, criocirugía, electrocirugía y cirugía controlada microscópicamente (cirugía de Mohs). Se contempla adicionalmente que la presente divulgación se puede utilizar en conjunción con la retirada de los cánceres superficiales, pre-cánceres o cantidades incidentales de tejido normal.

10 Con la escisión de parte de todas las células cancerosas, tejido o tumor, se puede formar una cavidad en el cuerpo. El tratamiento se puede conseguir por perfusión, inyección directa o aplicación local del área con una terapia anticáncer adicional. Dicho tratamiento se puede repetir, por ejemplo, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 días, o cada 1, 2, 3, 4, y 5 semanas o cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12 meses. Estos tratamientos también pueden tener dosificaciones variables.

15 **f. Otros agentes**

Se contempla que se pueden utilizar otros agentes en combinación con la presente divulgación para mejorar la eficacia terapéutica del tratamiento. Estos agentes adicionales incluyen agentes inmunomoduladores, agentes que afectan la regulación positiva de los receptores de superficie celular y uniones GAP, agentes citostáticos y de diferenciación, inhibidores de adhesión celular, agentes que aumentan la sensibilidad de las células hiperproliferativas a los inductores apoptóticos, u otros agentes biológicos. Los agentes inmunomoduladores incluyen el factor de necrosis tumoral; interferón α , β y γ ; IL-2 y otras citocinas; F42K y otros análogos de citocinas; o MIP-1, MIP-1p, MCP-1, RANTES, y otras quimiocinas. Se contempla adicionalmente que la regulación positiva de receptores de superficie celular o sus ligandos tales como el ligando Fas/Fas, DR4 o DR5/TRAIL (ligando Apo-2) potenciaría la capacidad inductora de apoptosis de la presente invención por el establecimiento de un efecto autocrino o apocrino de células hiperproliferativas. Los aumentos de la señalización intercelular elevando el número de uniones GAP aumentaría los efectos anti-hiperproliferativos en la vecindad de la población de células hiperproliferativas. En otros aspectos, los agentes citostáticos o de diferenciación se pueden utilizar en combinación con la presente divulgación para mejorar la eficacia anti-proliferativa de los tratamientos. Los inhibidores de la adhesión celular se contemplan para aumentar la eficacia de la presente invención. Ejemplos de inhibidores de adhesión celular son los inhibidores de cinasa de adhesión focal (FAK) y lovastatina. Se contemplan adicionalmente otros agentes que aumentan la sensibilidad de una célula hiperproliferativa a la apoptosis, tales como el anticuerpo c225, que se podrían utilizar en combinación con la presente invención para mejorar la eficacia del tratamiento.

Ha habido muchos avances en la terapia del cáncer siguiendo la introducción de fármacos quimioterápicos. Sin embargo, una de las consecuencias de la quimioterapia es el desarrollo/adquisición de fenotipos resistentes a los fármacos y el desarrollo de resistencias multi-fármacos. El desarrollo de la resistencia a fármacos sigue siendo un obstáculo principal en el tratamiento de dichos tumores y, por lo tanto, hay una necesidad obvia de estrategias alternativas tales como la terapia vírica.

Otra forma de terapia para su uso en conjunción con la quimioterapia, terapia por radiación y terapia biológica incluye la hipertermia, que es un procedimiento en el que el tejido del paciente se expone a altas temperaturas (hasta de 41 °C). los dispositivos de calentamiento externos o internos pueden implicarse en la aplicación de hipertermia local, regional, o del cuerpo completo. La hipertermia local implica la aplicación de calor en un área pequeña, tal como un tumor. El calor puede generarse externamente con ondas con alta frecuencia que se dirige a un tumor desde un dispositivo fuera del cuerpo. El calor interno puede implicar una sonda estéril, que incluyen cables finos calentados o tubos huecos rellenos con agua caliente, antena de microondas implantadas, o electrodos de radio frecuencia.

El órgano o una extremidad de un paciente se calienta por terapia regional, que se consigue utilizando dispositivos que producen alta energía, tal como imanes. De manera alternativa, algo de sangre del paciente se puede retirar y calentar antes de perfundirla en el área que se calentará internamente. El calentamiento de sangre completa se puede implementar también en los casos donde el cáncer se ha diseminado a través del cuerpo. Se pueden utilizar mantas de agua caliente, cera caliente, bobinas inductoras y cámaras térmicas para este fin.

También se puede utilizar terapia hormonal en conjunción con la presente divulgación o en combinación con cualquier otra terapia del cáncer descrita previamente. El uso de hormonas se puede emplear en el tratamiento de ciertos cánceres tales como un cáncer de mama, próstata, ovárico, o de cuello uterino para disminuir el nivel o bloquear los efectos de ciertas hormonas tales como testosterona o estrógenos. El tratamiento a menudo se utiliza en combinación con al menos una terapia de cáncer como tratamiento.

V. Ejemplos

Los siguientes ejemplos se dan con el fin de ilustrar distintos aspectos de la divulgación y no significa que limitan la presente divulgación de ninguna manera. Un experto en la técnica apreciará fácilmente que la presente divulgación

se adapta mejor para llevar a cabo los objetivos y obtener los fines y ventajas mencionadas, así como los objetivos, fines y ventajas inherentes a ellas. Los presentes ejemplos, junto con los procedimientos descritos en el presente documento son actualmente representativos de aspectos preferidos, son ejemplares, y no pretenden ser limitantes del ámbito de la divulgación.

5 Ejemplo comparativo 1

EXPLORACIÓN DE NUEVOS RHABDOVIRUS ONCOLÍTICOS CANDIDATOS

Exploraciones *in vitro*. Como una exploración inicial para identificar nuevos virus oncolíticos, rhabdovirus de campo aislados se evaluaron en cuanto a su capacidad para destruir células tumorales humanas del panel celular NCI60. Esto fue una estrategia fructífera para los inventores en el pasado para determinar la eficacia relativa de una serie de VSV mutantes como oncolíticos candidatos (que lisan células cancerosas). Inicialmente los inventores han examinado 13 nuevos rhabdovirus que se había determinado anteriormente que se replicaba en células de mamífero. Se contempla que este procedimiento se extendiera para estudiar los rhabdovirus para los cuales hay menos experiencia en cultivo celular. En un esfuerzo para explorar rápida y eficazmente mediante una matriz de 60 células infectadas con 13 virus diferentes, los inventores utilizando un ensayo rápido y barato en un formato de 96 pocillos utilizando la reducción de MTS formazan, o tinción con cristal violeta de las células residuales, para medir el número celular y la viabilidad. Los inventores cultivaron las líneas celulares a un 80 % de confluencia en placas de 96 pocillos y entonces se expusieron en paralelo a los aislados de rhabdovirus de campo de los inventores aumentando las MOI (Moi = 0,0001 – 10 UFP/célula). A las 48 y 96 horas después de la infección, se tiñeron las células con el reactivo MTS acuoso (Promega USA) y se incubaron durante 3 horas para permitir la suficiente formación de formazan. De manera alternativa, las placas de células infectadas se lavaron con tampón para retirar las células muertas, se tiñó con un colorante de cristal violeta, se lavaron para retirar el colorante residual, después de cuyo tiempo se solubilizó el colorante utilizando un detergente. Estas placas se leyeron entonces utilizando un lector de placas multipocillo integrado (Biotek SynergyHT; USA), se ajustó la curva de datos, y se determinó la CE₅₀ de esta curva. Normalmente, los ensayos se llevaron a cabo por sextuplicado, con retirada del valor más alto y el más bajo de la CE₅₀, y promediando las restantes CE₅₀ para determinar en último término y valor y un intervalo de confianza (por ejemplo, véase la FIG. 2).

Como marcador para evaluar si un virus particular infecta/destruye células humanas normales *in vitro*, se explorarán cultivos de fibroblastos humanos normales, cultivos de epitelio y endotelio y neuronales de la colección de los inventores y los disponibles en el mercado (Cambrex. USA). Los cultivos se infectarán con los virus candidatos (0,1 a 20 ufp/célula) durante 48 y 96 horas. Se detectará la viabilidad celular mediante el ensayo con MTS, o el ensayo con cristal violeta, y se caracterizó adicionalmente marcándolo con anticuerpo D175 caspasa 3 activado (Cell Signaling Technologies, USA) y se detectaron utilizando un anticuerpo secundario conjugado con FITC. Los estudios se harán en paralelo con líneas tumorales humanas y de ratón susceptibles /resistentes conocidas. Se ha utilizado una combinación de células no tratadas y células tratadas con TRAIL y ciclohexamida para establecer el rango dinámico del ensayo, con determinaciones preliminares de factor z significativamente por encima de 0,5.

Otra contingencia es que los virus se puedan replicar y diseminar eficazmente en los cultivos sin destruir rápidamente estas células. Hay también virus potencialmente interesantes, a condición de que su replicación sea selectiva del tumor en la naturaleza, ya que su capacidad lítica se podía aumentar posteriormente mediante modificación recombinante. Para detectar estos virus, los inventores infectaron células del panel celular del NCI 60 con aislados de campo a una MOI baja (0,1 ufp/célula) en pocillos duplicados de una placa de 24 pocillos. Después de una hora, se lavaron los pocillos completamente para retirar los virus introducidos libres, se añadió medio y se incubaron los cultivos durante 72 horas adicionales. Estos sobrenadantes del cultivo se titularon posteriormente sobre una línea celular permisiva (células Vero) para detectar y cuantificar la infección productiva. El lavado final de cada uno de estos se tituló para controlar los virus de entrada residuales. Los virus candidatos superiores en este ensayo se confirmaron en células de cultivo tisular utilizando un antisuero específico del virus y microscopía de fluorescencia convencional.

Clasificación basada en todos los parámetros. Varias propiedades contribuyen a la destrucción oncolítica de las células tumorales incluyendo: la capacidad para inducir apoptosis, la tasa de producción vírica, la cuantificación del virus producido, así como las funciones especiales, tales como la formación sincitial. Los candidatos prometedores de la exploración inicial se caracterizaron adicionalmente con respecto a la inducción de apoptosis (como se determinó por el ensayo TUNEL (la tinción inmunofluorescente por la caspasa-3 activada), y curvas de crecimiento de una etapa para comparar las cinéticas y cuantificar la producción de virus. Estos estudios sirven como guía para mejorar estas cepas. Por ejemplo: (1) si un virus destruye bien las células tumorales pero presenta una toxicidad inaceptable para las células normales, los inventores atenuaban este virus utilizando una o más de las estrategias señaladas posteriormente; (2) de manera alternativa, si un virus muestra cinéticas de destrucción más lentas mientras mantiene una alta tasa de replicación, entonces los inventores pueden añadir un tóxico o transgén terapéutico; (3) Si un virus candidato se replica lentamente aunque es un destructor eficaz, el inventor seleccionará una variante con cinéticas de crecimiento aumentadas para reforzar su potencia.

Por la experiencia de los inventores con VSV y otros virus oncolíticos, han identificado tres criterios de regulación claves *in vitro* para estrechar la lista de candidatos: (1) destrucción celular tumoral selectiva, (2) replicación

productiva dentro de las células tumorales (independiente de la destrucción), y (3) eficacia en líneas tumorales resistentes a VSV (UACC-62 de melanoma, A431 y NCI-H226 de pulmón, DU-145 de próstata, HL60 de leucemia). Basándose en estos criterios, los resultados de los ensayos de exploración descritos anteriormente se integrarán para recortar la lista para la evaluación adicional en ensayos *in vivo* preliminares.

5 **Toxicidad y biodistribución *in vivo*.** Las dos vías de administración relacionadas con un cuadro clínico son inyecciones intravenosas (IV) e intracraneales (IC). Los candidatos de cabeza identificados durante la exploración *in vitro* de toxicidad y biodistribución en ratones después de la infección se evaluaron por estas vías. Los grupos de 3 ratones se infectaron por vía IV a dosis de 1×10^5 a 1×10^9 ufp, o por IC a 1×10^2 a 1×10^6 ufp. Además de la mortalidad, se monitorizará la morbilidad diariamente en cuanto a signos de letargia, deshidratación, pérdida de peso y parálisis de extremidades. La histopatología se llevó a cabo en 2 ratones del grupo de dosis letal mínima (máxima dosis sin alcanzar la dosis letal) de cada infección de virus candidato. El VSV WT y la infección falsa sirve como controles positivo y negativo apropiados, respectivamente. Los órganos se recolectaron de los restantes ratones de este grupo, se homogeneizaron y se titularon como evaluación preliminar de la biodistribución vírica.

15 Para los virus que presentan un intervalo de dosis letal aceptable, los inventores evaluaron posteriormente la biodistribución en ratones que albergaban un tumor para identificar virus compatibles con la administración sistémica. El inventor emplea tres de los modelos de cáncer existentes del inventor que representan órganos diana muy diferentes de relevancia clínica crítica: (1) carcinoma de colon de ratón CT-26 (1×10^5 células) por inyección intravenosa para formar tumores pulmonares diseminados en ratones Balb/C singénicos (2), carcinoma de mama 4T1 de ratón (4×10^5 células) inyectadas en la almohadilla grasa de ratones Balb/C singénicos para formar un único tumor primario con metástasis espontánea, y (3) células de glioblastoma humano U87 (1×10^5 células) implantadas estereotáticamente en el córtex de ratones atímicos. Se determinó una dosis máxima tolerable para cada virus y vía (IV o IC) a partir de los experimentos de toxicidad preliminares *in vivo*. Este valor sirve como una dosis terapéutica inicial para los estudios de biodistribución en ratones que albergan un tumor. En los grupos de 3 ratones, se establecieron los tumores durante una semana y entonces se trataron por vía IV o IC con una única dosis de cada virus candidato a su respectiva MTD. Cuarenta y ocho horas después del tratamiento, se perfundieron los animales con solución salina para aclarar cualquier virus libre de la circulación y se recolectaron los tumores y los órganos, se homogeneizaron y se titularon para cuantificar los virus infecciosos. De esta manera, los inventores determinaron que virus se suministrarían en los sitios tumorales por inyección sistémica, así como la selectividad tumoral relativa de la replicación del virus *in vivo*.

30 **Reclasificación.** Basándose en la toxicidad, biodistribución, suministro sistémico y perfiles de selectividad tumoral en los estudios *in vivo*, los inventores seleccionaron los mejores candidatos para proceder con la caracterización detallada y el desarrollo posterior.

Ejemplo comparativo 2

CONSTRUCCIONES RECOMBINANTES

35 **Sistema de secuenciación y recombinante.** Con el fin de facilitar la investigación y desarrollo rápidos, la producción posterior de material clínico y para asegurar la seguridad y estabilidad de los virus terapéuticos, los inventores clonaron y rescataron formas recombinantes de virus seleccionados.

Muchos ssARN virus con cadena negativa se han clonado y rescatado utilizando técnicas recombinantes convencionales. Los inventores emplearon estrategias similares que se habían adoptado satisfactoriamente para los virus recombinantes -ssARN conocidos. En resumen, el genoma de un virus candidato se aísla mediante extracción de ARN (Qiagen Corp) a partir de 1×10^9 partículas víricas purificadas. El ARN genómico purificado se ceba entonces con hexámeros aleatorios y se transcribe inversamente a ADNc, que se hace posteriormente de doble cadena y se clona ligando adaptadores EcoRI, se fracciona por tamaño y finalmente se liga en un plásmido bacteriano digerido con EcoRI (pT7Blue; Novagen). El resultado es una biblioteca de fragmentos genómicos que se pueden secuenciar fácilmente por técnicas convencionales. Debido a la naturaleza de cebado aleatorio de esta biblioteca, esta estrategia no "captura" el extremo 3' y los extremos 5'. Para hacer esto los inventores ligaron oligos en los extremos 3' o 5' del ARN genómico purificado utilizando una ARN ligasa T4. Utilizando los cebadores complementarios para el oligo ligado recientemente que flanquea el genoma, los inventores amplificaron por PCR y clonaron los extremos del genoma para la secuenciación posterior. Esta información de secuencias se utilizó entonces para diseñar cebadores específicos del extremo para amplificar el genoma completo, que se clonó entonces en un plásmido especializado. Este plásmido flanquea el genoma con un promotor T7 en un extremo y una ribozima que auto escinde el delta de hepatitis y una secuencia terminadora T7 en el flanco opuesto. Cuando se transfectan en células A549 que expresan ARN polimerasa T7 (previamente infectadas con un virus vaccinia que expresa T7), este plásmido genera genomas víricos en el citoplasma. En paralelo, las secuencias codificantes de los virus para los genes N, P y L se clonaron en plásmidos de expresión dirigidos por el promotor CMV. La co-transfección de la construcción del genoma con los plásmidos N, P y L en estas células A549 reconstituye el complejo de replicación vírica en el genoma vírico y da como resultado el rescate de virus infecciosos. Como una prueba del principio, los inventores han cuando, modificado genéticamente, y rescatado el virus Maraba utilizando este procedimiento. Véase la FIG. 17 y FIG. 18 para ejemplos de virus relacionados con el Maraba.

Ejemplo comparativo 3**OPTIMIZACIÓN/AUMENTO**

Los rhabdovirus no VSV son virus silvestres; y como todos los virus oncolíticos informados hasta hora, incluyendo el VSV, los inventores predicen que estos aislados de campo se benefician de una optimización posterior mediante la selección *in vitro* y/o estrategias de modificación recombinante. Algunos candidatos pueden necesitar una atenuación (por ejemplo, el virus Maraba) mientras que algunos necesitan un aumento de sus cinéticas replicación y/o destrucción tumoral (por ejemplo, el virus Muir Springs). A continuación, está un sumario de varias estrategias que los inventores emplean para maximizar la eficacia de los virus terapéuticos recién identificados.

Mutaciones modificadas. El VSV bloquea el transporte de ARNm nuclear/citoplasmático como un medio para derrotar la inmunidad innata de la célula huésped. Los inventores habían descrito anteriormente mutaciones modificadas en la proteína M de VSV para incapacitar esta actividad y de esta manera atenuar selectivamente este virus en células normales. Dado que otros miembros del género vesiculovirus también han demostrado esta capacidad (Chandipura, y viremia de primavera de la carpa) y que la mayoría de los vesiculovirus secuenciados hasta ahora (VSV, Chandipura, Piry, Cocal, viremia de primavera de la carpa, Maraba) tienen el motivo de secuencia crítico necesario para esta función del VSV, los inventores contemplaron atenuar los rhabdovirus no VSV de una manera análoga a la que se utiliza para VSV. Sin embargo, otros rhabdovirus tales como el virus de rabia y de la fiebre efímera bovina no tienen este motivo y no bloquean el transporte de ARNm nuclear/citoplasmático y quizá no son propensos a esta estrategia de atenuación. Según haya disponible más información con respecto a la interacción rhabdovirus/huésped de los laboratorios del consorcio y otros, serán posibles modificaciones adicionales guiadas a la estructura/funcionalidad para atenuar estos virus.

Transgenes. Existen ahora varios informes de “armado” de virus oncolíticos con genes suicidas o mediadores inmunitarios para aumentar su potencia. Los inventores se enfocaron en la adición de transgenes para aumentar la citotoxicidad de los virus candidatos que se sentaban una replicación eficaz, por insuficiente destrucción tumoral. Los inventores han sopesado la prioridad de la lista de transgenes que se van a modificar actualmente en el virus Maraba. En este momento, la clasificación consiste en: (1) factor e inducción de apoptosis (AIF) – un homólogo de la oxido reductasa responsable del colapso y degradación de la cromatina de una manera independiente de la caspasa. (2) Harakiri – el miembro pro-apoptótico más potente solo de BH3 de la familia Bcl- responsable de la inducción de apoptosis dependiente de caspasa convencional (Tipo I PCD). (3) XAF1 – un potente gen supresor tumoral e inhibidor directo de la familia IAP. (4) Atg4B – la proteasa clave responsable del inicio de la autofagia (Tipo II PCD).

En último término, los miembros de las rutas intrínseca o extrínseca de la muerte celular se podrían modificar con Tat u otro dominio de transducción proteica para secretarse de las células infectadas con el virus para inducir un testigo de destrucción dentro de la masa del tumor. Los inventores siguen siendo conscientes de otros efectos de testigo de destrucción pueden mediar a través de la inmunidad del huésped contra el virus y/o el tumor. Por lo tanto, una estrategia alternativa sería modificar un transgén, para llevar células a los sitios de la infección. Las pruebas indican que la infección vírica de tumores CT26 de pulmón inducen la infiltración de neutrófilos en el tumor y producen un efecto de destrucción por testigo apoptótico masivo.

Evolución dirigida para mejorar los rhabdovirus oncolíticos. Se han descrito muchos ejemplos de evolución dirigida en los que la fuerza de la replicación de una cepa vírica parental se aumentaba o disminuía mediante pasajes en serie en un cultivo de células de mamífero. Los rhabdovirus son particularmente proclives a este tipo de procedimientos ya que no existe como una entidad única, sino como una población de cepas llamadas cuasi-especies. Los miembros de las cuasi-especies representan mutaciones puntuales del genoma dominante. Cuando se aplica una apropiada presión de selección, el miembro más válido de la población se selecciona, y se convierte en el genoma dominante. Esto tiene una tremenda utilidad en los esfuerzos para construir un virus oncolítico mejor debido a que proporciona una colección de mutantes fáciles de hacer de los que se selecciona una variante con las mejores capacidades oncolíticas. Por lo tanto, para atenuar un determinado candidato, los inventores seleccionaron mutantes de placa pequeña en fibroblastos primarios y posteriormente amplificaron el virus clonado en células tumorales para retro seleccionar las mutaciones no productivas (es decir, mutaciones que se debilitan uniformemente, tal como mutaciones de polimerasa, al contrario, a las discapacidades específicas en células/tejidos normales). Llevando a cabo esto en ciclos repetidos a altas MOI (10 ufp/célula), los inventores esperan aislar un mutante que mantenga una robusta replicación en células tumorales, aunque hayan perdido la capacidad para infectar productivamente células sanas normales. De manera alternativa, los inventores pueden aumentar la potencia de rhabdovirus no VSV, por selección de replicadores más rápidos, o destructores más letales. Para acelerar la tasa de replicación de un virus candidato, los inventores llevaron a cabo rondas repetidas de infección/replicación en líneas celulares tumorales, pero en cada ronda siguiente disminuía el tiempo de recolección tras la infección. Esta presión de selección fuerza a los virus a evolucionar hacia la replicación rápida. Si se deseara aumentar la citotoxicidad, los inventores infectaron líneas celulares tumorales resistentes o recalcitrantes (1×10^6 células) con virus candidatos (MOI = 1). Las células vivas se tiñeron posteriormente con colorante vital JC1 para detectar eventos de apoptosis precoz mediante citometría de flujo de color dual. Las células que sufrían apoptosis se clasificaron en monocapas de células Vero para recuperar el virus que se replicaba dentro de ellas. Las rondas repetidas de este ensayo, de nuevo con disminución del tiempo de recolección, selecciona un fenotipo más

rápidamente letal. Los virus mejorados de esta manera se secuencian para mapear las alteraciones genéticas y que contribuyen a los esfuerzos del análisis de estructura/función de los inventores hacia un mejor entendimiento de la biología de los rhabdovirus y la oncólisis. El panel genético inverso permite una estrategia sin tendencia para mejorar rhabdovirus y representa un buen complemento a los esfuerzos para hacer mejoras mediante modificación recombinante de los transgenes o las mutaciones racionales basadas en los estudios de estructura/función.

Ejemplo 4

ENSAYO *IN VIVO* DE NUEVOS RHABDOVIRUS ONCOLÍTICOS RECOMBINANTES

Los inventores han escogido el uso de modelos ortotópicos de cáncer ya que recapitulan con más precisión la enfermedad clínica humana. Sin embargo, a diferencia de los modelos de tumor subcutáneo, los tumores ortotópicos no son fácilmente accesibles y por lo tanto difíciles de evaluar sin sacrificar al animal de experimentación. Para resolver este problema, se adoptó una tecnología de creación de imágenes ópticas multimodal que permite la creación de imágenes no invasiva y la medición repetida del crecimiento y regresión de los tumores implantados, así como el desarrollo y regresión de las lesiones metastáticas distales. Los inventores tienen una plataforma altamente sensible completamente integrada de creación de imágenes completas del animal (IVIS 200; Xenogen Corp) que pueden detectar fotones emitidos incluso desde dentro del tejido profundo. Puede medir luz fluorescente emitida por proteínas fluorescentes recombinantes tales como GFP, así como detectar la bioluminiscencia generada por luciferasa. Utilizando genes indicadores de luciferasa específicos del sustrato, uno expresado desde el virus y el otro expresado desde las células tumorales, los inventores pueden medir la bioluminiscencia resultante de la replicación vírica de manera concurrente con las mediciones tumorales. Para hacer esto los inventores han clonado o YFP o una nueva RFP monomérica en fase con luciferasa de luciérnaga o una luciferasa tipo renilla nueva del copépodo marino *Gaussia princeps*. Entre estas dos secuencias codificantes los inventores han modificado una secuencia de "parada-reinicio" de 30 aminoácidos. Este pequeño motivo viene del virus de la enfermedad del pie y la boca y permite la expresión estequiométrica de dos proteínas a partir de un único ARNm, es muy pequeño y no sufre por la variabilidad de célula a célula como los motivos de un IRES. Estas construcciones indicadoras duales se clonaron en vectores de lentivirus, se empaquetaron en el virus, y se utilizaron para establecer unas células 4T1, CT26 y U87 de glioblastoma humano marcadas con un indicador estable. Estas líneas celulares se utilizaron en tres modelos de tumor ortotópico en ratón: las U87 de glioma humano implantadas por vía intracraneal en ratones atímicos CD-1; células 4T1 de carcinoma de mama de ratón implantadas en la almohadilla grasa de hembras Balb/c (modelo de enfermedad metastática agresiva); las CT-15 e carcinoma de colon inyectadas en la vena de la cola de ratones Balb/C (tumores diseminados en el pulmón). La elección del modelo ortotópico se declara con los siguientes criterios: tumor de desarrollo rápido, agresivo, y por lo tanto un desafío para el tratamiento; representa muchas dianas orgánicas diferentes, abarca sistemas tanto de huéspedes inmunocompetentes como inmunocomprometidos.

Los primeros estudios son para evaluar las características de la respuesta a la dosis de los modelos de los inventores para identificar una dosis óptima. A partir de los experimentos de toxicidad preliminares, los inventores han definido una MTD para cada una de las cepas candidatas en animales Balb/C que no tenían tumor. Por lo tanto, los inventores ensayaron dosis desde la MTD, disminuyendo en intervalos de medio log hasta 1×10^3 ufp. Utilizando el IVIS para la replicación de imágenes en los tumores establecidos, se estudiaron las cinéticas de suministro de virus inicial y la duración de la replicación posterior en función de la dosis. En estudios paralelos los ratones se sacrificaron durante este momento y se examinaron utilizando microscopía de fluorescencia para determinar cómo afecta la dosis a la capacidad para alcanzar todas las partes del tumor y las lesiones metastáticas distales. El tejido sano se examinó para evaluar la replicación específica en el tumor. Finalmente, se determinó la seguridad en cada dosis monitorizando los ratones por cualquier signo de morbilidad tal como pérdida de peso, deshidratación y cambios de comportamiento. Las respuestas tumorales a los virus en las comparaciones mano a mano se evaluaron a continuación de un tratamiento de dosis única IV. La sensibilidad y la naturaleza cuantitativa e la tecnología de reacción de imágenes ópticas la hace idealmente adecuada para este fin. Por lo tanto, los tumores se establecieron como se ha descrito anteriormente y se monitorizaron el crecimiento o la regresión tumorales a continuación de la dosificación con los virus y se compararon estos resultados con virus de control inactivados con UV. Basándose en un trabajo previo con VSV, se contempla que una única dosis puede no ser suficiente para una regresión completa y perdurable del tumor. Esto necesita una serie de experimentos para determinar el número más eficaz y el intervalo de dosis. En una estrategia similar a la descrita anteriormente, los inventores utilizan modelos tumorales para desarrollar estrategias de dosificación máxima eficaz. Esto se hace mientras se monitoriza el suministro de virus al tumor, la replicación, duración de la replicación en el lecho del tumor y diseminación a sitios tumorales distantes, en concierto con el crecimiento/remisión del tumor. Además, los inventores examinan la infiltración celular inmunitaria y la activación en lechos tumorales y alrededor de los ganglios linfático utilizando citometría de flujo e inmunohistoquímica como otro parámetro de la actividad oncolítica. En último término, se confirma la eficacia monitorizando estos ratones en cuanto a la supervivencia total y/o tiempo de progresión; comparando los grupos tratados con el virus con los tratados con virus inactivados con UV como control. Un ejemplo del modelo animal se puede encontrar en la FIG. 13.

Ciclo retrógrado para la optimización/aumento. Puede ser que varios ciclos de optimización y luego reensayo sean necesarios para desarrollar en último término un virus terapéutico sumamente eficaz. Por lo tanto, los inventores utilizan los resultados del ensayo *in vivo* para guiar rondas adicionales de optimización biológica y/o recombinante y luego se reensaya en los modelos tumorales.

Tabla 4. Destrucción celular mediada por rhabdovirus en el panel celular NCI 60 Las células del panel celular NCI 60 se colocaron en placas de 6 pocillos hasta una confluencia del 90 %. Estas células se infectaron en diluciones log con distintos rhabdovirus como se indica. Después de 48 horas, las monocapas se lavaron, fijaron y tñieron con cristal violeta para calificar las células viables. Los valores representan las ufp necesarias para destruir el 50 % de las células en 48 h.

Enfermedad maligna	Línea celular	Chandipura	Maraba	Carajas	Isfahan	Klamath	Sawgrass	VSV HR
	A549-							
PULMÓN NSC	ATCC	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^4	10^5	$\geq 10^9$	NE	$\geq 10^6$
PULMÓN NSC	EKVX	$\leq 10^2$	10^3		$\geq 10^6$			10^3
PULMÓN NSC	HOP92 NCI-	10^3	10^3		10^5			$\leq 10^2$
PULMÓN NSC	H226	$\geq 10^6$	$\geq 10^6$	10^4				
PULMÓN NSC	NCI-H23	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$		$\leq 10^2$	10^4		$\leq 10^2$
MELANOMA	LOX IMVI	$\leq 10^2$	10^3	10^3				$\leq 10^2$
MELANOMA	M 14 SK-MEL-	10^3	$\leq 10^2$	10^3		$\geq 10^6$		10^5
MELANOMA	2 MALME	$\leq 10^2$	10^3					$\leq 10^2$
MELANOMA	3M UACC-	10^3	10^5	10^5	10^3			10^5
MELANOMA	257 UACC-	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^3			$\leq 10^2$
MELANOMA	62		$\leq 10^2$	10^3				$\geq 10^6$
LEUCEMIA	MOLT-4		10^3					$\leq 10^2$
LEUCEMIA	K-562		10^5					
	OVCAR-3							
OVÁRICA	OVCAR-4		10^3					$\leq 10^2$
OVÁRICA	OVCAR-8	10^3	$\leq 10^2$	10^5	10^4	$\geq 10^6$	10^4	10^3
OVÁRICA		NE	10^6	$\geq 10^6$	NE		NE	10^3
OVÁRICA	SK-OV-3	$\leq 10^2$	10^5	10^5	$\geq 10^9$		$\geq 10^6$	10^4
SNC	SF-268		$\leq 10^2$	10^4				10^4
SNC	SF-539	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^3	10^4			10^5
SNC	SNB-19	10^3	10^4	$\leq 10^2$				$\leq 10^2$
SNC	SNB-75	10^3	10^3	NE	10^5	$\geq 10^6$		$\leq 10^2$
COLON	HT29 COLO	10^4	$\geq 10^6$	NE	NE		NE	10^5
COLON	205	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$		$\geq 10^6$			10^3
COLON	HCT-15	10^5	10^4	10^5	$\geq 10^6$			10^3
COLON	SW-620	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^3	10^5			$\leq 10^2$
MAMA	HS 578T MDA-	$\geq 10^6$	$\geq 10^6$				$\geq 10^6$	10^4
MAMA	MB-435	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^3			$\leq 10^2$
RENAL	TK-10	$\leq 10^2$	10^3		10^4			10^4
RENAL	786-O	10^4	$\leq 10^2$	10^5	10^5			10^5
RENAL	ACHN	10^5	10^3	10^5	$> 10^6$		NE	$\leq 10^2$
RENAL	A498	10^5	10^5	$\geq 10^6$				10^4

(continuación)

Enfermedad maligna	Línea celular	Chandipura	Maraba	Carajas	Isfahan	Klamath	Sawgrass	VSV HR
PRÓSTATA	DU-145		$\leq 10^2$		$\geq 10^6$			$\geq 10^6$
PRÓSTATA	PC-3		$\geq 10^6$		NE			$\leq 10^2$
COLON DE RATÓN	CT26	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	$\geq 10^6$	NE			$\leq 10^2$

Tabla 5. Comparación enfocada entre cuatro rhabdovirus. Las células del panel celular NCI 60 se colocaron en placas de 6 pocillos hasta una confluencia del 90 %. Estas células se infectaron en diluciones log con distintos rhabdovirus como se indica. Después de 48 horas, las monocapas se lavaron, fijaron y tiñeron con cristal violeta para calificar las células viables. Los valores representan las ufp necesarias para destruir el 50 % de las células en 48 h.

		Chandipura	Maraba	Carajas	WT VSV
Pulmón	A549	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^4	$\geq 10^6$
	H226	$\geq 10^6$	$\geq 10^6$	10^4	$\leq 10^2$
Melanoma	M14	10^3	$\leq 10^2$	10^3	10^5
	Malme 3M	10^3	10^5	10^5	10^5
	UACC-62		$\leq 10^2$	10^3	$\geq 10^6$
Leucemia	K562		10^5		10^3
Ovárico	OVCAR4	10^3	$\leq 10^2$	10^5	10^3
	OVCAR8		$\geq 10^6$	$\geq 10^6$	10^3
	SK-OV-3	$\leq 10^2$	10^5	10^5	10^4
SNC	SF268		$\leq 10^2$	10^4	10^4
	SF539	$\leq 10^2$	$\leq 10^2$	10^3	10^5
Colon	HCT-15	10^5	10^4	10^5	10^3
Mama	HS578T	$\geq 10^6$	$\geq 10^6$		10^4
Renal	786-O	10^4	$\leq 10^2$	10^5	10^5
	ACHN	10^5	10^3	10^5	$\leq 10^2$
Próstata	DU-145		$\leq 10^2$		$\geq 10^6$
	PC-3			$\geq 10^6$	$\leq 10^2$

5 Las diferencias entre los VSV y otros rhabdovirus del panel celular NCI 60 incluyen: (1) destrucción preferente por el virus Maraba en comparación del VSV de A549 de pulmón, M14 de melanoma, UACC-62 de melanoma, SF268 de SNC, SF539 SNC, 786-O renal, DU-145 próstata; (2) destrucción preferente del virus Carajas en comparación con el VSV para M14 melanoma, UACC-62 de melanoma, SF539 de SNC; destrucción preferente por el VSV para H226 de pulmón, K562 de leucemia, OVCAR-8 ovárico, HCT-15, HS578T de mama, y PC-3 de próstata. Todas las demás líneas celulares del panel celular 60 muestran susceptibilidades similares al VSV, Maraba y Carajas y Chandipura

10

Tabla 6. Destrucción *in vitro* de células transformadas e inmortalizadas seleccionadas por los nuevos rhabdovirus. Las células se colocaron en placas de 6 pocillos y se dejaron hasta alcanzar una confluencia del 75 %. Estas células se infectaron posteriormente con cada virus con un título fijo. Se valoraron los cultivos visualmente en cuanto a la muerte celular después de 96 h. 4+ = 100 % obliteradas, 3+ = 75-90 % muertas, 2+ = 50 % muertas, 1+= <30 % muertas, -- = no muertas.

		Farmington	Muir Springs	Rio Grande	Ngaingan	Tibrogargan	Le Dantec	Kwatta
Ser humano	293T	++++	++++	+++	++	+		
Ratón	4T1	+	+	++	+			
Ser humano	SW620	+++	+++	+++	+			
Hámster	BHKT7	+	+++	+++	+++	+++		
Ser humano	U20S	++++	++	++++	++++			
Mono	Vero	+++	++++	+++	++++			

Ejemplo comparativo 5

RHABDOVIRUS QUIMÉRICOS

5 Un problema potencial con las composiciones víricas oncolíticas es el potencial de una respuesta inmunitaria en un paciente. Dicha respuesta inmunitaria puede truncar la eficacia de aplicaciones adicionales del virus oncolítico ya que una parte significativa del virus se puede neutralizar por el sistema inmunitario del paciente. Para evitar este problema sería preferible tener una pluralidad de composiciones víricas oncolíticas que sean inmunológicamente distintas. En este caso se puede aplicar un virus oncolítico diferente a un paciente para cada terapia posterior
 10 proporcionando de esta manera una actividad oncolítica sostenida que esté mínimamente afectada por la respuesta inmunitaria del huésped. En este punto, se construyeron varias composiciones víricas pseudotipadas y se ensayaron en cuanto a su capacidad para infectar células.

Par estudiar la posibilidad de la utilización de rhabdovirus oncolíticos que comprendan distintas proteínas G a partir de varios de los rhabdovirus, se construyeron distintos virus recombinantes. Cada recombinante incluía el armazón de VSV Indiana de tipo silvestre (genes N, P, M y L) a menos de que se especifique otra cosa. Además, los recombinantes incluían un gen indicador de luciferasa, sea de luciérnaga (FL) o de renilla (RL) entre el gen G y el gen L. La nomenclatura general utilizada para hacer referencia a los recombinantes es RVR_aG^x, donde RVR significa Rhabdovirus recombinante, (a) denota el origen de la proteína G o el gen tipo proteína G y (x) denota el número de versión.

20 **RVR con proteína G de Isfahan.** Se clonó un genoma de RVR en el vector pNX2VSV de manera que los sitios de restricción XhoI y NheI flanqueaban los genes G o tipo G. Se añadió la secuencia de parada inicio vírica al extremo 3' de todos los genes G o tipo G que codificaban la siguiente secuencia: CTCGAGGGTATGAAAAAACTAACAGATATCACGGCTAG (SEQ ID NO: 25). El virus recombinante se pseudotipó con la proteína G de Isfahan que tiene una identidad de secuencia proteica del 37 % en comparación con VSV G Ind. El RVR que comprendía el indicador FDL se denominó RVR_{Isf} (Isfahan) G¹ (en el que la versión 1 indica la presencia del gen indicador FL).

Además, los estudios de neutralización con anticuerpo demostraron que el suero que comprende anticuerpos de ratones inmunizados con VSV WT no neutralizaban significativamente la actividad del RVR Isf G¹ *in vitro*.

Además, cuando se inyectaron los ratones los ratones inmunizados con VSV WT con el RVR_{Isf}G¹ el virus con el polipéptido Isf G es capaz de evadirse del sistema inmunitario. Como se muestra en la FIG. 6C, el RVR_{Isf}G¹ era detectable en distintas localizaciones de los ratones inmunizados después de la inoculación vírica. El nivel de RVR_{Isf}G¹ que se detecta en los ratones inmunizados era similar al nivel detectado en animales de control intactos (FIG. 6A). Por otra parte, no se detectaron virus en ratones inmunizados a los que se inoculó con VSV (FIG. 6B). Por lo tanto, los virus oncolíticos que comprenden el polipéptido G de Isf escapan de la respuesta inmunitaria del huésped al que se administró previamente VSV *in vivo*.

Estos resultados se confirmaron adicionalmente inyectando tumores en ratones intactos inmunizados con VSV o virus recombinante y se determinó que el virus se producía a partir de las inyecciones. Como se muestra en la FIG. 7, el virus recombinante inyectado en los tumores de ratones inmunizados o intactos producía grandes cantidades de virus de al progenie. Por otra parte, la propagación de VSV inyectado en ratones inmunizados era apenas detectable.

Se construyeron también dos RVR adicionales que comprendían el Isf. El RVR_{Isf}G² comprende un indicador genético RL en lugar del indicador genético FL del RVR_{Isf}G¹. También, el RVR_{Isf}G³ comprende una proteína G VSV-Isf quimérica. La proteína quimérica (SEQ ID NO: 19) comprende el ectodominio G de Isfahan con el dominio de G transmembrana y la cola citoplasmática de VSV.

5 **RVR con proteína G de Chandipura.** La G de Chandipura tiene una homología de secuencia proteica del 42 % con la G de VSV (Indiana). Se utilizó la misma estrategia de clonación descrita anteriormente para construir el RVR_{Cha}G¹. Una curva de crecimiento de una etapa con RVR_{Cha}G¹ demostraba que produce cantidades de virus similares en comparación con VSV (FIG. 8). Además, el RVR tenía una citotoxicidad similar en comparación con el VSV (FIG. 9).

10 **RVR con proteína G de Maraba.** La G de Maraba tiene una homología de secuencia proteica el 83 % con la G de VSV (Indiana). Este es el primer informe de la secuencia de la proteína G de Maraba proporcionada como una secuencia de ADN en la SEQ ID NO: 20. Se utilizó la misma estrategia de clonación descrita anteriormente para construir RVR_{Mar}G¹. Una curva de crecimiento de una etapa con RVR_{Mar}G¹ demostraba que el título de virus recombinante era mayor que el de VSV a las 48 y 72 h. Por lo tanto, el cambio de proteína G puede estabilizar el virus y de esa manera aumentar el rendimiento (FIG. 10). Además, se demostró que el RVR_{Mar}G¹ era citotóxico (FIG. 11). Además, los ensayos de neutralización con anticuerpos demostraron que el suero de ratones inmunizados con VSV WT no neutralizaban la actividad de RVR_{Mar}G¹ indicando que el RVE es capaz de evasión inmunitaria.

15 **RVR con Proteína G de Muir Springs.** La G de Muir Springs tiene una homología de secuencia del 25,4 % con la G de VSV (Indiana). La secuencia de G de Muir Springs se proporciona en la SEQ ID NO: 21 (aminoácidos) y SEQ ID NO: 22 (ADN). Se utilizó la misma estrategia de clonación descrita anteriormente para construir el RVR_{Mur}G¹.

20 **RVR con proteína G del virus Klamath.** Los experimentos de pseudotipado confirmaron que la proteína G de Klamath es funcional en un entorno con pH bajo (6,8), a diferencia de la G de VSV. Esto es de gran importancia ya que se sabe que el centro tumoral es hipóxico y ácido. Por lo tanto, puede ser una ventaja tener un virus que pueda replicarse en dicho entorno. El VSV HRGFP-Klamath pseudotipado se generó de manera que los viriones contenían el genoma de un virus pero las proteínas de envoltura de ambos virus por co-infección en células CT26. 24 horas después de la co infección se recolectó el sobrenadante y se titularon las partículas pseudotipadas. El virus pseudotipado se utilizó entonces (junto con un virus de control para infectar células diana en medios de dos diferentes acideces. Los resultados muestran que la proteína G de Klamath era responsable de la capacidad de infección del virus a pH bajo.

25 **Esencialmente se utilizó la misma estrategia de clonación descrita anteriormente para construir el RVR_{Kla}G².** Sin embargo, a diferencia de las estrategias previas, este recombinante incluye la G de Klamath además de la G de VSV (Indiana).

RVR con proteína G de virus Farmington (Far). El virus Farmington es un no vesiculovirus que no es neurotrópico y demuestra la formación de grandes sincitios.

30 **RVR con proteína G de virus Bahía Grande (Bah).** El virus Bahía Grande es un no vesiculovirus que no es neurotrópico.

35 **RVR con proteína Env del retrovirus JSR.** Como el VSV tiene una neurotoxicidad conocida, una estrategia por la que un VSV recombinante no infectara las neuronas sería ventajosa. La Env JSR es originalmente del gen de envoltura (Env) no neurotrópico de un retrovirus JSRV (un virus no neurotrópico). Se generó una quimera que comprendía el ectodominio Env del JSRV con el dominio transmembrana y cola citoplasmática de G de VSV (secuencia de ADN proporcionada como SEQ ID NO: 23).

40 **RVR con proteína G de Ébola.** El Ébola es un virus no neurotrópico con una glicoproteína que funciona como receptor de unión y media en la fusión con la membrana. La proteína G contiene un sitio de escisión furin en la posición de aminoácidos 497-501. Los productos de la escisión (GP1 y GP2) se unen por enlaces disulfuro y se piensa que actúan como un posible señuelo para neutralizar anticuerpos o como inmunomodulador. Sin embargo el sitio de escisión furin no es necesario para la infección ni el tropismo. La secuencia del ADN de la proteína G del Ébola se proporciona como SEQ ID NO: 24.

Referencias

50 Patente de EE. UU. 4.554.101
 Patente de EE. UU. 4.683.195
 Patente de EE. UU. 4.683.202
 Patente de EE. UU. 4.684.611
 Patente de EE. UU. 4.800.159
 Patente de EE. UU. 4.879.236
 55 Patente de EE. UU. 4.883.750
 Patente de EE. UU. 4.946.773
 Patente de EE. UU. 4.952.500

Patente de EE. UU. 5.220.007
 Patente de EE. UU. 5.279.721
 Patente de EE. UU. 5.284.760
 Patente de EE. UU. 5.302.523
 5 Patente de EE. UU. 5.322.783
 Patente de EE. UU. 5.354.670
 Patente de EE. UU. 5.366.878
 Patente de EE. UU. 5.384.253
 Patente de EE. UU. 5.389.514
 10 Patente de EE. UU. 5.399.363
 Patente de EE. UU. 5.464.765
 Patente de EE. UU. 5.466.468
 Patente de EE. UU. 5.538.877
 Patente de EE. UU. 5.538.880
 15 Patente de EE. UU. 5.543.158
 Patente de EE. UU. 5.550.318
 Patente de EE. UU. 5.563.055
 Patente de EE. UU. 5.580.859
 Patente de EE. UU. 5.589.466
 20 Patente de EE. UU. 5.591.616
 Patente de EE. UU. 5.610.042
 Patente de EE. UU. 5.635.377
 Patente de EE. UU. 5.641.515
 Patente de EE. UU. 5.656.610
 25 Patente de EE. UU. 5.702.932
 Patente de EE. UU. 5.736.524
 Patente de EE. UU. 5.739.169
 Patente de EE. UU. 5.780.448
 Patente de EE. UU. 5.789.166
 30 Patente de EE. UU. 5.789.215
 Patente de EE. UU. 5.798.208
 Patente de EE. UU. 5.801.005
 Patente de EE. UU. 5.824.311
 Patente de EE. UU. 5.830.650
 35 Patente de EE. UU. 5.830.880
 Patente de EE. UU. 5.840.873
 Patente de EE. UU. 5.843.640
 Patente de EE. UU. 5.843.650
 Patente de EE. UU. 5.843.651
 40 Patente de EE. UU. 5.843.663
 Patente de EE. UU. 5.846.225
 Patente de EE. UU. 5.846.233
 Patente de EE. UU. 5.846.708
 Patente de EE. UU. 5.846.709
 45 Patente de EE. UU. 5.846.717
 Patente de EE. UU. 5.846.726
 Patente de EE. UU. 5.846.729
 Patente de EE. UU. 5.846.783
 Patente de EE. UU. 5.846.945
 50 Patente de EE. UU. 5.849.481
 Patente de EE. UU. 5.849.483
 Patente de EE. UU. 5.849.486
 Patente de EE. UU. 5.849.487
 Patente de EE. UU. 5.849.497
 55 Patente de EE. UU. 5.849.546
 Patente de EE. UU. 5.849.547
 Patente de EE. UU. 5.851.770
 Patente de EE. UU. 5.851.772
 Patente de EE. UU. 5.851.772
 60 Patente de EE. UU. 5.853.990
 Patente de EE. UU. 5.853.992
 Patente de EE. UU. 5.853.993
 Patente de EE. UU. 5.856.092
 Patente de EE. UU. 5.858.652
 65 Patente de EE. UU. 5.861.244
 Patente de EE. UU. 5.863.732

Patente de EE. UU. 5.863.753
 Patente de EE. UU. 5.866.331
 Patente de EE. UU. 5.866.337
 Patente de EE. UU. 5.866.366
 5 Patente de EE. UU. 5.871.986
 Patente de EE. UU. 5.882.864
 Patente de EE. UU. 5.900.481
 Patente de EE. UU. 5.905.024
 Patente de EE. UU. 5.910.407
 10 Patente de EE. UU. 5.912.124
 Patente de EE. UU. 5.912.145
 Patente de EE. UU. 5.912.148
 Patente de EE. UU. 5.916.776
 Patente de EE. UU. 5.916.779
 15 Patente de EE. UU. 5.919.626
 Patente de EE. UU. 5.919.630
 Patente de EE. UU. 5.922.574
 Patente de EE. UU. 5.925.517
 Patente de EE. UU. 5.925.525
 20 Patente de EE. UU. 5.925.565
 Patente de EE. UU. 5.928.862
 Patente de EE. UU. 5.928.869
 Patente de EE. UU. 5.928.870
 Patente de EE. UU. 5.928.905
 25 Patente de EE. UU. 5.928.906
 Patente de EE. UU. 5.929.227
 Patente de EE. UU. 5.932.413
 Patente de EE. UU. 5.932.451
 Patente de EE. UU. 5.935.791
 30 Patente de EE. UU. 5.935.819
 Patente de EE. UU. 5.935.825
 Patente de EE. UU. 5.939.291
 Patente de EE. UU. 5.942.391
 Patente de EE. UU. 5.945.100
 35 Patente de EE. UU. 5.981.274
 Patente de EE. UU. 5.994.624
 Abschuetz y col., *Cell Tissue Res.*, 325(3):423-36, 2006.
 Almendro y col., *J. Immunol.*, 157(12):5411-5421, 1996.
 Angel y col., *Cell*, 49:729, 1987a.
 40 Angel y col., *Mol. Cell. Biol.*, 7:2256, 1987b.
 Austin-Ward y Villaseca, *Revista Médica de Chile*, 126(7):838-845, 1998.
 Ausubel y col., In: *Current Protocols in Molecular Biology*, John, Wiley & Sons, Inc, NY, 1994.
 Bajorin y col., *J. Clin. Oncol.*, 6(5):786-792, 1988.
 Bakhshi y col., *Cell*, 41(3):899-906, 1985.
 45 Banerji y col., *Cell*, 27(2 Pt 1):299-308, 1981.
 Banerji y col., *Cell*, 33(3):729-740, 1983.
 Bergmann y col., *Cancer Res.*, 61(22):8188-93, 2001.
 Berkhout y col., *Cell*, 59:273-282, 1989.
 Blana y col., *EMBO J.*, 8:1139, 1989.
 50 *Blood*. 2001 jun 15;97(12):3746-54
 Bodine y Ley, *EMBO J.*, 6:2997, 1987.
 Boshart y col., *Cell*, 41:521, 1985.
 Bosze y col., *EMBO J.*, 5(7):1615-1623, 1986.
 Braddock y col., *Cell*, 58:269, 1989.
 55 Braisted y Wells, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 93(12):5688-5692, 1996.
 Bukowski y col., *Clinical Cancer Res.*, 4(10):2337-2347, 1998.
 Bulla y Siddiqui, *J. Virology*, 62:1437, 1986.
 Burton y Barbas, *Adv. Immunol.*, 57:191-280, 1994.
 Campbell y Villarreal, *Mol. Cell. Biol.*, 8:1993, 1988.
 60 Campere y Tilghman, *Genes and Dev.*, 3:537, 1989.
 Campo y col., *Nature*, 303:77, 1983.
 Carbonelli y col., *FEMS Microbiol. Lett.*, 177(1):75-82, 1999.
 Celandier y Haseltine, *J. Virology*, 61:269, 1987.
 Celandier y col., *J. Virology*, 62:1314, 1988.
 65 Chandler y col., *Cell*, 33:489, 1983.
 Chandler y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 94(8):3596-601, 1997.

- Chang y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:2153, 1989.
 Chatterjee y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 86:9114, 1989.
 Chen y Okayama, *Mol. Cell Biol.*, 7(8):2745-2752, 1987.
 Choi y col., *Cell*, 53:519, 1988.
 5 Christodoulides y col., *Microbiology*, 144(Pt 11):3027-3037, 1998.
 Cleary y Sklar, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 82(21):7439-7443, 1985.
 Cleary y col., *J. Exp. Med.*, 164(1):315-320, 1986.
 Cocea, *Biotechniques*, 23(5):814-816, 1997.
 Coffey y col., *Science*, 282(5392):1332-4, 1998.
 10 Cohen y Wittenauer, *J. Cardiovasc. Pharmacol.*, 10:176-181, 1987.
 Costa y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:81-90, 1988.
 Cripe y col., *EMBO J.*, 6:3745, 1987.
 Culotta y Hamer, *Mol. Cell. Biol.*, 9:1376-1380, 1989.
 Culver y col., *Science*, 256(5063):1550-1552, 1992.
 15 Cunningham y col., *Science*, 244(4908):1081-1085, 1989.
 Dandolo y col., *J. Virology*, 47:55-64, 1983.
 Davidson y col., *J. Immunother.*, 21(5):389-398, 1998.
 de Villiers y col., *Nature*, 312(5991):242-246, 1984.
 Deschamps y col., *Science*, 230:1174-1177, 1985.
 20 Dillman, *Cancer Biother. Radiopharm.*, 14(1):5-10, 1999.
 Edbrooke y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:1908-1916, 1989.
 Edlund y col., *Science*, 230:912-916, 1985.
 Solicit. Europea 320 308
 Solicit. Europea 329 822
 25 Fechheimer, y col., *Proc Natl. Acad. Sci. USA*, 84:8463-8467, 1987.
 Feng y Holland, *Nature*, 334:6178, 1988.
 Firak y Subramanian, *Mol. Cell. Biol.*, 6:3667, 1986.
 Foecking y Hofstetter, *Gene*, 45(1):101-105, 1986.
 Fraley y col., *Bio/Technology*, 3:629-635, 1985.
 30 Frohman, In: *PCR Protocols: A Guide To Methods And Applications*, Academic Press, N.Y., 1990.
 Fuerst y col., *Proc. Natl Acad. Sci. USA*, 3:8122-8126, 1986.
 Fuerst y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 3: 8122-26, 1986.
 Fujita y col., *Cell*, 49:357, 1987.
 GB Appln. 2 202 328
 35 Gilles y col., *Cell*, 33:717, 1983.
 Gloss y col., *EMBO J.*, 6:3735, 1987.
 Godbout y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:1169, 1988.
 Goodbourn y Maniatis, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 85:1447, 1988.
 Goodbourn y col., *Cell*, 45:601, 1986.
 40 Gopal, *Mol. Cell Biol.*, 5:1188-1190, 1985.
 Graham y Van Der Eb, *Virology*, 52:456-467, 1973.
 Greene y col., *Immunology Today*, 10:272, 1989.
 Gromeier y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 97(12):6803-8, 2000.
 Grosschedl y Baltimore, *Cell*, 41:885, 1985.
 45 Grote y col., *Blood.*, 97(12):3746-54, 2001.
 Hanibuchi y col., *Int. J. Cancer*, 78(4):480-485, 1998.
 Harland y Weintraub, *J. Cell Biol.*, 101(3): 1094-1099, 1985.
 Haslinger y Karin, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 82:8572, 1985.
 Hauber y Cullen, *J. Virology*, 62:673, 1988.
 50 Heise y col., *Nat. Med.*, 6(10):1134-9, 2000.
 Hellstrand y col., *Acta Oncologica*, 37(4):347-353, 1998.
 Hen y col., *Nature*, 321:249, 1986.
 Hensel y col., *Lymphokine Res.*, 8:347, 1989.
 Herr y Clarke, *Cell*, 45:461, 1986.
 55 Hilton y col., *J. Biol. Chem.*, 271(9):4699-4708, 1996.
 Hirochika y col., *J. Virol.*, 61:2599, 1987.
 Hirsch y col., *Mol. Cell. Biol.*, 10:1959, 1990.
 Holbrook y col., *Virology*, 157:211, 1987.
 Holden y col., *EMBO J.*, 6:1565-1570, 1987.
 60 Horlick y Benfield, *Mol. Cell. Biol.*, 9:2396, 1989.
 Huang y col., *Cell*, 27:245, 1981.
 Hug y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:3065-3079, 1988.
 Hui y Hashimoto, *Infection Immun.*, 66(11):5329-5336, 1998.
 Hwang y col., *Mol. Cell. Biol.*, 10:585, 1990. Imagawa y col., *Cell*, 51:251, 1987.
 65 Imbra y Karin, *Nature*, 323:555, 1986. Imler y col., *Mol. Cell. Biol.*, 7:2558, 1987.
 Imperiale y Nevins, *Mol. Cell. Biol.*, 4:875, 1984.

- Innis y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 85(24):9436-9440, 1988.
 Irie y Morton, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 83(22):8694-8698, 1986.
 Irie y col., *Lancet*, 1(8641):786-787, 1989.
 Jakobovits y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:2555, 1988.
 5 Jameel y Siddiqui, *Mol. Cell. Biol.*, 6:710, 1986.
 Jaynes y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:62, 1988.
 Johnson y col., *Amer. J. Physiol.*, 256:H1012-1022, 1989.
 Ju y col., *Gene Ther.*, 7(19):1672-1679, 2000.
 Kadesch y Berg, *Mol. Cell. Biol.*, 6:2593, 1986.
 10 Kaeppeler y col., *Plant Cell Reports*, 9:415-418, 1990.
 Kaneda y col., *Science*, 243:375-378, 1989.
 Karin y col., *Mol. Cell. Biol.*, 7:606, 1987.
 Katinka y col., *Cell*, 20:393, 1980.
 Katinka y col., *Nature*, 290:720, 1981.
 15 Kato y col., *J. Biol. Chem.*, 266:3361-3364, 1991.
 Kawamoto y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:267, 1988.
 Kerschner y col., *J. Gen. Virol.*, 67 (Pt 6):1081-9, 1986.
 Kiledjian y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:145, 1988.
 Kinoh y col., *Gene Ther.*, 11(14): 1137-45, 2004.
 20 Klamut y col., *Mol. Cell. Biol.*, 10:193, 1990.
 Koch y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:303, 1989.
 Kraus y col. *FEBS Lett.*, 428(3):165-170, 1998.
 Kriegler y Botchan, In: *Eukaryotic Viral Vectors*, Gluzman (Ed.), Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory, NY, 1982.
 25 Kriegler y Botchan, *Mol. Cell. Biol.*, 3:325, 1983. Kriegler y col., *Cell*, 38:483, 1984. Kriegler y col., *Cell*, 53:45, 1988.
 Kriegler y col., In: *Cancer Cells 2/Oncogenes and Viral Genes*, Van de Woude y col. eds, Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Laboratory, 1984.
 Kriegler y col., In: *Gene Expression*, Alan Liss (Ed.), Hamer y Rosenberg, New York, 1983. Kuhl y col., *Cell*, 50:1057, 1987.
 30 Kunz y col., *Nucl. Acids Res.*, 17:1121, 1989.
 Kwoh y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 86:1173, 1989.
 Kyte y Doolittle, *J. Mol. Biol.*, 157(1):105-132, 1982.
 Lareyre y col., *J. Biol. Chem.*, 274(12):8282-8290, 1999.
 35 Larsen y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 83:8283, 1986.
 Laspia y col., *Cell*, 59:283, 1989. Latimer y col., *Mol. Cell. Biol.*, 10:760, 1990.
 Lee y col., *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 238(2):462-467, 1997.
 Lee y col., *Nature*, 294:228, 1981. Lee y col., *Nucleic Acids Res.*, 12:4191-206, 1984.
 Levenson y col., *Hum. Gene Ther.*, 9(8):1233-1236, 1998.
 40 Levinson y col., *Nature*, 295:79, 1982.
 Lin y col., *Cytogenet. Cell Genet.*, 53:169-171, 1990.
 Logg y col., *Hum. Gene Ther.*, 12(8):921-32, 2001.
 Luria y col., *EMBO J.*, 6:3307, 1987.
 Lusky y Botchan, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 83:3609, 1986.
 45 Lusky y col., *Mol. Cell. Biol.*, 3:1108, 1983.
 Macejak y Sarnow, *Nature*, 353:90-94, 1991.
 Majors y Varmus, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 80:5866, 1983.
 McNeill y col., *Gene*, 76:81, 1989.
 Miksicek y col., *Cell*, 46:203, 1986.
 50 Mineta y col., *Nat. Med.*, 1(9):938-43, 1995.
 Mitchell y col., *Ann. NY Acad. Sci.*, 690:153-166, 1993.
 Mitchell y col., *J. Clin. Oncol.*, 8(5):856-869, 1990.
 Mordacq y Linzer, *Genes and Dev.*, 3:760, 1989.
 Moreau y col., *Nucl. Acids Res.*, 9:6047, 1981.
 55 Morton y col., *Arch. Surg.*, 127:392-399, 1992.
 Muesing y col., *Cell*, 48:691, 1987.
 Muir Springs y Bahia Grande: *J Gen Virol*. 1986 jun ;67 (Pt 6):1081-9 Ng y col., *Nuc. Acids Res.*, 17:601, 1989.
 Nicolau y Sene, *Biochim. Biophys. Acta*, 721:185-190, 1982.
 Nicolau y col., *Methods Enzymol.*, 149:157-176, 1987.
 60 Nomoto y col., *Gene*, 236(2):259-271, 1999.
 Ohara y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 86:5673-5677, 1989.
 Omirulleh y col., *Plant Mol. Biol.*, 21(3):415-428, 1993.
 Omitz y col., *Mol. Cell. Biol.* 7:3466, 1987.
Oncol Res. 1999; 11(3):133-44.
 65 Ondek y col., *EMBO J.*, 6:1017, 1987.
 Palmiter y col., *Cell*, 29:701, 1982.

- Palmiter y col., *Nature*, 300:611, 1982.
 Solicit. PCT PCT/US87/00880
 Solicit. PCT PCT/US89/01025
 Solicit. PCT WO 88/10315
 5 Solicit. PCT WO 89/06700
 Solicit. PCT WO 90/07641
 Solicit. PCT WO 94/09699
 Solicit. PCT WO 95/06128
- Pech y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:396, 1989.
 10 Pelletier y Sonenberg, *Nature*, 334(6180):320-325, 1988.
 Perez-Stable y Constantini, *Mol. Cell. Biol.*, 10:1116, 1990.
 Picard y Schaffner, *Nature*, 307:83, 1984.
 Pietras y col., *Oncogene*, 17(17):2235-2249, 1998.
 Pinkert y col., *Genes and Dev.*, 1:268, 1987.
 15 Ponta y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*, 82:1020, 1985.
 Porton y col., *Mol. Cell. Biol.*, 10:1076, 1990.
 Potrykus y col., *Mol. Gen. Genet.*, 199(2):169-177, 1985.
 Qin y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 95(24):14411-14416, 1998.
 Queen y Baltimore, *Cell*, 35:741, 1983.
 20 Quinn y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:4713, 1989.
 Ravindranath y Morton, *Intern. Rev. Immunol.*, 7: 303-329, 1991.
 Redondo y col., *Science*, 247:1225, 1990.
 Reisman y Rotter, *Mol. Cell. Biol.*, 9:3571, 1989.
 Remington's *Pharmaceutical Sciences* 15ª Edición, páginas 1035-1038 y 1570-1580, 1990.
 25 Resendez Jr. y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:4579, 1988.
 Rippe y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9(5):2224-22277, 1989.
 Rittling y col., *Nuc. Acids Res.*, 17:1619, 1989.
 Rodríguez y col. (1990) *J. Virol.*, 64:4851-4857, 1990.
 Rodríguez y col., *J. Virol.*, 64:4851-4857, 1990.
 30 Rosen y col., *Cell*, 41:813, 1988.
 Rosenberg y col., *Ann. Surg.*, 210(4):474-548, 1989.
 Rosenberg y col., *N. Engl. J. Med.*, 319:1676, 1988.
 Sakai y col., *Genes and Dev.*, 2:1144, 1988.
 Sambrook y Russell, *Molecular Cloning: A Laboratory Manual* 3ª Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
 35 Satake y col., *J. Virology*, 62:970, 1988.
 Schaffner y col., *J. Mol. Biol.*, 201:81, 1988.
 Searle y col., *Mol. Cell. Biol.*, 5:1480, 1985.
 Shafren y col., *Clin. Cancer Res.*, 10(1 Pt 1):53-60, 2004.
 Sharp y Marciniak, *Cell*, 59:229, 1989.
 40 Shaul y Ben-Levy, *EMBO J.*, 6:1913, 1987.
 Sherman y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:50, 1989.
 Sinkovics y Horvath. *J. Clin. Virol.*, 16(1):1-15, 2000.
 Sleight y Lockett, *J. EMBO*, 4:3831, 1985.
 Spalholz y col., *Cell*, 42:183, 1985.
 45 Spandau y Lee, *J. Virology*, 62:427, 1988.
 Spandidos y Wilkie, *EMBO J.*, 2:1193, 1983.
 Stephens y Hentschel, *Biochem. J.*, 248:1, 1987.
 Stillman y col., *J. Virol.*, 69: 2946-53, 1995.
 Stillman y col., *J. Virol.*, 69:2946-2953, 1995.
 50 Stojdl y col., *Cancer Cell.*, 4(4):263-75, 2003.
 Stojdl y col., *Nat Med.*, 6(7):821-5, 2000.
 Stuart y col., *Nature*, 317:828, 1985.
 Sullivan y Peterlin, *Mol. Cell. Biol.*, 7:3315, 1987.
 Swartzendruber y Lehman, *J. Cell. Physiology*, 85:179, 1975.
 55 Takada y col., *Proc. Natl Acad. Sci. USA*, 1997.
 Takada y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 1997.
 Takebe y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:466, 1988.
 Tavernier y col., *Nature*, 301:634, 1983.
 Taylor y Kingston, *Mol. Cell. Biol.*, 10:165, 1990a.
 60 Taylor y Kingston, *Mol. Cell. Biol.*, 10:176, 1990b.
 Taylor y col., *J. Biol. Chem.*, 264:15160, 1989.
 Thiesen y col., *J. Virology*, 62:614, 1988.
 Timiryasova y col., *Oncol. Res.*, 11(3):133-44, 1999.
 Treisman, *Cell*, 46(4):567-174, 1986
 65 Tronche y col., *Mol. Biol. Med.*, 7:173, 1990.
 Tronche y col., *Mol. Cell Biol.*, 9(11):4759-4766, 1989.

Trudel y Constantini, *Genes and Dev.*, 6:954, 1987.
 Tsujimoto y Croce, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 83(14):5214-5218, 1986.
 Tsujimoto y col., *Nature*, 315:340-343, 1985.
 5 Tsumaki y col., *J. Biol. Chem.*, 273(36):22861-22864, 1998.
 Unno y col., *Clin. Cancer Res.*, 11(12):4553-60, 2005.
 Usdin y col., (1993) *BioTechniques*, 14:222-224, 1993.
 Usdin y col., *Bio. Techniques.*, 14:222-224, 1993.
 Vannice y Levinson, *J. Virology*, 62:1305, 1988.
 10 Vasseur y col., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*, 77:1068, 1980.
 Walker y col., *Nucleic Acids Res.* 20(7):1691-1696, 1992.
 Wang y Calame, *Cell*, 47:241, 1986.
 Warren y col., *Biochemistry*, 35(27):8855-8862, 1996.
 Weber y col., *Cell*, 36:983, 1984.
 15 Weinberger y col., *Mol. Cell. Biol.*, 8:988, 1984.
 Wells y col., *J. Leukoc. Biol.*, 59(1):53-60, 1996.
 Winoto y Baltimore, *Cell*, 59:649, 1989.
 Wong y col., *Gene*, 10:87-94, 1980.
 Wu y col., *J. Exp. Med.*, 185:1681-1691, 1997.
 20 Yelton y col., *J. Immunol.*, 155(4):1994-2004, 1995.
 Yutzey y col., *Mol. Cell. Biol.*, 9:1397-1405, 1989.
 Zeng y col., *Biochemistry*, 35(40):13157-13164, 1996.
 Zhao-Emonet y col., *Biochim. Biophys. Acta*, 1442(2-3):109-119, 1998.

LISTADO DE SECUENCIAS

- <110> STOJDL, DAVID
- 25 <120> RHABDOVIRUS ONCOLÍTICOS
- <130> FUL-338 EP DIV 1
- <140> Aun desconocido
- <141> 17-09-2007
- <150> 60/844.726
- 30 <151> 15-09-2006
- <160> 28
- <170> PatentIn versión 3.3
- <210> 1
- <211> 11068
- 35 <212> ADN
- <213> Desconocido
- <220>
- <223> *Virus Maraba*
- <400> 1

ES 2 741 138 T3

ctggttacagt caagagagtc attgatgatt cactcatcac ccccaaattg cctgcgaatg	60
aggaccctgt ggagtaccct gctgattatt tcaaaaagtc ccgtgatatt ccggtgtaca	120
taaacacgac caaaagtttg tctgatttgc ggggctatgt ttatcaaggc ctaaagtcag	180
gcaacatctc tataattcat gtcaacagtt atctgtatgc agcattaaaa gagatcagag	240
gaaaattgga cagagattgg atcacctttg gtatccaaat cggaaaaaca ggagatagcg	300
tggggatatt cgatttactg accctaaaac ctctagatgg tgttttacca gatgggggtg	360
ctgatgctac tcgaactagc tcagacgatg catggcttcc actgtatcta ttggggttat	420
acagagttgg tcgaacacag atgccagaat acaggaagaa gctgatggat ggtctgatta	480
atcaatgtaa gatgatcaat gagcagtttg aaccactggt gccagaagga agagatgtct	540
ttgatgtctg gggaaatgac agcaattaca caaagattgt ggccgctgta gatatgttct	600
tccatatgtt caaaaagcat gagaaggcct ctttcaggta tggcacaata gtgtcaagat	660
ttaaggattg tgcagcattg gctacatttg gtcacatctg taagatcact ggtatgtcca	720
ctgaagatgt gacaacttgg attctaaaca gggaggtggc tgatgagatg gttcaaatga	780
tgtaccocagg acaggagata gataaggctg attccttacat gccttatcta atcgacttag	840
gtctgtcctc aaaatctcca tatccatcag ttaaaaatcc agctttccat ttttggggtc	900
aattgaccgc attgttactg agatcaacca gagccagaaa tgcacgtcag ccggatgaca	960
tcgagtatac atccctgacc actgctgggc tgttgtatgc atatgccggt ggttcgtctg	1020
cagacctggc tcaacaattc tacgttgggg acaacaagta tgtgccagaa actggagatg	1080

ES 2 741 138 T3

gaggattaac caccaatgca cgcacacaag ggcgagatgt ggtcagatgg cttagttggt 1140
ttgaagatca aaacagaaaa cctaccccag acatgctcat gtatgctaag agagctgtca 1200
gtgctttaca aggattgagg gagaagacga ttggcaagta cgccaagtca gaggttgaca 1260
aatgacaact cactcacat atgtattact acctttgctt catatgaaaa aaactaacag 1320
cgatcatgga tcagctatca aaggtcaagg aattccttaa gacttacgcg cagttggatc 1380
aagcagtaca agagatggat gacattgagt ctacagagaga ggaaaagact aattttgatt 1440
tgtttcagga agaaggattg gagattaagg agaagccttc ctattatcgg gcagatgaag 1500
aagagattga ttcagatgaa gacagcgtgg atgatgcaca agacttaggg atacgtacat 1560
caacaagtcc catcgagggg tatgtggatg aggagcagga tgattatgag gatgaggaag 1620
tgaacgtggt gtttacatcg gactggaaac agcctgagct ggaatccgac ggggatggga 1680
aaactctccg attgacgata ccagatggat tgactgggga gcagaagtcg caatggcttg 1740
ccacgattaa ggcagttggt cagagtgcta aatattggaa catctcagaa tgttcatttg 1800
agagttatga gcaaggggtt ttgattagag agagacaaat gactcctgat gtctacaaag 1860
tcactcctgt tttaaatgct ccaccggttc aaatgacagc taatcaagat gtttggtctc 1920
tcagcagcac tccatttaca tttttgccca agaaacaagg tgtgactcca ttgaccatgt 1980
ccttagaaga actcttcaac acccgaggtg aattcatatc tctgggagga aacgggaaaa 2040
tgagtcaccg ggaggccatc attctaggtt tgagacacaa gaagctctat aatcaagcca 2100
gactaaagta taacttagct tgaatatgaa aaaaactaac agatatcaa agatatctct 2160
aactcagtc attgtgttca gttcaatcat gagctctctc aagaaaattt tgggtattaa 2220
agggaaagg aagaaatcta agaaattagg tatggctccc ccaccctatg aagaagagac 2280
tccaatggaa tattctcaa gtgcacctta tgataagtca ttgtttgag tcgaagatat 2340
ggatttccat gatcaacgtc aactccgata tgagaaattt cacttctcat tgaagatgac 2400
tgtgagatca aacaaacat ttcgaaatta tgatgacggt gcagcagcgg tgtccaattg 2460
ggatcatatg tacatcggca tggcaggaaa acgtcctttt tataagatat tagcattcat 2520
gggttctact ctattgaagg ctacaccagc tgtcttggtt gaccaaggac agccagaata 2580
tcatgctcac tgtgaggac gagcttactt gccgcatcgg ttagggccga cccctccgat 2640
gttgaatgtc octgaacatt ttcgccgtcc atttaacatc ggattattca gagggacaat 2700
cgacataacc ctggtacttt tcgatgatga atctgtagat tctgccccgg tcatatggga 2760
tcattttaat gcatccagat tgagcagctt cagagaaaag gctttgttgt ttggtttgat 2820
tctagaaaag aaagccactg ggaattgggt attggactct attagtcatt tcaagtaatt 2880
atcacaagtg ttgaggtgat ggcagacta tgaaaaaac taacagggtt caaacactct 2940
tgatcgaggt acccagttat atttgttaca acaatgttga gacttttctt cttttgtttc 3000

ES 2 741 138 T3

ttggccttag gagcccactc caaatttact atagtattcc ctcatcatca aaaagggaaat 3060
 tggagaatg tgccttccac atatcattat tgcccttcta gttctgacca gaattggcat 3120
 aatgatttga ctggagttag tcttcatgtg aaaattccca aaagtcacaa agctatacaa 3180
 gcagatggct ggatgtgcca cgctgctaaa tgggtgacta cttgtgactt cagatggtag 3240
 ggacccaaat acatcacgca ttccatacac tctatgtcac ccaccctaga acagtgcaag 3300
 accagtattg agcagacaaa gcaaggagtt tggattaatc caggctttcc ccctcaaagc 3360
 tgcggatatg ctacagtgac ggatgcagag gtggttgttg tacaagcaac acctcatcat 3420
 gtgttgggtg atgagtacac aggagaatgg attgactcac aattggtggg gggcaaatgt 3480
 tccaaggagg tttgtcaaac ggttcacaac tgcaccgtgt ggcatgctga ttacaagatt 3540
 acagggctgt gcgagtcaaa tctggcatca gtggatatca ctttcttctc tgaggatgg 3600
 caaaagacgt ctttgggaaa accgaacact ggattcagga gtaattactt tgcttacgaa 3660
 agtggagaga aggcattgccc tatgcagtac tgcacacaat ggggatccg actaccttct 3720
 ggagtatgg ttgaattagt ggacaaagat ctcttccagg cggcaaaatt gcctgaatgt 3780
 cctagaggat ccagtatctc agctccttct cagacttctg tggatgtag tttgatataa 3840
 gacgtagaga ggatcttaga ttactctcta tgccaggaga cgtggagtaa gatacgagcc 3900
 aagcttctg tatctccagt agatctgagt tatctcgccc caaaaaatcc agggagcgg 3960
 ccggccttca ctatcattaa tggcactttg aaatatttcg aaacaagata catcagagtt 4020
 gacataagta atcccatcat ccctcacatg gtgggaacaa tgagtggaac cacgactgag 4080
 cgtgaattgt ggaatgattg gtatccatat gaagacgtag agattggtcc aaatgggggtg 4140
 ttgaaaactc ccactggttt caagtttccg ctgtacatga ttgggcacgg aatggtggat 4200
 tccgatctcc acaaatcctc ccaggctcaa gtcttcgaac atccacacgc aaaggacgct 4260
 gcatcacagc ttctgatga tgagacttta ttttttgggtg acacaggact atcaaaaaac 4320
 ccagtagagt tagtagaagg ctggttcagt agctggaaga gcacattggc atcgttcttt 4380
 ctgattatag gcttgggggt tgcattaatc ttcattcattc gaattattgt tgcgattcgc 4440
 tataaataca aggggaggaa gacccaaaaa atttacaatg atgtcgagat gagtcgattg 4500
 ggaaataaat aacagatgac gcatgagggt cagatcagat ttacagcgt agtgtgatat 4560
 ttaggattat aaaggttcct tcattttaat ttgttacaga ctgtatgaaa aaaactcatc 4620
 aacagccatc atggatgta acgattttga gttgcatgag gactttgcat tgtctgaaga 4680
 tgactttgct acttcagaat ttctcaatcc ggaagaccaa atgacatacc tgaatcatgc 4740
 cgattataat ttgaattctc ccttaatcag cgatgatatt gatttcctga tcaagaaata 4800
 taatcatgag caaattccga aaatgtggga tgtaaagaat tgggaggag tgtagagat 4860

ES 2 741 138 T3

gttgacagcc tggcaagcca gtccaatfff atctagcact atgcataagt ggggtgggaaa 4920
 gtggctcatg tctgatgatc atgacgcaag ccaaggcttc agttttcttc atgaagtgga 4980
 caaagaagct gatctgacgt ttgaggtggt ggagacattc attagaggat ggggaggtcg 5040
 agaattgcag tacaagagga aagacacatt tccggactcc tttagagttg cagcctcatt 5100
 gtgtcaaaaa ttccttgatt tgcacaaact cactctgata atgaattcag tctctgaagt 5160
 cgaacttacc aacctagcaa agaattttaa aggaaaaaac aggaaagcaa aaagcggaaa 5220
 tctgataacc agattgaggg tcccagttt aggtcctgct tttgtgactc agggatgggt 5280
 gtacatgaag aagttggaaa tgattatgga tcggaatfff ttgttgatgt tgaaagacgt 5340
 tatcatcggg aggatgcaga cgatcctgtc catgatctca agagatgata atctcttctc 5400
 cgagtctgat atctttactg tattaagat ataccggata ggggataaga tattagaaag 5460
 gcaagggaca aagggttacg acttgatcaa aatgattgag cctatftgta acttaaagat 5520
 gatgaatctg gcacgtaaat atcgtcctct catccctaca tttcctcatt ttgaaaaaca 5580
 tattgctgac tctgttaagg aaggatcgaa aatagacaaa gggattgagt ttatatatga 5640
 tcacattatg tcaatccctg gtgtggactt gacctagtt atttacggat catttcggca 5700
 ctggggtcac cttttatca actactatga gggcttagag aagctacaca agcaggttac 5760
 aatgcccag actattgaca gagaatatgc agaatgtctt gctagtgatc tggcaagaat 5820
 cgttcttcag caacaattca atgaacataa gaaatggtt gttgatgtag ataaagtccc 5880
 acaatcccat cttttcaaaa gccatatgaa agagaatact tggcctactg cagcccagat 5940
 tcaggattac ggcgatcgtt ggcacagct cccactcatc aaatgcttcg aaatcccaga 6000
 tttgttagat ccatcgatca tctactcaga caaaagtcac tccatgaacc ggtctgaagt 6060
 actacgacat gtaagactta cacctcatgt gccattcca agcaggaaaag tattgcagac 6120
 aatgttgag actaaggcaa cagactggaa agagtfttta aagaaaattg acgaagaggg 6180
 gttagaggat gatgatcttg tcataggact caaagggaaa gagagagaat taaaaattgc 6240
 gggaaagattc ttttcttga tgtcctggaa gctcagagag tattttgtca tctactgagta 6300
 tttgattaag acgcactttg tcccgatgtt taaagggttg accatggcgg atgacttgac 6360
 agcggtgata aagaagatga tggacacatc ttcaggacaa ggcttagata attatgaatc 6420
 catttgata gccaacata ttgactatga gaagtggaa aatcatcaaa gaaaagagtc 6480
 gaacgggccc gtgttcaagg tgatgggtca attcttggga tatccacgtc tgattgagag 6540
 aactcatgaa tttttgaga agagtctgat atattacaat ggacgaccag atctgatgag 6600
 ggttcgagga aattctctag tcaacgcctc atctftaaat gtctgctggg agggctcaagc 6660
 tgggggatta gaaggactgc gacagaaggg atggagtatt ctaaatttgc ttgtcattca 6720
 gagagaagca aaaataagga acaccgccgt gaaagtgcta gctcaaggtg acaatcaggt 6780

ES 2 741 138 T3

gatatgtact cagtataaaa cgaagaaatc ccggaatgat attgagctta aggcagctct 6840
aacacagatg gtatctaata atgagatgat tatgtctgcg attaaatcag gcaccgagaa 6900
actgggtcctt ttgattaatg atgatgagac aatgcaatct gctgattacc tcaattacgg 6960
gaaggttccc attttcagag gagtaatcag aggccttgag acaaaaagat ggtcacgcgt 7020
gacctgtgtg acaaatgatc agattccaac gtgtgcgaac attatgagct ctgtgtcaac 7080
taatgcatta actgtagccc attttgccga gaatccagtc aatgccatca ttcagtataa 7140
ctactttgga acatttgcaa ggctactgct gatgatgcat gaccccgcctc tgaggatctc 7200
tctgtatgaa gtccaatcaa aaattccagg acttcacagt ttgacattta aatattctat 7260
gttgtatctg gatccttcga taggaggagt ctccggaatg tcaactctcga gattcctcat 7320
aagatcattt ccagatccag tgacagaaag tttggcgctt tggaaattta tccactctca 7380
tgcaagaagc gattcattaa aggagatatg tgcagttttt ggaaatcctg aaattgcaag 7440
atctcggcta actcatgtcg ataaattggg ggaagaccca acctcattga acatagctat 7500
gggaatgagt cctgctaatac tattaagac agaggtaaaa aatgtctac tggaatcaag 7560
gcagagcatc aagaaccaga ttgtaagaga tgctactatt tacctacacc atgaggaaga 7620
caaacttcgt agtttcttat ggtccataac accactgttc cctcggttct tgagtgaatt 7680
caaatctggg acattcatcg gagtagcaga tggcctgatc agcttatttc agaactctag 7740
gactattcga aattctttta aaaagcgtta tcacagggaa cttgatgatt taataatcaa 7800
gagcgaagtt tcctcactta tgcatttggg taagctacat ttgagggcag gctcagttcg 7860
tatgtggact tgctcttcta ctcaggctga tcttctccga ttccggctcat ggggaagatc 7920
tgttatagga accacagtcc ctcatccctt agagatgtta ggacaacatt ttaaaaagga 7980
gactccttgc agtgcttgca acatatccgg attagactat gtatctgtcc actgtccgaa 8040
tgggattcat gacgtttttg aatcacgtgg tccactccct gcatatttgg gttctaaaac 8100
atccgaatca acttcgatct tgcagccgtg ggagagagag agtaaagtac cgttgattaa 8160
gcgtgccaca aggcttcgtg atgcaatttc atggtttgtg tctcccgact ctaacttggc 8220
ctcaactatc ctaagaaca taaatgcatt aacaggagaa gaatggtcaa agaagcagca 8280
tgattttaa aggacgggat cggcgttaca caggttctcc acatccagga tgagtcatgg 8340
tggttttgct tctcagagta cggctgcctt gactagattg atggcaacta ctgacactat 8400
gagagatctg ggagaacaga actatgattt cctgtttcag gcgacattat tgtatgctca 8460
aataaccaca actgtagtca ggaatggatc atttcatagc tgcacggacc attaccatat 8520
aacctgcaaa tcttgtctga gggccattga tgagattacc ttggattcag cgatggaata 8580
tagccctcca gatgtatcat cagttttaca atcttggagg aatggagaag gctcttgggg 8640

ES 2 741 138 T3

acatgaagtg aaacaaatat acccagttga aggtgactgg aggggactat ctctgttga 8700
 acaatcttat caagtcggac gctgtatcgg gtttctgttc ggtgatctgg cgtatagaaa 8760
 atcatcccat gcagatgata gctccatggt tccgttatct atacaaaaca aagtcagagg 8820
 aagaggcttt ttaaaagggc ttatggatgg gttaatgaga gccagttggt gccaggtgat 8880
 ccatcgtcga agcttagccc atctgaagag accggctaata gcagtctatg gagggctgat 8940
 ttatttgata gacaaattga gtgcatctgc cccttttctt tcaactgacga gacatggacc 9000
 ttttaagggaa gaattagaaa ctgttccaca taagataccg acttcttctc ctacgagcaa 9060
 ccgagatatg ggggtgatag ttcgtaatta ttttaaatat cagtgcagac tggtagaaaa 9120
 aggtcggtag aagacacatt atcctcaatt gtggcttttc tcagatgtgc tgtccattga 9180
 tttcttagga cccctgtcta tatcttcaac tctattgggt attctgtata aacagacggt 9240
 atcttctcga gacaaaaatg agttgagaga actcgtctaac ttgtcttcat tgttgagatc 9300
 aggagaagga tgggaagata tccatgtcaa attcttctct aaggacactt tactctgccc 9360
 tgaagagatc cgacatgcgt gcaaatttgg gattgctaag gaatccgctg ttttaagcta 9420
 ttatcctcct tgggtctcaag agtcttatgg aggcataacc tcgatccccg tatatttttc 9480
 gaccaggaag tatcccaaaa ttttagatgt ccctcctcgg gttcaaaacc cattggtctc 9540
 gggctctacga ttggggcaac tcctactcgg agcacattat aagattagga gcattgtaaa 9600
 gaacaagaac cttcgttata gagatttctt tagttgtggg gatggatctg ggggatgac 9660
 cgcggcacta ttgagagaaa acagacaaag taggggaatc ttcaacagcc tgttagagtt 9720
 agccggatct cttatgagag gagcatctcc agagcctcca agtgactcgg agacgctcgg 9780
 gcaagaacga tctaggtgtg tgaatggaag cacatggtgg gagtactcat ctgacctaa 9840
 ccaaaaagag acatgggatt acttcttaag attgaagaga ggcctgggtt tgacctgga 9900
 cttaatcacc atggacatgg aggtcagaga ccctaataca agtttgatga tagaaaagaa 9960
 cctcaaagtt tatctgcata agatattaga accaactggt gtcttaatat ataaaacata 10020
 cgggacccat attgcgacac aaacagataa tatcctgacg ataatcggtc ctttctttga 10080
 gacggttgac ctagtccagt ccgaatacag cagctcacia acgtccgagg tctattttgt 10140
 aggacgaggc ttgcgctctc atgttgacga accctgggtg gactggccat ccttaatgga 10200
 caattggaga tccatthtatg cttttcatga tctactaca gaatttatca gagcaaaaaa 10260
 agtctgtgaa attgacagtc ttataggcat tccggtcaa ttcattccag acccatttgt 10320
 aatctcgag accatgctac agatagttgg tgttccaaca ggagtttcgc atgccgcagc 10380
 tctattatca tcacaatatc caaatcaatt ggtcacaacg tcaatatttt atatgacact 10440
 cgtgtcttat tataatgtaa accatattcg aagaagcccc aagcctttct ctctccgctc 10500
 tgatggagtc tcacagaaca ttggttcagc catagtogga ctaagttttt gggtagttt 10560

ES 2 741 138 T3

gatggagaat gatctcggat tatacaaaca ggctctaggt gcaataaaga cgtcattccc 10620
tattagatgg tcctctgtcc agaccaagga tgggtttaca caagaatgga gaactaaagg 10680
aaacggaatt cctaaagatt gtcgtctctc agactctttg gctcagatag gaaactggat 10740
cagagcgatg gaattggta ggaacaaaac gaggcaatca ggattttctg aaaccctatt 10800
tgatcaattc tgcggacttg cagaccatca cctcaaattg cggaagttgg gaaacagaac 10860
aggaattatt gattggctaa ataatagaat ttcatccatt gacaaatcca tcttgggtgac 10920
caaaagtgat ctgcatgacg agaactcatg gagggagtga agatgtattc ttccacctct 10980
cattgggtga taccatata tgaaaaaac tataagtact ttaaactctc tttgtttttt 11040
aatgtatatc tggttttggt gtttccgt 11068

<210> 2
<211> 422
<212> PRT
5 <213> Desconocida
<220>
<223> *Virus Maraba*
<400> 2

Met	Ser	Val	Thr	Val	Lys	Arg	Val	Ile	Asp	Asp	Ser	Leu	Ile	Thr	Pro
1				5					10					15	
Lys	Leu	Pro	Ala	Asn	Glu	Asp	Pro	Val	Glu	Tyr	Pro	Ala	Asp	Tyr	Phe
			20					25					30		
Lys	Lys	Ser	Arg	Asp	Ile	Pro	Val	Tyr	Ile	Asn	Thr	Thr	Lys	Ser	Leu
		35					40					45			
Ser	Asp	Leu	Arg	Gly	Tyr	Val	Tyr	Gln	Gly	Leu	Lys	Ser	Gly	Asn	Ile
	50					55					60				
Ser	Ile	Ile	His	Val	Asn	Ser	Tyr	Leu	Tyr	Ala	Ala	Leu	Lys	Glu	Ile
65					70					75					80
Arg	Gly	Lys	Leu	Asp	Arg	Asp	Trp	Ile	Thr	Phe	Gly	Ile	Gln	Ile	Gly
				85					90					95	
Lys	Thr	Gly	Asp	Ser	Val	Gly	Ile	Phe	Asp	Leu	Leu	Thr	Leu	Lys	Pro
			100					105					110		
Leu	Asp	Gly	Val	Leu	Pro	Asp	Gly	Val	Ser	Asp	Ala	Thr	Arg	Thr	Ser
		115					120					125			
Ser	Asp	Asp	Ala	Trp	Leu	Pro	Leu	Tyr	Leu	Leu	Gly	Leu	Tyr	Arg	Val

ES 2 741 138 T3

130						135						140			
Gly	Arg	Thr	Gln	Met	Pro	Glu	Tyr	Arg	Lys	Lys	Leu	Met	Asp	Gly	Leu
145					150					155					160
Ile	Asn	Gln	Cys	Lys	Met	Ile	Asn	Glu	Gln	Phe	Glu	Pro	Leu	Leu	Pro
				165					170					175	
Glu	Gly	Arg	Asp	Val	Phe	Asp	Val	Trp	Gly	Asn	Asp	Ser	Asn	Tyr	Thr
			180					185					190		
Lys	Ile	Val	Ala	Ala	Val	Asp	Met	Phe	Phe	His	Met	Phe	Lys	Lys	His
		195					200					205			
Glu	Lys	Ala	Ser	Phe	Arg	Tyr	Gly	Thr	Ile	Val	Ser	Arg	Phe	Lys	Asp
	210					215					220				
Cys	Ala	Ala	Leu	Ala	Thr	Phe	Gly	His	Leu	Cys	Lys	Ile	Thr	Gly	Met
225					230					235					240
Ser	Thr	Glu	Asp	Val	Thr	Thr	Trp	Ile	Leu	Asn	Arg	Glu	Val	Ala	Asp
				245					250					255	
Glu	Met	Val	Gln	Met	Met	Tyr	Pro	Gly	Gln	Glu	Ile	Asp	Lys	Ala	Asp
			260					265					270		
Ser	Tyr	Met	Pro	Tyr	Leu	Ile	Asp	Leu	Gly	Leu	Ser	Ser	Lys	Ser	Pro
		275					280					285			
Tyr	Pro	Ser	Val	Lys	Asn	Pro	Ala	Phe	His	Phe	Trp	Gly	Gln	Leu	Thr
	290					295					300				
Ala	Leu	Leu	Leu	Arg	Ser	Thr	Arg	Ala	Arg	Asn	Ala	Arg	Gln	Pro	Asp
305					310					315					320
Asp	Ile	Glu	Tyr	Thr	Ser	Leu	Thr	Thr	Ala	Gly	Leu	Leu	Tyr	Ala	Tyr
				325					330					335	
Ala	Val	Gly	Ser	Ser	Ala	Asp	Leu	Ala	Gln	Gln	Phe	Tyr	Val	Gly	Asp
			340					345					350		
Asn	Lys	Tyr	Val	Pro	Glu	Thr	Gly	Asp	Gly	Gly	Leu	Thr	Thr	Asn	Ala
		355					360					365			
Pro	Pro	Gln	Gly	Arg	Asp	Val	Val	Glu	Trp	Leu	Ser	Trp	Phe	Glu	Asp
	370					375					380				

ES 2 741 138 T3

Gln Asn Arg Lys Pro Thr Pro Asp Met Leu Met Tyr Ala Lys Arg Ala
385 390 395 400

Val Ser Ala Leu Gln Gly Leu Arg Glu Lys Thr Ile Gly Lys Tyr Ala
405 410 415

Lys Ser Glu Phe Asp Lys
420

<210> 3

<211> 265

<212> PRT

<213> Desconocida

5

<220>

<223> *Virus Maraba*

<400> 3

Met Asp Gln Leu Ser Lys Val Lys Glu Phe Leu Lys Thr Tyr Ala Gln
1 5 10 15

Leu Asp Gln Ala Val Gln Glu Met Asp Asp Ile Glu Ser Gln Arg Glu
20 25 30

Glu Lys Thr Asn Phe Asp Leu Phe Gln Glu Glu Gly Leu Glu Ile Lys
35 40 45

Glu Lys Pro Ser Tyr Tyr Arg Ala Asp Glu Glu Glu Ile Asp Ser Asp
50 55 60

Glu Asp Ser Val Asp Asp Ala Gln Asp Leu Gly Ile Arg Thr Ser Thr
65 70 75 80

Ser Pro Ile Glu Gly Tyr Val Asp Glu Glu Gln Asp Asp Tyr Glu Asp
85 90 95

Glu Glu Val Asn Val Val Phe Thr Ser Asp Trp Lys Gln Pro Glu Leu
100 105 110

Glu Ser Asp Gly Asp Gly Lys Thr Leu Arg Leu Thr Ile Pro Asp Gly
115 120 125

Leu Thr Gly Glu Gln Lys Ser Gln Trp Leu Ala Thr Ile Lys Ala Val
130 135 140

Val Gln Ser Ala Lys Tyr Trp Asn Ile Ser Glu Cys Ser Phe Glu Ser
145 150 155 160

Tyr Glu Gln Gly Val Leu Ile Arg Glu Arg Gln Met Thr Pro Asp Val

ES 2 741 138 T3

				165					170					175		
Tyr	Lys	Val	Thr	Pro	Val	Leu	Asn	Ala	Pro	Pro	Val	Gln	Met	Thr	Ala	
			180					185					190			
Asn	Gln	Asp	Val	Trp	Ser	Leu	Ser	Ser	Thr	Pro	Phe	Thr	Phe	Leu	Pro	
		195					200					205				
Lys	Lys	Gln	Gly	Val	Thr	Pro	Leu	Thr	Met	Ser	Leu	Glu	Glu	Leu	Phe	
	210					215					220					
Asn	Thr	Arg	Gly	Glu	Phe	Ile	Ser	Leu	Gly	Gly	Asn	Gly	Lys	Met	Ser	
225					230					235					240	
His	Arg	Glu	Ala	Ile	Ile	Leu	Gly	Leu	Arg	His	Lys	Lys	Leu	Tyr	Asn	
				245					250					255		
Gln	Ala	Arg	Leu	Lys	Tyr	Asn	Leu	Ala								
			260					265								

- <210> 4
- <211> 229
- <212> PRT
- <213> Desconocida
- <220>
- <223> *Virus Maraba*
- <400> 4

5

ES 2 741 138 T3

Met Ser Ser Leu Lys Lys Ile Leu Gly Ile Lys Gly Lys Gly Lys Lys
 1 5 10 15

Ser Lys Lys Leu Gly Met Ala Pro Pro Pro Tyr Glu Glu Glu Thr Pro
 20 25 30

Met Glu Tyr Ser Pro Ser Ala Pro Tyr Asp Lys Ser Leu Phe Gly Val
 35 40 45

Glu Asp Met Asp Phe His Asp Gln Arg Gln Leu Arg Tyr Glu Lys Phe
 50 55 60

His Phe Ser Leu Lys Met Thr Val Arg Ser Asn Lys Pro Phe Arg Asn
 65 70 75 80

Tyr Asp Asp Val Ala Ala Ala Val Ser Asn Trp Asp His Met Tyr Ile
 85 90 95

Gly Met Ala Gly Lys Arg Pro Phe Tyr Lys Ile Leu Ala Phe Met Gly
 100 105 110

Ser Thr Leu Leu Lys Ala Thr Pro Ala Val Leu Ala Asp Gln Gly Gln
 115 120 125

Pro Glu Tyr His Ala His Cys Glu Gly Arg Ala Tyr Leu Pro His Arg
 130 135 140

Leu Gly Pro Thr Pro Pro Met Leu Asn Val Pro Glu His Phe Arg Arg
 145 150 155 160

Pro Phe Asn Ile Gly Leu Phe Arg Gly Thr Ile Asp Ile Thr Leu Val
 165 170 175

Leu Phe Asp Asp Glu Ser Val Asp Ser Ala Pro Val Ile Trp Asp His
 180 185 190

Phe Asn Ala Ser Arg Leu Ser Ser Phe Arg Glu Lys Ala Leu Leu Phe
 195 200 205

Gly Leu Ile Leu Glu Lys Lys Ala Thr Gly Asn Trp Val Leu Asp Ser
 210 215 220

Ile Ser His Phe Lys
 225

<210> 5
 <211> 512
 <212> PRT

ES 2 741 138 T3

<213> Desconocida

<220>

<223> *Virus Maraba*

<400> 5

Met Leu Arg Leu Phe Leu Phe Cys Phe Leu Ala Leu Gly Ala His Ser
1 5 10 15

Lys Phe Thr Ile Val Phe Pro His His Gln Lys Gly Asn Trp Lys Asn
20 25 30

Val Pro Ser Thr Tyr His Tyr Cys Pro Ser Ser Ser Asp Gln Asn Trp
35 40 45

His Asn Asp Leu Thr Gly Val Ser Leu His Val Lys Ile Pro Lys Ser
50 55 60

His Lys Ala Ile Gln Ala Asp Gly Trp Met Cys His Ala Ala Lys Trp
65 70 75 80

5

ES 2 741 138 T3

Val Thr Thr Cys Asp Phe Arg Trp Tyr Gly Pro Lys Tyr Ile Thr His
85 90 95

Ser Ile His Ser Met Ser Pro Thr Leu Glu Gln Cys Lys Thr Ser Ile
100 105 110

Glu Gln Thr Lys Gln Gly Val Trp Ile Asn Pro Gly Phe Pro Pro Gln
115 120 125

Ser Cys Gly Tyr Ala Thr Val Thr Asp Ala Glu Val Val Val Val Gln
130 135 140

Ala Thr Pro His His Val Leu Val Asp Glu Tyr Thr Gly Glu Trp Ile
145 150 155 160

Asp Ser Gln Leu Val Gly Gly Lys Cys Ser Lys Glu Val Cys Gln Thr
165 170 175

Val His Asn Ser Thr Val Trp His Ala Asp Tyr Lys Ile Thr Gly Leu
180 185 190

Cys Glu Ser Asn Leu Ala Ser Val Asp Ile Thr Phe Phe Ser Glu Asp
195 200 205

Gly Gln Lys Thr Ser Leu Gly Lys Pro Asn Thr Gly Phe Arg Ser Asn
210 215 220

Tyr Phe Ala Tyr Glu Ser Gly Glu Lys Ala Cys Arg Met Gln Tyr Cys
225 230 235 240

Thr Gln Trp Gly Ile Arg Leu Pro Ser Gly Val Trp Phe Glu Leu Val
245 250 255

Asp Lys Asp Leu Phe Gln Ala Ala Lys Leu Pro Glu Cys Pro Arg Gly
260 265 270

Ser Ser Ile Ser Ala Pro Ser Gln Thr Ser Val Asp Val Ser Leu Ile
275 280 285

Gln Asp Val Glu Arg Ile Leu Asp Tyr Ser Leu Cys Gln Glu Thr Trp
290 295 300

Ser Lys Ile Arg Ala Lys Leu Pro Val Ser Pro Val Asp Leu Ser Tyr
305 310 315 320

Leu Ala Pro Lys Asn Pro Gly Ser Gly Pro Ala Phe Thr Ile Ile Asn
325 330 335

ES 2 741 138 T3

Gly Thr Leu Lys Tyr Phe Glu Thr Arg Tyr Ile Arg Val Asp Ile Ser
 340 345 350

Asn Pro Ile Ile Pro His Met Val Gly Thr Met Ser Gly Thr Thr Thr
 355 360 365

Glu Arg Glu Leu Trp Asn Asp Trp Tyr Pro Tyr Glu Asp Val Glu Ile
 370 375 380

Gly Pro Asn Gly Val Leu Lys Thr Pro Thr Gly Phe Lys Phe Pro Leu
 385 390 395 400

Tyr Met Ile Gly His Gly Met Leu Asp Ser Asp Leu His Lys Ser Ser
 405 410 415

Gln Ala Gln Val Phe Glu His Pro His Ala Lys Asp Ala Ala Ser Gln
 420 425 430

Leu Pro Asp Asp Glu Thr Leu Phe Phe Gly Asp Thr Gly Leu Ser Lys
 435 440 445

Asn Pro Val Glu Leu Val Glu Gly Trp Phe Ser Ser Trp Lys Ser Thr
 450 455 460

Leu Ala Ser Phe Phe Leu Ile Ile Gly Leu Gly Val Ala Leu Ile Phe
 465 470 475 480

Ile Ile Arg Ile Ile Val Ala Ile Arg Tyr Lys Tyr Lys Gly Arg Lys
 485 490 495

Thr Gln Lys Ile Tyr Asn Asp Val Glu Met Ser Arg Leu Gly Asn Lys
 500 505 510

<210> 6
 <211> 2109
 <212> PRT
 <213> Desconocida

5

<220>
 <223> *Virus Maraba*

<400> 6

Met Asp Val Asn Asp Phe Glu Leu His Glu Asp Phe Ala Leu Ser Glu
 1 5 10 15

Asp Asp Phe Val Thr Ser Glu Phe Leu Asn Pro Glu Asp Gln Met Thr
 20 25 30

ES 2 741 138 T3

Tyr Leu Asn His Ala Asp Tyr Asn Leu Asn Ser Pro Leu Ile Ser Asp
 35 40 45

Asp Ile Asp Phe Leu Ile Lys Lys Tyr Asn His Glu Gln Ile Pro Lys
 50 55 60

Met Trp Asp Val Lys Asn Trp Glu Gly Val Leu Glu Met Leu Thr Ala
 65 70 75 80

Trp Gln Ala Ser Pro Ile Leu Ser Ser Thr Met His Lys Trp Val Gly
 85 90 95

Lys Trp Leu Met Ser Asp Asp His Asp Ala Ser Gln Gly Phe Ser Phe
 100 105 110

Leu His Glu Val Asp Lys Glu Ala Asp Leu Thr Phe Glu Val Val Glu
 115 120 125

Thr Phe Ile Arg Gly Trp Gly Gly Arg Glu Leu Gln Tyr Lys Arg Lys
 130 135 140

Asp Thr Phe Pro Asp Ser Phe Arg Val Ala Ala Ser Leu Cys Gln Lys
 145 150 155 160

Phe Leu Asp Leu His Lys Leu Thr Leu Ile Met Asn Ser Val Ser Glu
 165 170 175

Val Glu Leu Thr Asn Leu Ala Lys Asn Phe Lys Gly Lys Asn Arg Lys
 180 185 190

Ala Lys Ser Gly Asn Leu Ile Thr Arg Leu Arg Val Pro Ser Leu Gly
 195 200 205

Pro Ala Phe Val Thr Gln Gly Trp Val Tyr Met Lys Lys Leu Glu Met
 210 215 220

Ile Met Asp Arg Asn Phe Leu Leu Met Leu Lys Asp Val Ile Ile Gly
 225 230 235 240

Arg Met Gln Thr Ile Leu Ser Met Ile Ser Arg Asp Asp Asn Leu Phe
 245 250 255

Ser Glu Ser Asp Ile Phe Thr Val Leu Lys Ile Tyr Arg Ile Gly Asp
 260 265 270

Lys Ile Leu Glu Arg Gln Gly Thr Lys Gly Tyr Asp Leu Ile Lys Met
 275 280 285

ES 2 741 138 T3

Ile Glu Pro Ile Cys Asn Leu Lys Met Met Asn Leu Ala Arg Lys Tyr
 290 295 300

Arg Pro Leu Ile Pro Thr Phe Pro His Phe Glu Lys His Ile Ala Asp
 305 310 315 320

Ser Val Lys Glu Gly Ser Lys Ile Asp Lys Gly Ile Glu Phe Ile Tyr
 325 330 335

Asp His Ile Met Ser Ile Pro Gly Val Asp Leu Thr Leu Val Ile Tyr
 340 345 350

Gly Ser Phe Arg His Trp Gly His Pro Phe Ile Asn Tyr Tyr Glu Gly
 355 360 365

Leu Glu Lys Leu His Lys Gln Val Thr Met Pro Lys Thr Ile Asp Arg
 370 375 380

Glu Tyr Ala Glu Cys Leu Ala Ser Asp Leu Ala Arg Ile Val Leu Gln
 385 390 395 400

Gln Gln Phe Asn Glu His Lys Lys Trp Phe Val Asp Val Asp Lys Val
 405 410 415

Pro Gln Ser His Pro Phe Lys Ser His Met Lys Glu Asn Thr Trp Pro
 420 425 430

Thr Ala Ala Gln Val Gln Asp Tyr Gly Asp Arg Trp His Gln Leu Pro
 435 440 445

Leu Ile Lys Cys Phe Glu Ile Pro Asp Leu Leu Asp Pro Ser Ile Ile
 450 455 460

Tyr Ser Asp Lys Ser His Ser Met Asn Arg Ser Glu Val Leu Arg His
 465 470 475 480

Val Arg Leu Thr Pro His Val Pro Ile Pro Ser Arg Lys Val Leu Gln
 485 490 495

Thr Met Leu Glu Thr Lys Ala Thr Asp Trp Lys Glu Phe Leu Lys Lys
 500 505 510

Ile Asp Glu Glu Gly Leu Glu Asp Asp Asp Leu Val Ile Gly Leu Lys
 515 520 525

Gly Lys Glu Arg Glu Leu Lys Ile Ala Gly Arg Phe Phe Ser Leu Met

ES 2 741 138 T3

530																			
Ser	Trp	Lys	Leu	Arg	Glu	Tyr	Phe	Val	Ile	Thr	Glu	Tyr	Leu	Ile	Lys				
545					550					555					560				
Thr	His	Phe	Val	Pro	Met	Phe	Lys	Gly	Leu	Thr	Met	Ala	Asp	Asp	Leu				
				565					570					575					
Thr	Ala	Val	Ile	Lys	Lys	Met	Met	Asp	Thr	Ser	Ser	Gly	Gln	Gly	Leu				
			580					585					590						
Asp	Asn	Tyr	Glu	Ser	Ile	Cys	Ile	Ala	Asn	His	Ile	Asp	Tyr	Glu	Lys				
		595					600					605							
Trp	Asn	Asn	His	Gln	Arg	Lys	Glu	Ser	Asn	Gly	Pro	Val	Phe	Lys	Val				
	610					615					620								
Met	Gly	Gln	Phe	Leu	Gly	Tyr	Pro	Arg	Leu	Ile	Glu	Arg	Thr	His	Glu				
625					630					635					640				
Phe	Phe	Glu	Lys	Ser	Leu	Ile	Tyr	Tyr	Asn	Gly	Arg	Pro	Asp	Leu	Met				
				645					650					655					
Arg	Val	Arg	Gly	Asn	Ser	Leu	Val	Asn	Ala	Ser	Ser	Leu	Asn	Val	Cys				
			660					665					670						
Trp	Glu	Gly	Gln	Ala	Gly	Gly	Leu	Glu	Gly	Leu	Arg	Gln	Lys	Gly	Trp				
		675					680					685							
Ser	Ile	Leu	Asn	Leu	Leu	Val	Ile	Gln	Arg	Glu	Ala	Lys	Ile	Arg	Asn				
	690					695					700								
Thr	Ala	Val	Lys	Val	Leu	Ala	Gln	Gly	Asp	Asn	Gln	Val	Ile	Cys	Thr				
705					710					715					720				
Gln	Tyr	Lys	Thr	Lys	Lys	Ser	Arg	Asn	Asp	Ile	Glu	Leu	Lys	Ala	Ala				
				725					730					735					
Leu	Thr	Gln	Met	Val	Ser	Asn	Asn	Glu	Met	Ile	Met	Ser	Ala	Ile	Lys				
			740					745					750						
Ser	Gly	Thr	Glu	Lys	Leu	Gly	Leu	Leu	Ile	Asn	Asp	Asp	Glu	Thr	Met				
		755					760					765							
Gln	Ser	Ala	Asp	Tyr	Leu	Asn	Tyr	Gly	Lys	Val	Pro	Ile	Phe	Arg	Gly				
	770					775					780								

ES 2 741 138 T3

Val Ile Arg Gly Leu Glu Thr Lys Arg Trp Ser Arg Val Thr Cys Val
785 790 795 800

Thr Asn Asp Gln Ile Pro Thr Cys Ala Asn Ile Met Ser Ser Val Ser
805 810 815

Thr Asn Ala Leu Thr Val Ala His Phe Ala Glu Asn Pro Val Asn Ala
820 825 830

Ile Ile Gln Tyr Asn Tyr Phe Gly Thr Phe Ala Arg Leu Leu Leu Met
835 840 845

Met His Asp Pro Ala Leu Arg Ile Ser Leu Tyr Glu Val Gln Ser Lys
850 855 860

Ile Pro Gly Leu His Ser Leu Thr Phe Lys Tyr Ser Met Leu Tyr Leu
865 870 875 880

Asp Pro Ser Ile Gly Gly Val Ser Gly Met Ser Leu Ser Arg Phe Leu
885 890 895

Ile Arg Ser Phe Pro Asp Pro Val Thr Glu Ser Leu Ala Phe Trp Lys
900 905 910

Phe Ile His Ser His Ala Arg Ser Asp Ser Leu Lys Glu Ile Cys Ala
915 920 925

Val Phe Gly Asn Pro Glu Ile Ala Arg Phe Arg Leu Thr His Val Asp
930 935 940

Lys Leu Val Glu Asp Pro Thr Ser Leu Asn Ile Ala Met Gly Met Ser
945 950 955 960

Pro Ala Asn Leu Leu Lys Thr Glu Val Lys Lys Cys Leu Leu Glu Ser
965 970 975

Arg Gln Ser Ile Lys Asn Gln Ile Val Arg Asp Ala Thr Ile Tyr Leu
980 985 990

His His Glu Glu Asp Lys Leu Arg Ser Phe Leu Trp Ser Ile Thr Pro
995 1000 1005

Leu Phe Pro Arg Phe Leu Ser Glu Phe Lys Ser Gly Thr Phe Ile
1010 1015 1020

Gly Val Ala Asp Gly Leu Ile Ser Leu Phe Gln Asn Ser Arg Thr
1025 1030 1035

ES 2 741 138 T3

Ile Arg Asn Ser Phe Lys Lys Arg Tyr His Arg Glu Leu Asp Asp
1040 1045 1050

Leu Ile Ile Lys Ser Glu Val Ser Ser Leu Met His Leu Gly Lys
1055 1060 1065

Leu His Leu Arg Arg Gly Ser Val Arg Met Trp Thr Cys Ser Ser
1070 1075 1080

Thr Gln Ala Asp Leu Leu Arg Phe Arg Ser Trp Gly Arg Ser Val
1085 1090 1095

Ile Gly Thr Thr Val Pro His Pro Leu Glu Met Leu Gly Gln His
1100 1105 1110

Phe Lys Lys Glu Thr Pro Cys Ser Ala Cys Asn Ile Ser Gly Leu
1115 1120 1125

Asp Tyr Val Ser Val His Cys Pro Asn Gly Ile His Asp Val Phe
1130 1135 1140

Glu Ser Arg Gly Pro Leu Pro Ala Tyr Leu Gly Ser Lys Thr Ser
1145 1150 1155

Glu Ser Thr Ser Ile Leu Gln Pro Trp Glu Arg Glu Ser Lys Val
1160 1165 1170

Pro Leu Ile Lys Arg Ala Thr Arg Leu Arg Asp Ala Ile Ser Trp
1175 1180 1185

Phe Val Ser Pro Asp Ser Asn Leu Ala Ser Thr Ile Leu Lys Asn
1190 1195 1200

Ile Asn Ala Leu Thr Gly Glu Glu Trp Ser Lys Lys Gln His Gly
1205 1210 1215

Phe Lys Arg Thr Gly Ser Ala Leu His Arg Phe Ser Thr Ser Arg
1220 1225 1230

Met Ser His Gly Gly Phe Ala Ser Gln Ser Thr Ala Ala Leu Thr
1235 1240 1245

Arg Leu Met Ala Thr Thr Asp Thr Met Arg Asp Leu Gly Glu Gln
1250 1255 1260

Asn Tyr Asp Phe Leu Phe Gln Ala Thr Leu Leu Tyr Ala Gln Ile
1265 1270 1275

ES 2 741 138 T3

Thr Thr Thr Val Val Arg Asn Gly Ser Phe His Ser Cys Thr Asp
 1280 1285 1290

His Tyr His Ile Thr Cys Lys Ser Cys Leu Arg Ala Ile Asp Glu
 1295 1300 1305

Ile Thr Leu Asp Ser Ala Met Glu Tyr Ser Pro Pro Asp Val Ser
 1310 1315 1320

Ser Val Leu Gln Ser Trp Arg Asn Gly Glu Gly Ser Trp Gly His
 1325 1330 1335

Glu Val Lys Gln Ile Tyr Pro Val Glu Gly Asp Trp Arg Gly Leu
 1340 1345 1350

Ser Pro Val Glu Gln Ser Tyr Gln Val Gly Arg Cys Ile Gly Phe
 1355 1360 1365

Leu Phe Gly Asp Leu Ala Tyr Arg Lys Ser Ser His Ala Asp Asp
 1370 1375 1380

Ser Ser Met Phe Pro Leu Ser Ile Gln Asn Lys Val Arg Gly Arg
 1385 1390 1395

Gly Phe Leu Lys Gly Leu Met Asp Gly Leu Met Arg Ala Ser Cys
 1400 1405 1410

Cys Gln Val Ile His Arg Arg Ser Leu Ala His Leu Lys Arg Pro
 1415 1420 1425

Ala Asn Ala Val Tyr Gly Gly Leu Ile Tyr Leu Ile Asp Lys Leu
 1430 1435 1440

Ser Ala Ser Ala Pro Phe Leu Ser Leu Thr Arg His Gly Pro Leu
 1445 1450 1455

Arg Glu Glu Leu Glu Thr Val Pro His Lys Ile Pro Thr Ser Tyr
 1460 1465 1470

Pro Thr Ser Asn Arg Asp Met Gly Val Ile Val Arg Asn Tyr Phe
 1475 1480 1485

Lys Tyr Gln Cys Arg Leu Val Glu Lys Gly Arg Tyr Lys Thr His
 1490 1495 1500

Tyr Pro Gln Leu Trp Leu Phe Ser Asp Val Leu Ser Ile Asp Phe

ES 2 741 138 T3

1505						1510								1515
Leu Gly	Pro Leu	Ser Ile	Ser Ser	Ser Thr	Leu Leu	Gly Ile	Leu Tyr							
1520						1525								1530
Lys Gln	Thr Leu	Ser Ser	Arg Asp	Lys Asn	Glu Leu	Arg Glu	Leu Leu							
1535						1540								1545
Ala Asn	Leu Ser	Ser Leu	Leu Leu	Arg Ser	Gly Glu	Gly Trp	Glu Asp							
1550						1555								1560
Ile His	Val Lys	Phe Phe	Ser Ser	Lys Asp	Thr Leu	Leu Cys	Pro Glu							
1565						1570								1575
Glu Ile	Arg His	Ala Cys	Lys Lys	Phe Gly	Ile Ala	Lys Glu	Ser Ala							
1580						1585								1590
Val Leu	Ser Tyr	Tyr Pro	Pro Pro	Trp Ser	Gln Glu	Ser Tyr	Gly Gly							
1595						1600								1605
Ile Thr	Ser Ile	Pro Val	Tyr Tyr	Phe Ser	Thr Arg	Lys Tyr	Pro Lys							
1610						1615								1620
Ile Leu	Asp Val	Pro Pro	Arg Arg	Val Gln	Asn Pro	Leu Val	Ser Gly							
1625						1630								1635
Leu Arg	Leu Gly	Gln Leu	Pro Pro	Thr Gly	Ala His	Tyr Lys	Ile Arg							
1640						1645								1650
Ser Ile	Val Lys	Asn Lys	Asn Asn	Leu Arg	Tyr Arg	Asp Phe	Leu Ser							
1655						1660								1665
Cys Gly	Asp Gly	Ser Gly	Gly Gly	Met Thr	Ala Ala	Leu Leu	Arg Glu							
1670						1675								1680
Asn Arg	Gln Ser	Arg Gly	Ile Ile	Phe Asn	Ser Leu	Leu Glu	Leu Ala							
1685						1690								1695
Gly Ser	Leu Met	Arg Gly	Ala Ala	Ser Pro	Glu Pro	Pro Ser	Ala Leu							
1700						1705								1710
Glu Thr	Leu Gly	Gln Glu	Arg Arg	Ser Arg	Cys Val	Asn Gly	Ser Thr							
1715						1720								1725
Cys Trp	Glu Tyr	Ser Ser	Asp Asp	Leu Ser	Gln Lys	Glu Thr	Trp Asp							
1730						1735								1740

ES 2 741 138 T3

Tyr Phe Leu Arg Leu Lys Arg Gly Leu Gly Leu Thr Val Asp Leu
 1745 1750 1755
 Ile Thr Met Asp Met Glu Val Arg Asp Pro Asn Thr Ser Leu Met
 1760 1765 1770
 Ile Glu Lys Asn Leu Lys Val Tyr Leu His Gln Ile Leu Glu Pro
 1775 1780 1785
 Thr Gly Val Leu Ile Tyr Lys Thr Tyr Gly Thr His Ile Ala Thr
 1790 1795 1800
 Gln Thr Asp Asn Ile Leu Thr Ile Ile Gly Pro Phe Phe Glu Thr
 1805 1810 1815
 Val Asp Leu Val Gln Ser Glu Tyr Ser Ser Ser Gln Thr Ser Glu
 1820 1825 1830
 Val Tyr Phe Val Gly Arg Gly Leu Arg Ser His Val Asp Glu Pro
 1835 1840 1845
 Trp Val Asp Trp Pro Ser Leu Met Asp Asn Trp Arg Ser Ile Tyr
 1850 1855 1860
 Ala Phe His Asp Pro Thr Thr Glu Phe Ile Arg Ala Lys Lys Val
 1865 1870 1875
 Cys Glu Ile Asp Ser Leu Ile Gly Ile Pro Ala Gln Phe Ile Pro
 1880 1885 1890
 Asp Pro Phe Val Asn Leu Glu Thr Met Leu Gln Ile Val Gly Val
 1895 1900 1905
 Pro Thr Gly Val Ser His Ala Ala Ala Leu Leu Ser Ser Gln Tyr
 1910 1915 1920
 Pro Asn Gln Leu Val Thr Thr Ser Ile Phe Tyr Met Thr Leu Val
 1925 1930 1935
 Ser Tyr Tyr Asn Val Asn His Ile Arg Arg Ser Pro Lys Pro Phe
 1940 1945 1950
 Ser Pro Pro Ser Asp Gly Val Ser Gln Asn Ile Gly Ser Ala Ile
 1955 1960 1965
 Val Gly Leu Ser Phe Trp Val Ser Leu Met Glu Asn Asp Leu Gly
 1970 1975 1980

ES 2 741 138 T3

Leu Tyr Lys Gln Ala Leu Gly Ala Ile Lys Thr Ser Phe Pro Ile
 1985 1990 1995

Arg Trp Ser Ser Val Gln Thr Lys Asp Gly Phe Thr Gln Glu Trp
 2000 2005 2010

Arg Thr Lys Gly Asn Gly Ile Pro Lys Asp Cys Arg Leu Ser Asp
 2015 2020 2025

Ser Leu Ala Gln Ile Gly Asn Trp Ile Arg Ala Met Glu Leu Val
 2030 2035 2040

Arg Asn Lys Thr Arg Gln Ser Gly Phe Ser Glu Thr Leu Phe Asp
 2045 2050 2055

Gln Phe Cys Gly Leu Ala Asp His His Leu Lys Trp Arg Lys Leu
 2060 2065 2070

Gly Asn Arg Thr Gly Ile Ile Asp Trp Leu Asn Asn Arg Ile Ser
 2075 2080 2085

Ser Ile Asp Lys Ser Ile Leu Val Thr Lys Ser Asp Leu His Asp
 2090 2095 2100

Glu Asn Ser Trp Arg Glu
 2105

<210> 7
 <211> 10716
 <212> ADN
 <213> Desconocido

5

<220>
 <223> *Virus Carajas*

<400> 7
 cggccggtcg acgctgccta ttacttact gggcttttac cgtggttgaa kaacaaaact 60
 gccggaatac cgaaagaagt tgatggaggg gttggaaatg cagtgtaaaa tcatgtatcc 120
 tgactttgta ccaatcgttc cggaaggaat ggacttcttt gatgtgtggg gaaatgatag 180
 taatttcacc aaaatagtcg ccgcagtgga tatgtttttc catatgttca aaaagcatga 240
 gagagcatcc ctccagatatg gaacaattgt ctccagattc aaggattgtg ctgcattggc 300
 tacatttggc catgtatgta aagtttccgg aatgtccaca gaggagggtca ccaacttgggt 360
 gctgaatagg gaagtggcag acgaattatg ccagatgatg ttccctggac aggaaataga 420
 ccgagcggac tcatacatgc cgtatatgat agatttcggg ttgtctcaga aatcgccata 480
 ttctctgtc aaaaatccgt cttttcactt ttgggggcaa cttgcagcac tactgctcag 540

ES 2 741 138 T3

atcaaccagg gcaaaaaatg ccagacaacc tgatgacatt gaatacacat cactgactac 600
agcaggctcta cttcttgctg atgctgtagg gtcacatctgca gacatctctc aacagttcta 660
catgggagat gagaaatata tctcagaccc aagtgcgggt ggattaacct ccaatgcacc 720
tccgaaagga aggaatgtag ttgactggct cgggtggttt gaggatcaag gaggaaatat 780
cactccagat atgtacactt cgctaaaagg gctgtttgct ctttgcaagg gctgcgagat 840
aagaccattg gaaagtatgc caagggagag tttgacaagt gactccattc agatcaaatg 900
ctttactaca tgctgtatta tatataacta tgaaaaaac taacagagat catggataat 960
ctctcgaaac ttaaggagta tatggggact tacacccatc tagactctgc attgcaagat 1020
gcaaatgaat cagaagaatc tcgagatgaa aagagcaatt ttgatctttt cgatgaggaa 1080
agtaaggagg ttgcaagacc ttcttattat tctgcaattg atgaggagtc tgaccaggag 1140
gaaactgaat ccgatgatcc agatgaggag ctgaatgact caaatgcca tggggcgggtg 1200
gatggatggg acgagacgtt gaacgagaat tctcagcctg acgacaatgt ctctgttgag 1260
ttcgtctgta catggtcaac accggtgatg gaatcttcgt cagagggaaa gactttgcat 1320
ttggctatgc cagatggact gaatccagat caagtgcac agtggctgca gactgtcaag 1380
gctttgtttg agagtgcca atattggaat ctgtccgaat gcaggatgga agtgctgctt 1440
gagggagtat taatcaaaga gagacaaatg actccagatc ttcagaaggt cacaccgaag 1500
ccgaacaatc ctctccaga aagtatgcca tgcgatcctc tccctcccgc tatggacgtg 1560
tgggaggccg cgtctcaggt gtatacacta gagcccaagc gggcaaacct ggcccaatg 1620
gatgtaaagc tgaaagatct gtttcatct agggccgaat ttctctcagt cggaggatct 1680
ccccagatga gctggaaga ggccattata ttgggtctaa gatacaagaa attgtataat 1740
caagctcgc taaaatattc cctatagggt ataccata tgaaaaaac taacagaatt 1800
caaatgagt tctctcaaga aaatactcg cctgaaagc aagaaggagg aaaagtccaa 1860
aaagttggga cttcctcctc cttacgagat gccagcaaac aatgagttcg agccaaatgc 1920
tcctttagat cctgacatgt tcggggcga acatttgag attgaaagca agtctgcat 1980
gcgttatgag aaatttaagt tctctgtcaa gatcaccctt aggaccaatc gacctttgag 2040
aacttatgat gatgtgtgcc agattctatc caaatgggat gcaatgtatg tcggcatgat 2100
gggtaagcga ccgttctaca aggtattggt cttgatcgga tccagccact tgcaggctac 2160
acctgctata ctctcagatc gtggtcaacc agaatatcat atgtacttg aagatagagg 2220
attcatcgca cacaggttgg ggttgacacc gccaatgtta agtgggccgg aaagttttag 2280
aagaccttc catgtcggtc tttacagagg gacaattgac attacagtaa atctcatgga 2340
cgacgaatca acggaatcag caccacaggt ttgggatcac ttcaatacca gatatgtgaa 2400

ES 2 741 138 T3

tcatttcctt gagcatgcaa agaggttcgg attggctcctg tccaagaaac caggtggcgg 2460
 ctggatatta gatcaagcgg tctgtgcata atgcgaatat aatcatagtc tcatcagacg 2520
 attatttata cattattcta ttctctctct tagttggtgg tagctatgaa aaaaactaac 2580
 agagttcaaa actctacatc tcaactgcaa aggctatfff tcttaaaaaa accttttaat 2640
 acagagtcac cattcaaaaa tgaagatgaa aatggtcata gcaggattaa tcctttgtat 2700
 agggatttta cgggctattg ggaaaataac aatttccttc ccacaaagct tgaaaggaga 2760
 ttggaggcct gtacctaaagg gatacaatta ttgtcctaca agtgccggata aaaatctcca 2820
 tggtgatttg attgacatag gtctcagact tcgggcccct aagagcttca aagggatctc 2880
 cgcagatgga tggatgtgcc atgcggcaag atggatcacc acctgtgatt tcagatggta 2940
 tggacccaag tacatcaccc actcaattca ctctttcagg ccgagcaatg accaatgcaa 3000
 agaagcaatc cggctgacta atgaaggaa ttggattaat ccaggtttcc ctccgcaatc 3060
 ttgcggatat gcttctgtaa ccgactcaga atccgttgtc gtaaccgtga ccaagcacca 3120
 ggtcctagta gatgagtact ccggtcatg gatcgatagt caattccccg gaggaagttg 3180
 cacatcccc atttgcgata cagtgcacaa ctcgacactt tggcacgcgg accacacct 3240
 ggacagtatc tgtgaccaag aattcgtggc aatggacgca gttctgttca cagagagtgg 3300
 caaatttgaa gagttcggaa aaccgaactc cggcatcagg agcaactatt ttccttatga 3360
 gagtctgaaa gatgtatgtc agatggattt ctgcaagagg aaaggattca agctcccatc 3420
 cgggtgtctgg tttgaaatcg aggatgcaga gaaatctcac aaggcccagg ttgaattgaa 3480
 aataaaaagg tgccctcatg gagcagtaat ctgagctcct aatcagaatg cagcagatat 3540
 caatctgata atggatgtgg aacgaattct agactactcc ctttgccaag caacttggag 3600
 caaaatccaa aacaaggaag cgttgacccc catcgatata agttatcttg gtccgaaaaa 3660
 cccaggacca ggcccagcct tcaccataat aaatggaaca ctgcactact tcaatactag 3720
 atacattcga tgggatattg cagggcctgt taccaaagag attacaggat ttgtttcggg 3780
 aacatctaca tctaggggtc tgtgggatca gtgggtcccat atggagagaa ttccattgga 3840
 cccaatggct tgctgaaaac cgccagcggg taaaaatata cattgttcat ggttggatca 3900
 ggtgtgctgg atgcggacat ccacaagctg ggagaagcaa ccgtgattga acatccacat 3960
 gccaaagagg ctcagaaggt agttgatgac agtgaggtta ttttttttgg tgacaccgga 4020
 gtctccaaga atccagtgga ggtagtcgaa ggatggttta gcggatggag aagctctttg 4080
 atgagcatat ttggcataat tttgttgatt gtttgttttag tcttgattgt tcgaatcctt 4140
 atagccctta aatactgttg tgttagacac aaaaagagaa ctatttacia agaggacctt 4200
 gaaatgggtc gaattcctcg gagggcttaa ttacttataa ttacggactt taaatgtatg 4260
 aaaaaaacta taacagaagt caaaatggac ttcttaccgg ttgaacaaga ggaggactgg 4320

ES 2 741 138 T3

ggttatgcag aagatgattt ctctagctca gattatctag attttgaaga acgaatgaca 4380
 tatttaaadc aggctgatta taatctaaac tcaccattga tatctgatga catttattac 4440
 ctgagtcgaa aattccactc atatggcatc ccccccatgt ggaacctcaa agaatgggat 4500
 ggaccattgg agatgttaaa atcatgtcaa gcagaccgga ttccacatga tctgatgcac 4560
 aatgggttg gaacttggtt agaagacttt gatcacgact ctgcacaagg gatagtgttt 4620
 ttaaggaag tagacaaaga ggcctccgag acctatgatt tagtggatac ctttttgaaa 4680
 aattgggcag ggaaatccta tccttacaaa gcaaaggaga gatacttaga tcagatgaag 4740
 atcattggcc ctttgtgtca aaagttcctt gatttgcaca agctgacatt gatcctcaat 4800
 gctgttggtc ctgaagagt gaaaaacctg ttacgaacat ttaaggaag aacgagagat 4860
 ttatcgacca aagatccatg cactcggcta cgtgttccca gccttgggcc cgtattcata 4920
 tgcaaaggct gggctatat ccacaagcac aaaattttga tggaccgaaa tttcctgctt 4980
 atgtgtaaag atgtcataat aggacgcatg cagaccctat tgtctatgat aggtagatct 5040
 gacgatgcat tcactcagca agacttcttc acccttgtaa atatctacag gacaggagat 5100
 atcatcttac aagagaaagg aatctggcc tatgacttaa tcaagatggt ggagcctatc 5160
 tgcaatctga aattgatgaa attggcgaga gaatacagac cactgattcc cccttttcca 5220
 cattttgaaa atcatgttaa aatgcagtg gacgaacaat ctaaggtctc gaggaggatc 5280
 aaagttctct ttgagctgat tatgggaatc aaaaatgtgg atcttgtcct ggtgatctat 5340
 ggatcattta ggcattgggg gcatccattc atagattatt tcgaaggatt aaacaagcta 5400
 cataagcagg taacatgtc gaaggagatt gacacggagt atgcaaatgc tctggcaagt 5460
 gatttggcta gaatcgttct gactaaacag tttgactctg ttaagaagt gttttagtac 5520
 aagacaaaaa tcccctctgc ccatccctt ttcaagcata tcatggataa cacatggccc 5580
 actgccgccc agatccaaga cttgggagac cactggcatg aactgccgtt aatcaagtgt 5640
 tatgagatac ctgacctcat cgatccatct atcatctatt cagacaagag ccaactcaatg 5700
 aaccgatctg aggtgcttgg acatgtgagg agatcccctc atttgccaat accgagcaaa 5760
 aaggtactcc agactatgct tgataccag gcgacaaaact gggttgagtt tctagaaatg 5820
 gtagacaaac atggtcttga aaaggatgat ttgataattg gactcaagg gaaagaacgt 5880
 gagttaaamt tagcaggtag atttttttca ttgatgtcct ggaagttgag agaatacttc 5940
 gttatcacgg aatatcttat aaaaacacat tttgtaccct tgtttaagg gctgacgatg 6000
 gcagatgatt taacttccgt catcaaaaag atgttgata gttcttccgg acaggaata 6060
 gacgactact cttcagtgtg ttttgccaat catatagatt acgagaagt gaataatcac 6120
 cagagaaagg aatcaaacgg accagtgtt cgggtgatgg gccaatttt gggataccca 6180

ES 2 741 138 T3

cgtttgattg aacgaaccca tgagttcttt gagaaaagtc tcatttatta taacaacaga 6240
 ccggatctaa tgtgggtcaa tgaagacaca ctgattaatc gtacacaaca gcgagtatgt 6300
 tgggaaggtc aggctggagg ccttgagggg ttgaggcaaa agggttggag tattctcaat 6360
 cttcttgatga ttcagagaga ggcaaaaatt cgaaacacag cagtcaaggt attggcacia 6420
 ggggacaatc aggtcatctg tactcaatat aagacgaaga aatccagaga tcagagtgaa 6480
 ctcatcaatg cattagatca aatggtgaaa aacaacaaca aaattatgga ggaaataaag 6540
 aagggaacga gcaaaactggg actattgatt aacgatgatg agaccatgca atcggctgat 6600
 tatttgaatt acggtaaagt tccaatattc cgtggggtaa ttagagggtt agagacaaaa 6660
 agatggtccc gggtcacatg tgtgacaaat gatcaaattc caacgtgtgc caatctgatg 6720
 gcttctgtct caactaatgc actaacagta gctcattttg cgtctaacc ccaatcaattca 6780
 atgatacagt acaattactt cggtaacttt tcccgactac tgttgtttat gcatgaccca 6840
 gcactgogaa gatcacttta cgatgtgcag aatgaaatac cgggattgca cagtaagact 6900
 ttcaaatatg caatgctata tttggaccca tctattggcg gcgtttcagg gatggcattg 6960
 agtagattcc ttatacgtgc attcccggac cctgtaactg aaagcttacc tttctggaaa 7020
 tttattcoatg accatactga tgatgaatac ctcaaaagct tatcaattgc ctttgggaat 7080
 cctgatatag cgaattccg actagagcat atcagtaaac tgcttgagga tccaacttcc 7140
 ctcaatata ctatgggaat gagtccttca aatcttttga aaaccgaagt taaaaaatgt 7200
 ctcaattgaaa atagaacatc tatcaggaac gatattatca aagatgccac catctatttg 7260
 aaccaagagg aagcaaaatt gaaaagcttc ttatggtcta tcaatccact gtttctctaga 7320
 tttttgagtg agttcaaadc tggcaccttc ctgggagtat ccgaaggatt aatcagtcta 7380
 ttccaaaatt ctcgaccat ccgaaattcc ttcaagggtg agtatcggaa agagctggat 7440
 cacttgatcg tgaagagtga aatttcttct ctcaaacatc tgggcggcat tcacttcaaa 7500
 ttggggaaatg ggaaaatttg gggatgctcg tcatcccaat cagatttctg tagatacaga 7560
 tcctggggaa gaaaactggt gggaaactaca attcctcatc ctttggaaat gcacggagca 7620
 gcgagtctca aagaggctcc ttgcaccttg tgtaactgct ctggcctgac ttacatctct 7680
 gttcattgcc cgaaaggaat tacagaggta ttttccagaa gaggaccctt accggcgtac 7740
 ctgggttcta agacatcggg gaccacttca attcttcagc cttgggaaaa agaaagtaag 7800
 gttcctattg taagacgagc tactagactg agagatgcca tctcatggtt catagacca 7860
 gattctacac ttgctcaatc tattcttgac aacattaaat ctttgacagg ggaagagtgg 7920
 ggaggaagac agcatgggta taagagaact ggctctgcat tgcatagatt ttctacctca 7980
 cgtatgagca atggagggtt tgcttctcaa agtcccggg ctttgaccgg attgattgct 8040
 acgactgaca ccatgcacga ttatggagac aagaattatg atttcatggt ccaggcctct 8100

ES 2 741 138 T3

ttgttatacg cacagatgac tacatctata tccagatggg ggcatgtcgg ggcttgcaca 8160
 gatcattacc atgtccggtg tgacagctgc attcgagaaa tacaagagat tgaattgaac 8220
 actggagtcc agtactctcc ccccgatgtg tcttatgttt tgacaaaatg gcggaacggc 8280
 tcaggttcctt ggggtactgt caccaaacia ctcaccccga aagaaggaaa ctggaccgta 8340
 ctctcgctg cagaacaatc ctatcaagtt ggacggtgta tcggatttct gtacggagat 8400
 ctagtacata agaaatcaca tcaagcggac gacagttcat tatttccggt aagcatacaa 8460
 cacaaagtga gaggagagg ttttcttgaa ggtcttttag atggaataat gagagctagc 8520
 tgttgtaacg tcattcacag gagaagtgtc gcaaccttaa agcgtccggc aaatgctgtg 8580
 tatgggggag tcatattcctt gattgacaaa ttgagtatgt cagccccatt cttgtcttta 8640
 acccgactg gtcctatcag ggaagaacta gaaaatgtcc ctcaaaaat gccagcgtcc 8700
 taccctaata ataatcgaga tttgggatg accgtcagaa actacttcaa gtatcaatgt 8760
 cgaatcattg agagaggaca gtataaatcc cattatccca caatttggtt attttccgat 8820
 gtcttatcgg tggactttat tggctctatg tccttgtcat ctggacttat gagattgta 8880
 tacaagaaca gtctcagtaa gaaagacaaa aatgagctcc gagacttggc aaatctttca 8940
 tctcttctca gatcaggaga agaatgggat gatatacatg tcaaattttt ctctcaagac 9000
 ttactctttt gttctcagga gatacgacat gcctgtaaat tcgggattat acgagacaaa 9060
 gtaagtctag aagtggatca tgggtggggg aaagaagcat atggaggatg tacagtgctt 9120
 ccagtgttct acaggtctca gatttataag aaaagtttga ctgtaccccc acgaattcaa 9180
 aaccctatca tatctggact ccgcttgggg caacttccta caggagctca ttataagatc 9240
 agatcaatca tcatgactct aaagatcaat tatcaggact tcctgtcatg tggagacggt 9300
 tcagggggga tgactgcctg cttgctccgg ttaaacccta atagtcgggg aattttcaat 9360
 agtttgctag aattagatgg agcattaatg agaggatcat ccccgagcc acccagtgcg 9420
 ctagagacgt tggggagcca aagaactcga tgtgtaaacg gaggaacatg ttgggaacat 9480
 ccctctgact tgagcgacc caatacttgg aagtatttta ttggattgaa gagaggatta 9540
 ggcttgcaga tcaatctgat tactatggat atggaagttc gagatccagt gatctcacac 9600
 aaaattgaag caaacatccg agcatttctc tatgatcttt tagaccgga gggaaaccctt 9660
 atatacaaaa cgtatggcac atatctggca gaagaggaaa ggaatattct gacagaagta 9720
 ggtcctttgt ttcacactac tgacttgggtg caaactatth acagtagtgc ccagacttgc 9780
 gaggtttact gtgtatgcag acggttaaag aaatatgctg atcaacaaca tgtggattgg 9840
 tcattgttga ctgatggatg gtctcgggta tatgcgtttt ctgtgaatcg attggaattc 9900
 caaagggtc agagtcttcg gaaactggac aactgcaag gaattccaag ctttttcata 9960

ES 2 741 138 T3

ccagatcctt ttgtcaatgc ggagacttta ttgcaaattg caggtgttcc aacagggatt 10020
 tctcacacag ccgtattaca tggatcgta cattctgaac aattgataac gcttggatt 10080
 ttcttctgtg cgctaattctc tcaccataca atgaacatca tacgaatc acctgtcccc 10140
 ccgtctcctc catccgatgg gtcaataagt agaatgtgtt ctgcaatcac agggatccta 10200
 ttttgggtct ccttagtgga gaaggacttg actctataca actcattgtt gtcaataata 10260
 cagagatcct ttccaatccg atggtacaaa aataaggaga aaaacggatg gtccaatgt 10320
 tggggggcaa atggagacgg gatacccaaa gatactcgac taaatgattc gatggcgaac 10380
 ataggaaact ggataagggc tatggagttg ctttgcaata agaccgctca gatgcccttc 10440
 tctcccaagt tgttcaatcg attggccgca caatatgaca gagaattaac atggaagaag 10500
 gtgttggcta aaacaggact tgcagattta ctaacaggac aaatttcaca aattgatcga 10560
 tcagttgcga atgtccggag cgagccgagt aatgagaact cttggcaaga ttagagcgat 10620
 ccacaagtat gaaaaaaact aatcccatag ccattttaa ttattgaaat tgatgaaatt 10680
 ggcgtcgacc ggccgcgatt ctggakccga tgcgta 10716

<210> 8
 <211> 442
 <212> PRT
 <213> Desconocida
 <220>
 <223> *Virus Carajas*
 <400> 8

5

Met	Asn	Ser	Ile	Val	Lys	Lys	Val	Ile	Asp	Asp	Thr	Val	Ile	Gln	Pro
1				5					10					15	
Lys	Leu	Pro	Ala	Asn	Glu	Asp	Pro	Val	Glu	Tyr	Pro	Ala	Asp	Tyr	Phe
			20					25					30		
Lys	Thr	Ser	Lys	Gln	Ile	Pro	Leu	Tyr	Ile	Asn	Thr	Asp	Lys	Thr	Leu
		35					40					45			
Ala	Glu	Leu	Arg	Ala	Phe	Val	Tyr	Gln	Gly	Leu	Lys	Ala	Gly	Asn	Pro
	50					55					60				
Ser	Ile	Ile	His	Val	Asn	Ser	Tyr	Leu	Tyr	Leu	Ala	Leu	Lys	Asp	Ile
65					70					75					80
Lys	Ala	Thr	Leu	Glu	Arg	Asp	Trp	Thr	Ser	Phe	Ser	Ile	Thr	Ile	Gly
				85					90						95
Lys	Gln	Gly	Glu	Glu	Ile	Thr	Ile	Phe	Asn	Leu	Val	Ser	Val	Arg	Pro
			100					105					110		

ES 2 741 138 T3

Leu Val Ile Thr Val Pro Asp Gly Arg Thr Asp Pro Asp Arg Ser Pro
 115 120 125

Asn Asp Asp Lys Trp Leu Pro Ile Tyr Leu Leu Gly Leu Tyr Arg Val
 130 135 140

Gly Arg Thr Lys Leu Pro Glu Tyr Arg Lys Lys Leu Met Glu Gly Leu
 145 150 155 160

Glu Met Gln Cys Lys Ile Met Tyr Pro Asp Phe Val Pro Ile Val Pro
 165 170 175

Glu Gly Met Asp Phe Phe Asp Val Trp Gly Asn Asp Ser Asn Phe Thr
 180 185 190

Lys Ile Val Ala Ala Val Asp Met Phe Phe His Met Phe Lys Lys His
 195 200 205

Glu Arg Ala Ser Leu Arg Tyr Gly Thr Ile Val Ser Arg Phe Lys Asp
 210 215 220

Cys Ala Ala Leu Ala Thr Phe Gly His Val Cys Lys Val Ser Gly Met
 225 230 235 240

Ser Thr Glu Glu Val Thr Thr Trp Val Leu Asn Arg Glu Val Ala Asp
 245 250 255

Glu Leu Cys Gln Met Met Phe Pro Gly Gln Glu Ile Asp Arg Ala Asp
 260 265 270

Ser Tyr Met Pro Tyr Met Ile Asp Phe Gly Leu Ser Gln Lys Ser Pro
 275 280 285

Tyr Ser Ser Val Lys Asn Pro Ser Phe His Phe Trp Gly Gln Leu Ala
 290 295 300

Ala Leu Leu Leu Arg Ser Thr Arg Ala Lys Asn Ala Arg Gln Pro Asp
 305 310 315 320

Asp Ile Glu Tyr Thr Ser Leu Thr Thr Ala Gly Leu Leu Leu Ala Tyr
 325 330 335

Ala Val Gly Ser Ser Ala Asp Ile Ser Gln Gln Phe Tyr Met Gly Asp
 340 345 350

Glu Lys Tyr Ile Ser Asp Pro Ser Ala Gly Gly Leu Thr Ser Asn Ala

ES 2 741 138 T3

355 360 365

Pro Pro Lys Gly Arg Asn Val Val Asp Trp Leu Gly Trp Phe Glu Asp
 370 375 380

Gln Gly Gly Asn Ile Thr Pro Asp Met Tyr Thr Ser Leu Lys Gly Leu
 385 390 395 400

Phe Ala Leu Cys Lys Gly Cys Glu Ile Arg Pro Leu Glu Ser Met Pro
 405 410 415

Arg Glu Ser Leu Thr Ser Asp Ser Ile Gln Ile Lys Cys Phe Thr Thr
 420 425 430

Cys Cys Ile Ile Tyr Asn Tyr Glu Lys Asn
 435 440

<210> 9
 <211> 261
 <212> PRT
 <213> Desconocida

5

<220>
 <223> *Virus Carajas*

<400> 9

Met Gly Thr Tyr Thr His Leu Asp Ser Ala Leu Gln Asp Ala Asn Glu
 1 5 10 15

Ser Glu Glu Ser Arg Asp Glu Lys Ser Asn Phe Asp Leu Phe Asp Glu
 20 25 30

Glu Ser Lys Glu Val Ala Arg Pro Ser Tyr Tyr Ser Ala Ile Asp Glu
 35 40 45

Glu Ser Asp Gln Glu Glu Thr Glu Ser Asp Asp Pro Asp Glu Glu Leu
 50 55 60

Asn Asp Ser Asn Ala His Gly Ala Val Asp Gly Trp Asp Glu Thr Leu
 65 70 75 80

Asn Glu Asn Ser Gln Pro Asp Asp Asn Val Ser Val Glu Phe Ala Arg
 85 90 95

Thr Trp Ser Thr Pro Val Met Glu Ser Ser Ser Glu Gly Lys Thr Leu
 100 105 110

His Leu Ala Met Pro Asp Gly Leu Asn Pro Asp Gln Val Ala Gln Trp
 115 120 125

ES 2 741 138 T3

Leu Gln Thr Val Lys Ala Leu Phe Glu Ser Ala Lys Tyr Trp Asn Leu
 130 135 140

Ser Glu Cys Arg Met Glu Val Leu Leu Glu Gly Val Leu Ile Lys Glu
 145 150 155 160

Arg Gln Met Thr Pro Asp Leu Gln Lys Val Thr Pro Lys Pro Asn Asn
 165 170 175

Pro Pro Pro Glu Ser Met Pro Cys Asp Pro Leu Pro Pro Ala Met Asp
 180 185 190

Val Trp Glu Ala Ala Ser Gln Val Tyr Thr Leu Glu Pro Lys Arg Ala
 195 200 205

Asn Leu Ala Pro Met Asp Val Lys Leu Lys Asp Leu Phe Ser Ser Arg
 210 215 220

Ala Glu Phe Leu Ser Val Gly Gly Ser Pro Gln Met Ser Trp Lys Glu
 225 230 235 240

Ala Ile Ile Leu Gly Leu Arg Tyr Lys Lys Leu Tyr Asn Gln Ala Arg
 245 250 255

Leu Lys Tyr Ser Leu
 260

- <210> 10
- <211> 228
- <212> PRT
- <213> Desconocida
- <220>
- <223> *Virus Carajas*
- <400> 10

5

Met Ser Ser Leu Lys Lys Ile Leu Gly Leu Lys Gly Lys Lys Glu Glu
 1 5 10 15

Lys Ser Lys Lys Leu Gly Leu Pro Pro Pro Tyr Glu Met Pro Ala Asn
 20 25 30

Asn Glu Phe Glu Pro Asn Ala Pro Leu Asp Pro Asp Met Phe Gly Ala
 35 40 45

Glu His Leu Glu Ile Glu Ser Lys Ser Ala Met Arg Tyr Glu Lys Phe
 50 55 60

ES 2 741 138 T3

Lys Phe Ser Val Lys Ile Thr Leu Arg Thr Asn Arg Pro Leu Arg Thr
65 70 75 80

Tyr Asp Asp Val Cys Gln Ile Leu Ser Lys Trp Asp Ala Met Tyr Val
85 90 95

Gly Met Met Gly Lys Arg Pro Phe Tyr Lys Val Leu Val Leu Ile Gly
100 105 110

Ser Ser His Leu Gln Ala Thr Pro Ala Ile Leu Ser Asp Arg Gly Gln
115 120 125

Pro Glu Tyr His Met Tyr Leu Glu Asp Arg Gly Phe Ile Ala His Arg
130 135 140

Leu Gly Leu Thr Pro Pro Met Leu Ser Gly Pro Glu Ser Phe Arg Arg
145 150 155 160

Pro Phe His Val Gly Leu Tyr Arg Gly Thr Ile Asp Ile Thr Val Asn
165 170 175

Leu Met Asp Asp Glu Ser Thr Glu Ser Ala Pro Gln Val Trp Asp His
180 185 190

Phe Asn Thr Arg Tyr Val Asn His Phe Leu Glu His Ala Lys Arg Phe
195 200 205

Gly Leu Val Leu Ser Lys Lys Pro Gly Gly Gly Trp Ile Leu Asp Gln
210 215 220

Ala Val Cys Ala
225

<210> 11
<211> 519
<212> PRT
<213> Desconocida

5

<220>
<223> *Virus Carajas*

<400> 11

Met Val Ile Ala Gly Leu Ile Leu Cys Ile Gly Ile Leu Pro Ala Ile
1 5 10 15

Gly Lys Ile Thr Ile Ser Phe Pro Gln Ser Leu Lys Gly Asp Trp Arg
20 25 30

ES 2 741 138 T3

Pro Val Pro Lys Gly Tyr Asn Tyr Cys Pro Thr Ser Ala Asp Lys Asn
 35 40 45
 Leu His Gly Asp Leu Ile Asp Ile Gly Leu Arg Leu Arg Ala Pro Lys
 50 55 60
 Ser Phe Lys Gly Ile Ser Ala Asp Gly Trp Met Cys His Ala Ala Arg
 65 70 75 80
 Trp Ile Thr Thr Cys Asp Phe Arg Trp Tyr Gly Pro Lys Tyr Ile Thr
 85 90 95
 His Ser Ile His Ser Phe Arg Pro Ser Asn Asp Gln Cys Lys Glu Ala
 100 105 110
 Ile Arg Leu Thr Asn Glu Gly Asn Trp Ile Asn Pro Gly Phe Pro Pro
 115 120 125
 Gln Ser Cys Gly Tyr Ala Ser Val Thr Asp Ser Glu Ser Val Val Val
 130 135 140
 Thr Val Thr Lys His Gln Val Leu Val Asp Glu Tyr Ser Gly Ser Trp
 145 150 155 160
 Ile Asp Ser Gln Phe Pro Gly Gly Ser Cys Thr Ser Pro Ile Cys Asp
 165 170 175
 Thr Val His Asn Ser Thr Leu Trp His Ala Asp His Thr Leu Asp Ser
 180 185 190
 Ile Cys Asp Gln Glu Phe Val Ala Met Asp Ala Val Leu Phe Thr Glu
 195 200 205
 Ser Gly Lys Phe Glu Glu Phe Gly Lys Pro Asn Ser Gly Ile Arg Ser
 210 215 220
 Asn Tyr Phe Pro Tyr Glu Ser Leu Lys Asp Val Cys Gln Met Asp Phe
 225 230 235 240
 Cys Lys Arg Lys Gly Phe Lys Leu Pro Ser Gly Val Trp Phe Glu Ile
 245 250 255
 Glu Asp Ala Glu Lys Ser His Lys Ala Gln Val Glu Leu Lys Ile Lys
 260 265 270
 Arg Cys Pro His Gly Ala Val Ile Ser Ala Pro Asn Gln Asn Ala Ala
 275 280 285

ES 2 741 138 T3

Asp Ile Asn Leu Ile Met Asp Val Glu Arg Ile Leu Asp Tyr Ser Leu
 290 295 300
 Cys Gln Ala Thr Trp Ser Lys Ile Gln Asn Lys Glu Ala Leu Thr Pro
 305 310 315 320
 Ile Asp Ile Ser Tyr Leu Gly Pro Lys Asn Pro Gly Pro Gly Pro Ala
 325 330 335
 Phe Thr Ile Ile Asn Gly Thr Leu His Tyr Phe Asn Thr Arg Tyr Ile
 340 345 350
 Arg Val Asp Ile Ala Gly Pro Val Thr Lys Glu Ile Thr Gly Phe Val
 355 360 365
 Ser Gly Thr Ser Thr Ser Arg Val Leu Trp Asp Gln Trp Phe Pro Tyr
 370 375 380
 Gly Glu Asn Ser Ile Gly Pro Asn Gly Leu Leu Lys Thr Ala Ser Gly
 385 390 395 400
 Tyr Lys Tyr Pro Leu Phe Met Val Gly Thr Gly Val Leu Asp Ala Asp
 405 410 415
 Ile His Lys Leu Gly Glu Ala Thr Val Ile Glu His Pro His Ala Lys
 420 425 430
 Glu Ala Gln Lys Val Val Asp Asp Ser Glu Val Ile Phe Phe Gly Asp
 435 440 445
 Thr Gly Val Ser Lys Asn Pro Val Glu Val Val Glu Gly Trp Phe Ser
 450 455 460
 Gly Trp Arg Ser Ser Leu Met Ser Ile Phe Gly Ile Ile Leu Leu Ile
 465 470 475 480
 Val Cys Leu Val Leu Ile Val Arg Ile Leu Ile Ala Leu Lys Tyr Cys
 485 490 495
 Cys Val Arg His Lys Lys Arg Thr Ile Tyr Lys Glu Asp Leu Glu Met
 500 505 510
 Gly Arg Ile Pro Arg Arg Ala
 515

<210> 12
 <211> 2109
 <212> PRT

ES 2 741 138 T3

<213> Desconocida

<220>

<223> *Virus Carajas*

<400> 12

Met Asp Phe Leu Pro Val Glu Gln Glu Glu Asp Trp Gly Tyr Ala Glu
1 5 10 15

Asp Asp Phe Ser Ser Ser Asp Tyr Leu Asp Phe Glu Glu Arg Met Thr
20 25 30

Tyr Leu Asn Gln Ala Asp Tyr Asn Leu Asn Ser Pro Leu Ile Ser Asp
35 40 45

Asp Ile Tyr Tyr Leu Ser Arg Lys Phe His Ser Tyr Gly Ile Pro Pro
50 55 60

Met Trp Asn Leu Lys Glu Trp Asp Gly Pro Leu Glu Met Leu Lys Ser
65 70 75 80

Cys Gln Ala Asp Pro Ile Pro His Asp Leu Met His Lys Trp Phe Gly
85 90 95

Thr Trp Leu Glu Asp Phe Asp His Asp Ser Ala Gln Gly Ile Val Phe
100 105 110

Leu Arg Glu Val Asp Lys Glu Ala Ser Glu Thr Tyr Asp Leu Val Asp
115 120 125

Thr Phe Leu Lys Asn Trp Ala Gly Lys Ser Tyr Pro Tyr Lys Ala Lys
130 135 140

Glu Arg Tyr Leu Asp Gln Met Lys Ile Ile Gly Pro Leu Cys Gln Lys
145 150 155 160

Phe Leu Asp Leu His Lys Leu Thr Leu Ile Leu Asn Ala Val Gly Pro
165 170 175

Glu Glu Leu Lys Asn Leu Leu Arg Thr Phe Lys Gly Arg Thr Arg Asp
180 185 190

Leu Ser Thr Lys Asp Pro Cys Thr Arg Leu Arg Val Pro Ser Leu Gly
195 200 205

Pro Val Phe Ile Cys Lys Gly Trp Val Tyr Ile His Lys His Lys Ile
210 215 220

ES 2 741 138 T3

Leu Met Asp Arg Asn Phe Leu Leu Met Cys Lys Asp Val Ile Ile Gly
 225 230 235 240

Arg Met Gln Thr Leu Leu Ser Met Ile Gly Arg Ser Asp Asp Ala Phe
 245 250 255

Thr Gln Gln Asp Phe Phe Thr Leu Val Asn Ile Tyr Arg Thr Gly Asp
 260 265 270

Ile Ile Leu Gln Glu Lys Gly Asn Leu Ala Tyr Asp Leu Ile Lys Met
 275 280 285

Val Glu Pro Ile Cys Asn Leu Lys Leu Met Lys Leu Ala Arg Glu Tyr
 290 295 300

Arg Pro Leu Ile Pro Pro Phe Pro His Phe Glu Asn His Val Lys Asn
 305 310 315 320

Ala Val Asp Glu Gln Ser Lys Val Ser Arg Arg Ile Lys Val Leu Phe
 325 330 335

Glu Leu Ile Met Gly Ile Lys Asn Val Asp Leu Val Leu Val Ile Tyr
 340 345 350

Gly Ser Phe Arg His Trp Gly His Pro Phe Ile Asp Tyr Phe Glu Gly
 355 360 365

Leu Asn Lys Leu His Lys Gln Val Thr Met Ser Lys Glu Ile Asp Thr
 370 375 380

Glu Tyr Ala Asn Ala Leu Ala Ser Asp Leu Ala Arg Ile Val Leu Thr
 385 390 395 400

Lys Gln Phe Asp Ser Val Lys Lys Trp Phe Val Asp Lys Thr Lys Ile
 405 410 415

Pro Ser Ala His Pro Phe Phe Lys His Ile Met Asp Asn Thr Trp Pro
 420 425 430

Thr Ala Ala Gln Ile Gln Asp Phe Gly Asp His Trp His Glu Leu Pro
 435 440 445

Leu Ile Lys Cys Tyr Glu Ile Pro Asp Leu Ile Asp Pro Ser Ile Ile
 450 455 460

Tyr Ser Asp Lys Ser His Ser Met Asn Arg Ser Glu Val Leu Gly His
 465 470 475 480

ES 2 741 138 T3

Val Arg Arg Ser Pro His Leu Pro Ile Pro Ser Lys Lys Val Leu Gln
485 490 495

Thr Met Leu Asp Thr Arg Ala Thr Asn Trp Val Glu Phe Leu Glu Met
500 505 510

Val Asp Lys His Gly Leu Glu Lys Asp Asp Leu Ile Ile Gly Leu Lys
515 520 525

Gly Lys Glu Arg Glu Leu Lys Leu Ala Gly Arg Phe Phe Ser Leu Met
530 535 540

Ser Trp Lys Leu Arg Glu Tyr Phe Val Ile Thr Glu Tyr Leu Ile Lys
545 550 555 560

Thr His Phe Val Pro Leu Phe Lys Gly Leu Thr Met Ala Asp Asp Leu
565 570 575

Thr Ser Val Ile Lys Lys Met Leu Asp Ser Ser Ser Gly Gln Gly Ile
580 585 590

Asp Asp Tyr Ser Ser Val Cys Phe Ala Asn His Ile Asp Tyr Glu Lys
595 600 605

Trp Asn Asn His Gln Arg Lys Glu Ser Asn Gly Pro Val Phe Arg Val
610 615 620

Met Gly Gln Phe Leu Gly Tyr Pro Arg Leu Ile Glu Arg Thr His Glu
625 630 635 640

Phe Phe Glu Lys Ser Leu Ile Tyr Tyr Asn Asn Arg Pro Asp Leu Met
645 650 655

Trp Val Asn Glu Asp Thr Leu Ile Asn Arg Thr Gln Gln Arg Val Cys
660 665 670

Trp Glu Gly Gln Ala Gly Gly Leu Glu Gly Leu Arg Gln Lys Gly Trp
675 680 685

Ser Ile Leu Asn Leu Leu Val Ile Gln Arg Glu Ala Lys Ile Arg Asn
690 695 700

Thr Ala Val Lys Val Leu Ala Gln Gly Asp Asn Gln Val Ile Cys Thr
705 710 715 720

Gln Tyr Lys Thr Lys Lys Ser Arg Asp Gln Ser Glu Leu Ile Asn Ala

ES 2 741 138 T3

Arg Thr Ser Ile Arg Asn Asp Ile Ile Lys Asp Ala Thr Ile Tyr Leu
 980 985 990

Asn Gln Glu Glu Ala Lys Leu Lys Ser Phe Leu Trp Ser Ile Asn Pr
 995 1000 1005

Leu Phe Pro Arg Phe Leu Ser Glu Phe Lys Ser Gly Thr Phe Leu
 1010 1015 1020

Gly Val Ser Glu Gly Leu Ile Ser Leu Phe Gln Asn Ser Arg Thr
 1025 1030 1035

Ile Arg Asn Ser Phe Lys Gly Lys Tyr Arg Lys Glu Leu Asp His
 1040 1045 1050

Leu Ile Val Lys Ser Glu Ile Ser Ser Leu Lys His Leu Gly Gly
 1055 1060 1065

Ile His Phe Lys Leu Gly Asn Gly Lys Ile Trp Gly Cys Ser Ser
 1070 1075 1080

Ser Gln Ser Asp Leu Leu Arg Tyr Arg Ser Trp Gly Arg Lys Leu
 1085 1090 1095

Val Gly Thr Thr Ile Pro His Pro Leu Glu Met His Gly Ala Ala
 1100 1105 1110

Ser Pro Lys Glu Ala Pro Cys Thr Leu Cys Asn Cys Ser Gly Leu
 1115 1120 1125

Thr Tyr Ile Ser Val His Cys Pro Lys Gly Ile Thr Glu Val Phe
 1130 1135 1140

Ser Arg Arg Gly Pro Leu Pro Ala Tyr Leu Gly Ser Lys Thr Ser
 1145 1150 1155

Glu Thr Thr Ser Ile Leu Gln Pro Trp Glu Lys Glu Ser Lys Val
 1160 1165 1170

Pro Ile Val Arg Arg Ala Thr Arg Leu Arg Asp Ala Ile Ser Trp
 1175 1180 1185

Phe Ile Asp Pro Asp Ser Thr Leu Ala Gln Ser Ile Leu Asp Asn
 1190 1195 1200

Ile Lys Ser Leu Thr Gly Glu Glu Trp Gly Gly Arg Gln His Gly
 1205 1210 1215

ES 2 741 138 T3

Tyr Lys Arg Thr Gly Ser Ala Leu His Arg Phe Ser Thr Ser Arg
 1220 1225 1230
 Met Ser Asn Gly Gly Phe Ala Ser Gln Ser Pro Ala Ala Leu Thr
 1235 1240 1245
 Arg Leu Ile Ala Thr Thr Asp Thr Met His Asp Tyr Gly Asp Lys
 1250 1255 1260
 Asn Tyr Asp Phe Met Phe Gln Ala Ser Leu Leu Tyr Ala Gln Met
 1265 1270 1275
 Thr Thr Ser Ile Ser Arg Trp Gly His Val Gly Ala Cys Thr Asp
 1280 1285 1290
 His Tyr His Val Arg Cys Asp Ser Cys Ile Arg Glu Ile Gln Glu
 1295 1300 1305
 Ile Glu Leu Asn Thr Gly Val Gln Tyr Ser Pro Pro Asp Val Ser
 1310 1315 1320
 Tyr Val Leu Thr Lys Trp Arg Asn Gly Ser Gly Ser Trp Gly Thr
 1325 1330 1335
 Val Thr Lys Gln Leu Ile Pro Lys Glu Gly Asn Trp Thr Val Leu
 1340 1345 1350
 Ser Pro Ala Glu Gln Ser Tyr Gln Val Gly Arg Cys Ile Gly Phe
 1355 1360 1365
 Leu Tyr Gly Asp Leu Val His Lys Lys Ser His Gln Ala Asp Asp
 1370 1375 1380
 Ser Ser Leu Phe Pro Leu Ser Ile Gln His Lys Val Arg Gly Arg
 1385 1390 1395
 Gly Phe Leu Glu Gly Leu Leu Asp Gly Ile Met Arg Ala Ser Cys
 1400 1405 1410
 Cys Gln Val Ile His Arg Arg Ser Val Ala Thr Leu Lys Arg Pro
 1415 1420 1425
 Ala Asn Ala Val Tyr Gly Gly Val Ile Phe Leu Ile Asp Lys Leu
 1430 1435 1440
 Ser Met Ser Ala Pro Phe Leu Ser Leu Thr Arg Thr Gly Pro Ile
 1445 1450 1455

ES 2 741 138 T3

Arg Glu Glu Leu Glu Asn Val Pro His Lys Met Pro Ala Ser Tyr
1460 1465 1470

Pro Thr Asn Asn Arg Asp Leu Gly Met Thr Val Arg Asn Tyr Phe
1475 1480 1485

Lys Tyr Gln Cys Arg Ile Ile Glu Arg Gly Gln Tyr Lys Ser His
1490 1495 1500

Tyr Pro Thr Ile Trp Leu Phe Ser Asp Val Leu Ser Val Asp Phe
1505 1510 1515

Ile Gly Pro Met Ser Leu Ser Ser Gly Leu Met Arg Leu Leu Tyr
1520 1525 1530

Lys Asn Ser Leu Ser Lys Lys Asp Lys Asn Glu Leu Arg Asp Leu
1535 1540 1545

Ala Asn Leu Ser Ser Leu Leu Arg Ser Gly Glu Glu Trp Asp Asp
1550 1555 1560

Ile His Val Lys Phe Phe Ser Gln Asp Leu Leu Phe Cys Ser Gln
1565 1570 1575

Glu Ile Arg His Ala Cys Lys Phe Gly Ile Ile Arg Asp Lys Val
1580 1585 1590

Ser Leu Glu Val Asp His Gly Trp Gly Lys Glu Ala Tyr Gly Gly
1595 1600 1605

Cys Thr Val Leu Pro Val Phe Tyr Arg Ser Gln Ile Tyr Lys Lys
1610 1615 1620

Ser Leu Thr Val Pro Pro Arg Ile Gln Asn Pro Ile Ile Ser Gly
1625 1630 1635

Leu Arg Leu Gly Gln Leu Pro Thr Gly Ala His Tyr Lys Ile Arg
1640 1645 1650

Ser Ile Ile Met Thr Leu Lys Ile Asn Tyr Gln Asp Phe Leu Ser
1655 1660 1665

Cys Gly Asp Gly Ser Gly Gly Met Thr Ala Cys Leu Leu Arg Leu
1670 1675 1680

Asn Pro Asn Ser Arg Gly Ile Phe Asn Ser Leu Leu Glu Leu Asp

ES 2 741 138 T3

1685						1690									1695
Gly	Ala	Leu	Met	Arg	Gly	Ser	Ser	Pro	Glu	Pro	Pro	Ser	Ala	Leu	
1700						1705									1710
Glu	Thr	Leu	Gly	Ser	Gln	Arg	Thr	Arg	Cys	Val	Asn	Gly	Gly	Thr	
1715						1720									1725
Cys	Trp	Glu	His	Pro	Ser	Asp	Leu	Ser	Asp	Pro	Asn	Thr	Trp	Lys	
1730						1735									1740
Tyr	Phe	Ile	Gly	Leu	Lys	Arg	Gly	Leu	Gly	Leu	Gln	Ile	Asn	Leu	
1745						1750									1755
Ile	Thr	Met	Asp	Met	Glu	Val	Arg	Asp	Pro	Val	Ile	Ser	His	Lys	
1760						1765									1770
Ile	Glu	Ala	Asn	Ile	Arg	Ala	Phe	Leu	Tyr	Asp	Leu	Leu	Asp	Pro	
1775						1780									1785
Glu	Gly	Thr	Leu	Ile	Tyr	Lys	Thr	Tyr	Gly	Thr	Tyr	Leu	Ala	Glu	
1790						1795									1800
Glu	Glu	Arg	Asn	Ile	Leu	Thr	Glu	Val	Gly	Pro	Leu	Phe	His	Thr	
1805						1810									1815
Thr	Asp	Leu	Val	Gln	Thr	Ile	Tyr	Ser	Ser	Ala	Gln	Thr	Ser	Glu	
1820						1825									1830
Val	Tyr	Cys	Val	Cys	Arg	Arg	Leu	Lys	Lys	Tyr	Ala	Asp	Gln	Gln	
1835						1840									1845
His	Val	Asp	Trp	Ser	Leu	Leu	Thr	Asp	Gly	Trp	Ser	Arg	Leu	Tyr	
1850						1855									1860
Ala	Phe	Ser	Val	Asn	Arg	Leu	Glu	Phe	Gln	Arg	Ala	Gln	Ser	Leu	
1865						1870									1875
Arg	Lys	Leu	Asp	Thr	Leu	Gln	Gly	Ile	Pro	Ser	Phe	Phe	Ile	Pro	
1880						1885									1890
Asp	Pro	Phe	Val	Asn	Ala	Glu	Thr	Leu	Leu	Gln	Ile	Ala	Gly	Val	
1895						1900									1905
Pro	Thr	Gly	Ile	Ser	His	Thr	Ala	Val	Leu	His	Gly	Ser	Leu	His	
1910						1915									1920

ES 2 741 138 T3

Ser Glu Gln Leu Ile Thr Leu Gly Ile Phe Phe Cys Ala Leu Ile
 1925 1930 1935

Ser His His Thr Met Asn Ile Ile Arg Ile Ser Pro Val Pro Pro
 1940 1945 1950

Ser Pro Pro Ser Asp Gly Ser Ile Ser Arg Met Cys Ser Ala Ile
 1955 1960 1965

Thr Gly Ile Leu Phe Trp Val Ser Leu Val Glu Lys Asp Leu Thr
 1970 1975 1980

Leu Tyr Asn Ser Leu Leu Ser Ile Ile Gln Arg Ser Phe Pro Ile
 1985 1990 1995

Arg Trp Tyr Lys Asn Lys Glu Lys Asn Gly Trp Ser Gln Cys Trp
 2000 2005 2010

Gly Ala Asn Gly Asp Gly Ile Pro Lys Asp Thr Arg Leu Asn Asp
 2015 2020 2025

Ser Met Ala Asn Ile Gly Asn Trp Ile Arg Ala Met Glu Leu Leu
 2030 2035 2040

Cys Asn Lys Thr Ala Gln Met Pro Phe Ser Pro Lys Leu Phe Asn
 2045 2050 2055

Arg Leu Ala Ala Gln Tyr Asp Arg Glu Leu Thr Trp Lys Lys Val
 2060 2065 2070

Leu Ala Lys Thr Gly Leu Ala Asp Leu Leu Thr Gly Gln Ile Ser
 2075 2080 2085

Gln Ile Asp Arg Ser Val Ala Asn Val Arg Ser Glu Pro Ser Asn
 2090 2095 2100

Glu Asn Ser Trp Gln Asp
 2105

<210> 13
 <211> 12416
 <212> ADN
 <213> Desconocido

5

<220>
 <223> *Virus Bahía Grande*

<400> 13

acaatattag ataaactcct ctacttctta actatcgtta gacatggccg ccgcaatact

60

ES 2 741 138 T3

tccagtttct cgtaacatgc ctgtcagaga aaggacagtg gcaggaagtg taacagcgcc 120
accagttcag tatccaagca cctggttcca agcccatgcc ggacaaaaag tttcaataac 180
tatttatcaa aataactaatg cagacaagc tttctccaga attactcaac tcagaaacaa 240
cggacaatgg gatgataaat tgatcgctac tttcatgaaa ggtgtcttgg atgaaaatgc 300
tgaatggttc caaagccctc ccctcattga ggactggatt gtaaatgaag cagtcatcgg 360
aagagtagat gacgtagttg caccactgc acttgcacag tgggaagagg ttgaaaggcc 420
tcaaaacatg gatccagtac ccaatgagga aggagaactg gggactcggg ggtcattttt 480
cttggcatta atcaccatct acaggcaagt actgacaaga accatcaatg tggactacgg 540
ccaagaagtg agcagaagga taatagataa tttcaaagaa caacctttag gtatgtcaca 600
ggatgacata aatgaaatcc aggggatga atcaaaagaa aggctaacta caaattatgt 660
gaaaatctta tgcacottg atatgttctt caataagttt cagacccatg acaaaagcac 720
catcaggata gctactttac caacaagata tagaggatgt gctgcattca cttcatacgg 780
agaactagca ataagattgg gaattgaacc cataaagctg cccagtttga ttcttacagt 840
agcagtggcc aaagatttcg ataagatcaa tgtcaatgga gagcaagcag agcaattaga 900
tggatatttt ccatatcaat tagagttggg attagttaaa aagagtgctt attcagcagg 960
aaattgtcca tctttatact tatggatgca caccatagga acaatgctcc atcaacaaag 1020
atcttatcga gccaatgttc ccaaaaatgt accagaccaa atgggaacaa taaattctgc 1080
aattgctgtt gccatgcagt ttgttgctgg gggagagttc agtatgcaat ttgtagggga 1140
tgcacgagtt caagaagcca tgagagaaat gcaaacagca gaagctgaat tgaatgagtt 1200
aagaatggct caggcaagag aatgagagc tgcagcaaga ggagatgaag atgaagaagg 1260
ctctgaagat ggacttgatg atgaaaatga tggagaaggg gatgatgagt taccagctga 1320
aattgaacaa aatcctgaat atttaaatag agtcaacagg atcagagaat tacaagaaaa 1380
cctccaacaa tacaacgcaa cagtacaaca gcacactaat gcggtagaaa aagccgact 1440
cagagcactc gcttatcttc aagaaaatgg aggaattgca gataaggaca agagagactt 1500
gggtataaga ttcaggaggt ttgctgatga agcgggaagg agagtccgta aattattagc 1560
cagtttgttc cctgccccga gataaatatt ctttcaggta tcattttctt atttttaaaa 1620
tattttatcc agattttaat ttctttatct actgtattat tttattcaaa tatgttttca 1680
attaattttt tcttctttat atgttatatt ctatacatat gttaatgttc atgaaaaaaaa 1740
caacaaatct cataagatac tcgtttaag aatggctta ttcaactggg ttgattaaag 1800
gtgaagtgtc ccaaggattg tctaatgcat ttaaagatgc aggaatacat caaatagaat 1860
taaataaaga atatgacaat ttatcaattt tgggggccaa catgagtgca ttgaataaaa 1920
tgtttgacac agaagatgaa gggttatctg atactaatac taactcatca aaaaactcta 1980

ES 2 741 138 T3

ttttacaagc gagtgatatg ttcataggaa atgatgaata tgaatcagat gactctcatc 2040
 attttctaag ctcacctagt ccagataaag gaagcagtga agaaggaagc aacctccaag 2100
 aattcaattt tcagatacct agaaacaagg ttggaaaaga aaaggcatac aggaggggag 2160
 tcattgatgt attggatttt ctacagagac acagatttat agaagaattc cgtatggaag 2220
 gacttaatga ggatatagtc tgtatcatcc ctacaagagg aatgatcccc acaaaaacac 2280
 cccctaccct ggatgacaaa attcatcttg ctaacgatca gtcaatagaa aaagaagaaa 2340
 tcctccaaaa agacaagaca tcaaaaccaa acaaaggaat caaacagcca aacaagcaag 2400
 aggcacaacc agtctctgaa tctcaaacag gaatgaagga agacaaaaaa gaacaaaagc 2460
 caaagcaaaa ccaattccc attaaaaaca aacaggaaaa tgaagactca aaagaagttg 2520
 ctaagacca caaagataaa gaaaataaag tcagcaaagg aagtatgtca aagaatgaca 2580
 aactaaaaga aggcaatata actgttccaa aacagggatt tgaaaagaag aaaacaaaac 2640
 aaataaatga agaaggccac aaatcatttg attatgctaa tacatatggg acaaaagtca 2700
 ctgtgaaaac tataaggtat tgtaagacat gcaatcctaa tactagaaaa aatgctacag 2760
 tatatcttga ccatctttat gaacgccaca gtcatgaggt tgctttgatt aahagcttg 2820
 cttaccctct tttattttwt ttwwggttga wttaaattaa ctaattagat acttlyttaa 2880
 tacatgawaa wwacaacaaa tctaataaat tacattgaaa caaagatgtc tgggtgatg 2940
 agtatattta aaaggaagga caagaaaggg aatgaggggt ccaaagccct agccatacca 3000
 gatgaaaaat cagtagtccc atctgcacct ccagacatct cagctatgga ttatgggagg 3060
 tttggtttat tagggaggca aactctatta gaagaagatg aggaagaatc tagatgcatc 3120
 actattatag atctagaagt cgatctacag atagaggtgt tatctaatag agaaactcga 3180
 cttgtaatag acttgattgc tcctttgtgt aatcttcaaa ctgattacat tggaaaagag 3240
 aacacaaaag caatttggat aggattaact gtagtagcag cttttggagt gaaaagaacc 3300
 attaagacaa aaaatcatca tgtatataaa ggggtgtgtc ccagtggact taggctttta 3360
 atagactcag aaaaacaatt tgagctagat aagaggaata aatgstctca gcatctcagt 3420
 tatctacca atggtgtaaa aacagagtgg gccataagag gggagatgat caggacaaga 3480
 gtaccttacc tcctcagcc aggaagtgag gatgtgctta tgtttttagc agggatggga 3540
 ataagttggt attcaaatcc agatggcat ttagtctca aagtttgaaa aataacaaaa 3600
 ttcttttagag atcatattca gtatttatac cttagtaata ttgtggctca gatttaatga 3660
 tgggagtgcc taaagtattt caattttggg ttagaatcag gacatgaaaa aaacaacaaa 3720
 tctaattaac tatcatttag tacttagaac gaacttatct tctgttgaat catgatttcg 3780
 aatatgtttt tcttgtttca actctcatta tttctacagt ttatagcagg agatgagtca 3840

ES 2 741 138 T3

ttagaacaaa taacagcccc tgaaactcct gaccctatac tcttaaaagg agatacaaaa 3900
 tatctgttct tagtcccttc ttctgtcaaa aattggaaac cagctgacct gaatgaatta 3960
 acatgcccc ccctaactctc gaaaccagat acttctgaaa tgacttattt ttccacagat 4020
 gtgatggagt tacaaaaaca tcatgaattg gcaccagtag aagggtattt atgttcgggt 4080
 ttgcgttaca aagtaatatg ttctgaagga ttttttggac aaaaaacaat agcaaaaaag 4140
 attgagaaca ttgaacctga tagtaacaa tgccttgatg acttgtcaaa atttaagaat 4200
 gatgattacc tactcccata tttcccttct gaagattgta attggatgaa agagactccc 4260
 acccataaag attttatagt ttttcaaaa cattttgtta aatatgacct atacaataat 4320
 ggtttttatg atcctttact taaaaagac tactgtgata ctcaagtctg tgagacagaa 4380
 catgatcaaa ctatttggat aacagaaaag agtattgaaa atgaatgcat cttcaattat 4440
 ccgattaaaa agcatatatt ccatacagct gactttggga aatgataat agattacgaa 4500
 ttaaatcaat ggacttcagt ggaagatggg tgtttaatta actattgtgg aagagagggg 4560
 ataagttat ctaatgggat gttctttgta ggtaagttct ataaaaatct caataattta 4620
 cagacctgta gtgctggaac aaaggtcagt tacaagcctt taacctcaa gctggaagaa 4680
 attgaaaatg aatcattct agatcaggaa agattattat gtcttgattc aattaggcaa 4740
 atgacagcaa caaaaaaatt atcattttat tctttatcct ttctagaacc aaaatcttct 4800
 agtaggcaca aggtcttttag aattcataat aaaacactag aatataccga aaccgaatgg 4860
 catccaatca tgtcgtttta ttttgatgaa ccaaacaaaa ttggaattga caagaatggt 4920
 aatcagttt attggaatga atgggttcct agtggaatat ctgggctgtt atcagggttc 4980
 aatggagtct acaaaaaaga aatgaaact aaagtaacta ttgcccgatt agaaacaata 5040
 aaagaagatt atgatagggg gatgatgata gatcacgagt tggtagaggat agaacatcct 5100
 aaaattgtac acttaaaaag agagaacatc acaggatcta gagtcgaaat tgttaataaa 5160
 gaacattctg atgtgagtgg ttggctgtca tcagtattga gtagtttttg gggaaaaatc 5220
 atgatgacaa taataagtat aatcttaatc gtaataatag gattagtttt aataaactgc 5280
 tgcccaatta tatgcaaadc atgtattaaa cgttataaaa caaaggaaga atcccgcaat 5340
 agacatagat tggatagaga agataacggt agattgagga ggcaacatcg agttatTTTT 5400
 aacaatcaat ccaatgatga agaaaatgcc attgaaatgg tagaatatac tgacactccc 5460
 aggccattgc gaccgattcc tgatgccaca acatcagaca ctgagtcaag atccccaca 5520
 acagcccata gttttttcaa ccgttaaaaa ggtaggttat attatacttt tctctatacc 5580
 tctaatagtc atcatcgtgt tttttgtgtt attagataga aaacatctca aatatatacc 5640
 tttaaaggca tggaaactt caataattac aattaaaga ccttattaaa attaaaaagt 5700
 tttctttaa ataattctcc taattgattt taatttcag aaaaaacat taahaaatct 5760

ES 2 741 138 T3

aagtatmact saaatttagg gtatgcttgg tgtgttaaaa tggatttctc ttatgaacaa 5820
ttgctggatc ctatagatgt cttagaagaa gaattatatg aatttgattt cgaatatgat 5880
gattacactg atgatgatca gacaccctta cccaatatta agtacaaaaa cctagaaggt 5940
aaagactata atttaaactc acctctcatc agcgatgtga tcgattcagg aagagaatac 6000
ataattaatt ctaaaaagta cttttctcat gaaagaacaa atccggagtt ggaacaattt 6060
agtaaagctc taatggctat tgggttttct agatttgatt tacgaaaatc atcagaacat 6120
cataggtaca tgagttcata tatatatgga aatgagaaaa aacatatgaa aatcgaaata 6180
ataccagat ggaaagaagt cttagaactg actcgcaatc ctgtagaagt aacctctcat 6240
aagatattgg gatcaaaatc acaatctgat caagaaggat atataaatag attgcatat 6300
attacagtag atggacctca tgcaagaaaa acaagattac accaagaatg ggaaaaattc 6360
tcaacattac attatataac gtatattatg aattcaaaag cctttagtga caacaaaaat 6420
tgggtgaggg aagtctttga gaccatagaa actagtgaag ttgaccctga aataattaca 6480
ataattggaa caggtttatc aaagaaagaa gtatcctgga ttatatctga gaactttgca 6540
ttaaagtta gaacaggttt atttgtctcc aaagatttct tgctgatgat taaagatgtc 6600
accttagcta gatgtatgag caaactgagt atgattaaca gaaagtctcc caacacaact 6660
tatgatatga taaaattttt ggatagtcta tatgaaagtg gtgacaaaat attgacaaga 6720
catggaaatt tagcttacia gcatatcaag ttattggagg cagcttgtct agagagatgg 6780
aatcaattag ggcacaaaatt tgcaccattg ataccaatct cttcaagcat gagtgatcat 6840
cttagaactc aattagaaga aaatcaagat ctctatatgg tgagtaggga attcttcgat 6900
ttgattggaa agattgaaga tccttgggtc gttgctcaag cgtatggaac attcaggcat 6960
tggggacatc catacattga ttatttaaat ggtctaaaag atctagaaaa aagagtaaat 7020
gaaaatatca aaattgataa aaattatgca gaaaaattgg ctagcgatct tgcgtttata 7080
gttctaaaag accaatttgg aaaacataaa agatggtttg ctaaacctaa taaagaattg 7140
gatgaaaata atcccattgcg aaaatgcata gaaaacaatg tgtggcctaa cactaaagtt 7200
attttagact tccggagacaa ttggcataaa ttagaattat taccatgttt tgaaatccct 7260
gatgcaatag acctttctga cctatatagt gataaagctc attccatgca atacagtgaa 7320
gtattaaatt atgtaaaata caaaaaatcc aaaaagaata tcctgcctt acgtgttatc 7380
gggacattat tagaaaagga aaatccaaat ataaaagaat ttttacaaaa aataaacgat 7440
gaaggtttag atgatgatga tctgataata gggctgaaag caaagaaaga gaactgaaag 7500
ataaaggaag atttttctct cttatgagtt ggaatattag gttatatttt ktgattacag 7560
aatatttaat twwwttwcaw ttttktmcca ttgttttctg gcttaacagt agcggatgac 7620

ES 2 741 138 T3

ttaaatactg dcmsmmamrr attmttaagt gctacagaag gacaaggtct agatgactat 7680
 gaaagggctc acatagcaaa tagtttagat tatgaaaaat ggaacaacag gcagcgttat 7740
 gaatctaata accaggtatt cacagtaatg gggaaatfff taggttatcc aaacttaata 7800
 tcgtatactc ataagatfff tgaagatca tttatctatt ataacggaag actagactta 7860
 atgggagtag atggttacca tatttataat ttatttgatg ataaaatggg ctggtggcat 7920
 ggtcaattgg gaggatttga aggtgtaaga caaaagggct ggagtgtfff aaactactta 7980
 attttgcgaa gagaagctgc aacacgaaat actgcaccga aatffftagc ccaaggagac 8040
 aatcaaattg tcattactca gtatacattg accagtataa gcaactcaagc tataattgaa 8100
 cgagaattga ggaatatttgg ggaatacaat gctcatataa tgcataaggat acaacaagcg 8160
 acaagtcgaa ttggattagt cataaataat gatgaagtgt taacttccgc agagttattg 8220
 gtttacggta aaataccagt atttcgaggg aaattgttac ctttagaaac aaaagatgg 8280
 tctagagtca gtaccgtgac aatgaacag ataccatcct tttctaattc attggctagt 8340
 agtacaacta ctgctttggc ggtaaatcaa cactcagaaa atcctatcga ggttatatct 8400
 caacatcatt tctttagttc ttttgctggc acattagtaa catttgtaa tcctatctta 8460
 ggttttgatc cgattaaata ttctcaattg tcagagagaa ataagaagtt attcttatta 8520
 aggcttattt acaagatcc aagtgttggg ggagtgttg gaactaattt attaaggttt 8580
 tttatatcaa gatttcctga tctttgaca gagacattga catggtggaa aatattggtt 8640
 gagaattcta aagataaaga ggttgtaaa attgctgtag aatgtggaaa tctaagttt 8700
 ggagggatta atgataagac attagctatg ttactcgaag accctatgtc actaaatata 8760
 ccaggaggac tctcaagtga cacgatgata aaaaacaaaa tttatgaagg tcttattcat 8820
 caaatggggc ttaaattgat caaaaatgaa ttggtttag aatctctaac cttctataat 8880
 gattacaaag cacaatttgt aagatggta ttctccataa gaccaatfff cccacgattc 8940
 attagtgaat tttatacatc tacttatttt tatataacag aaagtgtcct tgccatattt 9000
 caaaattcta gaaccattag aaaagttttc tcaaaaagat ttccgaaaga ggtttatctc 9060
 acgatagtta aaggagaaca aatgtctata gatagcttat tgacaaccaa aagagggatt 9120
 gttagggagg ctatttgga atgttcagca acgaaagcag atgaaatgag aaaactatca 9180
 tggggtagag atatggttgg aataacaaca cctcatccag ctgaattcac acaagaatta 9240
 ttatgttcag acgggtgttc agaacctcac attgtagcca aaaaggttat ttactctgat 9300
 agaaaattat ggactaaggg taagatgatg ccttaccttg gtactaaaac caaagagtcc 9360
 acaagtatac ttcaaccatg ggaaaaaaga ttagagattc cattattgag gaaagcatgt 9420
 gatttaagaa aagccattag gtggtttcta gaagataatt caaacttagc aaaatccatt 9480
 tataaaaatt tagaaagtat gacaggaatt gatttaagag aagaacttcg aaactataaa 9540

ES 2 741 138 T3

agaactggta gtagcaaaaca tagattaaga aactcgagag tctccaatga aggtaatccc 9600
 gccataggtt ataataacct aacgtatgtc acagtaacaa ctgatagttt aggaaatatt 9660
 aattccgaaa attatgattt catgtatcaa tctatcttat gctgggtgtgg tgtattatcg 9720
 tcctagcaa ccaatcgata tcgagaccat gagactactc attttcatct taaatgtaat 9780
 gattgcttca gattggttaa agaggaaata ttagaggctc cttcagttta cccatttcoct 9840
 aatgtaagat cctctgtaag gagaatgctt acacaggata ttaaattaa atatctgcca 9900
 cgaatttctg cccctgatga aaacacctgg gatactctgg atgttgatca aaaaagttgg 9960
 catattggga gagctcaagg gtttttgtgg ggattaaatg tatttacc aaactactaaa 10020
 gaggttgagg gtgacatttt cccaacttcc ataacgaaaa aagtcgaacc agaaaattac 10080
 atggatggtt tacacagagg gttttgttta ggagctactc tctccccat gtacacaaga 10140
 tatggatcac tcagcaggat ggctagaaga aaattcgaag gagcatactg ggaaatcgta 10200
 gatgaagcaa tgaaaaactaa tctaccaa atgattgatc amaaaaattt caaacctttc 10260
 ctgagaagga caggaggtga tctaattaa tcttatcctg cacgaaagga agagttggta 10320
 cttgttttaa agaaatggtt cttacataaa atggctctctg aaagaaaaaa caattccata 10380
 tgggaaagta aaagagtaat tgcctttgct gacatggaca ctgaatttgt attgtgtctc 10440
 ttcagattag cggaaagcat actgaattgt tatcaaaatg aagctttatc tgctggtcag 10500
 gctagggctt tagggaatgc aaaagagaca atagatctga tctcaaaata caataactca 10560
 aacattaatg cagatgagat tgagcgattg cagcagatat tgatggcttc tgacctgaaa 10620
 gatcatgaag ttgtagattc acaagctagg catgctgctt ctgacttacc tgaattggca 10680
 aatcagaaa attacaatga agtgattaaa tatgtagaat ttagaggtta tgggtgtaaa 10740
 accataagat tagaatatca acctagtgat ttgatagact ggaagggagg aatggttcaa 10800
 gacctacaag tacctagatt gaagaaccct ttaatttctg gagtcagagt agtgcaatat 10860
 agcacaggag ct cattataa atataaagat atagaaagag aatttcaaat tgctggatgat 10920
 ggtatattcg ctgggtgatgg ttctgggtgg atgggtgcaa accatctgag attacataaa 10980
 tcagcccgcg ttatatthaa ctctaaatta gagttagaag gagaatcttt aaaaggggta 11040
 gccctgcag gacctggagc ttacacggtc tcaggtgaag atggtgtgga aagatgtgtc 11100
 aattacacaa cttgctggga agaagcttct gatctgagtg acgaaaaaac ttggaagaat 11160
 ttttttaggc tcataaaaga gtactcatta gatatagaag tgttttgctg tgatgctgaa 11220
 gtccaagacc catatatcac aaacaaaatt gaatctaata tattgaaata catatctttg 11280
 atccttaata aaagaactgg aactttaatt tacaaaactt atttcaatag attattggat 11340
 cccaatacta taaccactt tttgggaatg tttttccata gatgttacgg atttctcoct 11400

ES 2 741 138 T3

actactcaag gatcctttac ctctgaaatt tacattgtct gtcaatatcc aaagacactt 11460
gactctacaa gcaaaacaga gttaacctat actagtttat ttaatattta tcagaacata 11520
agagtgatgg aaacttatca aatgaattt gatagagcat gtagtttatt gttttctgat 11580
atgacggaag gtcttattga taaaacacca tttttagatc ctgaagaatt ggctattttc 11640
ctgacaacag tgggattgga tacgggggtg gctttactaa tagcagaaca attacagata 11700
tcttgctcaa acaaattaca tccaataatc atattatgga ttttaggctt tataatttcc 11760
agacacttag tgagtataac atcttggtt cgtagaggaa caaattccc tccttctatc 11820
cagttgcaaa aatgtagc tgctctattt ggaatctggt atggagtctc ttatattatg 11880
aatgatgcag agagttactc aaggatttct gtattgtaca atcaagagat ttatttctca 11940
ttaggcttga ctaatatggt atataggaaa aaagatgaca tggaattggg tcaattttca 12000
acttgaaga taggacctgg tgataatagt aaactcatag atatagggcc caaagcgggt 12060
ataactcaga caatgataag agctattgta gtcttgata aaggagaaca tataacttct 12120
attgtgacta aggaagataa agtagaagga gatagaattt taagcttatt tggaaaagga 12180
ttgaatctta aaactttaat ggagcgaaca ggaataaatt atttgcaaat aggggaaaga 12240
aatcctcaag aaattccata tacgtagag gaagaagtat tggaagaagt ggtagaagaa 12300
aatacaggag aatttgatca atcataaaca gataaaggaa atraaaaaaa aaaaaatata 12360
tattgaaata ataaagctta aagaacaaga tcttgaaatt gtgaactact aagtat 12416

<210> 14
<211> 513
<212> PRT
<213> Desconocida

5

<220>
<223> *Virus Bahía Grande*

<400> 14

Met	Ala	Ala	Ala	Ile	Leu	Pro	Val	Ser	Arg	Asn	Met	Pro	Val	Arg	Glu
1				5					10					15	
Arg	Thr	Val	Ala	Gly	Ser	Val	Thr	Ala	Pro	Pro	Val	Gln	Tyr	Pro	Ser
			20					25					30		
Thr	Trp	Phe	Gln	Ala	His	Ala	Gly	Gln	Lys	Val	Ser	Ile	Thr	Ile	Tyr
		35					40					45			
Gln	Asn	Thr	Asn	Ala	Arg	Gln	Ala	Phe	Ser	Arg	Ile	Thr	Gln	Leu	Arg
	50					55					60				
Asn	Asn	Gly	Gln	Trp	Asp	Asp	Lys	Leu	Ile	Ala	Thr	Phe	Met	Lys	Gly
65					70					75					80

ES 2 741 138 T3

Val Leu Asp Glu Asn Ala Glu Trp Phe Gln Ser Pro Pro Leu Ile Glu
85 90 95

Asp Trp Ile Val Asn Glu Ala Val Ile Gly Arg Val Asp Asp Val Val
100 105 110

Ala Pro Thr Ala Leu Ala Gln Trp Glu Glu Val Glu Arg Pro Gln Asn
115 120 125

Met Asp Pro Val Pro Asn Glu Glu Gly Glu Leu Gly Thr Arg Arg Ser
130 135 140

Phe Phe Leu Ala Leu Ile Thr Ile Tyr Arg Gln Val Leu Thr Arg Thr
145 150 155 160

Ile Asn Val Asp Tyr Gly Gln Glu Val Ser Arg Arg Ile Ile Asp Asn
165 170 175

Phe Lys Glu Gln Pro Leu Gly Met Ser Gln Asp Asp Ile Asn Glu Ile
180 185 190

Gln Gly Tyr Glu Ser Lys Glu Arg Leu Thr Thr Asn Tyr Val Lys Ile
195 200 205

Leu Cys Ile Leu Asp Met Phe Phe Asn Lys Phe Gln Thr His Asp Lys
210 215 220

Ser Thr Ile Arg Ile Ala Thr Leu Pro Thr Arg Tyr Arg Gly Cys Ala
225 230 235 240

Ala Phe Thr Ser Tyr Gly Glu Leu Ala Ile Arg Leu Gly Ile Glu Pro
245 250 255

Ile Lys Leu Pro Ser Leu Ile Leu Thr Val Ala Val Ala Lys Asp Phe
260 265 270

Asp Lys Ile Asn Val Asn Gly Glu Gln Ala Glu Gln Leu Asp Gly Tyr
275 280 285

Phe Pro Tyr Gln Leu Glu Leu Gly Leu Val Lys Lys Ser Ala Tyr Ser
290 295 300

Ala Gly Asn Cys Pro Ser Leu Tyr Leu Trp Met His Thr Ile Gly Thr
305 310 315 320

Met Leu His Gln Gln Arg Ser Tyr Arg Ala Asn Val Pro Lys Asn Val

ES 2 741 138 T3

				325						330						335
Pro	Asp	Gln	Met	Gly	Thr	Ile	Asn	Ser	Ala	Ile	Ala	Val	Ala	Met	Gln	
			340					345					350			
Phe	Val	Ala	Gly	Gly	Glu	Phe	Ser	Met	Gln	Phe	Val	Gly	Asp	Ala	Arg	
		355					360					365				
Val	Gln	Glu	Ala	Met	Arg	Glu	Met	Gln	Thr	Ala	Glu	Ala	Glu	Leu	Asn	
	370					375					380					
Glu	Leu	Arg	Met	Ala	Gln	Ala	Arg	Glu	Met	Arg	Ala	Ala	Ala	Arg	Gly	
385					390					395					400	
Asp	Glu	Asp	Glu	Glu	Gly	Ser	Glu	Asp	Gly	Leu	Asp	Asp	Glu	Asn	Asp	
				405					410					415		
Gly	Glu	Gly	Asp	Asp	Glu	Leu	Pro	Ala	Glu	Ile	Glu	Gln	Asn	Pro	Glu	
			420					425					430			
Tyr	Leu	Asn	Arg	Val	Asn	Arg	Ile	Arg	Glu	Leu	Gln	Glu	Asn	Leu	Gln	
		435					440					445				
Gln	Tyr	Asn	Ala	Thr	Val	Gln	Gln	His	Thr	Asn	Ala	Val	Glu	Lys	Ala	
	450					455					460					
Ala	Leu	Arg	Ala	Leu	Ala	Tyr	Leu	Gln	Glu	Asn	Gly	Gly	Ile	Ala	Asp	
465					470					475					480	
Lys	Asp	Lys	Arg	Asp	Leu	Gly	Ile	Arg	Phe	Arg	Arg	Phe	Ala	Asp	Glu	
				485					490					495		
Ala	Glu	Gly	Arg	Val	Gly	Lys	Leu	Leu	Ala	Ser	Leu	Phe	Pro	Ala	Pro	
			500					505					510			

Arg

<210> 15
 <211> 353
 <212> PRT
 <213> Desconocida

5

<220>
 <223> *Virus Bahía Grande*

<400> 15

Met	Ala	Tyr	Ser	Thr	Gly	Leu	Ile	Lys	Gly	Glu	Val	Ser	Gln	Gly	Leu
1				5					10					15	

10

ES 2 741 138 T3

Ser Asn Ala Phe Lys Asp Ala Gly Ile His Gln Ile Glu Leu Asn Lys
 20 25 30

Glu Tyr Asp Asn Leu Ser Ile Leu Gly Ala Asn Met Ser Ala Leu Asn
 35 40 45

Lys Met Phe Asp Thr Glu Asp Glu Gly Leu Ser Asp Thr Asn Thr Asn
 50 55 60

Ser Ser Lys Asn Ser Ile Leu Gln Ala Ser Asp Met Phe Ile Gly Asn
 65 70 75 80

Asp Glu Tyr Glu Ser Asp Asp Ser His His Phe Leu Ser Ser Pro Ser
 85 90 95

Pro Asp Lys Gly Ser Ser Glu Glu Gly Ser Asn Leu Gln Glu Phe Asn
 100 105 110

Phe Gln Ile Pro Arg Asn Lys Val Gly Lys Glu Lys Ala Tyr Arg Arg
 115 120 125

Gly Val Ile Asp Val Leu Asp Phe Leu Gln Arg His Arg Phe Ile Glu
 130 135 140

Glu Phe Arg Met Glu Gly Leu Asn Glu Asp Ile Val Cys Ile Ile Pro
 145 150 155 160

Thr Arg Gly Met Ile Pro Thr Lys Thr Pro Pro Thr Leu Asp Asp Lys
 165 170 175

Ile His Leu Ala Asn Asp Gln Ser Ile Glu Lys Glu Glu Ile Leu Gln
 180 185 190

Lys Asp Lys Thr Ser Lys Pro Asn Lys Gly Ile Lys Gln Pro Asn Lys
 195 200 205

Gln Glu Ala Gln Pro Val Ser Glu Ser Gln Thr Gly Met Lys Glu Asp
 210 215 220

Lys Lys Glu Gln Lys Pro Lys Gln Asn Gln Ile Pro Ile Lys Asn Lys
 225 230 235 240

Gln Glu Asn Glu Asp Ser Lys Glu Val Ala Lys Thr Asn Lys Asp Lys
 245 250 255

Glu Asn Lys Val Ser Lys Gly Ser Met Ser Lys Asn Asp Lys Leu Lys

ES 2 741 138 T3

260 265 270

Glu Gly Asn Ile Thr Val Pro Lys Gln Gly Phe Glu Lys Lys Lys Thr
 275 280 285

Lys Gln Ile Asn Glu Glu Gly His Lys Ser Phe Asp Tyr Ala Asn Thr
 290 295 300

Tyr Gly Thr Lys Val Thr Val Lys Thr Ile Arg Tyr Cys Lys Thr Cys
 305 310 315 320

Asn Pro Asn Thr Arg Lys Asn Ala Thr Val Tyr Leu Asp His Leu Tyr
 325 330 335

Glu Arg His Ser His Glu Val Ala Leu Ile Lys Ser Leu Ala Tyr Pro
 340 345 350

Leu

5 <210> 16
 <211> 220
 <212> PRT
 <213> Desconocida

<220>
 <223> *Virus Bahía Grande*

10 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (160)..(160)
 <223> Xaa puede ser cualquier aminoácido de origen natural

<400> 16

Met Ser Gly Val Met Ser Ile Phe Lys Arg Lys Asp Lys Lys Gly Asn
 1 5 10 15

Glu Gly Ser Lys Ala Leu Ala Ile Pro Asp Glu Lys Ser Val Val Pro
 20 25 30

Ser Ala Pro Pro Asp Ile Ser Ala Met Asp Tyr Gly Arg Phe Gly Leu
 35 40 45

Leu Gly Arg Gln Thr Leu Leu Glu Glu Asp Glu Glu Glu Ser Arg Cys
 50 55 60

Ile Thr Ile Ile Asp Leu Glu Val Asp Leu Gln Ile Glu Val Leu Ser
 65 70 75 80

ES 2 741 138 T3

Asn Arg Glu Thr Arg Leu Val Ile Asp Leu Ile Ala Pro Leu Cys Asn
85 90 95

Leu Gln Thr Asp Tyr Ile Gly Lys Glu Asn Thr Lys Ala Ile Trp Ile
100 105 110

Gly Leu Thr Val Val Ala Ala Phe Gly Val Lys Arg Thr Ile Lys Thr
115 120 125

Lys Asn His His Val Tyr Lys Gly Cys Val Ser Ser Gly Leu Arg Leu
130 135 140

Leu Ile Asp Ser Glu Lys Gln Phe Glu Leu Asp Lys Arg Asn Lys Xaa
145 150 155 160

Ser Gln His Leu Ser Tyr Leu Thr Asn Gly Val Lys Thr Glu Trp Ala
165 170 175

Ile Arg Gly Glu Met Ile Arg Thr Arg Val Pro Tyr Leu Pro Gln Pro
180 185 190

Gly Ser Glu Asp Val Leu Met Phe Leu Ala Gly Met Gly Ile Ser Cys
195 200 205

Tyr Ser Asn Pro Asp Gly His Leu Val Leu Lys Val
210 215 220

<210> 17
<211> 591
<212> PRT
5 <213> Desconocida

<220>
<223> *Virus Bahía Grande*

<400> 17

Met Ile Ser Asn Met Phe Phe Leu Phe Gln Leu Ser Leu Phe Leu Gln
1 5 10 15

Phe Ile Ala Gly Asp Glu Ser Leu Glu Thr Ile Thr Ala Pro Glu Thr
20 25 30

Pro Asp Pro Ile Leu Leu Lys Gly Asp Thr Lys Tyr Leu Phe Leu Val
35 40 45

Pro Ser Ser Val Lys Asn Trp Lys Pro Ala Asp Leu Asn Glu Leu Thr
50 55 60

Cys Pro Pro Leu Ile Ser Lys Pro Asp Thr Ser Glu Met Thr Tyr Phe

ES 2 741 138 T3

Ile Arg Gln Met Thr Ala Thr Lys Lys Leu Ser Phe Tyr Ser Leu Ser
 325 330 335

Phe Leu Glu Pro Lys Ser Ser Ser Arg His Lys Val Phe Arg Ile His
 340 345 350

Asn Lys Thr Leu Glu Tyr Thr Glu Thr Glu Trp His Pro Ile Met Ser
 355 360 365

Phe Asn Phe Asp Glu Pro Asn Lys Ile Gly Ile Asp Lys Asn Gly Lys
 370 375 380

Ser Val Tyr Trp Asn Glu Trp Val Pro Ser Gly Ile Ser Gly Leu Leu
 385 390 395 400

Ser Gly Phe Asn Gly Val Tyr Lys Lys Glu Asn Glu Thr Lys Val Thr
 405 410 415

Ile Ala Arg Leu Glu Thr Ile Lys Glu Asp Tyr Asp Arg Glu Met Met
 420 425 430

Ile Asp His Glu Leu Val Glu Val Glu His Pro Lys Ile Val His Leu
 435 440 445

Lys Arg Glu Asn Ile Thr Gly Ser Arg Val Glu Ile Val Asn Lys Glu
 450 455 460

His Ser Asp Val Ser Gly Trp Leu Ser Ser Val Leu Ser Ser Phe Trp
 465 470 475 480

Gly Lys Ile Met Met Thr Ile Ile Ser Ile Ile Leu Ile Val Ile Ile
 485 490 495

Gly Leu Val Leu Ile Asn Cys Cys Pro Ile Ile Cys Lys Ser Cys Ile
 500 505 510

Lys Arg Tyr Lys Thr Lys Glu Glu Ser Arg Asn Arg His Arg Leu Asp
 515 520 525

Arg Glu Asp Asn Gly Arg Leu Arg Arg Gln His Arg Val Ile Phe Asn
 530 535 540

Asn Gln Ser Asn Asp Glu Glu Asn Ala Ile Glu Met Val Glu Tyr Thr
 545 550 555 560

Asp Thr Pro Arg Pro Leu Arg Pro Ile Pro Asp Ala Thr Thr Ser Asp
 565 570 575

ES 2 741 138 T3

Thr Glu Ser Arg Ser Pro Thr Thr Ala His Ser Phe Phe Asn Arg
 580 585 590

5 <210> 18
 <211> 2175
 <212> PRT
 <213> Desconocida

<220>
 <223> *Virus Bahía Grande*

<400> 18

Met Asp Phe Ser Tyr Glu Gln Leu Leu Asp Pro Ile Asp Val Leu Glu
 1 5 10 15

Glu Glu Leu Tyr Glu Phe Asp Phe Glu Tyr Asp Asp Tyr Thr Asp Asp
 20 25 30

Asp Gln Thr Pro Leu Pro Asn Ile Lys Tyr Lys Asn Leu Glu Gly Lys
 35 40 45

Asp Tyr Asn Leu Asn Ser Pro Leu Ile Ser Asp Val Ile Asp Ser Gly
 50 55 60

Arg Glu Tyr Ile Ile Asn Ser Lys Lys Tyr Phe Ser His Glu Arg Thr
 65 70 75 80

Asn Pro Glu Leu Glu Gln Phe Ser Lys Ala Leu Met Ala Ile Gly Phe
 85 90 95

Ser Arg Phe Asp Leu Arg Lys Ser Ser Glu His His Arg Tyr Met Ser
 100 105 110

Ser Tyr Ile Tyr Gly Asn Glu Lys Lys His Met Lys Ile Glu Ile Ile
 115 120 125

Pro Arg Trp Lys Glu Val Leu Glu Leu Thr Arg Asn Pro Val Glu Val
 130 135 140

Thr Ser His Lys Ile Leu Gly Ser Lys Ser Gln Ser Asp Gln Glu Gly
 145 150 155 160

Tyr Ile Asn Arg Leu Arg Tyr Ile Thr Val Asp Gly Pro His Ala Arg
 165 170 175

Lys Thr Arg Leu His Gln Glu Trp Glu Lys Phe Ser Thr Leu His Tyr
 180 185 190

ES 2 741 138 T3

Ile Thr Tyr Ile Met Asn Ser Lys Ala Phe Ser Asp Asn Lys Asn Trp
195 200 205

Val Arg Glu Val Phe Glu Thr Ile Glu Thr Ser Glu Val Asp Pro Glu
210 215 220

Ile Ile Thr Ile Ile Gly Thr Gly Leu Ser Lys Lys Glu Val Ser Trp
225 230 235 240

Ile Ile Ser Glu Asn Phe Ala Leu Asn Val Arg Thr Gly Leu Phe Val
245 250 255

Ser Lys Asp Phe Leu Leu Met Ile Lys Asp Val Thr Leu Ala Arg Cys
260 265 270

Met Ser Lys Leu Ser Met Ile Asn Arg Lys Ser Pro Asn Thr Thr Tyr
275 280 285

Asp Met Ile Lys Phe Leu Asp Ser Leu Tyr Glu Ser Gly Asp Lys Ile
290 295 300

Leu Thr Arg His Gly Asn Leu Ala Tyr Lys His Ile Lys Leu Leu Glu
305 310 315 320

Ala Ala Cys Leu Glu Arg Trp Asn Gln Leu Gly His Lys Phe Arg Pro
325 330 335

Leu Ile Pro Ile Ser Ser Ser Met Ser Asp His Leu Arg Thr Gln Leu
340 345 350

Glu Glu Asn Gln Asp Leu Tyr Met Val Ser Arg Glu Phe Phe Asp Leu
355 360 365

Ile Gly Lys Ile Glu Asp Pro Trp Val Val Ala Gln Ala Tyr Gly Thr
370 375 380

Phe Arg His Trp Gly His Pro Tyr Ile Asp Tyr Leu Asn Gly Leu Lys
385 390 395 400

Asp Leu Glu Lys Arg Val Asn Glu Asn Ile Lys Ile Asp Lys Asn Tyr
405 410 415

Ala Glu Lys Leu Ala Ser Asp Leu Ala Phe Ile Val Leu Lys Asp Gln
420 425 430

Phe Gly Lys His Lys Arg Trp Phe Ala Lys Pro Asn Lys Glu Leu Asp
435 440 445

ES 2 741 138 T3

Glu Asn Asn Pro Met Arg Lys Cys Ile Glu Asn Asn Val Trp Pro Asn
 450 455 460

Thr Lys Val Ile Leu Asp Phe Gly Asp Asn Trp His Lys Leu Glu Leu
 465 470 475 480

Leu Pro Cys Phe Glu Ile Pro Asp Ala Ile Asp Leu Ser Asp Leu Tyr
 485 490 495

Ser Asp Lys Ala His Ser Met Gln Tyr Ser Glu Val Leu Asn Tyr Val
 500 505 510

Lys Tyr Lys Lys Ser Lys Lys Asn Ile Pro Ala Leu Arg Val Ile Gly
 515 520 525

Thr Leu Leu Glu Lys Glu Asn Pro Asn Ile Lys Glu Phe Leu Gln Lys
 530 535 540

Ile Asn Asp Glu Gly Leu Asp Asp Asp Asp Leu Ile Ile Gly Leu Lys
 545 550 555 560

Ala Lys Glu Arg Glu Leu Lys Asp Lys Gly Arg Phe Phe Ser Leu Met
 565 570 575

Ser Trp Asn Ile Arg Leu Tyr Phe Val Ile Thr Glu Tyr Leu Ile Lys
 580 585 590

Leu His Phe Val Pro Leu Phe Ser Gly Leu Thr Val Ala Asp Asp Leu
 595 600 605

Asn Thr Val Thr Lys Lys Leu Leu Ser Ala Thr Glu Gly Gln Gly Leu
 610 615 620

Asp Asp Tyr Glu Arg Val Tyr Ile Ala Asn Ser Leu Asp Tyr Glu Lys
 625 630 635 640

Trp Asn Asn Arg Gln Arg Tyr Glu Ser Asn Glu Pro Val Phe Thr Val
 645 650 655

Met Gly Lys Phe Leu Gly Tyr Pro Asn Leu Ile Ser Tyr Thr His Lys
 660 665 670

Ile Phe Glu Arg Ser Phe Ile Tyr Tyr Asn Gly Arg Leu Asp Leu Met
 675 680 685

Gly Val Asp Gly Tyr His Ile Tyr Asn Leu Phe Asp Asp Lys Met Val
 690 695 700

ES 2 741 138 T3

Cys Trp His Gly Gln Leu Gly Gly Phe Glu Gly Val Arg Gln Lys Gly
 705 710 715 720
 Trp Ser Val Leu Asn Tyr Leu Ile Leu Arg Arg Glu Ala Ala Thr Arg
 725 730 735
 Asn Thr Ala Pro Lys Phe Leu Ala Gln Gly Asp Asn Gln Ile Val Ile
 740 745 750
 Thr Gln Tyr Thr Leu Thr Ser Lys Ser Thr Gln Ala Ile Ile Glu Arg
 755 760 765
 Glu Leu Arg Asn Ile Trp Glu Asn Asn Ala His Ile Met His Arg Ile
 770 775 780
 Gln Gln Ala Thr Ser Arg Ile Gly Leu Val Ile Asn Asn Asp Glu Val
 785 790 795 800
 Leu Thr Ser Ala Glu Leu Leu Val Tyr Gly Lys Ile Pro Val Phe Arg
 805 810 815
 Gly Lys Leu Leu Pro Leu Glu Thr Lys Arg Trp Ser Arg Val Ser Thr
 820 825 830
 Val Thr Asn Glu Gln Ile Pro Ser Phe Ser Asn Ser Leu Ala Ser Ser
 835 840 845
 Thr Thr Thr Ala Leu Ala Val Asn Gln His Ser Glu Asn Pro Ile Glu
 850 855 860
 Val Ile Ser Gln His His Phe Phe Ser Ser Phe Ala Gly Thr Leu Val
 865 870 875 880
 Thr Phe Val Asn Pro Ile Leu Gly Phe Asp Pro Ile Lys Tyr Ser Gln
 885 890 895
 Leu Ser Glu Arg Asn Lys Lys Leu Phe Leu Leu Arg Leu Ile Tyr Lys
 900 905 910
 Asp Pro Ser Val Gly Gly Val Cys Gly Thr Asn Leu Leu Arg Phe Phe
 915 920 925
 Ile Ser Arg Phe Pro Asp Pro Leu Thr Glu Thr Leu Thr Trp Trp Lys
 930 935 940
 Ile Leu Val Glu Asn Ser Lys Asp Lys Glu Val Val Lys Ile Ala Leu

ES 2 741 138 T3

Ser Ile Leu Gln Pro Trp Glu Lys Arg Leu Glu Ile Pro Leu Leu
1190 1195 1200

Arg Lys Ala Cys Asp Leu Arg Lys Ala Ile Arg Trp Phe Val Glu
1205 1210 1215

Asp Asn Ser Asn Leu Ala Lys Ser Ile Tyr Lys Asn Leu Glu Ser
1220 1225 1230

Met Thr Gly Ile Asp Leu Arg Glu Glu Leu Arg Asn Tyr Lys Arg
1235 1240 1245

Thr Gly Ser Ser Lys His Arg Leu Arg Asn Ser Arg Val Ser Asn
1250 1255 1260

Glu Gly Asn Pro Ala Ile Gly Tyr Asn Asn Leu Thr Tyr Val Thr
1265 1270 1275

Val Thr Thr Asp Ser Leu Gly Asn Ile Asn Ser Glu Asn Tyr Asp
1280 1285 1290

Phe Met Tyr Gln Ser Ile Leu Cys Trp Cys Gly Val Leu Ser Ser
1295 1300 1305

Leu Ala Thr Asn Arg Tyr Arg Asp His Glu Thr Thr His Phe His
1310 1315 1320

Leu Lys Cys Asn Asp Cys Phe Arg Leu Val Lys Glu Glu Ile Leu
1325 1330 1335

Glu Ala Pro Ser Val Tyr Pro Phe Pro Asn Val Arg Ser Ser Val
1340 1345 1350

Arg Arg Met Leu Thr Gln Asp Ile Lys Leu Lys Tyr Leu Pro Arg
1355 1360 1365

Ile Ser Ala Pro Asp Glu Asn Thr Trp Asp Thr Leu Asp Val Asp
1370 1375 1380

Gln Lys Ser Trp His Ile Gly Arg Ala Gln Gly Phe Leu Trp Gly
1385 1390 1395

Leu Asn Val Phe Thr Lys Thr Thr Lys Glu Val Glu Gly Asp Ile
1400 1405 1410

Phe Pro Thr Ser Ile Thr Lys Lys Val Glu Pro Glu Asn Tyr Met
1415 1420 1425

ES 2 741 138 T3

Asp Gly Leu His Arg Gly Phe Cys Leu Gly Ala Thr Leu Ser Pro
 1430 1435 1440
 Met Tyr Thr Arg Tyr Gly Ser Leu Ser Arg Met Ala Arg Arg Lys
 1445 1450 1455
 Phe Glu Gly Ala Tyr Trp Glu Ile Val Asp Glu Ala Met Lys Thr
 1460 1465 1470
 Asn Leu Pro Asn Met Ile Asp His Lys Asn Phe Lys Pro Phe Leu
 1475 1480 1485
 Arg Arg Thr Gly Gly Asp Leu Ile Lys Ser Tyr Pro Ala Arg Lys
 1490 1495 1500
 Glu Glu Leu Val Leu Val Leu Lys Lys Trp Phe Leu His Lys Met
 1505 1510 1515
 Val Ser Glu Arg Lys Asn Asn Ser Ile Trp Glu Ser Lys Arg Val
 1520 1525 1530
 Ile Ala Phe Ala Asp Met Asp Thr Glu Phe Val Leu Cys Leu Phe
 1535 1540 1545
 Arg Leu Ala Glu Ser Ile Leu Asn Cys Tyr Gln Asn Glu Ala Leu
 1550 1555 1560
 Ser Ala Gly Gln Ala Arg Val Leu Gly Asn Ala Lys Glu Thr Ile
 1565 1570 1575
 Asp Leu Ile Ser Lys Tyr Asn Asn Ser Asn Ile Asn Ala Asp Glu
 1580 1585 1590
 Ile Glu Arg Leu Gln Gln Ile Leu Met Ala Ser Asp Leu Lys Asp
 1595 1600 1605
 His Glu Val Val Asp Ser Gln Ala Arg His Ala Ala Ser Asp Leu
 1610 1615 1620
 Pro Glu Leu Ala Lys Ser Glu Asn Tyr Asn Glu Val Ile Lys Tyr
 1625 1630 1635
 Val Glu Phe Arg Gly Tyr Gly Gly Lys Thr Ile Arg Leu Glu Tyr
 1640 1645 1650
 Gln Pro Ser Asp Leu Ile Asp Trp Lys Gly Gly Met Val Gln Asp
 1655 1660 1665

ES 2 741 138 T3

Leu Gln Val Pro Arg Leu Lys Asn Pro Leu Ile Ser Gly Val Arg
 1670 1675 1680

Val Val Gln Tyr Ser Thr Gly Ala His Tyr Lys Tyr Lys Asp Ile
 1685 1690 1695

Glu Arg Glu Phe Gln Ile Ala Gly Asp Gly Ile Phe Ala Gly Asp
 1700 1705 1710

Gly Ser Gly Gly Met Gly Ala Asn His Leu Arg Leu His Lys Ser
 1715 1720 1725

Ala Arg Val Ile Phe Asn Ser Lys Leu Glu Leu Glu Gly Glu Ser
 1730 1735 1740

Leu Lys Gly Leu Ala Pro Ala Gly Pro Gly Ala Tyr Thr Val Ser
 1745 1750 1755

Gly Glu Asp Val Val Glu Arg Cys Val Asn Tyr Thr Thr Cys Trp
 1760 1765 1770

Glu Glu Ala Ser Asp Leu Ser Asp Glu Lys Thr Trp Lys Asn Phe
 1775 1780 1785

Phe Arg Leu Ile Lys Glu Tyr Ser Leu Asp Ile Glu Val Phe Cys
 1790 1795 1800

Cys Asp Ala Glu Val Gln Asp Pro Tyr Ile Thr Asn Lys Ile Glu
 1805 1810 1815

Ser Asn Ile Leu Lys Tyr Ile Ser Leu Ile Leu Asn Lys Arg Thr
 1820 1825 1830

Gly Thr Leu Ile Tyr Lys Thr Tyr Phe Asn Arg Leu Leu Asp Pro
 1835 1840 1845

Asn Thr Ile Thr His Phe Leu Gly Met Phe Phe His Arg Cys Tyr
 1850 1855 1860

Gly Phe Leu Pro Thr Thr Gln Gly Ser Phe Thr Ser Glu Ile Tyr
 1865 1870 1875

Ile Val Cys Gln Tyr Pro Lys Thr Leu Asp Ser Thr Ser Lys Thr
 1880 1885 1890

Glu Leu Thr Tyr Thr Ser Leu Phe Asn Ile Tyr Gln Asn Ile Arg

ES 2 741 138 T3

1895						1900						1905			
Val	Met	Glu	Thr	Tyr	Gln	Asn	Glu	Phe	Asp	Arg	Ala	Cys	Ser	Leu	
1910						1915					1920				
Leu	Phe	Ser	Asp	Met	Thr	Glu	Gly	Leu	Ile	Asp	Lys	Thr	Pro	Phe	
1925						1930					1935				
Leu	Asp	Pro	Glu	Glu	Leu	Ala	Ile	Phe	Leu	Thr	Thr	Val	Gly	Leu	
1940						1945					1950				
Asp	Thr	Gly	Trp	Ala	Leu	Leu	Ile	Ala	Glu	Gln	Leu	Gln	Ile	Ser	
1955						1960					1965				
Cys	Ser	Asn	Lys	Leu	His	Pro	Ile	Ile	Ile	Leu	Trp	Ile	Leu	Gly	
1970						1975					1980				
Phe	Ile	Ile	Ser	Arg	His	Leu	Val	Ser	Ile	Thr	Ser	Trp	Phe	Arg	
1985						1990					1995				
Arg	Gly	Thr	Lys	Phe	Pro	Pro	Ser	Ile	Gln	Leu	Gln	Lys	Met	Leu	
2000						2005					2010				
Ala	Ala	Leu	Phe	Gly	Ile	Trp	Tyr	Gly	Val	Ser	Tyr	Ile	Met	Asn	
2015						2020					2025				
Asp	Ala	Glu	Ser	Tyr	Ser	Arg	Ile	Ser	Val	Leu	Tyr	Asn	Gln	Glu	
2030						2035					2040				
Ile	Tyr	Phe	Ser	Leu	Gly	Leu	Thr	Asn	Met	Val	Tyr	Arg	Lys	Lys	
2045						2050					2055				
Asp	Asp	Met	Glu	Leu	Gly	Gln	Phe	Ser	Thr	Trp	Lys	Ile	Gly	Pro	
2060						2065					2070				
Gly	Asp	Asn	Ser	Lys	Leu	Ile	Asp	Ile	Gly	Pro	Lys	Ala	Gly	Ile	
2075						2080					2085				
Thr	Gln	Thr	Met	Ile	Arg	Ala	Ile	Val	Val	Leu	Tyr	Lys	Gly	Glu	
2090						2095					2100				
His	Ile	Thr	Ser	Ile	Val	Thr	Lys	Glu	Asp	Lys	Val	Glu	Gly	Asp	
2105						2110					2115				
Arg	Ile	Leu	Ser	Leu	Phe	Gly	Lys	Gly	Leu	Asn	Leu	Lys	Thr	Leu	
2120						2125					2130				

ES 2 741 138 T3

Met Glu Arg Thr Gly Ile Asn Tyr Leu Gln Ile Gly Glu Arg Asn
 2135 2140 2145

Pro Gln Glu Ile Pro Tyr Thr Leu Glu Glu Glu Val Leu Glu Glu
 2150 2155 2160

Val Val Glu Glu Asn Thr Gly Glu Phe Asp Gln Ser
 2165 2170 2175

<210> 19
 <211> 519
 <212> PRT
 <213> Desconocida

5

<220>
 <223> Isf-VSV quimérico

<400> 19

Met Thr Ser Val Leu Phe Met Val Gly Val Leu Leu Gly Ala Phe Gly
 1 5 10 15

Ser Thr His Cys Ser Ile Gln Ile Val Phe Pro Ser Glu Thr Lys Leu
 20 25 30

Val Trp Lys Pro Val Leu Lys Gly Thr Arg Tyr Cys Pro Gln Ser Ala
 35 40 45

Glu Leu Asn Leu Glu Pro Asp Leu Lys Thr Met Ala Phe Asp Ser Lys
 50 55 60

Val Pro Ile Gly Ile Thr Pro Ser Asn Ser Asp Gly Tyr Leu Cys His
 65 70 75 80

Ala Ala Lys Trp Val Thr Thr Cys Asp Phe Arg Trp Tyr Gly Pro Lys
 85 90 95

Tyr Ile Thr His Ser Val His Ser Leu Arg Pro Thr Val Ser Asp Cys
 100 105 110

Lys Ala Ala Val Glu Ala Tyr Asn Ala Gly Thr Leu Met Tyr Pro Gly
 115 120 125

Phe Pro Pro Glu Ser Cys Gly Tyr Ala Ser Ile Thr Asp Ser Glu Phe
 130 135 140

Tyr Val Met Leu Val Thr Pro His Pro Val Gly Val Asp Asp Tyr Arg
 145 150 155 160

Gly His Trp Val Asp Pro Leu Phe Pro Thr Ser Glu Cys Asn Ser Asn

ES 2 741 138 T3

Asp Gln Asp Leu Gln Glu Leu Ser Ser Val Asn Pro Val Asp His Pro
 420 425 430

His Val Pro Ile Ala Gln Ala Phe Val Ser Glu Gly Glu Glu Val Phe
 435 440 445

Phe Gly Asp Thr Gly Val Ser Lys Asn Pro Ile Glu Leu Ile Ser Gly
 450 455 460

Trp Phe Ser Ser Trp Lys Ser Ser Ile Ala Ser Phe Phe Phe Thr Ile
 465 470 475 480

Gly Leu Ile Ile Gly Leu Phe Leu Val Leu Arg Val Gly Ile Tyr Leu
 485 490 495

Cys Ile Lys Leu Lys His Thr Lys Lys Arg Gln Ile Tyr Thr Asp Ile
 500 505 510

Glu Met Asn Arg Leu Gly Thr
 515

- <210> 20
 - <211> 1662
 - <212> ADN
 - <213> Desconocido
- 5
- <220>
 - <223> *Virus Maraba*
 - <400> 20

ES 2 741 138 T3

atgaaaaaaaa ctaacaggggt tcaaacactc ttgatcgagg tattgagact ttttctcttt 60
 tgtttcttgg ccttaggagc cactcctaaa tttactatag tattccctca tcatcaaaaa 120
 ggggaattgga agaattgtgcc ttccacatat cattattgcc cttctagttc tgaccagaat 180
 tggcataatg atttgactgg agttagtctt catgtgaaaa ttcccaaaag tcacaaagct 240
 atacaagcag atggctggat gtgccacgct gctaaatggg tgactacttg tgacttcaga 300
 tggtagcggac ccaaatacat cacgcattcc atacactcta tgtcacccac cctagaacag 360
 tgcaagacca gtattgagca gacaaagcaa ggagtttggg ttaatccagg ctttccccct 420
 caaagctgcg gatatgctac agtgacggat gcagaggtgg ttgtttgtaca agcaacacct 480
 catcatgtgt tggttgatga gtacacagga gaatggattg actcacaatt ggtggggggc 540
 aaatgttcca aggaggtttg tcaaacggtt cacaactcga ccgtgtggca tgctgattac 600
 aagattacag ggctgtgcca gtcaaactctg gcatcagtgg atatcacctt cttctctgag 660
 gatgggtcaaa agacgtcttt gggaaaaccg aacactggat tcaggagtaa ttactttgct 720
 tacgaaagtg gagagaaggc atgccgtatg cagtactgca cacaatgggg gatccgacta 780

 ctttctggag tatggtttga attagtggac aaagatctct tccaggcggc aaaattgcct 840
 gaatgtccta gaggatccag tatctcagct ctttctcaga cttctgtgga tgttagtttg 900
 atacaagacg tagagaggat cttagattac tctctatgcc aggagacgtg gagtaagata 960
 cgagccaagc ttcctgtatc tccagtagat ctgagttatc tcgccccaaa aaatccaggg 1020
 agcggaccgg ctttcaactat cattaatggc actttgaaat atttcgaaac aagatacatc 1080
 agagttgaca taagtaatcc catcatccct cacatggtgg gaacaatgag tgggaaccacg 1140
 actgagcgtg aattgtggaa tgattggtat ccatatgaag acgtagagat tgggtccaaat 1200
 ggggtgttga aaactcccac tggtttcaag tttccgctgt acatgattgg gcacggaatg 1260
 ttggattccg atctccacaa atcctcccag gctcaagtct tcgaacatcc acacgcaaag 1320
 gacgctgcat cacagcttcc tgatgatgag actttatfff ttggtgacac aggactatca 1380
 aaaaaccag tagagttagt agaaggctgg ttcagtagct ggaagagcac attggcatcg 1440
 ttctttctga ttataggctt gggggttga ttaatcttca tcattcgaat tattgttgcg 1500
 attcgatcac gaattctgga tccgatacgt aacgctctgc agctgcgggt tgcattaatc 1560
 ttcattcattc gaattattgt tgcgattcgc tataaataca aggggaggaa gacccaaaaa 1620
 attacaatg atgtcgagat gagtcgattg ggaaataaat aa 1662

<210> 21
 <211> 518
 <212> PRT
 <213> Desconocida

<220>
 <223> *Virus Muir Springs*

5 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (384)..(384)
 <223> Xaa puede ser cualquier aminoácido de origen natural

10 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (386)..(386)
 <223> Xaa puede ser cualquier aminoácido de origen natural

<220>
 <221> misc_feature
 <222> (389)..(390)
 <223> Xaa puede ser cualquier aminoácido de origen natural

15 <400> 21
 Met Lys Tyr Pro Val Leu Leu Leu Tyr Gln Asn Gln Ile Leu Leu Lys
 1 5 10 15
 Trp Asn Thr Cys Leu Leu Met Ser Trp Asn Ser Gln Lys His His Glu
 20 25 30

ES 2 741 138 T3

Leu Ala Pro Val Gln Gly Tyr Leu Cys Ser Gly Leu Arg Tyr Lys Val
 35 40 45
 Ile Cys Ser Glu Gly Phe Phe Gly Gln Lys Thr Ile Thr Lys Lys Ile
 50 55 60
 Glu Asn Leu Glu Pro Asp Gln Asn Lys Cys Val Gln Asp Leu Glu Lys
 65 70 75 80
 Phe Ile Asn Asp Asp Tyr Leu Leu Pro Tyr Phe Pro Ser Glu Asp Cys
 85 90 95
 Asn Trp Met Lys Glu Thr Pro Val His Gln Asp Phe Ile Val Tyr Gln
 100 105 110
 Lys His Gln Val Lys Tyr Asp Pro Tyr His Asn Gly Phe Tyr Asp Ala
 115 120 125
 Leu Phe Lys Lys Asp Phe Cys Gln Glu Lys Ile Cys Glu Thr Glu His
 130 135 140
 Asp Gln Thr Ile Trp Ile Thr Asn Gln Glu Leu Lys Gln Glu Cys Thr
 145 150 155 160
 Phe Asn Tyr Pro Val Lys Lys His Val Phe Tyr Lys Arg Asp Tyr Ser
 165 170 175
 Lys Met Ile Ile Asp Tyr Glu Ile Asn Gln Trp Thr Ser Val Glu Asp
 180 185 190
 Gly Cys Leu Ile Arg Tyr Cys Gly Gln Glu Gly Ile Arg Leu Ser Asn
 195 200 205
 Gly Met Phe Phe Val Gly Lys Phe Tyr Lys Leu Ile Ser Asn Leu Pro
 210 215 220
 Ile Cys Pro Glu Gly Thr Lys Ile Ser Tyr Lys Pro Ile Lys Ala Gln
 225 230 235 240
 Leu Asp Glu Ile Glu Asn Glu Ile Ile Leu Asn Gln Glu Arg Leu Leu
 245 250 255
 Cys Leu Asp Ser Ile Arg Gln Met Thr Ala Ser Lys Lys Leu Ser Phe
 260 265 270
 Tyr Ser Leu Ser Phe Leu Glu Pro Lys Ser Met Ser Arg His Lys Val

ES 2 741 138 T3

	275					280					285				
Tyr	Arg	Ile	His	Asn	Asn	Thr	Leu	Glu	Tyr	Thr	Glu	Thr	Glu	Trp	Glu
	290					295					300				
Pro	Ile	Val	Ala	Phe	Asn	Phe	Asn	Gly	Lys	Asn	Gln	Ile	Gly	Val	Asn
305					310					315					320
Lys	Glu	Gly	Lys	Glu	Val	Tyr	Trp	Asn	Glu	Trp	Val	Pro	Ser	Gly	Lys
				325					330					335	
Asp	Gly	Leu	Leu	Ser	Gly	Phe	Asn	Gly	Val	Tyr	Lys	Lys	Val	Asn	Ser
			340					345					350		
Ser	Lys	Ile	Ser	Ile	Ser	Arg	Leu	Glu	Thr	Ile	Lys	Glu	Asp	Tyr	Glu
		355					360					365			
Arg	Glu	Met	Met	Ile	Asp	His	Glu	Leu	Val	Thr	Val	Glu	His	Pro	Xaa
	370					375					380				
Ile	Xaa	His	Leu	Xaa	Xaa	Glu	Asn	Ile	Thr	Gly	Ser	Arg	Val	Glu	Ile
385					390					395					400
Val	Asn	Thr	Glu	His	Ser	Asp	Val	Ser	Gly	Trp	Phe	Ser	Ser	Val	Leu
				405					410					415	
Lys	Ser	Phe	Trp	Gly	Lys	Leu	Met	Met	Thr	Val	Val	Ser	Ile	Ile	Ile
			420					425					430		
Ile	Ile	Ile	Ile	Gly	Leu	Leu	Ile	Ile	Asn	Cys	Gly	Pro	Ile	Ile	Cys
			435				440					445			
Lys	Thr	Cys	Ile	Ser	Ser	Tyr	Lys	Lys	Lys	Lys	Ser	Arg	Arg	Asp	Arg
	450					455					460				
Phe	Arg	Ala	Asp	Arg	Glu	Thr	Glu	Thr	Gly	Leu	Arg	Arg	Gln	His	Arg
465					470					475					480
Val	Val	Phe	His	Asn	Asn	Glu	Thr	Asp	Asp	Glu	Arg	Ala	Ile	Glu	Met
				485					490					495	
Thr	Gly	His	His	Phe	Gly	Lys	His	Val	Arg	Ser	Glu	Leu	Arg	Pro	Arg
			500					505					510		
Arg	His	Pro	Gly	Ser	Gly										
		515													

ES 2 741 138 T3

<210> 22
 <211> 2248
 <212> ADN
 <213> Desconocido

5

<220>
 <223> *Virus Muir Springs*

<400> 22

```

gcggcggggg ctggccatca ctttggcaag cacgtgagat ctgattcgcg gccgcgtcga      60
cgccccctgaa actcctgatc ctatcctcct ccaaggagat aaaacttadc tctttttagt      120
cccttcagag agcaaaaatt ggaaacccgc agatcttaat gaagtatcct gtcctcctct      180
tatatcaaaa ccagatactg ctgaaatgga atacatgtct actgatgtca tggaactcgc      240
aaaaacatca tgaactcgcg cctgtgcaag ggtatttatg ttctggctta agatataaag      300
ttatttggtc tgaaggattc tttggacaaa aaacaataac taagaaaatt gaaaatcttg      360
aacctgatca gaacaaatgt gttcaagatt tagaaaagtt tattaatgac gattatttgc      420
taccctatth cccatcagaa gattgtaatt ggatgaaaga aacaccagtt catcaagatt      480
tcatagttta ccaaaaacat caggttaaat atgatccata ccacaatggc ttttacgatg      540
ctctgttcaa gaaagatttt tgtcaagaga aaatatgtga gacagagcat gatcagacaa      600
tatggataac taaccaagaa ttaaaacaag aatgcacttt taattatccg gttaaaaaac      660
atgtattcta taagagagat tatagcaaaa tgatcatcga ttatgaaatc aaccaatgga      720
cttcagttga ggatggatgt ttgataagat attgtgttca ggaaggaatt agattatcta      780
atgggatggt ctttgttaga aaattttaca aattaatadc gaatctgcca atttgtccag      840
aaggaacca gatcagctac aagcccatta aagcacaatt agatgaaata gaaaatgaaa      900
taattttaaa tcaagaaaga cttttatggt tagattctat acgacaaatg actgcttcta      960
aaaaattadc tttttattca ttatccttct tggagcctaa atccatgagt agacataagg     1020
tctatagaat tcacaataat actttagaat aactgaaac tgaatgggaa cctatagtgg     1080
cttttaattt taatggaaag aatcaaadcg gagtaaataa agaagggag gaagtttatt     1140
ggaatgaatg ggtgcccagt ggaaaagatg gattgctctc aggattcaat ggagtttata     1200
agaaagttaa ttcttccaaa atttcaatat caagattaga aaccattaaa gaagattatg     1260
aaagagaaat gatgatagat catgaattgg ttacagttga gcatcctama attgkccatc     1320
ttaawasaga aaacatmaca ggttctagag tggagatagt taatactgaa cattcagacg     1380
tcagtgggtg gttctcatct gttttaaaga gtttttgggg aaagttgatg atgactgttg     1440
tcagtataat aataattadc atcataggcc tattgattat caattgtggc ccaattatct     1500
gtaaaacttg cattagcagc tataaaaaga aaaagagtag aagagataga tttagagcag     1560
atagagaaac tgaaactgga ctgctcgcac aacatagagt ggtatttcat aataatgaaa     1620
    
```

ES 2 741 138 T3

cagatgatga aagagcaata gagatgactg gccatcactt tggcaagcac gtgagatctg 1680
aattgcggcc gcgtcgacat cctggctcag gatgaacgct ggctgtgtgc ctaatacatg 1740
catgtcgagc gaggttcttt tgaacctagc ggcgaatggg tgagtaacac gtgcttaatc 1800
taccctttag attggaatac ccaatggaaa cattggctaa tgccggatac gcatggaatc 1860
gcatgattcc gttgtgaaag gagcctttaa agctccgcta gaggatgagg gtgcggaaca 1920
ttagttagtt ggtagggtaa tggcctacca agactatgat gtttagccgg gtcgagagac 1980
tgaacggcca cattgggact gagatacggc ccaaactcct acgggaggca gcagtaggga 2040
atattccaca atgagcgaaa gcttgatgga gcgacacagc gtgcacgatg aaggctcttcg 2100
gattgtaaag tgctgttata gggaaagaac acctggttga ggaaatgctt ccaggctgac 2160
ggtaccctgt cagaaagcga tggctaacta tgtgccagca gccgcggtaa tacataggtc 2220
gcaagcgta tccggaatta ttgggcgt 2248

<210> 23
<211> 1948
<212> ADN
<213> Desconocido

5

<220>
<223>VSV

<400> 23

acgcgttttc gccaccatgc cgaagcgccg cgctggattc cggaaggct ggtacgcgcg 60
gcagaggaac tccctgacgc atcaaatgca acgcatgacg ctgagcgagc ccacgagtga 120
gctgcccacc cagaggcaaa ttgaagcgt aatgcgctac gcctggaatg aggcacatgt 180
acaacctccg gtgacaccta ctaacatctt gatcatgtta ttattattgt tacagcgggt 240
acaaaatggg gcagctgcgg ctttttgggc gtacattcct gatccgcaa tgattcaatc 300
cttaggatgg gatagagaaa tagtaccctg atatgttaat gatacgagcc ttttaggagg 360
aaaatcagat attcacattt cccctcagca agcaaatatc tcttttatg gccttaccac 420
tcaatatccc atgtgctttt cttatcaatc gcagcatcct cattgtatac aggtatcagc 480
tgacatatca taccctcgag tgactatctc aggcattgat gaaaaaactg ggaaaaaatc 540
atacgggaac ggatctggac ccctcgacat tccgttttgt gacaagcatt taagcattgg 600
cataggcata gacactcctt ggactttatg tcgagcccgg gtcgcgtcag tatataacat 660
caataatgcc aatgccacct ttttatggga ttgggcacct ggaggaacac ctgattttcc 720
tgaatatcga ggacagcatc cgcctatfff ctctgtgaat accgctcaa tatacctaac 780
ggaactatgg aaacttttgg ctgcttttgg tcatggcaat agtttatatt tacagcccaa 840
tatcagtgga agcaaatatg gtgatgtagg agttacagga tttttatctc ctcgagcttg 900
cgtgccgtat ccattcatgt tgatacaagg ccatatggaa ataactctgt cattaatat 960

ES 2 741 138 T3

ttatcatttg aattgttcta attgcatact gactaattgt atcaggggag tagccaaagg 1020
 agaacagggtt ataatagtaa aacagcctgc ctttgtaatg ctgcccgttg aatagctga 1080
 agcctgggtat gatgaaactg ctttagaatt attacaacgc attaatacgg ctcttagccg 1140
 ccctaagaga ggcctgagcc tgattattct gggatatagta tctttaatca ccctcatagc 1200
 tacagctggt acggcttccg tatcttttagc acagtctatt caagctgcbc acacggtaga 1260
 ctccttatca tataatgtta ctaaagtgat ggggacccaa gaagatattg ataaaaaat 1320
 agaagatagg ctatcagctc tatatgatgt agtcagagtc ttaggagagc aagttcagag 1380
 cattaatttt cgcataaaaa tccaatgtca tgctaactat aatggattt gtgttacaaa 1440
 aaaaccatac aacacttctg attttccatg ggacaaagtg aagaacatt tgcaaggaat 1500
 ttggttcaat actaatctat cgtagacct tttacaactg cataatgaga ttcttgatat 1560
 tgaaaattcg ccgaaggcta cactaaatat agccgatact gttgataatt tcttgcaaaa 1620
 tttattctct aatttcccta gtctccattc gctgtggaaa accctgattg gtgtaggaat 1680
 acttgtgttt attataattg tcgtaatcct tatatttcct tgcctcgtac gtagtagttg 1740
 gaagagctct attgcctctt ttttctttac cataggggta atcattggac tattcttggg 1800
 tctccgagtt ggtatttatc tttgcattaa attaaagcac accaagaaaa gacagattta 1860
 tacagacata gagatgaacc gacttggaac gtaactcaaa tcctcgaggc taggtatgaa 1920
 aaaaactaac agatatcacg gctagcgg 1948

<210> 24
 <211> 2031
 <212> ADN
 <213> Desconocido

5

<220>
 <223> *Virus Ébola*

<400> 24

atgggcggtta caggaatatt gcagttacct cgtgatcgat tcaagaggac atcattcttt 60
 ctttgggtaa ttatcctttt ccaaagaaca ttttccatcc cacttggagt catccacaat 120
 agcacattac aggttagtga tgtcgacaaa ctagtttgtc gtgacaaact gtcacccaca 180
 aatcaattga gatcagttgg actgaatctc gaagggaatg gagtggcaac tgacgtgcca 240
 tctgcaacta aaagatgggg cttcaggtcc ggtgtccac caaaggtggg caattatgaa 300
 gctgggtaat gggctgaaaa ctgctacaat cttgaaatca aaaaacctga cgggagtgag 360
 tgtctaccag cagcgcgaga cgggattcgg ggcttcccc ggtgccggta tgtgcacaaa 420
 gtatcaggaa cgggaccgtg tgccggagac tttgccttcc ataaagaggg tgctttcttc 480
 ctgtatgatc gacttgcttc cacagttatc taccgaggaa cgactttcgc tgaaggtgtc 540

ES 2 741 138 T3

gttgcatttc tgatactgcc ccaagctaag aaggacttct tcagctcaca ccccttgaga 600
 gagccggtca atgcaacgga ggacccgtct agtggctact attctaccac aattagatat 660
 caggctaccg gttttggaac caatgagaca gagtacttgt tcgaggttga caatttgacc 720
 tacgtccaac ttgaatcaag attcacacca cagtttctgc tccagctgaa tgagacaata 780
 tatacaagtg ggaaaaggag caataccacg ggaaaactaa tttggaaggt caaccccgaa 840
 attgatacaa caatcgggga gtgggccttc tgggaaacta aaaaaaacct cactagaaaa 900
 attcgcagtg aagagttgtc tttcacagtt gtatcaaacg gagccaaaaa catcagtggc 960
 cagagtccgg cgcgaacttc ttccgaccca gggaccaaca caacaactga agaccacaaa 1020
 atcatggctt cagaaaattc ctctgcaatg gttcaagtgc acagtcaagg aagggagct 1080
 gcagtgtcgc atctaacaac ccttgccaca atctccacga gtccccaatc cctcacaacc 1140
 aaaccaggtc cggacaacag cacccataat acaccctgtg ataaacttga catctctgag 1200
 gcaactcaag ttgaacaaca tcaccgcaga acagacaacg acagcacagc ctccgacact 1260
 ccctctgcca cgaccgcagc cggaccccca aaagcagaga acaccaacac gagcaagagc 1320
 actgacttcc tggaccccgc caccacaaca agtccccaaa accacagcga gaccgctggc 1380
 aacaacaaca ctcatcacca agataccgga gaagagagtg ccagcagcgg gaagctaggc 1440
 ttaattacca atactattgc tggagtcgca ggactgatca caggcgggag aagaactcga 1500
 agagaagcaa ttgtcaatgc tcaacccaaa tgcaacccta atttacatta ctggactact 1560
 caggatgaag gtgctgcaat cggactggcc tggataccat atttcgggcc agcagccgag 1620
 ggaatttaca tagaggggct aatgcacaat caagatggtt taatctgtgg gttgagacag 1680
 ctggccaacg agacgactca agctcttcaa ctgttcctga gagccacaac tgagctacgc 1740
 accttttcaa tctcaaccg taaggcaatt gatttcttgc tgcagcagcgg gggcggcaca 1800
 tgccacattc tgggaccgga ctgctgtatc gaaccacatg attggaccaa gaacataaca 1860
 gacaaaattg atcagattat tcatgatttt gttgataaaa cccttccgga ccagggggac 1920
 aatgacaatt ggtggacagc atggagacaa tggatacccg caggtattgg agttacaggc 1980
 gttataattg cagttatcgc tttattctgt atatgcaaat ttgtctttta g 2031

<210> 25
 <211> 39
 <212> ADN
 <213> Artificial

5

<220>
 <223> Cebador sintético

<400> 25

ctcagggta tgaaaaaac taacagatat cacggctag 39

10

<210> 26
 <211> 523

ES 2 741 138 T3

<212> PRT
 <213> Desconocida

<220>
 <223> *Virus isfahan*

5 <400> 26

Met Thr Ser Val Leu Phe Met Val Gly Val Leu Leu Gly Ala Phe Gly
 1 5 10 15

Ser Thr His Cys Ser Ile Gln Ile Val Phe Pro Ser Glu Thr Lys Leu
 20 25 30

Val Trp Lys Pro Val Leu Lys Gly Thr Arg Tyr Cys Pro Gln Ser Ala
 35 40 45

Glu Leu Asn Leu Glu Pro Asp Leu Lys Thr Met Ala Phe Asp Ser Lys
 50 55 60

Val Pro Ile Gly Ile Thr Pro Ser Asn Ser Asp Gly Tyr Leu Cys His
 65 70 75 80

Ala Ala Lys Trp Val Thr Thr Cys Asp Phe Arg Trp Tyr Gly Pro Lys
 85 90 95

Tyr Ile Thr His Ser Val His Ser Leu Arg Pro Thr Val Ser Asp Cys
 100 105 110

Lys Ala Ala Val Glu Ala Tyr Asn Ala Gly Thr Leu Met Tyr Pro Gly
 115 120 125

Phe Pro Pro Glu Ser Cys Gly Tyr Ala Ser Ile Thr Asp Ser Glu Phe
 130 135 140

Tyr Val Met Leu Val Thr Pro His Pro Val Gly Val Asp Asp Tyr Arg
 145 150 155 160

Gly His Trp Val Asp Pro Leu Phe Pro Thr Ser Glu Cys Asn Ser Asn
 165 170 175

Phe Cys Glu Thr Val His Asn Ala Thr Met Trp Ile Pro Lys Asp Leu
 180 185 190

Lys Thr His Asp Val Cys Ser Gln Asp Phe Gln Thr Ile Arg Val Ser
 195 200 205

Val Met Tyr Pro Gln Thr Lys Pro Thr Lys Gly Ala Asp Leu Thr Leu

ES 2 741 138 T3

210																			
Lys	Ser	Lys	Phe	His	Ala	His	Met	Lys	Gly	Asp	Arg	Val	Cys	Lys	Met				
225					230					235					240				
Lys	Phe	Cys	Asn	Lys	Asn	Gly	Leu	Arg	Leu	Gly	Asn	Gly	Glu	Trp	Ile				
				245					250					255					
Glu	Val	Gly	Asp	Glu	Val	Met	Leu	Asp	Asn	Ser	Lys	Leu	Leu	Ser	Leu				
			260					265					270						
Phe	Pro	Asp	Cys	Leu	Val	Gly	Ser	Val	Val	Lys	Ser	Thr	Leu	Leu	Ser				
		275					280					285							
Glu	Gly	Val	Gln	Thr	Ala	Leu	Trp	Glu	Thr	Asp	Arg	Leu	Leu	Asp	Tyr				
	290					295					300								
Ser	Leu	Cys	Gln	Asn	Thr	Trp	Glu	Lys	Ile	Asp	Arg	Lys	Glu	Pro	Leu				
305					310					315					320				
Ser	Ala	Val	Asp	Leu	Ser	Tyr	Leu	Ala	Pro	Arg	Ser	Pro	Gly	Lys	Gly				
				325					330					335					
Met	Ala	Tyr	Ile	Val	Ala	Asn	Gly	Ser	Leu	Met	Ser	Ala	Pro	Ala	Arg				
			340					345					350						
Tyr	Ile	Arg	Val	Trp	Ile	Asp	Ser	Pro	Ile	Leu	Lys	Glu	Ile	Lys	Gly				
		355					360					365							
Lys	Lys	Glu	Ser	Ala	Ser	Gly	Ile	Asp	Thr	Val	Leu	Trp	Glu	Gln	Trp				
	370					375					380								
Leu	Pro	Phe	Asn	Gly	Met	Glu	Leu	Gly	Pro	Asn	Gly	Leu	Ile	Lys	Thr				
385					390					395					400				
Lys	Ser	Gly	Tyr	Lys	Phe	Pro	Leu	Tyr	Leu	Leu	Gly	Met	Gly	Ile	Val				
				405					410					415					
Asp	Gln	Asp	Leu	Gln	Glu	Leu	Ser	Ser	Val	Asn	Pro	Val	Asp	His	Pro				
			420					425					430						
His	Val	Pro	Ile	Ala	Gln	Ala	Phe	Val	Ser	Glu	Gly	Glu	Glu	Val	Phe				
		435					440					445							
Phe	Gly	Asp	Thr	Gly	Val	Ser	Lys	Asn	Pro	Ile	Glu	Leu	Ile	Ser	Gly				
	450					455					460								

ES 2 741 138 T3

Trp Phe Ser Asp Trp Lys Glu Thr Ala Ala Ala Leu Gly Phe Ala Ala
465 470 475 480

Ile Ser Val Ile Leu Ile Ile Gly Leu Met Arg Leu Leu Pro Leu Leu
485 490 495

Cys Arg Arg Arg Lys Gln Lys Lys Val Ile Tyr Lys Asp Val Glu Leu
500 505 510

Asn Ser Phe Asp Pro Arg Gln Ala Phe His Arg
515 520

<210> 27

<211> 530

<212> PRT

5 <213> Desconocida

<220>

<223> *Virus Chandipura*

<400> 27

ES 2 741 138 T3

Met Thr Ser Ser Val Thr Ile Ser Val Val Leu Leu Ile Ser Phe Ile
 1 5 10 15

Thr Pro Ser Tyr Ser Ser Leu Ser Ile Ala Phe Pro Glu Asn Thr Lys
 20 25 30

Leu Asp Trp Lys Pro Val Thr Lys Asn Thr Arg Tyr Cys Pro Met Gly
 35 40 45

Gly Glu Trp Phe Leu Glu Pro Gly Leu Gln Glu Glu Ser Phe Leu Ser
 50 55 60

Ser Thr Pro Ile Gly Ala Thr Pro Ser Lys Ser Asp Gly Phe Leu Cys
 65 70 75 80

His Ala Ala Lys Trp Val Thr Thr Cys Asp Phe Arg Trp Tyr Gly Pro
 85 90 95

Lys Tyr Ile Thr His Ser Ile His Asn Ile Lys Pro Thr Arg Ser Asp
 100 105 110

Cys Asp Thr Ala Leu Ala Ser Tyr Lys Ser Gly Thr Leu Val Ser Pro
 115 120 125

Gly Phe Pro Pro Glu Ser Cys Gly Tyr Ala Ser Val Thr Asp Ser Glu
 130 135 140

Phe Leu Val Ile Met Ile Thr Pro His His Val Gly Val Asp Asp Tyr

ES 2 741 138 T3

Thr Ala Gly Gly Tyr Lys Phe Pro Trp His Leu Ile Gly Met Gly Ile
 405 410 415

Val Asp Asn Glu Leu His Glu Leu Ser Glu Ala Asn Pro Leu Asp His
 420 425 430

Pro Gln Leu Pro His Ala Gln Ser Ile Ala Asp Asp Ser Glu Glu Ile
 435 440 445

Phe Phe Gly Asp Thr Gly Val Ser Lys Asn Pro Val Glu Leu Val Thr
 450 455 460

Gly Trp Phe Thr Ser Trp Lys Glu Ser Leu Ala Ala Gly Val Val Leu
 465 470 475 480

Ile Leu Val Val Val Leu Ile Tyr Gly Val Leu Arg Cys Phe Pro Val
 485 490 495

Leu Cys Thr Thr Cys Arg Lys Pro Lys Trp Lys Lys Gly Val Glu Arg
 500 505 510

Ser Asp Ser Phe Glu Met Arg Ile Phe Lys Pro Asn Asn Met Arg Ala
 515 520 525

Arg Val
 530

- <210> 28
- <211> 611
- <212> PRT
- <213> Desconocida

5

- <220>
- <223> *retrovirus Jaagsietke de oveja*

<400> 28

Met Pro Lys Arg Arg Ala Gly Phe Arg Lys Gly Trp Tyr Ala Arg Gln
 1 5 10 15

Arg Asn Ser Leu Thr His Gln Met Gln Arg Met Thr Leu Ser Glu Pro
 20 25 30

Thr Ser Glu Leu Pro Thr Gln Arg Gln Ile Glu Ala Leu Met Arg Tyr
 35 40 45

Ala Trp Asn Glu Ala His Val Gln Pro Pro Val Thr Pro Thr Asn Ile
 50 55 60

Leu Ile Met Leu Leu Leu Leu Leu Gln Arg Ile Gln Asn Gly Ala Ala

ES 2 741 138 T3

Ser Asn Cys Ile Leu Thr Asn Cys Ile Arg Gly Val Ala Lys Gly Glu
 325 330 335

Gln Val Ile Ile Val Lys Gln Pro Ala Phe Val Met Leu Pro Val Glu
 340 345 350

Ile Thr Glu Glu Trp Tyr Asp Glu Thr Ala Leu Glu Leu Leu Gln Arg
 355 360 365

Ile Asn Thr Ala Leu Ser Arg Pro Lys Arg Gly Leu Ser Leu Ile Ile
 370 375 380

Leu Gly Ile Val Ser Leu Ile Thr Leu Ile Ala Thr Ala Val Thr Ala
 385 390 395 400

Ser Val Ser Leu Ala Gln Ser Ile Gln Val Ala His Thr Val Asp Ser
 405 410 415

Leu Ser Ser Asn Val Thr Lys Val Met Gly Thr Gln Glu Asn Ile Asp
 420 425 430

Lys Lys Ile Glu Asp Arg Leu Pro Ala Leu Tyr Asp Val Val Arg Val
 435 440 445

Leu Gly Glu Gln Val Gln Ser Ile Asn Phe Arg Met Lys Ile Gln Cys
 450 455 460

His Ala Asn Tyr Lys Trp Ile Cys Val Thr Lys Lys Pro Tyr Asn Thr
 465 470 475 480

Ser Asp Phe Pro Trp Asp Lys Val Lys Lys His Leu Gln Gly Ile Trp
 485 490 495

Phe Asn Thr Thr Val Ser Leu Asp Leu Leu Gln Leu His Asn Glu Ile
 500 505 510

Leu Asp Ile Glu Asn Ser Pro Lys Ala Thr Leu Asn Ile Ala Asp Thr
 515 520 525

Val Asp Asn Phe Leu Gln Asn Leu Phe Ser Asn Phe Pro Ser Leu His
 530 535 540

Ser Leu Trp Arg Ser Ile Ile Ala Met Gly Ala Val Leu Thr Phe Val
 545 550 555 560

Leu Ile Ile Ile Cys Leu Ala Pro Cys Leu Ile Arg Ser Ile Val Lys
 565 570 575

ES 2 741 138 T3

Glu Phe Leu His Met Arg Val Leu Ile His Lys Asn Met Leu Gln His
580 585 590

Gln His Leu Met Glu Leu Leu Asn Asn Lys Glu Arg Gly Ala Ala Gly
595 600 605

Asp Asp Pro
610

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un rhabdovirus oncolítico Farmington para su uso en un procedimiento para el tratamiento del cuerpo humano mediante cirugía o terapia.
- 5 2. Una composición farmacéutica que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un rhabdovirus oncolítico Farmington para su uso en el tratamiento del cáncer en un sujeto en el que la composición se va a administrar al sujeto en una cantidad eficaz para tratar el cáncer.
3. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2, en la que el cáncer es metastático.
- 10 4. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2, en la que la composición se administra mediante administración intraperitoneal, intravascular, intramuscular, intratumoral, subcutánea o intranasal, en particular en la que la composición se administra mediante administración intratumoral o intravascular.
5. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2, en la que la composición se administra múltiples veces.
- 15 6. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende adicionalmente la administración de una terapia anticáncer adicional.
7. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 6, en la que la terapia anticáncer adicional es quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.
8. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 6, en la que la terapia anticáncer adicional comprende la administración al sujeto de un segundo virus oncolítico.
- 20 9. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 8, en la que el segundo virus oncolítico es un virus vaccinia, herpesvirus, adenovirus, alfavirus, parvovirus o rhabdovirus.
10. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 9, en la que el segundo virus oncolítico es un virus vaccinia.
- 25 11. Un rhabdovirus oncolítico Farmington para su uso en el tratamiento del cáncer en un sujeto en el que el rhabdovirus oncolítico Farmington es para administrar al sujeto en una cantidad eficaz para tratar el cáncer.
12. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2 o el rhabdovirus Farmington para su uso de acuerdo con la reivindicación 11, en los que el cáncer se selecciona de entre el grupo que consiste en cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer del sistema nervioso central, cáncer pancreático, cáncer prostático, cáncer renal, cáncer de huesos, cáncer testicular, cáncer de cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gastrointestinal, linfoma, cáncer de colon, melanoma, y cáncer de vejiga, en particular en el que el cáncer se selecciona de entre el grupo que consiste en cáncer de mama, sistema nervioso central, melanoma, pulmón, ovárico, pancreático, de colon, de próstata y renal.
- 30 13. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2 o el rhabdovirus Farmington para su uso de acuerdo con la reivindicación 11, en los que el sujeto es un ser humano.
- 35 14. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 2 o el rhabdovirus Farmington para su uso de acuerdo con la reivindicación 11, en los que el cáncer es un cáncer del sistema nervioso central.

FIG. 1

Citotoxicidad
Panel NCI60
96h

Leyenda

EC₅₀

- 1 = <0,001
- 2 = <0,01
- 3 = <0,1
- 4 = <1
- 5 = <10
- 6 = >10
- 7 = >>10

Orga-nismo	Fuente	Linea celular	Dia	MS	BG	NGG	TIB	FMT	MRE	CRJ	VSVI	R	VV
Humano	Hueso, Osteosarcoma	U2OS	Dia 4	3	3	3	4	1	1	1	2	2	2
Humano	Mama	MCF7 (2do)	Dia 4	3	3	7	3	2	2	1	2	2	2
Humano	Mama	MDA-MB-23	Dia 4	4	4	7	4	2	1	1	1	1	2
Humano	Mama	MDA-MB-435	Dia 4	4	3	7	3	2	2	1	2	3	3
Humano	Mama	NCI/ADR-RES	Dia 4	7	5	7	3	3	2	4	2	2	2
Humano	Mama	T47D	Dia 4	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
Humano	SNC	SF268	Dia 4	4	4	7	4	1	2	1	2	3	3
Humano	SNC	SF295	Dia 4	7	5	4	3	3	2	2	2	3	3
Humano	SNC	SF539	Dia 4	5	5	7	3	1	1	1	1	1	2
Humano	SNC	SNB19	Dia 4	2	1	7	4	1	1	1	1	1	3
Humano	SNC	SNB75	Dia 4	X	X	X	X	1	2	2	1	1	1
Humano	SNC	U118	Dia 4	4	3	7	4	1	2	1	2	1	2
Humano	SNC	U343	Dia 4	4	3	7	4	1	1	1	1	1	2
Humano	SNC	U373	Dia 4	2	1	7	3	1	1	1	1	1	2
Humano	Colon	COLO 205	Dia 4	X	7	X	7	7	3	3	3	3	3
Humano	Colon	HCT116	Dia 4	3	3	7	3	1	2	1	2	2	2
Humano	Colon	HCT15	Dia 4	7	7	7	7	7	2	3	3	3	3
Humano	Colon	HT29	Dia 4	X	X	X	X	X	2	1	2	3	3
Humano	Colon	SW620	Dia 4	X	3	X	5	2	2	1	1	1	4
Humano	Melanoma	M14	Dia 4	3	7	3	3	3	3	1	3	1	1
Humano	Melanoma	MALME3M	Dia 4	3	3	4	2	3	3	3	3	1	1
Humano	Melanoma	SKMEL28	Dia 4	4	4	7	3	1	3	1	2	1	1
Humano	Melanoma	UACC257	Dia 4	3	3	7	3	2	2	1	2	1	1
Humano	Melanoma	UACC62	Dia 4	3	3	7	7	2	3	4	2	1	1
Humano	Pulmón	A549	Dia 4	3	3	X	3	1	2	3	1	3	3
Humano	Pulmón	HOP62	Dia 4	7	3	7	3	1	2	3	2	1	1
Humano	Pulmón	HOP92	Dia 4	7	7	7	7	2	3	3	2	2	2
Humano	Pulmón	NCI-H226	Dia 4	3	3	7	3	3	2	4	4	3	3
Humano	Pulmón	NCI-H23	Dia 4	X	3	X	3	3	2	1	1	1	2
Humano	Ovárico	OVCAR3	Dia 4	3	3	7	3	3	3	2	2	2	2
Humano	Ovárico	OVCAR4	Dia 4	X	X	X	X	2	3	1	3	3	3
Humano	Ovárico	OVCAR8	Dia 4	X	2	X	3	1	1	1	1	1	1
Humano	Páncreas	PANC-1	Dia 4	2	1	3	4	1	1	1	1	1	1
Humano	Próstata	DU145	Dia 4	3	7	7	3	3	3	3	3	2	2
Humano	Próstata	PC3	Dia 4	7	7	7	7	3	2	3	3	2	2
Humano	Renal	786-O	Dia 4	3	3	X	4	1	3	3	1	3	3
Humano	Renal	ACHN	Dia 4	3	4	7	3	1	2	1	1	1	3
Humano	Renal	SN12C	Dia 4	3	3	7	2	3	4	2	2	2	2
Humano	Renal	TK10	Dia 4	7	7	7	1	2	1	1	1	2	2
Humano	Carcinoma de piel	A431	Dia 4	7	7	7	4	3	3	4	2	2	2
Mono	Riñón, Normal	CV-1	Dia 4	4	3	X	3	1	1	1	1	1	2
Mono	Riñón, Normal	VERO	Dia 4	7	4	7	4	1	1	1	1	1	3
Mono	Mama	EMT6	Dia 4	4	3	7	4	3	1	3	1	4	4
Mono	Mama	4T1	Dia 4	3	4	1	4	2	2	3	2	3	3
Mono	Colon	CT26	Dia 4	4	4	3	3	1	1	1	1	4	4
Mono	Glioma	GL261	Dia 4	X	X	X	X	2	2	2	2	2	2

Las cepas estrechamente relacionadas se comportan de manera diferente en las mismas células

Los mismos virus se comportan de manera diferente en las mismas células

FIG. 2

FIGs. 3A-3B

FIG. 4

Evolución dirigida de Bahía Grande

Objetivo: Selección de variantes con replicación más rápida en GBM humano

Evolución dirigida

FIG. 6

FIG. 7

Bahía Grande y Muir Springs no muestran neurotoxicidad

Toxicidad intracraneal

	I.C (LD, pfu)
WT VSV	<10
VSV delta M51	<10
Bahia Grande	>1e ⁷
Muir Springs	>1e ⁷
Bahia Grande P6	>1e ⁷

FIG. 8

FIG. 9

Infectividad del VSV WT G-menos Pseudotipado con varias G a las 24 h de MOI 1

FIG. 10

Curva de crecimiento de una etapa con el VSV WT Isfahan y RVR IsfG1

FIG. 11

**Ensayo MTS
48 h MOI 0,01**

FIG. 12

FIGs. 13A-13C

FIG. 14

Curva de crecimiento de una etapa con VSV WT, Chandipura y RVR Cha G1

FIG. 15

FIG. 16

Curva de crecimiento de una etapa con VSV WT, Maraba y RVR Mar G1

FIG. 17

FIG. 18