19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 760 699**

51 Int. Cl.:

A61K 39/00 (2006.01)

A61K 39/39 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **16.06.2016 PCT/EP2016/001004**

87 Fecha y número de publicación internacional: **22.12.2016 WO16202459**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **16.06.2016 E 16736381 (1)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **06.11.2019 EP 3310379**

54 Título: **Vacuna de ADN dirigida al VEGFR-2 para terapia de combinación**

30 Prioridad:

18.06.2015 EP 15001803

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

14.05.2020

73 Titular/es:

**VAXIMM AG (100.0%)
Hochbergerstrasse 60c
4057 Basel, CH**

72 Inventor/es:

LUBENAU, HEINZ

74 Agente/Representante:

SÁNCHEZ SILVA, Jesús Eladio

ES 2 760 699 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Vacuna de ADN dirigida al VEGFR-2 para terapia de combinación

5 Campo de la invención

La presente invención se refiere a una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF, para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos otro agente contra el cáncer, particularmente de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4. La presente invención se refiere, además, a una composición farmacéutica que comprende una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF para su uso en terapia, en donde la composición farmacéutica comprende, además, al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión eucariota adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, y en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.

20 Antecedentes de la invención

El hallazgo de que los tumores pueden ser inmunogénicos condujo al desarrollo de una serie de inmunoterapias contra el cáncer diseñadas para emplear el sistema inmune para eliminar selectivamente las células malignas mientras se conserva el tejido normal. Sin embargo, los beneficios de supervivencia de solamente la vacunación contra los antígenos tumorales aún son modestos. Las vacunas contra el cáncer enfrentan numerosos desafíos, uno de ellos es el microambiente inmunosupresor. La vasculatura tumoral anormal crea un microambiente hipóxico que polariza las células inflamatorias hacia la supresión inmune. Además, los tumores alteran sistémicamente la proliferación, diferenciación, y función de las células inmunes mediante la secreción de factores de crecimiento y citoquinas.

30 Para la cura del cáncer, la erradicación completa de las células madre del cáncer es de importancia crucial. Los numerosos mecanismos de escape inmunitario de los tumores humanos permanecen como un desafío importante en la inmunoterapia contra el cáncer. Por lo tanto, existe una gran necesidad de enfoques de terapia contra el cáncer mejorados, que no se encuentran hasta ahora.

35 El documento WO 2014/005683 describe una cepa mutante atenuada de Salmonella que comprende una molécula de ADN recombinante que codifica una proteína receptora de VEGF para su uso en la inmunoterapia contra el cáncer, particularmente para su uso en el tratamiento del cáncer pancreático.

40 El documento WO 2014/173542 describe una cepa atenuada de Salmonella que comprende una molécula de ADN recombinante que codifica la proteína tumoral de Wilms (WT1) para su uso en la inmunoterapia contra el cáncer.

El documento WO 2013/09189 describe un método para crecer cepas mutantes atenuadas de Salmonella typhi que carecen de actividad de galactosa epimerasa y que portan una molécula de ADN recombinante.

45 Objeto de la invención

En vista de la técnica anterior, es un objeto de la presente invención proporcionar novedosas terapias contra el cáncer. Dichas terapias novedosas ofrecerían grandes ventajas para mejorar las opciones de tratamiento para pacientes con cáncer.

50 Resumen de la invención

En un aspecto, la presente invención se refiere a una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF, para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.

60 Sorprendentemente, se encontró que la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF aumenta fuertemente la eficacia de las terapias contra el cáncer que se basan en el empleo del sistema inmunitario del paciente, tal como el tratamiento con vacunas contra el cáncer que codifican antígenos tumorales o antígenos de estroma tumoral, tratamiento células T modificadas por ingeniería genética que se diseñan para atacar a las células tumorales, tratamiento con anticuerpos biespecíficos diseñados para mediar la unión de las células inmunes a las células tumorales y tratamiento con inhibidores de punto de control que tienen como objetivo prevenir la inhibición inducida por el tumor de la proliferación de células T.

- 5 Sorprendentemente, se observó que la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF conduce a una infiltración significativamente aumentada del tumor por las células T CD8⁺ y CD4⁺. Además, la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF puede conducir a un aumento en el número de células T CD8⁺ y CD4⁺ activadas y/o a una reducción en el número de células linfoides inmunosupresoras tales como las células Treg. Sin desear limitarse a la teoría, se cree que la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF mejora la eficacia de las inmunoterapias contra el cáncer al mejorar el compromiso de las células T en la erradicación del tumor. Se demostró que la combinación de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF con otros agentes contra el cáncer, tales como las células T modificadas por ingeniería genética, inhibidores de punto de control, anticuerpos biespecíficos y vacunas de ADN que codifican antígenos tumorales o antígenos del estroma tumoral tienen efectos sinérgicos sobre las respuestas de células T específicas contra el tumor y la supervivencia general.
- 10 En realizaciones particulares, el tratamiento comprende, además, la administración de al menos una vacuna de ADN que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral.
- 15 En realizaciones particulares, el casete de expresión y el casete de expresión adicional son un casete de expresión eucariota que comprende un promotor de CMV.
- 20 En realizaciones particulares, la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.
- 25 En realizaciones particulares, el VEGFR-2 humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1.
- 30 En realizaciones particulares, la molécula de ADN y la molécula de ADN adicional comprenden el gen de resistencia al antibiótico kanamicina, el ori pMB1, y un promotor de CMV.
- 35 En realizaciones particulares, la molécula de ADN y la molécula de ADN adicional comprenden la secuencia de ADN como se encuentra en la SEQ ID NO 2.
- 40 En realizaciones particulares, el antígeno tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de Salmonella se selecciona del grupo que consiste en la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, Mesotelina humana (MSLN) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CEA humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 5 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 7 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma y CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 8 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, y el antígeno de estroma tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de Salmonella se selecciona del grupo que consiste en proteína de activación de fibroblastos humanos (FAP).
- 45 En realizaciones particulares, la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3, Mesotelina humana (MSLN) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4, CEA humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 5, y CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6, SEQ ID NO 7 o SEQ ID NO 8.
- 50 En realizaciones particulares, la cepa atenuada de Salmonella se administra simultáneamente con o antes de dicho al menos un inhibidor de punto de control.
- 55 En realizaciones particulares, el tratamiento se acompaña con quimioterapia y/o radioterapia. Particularmente, la cepa atenuada de Salmonella se administra antes o durante el ciclo de tratamiento con quimioterapia o radioterapia. En otras realizaciones particulares, la cepa atenuada de Salmonella se administra antes y durante el ciclo de tratamiento con quimioterapia o radioterapia.
- 60 En realizaciones particulares, la cepa atenuada de Salmonella y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella se administran por vía oral.
- 65 En realizaciones particulares, el cáncer se selecciona de cáncer colorrectal, cáncer pancreático, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, mesotelioma, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, glioblastoma, cáncer gástrico, cáncer hepatocelular, cáncer de células renales, cáncer de próstata, y cáncer cervical.

En realizaciones particulares, la dosis única de la cepa atenuada de Salmonella y de la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella comprende de alrededor de 10^5 a alrededor de 10^{11} , particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^{10} , más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^9 , más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^8 , lo más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^7 unidades formadoras de colonias (CFU).

En realizaciones particulares, el tratamiento es inmunoterapia individualizada contra el cáncer que comprende la etapa de evaluar el patrón de expresión y/o la respuesta preinmune contra dicho antígeno tumoral en un paciente.

En un aspecto adicional, la presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde la composición farmacéutica comprende, además, al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, y en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.

En realizaciones particulares, el casete de expresión y el casete de expresión adicional son un casete de expresión eucariota que comprende un promotor de CMV.

En realizaciones particulares, la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.

En realizaciones particulares, el VEGFR-2 humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1.

Descripción detallada de la invención

La presente invención puede entenderse más fácilmente por referencia a la siguiente descripción detallada de la invención y a los ejemplos incluidos en la misma.

En un aspecto, la presente invención se refiere a una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF, para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.

Las proteínas receptoras de VEGF son receptores de tirosina quinasas específicas de células endoteliales que pueden unirse por el factor de crecimiento endotelial vascular del ligando (VEGF) que hace que se dimericen y se activen mediante la transfosforilación. La familia de factores de crecimiento VEGF (Kd 75-760 pM) abarca 6 miembros de la familia, VEGF-A (también conocido como VEGF) a través de E y PLGF (factor de crecimiento placentario, también conocido como PGF o PIGF-2). Los factores de crecimiento VEGF regulan el crecimiento y la diferenciación de múltiples componentes del sistema vascular, especialmente los vasos sanguíneos y linfáticos. Hay tres subtipos principales de VEGFR, VEGFR-1 (o FLT1), VEGFR-2 (o KDR, FLK1) y VEGFR-3 (o FLT4). Los receptores de VEGF unidos a la membrana tienen una porción extracelular que consta de 7 dominios similares a inmunoglobulina, una única región que se expande por la transmembrana y una porción intracelular que contiene un dominio dividido de tirosina-quinasa. Las transcripciones de VEGFR también dan lugar a variantes de empalme alternativas que codifican proteínas receptoras de VEGF solubles.

De acuerdo con la invención, la cepa atenuada de Salmonella funciona como el portador bacteriano de la molécula de ADN recombinante que comprende un casete de expresión que codifica una proteína receptora de VEGF para la administración de dicha molécula de ADN recombinante en una célula diana. Dicho vector de administración que comprende una molécula de ADN que codifica un antígeno heterólogo, tal como una proteína receptora de VEGF - un antígeno de estroma tumoral, se denomina vacuna de ADN.

En el contexto de la presente invención, el término "vacuna" se refiere a un agente que es capaz de inducir una respuesta inmune en un sujeto tras su administración. Una vacuna preferiblemente puede prevenir, mejorar o tratar una enfermedad.

La cepa de Salmonella viva atenuada de acuerdo con la presente invención lleva establemente una molécula de ADN recombinante que codifica una proteína receptora de VEGF. Puede usarse como vehículo para la administración oral de esta molécula de ADN recombinante.

La inmunización genética podría ser ventajosa sobre la vacunación convencional. El ADN diana puede detectarse durante un período de tiempo considerable, actuando así como un depósito del antígeno. Los restos de secuencia en algunos plásmidos, como las islas GpC, son inmunoestimuladores y pueden funcionar como adyuvantes promovidos por la inmunoestimulación debido a LPS y otros componentes bacterianos.

5 Los vectores de Salmonella atenuada viva producen sus propios factores inmunomoduladores tales como lipopolisacáridos (LPS) *in situ* lo que puede constituir una ventaja sobre otras formas de administración tales como la lipopolisacáridos (LPS) *in situ* lo que puede constituir una ventaja sobre otras formas de administración tales como la microencapsulación. Además, la vacuna mucosal de acuerdo con la presente invención tiene un modo de acción intralinfático, lo que demuestra ser beneficioso. Después de la ingestión de la vacuna atenuada de acuerdo con la presente invención, las bacterias modificadas invaden los macrófagos y otras células en los parches de Peyer del intestino. Las bacterias son absorbidas por estas células fagocíticas. Debido a sus mutaciones atenuantes, las bacterias de la cepa *S. typhi* Ty21 no pueden persistir en estas células fagocíticas, y mueren en este momento. Las moléculas de ADN recombinante se liberan y posteriormente se transfieren al citosol de las células inmunes fagocíticas, ya sea a través de un sistema de transporte específico o por filtración endosómica. Finalmente, las moléculas de ADN recombinante entran en el núcleo, donde se transcriben, y conducen a la expresión masiva de la proteína receptora de VEGF en el citosol de las células fagocíticas. Las células infectadas sufren apoptosis, se cargan con el antígeno del receptor de VEGF, y se absorben y procesan por el sistema inmune intestinal. Las señales de peligro de la infección bacteriana sirven como un fuerte adyuvante en este proceso, lo que conduce a una fuerte respuesta de anticuerpos y de células T CD8+ específicas para el antígeno diana a nivel de los compartimientos tanto sistémicos como mucosales. La respuesta inmune alcanza su punto máximo alrededor de diez días después de la vacunación. La falta de respuesta contra el portador permite reforzar con la misma vacuna muchas veces.

En el contexto de la presente invención, el término "atenuada" se refiere a una cepa bacteriana de virulencia reducida en comparación con la cepa bacteriana parental, que no porta la mutación atenuante. Las cepas bacterianas atenuadas han perdido preferiblemente su virulencia, pero retienen su capacidad para inducir inmunidad protectora. La atenuación se puede lograr mediante la delección de varios genes, incluidos los genes de virulencia, reguladores y metabólicos. Las bacterias atenuadas se pueden encontrar de forma natural o se pueden producir artificialmente en el laboratorio, por ejemplo, mediante la adaptación a un nuevo medio o cultivo celular o se pueden producir mediante tecnología de ADN recombinante. La administración de alrededor de 10^{11} CFU de la cepa atenuada de Salmonella de acuerdo con la presente invención preferiblemente causa salmonelosis en menos del 5%, con mayor preferencia menos del 1%, con la máxima preferencia menos del 1% de los sujetos.

En el contexto de la presente invención, el término "comprende" o "que comprende" significa "que incluye, pero no se limita a". El término está destinado a ser abierto, para especificar la presencia de cualesquiera características, elementos, números enteros, etapas o componentes declarados, pero no para impedir la presencia o adición de una o más características, elementos, números enteros, etapas, componentes o grupos adicionales de los mismos. El término "que comprende" incluye así los términos más restrictivos "que consiste en" y "que consiste esencialmente en". En una realización, el término "que comprende" tal y como se usa en toda la solicitud y en particular en las reivindicaciones puede reemplazarse por el término "que consiste en".

La molécula de ADN que comprende un casete de expresión que codifica una proteína receptora de VEGF es adecuadamente una molécula de ADN recombinante, es decir, una construcción de ADN modificada por ingeniería genética, preferiblemente compuesta de piezas de ADN de diferente origen. La molécula de ADN puede ser un ácido nucleico lineal, o preferiblemente, un plásmido de ADN circular generado mediante la introducción de un marco de lectura abierto que codifica una proteína receptora de VEGF en un plásmido vector de expresión.

En el contexto de la presente invención, el término "casete de expresión" se refiere a una unidad de ácido nucleico que comprende al menos un marco de lectura abierto (ORF) bajo el control de secuencias reguladoras que controlan su expresión. Los casetes de expresión pueden mediar preferiblemente la transcripción del marco de lectura abierto incluido que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, tal como la proteína receptora de VEGF, en una célula diana. Los casetes de expresión comprenden típicamente un promotor, al menos un marco de lectura abierto y una señal de terminación de la transcripción.

En realizaciones particulares, el tratamiento comprende, además, la administración de al menos una vacuna de ADN que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, de al menos una célula T modificada por ingeniería genética, de al menos un anticuerpo biespecífico que exhibe especificidad de unión por una proteína de superficie de célula T y por un antígeno tumoral o antígeno de estroma tumoral, o de cualquier combinación de los mismos.

En realizaciones particulares, el al menos un anticuerpo biespecífico exhibe especificidad de unión por un antígeno tumoral seleccionado de CD19, EpCAM, HER2, EGFR, CEA, CD33, EphA2 y MCSP.

En realizaciones particulares, la al menos una célula T modificada por ingeniería genética comprende al menos una proteína de unión a antígeno tumoral en su superficie celular, en donde el antígeno tumoral se selecciona de CEA, FBP, GD2, GD3, Her2-neu, MAGE-A1, MSLN, PSCA, PSMA.

En realizaciones particulares, el tratamiento comprende, además, la administración de vacunas de ADN adicionales que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, en particular de una cepa atenuada adicional de Salmonella que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral.

5 En realizaciones particulares, la administración de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF y el inhibidor de punto de control se combina con la administración de dos cepas atenuadas adicionales de Salmonella typhi Ty21a que codifican cada una un antígeno tumoral.

10 En realizaciones particulares, la administración de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF se combina con la administración de una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que codifica un antígeno tumoral y un inhibidor de punto de control.

15 En realizaciones particulares, la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF se combina con la administración de una célula T modificada por ingeniería genética y un inhibidor de punto de control.

20 En realizaciones particulares, la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF se combina con la administración de un anticuerpo biespecífico y un inhibidor de punto de control.

25 En realizaciones particulares, la al menos una vacuna de ADN que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral se selecciona de al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión eucariota adicional que codifica un antígeno tumoral o antígeno de estroma tumoral.

30 Los derivados atenuados de Salmonella enterica son vehículos atractivos para la administración de antígenos heterólogos al sistema inmune de los mamíferos, ya que las cepas de S. enterica pueden administrarse potencialmente a través de las rutas mucosales de inmunización, es decir, por vía oral o nasal, lo que ofrece ventajas de simplicidad y seguridad en comparación con la administración parenteral. Además, las cepas de Salmonella incitan fuertes respuestas inmunes humorales y celulares a nivel de los compartimientos tanto sistémicos como mucosales. Los costes de preparación de lotes son bajos y las formulaciones de vacunas bacterianas vivas son altamente estables. La atenuación se puede lograr mediante la delección de varios genes, incluidos los genes de virulencia, reguladores y metabólicos.

35 Se ha demostrado que varias cepas de Salmonella typhimurium atenuadas por mutaciones aro son vehículos de administración seguros y efectivos para antígenos heterólogos en modelos animales.

40 La cepa atenuada de Salmonella y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella de acuerdo con la invención son Salmonella typhi Ty21a. La cepa de S. typhi Ty21a atenuada, viva es el componente activo de Typhoral L®, también conocido como Vivotif® (fabricado por Berna Biotech Ltd., una Crucell Company, Suiza). Actualmente, es la única vacuna oral viva autorizada contra la fiebre tifoidea. Esta vacuna se ha ensayado ampliamente y ha demostrado ser segura con respecto a la toxicidad del paciente, así como con respecto a su transmisión a terceros (Wahdan et al., J. Infectious Diseases 1982, 145: 292-295). La vacuna se autorizó en más de 40 países y se usó en millones de personas incluidos miles de niños para la vacunación profiláctica contra la fiebre tifoidea. Tiene un historial de seguridad incomparable. No hay datos disponibles que indiquen que S. typhi Ty21a sea capaz de entrar en el torrente sanguíneo sistémicamente. La cepa de la vacuna viva atenuada de Salmonella typhi Ty21a permite así la focalización específica del sistema inmune en el intestino, a la vez que es segura y bien tolerada. El número de autorización de comercialización de Typhoral L® es PL 15747/0001 fechada el 16 de diciembre de 1996. Una dosis de vacuna contiene al menos 2×10^9 unidades formadoras de colonias viables de S. typhi Ty21a y al menos 5×10^9 células no viables de S. typhi Ty21a.

50 Esta vacuna viva oral, bien tolerada contra la fiebre tifoidea se derivó por mutagénesis química del aislado bacteriano virulento de tipo salvaje S. typhi Ty2 y porta una mutación de pérdida de función en el gen *galE* que resulta en su incapacidad para metabolizar la galactosa. La cepa bacteriana atenuada, además, tampoco es capaz de reducir el sulfato a sulfuro lo que la diferencia de la cepa de tipo salvaje Salmonella typhi Ty2. Con respecto a sus características serológicas, la cepa Salmonella typhi Ty21a contiene el antígeno O9 que es un polisacárido de la membrana externa de la bacteria y carece del antígeno O5 que a su vez es un componente característico de Salmonella typhimurium. Esta característica serológica respalda la justificación para incluir el ensayo respectivo en un panel de ensayos de identidad para la liberación de lotes.

60 En realizaciones particulares, el casete de expresión y el casete de expresión adicional son un casete de expresión eucariota que comprende un promotor de CMV. En el contexto de la presente invención, el término "casete de expresión eucariota" se refiere a un casete de expresión que permite la expresión del marco de lectura abierto en una célula eucariota. Se ha demostrado que la cantidad de antígeno heterólogo requerida para inducir una respuesta inmune adecuada puede ser tóxica para la bacteria y puede resultar en la muerte celular, atenuación excesiva o pérdida de expresión del antígeno heterólogo. El uso de un casete de expresión eucariota que no se expresa en el

vector bacteriano sino solo en la célula diana puede superar este problema de toxicidad y la proteína expresada exhibe típicamente un patrón de glicosilación eucariota.

Un casete de expresión eucariota comprende secuencias reguladoras que son capaces de controlar la expresión de un marco de lectura abierto en una célula eucariota, preferiblemente un promotor y una señal de poliadenilación. Los promotores y las señales de poliadenilación incluidas en las moléculas de ADN recombinante comprendidas por la cepa atenuada de Salmonella de la presente invención se seleccionan preferiblemente para que sean funcionales dentro de las células del sujeto a inmunizar. Los ejemplos de promotores adecuados, especialmente para la producción de una vacuna de ADN para seres humanos, incluyen pero no se limitan a promotores de Citomegalovirus (CMV), tales como el promotor de CMV fuerte inmediato temprano, Virus de Simios 40 (SV40), Virus de Tumor Mamario de Ratón (MMTV), Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV), tal como el promotor de Repetición de Terminal Larga (LTR) del HIV, el virus de Moloney, el virus de Epstein Barr (EBV), y el virus del Sarcoma de Rous (RSV), el promotor de CAG sintético compuesto del elemento potenciador temprano de CMV, el promotor, el primer exón y el primer intrón del gen de la beta actina de pollo y el aceptor de empalme del gen de la beta globina de conejo, así como los promotores de genes humanos tales como actina humana, miosina humana, hemoglobina humana, creatina muscular humana, y metalotioneína humana. En una realización particular, el casete de expresión eucariota contiene el promotor de CMV. En el contexto de la presente invención, el término "promotor de CMV" se refiere al promotor de citomegalovirus fuerte inmediato temprano.

Los ejemplos de señales de poliadenilación adecuadas, especialmente para la producción de una vacuna de ADN para seres humanos, incluyen, pero no se limitan a, el sitio de poliadenilación de la hormona de crecimiento bovino (BGH), las señales de poliadenilación de SV40 y las señales de poliadenilación de LTR. En una realización particular, el casete de expresión eucariota incluido en la molécula de ADN recombinante comprendida por la cepa atenuada de Salmonella de la presente invención comprende el sitio de poliadenilación de BGH.

Además de los elementos reguladores requeridos para la expresión del gen del antígeno de estroma tumoral o antígeno tumoral heterólogo, como un promotor y una señal de poliadenilación, también pueden incluirse otros elementos en la molécula de ADN recombinante. Dichos elementos adicionales incluyen potenciadores. El potenciador puede ser, por ejemplo, el potenciador de actina humana, miosina humana, hemoglobina humana, creatina muscular humana y potenciadores virales tales como los de CMV, RSV y EBV.

Las secuencias reguladoras y los codones generalmente dependen de la especie, por lo que para maximizar la producción de proteínas, las secuencias reguladoras y los codones se seleccionan preferiblemente para que sean efectivos en la especie que se va a inmunizar. El experto en la técnica puede producir moléculas de ADN recombinante que son funcionales en una especie de sujeto dada.

En realizaciones particulares, la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.

El VEGFR-2, también conocido como receptor que contiene el dominio de inserción de quinasa (KDR), parece mediar en casi todas las respuestas celulares conocidas al VEGF. Por ejemplo, el papel de VEGF en la angiogénesis parece estar mediado por la interacción de esta proteína con VEGFR-2. El VEGFR-2 es un receptor de alta afinidad de peso molecular de 200-230 kDa, de 1356 aminoácidos de longitud para VEGF, así como para VEGF-C y VEGF-D. Identificado en humanos a través de la selección de ADNc endotelial para receptores de tirosina quinasa, VEGFR-2 comparte una identidad de secuencia del 85% con la quinasa 1 de hígado fetal de ratón descubierta previamente (Flk-1). VEGFR-2 normalmente se expresa en precursores endoteliales y hematopoyéticos, así como en células endoteliales, células madre hematopoyéticas nacientes y el estroma del cordón umbilical. Sin embargo, en la vasculatura adulta en reposo, el ARNm de VEGFR-2 parece estar regulado negativamente.

El dominio extracelular de VEGFR-2 contiene 18 sitios potenciales de glicosilación unidos a N. VEGFR-2 se sintetiza inicialmente como una proteína de 150 kDa y se glucosila rápidamente a una forma intermedia de 200 kDa, y luego se glucosila más a una velocidad más lenta a una proteína madura de 230 kDa que se expresa en la superficie celular.

En este contexto, el término "alrededor de" o "aproximadamente" significa dentro del 80% al 120%, alternativamente dentro del 90% al 110%, incluido dentro del 95% al 105% de un valor o rango dado.

En el contexto de la presente invención, el término "proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con una proteína dada (la proteína de referencia) se refiere a una proteína que puede diferir en la secuencia de aminoácidos y/o la secuencia de ácido nucleico que codifica la secuencia de aminoácidos de la proteína de referencia. La proteína puede ser de origen natural, p. ej., una versión mutante de una proteína de tipo salvaje, p. ej., una versión mutante de una proteína receptora de VEGF de tipo salvaje, o un homólogo de una especie diferente, o una proteína modificada por ingeniería genética, p. ej., una proteína receptora de VEGF modificada por ingeniería genética. Se sabe que el uso de codones es diferente entre especies. Por lo tanto, cuando se expresa una proteína heteróloga en una célula diana, puede ser necesario, o al menos útil, adaptar la secuencia de ácido nucleico al uso de

codones de la célula diana. Los métodos para diseñar y construir derivados de una proteína dada son bien conocidos por cualquier experto en la técnica.

La proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con una proteína dada puede contener una o más mutaciones que comprenden una adición, una delección y/o una sustitución de uno o más aminoácidos en comparación con la proteína de referencia dada. De acuerdo con las enseñanzas de la presente invención, dichos aminoácidos eliminados, adicionados y/o sustituidos pueden ser aminoácidos consecutivos o pueden espaciarse a lo largo de la secuencia de aminoácidos de la proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con una proteína de referencia dada. De acuerdo con la enseñanza de la presente invención, pueden adicionarse, eliminarse y/o sustituirse cualquier número de aminoácidos, siempre que la identidad de secuencia de aminoácidos con la proteína de referencia sea al menos de alrededor del 80% y la proteína mutada sea inmunogénica. Preferiblemente, la inmunogenicidad de la proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con una proteína de referencia de una secuencia de aminoácidos dada se reduce en menos del 50%, menos del 40%, menos del 30%, menos del 20%, menos superior al 10%, menos del 5% o menos del 1% en comparación con la proteína de referencia de la secuencia de aminoácidos dada, medida por ELISA. Los métodos para diseñar y construir homólogos de proteínas y para probar dichos homólogos en cuanto a su potencial inmunogénico son bien conocidos por cualquier experto en la técnica. En realizaciones particulares, la identidad de secuencia con la proteína de referencia es al menos de alrededor del 80%, al menos de alrededor del 85%, al menos de alrededor del 90%, o más particularmente al menos de alrededor del 95%. Los métodos y algoritmos para determinar la identidad de la secuencia, incluida la comparación de una proteína parental y su derivado que tiene delecciones, adiciones y/o sustituciones en relación con una secuencia parental, son bien conocidos por el experto en la técnica. A nivel de ADN, las secuencias de ácido nucleico que codifican la proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la proteína receptora de VEGF pueden diferir en mayor medida debido a la degeneración del código genético.

En realizaciones particulares, el VEGFR-2 humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1.

En realizaciones particulares, la molécula de ADN y la molécula de ADN adicional comprenden el gen de resistencia al antibiótico kanamicina, el ori pMB1, y un promotor de CMV. En realizaciones particulares, la molécula de ADN recombinante se deriva del plásmido de expresión pVAX1™ disponible comercialmente (Invitrogen, San Diego, California). Este vector de expresión se modificó reemplazando el origen de replicación pUC de alto número de copias por el origen de replicación pMB1 de bajo número de copias de pBR322. La modificación de bajo número de copias se realizó con el fin de reducir la carga metabólica y para hacer que la construcción sea más estable. El esqueleto del vector de expresión generado se designó pVAX10.

En realizaciones particulares, la molécula de ADN y la molécula de ADN adicional comprenden la secuencia de ADN como se encuentra en la SEQ ID NO 2 (esqueleto del vector pVAX10).

La inserción del ORF que codifica la proteína receptora de VEGF con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 9 en este esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.VR2-1 (documento WO 2013/091898). El plásmido de expresión pVAX10.VR2-1 se representa esquemáticamente en la Figura 16. La vacuna de ADN que comprende la cepa de Salmonella atenuada Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.VR2-1 se denomina VXM01 (documento WO 2013/091898).

La inserción del ORF humano, que codifica WT1 truncado con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 10 en el esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.hWT1. La expresión del plásmido pVAX10.hWT1 se representa esquemáticamente en la Figura 17. La vacuna de ADN que comprende la cepa de Salmonella atenuada Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.hWT1 se denomina VXM06 (documento WO 2014/173542).

La inserción del ORF que codifica la MSLN humana con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 11 en este esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.hMSLN. El plásmido de expresión pVAX10.hMSLN se representa esquemáticamente en la Figura 18. La vacuna de ADN que comprende la cepa atenuada de Salmonella Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.hMSLN se denomina VXM04.

La inserción del ORF que codifica CEA con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 12 en el esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.hCEA. La expresión del plásmido pVAX10.hCEA se representa esquemáticamente en la Figura 19. La vacuna de ADN que comprende la cepa atenuada de Salmonella Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.hCEA se denomina VXM08.

La inserción del ORF que codifica CMV pp65 con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 13 en el esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_1. La expresión del plásmido pVAX10.CMVpp65_1 se representa esquemáticamente en la Figura

20. La vacuna de ADN que comprende la cepa atenuada de Salmonella Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_1 se denomina VXM65_1.

La inserción del ORF que codifica CMV pp65 con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 14 en el esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_2. La expresión del plásmido pVAX10.CMVpp65_2 se representa esquemáticamente en la Figura 21. La vacuna de ADN que comprende la cepa atenuada de Salmonella Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_2 se denomina VXM65_2.

La inserción del ORF que codifica CMV pp65 con la secuencia de ácido nucleico como se encuentra en la SEQ ID NO 15 en el esqueleto del vector de expresión a través de *NheI/XhoI* produjo el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_3. La expresión del plásmido pVAX10.CMVpp65_3 se representa esquemáticamente en la Figura 22. La vacuna de ADN que comprende la cepa atenuada de Salmonella Ty21a que porta el plásmido de expresión pVAX10.CMVpp65_3 se denomina VXM65_3.

En realizaciones particulares, el antígeno tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a se selecciona del grupo que consiste en la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, Mesotelina humana (MSLN) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CEA humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 5 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácido como se encuentra en la SEQ ID NO 7 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma y CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 8 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, y el antígeno de estroma tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de Salmonella se selecciona del grupo que consiste en la proteína de activación de fibroblastos humanos (FAP).

En realizaciones particulares, la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3, Mesotelina humana (MSLN) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4, CEA humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 5, y CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 6, o SEQ ID NO 7, o SEQ ID NO 8.

La mesotelina es una glicoproteína de la superficie celular de 40 kDa presente en las células mesoteliales normales y sobreexpresada en varios tumores humanos, incluidos el mesotelioma y el adenocarcinoma de ovario y pancreático. El gen de la mesotelina codifica una proteína precursora de 71 kDa que se procesa para producir una proteína escindida de 31 kDa llamada factor de potenciación de megacariocitos (MPF) y el fragmento de mesotelina unido a la célula de 40 kDa. Se demostró que la mesotelina exhibía actividad formadora de colonias de megacariocitos en presencia de interleuquina-3. La mesotelina es un antígeno de diferenciación tumoral presente en niveles bajos en un conjunto restringido de tejidos adultos normales, tales como el mesotelio, pero que está sobreexpresada de manera aberrante en una amplia variedad de tumores humanos, incluidos mesoteliomas, cánceres de ovario y pancreático, carcinomas de células escamosas del cuello uterino, cabeza y cuello, vulva, pulmón y esófago, adenocarcinomas de pulmón, carcinomas endometriales, sarcomas sinoviales bifásicos, tumores desmoplásicos de células pequeñas y redondas y adenocarcinomas gástricos. Se desconoce la función biológica normal de la Mesotelina. Los estudios en ratones con inactivación de mesotelina no revelaron un fenotipo detectable, y tanto los ratones machos como las hembras produjeron descendencia sana. Los estudios en cáncer pancreático sugieren que la mesotelina juega un papel en la tumorigénesis al aumentar la proliferación celular, la migración y las poblaciones de células en fase S. Además, hay evidencia de que la mesotelina es una proteína inmunogénica. Debido a su perfil de expresión, sus funciones oncogénicas y su potencial inmunogénico, el antígeno tumoral mesotelina es un candidato prometedor para el desarrollo de vacunas contra el cáncer.

El gen tumoral de Wilms 1 (WT1) codifica un factor de transcripción de dedo de zinc que participa en la proliferación y diferenciación celular. La proteína WT1 contiene cuatro restos de dedos de zinc en el extremo C y un dominio de unión al ADN rico en prolina/glutamina en el extremo N-terminal. Múltiples variantes de transcripciones, resultantes del empalme alternativo en dos exones de codificación, se caracterizaron bien. WT1 juega un papel esencial en el desarrollo del sistema urogenital y participa en la proliferación y diferenciación celular. El gen de WT1 se aisló como el gen responsable de una neoplasia renal infantil, el tumor de Wilms. Está altamente expresado en una amplia variedad de tumores malignos incluidos varios tipos de tumores malignos hematológicos y varios tumores sólidos. En contraste, la expresión tisular normal de WT1 en adultos se restringe a gónadas, útero, riñón, mesotelio y células progenitoras en varios tipos de tejidos. WT-1 afecta negativamente la diferenciación y promueve la proliferación de células progenitoras. Además, el WT1 sobreexpresado es inmunogénico; se observaron células T específicas para WT1 así como anticuerpos IgG anti-WT1 en pacientes con cáncer. Debido a su perfil de expresión, sus funciones oncogénicas y su potencial inmunogénico, el antígeno tumoral WT1 es un candidato prometedor para el desarrollo de vacunas contra el cáncer.

En realizaciones particulares, WT1 está truncado. En realizaciones particulares, se elimina el dominio de dedo de zinc de WT1. En realizaciones particulares, el WT1 truncado tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3.

5 El dominio de dedo de zinc en el extremo C de WT1 comprende cuatro restos de dedos de zinc. El WT1 truncado de la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3 representa los aminoácidos del 1 al 371 de UniProt ref P19544-7. La eliminación del dominio de dedo de zinc minimiza el riesgo de reactividad cruzada inmunológica con otros factores de transcripción que contienen dedo de zinc. Además, el WT1 truncado que carece del dominio de dedo de zinc tiene mayor potencial inmunogénico que el WT1 de longitud completa. En adición, la
10 eliminación de los restos de dedos de zinc, que son esenciales para la unión del ADN, anula el potencial oncogénico de WT1, y minimiza así el riesgo de oncogénesis.

La proteína tegumento CMV pp65 es una proteína inmunodominante importante del citomegalovirus humano (CMV). La función biológica del CMV pp65 no está clara, pero se cree que participa en la regulación del ciclo celular. CMV
15 pp65 es una proteína nucleotrópica que exhibe actividad de proteína quinasa, que es capaz de unirse a la quinasa similar a polo 1 (PLK-1).

HCMV pp65 se expresa en más del 90% de las muestras de glioblastoma pero no en el cerebro normal circundante. Esta proteína viral es por lo tanto un candidato prometedor como diana específica de tumor para el desarrollo de
20 nuevas inmunoterapias contra el cáncer.

La proteína CMV pp65 contiene dos señales de localización nuclear bipartita (NLS) en los aminoácidos del 415 al 438 y los aminoácidos del 537 al 561 cerca del extremo carboxilo y un sitio de unión a fosfato relacionado con su actividad quinasa en la lisina-436. La mutación de la lisina en la posición 436 a asparagina y la delección de los aminoácidos del
25 537 al 561 dan como resultado una proteína sin actividad quinasa y una localización nuclear notablemente reducida. Esta proteína mutante exhibe inmunogenicidad inalterada.

En realizaciones particulares, la CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6. La SEQ ID NO 6 representa la secuencia de aminoácidos de CMV pp65 humano de tipo salvaje.
30

En realizaciones particulares, la CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 7. La SEQ ID NO 7 representa la secuencia de aminoácidos de CMV pp65 humano, que porta la mutación K436N en relación con el CMV pp65 humano de tipo salvaje de la SEQ ID NO 6.

35 En realizaciones particulares, la CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 8. La SEQ ID NO 8 representa la secuencia de aminoácidos de una versión truncada de CMV pp65 de la SEQ ID NO 7, que carece de la segunda más NLS (secuencia de localización nuclear) C-terminal (es decir, aminoácidos del 537 al 561 de CMV pp65 de la SEQ ID NO 7).

40 El antígeno carcinoembrionario (CEA) (también conocido como CEACAM5 y CD66e) es miembro de una familia de glicoproteínas ancladas en la superficie celular glicosilfosfatidil inositol (GPI) altamente relacionadas que participan en la adhesión celular. El CEA se produce normalmente en el tejido gastrointestinal durante el desarrollo fetal; la expresión de proteínas termina antes del nacimiento. Por lo tanto, el CEA generalmente está presente solo a niveles muy bajos en la sangre de adultos sanos. Sin embargo, los niveles séricos se elevan en algunos tipos de cáncer, en particular el
45 carcinoma colorrectal, que funciona así como marcador tumoral. Los niveles de CEA también pueden elevarse en el carcinoma gástrico, carcinoma pancreático, carcinoma de pulmón, carcinoma de mama, y carcinoma de tiroides medular, así como en algunas afecciones no neoplásicas como colitis ulcerosa, pancreatitis, cirrosis, COPD, enfermedad de Crohn e hipotiroidismo.

50 En realizaciones particulares, la cepa atenuada de Salmonella se administra simultáneamente con o antes de dicho al menos un inhibidor de punto de control.

En el contexto de la presente invención, el término "simultáneamente con" significa la administración de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF y el al menos un inhibidor de punto de control
55 en el mismo día, más particularmente dentro de 12 horas, más particularmente dentro de 2 horas.

En realizaciones particulares, la administración de la cepa de Salmonella atenuada que codifica una proteína receptora de VEGF y el al menos un inhibidor de punto de control se produce dentro de ocho semanas consecutivas, más particularmente dentro de tres a seis semanas consecutivas. La cepa de Salmonella atenuada de acuerdo con la
60 presente invención y el al menos un inhibidor de punto de control pueden administrarse por la misma ruta o por diferentes rutas.

En realizaciones particulares, el tratamiento se acompaña de quimioterapia, radioterapia o terapia biológica contra el cáncer. Para la cura del cáncer, puede ser esencial la erradicación completa de las células madre del cáncer. Para una eficacia máxima, puede ser beneficiosa una combinación de diferentes estrategias terapéuticas.
65

En el contexto de la presente invención, el término "terapia biológica contra el cáncer" se refiere a la terapia contra el cáncer que implica el uso de sustancias derivadas de organismos vivos o versiones producidas en el laboratorio de dichas sustancias. Los enfoques de terapia biológica contra el cáncer incluyen la administración de citoquinas inmunoestimuladoras.

5 Los agentes quimioterapéuticos que pueden usarse en combinación con la cepa mutante atenuada de Salmonella de la presente invención pueden ser, por ejemplo: gemcitabina, amifostina (etiol), cabazitaxel, cisplatino, dacarbazina (DTIC), dactinomicina, docetaxel, mecloretamina, estreptozocina, ciclofosfamida, carrnustina (BCNU), lomustina (CCNU), doxorubicina (adriamicina), doxorubicina lipo (doxil), ácido folínico, gemcitabina (gemzar), daunorrubicina, 10 daunorrubicina lipo (daunoxoma), procarbazona, ketokonazol, mitomicina, citarabina, etopósido, metotrexato, 5-fluorouracilo (5-FU), vinblastina, vincristina, bleomicina, paclitaxel (taxol), docetaxel (taxotere), aldesleucina, asparaginasa, busulfán, carboplatino, cladribina, camptotecina, CPT-11, 10-hidroxi-7-etil-camptotecina (SN38), dacarbazina, floxuridina, fludarabina, hidroxiaurea, ifosfamida, idarrubicina, mesna, interferón alfa, interferón beta, 15 irinotecán, mitoxantrona, topotecán, leuprólido, megestrol, melfalán, mercaptopurina, oxaliplatino, plicamicina, mitotano, pegaspargasa, pentostatina, pipobromano, plicamicina, estreptozocina, tamoxifeno, tenipósido, testolactona, tioguanina, tiotepa, mostaza de uracilo, vinorelbina, clorambucilo y combinaciones de los mismos.

Los agentes quimioterapéuticos más preferidos de acuerdo con la invención son cabazitaxel, carboplatino, oxaliplatino, 20 cisplatino, ciclofosfamida, docetaxel, gemcitabina, doxorubicina, paclitaxel (taxol), irinotecán, vincristina, vinblastina, vinorelbina, ácido folínico, 5-fluorouracilo y bleomicina, especialmente gemcitabina.

Particularmente, la cepa mutante atenuada de Salmonella se administra antes o durante el ciclo de tratamiento con quimioterapia o radioterapia o la terapia biológica contra el cáncer. En otras realizaciones particulares, la cepa 25 atenuada de Salmonella se administra antes y durante el ciclo de tratamiento con quimioterapia o radioterapia o durante la terapia biológica contra el cáncer.

En realizaciones particulares, la cepa atenuada de Salmonella y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella se administran por vía oral. La administración oral es más simple, segura y cómoda que la administración 30 parenteral. Sin embargo, debe observarse que la cepa atenuada de Salmonella de la presente invención también puede administrarse por cualquier otra ruta adecuada. Preferiblemente, se administra una dosis terapéuticamente efectiva al sujeto, y esta dosis depende de la aplicación particular, del tipo de malignidad, del peso, la edad, el sexo y el estado de salud del sujeto, de la forma de administración y la formulación, etc. La administración puede ser única o múltiple, según se requiera.

35 La cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral pueden proporcionarse en forma de una solución, una suspensión, un liofilizado, una cápsula con cubierta entérica, o cualquier otra forma adecuada. Típicamente, la cepa atenuada de Salmonella se formula como solución para beber. Esta realización ofrece la ventaja de una mejor conformidad del paciente. Preferiblemente, la solución para beber comprende medios para 40 neutralizar los ácidos gástricos al menos en cierto grado, es decir, para acercar el pH del jugo gástrico a un pH de 7. Preferiblemente, la solución para beber es una suspensión tamponada que comprende la cepa atenuada de Salmonella de acuerdo con la presente invención. En una realización particular, la suspensión tamponada se obtiene mediante la suspensión de la cepa atenuada de Salmonella en un tampón adecuado, que contiene preferiblemente 2,6 g de hidrogenocarbonato de sodio, 1,7 g de ácido L-ascórbico, 0,2 g de lactosa monohidrato y 100 ml de agua 45 potable.

El al menos un inhibidor de punto de control se administra preferiblemente en la formulación galénica aprobada del producto comercial.

50 En realizaciones particulares, el cáncer se selecciona de cáncer colorrectal, cáncer pancreático, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, mesotelioma, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, glioblastoma, cáncer gástrico, cáncer hepatocelular, cáncer de células renales, cáncer de próstata, y cáncer cervical.

La cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF junto con al menos un inhibidor de punto de control sorprendentemente muestra efectos sinérgicos sobre las respuestas de células T y/o la supervivencia general a dosis relativamente bajas de la cepa atenuada de Salmonella que codifica una proteína receptora de VEGF. 55 Similarmente, las vacunas de ADN que comprenden una cepa atenuada de Salmonella que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral son sorprendentemente efectivas a dosis relativamente bajas. La administración de dosis bajas de vacuna bacteriana viva minimiza el riesgo de excreción y por lo tanto de transmisión a terceras partes.

60 En realizaciones particulares, la dosis única de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a comprende de alrededor de 10^5 a alrededor de 10^{11} , particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^9 , más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^8 , lo más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^7 unidades formadoras de colonias (CFU).

En realizaciones particulares, la dosis única de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF y la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral son esencialmente las mismas, ambas dosis individuales que comprende de alrededor de 10^5 a alrededor de 10^{11} , particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^{10} , más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^9 , más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^8 , lo más particularmente de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^7 unidades formadoras de colonias (CFU). En realizaciones particulares, la dosis única de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF es de alrededor de 10 a alrededor de 100 veces menor que la dosis única de al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que codifica un antígeno tumoral o un antígeno estroma tumoral. En otras realizaciones particulares, la dosis única de la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF es de alrededor de 10 a alrededor de 100 veces mayor que la dosis única de la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que codifica un antígeno tumoral o un antígeno estroma tumoral.

En este contexto, el término "alrededor de" o "aproximadamente" significa dentro de un factor de 3, alternativamente dentro de un factor de 2, incluido dentro de un factor de 1,5 de un valor o rango dado.

En realizaciones particulares, el tratamiento es inmunoterapia individualizada contra el cáncer que comprende la etapa de evaluar el patrón de expresión y/o la respuesta preinmune contra dicho antígeno tumoral en un paciente. Puede evaluarse el patrón de expresión de los antígenos tumorales y/o del estroma del paciente y/o las respuestas preinmunes del paciente contra los antígenos tumorales y/o del estroma en una primera etapa, por ejemplo, mediante diagnósticos complementarios dirigidos al patrón de antígenos tumorales y/o del estroma específicos del paciente. En dependencia del patrón de expresión de los antígenos tumorales y/o del estroma del paciente o de las respuestas preinmunes del paciente contra los antígenos tumorales y/o del estroma del paciente, la cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que codifica una proteína receptora de VEGF puede administrarse en combinación con una o más vacunas adecuadas contra el cáncer basadas en Salmonella typhi Ty21a adicionales que comprenden sistemas de expresión eucariotas.

En dependencia de la aparición de posibles efectos secundarios, puede ser favorable incluir un tratamiento con antibióticos o agentes antiinflamatorios.

En el caso en el que ocurran eventos adversos que se parezcan a reacciones de hipersensibilidad mediadas por histamina, leucotrienos o citoquinas, están disponibles opciones de tratamiento para la fiebre, anafilaxia, inestabilidad de la presión arterial, broncoespasmo y disnea. Las opciones de tratamiento en el caso de autoagresión derivada de células T no deseada se derivan de esquemas de tratamiento estándar en la enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica aplicada después del trasplante de células madre. Se proponen ciclosporina y glucocorticoides como opciones de tratamiento.

En el caso improbable de infección sistémica por el tipo de Salmonella typhi Ty21a, se recomienda una terapia antibiótica apropiada, por ejemplo, con fluoroquinolonas que incluyen ciprofloxacina u ofloxacina. Las infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal deben tratarse con agentes respectivos, tales como la rifaximina.

En un aspecto adicional, la presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende una cepa atenuada de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde la composición farmacéutica comprende, además, al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, y en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.

En realizaciones particulares, la composición farmacéutica comprende las vacunas de ADN VXM01 y VXM06.

En realizaciones particulares, la composición farmacéutica comprende las vacunas de ADN VXM01 y VXM04.

En realizaciones particulares, la composición farmacéutica comprende las vacunas de ADN VXM01 y VXM08.

En realizaciones particulares, la composición farmacéutica comprende las vacunas de ADN VXM01 y VXM65.

En realizaciones particulares, la al menos una cepa atenuada adicional de Salmonella typhi Ty21a comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión eucariota adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral seleccionado del grupo que consiste en la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, Mesotelina humana (MSLN) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CEA humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 5 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia

de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 7 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma y CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 8 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, particularmente en donde la proteína del tumor de Wilms humana (WT1) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3, Mesotelina humana (MSLN) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4, CEA humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 5 y CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6, SEQ ID NO 7 o SEQ ID NO 8, y en donde el antígeno de estroma tumoral se selecciona de la proteína de activación de fibroblastos (FAP).

La composición farmacéutica de la presente invención puede estar en forma de una solución, una suspensión, una cápsula con recubrimiento entérico, un polvo liofilizado o cualquier otra forma adecuada para el uso pretendido.

La composición farmacéutica de la presente invención puede comprender, además, uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

En el contexto de la presente invención, el término "excipiente" se refiere a una sustancia natural o sintética formulada junto con el ingrediente activo de un medicamento. Los excipientes adecuados incluyen antiadherentes, aglutinantes, revestimientos, desintegrantes, sabores, colorantes, lubricantes, deslizantes, sorbentes, conservantes y edulcorantes.

En el contexto de la presente invención, el término "farmacéuticamente aceptable" se refiere a entidades moleculares y otros ingredientes de composiciones farmacéuticas que son fisiológicamente tolerables y que típicamente no producen reacciones adversas cuando se administran a un mamífero (p. ej., un ser humano). El término "farmacéuticamente aceptable" también puede significar aprobado por una agencia reguladora de un gobierno federal o estatal o enumerado en la Farmacopea de EE.UU. u otra farmacopea generalmente reconocida para su uso en mamíferos y, más particularmente, en seres humanos.

En realizaciones particulares, la al menos una cepa atenuada adicional de *Salmonella typhi* Ty21a que comprende portar un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, la composición farmacéutica de acuerdo con la presente invención puede proporcionarse adecuadamente como solución para beber. Esta realización ofrece la ventaja de una mejor conformidad del paciente y permite programas de vacunación masiva rápidos, factibles y asequibles, especialmente en geografías pobres.

En particular, las soluciones para beber adecuadas comprenden medios para neutralizar los ácidos gástricos al menos en cierto grado, es decir, para acercar el pH del jugo gástrico a un pH de 7. En una realización particular, la solución para beber es una suspensión tamponada obtenida mediante la suspensión de la cepa atenuada de *Salmonella* de acuerdo con la presente invención en un tampón adecuado, preferiblemente en un tampón que neutraliza los ácidos gástricos al menos en cierto grado, preferiblemente en un tampón que contiene 2,6 g de hidrogenocarbonato de sodio, 1,7 g de ácido L-ascórbico, 0,2 g de lactosa monohidrato y 100 ml de agua potable.

En realizaciones particulares, el casete de expresión y el casete de expresión adicional son un casete de expresión eucariota que comprende un promotor de CMV.

En realizaciones particulares, la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.

En realizaciones particulares, el VEGFR-2 humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1.

En realizaciones particulares, el tratamiento comprende una o varias administraciones de la cepa atenuada de *Salmonella* que codifica una proteína receptora de VEGF o la composición farmacéutica de acuerdo con la presente invención. La dosis única de las administraciones puede ser igual o diferente. En particular, el tratamiento comprende 1, 2, 3, 4, 5 o 6 administraciones de la cepa atenuada de *Salmonella* que codifica una proteína receptora de VEGF o la composición farmacéutica de acuerdo con la presente invención, preferiblemente en donde las administraciones múltiples ocurren dentro de tres a seis meses consecutivos.

Breve descripción de las figuras y tablas

Figura 1: Secuencia de aminoácidos del VEGFR-2 humano codificado por el ADNc de VEGFR-2 contenido en el plásmido pVAX10.VR2-1 (correspondiente a la SEQ ID NO 1)

Figura 2: Secuencia de ácido nucleico comprendida en el vector de expresión vacío pVAX10 (secuencia del vector de expresión pVAX10 sin la porción del sitio de clonación múltiple que se encuentra entre los sitios de restricción *NheI* y *XhoI* (SEQ ID NO 2).

- Figura 3: Secuencia de aminoácidos de WT-1 humana truncada codificada por el ADNc de WT-1 contenido en el plásmido pVAX10.hWT1 (SEQ ID NO 3)
- Figura 4: Secuencia de aminoácidos de MSLN humana codificada por el ADNc de MSLN contenido en el plásmido pVAX10.hMSLN (SEQ ID NO 4)
- 5 Figura 5: Secuencia de aminoácidos de CEA humano codificado por el ADNc de CEA contenido en el plásmido pVAX10.hCEA (SEQ ID NO 5)
- Figura 6: Secuencia de aminoácidos de CMV pp65 codificada por el ADNc de CMV pp65 contenido en el plásmido pVAX10.CMVpp65_1 (SEQ ID NO 6)
- Figura 7: Secuencia de aminoácidos de CMV pp65 codificada por el ADNc de CMV pp65 contenido en el plásmido pVAX10.CMVpp65_2 (SEQ ID NO 7)
- 10 Figura 8: Secuencia de aminoácidos de CMV pp65 codificada por el ADNc de CMV pp65 contenido en el plásmido pVAX10.CMVpp65_3 (SEQ ID NO 8)
- Figura 9: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.VR2-1 y que codifica VEGFR-2 humano de la SEQ ID NO 1
- 15 Figura 10: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.hWT1 y que codifica WT-1 humano de la SEQ ID NO 3
- Figura 11: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.hMSLN y que codifica MSLN humano de la SEQ ID NO 4
- Figura 12: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.hCEA y que codifica CEA humano de la SEQ ID NO 5
- 20 Figura 13: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.CMVpp65_1 y que codifica CMV pp65 de la SEQ ID NO 6
- Figura 14: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.CMVpp65_2 y que codifica CMV pp65 de la SEQ ID NO 7
- 25 Figura 15: Secuencia de ácido nucleico contenida en el plásmido pVAX10.CMVpp65_3 y que codifica CMV pp65 de la SEQ ID NO 8
- Figura 16: Mapa plasmídico de pVAX10.VR2-1
- Figura 17: Mapa plasmídico de pVAX10.hWT1
- Figura 18: mapa plasmídico de pVAX10.hMSLN
- 30 Figura 19: Mapa plasmídico de pVAX10.hCEA
- Figura 20: Mapa plasmídico de pVAX10.CMVpp65_1
- Figura 21: Mapa plasmídico de pVAX10.CMVpp65_2
- Figura 22: Mapa plasmídico de pVAX10.CMVpp65_3
- Figura 23: Efectos de la administración combinada de VXM01 y anti-CTLA4 en un modelo de tumor de ratón MC38 - crecimiento tumoral
- 35 Figura 24: Efectos de la administración combinada de VXM01 y anti-CTLA4 en un modelo de tumor de ratón MC38 - supervivencia
- Figura 25: Efectos de la administración combinada de VXM01 y anti-CTLA4 en el modelo de tumor de ratón B16 - supervivencia
- 40 Figura 26: Programa de tratamiento Ejemplo 3
- Figura 27: Efecto del tratamiento con VXM01 con o sin ciclofosfamida sobre el tamaño del tumor [mm³] en el día 30. Cada punto representa el resultado del tumor de un animal.
- Figura 28: Porcentajes de células CD8⁺ específicas para VEGFR-2 en bazos de ratones BALB/C con células tumorales de colon CT26 subcutáneas. Cada punto representa los resultados de un bazo. Los resultados se dan en % total de 3 pentámeros de VEGFR2 agrupados.
- 45 Figura 29: Tinción inmunohistoquímica anti-CD3 de muestras tumorales de animales tratados con el vector vacío y VXM01, respectivamente. Las células CD3 positivas aparecen en color marrón (ver flecha, por ejemplo); aumento x200.
- Figura 30: Cuantificación de infiltrados de células inmunes e inducción en veces media de PD-L1 en muestras tumorales de animales tratados con VXM01 o VXM01 más ciclofosfamida en comparación con animales tratados con el control de vector vacío. Los datos se derivan del recuento absoluto de células/área de tejido [mm²]; Aumento x200.
- Figura 31: Porcentajes de células CD8⁺ específicas para VEGFR-2- y CEA en bazos de ratones sanos tratados con ratones que tienen células tumorales de colon CT26 subcutáneas. Cada punto representa los resultados de un bazo. Los resultados se dan en % total de 2 pentámeros de VEGFR2 agrupados.
- 55

Ejemplos

Ejemplo 1: Estudio combinado anti-CTLA4 de carcinoma de colon MC38:

- 60 Cuatro grupos de ratones C57/Bl6/6J (n=6 cada uno) se retaron con una administración subcutánea de 5x10⁵ células tumorales MC38 en el día 0 del estudio.

Los animales se trataron con VXM01 mlow (Salmonella typhimurium que llevaba un casete de expresión eucariota que codificaba VEGFR-2 murino, fabricado por Richter-Helm BioLogics, Hannover, Alemania) solo a una dosis de 10⁸ CFU por sonda oral el día -1, día 1, día 4 y día 6 (n=6), o con VXM01mlow en la misma dosis, vía de administración, y

65

esquema de administración más el anticuerpo anti-CTLA4 murino los días 12, 14, 16 y 18 (n=6), o con el anticuerpo antiCTLA4 murino los días 12, 14, 16 y 18 solo (n=6), o sin tratamiento (n=6, control).

5 El crecimiento tumoral se midió mediante el uso de un microcalibrador. Los animales se sacrificaron tan pronto como el volumen tumoral alcanzó 1500 mm³ por razones de bienestar animal.

La supervivencia de los animales de prueba se registró una vez al día.

10 El crecimiento tumoral se representa gráficamente en la Figura 23.

La supervivencia de los animales de prueba se muestra en un diagrama de Kaplan-Meier en la Figura 24.

Ejemplo 2: Estudio combinado anti-CTLA4 de melanoma B16-F10:

15 Cuatro grupos de ratones C57/Bl6/6J (n=6 cada uno) se retaron con una administración intravenosa de 2x10⁵ células tumorales B16-F10 en el día 0 del estudio.

20 Los animales se trataron con un VXM01 mlow (Salmonella typhimurium que llevaba un casete de expresión eucariota que codificaba VEGFR-2 murino, fabricado por Richter-Helm BioLogics, Hannover, Alemania) solo a una dosis de 10⁸ CFU por sonda oral el día 5, día -3, día 0 y día 2 (n=6), o con VXM01 mlow a la misma dosis, vía de administración, y esquema de administración más el anticuerpo anti-CTLA4 murino en los días 8, 10, 12 y 14 (n=6), o con el anticuerpo antiCTLA4 murino el día 8, 10, 12 y 14 solo (n=6), o sin tratamiento (n=6, control).

25 La supervivencia de los animales de prueba se registró una vez al día.

La supervivencia de los animales de prueba se muestra en un diagrama de Kaplan-Meier en la Figura 25.

Ejemplo 3: actividad antitumoral de la vacuna VMX01 en el modelo de tumor murino CT26

30 El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antitumoral de VXM01 con o sin ciclofosfamida en ratones BALB/C con tumores de colon CT26 subcutáneos, y caracterizar las respuestas inmunes provocadas por los tratamientos en bazo y tumor.

35 El control VXM0m vacío (control de vector de S. typhimurium sin plásmido de expresión) y VXM01mlow (Salmonella typhimurium que lleva un casete de expresión eucariota que codifica VEGFR-2 murino) se administraron a 10⁸ CFU/adm por sonda oral (por os, PO) a través de un tubo de sonda. Independientemente de los grupos de animales, cada animal recibió un tampón de aplicación PO previo a la dosis para neutralizar el ácido en el estómago antes de la dosificación (100 µl/animal/aplicación). Este tampón estaba compuesto por la disolución de 2,6 g de hidrogenocarbonato de sodio, 1,7 g de ácido L-ascórbico, 0,2 g de lactosa monohidrato en 100 ml de agua potable y se aplicó dentro de los 30 min previos a la aplicación de VXM0m vacío y VXM01m mlow.

40 Se inyectó ciclofosfamida a 100 mg/kg/adm en la cavidad peritoneal de los ratones (intraperitonealmente, IP). El volumen de inyección IP no superó los 10 ml/kg y se calculó de acuerdo con el peso corporal más reciente de los ratones.

45 El tratamiento comenzó en el día 0 (D0), un día después de la aleatorización que se consideró como el día -1 (D-1). 33 ratones BALB/C (BALB/CByJ) hembras sanas, de 6 semanas de edad, se aleatorizaron de acuerdo con su peso corporal en 4 grupos de 11 animales, cada uno mediante el uso del software Vivo manager® (Biosystemes, Coutermon, Francia). Se realizó una prueba estadística (análisis de varianza) para evaluar la homogeneidad entre los grupos.

50 El programa de tratamiento fue el siguiente:

Grupo 1: Los animales del grupo 1 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM0m vacío en D1, D3, D5, D7, D14 y D21.

55 Grupo 2: Los animales del grupo 2 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM01 mlow en D1, D3, D5, D7, D14 y D21.

Grupo 3: Los animales del grupo 3 recibieron una única inyección IP de ciclofosfamida en D0 y un total de 6 administraciones PO de VXM01mlow en D1, D3, D5, D7, D14 y D21.

60 El programa de tratamiento se resume en la Tabla 1 y la Figura 26.

65

Tab. 1: Programa de tratamiento

Grupo	Núm. Animales	Tratamiento	Dosis	Ruta	Programa de tratamiento
1*	11	Vector vacío	10 ⁸ CFU/adm	PO	D1, D3, D5, D7, D14 y D21
2*	11	VXM01 mlow	10 ⁸ CFU/adm	PO	D1, D3, D5, D7, D14 y D21
3*	11	VXM01 mlow	10 ⁸ CFU/adm	PO	D1, D3, D5, D7, D14 y D21
		Ciclofosfamida	100 mg/kg/adm	IP	D0
TOTAL	33				

* Cada animal recibió un tampón de aplicación previo a la dosis por vía oral (PO) para neutralizar el ácido en el estómago antes de la dosificación

Los tumores se indujeron por inyección subcutánea de 1x10⁶ de células CT26 en 200 µl de RPMI 1640 en el flanco derecho de los animales de prueba el día 8 (D8).

El día de la terminación (D30, es decir, 22 días después de la inoculación del tumor), se recolectaron los tumores de todos los ratones y se midió el tamaño tumoral.

Los resultados se representan gráficamente en la Figura 27. El tamaño tumoral disminuyó significativamente en animales tratados con VXM01 solo o con VXM01 más ciclofosfamida en comparación con el control de vector vacío. La reducción del tamaño tumoral fue más pronunciada en los animales tratados con ciclofosfamida y la vacuna VXM01.

El día de la finalización, se recolectaron los bazos de todos los ratones (11 muestras por grupo) y se colocaron individualmente en tubos que contenían PBS enfriado (2-8 °C). Se realizó un inmunomonitorio de las respuestas de células T específicas para VEGFR-2 mediante el uso de citometría de flujo con pentámeros.

Para este propósito, las muestras de bazo se lavaron con PBS y posteriormente se homogeneizaron sumergiéndolas a través de un filtro de células de nylon de 100 µm. Durante la homogeneización, el filtro se enjuagó varias veces con PBS estéril frío. Las muestras se centrifugaron a 1.500 rpm durante 10 minutos a 2-8 °C, el sobrenadante se desechó y el sedimento celular se resuspendió en 2 ml de tampón de lisis de glóbulos rojos ACK (1 ml de tampón por bazo). Las células se incubaron en el tampón de lisis durante 1 minuto a temperatura ambiente. Luego, se añadió PBS hasta 40 ml para detener la lisis y la suspensión celular se tamizó a través de un filtro nuevo (40 µm) y el flujo que pasó a través se recolectó en un nuevo tubo de 50 ml. Luego de la centrifugación a 1.500 rpm durante 10 minutos a 2-8 °C, el sobrenadante se desechó y el sedimento se resuspendió en 5 ml de medio DMEM suplementado con IL-2. Las células se incubaron durante la noche a 37 °C y 5% de CO₂.

Antes de la tinción de los pentámeros, se realizó una tinción viva/muerta (L/D) mediante el uso del kit Live Dead (L/D) Fixable Yellow Dead Cell Stain de Invitrogen de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con el fin de excluir las células muertas mediante su inclusión en la población negativa.

La tinción de los pentámeros se realizó mediante el uso de Pro5® Recombinant MHC Pentamers por Proimmune, Oxford, Reino Unido, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se usaron los siguientes pentámeros KDR (VEGFR-2):

H-2Kd - SYQYGTMQTL	KDR-STL
H-2Kd - KYLSYPAPDI	KDR-KDI
H-2Kd - RFVPDGNRI	KDR-RRI
H-2Kd - TYQSIMYIV	KDR-TIV
H-2Kd - DFLTLEHLI	KDR-DLI

Los resultados de la tinción de los pentámeros se muestran en la Figura 28.

El número de células T citotóxicas CD8⁺ específicas para VEGFR-2 aumentó significativamente en animales tratados con VXM01 solo o con VXM01 más ciclofosfamida en comparación con el control de vector vacío. El tratamiento con ciclofosfamida junto con VXM01 aumentó significativamente la respuesta del pentámero KDR en comparación con la respuesta obtenida con la vacuna VXM01 sola.

Los tumores de 5 ratones en cada grupo se analizaron por inmunohistoquímica (IHC).

Para ese propósito, los tumores se fijaron en 10% de formalina tamponada neutra durante de 24 h a 48 h, se transfirieron a etanol y luego se embebieron en parafina. Las muestras embebidas se sometieron a tinción inmunohistoquímica. Los resultados se representan gráficamente en las Figuras 29 y 30.

5 Se encontró que el número medio de células T por unidad de tejido aumentaba en los tumores de ratones tratados con VXM01 solo o con VXM01 más ciclofosfamida en comparación con el control de vector vacío. Se encontró que las poblaciones de células CD3⁺ y CD8⁺ aumentaron aproximadamente tres veces en las muestras tumorales de ratones tratados con VXM01 más ciclofosfamida y aproximadamente dos veces en muestras tumorales de ratones tratados con VXM01 solo. También la población de células T CD4⁺ aumentó en los animales tratados con la vacuna VXM01 con y sin pretratamiento con ciclofosfamida, con un aumento de 1,7 veces en el número medio de células CD4⁺ / área de tejido en ambos grupos de vacunas en comparación con el control de vector vacío.

Además, el número de células inmunes positivas para PD-1 aumentó en un factor de 2,0 y 2,1 y el tumor se enriqueció en células que expresan PD-L1 tras el tratamiento con VXM01 como agente único o en combinación con ciclofosfamida, lo que indica claramente que el tratamiento con VXM01 podría aumentar la susceptibilidad de los tumores hacia el tratamiento con inhibidores de punto de control anti-PD-1 y anti-PD-L1.

Ejemplo 4: estudio de combinación VXM01 / VXM08 en ratones C56BL/6J sanos

20 El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de VXM01m low y VXM08hm para desencadenar una respuesta inmune en ratones sanos.

Se administraron el control VXM0m vacío (control de vector de *S. typhimurium* sin plásmido de expresión), la vacuna VXM01m low (*Salmonella typhimurium* que porta un casete de expresión eucariota que codifica VEGFR-2 murino) y la vacuna VXM08hm (*Salmonella typhimurium* que porta un casete de expresión eucariota que codifica CEA humano) a 10⁸ CFU/adm en 50 µl por aplicación por sonda oral (por os, PO) a través de un tubo de sonda. Independientemente de los grupos de animales, cada animal recibió el tampón PO de aplicación previa a la dosis para neutralizar el ácido en el estómago antes de la dosificación (50 µl/animal/aplicación antes de la administración de la vacuna única; 100 µl/animal/aplicación antes de la administración combinada de VXM01 y VXM08). Este tampón estaba compuesto por la disolución de 2,6 g de hidrogenocarbonato de sodio, 1,7 g de ácido L-ascórbico, 0,2 g de lactosa monohidrato en 100 ml de agua potable y se aplicó dentro de los 30 min previos a la aplicación de VXM0m vacío, VXM01 m low y/o VXM08hm.

40 ratones C57BU6J hembras sanas, de 6-7 semanas de edad, se aleatorizaron el día 0 (D0) de acuerdo con su peso corporal en 5 grupos de 8 animales cada uno mediante el uso del software Vivo manager® (Biosystemes, Couternon, Francia). Se realizó una prueba estadística (análisis de varianza) para evaluar la homogeneidad entre los grupos.

El programa de tratamiento fue el siguiente:

Grupo 1: Los animales del grupo 1 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM0m vacío en D1, D3, D5, D7, D14 y D21.

Grupo 2: Los animales del grupo 2 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM01 m low en D1, D3, D5, D7, D14 y D21.

Grupo 3: Los animales del grupo 3 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM08hm en D2, D4, D6, D8, D15 y D22.

45 Grupo 4: Los animales del grupo 4 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM01 m low en D2, D4, D6, D8, D15 y D22 y un total de 6 administraciones PO de VXM08hm en D2, D4, D6, D8, D15 y D22.

Grupo 5: Los animales del grupo 5 recibieron un total de 6 administraciones PO de VXM01m low en D1, D3, D5, D7, D14 y D21 y un total de 6 administraciones PO de VXM08hm en D2, D4, D6, D8, D15 y D22.

50 El programa de tratamiento se resume en la Tabla 2.

Grupo	Núm. Ratones	Tratamiento	Dosis (CFU/adm)	Volumen (µl)	Ruta	Programa de tratamiento
1	8	Vector vacío		50	PO	Sensibilización: D1, D3, D5, D7 Refuerzo: D14, D21
2	8	VXM01m low	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D1, D3, D5, D7 Refuerzo: D14, D21
3	8	VXM08hm	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D2, D4, D6, D8 Refuerzo: D15, D22
4	8	VXM01m low	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D2, D4, D6, D8 Refuerzo: D15 y D22
		VXM08hm* (concomitante)	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D2, D4, D6, D8 Refuerzo: D15, D22

ES 2 760 699 T3

5	8	VXM01mlow	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D1, D3, D5, D7 Refuerzo: D14, D21
		VXM08hm (días alternos)	10 ⁸	50	PO	Sensibilización: D2, D4, D6, D8 Refuerzo: D15, D22
*VXM08 se administró justo después de VMX01, el mismo día de la aplicación.						

El día de la finalización (es decir, D29), se recolectaron los bazos de todos los ratones (8 muestras por grupo) y se colocaron individualmente en tubos que contenían PBS enfriado (2-8 °C). Se realizó el inmunomonitorio de las respuestas de células T específicas para VEGFR-2 y CEA mediante el uso de citometría de flujo con pentámeros. El análisis de los pentámeros incluida la tinción viva/muerta anterior se realizó como se describe en el Ejemplo 3.

Los siguientes pentámeros KDR (VEGFR-2) se usaron como una mezcla de grupo en la misma proporción:

H-2Db-VILTNPISM	KDR2
H-2Db-FSNSTNDILI	KDR3

Los siguientes pentámeros CEA se usaron como una mezcla de grupo en la misma proporción:

H-2Db-CGIQNSVSA	CEA-CSA-Penta
H-2Db-LQLSNGNRTL	CEA-LTL-Penta
H-2Db-CGIQNKLSV	CEA-CSV-Penta

Los resultados de la tinción de los pentámeros se muestran en la Figura 31. La frecuencia media de las células T CD8⁺ específicas para VEGFR-2 (KDR) fue 1,71, 4,36 y 2,76 veces mayor en los ratones tratados con VXM01mlow, VXM01mlow/VXM08hm (concomitante) y VXM01 mlow/VXM08hm (días alternos) respectivamente que en el grupo de control. Los ratones tratados con VXM01 mlow/VXM08hm ya sea concomitantemente o en días alternos mostraron una mayor frecuencia de células T CD8⁺ específicas para VEGFR-2 en comparación con los ratones tratados con VXM01 mlow solo. Aunque no fue estadísticamente significativo, la sinergia fue ligeramente mayor cuando VXM01 mlow y la vacuna VXM08hm se aplicaron concomitantemente, es decir, el mismo día en comparación con el régimen de días alternos.

La frecuencia media de células T CD8⁺ específicas para CEA fue 1,29, 2,23 y 1,95 veces mayor en ratones tratados con VXM08hm, VXM01mlow/VXM08hm (concomitante) y VXM01mlow/VXM08hm (días alternos) respectivamente que en el grupo de control. Los ratones tratados con VXM01 mlow/VXM08hm concomitantemente o en días alternos mostraron una mayor frecuencia de células T CD8⁺ específicas para CEA en comparación con los ratones tratados con VXM08hm solo. Aunque no fue estadísticamente significativo, la sinergia fue ligeramente mayor cuando VXM01 mlow y la vacuna VXM08hm se aplicaron concomitantemente, es decir, el mismo día en comparación con el régimen de días alternos.

REIVINDICACIONES

1. Una cepa atenuada de *Salmonella typhi* Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF, para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.
2. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.
3. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la molécula de ADN comprende el gen de resistencia al antibiótico kanamicina, el ori pMB1 y un promotor de CMV.
4. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos una cepa atenuada adicional de *Salmonella typhi* Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión eucariota adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral.
5. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho antígeno tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de *Salmonella* se selecciona del grupo que consiste en la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, la Mesotelina humana (MSLN) que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CEA humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 5 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 7 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, y CMV pp65 que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en SEQ ID NO 8 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma, particularmente en donde la proteína tumoral de Wilms humana (WT1) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 3, la Mesotelina humana (MSLN) tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 4, CEA humano tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 5, y CMV pp65 tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 6, SEQ ID NO 7 o SEQ ID NO 8, y en donde dicho antígeno de estroma tumoral codificado por dicha cepa atenuada adicional de *Salmonella* se selecciona del grupo que consiste en proteína de activación de fibroblastos (FAP) humana.
6. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la cepa atenuada de *Salmonella* se administra simultáneamente con o antes de dicho al menos un inhibidor de punto de control.
7. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el tratamiento se acompaña de quimioterapia o radioterapia.
8. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la cepa atenuada de *Salmonella* se administra por vía oral.
9. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el cáncer se selecciona de cáncer colorrectal, cáncer pancreático, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, mesotelioma, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, glioblastoma, cáncer gástrico, cáncer hepatocelular, cáncer de células renales, cáncer de próstata, y cáncer cervical.
10. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde una dosis única de la cepa atenuada de *Salmonella* comprende de alrededor de 10^6 a alrededor de 10^9 unidades formadoras de colonias (CFU).
11. La cepa atenuada de *Salmonella* para su uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el tratamiento es inmunoterapia individualizada contra el cáncer que comprende la etapa de evaluar el patrón de expresión y/o la respuesta preinmune contra dicho antígeno tumoral en un paciente.

12. Una composición farmacéutica que comprende una cepa atenuada de *Salmonella typhi* Ty21a que comprende al menos una copia de una molécula de ADN que comprende un casete de expresión eucariota que codifica una proteína receptora de VEGF para su uso en el tratamiento del cáncer, en donde la composición farmacéutica comprende, además, al menos una cepa atenuada adicional de *Salmonella* que comprende al menos una copia de una molécula de ADN adicional que comprende un casete de expresión adicional que codifica un antígeno tumoral o un antígeno de estroma tumoral, y en donde el tratamiento comprende, además, la administración de al menos un inhibidor de punto de control seleccionado del grupo que consiste en un anticuerpo contra PD-1, PD-L1 y CTLA4.
- 5
- 10 13. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la proteína receptora de VEGF se selecciona del grupo que consiste en VEGFR-2 humano que tiene la secuencia de aminoácidos como se encuentra en la SEQ ID NO 1 y una proteína que comparte al menos una identidad de secuencia de alrededor del 80% con la misma.

ES 2 760 699 T3

Figura 1

10	20	30	40	50	60
MQSKVLLAVA	LWLCVETRAA	SVGLPSVSLD	LPRLSIQKDI	LTIKANTTLQ	ITCRGQRDL D
70	80	90	100	110	120
WLWPNNQSGS	EQRVEVTECS	DGLFCKTLTI	PKVIGNDTGA	YKCFYRETDL	ASVIYVYVQD
130	140	150	160	170	180
YRSPFIASVS	DQHG VVYITE	NKNKT VVIPC	LGSISNLNVS	LCARYPEKRF	VPDGNRISWD
190	200	210	220	230	240
SKKGFTIPSY	MISYAGMVFC	EAKINDESYQ	SIMYIVVVVG	YRIYDVVLS P	SHGIELSVGE
250	260	270	280	290	300
KLVLNCTART	ELNVGIDFNW	EYPSSKHQHK	KLVNRDLKTQ	SGSEMKKFLS	TLTIDGVTRS
310	320	330	340	350	360
DQGLYTCAAS	SGLMTKKNST	FVRVHEKPFV	AFGSGMESLV	EATVGERVRI	PAKYLGYPPP
370	380	390	400	410	420
EIKWYKNGIP	LESNHTIKAG	HVLTIMEVSE	RDTGN YTVIL	TNPISKEKQS	HVVSLVYVYP
430	440	450	460	470	480
PQIGEKSLIS	PVDSYQYGTT	QTLTCTVYAI	PPPHIHWWY	QLEEECANEP	SQAVSVTNPY
490	500	510	520	530	540
PCEEWRSVED	FQGGNKIEVN	KNQFALIEGK	NKT VSTLVIQ	AANVSALYKC	EAVNKVGRGE
550	560	570	580	590	600
RVISFHVTRG	PEITLQPD MQ	PTEQESVSLW	CTADRSTFEN	LTWYKLGPOP	LPIHVGELPT
610	620	630	640	650	660
PVCKNLDTLW	KLNATMFSNS	TNDILIMELK	NASLQDQGDY	VCLAQDRKTK	KRHCVVRQLT

ES 2 760 699 T3

Figura 1 (cont.)

670	680	690	700	710	720
VLERVAPTIT	GNLENQTTSI	GESIEVSCTA	SGNPPQIMW	FKDNETLVED	SGIVLKDGNR.
730	740	750	760	770	780
NLTIRRVKE	DEGLYTCQAC	SVLGCAKVEA	FFIIEGAQEK	TNLEIIILVG	TAVIAMFFWL
790	800	810	820	830	840
LLVIILRTVK	RANGGELKTG	YLSIVMDPDE	LPLDEHCERL	PYDASKWEFP	RDRLKLGKPL
850	860	870	880	890	900
GRGAFQVIE	ADAFGIDKTA	TCRTVAVKML	KEGATHSEHR	ALMSELKILI	HIGHHLNVVN
910	920	930	940	950	960
LLGACTKPGG	PLMVIVEFCK	FGNLSTYLRS	KRNEFVPYKT	KGARFRQGKD	YVGAI PVDLK
970	980	990	1000	1010	1020
RRLDSITSSQ	SSASSGFVEE	KSLSDVEEEE	APEDLYKDFL	TLEHLICYSF	QVAKGMEFLA
1030	1040	1050	1060	1070	1080
SRKCIHRDLA	ARNILLSEKN	VVKICDFGLA	RDIYKDPDYV	RKGDARLPLK	WMAPETIFDR
1090	1100	1110	1120	1130	1140
VYTIQSDVWS	FGVLLWEIFS	LGASPYPGVK	IDEEFCRRLK	EGTRMRAPDY	TTPEMYQTML
1150	1160	1170	1180	1190	1200
DCWHGEPSQR	PTFSELVEHL	GNULLQANAQQ	DGKDYIVLPI	SETLSMEEDS	GLSLPTSPVS
1210	1220	1230	1240	1250	1260
CMEEEEVCDP	KFHYDNTAGI	SQYLQNSKRK	SRPVSVKTFE	DIPLEEPEVK	VIPDDNQTDS
1270	1280	1290	1300	1310	1320
GMVLASEELK	TLEDRTKLSP	SFGGMVPSKS	RESVASEGSN	QTSQYQSGYH	SDDTDTTVYS

Figura 1 (cont.)

1330 1340 1350
SEEAELLKLI EIGVQTGSTA QILQPDSGTT LSSPPV

Figura 2

TGGGCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTGACTCTTCGCGATGTACGGGCCA
 GATATACGCGTTGACATTGATTATTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTC
 ATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCC
 GCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCGCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCC
 CCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGACTATTTACGGT
 AACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTG
 ACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGG
 GACTTTCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATG
 CGTTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGTTTTGACTCACGGGGATTTCC
 AAGTCTCCACCCATTGACGTCAATGGGAGTTTTTTTTGGCACCAAATCAACGGG
 ACTTTCCAAAATGTCGTAACAACCTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGT
 GTACGGTGGGAGGTCTATAAAGCAGAGCTCTCTGGCTAACTAGAGAACCCTACTGC
 TTAAGTGGCTTATCGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCCAAGCTGGCTAGCC
 TCGAGTCTAGAGGGCCCGTTTAAACCCGCTGATCAGCCTCGACTGTGCCTTCTAGT
 TGCCAGCCATCTGTTGTTTGCCCTCCCGCGTGCCTTCTTGACCCTGGAAGGTGC
 CACTCCCACTGTCTTTCTAATAAAATGAGGAAATTGCATCGCATTGTCTGAGTAG
 GTGTCATTCTATTCTGGGGGGTGGGGTGGGGCAGGACAGCAAGGGGGAGGATTG
 GGAAGACAATAGCAGGCATGCTGGGGATGCGGTGGGCTCTATGGCTTCTACTGGG
 CGTTTTTATGGACAGCAAGCGAACCAGGAAATTGCCAGCTGGGGCGCCCTCTGGTAA
 GGTGGGAAGCCCTGCAAAGTAACTGGATGGCTTTCTCGCCGCCAAGGATCTGAT
 GGCAGGAGGGATCAAGCTCTGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGCATGATT
 GAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCTG
 GCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGGCT
 GTCAGCGCAGGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTG
 AATGAAGTGAAGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGGCGTTC
 CTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATT
 GGGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAA
 GTATCCATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTG
 CCCATTCGACCACCAAGCGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAA
 GCCGGTCTTGTGATCAGGATGATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCGCGCCAG
 CCGAACTGTTTCGCCAGGCTCAAGGCGAGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGT
 GACCCATGGCGATGCCTGCTTGCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTG
 GATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCGGACCGCTATCAGGACATAGCGTT
 GGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCTC
 GTGCTTTACGGTATCGCCGCTCCCGATTGCGAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCT
 TGACGAGTTCCTTCTGAATTATTAACGCTTACAATTTCTGATGCGGTATTTTCTCCTT
 ACGCATCTGTGCGGTATTTACACCCGCATACAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTG
 CGCGGAACCCCTATTTGTTTATTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGA
 GACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATAGCACGTGCTAAAACCTCATTTTTAATT
 TAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAATCCCTTAACGT
 GAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCATCAGTGACCAAACAGGAAAAAACC
 GCCCTTAACATGGCCCGCTTTATCAGAAGCCAGACATTAACGCTTCTGGAGAACT
 CAACGAGCTGGACGCGGATGAACAGGCAGACATCTGTGAATCGCTTCACGACCAC

Figura 2 (cont.)

GCTGATGAGCTTTACCGCAGCTGCCTCGCGCGTTTCGGTGATGACGGTGAAAACCT
CTGACACATGCAGCTCCCGGAGACGGTCACAGCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGG
AGCAGACAAGCCCGTCAGGGCGCGTCAGCGGGTGTGGCGGGTGTGGGGGCGCA
GCCATGACCCAGTCACGTAGCGATAGCGGAGTGTATACTGGCTTAACTATGCCGGCA
TCAGAGCAGATTGTACTGAGAGTGCACCATATGCGGTGTGAAATACCGCACAGATG
CGTAAGGAGAAAATACCGCATCAGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGC
TGGCTCGGTTCGTTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAAT
ACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAAGGCC
AGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTC
CGCCCCCTGACGAGCATCACAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACC
CGACAGGACTATAAAGATAACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCCTCT
CCTGTTCCGACCCTGCCGTTACCGGATACCTGTCCGCTTTCTCCCTTCGGGAAG
CGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTT
GCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCGTTCCAGCCCGACCGCTGCGCCTT
ATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGG
CAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGA
GTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTG
CGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGAAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCA
AACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGC
AGAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATC

ES 2 760 699 T3

Figura 3

10 20 30 40 50 60
MGSDVRDLNA LLPAVPSLGG GGGCALPVSG AAQWAPVLDL APPGASAYGS LGGPAPPPAP

70 80 90 100 110 120
PPPPPPPHS FIKQEPSWGG AEPHEEQCLS AFTVHFSGQF TG TAGACRYG PFGPPPPSQA

130 140 150 160 170 180
SSGQARMFPN APYLPSCLES QPAIRNQGYS TVTFDGTPSY GHTPSHAAQ FPNHSFKHED

190 200 210 220 230 240
PMGQQGSLGE QQYSVPPPVY GCHTPTDSCT GSQALLRTP YSSDNLYQMT SQLECM TWNQ

250 260 270 280 290 300
MNLGATLKGV AAGSSSSVKW TEGQSNHSTG YESDNHTTPI LCGAQYRIHT HGVFRGIQDV

310 320 330 340 350 360
RRVPGVAPTL VRSASETSEK RPFMCAYPGC NKRYFKLSHL QMHSRKHTGE KPYQCDFKDC

370
ERRFSRSDQL K

Figura 4

MALPTARPLLGSCGTPALGSLLFLLFSLGWVQPSRTLGETGQEAAPLDGVLANPPNISSLS
PRQLLGFPCAEVSGLSTERVRELAVALAQKNVKLSTEQLRCLAHRLSEPPEDLDALPLDLLL
FLNPDAFSGPQACTRFFSRITKANVDLLPRGAPERQRLPAALACWGVVRSLLSEADVRL
GGLACDLPGRFVAESAEVLLPRLVSCPGPLDQDQQAARAALQGGGPPYGPPSTWSVST
MDALRGLLPVLGQPIIRSIPQGIVAARQRSSRDPSWRQPRTLPRFRREVEKTACPSGK
KAREIDESLIFYKKWELEACVDAALLATQMDRVNAIPFTYEQLDVLKHKLDELYPQGYPESVI
QHLGYLFLKMSPEDIRKWNVTSLKALLEVNKGHEMSPQAPRRPLPQVATLIDRFVKGR
GQLDKDLDLTLTAFYPGYLCSLSPEELSSVPPSSIWAVRPQDLDTCDPRQLDVLYPKARLAF
QNMNGSEYFVKIQSFLGGAPTEDLKALSQQNVSMDLATFMKLRTDAVLPLTVAEVQKLLGP
HVEGLKAEERHRPVRDWILRQRQDDLDTLGLGLQGGIPNGYLVLDLSMQEALSGTPCLLGP
GPVLTVLALLASTLA

Figura 5

MESPSAPPHRWCIPWQRLLLLTASLLTFWNPPTAKLTIESTPFNVAEGKEVLLL VHNLP
QHILFGYSWYKGERVDGNRQIIGYVIGTQQATPGPAYSGREIIPNASLLIQNIIQN DTGFY
TLHVIKSDLVNEEATGQFRVYPELPKPSISSNNSKPVEDKDAVAFTCEPETQDATYLWW
VNNQSLPVSPRLQLSNGNRTLTLFNVTRNDTASYKCETQNPVSARRSDSVILNVLYGPD
APTISPLNTSYRSGENLNLSCHAASNPPAQYSWVNGTFQQSTQELFIPNITVNNSGSY
TCQAHNSDTGLNRRTT VTTITVYAEPKPFITSNNSNPVEDEDAVALTCEPEIQNTTYLW
WVNNQSLPVSPRLQLSNDNRTL TLLSVTRNDVGPYECGIQNKLSVDHSDPVILNVLYGP
DDPTISPSYTYRPGVNL SLSCHAASNPPAQYSWLIDGNIQQHTQELFISNITEKNSGLY
TCQANNSASGHSRTTVKTITVSAELPKPSISSNNSKPVEDKDAVAFTCEPEAQNTTYLW
WVNGQSLPVSPRLQLSNGNRTLTLFNVTRNDARAYVCGIQNSVSANRSDPVTLDVLYG
PDTPIISPPDSSYLSGANLNLSCHSASNPSQYSWRINGIPQQHTQVLFIAKITPNNNGTY
ACFVSNLATGRNNSIVKSITVSASGTSPGLSAGATVGIMIGVLVGVALI

Figura 6

MESRGRRCPEMISVLGPISGHVLKAVFSRGDTPVLPHETRLQLTGIHVRVSQPSLILVSQ
YTPDSTPCHRGNLQVQHTYFTGSEVENVSNNVHNPTGRSICPSQEPMSIYVYALPL
KMLNIPSINVHHYPSAAERKHRHLPVADAVIHASGKQMWQARLTVSGLAWTRQQNQW
KEPDVYYTSAFVFPTKDVALRHVVCAHELVCSEMENTRATKMQVIGDQYVKVYLESFCE
DVPSGKLFMHVTLGSDVEEDLTMTRNPQPFMRPHERNGFTVLCPKNMIIKPGKISHIML
DVAFTSHEHFGLLCPKSIPGLSISGNLLMNGQQIFLEVQAIRETVELRQYDPVAALFFDI
DLLLQRGPQYSEHPTFTSQYRIQKLEYRHTWDRHDEGAAQGDDDVWTSGSDSDEEL
VTTERTKTPRVTGGGAMAGASTSAGRKRKSASSATACTAGVMTRGRLKAESTVAPEED
TDESDNEIHNPVFTWPPWQAGILARNLVPVATVQGGQNLKYQEFFWDANDIYRIFA
ELEGVWQPAAQPKRRRHRQDALPGPCIASTPKKHRG

Figura 7

MESRGRRCPEMISVLGPISGHVLKAVFSRGDTPVLPHETRLLQTGIHVRVSQPSSLILVSQ
YTPDSTPCHRGNLQVQHTYFTGSEVENVSVNVHNPTGRSICPSQEPMSIYVYALPL
KMLNIPSINVHHYPSAAERKHRHLPVADAVIHASGKQMWQARLTVSGLAWTRQQNQW
KEPDVYYTSAFVFPTKDVALRHVVCAHELVCSEMENTRATKMQVIGDQYVKVYLESFCE
DVPSGKLFMHVTLGSDVEEDLTMTRNPQPFMRPHERNGFTVLCPKNMIIKPGKISHIML
DVAFTSHEHFGLLCPKSIPGLSISGNLLMNGQQIFLEVQAIRETVELRQYDPVAALFFDI
DLLLQRGPQYSEHPTFTSQYRIQGKLEYRHTWDRHDEGAAQGDDDVWTSGSDSDEEL
VTTERTKPRVTGGGAMAGASTSAGRNRKSASSATACTAGVMTRGRLKAESTVAPEED
TDESDNEIHNPVFTWPPWQAGILARNLVPMVATVQGQNLKYQEFFWDANDIYRIFA
ELEGVWQPAAQPKRRRHRQDALPGPCIASTPKKHRG

Figura 8

MESRGRRCPEMISVLGPISGHVLKAVFSRGDTPVLPHETRLLQTGIHVRVSQPSLILVSQ
YTPDSTPCHRGNLQVQHTYFTGSEVENSVNVHNPTGRSICPSQEPMSIYVYALPL
KMLNIPSINVHHYPSAAERKHRHLPVADAVIHASGKQMWQARLTVSGLAWTRQQNQW
KEPDVYYTSAFVFPTKDVALRHVCAHELVCSEMENTRATKMQVIGDQYVKVYLESFCE
DVPSGKLFMHVTLGSDVEEDLTMTRNPQPFMRPHERNGFTVLCPKNMIKPGKISHIML
DVAFTSHEHFGLLCPKSIPGLSISGNLLMNGQQIFLEVQAIRETVELRQYDPVAALFFDI
DLLLQRGPQYSEHPTFTSQYRIQGKLEYRHTWDRHDEGAAQGDDDWTS GSDSDEEL
VTERKTTPRVTGGGAMAGASTSAGRNRKSASSATACTAGVMTRGRLKAESTVAPEED
TDESDNEIHNPVFTWPPWQAGILARNLVPMVATVQGQNLKYQEFFWDANDIYRIFA
ELEGVWQPAAQ

Figura 9

atgcagagcaagggtgctgctggccgtgcacctgtggctctgctgagaccgggcccgcctctgtgggttgcctaggtttct
ctgatctgccaggctcagcatacaaaaagacatacttacaattaaggctaatacaactctcaaattactgcaggggac
agagggactggactggccttggcccaataatcagagtggcagtgagcaaaagggagggtgactgagtcagcagatgg
cctctctgtaagacactcacaattccaaaagtgatcggaatgacactggagcctacaagtgcttaccgggaaactgac
ttggcctcggtcatttatgtctatgttcaagattacagatcctcatttattgcttctgttagtgaccaacatggagtcgtacattact
gagaacaaaaacaaaactgtggtgattccatgtctcgggtccatttcaaactcaacgtgtcactttgtcaagataccaga
aaagagattgttctgatggaacagaatttctgggacagcaagaagggcttactattcccagctacatgatcagctatgc
tgcatggtctctgtgaagcaaaaattatgatgaaagttaccagctattatgtacatagttgctgttagggatagggatta
tgatgtggtctgagtcctgctcatggaattgaactatctgttggagaaaagctgtcttaaattgtacagcaagaactgaacta
aatgtggggattgactcaactgggaatacccttctcgaagcatcagcataagaaactgtaaaccgagacctaataaacc
cagctcgggagtgagatgaagaaatfttgagcaccttaactatagatgggtgaaccgggagtgaccaaggattgtacacct
gtgcagcatccagtgggctgatgaccaagaagaacagcacattgtcagggctcatgaaaaacctttgttgcctttggaagt
ggatggaatctctgttgggaagccacgggtgggggagcgtgtcagaatccctgcaagtaacctgttaccaccccaga
aataaaatggtataaaaatggaatacccctgagtcacacataaagcggggcatgtactgacgattatggaagt
gagtgaaagagacacaggaatfacactgtcatccttaccatcccatttcaaaggagaagcagagccatgtggtctctct
ggtgtgtatgtcccaccccagattggtgagaaatctctaactctcctgttgattcctaccagtacggcaccactcaaagct
gacatgtacggctatgccattcctccccgcacatccactggattggcagttggaggaagagtgcccaacgagccc
agccaagctgtctcagtgacaaaccatacccttgaagaatggagaagtgaggagactccagggaggaaataaaa
ttgaagtaataaaaatcaattgtcttaattgaaggaaaaacaaaactgtaagtaacctgttatccaagcggcaaatgtgt
cagctttgtacaaatgtgaagcggcaacaaagtcgggagaggagagagggtgatctcctccacgtgaccaggggtcct
gaaactactttgcaacctgacatgcagcccactgagcaggagagcgtgtcttgggtgactgcagacagatctacgtttga
gaacctacatggtacaagcttggcccacagcctctgccaatccatgtgggagagttgccacacctgtttgcaagaactg
gatactttggaaatgaaatgccaccatgttctctaatagcaaaaatgacattttgatcatggagcttaagaatgacatcctgca
ggaccaaggagactatgtctgcctgtcgaagacaggaagaccaagaaaagacattgctggtgagcagctcacagtc
ctagagcgtgtggcaccacgatcacaggaaacctggagaatcagacgacaagattggggaaagcatcgaagtctcat
gcacggcatctgggaatccccctccacagatcatgtggtttaaagataatgagaccctgtagaagactcaggcattgtattg
aaggatgggaaccggaacctcaactatccgcagagtgaggaaggaggacgaaggcctctacacctgccaggcatgcag
tgttctggctgtgcaaaagtggaggcattttcataatagaagggtgccaggaaaagacgaactggaaatcattattctagt
aggcacggcgggtgattgcatgttcttctggctactctgtcatcatcctacggaccgtaagcgggccaatggaggggaact
gaagacaggctactgtccatcgtcatggatccagatgaactcccattggatgaacattgtgaacgactgcctatgatgcca
gcaaatgggaattcccagagaccggctgaagctaggaagcctcttggccgtggtgccttggccaagtattgaagcag
atgccttgggaattgacaagacagcaactgcaggacagtagcagtaaaaatgttgaagaaggagcaacacacagtg
gcatcagctctcatgtctgaactcaagatcctcattcataatgttaccatctcaatgtgtcaacctctaggtgctgtacca
agccaggaggccactcatggtgattgtggaattctgcaaatgtgaaacctgtccactacctgaggagcaagagaaatg
aatgtgccctacaagacaaagggcagattccgtcaagggaaagactacgttggagcaatccctgtggatctgaaa
cggcgttggacagcatcaccagtagccagagctcagccagctctggattgtggaggagaagtcctcagtgatgtaga
agaagaggaagctcctgaagatctgtataaggacttctgacctggagcatctcatctgttacagcttccaagtggctaagg
gcatggagttctggcatcgcgaaagtgtatccacagggacctggcggcagaaatacctcttatcggagaagaacgtgg
ttaaactctgtgacttggcttggcccgggatattataaagatccagattatgtcagaaaaggagatgctgcctcccttgaa
atggatggcccagaaacaatftttgacagagtgacacaatccagagtgacgtctggcttfttgggttfttctgtgggaaata
tttcttaggtgcttccatacctggggtaaagattgatgaagaatftttagggcattgaaagaaggaactagaatgagg
gcccctgattatactacaccagaaatgtaccagaccatgctggactgctggcacggggagcccagtcagagaccacggt
ttcagagttggtggaacatttgggaaatctcttgaagctaattgtcagcaggatggcaaagactacattgttctccgatca
gagactttgagcatggaagaggattctggactctctgctacctcactgttctctgatggaggaggaggaagtatgtgac
cccaaatccattatgacaacacagcaggaatcagtcagatctgcagaacagtaagcgaagagccggcctgtgagtg
aaaaacattgaaagatacccgttagaagaaccagaagtaaaagtaatcccagatgacaaccagacggacagtggtatg
gttcttgcctcagaagagctgaaaacttgggaagacagaaccaaatatctccatcttfttgggtggaatgggtgccagcaaaag
cagggagctgtggcatcgaaggctcaaaccagacaagcggctaccagtcgggatcactccgatgacacagacacc
accgtgtactccagtgaggaagcagaactfttaagctgatagagattggagtgcaaacgggtgacacagcccagattctc
cagcctgactcggggaccacactgagctctcctcctgttaa

Figura 10

ATGGACTTCCTCTTGCTGCAGGACCCGGCTTCCACGTGTGTCCCGGAGCCGGCGTCTC
AGCACACGCTCCGCTCCGGGCCTGGGTGCCTACAGCAGCCAGAGCAGCAGGGAGTCC
GGGACCCGGGCGGCATCTGGGCCAAGTTAGGCGCCGCGAGGCCAGCGCTGAACGT
CTCCAGGGCCGGAGGAGCCGCGGGGCGTCCGGGTCTGAGCCGCAGCAAATGGGCTC
CGACGTGCGGGACCTGAACGCGCTGCTGCCCGCCGTCCCCTCCCTGGGTGGCGGCG
GCGGCTGTGCCCTGCCTGTGAGCGGCGCGGCGCAGTGGGCGCCGGTGCTGGACTTTG
CGCCCCGGGCGCTTCGGCTTACGGGTCGTTGGGCGGCCCGCGCCGCCACCGGCT
CCGCCGCCACCCCCGCCGCCGCCGCCTCACTCCTTCATCAAACAGGAGCCGAGCTGG
GGCGGCGCGGAGCCGCACGAGGAGCAGTGCCTGAGCGCCTTCACTGTCCACTTTTCC
GGCCAGTTCCTGACCACAGCCGGAGCCTGTCGCTACGGGCCCTTCGGTCTCCTCCG
CCCAGCCAGGCGTCATCCGGCCAGGCCAGGATGTTTCCTAACGCGCCCTACCTGCCCA
GCTGCCTGGAGAGCCAGCCCGCTATTTCGCAATCAGGGTTACAGCACGGTACCTTCGA
CGGGACGCCCAGCTACGGTCACACGCCCTCGCACCATGCGGCGCAGTTCCCCAACCA
CTCATTCAAGCATGAGGATCCCATGGGCCAGCAGGGCTCGCTGGGTGAGCAGCAGTAC
TCGGTGCCGCCCCCGGTCTATGGCTGCCACACCCCCACCGACAGCTGCACCGGCAGC
CAGGCTTTGCTGCTGAGGACGCCCTACAGCAGTGACAATTTATACCAAATGACATCCCA
GCTTGAATGCATGACCTGGAATCAGATGAACTTAGGAGCCACCTTAAAGGGAGTTGCTG
CTGGGAGCTCCAGCTCAGTGAAATGGACAGAAGGGCAGAGCAACCACAGCACAGGGTA
CGAGAGCGATAACCACACAACGCCCATCCTCTGCGGAGCCCAATACAGAATACACAG
CACGGTGTCTTCAGAGGCATTCACTGA

Figura 11

ATGGCCTTGCCAACGGCTCGACCCCTGTTGGGGTCCTGTGGGACCCCGCCCTCGGC
 AGCCTCCTGTTCTGCTCTTCAGCCTCGGATGGGTGCAGCCCTCCAGGACCCCTGGCTG
 GAGAGACAGGGCAGGAGGCTGCGCCCCTGGACGGAGTCCTGGCCAACCCACCTAACA
 TTTCCAGCCTCTCCCCTCGCCAACCTCCTTGGCTTCCCGTGTGCGGAGGTGTCCGGCCT
 GAGCACGGAGCGTGTCCGGGAGCTGGCTGTGGCCTTGGCACAGAAGAATGTCAAGCT
 CTCAACAGAGCAGCTGCGCTGTCTGGCTCACCGGCTCTCTGAGCCCCCGAGGACCTG
 GACGCCCTCCCATTGGACCTGCTGCTATTCTCAACCCAGATGCGTTCTCGGGGCCCC
 AGGCCTGCACCCGTTTTCTTCTCCCGCATCACGAAGGCCAATGTGGACCTGCTCCCGAG
 GGGGGCTCCCGAGCGACAGCGGCTGCTGCCTGCGGCTCTGGCCTGCTGGGGTGTGC
 GGGGGTCTCTGCTGAGCGAGGCTGATGTGCGGGCTCTGGGAGGCCTGGCTTGCGACC
 TGCTGGGCGCTTTGTGGCCGAGTCGGCCGAAGTGTGCTACCCCGGCTGGTGAGCT
 GCCCGGACCCCTGGACCAGGACCAACAGGAGGCAGCCAGGGCGGCTCTGCAGGGC
 GGGGGACCCCTACGGCCCCCGTTCGACATGGTCTGTCTCCACGATGGACGCTCTG
 CGGGGCTGCTGCCCGTGTGGGCCAGCCCATCATCCGCAGCATCCCGCAGGGGCATC
 GTGGCCGCGTGGCGGCAACGCTCCTCTCGGGACCCATCCTGGCGGCAGCCTGAACGG
 ACCATCCTCCGGCCGCGGTTCCGGCGGGAAGTGGAGAAGACAGCCTGTCTTCAGGC
 AAGAAGGCCCGCGAGATAGACGAGAGCCTCATCTTCTACAAGAAGTGGGAGCTGGAAG
 CCTGCGTGGATGCGGCCCTGCTGGCCACCCAGATGGACCGCGTGAACGCCATCCCCT
 TCACCTACGAGCAGCTGGACGTCCTAAAGCATAAACTGGATGAGCTCTACCCACAAGGT
 TACCCCGAGTCTGTGATCCAGCACCTGGGCTACCTCTTCTCAAGATGAGCCCTGAGG
 ACATTCGCAAGTGAATGTGACGTCCTGGAGACCCTGAAGGCTTTGCTTGAAGTCAAC
 AAAGGGCACGAAATGAGTCCTCAGGCTCCTCGGCGGCCCTCCCACAGGTGGCCACC
 CTGATCGACCGCTTTGTGAAGGGAAGGGGCCAGCTAGACAAAGACACCCTAGACACCC
 TGACCGCTTCTACCCTGGGTACCTGTGCTCCCTCAGCCCCGAGGAGCTGAGCTCCGT
 GCCCCCCAGCAGCATCTGGGCGGTGAGGCCCCAGGACCTGGACACGTGTGACCCAAG
 GCAGCTGGACGTCCTCTATCCCAAGGCCCGCCTTGCTTTCCAGAACATGAACGGGTCC
 GAATACTTCGTGAAGATCCAGTCCTTCTGGGTGGGGCCCCCACGGAGGATTTGAAGG
 CGCTCAGTCAGCAGAATGTGAGCATGGACTTGGCCACGTTTATGAAGCTGCGGACGGA
 TGCGGTGCTGCCGTTGACTGTGGCTGAGGTGCAGAACTTCTGGGACCCACGTTGGAG
 GGCCTGAAGGCGGAGGAGCGGCACCGCCCGGTGCGGGACTGGATCCTACGGCAGCG
 GCAGGACGACCTGGACACGCTGGGGCTGGGGCTACAGGGCGGCATCCCCAACGGCTA
 CCTGGTCCTAGACCTCAGCATGCAAGAGGCCCTCTCGGGGACGCCCTGCCTCCTAGGA
 CCTGGACCTGTTCTCACCGTCCTGGCACTGCTCCTAGCCTCCACCCTGGCCTGA

Figura 12

ATGGAGTCTCCCTCGGCCCTCCCCACAGATGGTGCATCCCCTGGCAGAGGCTCC
 TGCTCACAGCCTCACTTCTAACCTTCTGGAACCCGCCACCACTGCCAAGCTCACT
 ATTGAATCCACGCCGTTCAATGTCGCAGAGGGGAAGGAGGTGCTTCTACTTGTCCA
 CAATCTGCCCCAGCATCTTTTTGGCTACAGCTGGTACAAAGGTGAAAGAGTGGATG
 GCAACCGTCAAATTATAGGATATGTAATAGGAACTCAACAAGCTACCCAGGGCCC
 GCATACAGTGGTCGAGAGATAATATACCCCAATGCATCCCTGCTGATCCAGAACAT
 CATCCAGAATGACACAGGATTCTACACCCTACACGTCATAAAGTCAGATCTTGTGAA
 TGAAGAAGCAACTGGCCAGTTCCGGGTATACCCGGAGCTGCCAAGCCCTCCATCT
 CCAGCAACAACCTCAAACCCCGTGGAGGACAAGGATGCTGTGGCCTTCACCTGTGAA
 CCTGAGACTCAGGACGCAACCTACCTGTGGTGGGTAAACAATCAGAGCCTCCCGGT
 CAGTCCCAGGCTGCAGCTGTCCAATGGCAACAGGACCCTCACTCTATTCAATGTCA
 CAAGAAATGACACAGCAAGCTACAAATGTGAAACCCAGAACCCAGTGAGTGCCAGG
 CGCAGTGATTCAGTCATCCTGAATGTCCTCTATGGCCCGGATGCCCCACCATTTCC
 CCTCTAACACATCTTACAGATCAGGGGAAAATCTGAACCTCTCCTGCCACGCAG
 CCTCTAACCCACCTGCACAGTACTCTTGGTTTGTCAATGGGACTTTCCAGCAATCCA
 CCCAAGAGCTCTTTATCCCCAACATCACTGTGAATAATAGTGGATCCTATACGTGCC
 AAGCCCATAACTCAGACACTGGCCTCAATAGGACCACAGTCACGACGATCACAGTC
 TATGCAGAGCCACCCAACCCCTTCATCACCAGCAACAACCTCCAACCCCGTGGAGGA
 TGAGGATGCTGTAGCCTAACCTGTGAACCTGAGATTCAGAACACAACCTACCTGT
 GGTGGGTAATAATCAGAGCCTCCCGGTGAGTCCCAGGCTGCAGCTGTCCAATGAC
 AACAGGACCCTCACTCTACTCAGTGTCAAGGAATGATGTAGGACCCTATGAGTG
 TGGAATCCAGAACAATTAAGTGTGACCACAGCGACCCAGTCATCCTGAATGTCCT
 CTATGGCCAGACGACCCACCATTTCCCCTCATACACCTATTACCGTCCAGGGG
 TGAACCTCAGCCTCTCCTGCCATGCAGCCTTAACCCACCTGCACAGTATTCTTGG
 CTGATTGATGGGAACATCCAGCAACACACAAGAGCTCTTTATCTCCAACATCACT
 GAGAAGAACAGCGGACTCTATACCTGCCAGGCCAATAACTCAGCCAGTGGCCACA
 GCAGGACTACAGTCAAGACAATCACAGTCTCTGCGGAGCTGCCAAGCCCTCCATC
 TCCAGCAACAACCTCAAACCCGTGGAGGACAAGGATGCTGTGGCCTTCACCTGTGA
 ACCTGAGGCTCAGAACAACCTACCTGTGGTGGGTAAATGGTCAGAGCCTCCAG
 TCAGTCCCAGGCTGCAGCTGTCCAATGGCAACAGGACCCTCACTCTATTCAATGTC
 ACAAGAAATGACGCAAGAGCCTATGTATGTGGAATCCAGAACTCAGTGAGTGCAA
 CCGCAGTGACCCAGTACCCTGGATGTCCTCTATGGGCCGGACACCCCATCATTT
 CCCCCCAGACTCGTCTTACCTTTCCGGAGCGAACCTCAACCTCTCCTGCCACTCG
 GCCTCTAACCCATCCCCGCAGTATTCTTGGCGTATCAATGGGATACCGCAGCAACA
 CACACAAGTTCTCTTTATCGCCAAAATCACGCCAAATAATAACGGGACCTATGCCTG
 TTTTGTCTCTAACTTGGCTACTGGCCGCAATAATTCATAGTCAAGAGCATCACAGT
 CTCTGCATCTGGAACCTCTCCTGGTCTCTCAGCTGGGGCCACTGTGCGCATCATGA
 TTGGAGTGCTGGTTGGGGTTGCTCTGATATAG

Figura 13

ATGGAATCCAGGGGGAGGAGGTGTCCGGAGATGATCTCAGTCCTCGGACCGATTA
 GCGGTCACGTGCTCAAAGCGGTCTTCAGCAGAGGAGACACTCCGGTGCTGCCGCA
 CGAAACAAGGCTCCTTCAGACGGGGATACACGTGCGTGTGAGTCAGCCCAGCCTG
 ATCCTCGTGTCTCAATACACCCCTGACAGCACTCCCTGTCACAGAGGGGACAACCA
 ACTCCAGGTCCAGCACACCTACTTCACTGGGAGCGAGGTCGAGAACGTCAGCGTG
 AACGTGCACAACCCACGGGAAGATCAATCTGCCCTAGCCAGGAGCCCATGAGCA
 TCTACGTGTACGCCCTCCCGCTCAAGATGCTCAACATCCCCTCCATCAACGTCCAC
 CACTATCCCTCCGCTGCCGAACGTAACACCCGACACTTGCCAGTTGCCGACGCCGT
 GATACACGCTTCAGGGAAGCAGATGTGGCAAGCCAGGCTTACTGTGAGTGGACTC
 GCCTGGACTAGGCAACAGAACCAGTGGAAGGAGCCCGACGTGTACTACACCAGCG
 CCTTCGTGTTCCCCACAAAAGACGTGCGCGCTGCGACATGTGGTGTGCGCTCACGAA
 CTGGTGTGCAGCATGGAGAACACGCGAGCGACCAAGATGCAGGTGATCGGTGACC
 AGTACGTCAAGGTGTACCTGGAGAGCTTCTGCGAGGATGTCCCCTCCGGAAAGCT
 GTTCATGCACGTGACCCTGGGCAGTGACGTTGAGGAAGACCTGACCATGACGCGT
 AACCCGCAGCCTTTCATGAGACCGCACGAGAGGAACGGATTCACCGTCCGTGACC
 CGAAGAACATGATCATCAAGCCCGGCAAGATCAGCCACATCATGCTCGACGTCGCC
 TTCACCTCTCACGAACACTTCGGGCTGCTGTGTCCGAAGAGCATTCCGGGTCTGAG
 CATCTCAGGCAACCTGCTGATGAACGGGCAGCAGATCTTCTGGAAGTGCAGGCC
 ATAAGGGAGACCGTGGAAGTGAAGGCAGTACGATCCTGTGGCTGCCCTGTTCTTCTT
 CGACATCGACCTCTTGCTGCAAAGGGGTCCACAGTATAGCGAACACCCACCTTCA
 CCTCCCAGTACCGTATCCAGGGCAAGCTGGAGTACCGACACACTTGGGATAGGCA
 CGACGAGGGTGCCGCTCAAGGTGACGACGATGTTTGGACTAGCGGCTCTGATAGC
 GACGAAGAGCTGGTGACCACTGAGCGCAAAACTCCAAGAGTTACGGGCGGCGGCG
 CAATGGCTGGCGCCTCTACTTCCGCGGGGAAGGAAaAGGAAAAGCGCGTCTAGCGC
 AACTGCATGCACTGCCGGTGTGATGACAAGGGGGAGACTGAAGGCCGAGAGTACA
 GTGGCTCCGGAAGAGGATACCGACGAGGACTCTGACAACGAGATCCACAACCCCG
 CAGTGTTCAGTGGCCACCTTGGCAAGCCGGCATCCTTGCTAGAAACCTGGTGCCC
 ATGGTGGCCACAGTCCAAGGCCAGAACCTGAAGTACCAGGAGTTCTTCTGGGACG
 CCAACGACATCTACCGTATCTTCGCCGAACCTTGAAGGCGTCTGGCAGCCGGCGGC
 TCAACCCAAAAGGAGACGTCACAGACAGGACGCGCTTCCCGGACCCTGTATTGCCT
 CTACCCCAAGAAACACCGGGGC

Figura 14

ATGGAATCCAGGGGGAGGAGGTGTCCGGAGATGATCTCAGTCCTCGGACCGATTA
 GCGGTCACGTGCTCAAAGCGGTCTTCAGCAGAGGAGACACTCCGGTGCTGCCGCA
 CGAAACAAGGCTCCTTCAGACGGGGATACACGTGCGTGTGAGTCAGCCCAGCCTG
 ATCCTCGTGTCTCAATACACCCCTGACAGCACTCCCTGTCACAGAGGGGACAACCA
 ACTCCAGGTCCAGCACACCTACTTCACTGGGAGCGAGGTTCGAGAACGTCAGCGTG
 AACGTGCACAACCCACGGGAAGATCAATCTGCCCTAGCCAGGAGCCCATGAGCA
 TCTACGTGTACGCCCTCCCGCTCAAGATGCTCAACATCCCCTCCATCAACGTCCAC
 CACTATCCCTCCGCTGCCGAACGTAAACACCGACACTTGCCAGTTGCCGACGCCGT
 GATACACGCTTCAGGGAAGCAGATGTGGCAAGCCAGGCTTACTGTGAGTGGACTC
 GCCTGGACTAGGCAACAGAACCAGTGGAAGGAGCCCGACGTGTACTACACCAGCG
 CCTTCGTGTTCCCCACAAAAGACGTGCGCTGCGACATGTGGTGTGCGCTCACGAA
 CTGGTGTGCAGCATGGAGAACACGCGAGCGACCAAGATGCAGGTGATCGGTGACC
 AGTACGTCAAGGTGTACCTGGAGAGCTTCTGCGAGGATGTCCCGTCCGGAAAGCT
 GTTCATGCACGTGACCCTGGGCAGTGACGTTGAGGAAGACCTGACCATGACGCGT
 AACCCGCAGCCTTTCATGAGACCGCACGAGAGGAACGGATTACCGTCCTGTGCC
 CGAAGAACATGATCATCAAGCCCGGCAAGATCAGCCACATCATGCTCGACGTGCC
 TTCACCTCTCACGAACACTTCGGGCTGCTGTGTCCGAAGAGCATTCCGGGTCTGAG
 CATCTCAGGCAACCTGCTGATGAACGGGCAGCAGATCTTCCTGGAAGTGCAGGCC
 ATAAGGGAGACCGTGGAAGTGGAGCAGTACGATCCTGTGGCTGCCCTGTTCTTCTT
 CGACATCGACCTCTTGCTGCAAAGGGGTCCACAGTATAGCGAACACCCACCTTCA
 CCTCCAGTACCGTATCCAGGGCAAGCTGGAGTACCGACACACTTGGGATAGGCA
 CGACGAGGGTGCCGCTCAAGGTGACGACGATGTTTGGACTAGCGGCTCTGATAGC
 GACGAAGAGCTGGTGACCACTGAGCGCAAACTCCAAGAGTTACGGGCGGCGGCG
 CAATGGCTGGCGCCTCTACTTCCGCGGGAAGGAAcAGGAAAAGCGCGTCTAGCGC
 AACTGCATGCACTGCCGGTGTGATGACAAGGGGGAGACTGAAGGCCGAGAGTACA
 GTGGCTCCGGAAGAGGATACCGACGAGGACTCTGACAACGAGATCCACAACCCCG
 CAGTGTTTACGTGGCCACCTTGGCAAGCCGGCATCCTTGCTAGAAACCTGGTGCC
 ATGGTGGCCACAGTCCAAGGCCAGAACCCTGAAGTACCAGGAGTTCTTCTGGGACG
 CCAACGACATCTACCGTATCTTCGCCGAACCTGAAGGCGTCTGGCAGCCGGCGGC
 TCAACCCAAAAGGAGACGTACAGACAGGACGCGCTTCCCGGACCCTGTATTGCCT
 CTACCCCAAGAAACACCGGGGC

Figura 15

ATGGAATCCAGGGGGAGGAGGTGTCCGGAGATGATCTCAGTCCTCGGACCGATTA
 GCGGTCACGTGCTCAAAGCGGTCTTCAGCAGAGGAGACACTCCGGTGCTGCCGCA
 CGAAACAAGGCTCCTTCAGACGGGGATACACGTGCGTGTGAGTCAGCCCAGCCTG
 ATCCTCGTGTCTCAATACACCCCTGACAGCACTCCCTGTCACAGAGGGGACAACCA
 ACTCCAGGTCCAGCACACCTACTTCACTGGGAGCGAGGTTCGAGAACGTCAGCGTG
 AACGTGCACAACCCACGGGAAGATCAATCTGCCCTAGCCAGGAGCCCATGAGCA
 TCTACGTGTACGCCCTCCCGCTCAAGATGCTCAACATCCCCTCCATCAACGTCCAC
 CACTATCCCTCCGCTGCCGAACGTAACACCCGACACTTGCCAGTTGCCGACGCCGT
 GATACACGCTTCAGGGAAGCAGATGTGGCAAGCCAGGCTTACTGTGAGTGGACTC
 GCCTGGACTAGGCAACAGAACCAGTGGAAGGAGCCCGACGTGTACTACACCAGCG
 CCTTCGTGTTCCCCACAAAAGACGTGCGGCTGCGACATGTGGTGTGCGCTCACGAA
 CTGGTGTGCAGCATGGAGAACACGCGAGCGACCAAGATGCAGGTGATCGGTGACC
 AGTACGTCAAGGTGTACCTGGAGAGCTTCTGCGAGGATGTCCCCTCCGGAAAGCT
 GTTCATGCACGTGACCCTGGGCAGTGACGTTGAGGAAGACCTGACCATGACGCGT
 AACCCGCAGCCTTTCATGAGACCGCACGAGAGGAACGGATTCACCGTCCGTGACC
 CGAAGAACATGATCATCAAGCCCGGCAAGATCAGCCACATCATGCTCGACGTCGCC
 TTCACCTCTCACGAACACTTCGGGCTGCTGTGTCCGAAGAGCATTCCGGGTCTGAG
 CATCTCAGGCAACCTGCTGATGAACGGGCAGCAGATCTTCTGGAAGTGCAGGCC
 ATAAGGGAGACCGTGGAAGTGAAGGCAGTACGATCCTGTGGCTGCCCTGTTCTTCTT
 CGACATCGACCTCTTGCTGCAAAGGGGTCCACAGTATAGCGAACACCCACCTTCA
 CCTCCCAGTACCGTATCCAGGGCAAGCTGGAGTACCGACACACTTGGGATAGGCA
 CGACGAGGGTGCCGCTCAAGGTGACGACGATGTTTGGACTAGCGGCTCTGATAGC
 GACGAAGAGCTGGTGACCACTGAGCGCAAACTCCAAGAGTTACGGGCGGCGGCG
 CAATGGCTGGCGCCTCTACTTCCGCGGGAAAGGAAcAGGAAAAGCGCGTCTAGCGC
 AACTGCATGCACTGCCGGTGTGATGACAAGGGGGAGACTGAAGGCCGAGAGTACA
 GTGGCTCCGGAAGAGGATACCGACGAGGACTCTGACAACGAGATCCACAACCCCG
 CAGTGTTTACGTGGCCACCTTGGCAAGCCGGCATCCTTGCTAGAAACCTGGTGCCC
 ATGGTGGCCACAGTCCAAGGCCAGAACCTGAAGTACCAGGAGTTCTTCTGGGACG
 CCAACGACATCTACCGTATCTTCGCCGAACCTTGAAGGCGTCTGGCAGCCGGCGGC
 TCAA

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Figura 29

Célula CD3+

Figura 30

Figura 31