19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 761 343**

51 Int. Cl.:

C12N 15/11 (2006.01)

C07H 21/04 (2006.01)

C12N 15/113 (2010.01)

A61K 31/7088 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **07.11.2012 PCT/US2012/063970**

87 Fecha y número de publicación internacional: **16.05.2013 WO13070786**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **07.11.2012 E 12847024 (2)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **02.10.2019 EP 2776564**

54 Título: **Modulación de la expresión de TMPRSS6**

30 Prioridad:

07.11.2011 US 201161556755 P
05.10.2012 US 201261710636 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

19.05.2020

73 Titular/es:

IONIS PHARMACEUTICALS, INC. (100.0%)
2855 Gazelle Court
Carlsbad, CA 92010, US

72 Inventor/es:

GUO, SHULING

74 Agente/Representante:

IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

ES 2 761 343 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Modulación de la expresión de TMPRSS6

5 **CAMPO DE LA INVENCION**

[0001] La presente invención se refiere a métodos, compuestos y composiciones para modular la expresión TMPRSS6 para el propósito de reducir la acumulación de hierro en un animal.

10 **ANTECEDENTES DE LA INVENCION**

[0002] El mantenimiento del equilibrio de hierro en los seres humanos es delicado debido a la capacidad limitada de la fisiología humana para la absorción y excreción de hierro (Finch, CA y Huebers, HN Engl. J. Med. 1982. 306: 1520-1528). La deficiencia de hierro es un trastorno generalizado y es el resultado de cualquier condición en donde la ingesta de hierro en la dieta no satisfaga las demandas del cuerpo. A menudo, la pérdida de sangre patológica contribuye al equilibrio negativo de hierro. La sobrecarga de hierro también es una condición común, y puede resultado de una causa genética, p. ej., mutaciones de diferentes genes del metabolismo del hierro (Camaschella, C. Blood. 2005. 106: 3710-3717). La hormona peptídica hepática, la hepcidina, juega un papel clave en el metabolismo del hierro del cuerpo, ya que controla la absorción y el reciclaje del hierro (Ganz, T. A-M. Soc. Hematol. Educ. Program 2006. 507: 29-35; Kemna, EH et al., Clin. Chem. 2007. 53: 620-628). Varias proteínas, incluyendo HFE (proteína de hemocromatosis) (Ahmad, KA et al., Blood Cells Mol Dis. 2002. 29: 361), receptor de transferrina 2 (Kawabata, H. et al., Blood 2005. 105: 376), y La hemojuvelina (Papanikolaou, G. et al., Nat. Genet. 2004. 36: 77) también regulan los niveles de hierro del cuerpo.

[0003] La proteasa transmembrana, la serina 6 (TMPRSS6) es una serina proteasa transmembrana de tipo II y se expresa principalmente en el hígado (Velasco, G. y col., J. Biol. Chem. 2002. 277: 37637-37646). Las mutaciones en TMPRSS6 se han implicado en la anemia por deficiencia de hierro (Finberg, KE et al., Nat. Genet. 2008. 40: 569-571), donde se encontró que el nivel de hepcidina era inusualmente elevado. Un estudio de una población humana con anemia microcítica encontró que las mutaciones de pérdida de función en el gen TMPRSS6 conducen a la sobreproducción de hepcidina, lo que, a su vez, conduce a una absorción y utilización defectuosas del hierro (Melis, MA et al., Hematologica 2008. 93: 1473-1479). TMPRSS6 participa en una vía de señalización transmembrana desencadenada por deficiencia de hierro y suprime diversas vías de activación de *Hamp*, el gen que codifica la hepcidina (Du, X. et al., Science 2008. 320: 1088-1092). La pérdida heterocigótica de TMPRSS6 en ratones HFE *-/-* reduce la sobrecarga de hierro sistémica, mientras que la pérdida homocigótica de TMPRSS6 en ratones HFE *-/-* causa deficiencia de hierro sistémica y una elevada expresión hepática de hepcidina (Finberg, KE et al., Blood 2011. 117: 4590 - 4599).

[0004] Un ejemplo de un trastorno de la sobrecarga de hierro es la hemocromatosis. La hemocromatosis (p. ej., hemocromatosis tipo 1 o hemocromatosis hereditaria) es un trastorno que produce una absorción intestinal excesiva de hierro en la dieta del tracto gastrointestinal (Allen, KJ et al., N. Engl. J. Med. 2008. 358: 221-230). Esto da como resultado un aumento patológico en las reservas totales de hierro en el cuerpo. El exceso de hierro se acumula en los tejidos y órganos, particularmente el hígado, las glándulas suprarrenales, el corazón, la piel, las gónadas, las articulaciones y el páncreas, e interrumpe su función normal. Complicaciones secundarias, como cirrosis (Ramm, GA y Ruddell, RG Semin. Liver Dis. 2010. 30: 271-287), poliartropatía (Carroll, GJ et al., Arthritis Rheum. 2011. 63: 286-294), suprarrenal insuficiencia, insuficiencia cardíaca y diabetes (Huang, J. et al., Diabetes 2011. 60: 80-87) son comunes. Otro ejemplo de un trastorno por sobrecarga de hierro es la β -talasemia, donde los pacientes pueden desarrollar una sobrecarga de hierro causada por eritropoyesis o transfusiones ineficaces para tratar la β -talasemia.

[0005] Maxson y col. (Journal of Biological Chemistry, 2010, 285 (50), páginas 39021-39028) describe moléculas de ARNip que se dirigen al gen TMPRSS6.

[0006] Sisay et al. (Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 53 (15), páginas 5523-5535) describe la identificación de los primeros inhibidores de bajo peso molecular de Matriptasa-2 (TMPRSS6).

[0007] Finberg y col. (Blood, 2010, 116 (21), página 75, de la 52ª Reunión Anual de la American Society of Hematology) enseña que TMPRSS6 es necesario para la supresión de hepcidina y la carga de hierro en un modelo de ratón de beta talasemia.

[0008] Ramsay y col. (Haematologica, 2009, 94 (6), páginas 840-849) describe la relevancia de Matriptasa-2 (TMPRSS6) en el metabolismo del hierro.

[0009] El documento WO 2011/085271 describe métodos, compuestos y composiciones para reducir la expresión de un ARNm y proteína ANGPTL3 en un animal.

[0010] El documento WO 2012/135246 enseña composiciones de ácido ribonucleico de doble cadena (ARNds) dirigidas al gen TMPRSS6, y métodos para usar tales composiciones de ARNds para inhibir la expresión de TMPRSS6.

5 **[0011]** Hay un momento, la falta de opciones aceptables para el tratamiento de trastornos de sobrecarga de hierro. Por lo tanto, es un objeto en el presente documento identificar compuestos y métodos para el tratamiento de tales enfermedades y trastornos. Esta invención se refiere al descubrimiento de nuevos inhibidores altamente potentes de la expresión del gen TMPRSS6.

SUMARIO DE LA INVENCION

10 **[0012]** La invención proporciona un compuesto antisentido que comprende un oligonucleótido modificado que consiste de 12-30 nucleósidos enlazados, en donde el oligonucleótido modificado tiene una secuencia de nucleobase que es al menos 95% complementaria a un ácido nucleico TMPRSS6, y en donde el compuesto disminuye la expresión de TMPRSS6, para usar en el tratamiento de la talasemia en un sujeto.

15 **[0013]** Otras características de la invención se exponen en las reivindicaciones.

20 **[0014]** También se describen en este documento métodos para modular los niveles de ARNm y/o proteína TMPRSS6 en un animal. Aquí se describen métodos, compuestos y composiciones para reducir los niveles de TMPRSS6. En ciertas realizaciones, la disminución de TMPRSS6 da como resultado un aumento en los niveles de expresión de hepcidina. En ciertas realizaciones, la disminución de TMPRSS6 da como resultado una disminución en el porcentaje de saturación de transferrina. En ciertas realizaciones, la disminución de TMPRSS6 da como resultado una reducción de la acumulación de hierro. En ciertas realizaciones, tales resultados se efectúan administrando un inhibidor de TMPRSS6. En ciertas realizaciones, se administra una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de TMPRSS6 a un animal. En realizaciones adicionales, la administración de la cantidad terapéuticamente efectiva del inhibidor TMPRSS6 también aumenta los niveles de expresión de hepcidina. En realizaciones adicionales, la administración de la cantidad terapéuticamente efectiva del inhibidor TMPRSS6 también disminuye el porcentaje de saturación de la molécula de transferrina en el animal.

25 **[0015]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para tratar, prevenir, retardar la aparición de, mejorar y/o reducir un síntoma, de una enfermedad, trastorno y/o afección asociada con el exceso de acumulación de hierro en un animal. Los métodos comprenden administrar al animal una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de TMPRSS6, en donde la enfermedad, trastorno y/o afección asociada con la acumulación excesiva de hierro se trata, previene, el inicio se retrasa, el síntoma mejora y/o reduce.

30 **[0016]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para la identificación de un animal en riesgo de una enfermedad, trastorno y/o condición o que tiene una enfermedad, trastorno y/o afección que está asociada con la acumulación de exceso de hierro. En realizaciones adicionales, los métodos incluyen administrar al animal una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de TMPRSS6, tratando así al animal.

35 **[0017]** En ciertas realizaciones, describe en el presente documento es el uso de un inhibidor de TMPRSS6 para la preparación de un medicamento.

40 **[0018]** En ciertas realizaciones, descritas en este documento es el uso de un inhibidor de TMPRSS6 como un medicamento para tratar, prevenir, retardar la aparición de, y/o reducir los síntomas de una enfermedad, trastorno y/o afección asociada con el exceso de acumulación de hierro en un animal administrando al animal una cantidad terapéuticamente efectiva del inhibidor TMPRSS6.

45 **[0019]** En ciertas realizaciones, describe en el presente documento es el uso de un compuesto antisentido TMPRSS6 como un inhibidor de TMPRSS6.

50 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

55 **[0020]** Ha de entenderse que tanto la anterior descripción general y la siguiente descripción detallada son a modo de ejemplo y sólo explicativas y no son restrictivas de la invención, según se reivindica. Aquí, el uso del singular incluye el plural a menos que se indique específicamente lo contrario. Como se usa en este documento, el uso de "o" significa "y/o" a menos que se indique lo contrario. Además, el uso del término "incluido", así como otras formas, como "incluye" e "incluido", no es limitante. Además, términos como "elemento" o "componente" abarcan tanto elementos como componentes que comprenden una unidad y elementos y componentes que comprenden más de una subunidad, a menos que se indique específicamente lo contrario.

60 **[0021]** Los encabezados de sección usados en este documento son sólo para fines de organización y no deben considerarse como limitativos de la materia diana descrita.

Definiciones

65 **[0022]** A menos que se proporcionen definiciones específicas, la nomenclatura utilizada en relación con, y los procedimientos y técnicas de, química analítica, química orgánica sintética y química médica y farmacéutica descritas

en el presente documento son los bien conocidos y comúnmente utilizados en la técnica. Se pueden usar técnicas estándar para la síntesis química y el análisis químico.

[0023] A menos que se indique lo contrario, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

- 5 "2'-O-metoxietilo" (también de 2'-MOE y 2'-O(CH₂)₂-OCH₃) se refiere a una modificación con O-metoxi-etilo de la posición 2' de un anillo de furosil. Un azúcar modificado con 2'-O-metoxietilo es un azúcar modificado. "Nucleótido de 2'-O-metoxietilo" significa un nucleótido que comprende un resto de azúcar modificado con 2'-O-metoxietilo.
- 10 "5-metilcitosina" significa una citosina modificada con un grupo metilo unido a la posición 5'. Una 5-metilcitosina es una nucleobase modificada. "Acerca de" significa dentro del $\pm$ 10% de un valor. Por ejemplo, si se indica, "un marcador puede incrementarse en aproximadamente un 50%", se implica que el marcador puede incrementarse entre 45% - 55%.
- 15 "Agente farmacéutico activo" o "agente farmacéutico" significa la sustancia o sustancias en una composición farmacéutica que proporcionan un beneficio terapéutico cuando se administran a un individuo. Por ejemplo, en ciertas realizaciones, un oligonucleótido antisentido dirigido a TMPRSS6 es un agente farmacéutico activo. "Región diana activa" o "región diana" significa una región a la que se dirige uno o más compuestos antisentido activos.
- 20 "Compuestos antisentido activos" se refiere a los compuestos antisentido que reducen los niveles de ácido nucleico o los niveles de proteína objetivo. "Administrado concomitantemente" se refiere a la administración conjunta de dos agentes de cualquier manera en que los efectos farmacológicos de ambos se manifiesten en el tiempo del paciente. La administración concomitante no requiere que ambos agentes se administren en una sola composición farmacéutica, en la misma forma de dosificación o por la misma vía de administración. Los efectos de ambos agentes no necesitan manifestarse al mismo tiempo. Los efectos solo necesitan superponerse por un período de tiempo y no necesitan ser coextensivos.
- 25 "Administrar" significa proporcionar un agente farmacéutico a un individuo e incluye, entre otros, la administración por un profesional médico y la autoadministración. "Agente" significa una sustancia activa que puede proporcionar un beneficio terapéutico cuando se administra a un animal.
- 30 "Primer agente" significa un compuesto terapéutico como se describe en el presente documento. Por ejemplo, un primer agente es un oligonucleótido antisentido dirigido a TMPRSS6. "Segundo agente" significa un segundo compuesto terapéutico descrito aquí. Por ejemplo, un segundo agente puede ser un segundo oligonucleótido antisentido dirigido a TMPRSS6 o un objetivo no TMPRSS6. Alternativamente, un segundo agente puede ser un compuesto distinto de un oligonucleótido antisentido.
- 35 "Mejoría" se refiere a una disminución de al menos un indicador, marcador, signo o síntoma de una enfermedad, trastorno y/o afección asociada. En ciertas realizaciones, la mejora incluye un retraso o desaceleración en la progresión de uno o más indicadores de una afección, trastorno y/o enfermedad. La gravedad de los indicadores puede determinarse mediante medidas subjetivas u objetivas, que son conocidas por los expertos en la materia.
- 40 "Anemia" es una enfermedad caracterizada por un número menor de lo normal de glóbulos rojos (eritrocitos) en la sangre, generalmente medido por una disminución en la cantidad de hemoglobina. La causa de la anemia puede incluir inflamación crónica, enfermedad renal crónica, tratamiento de diálisis renal, trastornos genéticos, infección crónica, infección aguda, cáncer y tratamientos contra el cáncer. La alteración de la homeostasis y/o la eritropoyesis de hierro en estas enfermedades, trastornos y/o afecciones también pueden provocar una disminución de la producción de eritrocitos. Los signos clínicos de anemia incluyen niveles bajos de hierro en suero (hipoferremia), niveles bajos de hemoglobina, niveles bajos de hematocrito, disminución de glóbulos rojos, disminución de reticulocitos, aumento del receptor de transferrina soluble y eritropoyesis restringida por hierro. Los ejemplos de anemia incluyen talasemias (es decir, α -talasemia, β -talasemia (leve, intermedia y mayor) y δ -talasemia), anemia falciforme, anemia aplásica, anemia de Fanconi, anemia de Diamond Blackfan, síndrome de Shwachman Diamond, trastornos de la membrana de los glóbulos rojos, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, telangiectasia hemorrágica hereditaria, anemia hemolítica, anemia de enfermedades crónicas y similares.
- 45 "Animal" se refiere a un animal humano o no humano, incluidos, entre otros, ratones, ratas, conejos, perros, gatos, cerdos y primates no humanos, incluidos, entre otros, monos y chimpancés. "Anticuerpo" se refiere a una molécula caracterizada por reaccionar específicamente con un antígeno de alguna manera, donde el anticuerpo y el antígeno se definen cada uno en términos del otro. El anticuerpo puede referirse a una molécula de anticuerpo completa o cualquier fragmento o región de la misma, como la cadena pesada, la cadena ligera, la región Fab y la región Fc.
- 60 "Actividad antisentido" significa cualquier actividad detectable o medible atribuible a la hibridación de un compuesto antisentido a su ácido nucleico diana. En ciertas realizaciones, la actividad antisentido es una disminución en la cantidad o expresión de un ácido nucleico o proteína diana codificado por dicho ácido nucleico diana.
- 65 "Compuesto antisentido" significa un compuesto oligomérico que es capaz de experimentar hibridación con un ácido nucleico diana a través de enlaces de hidrógeno.

"Inhibición antisentido" significa la reducción de los niveles de ácido nucleico diana o los niveles de proteína diana en presencia de un compuesto antisentido complementario a un ácido nucleico diana en comparación con los niveles de ácido nucleico diana o los niveles de proteína diana en ausencia del compuesto antisentido.

"Oligonucleótido antisentido" significa un oligonucleótido monocatenario que tiene una secuencia de nucleobase que permite la hibridación a una región o segmento correspondiente de un ácido nucleico diana.

"Azúcar bicíclico" significa un anillo de furosilo modificado por el puente de dos átomos del anillo no geminal. Un azúcar bicíclico es un azúcar modificado.

"Ácido nucleico bicíclico" o "BNA" se refiere a un nucleósido o nucleótido en donde la porción de furanosa del nucleósido o nucleótido incluye un puente que conecta dos átomos de carbono en el anillo de furanosa, formando así un sistema de anillo bicíclico.

La "transfusión de sangre" se refiere al proceso de recibir productos sanguíneos en la circulación intravenosa. Las transfusiones se usan en una variedad de enfermedades, trastornos y/o afecciones médicas para reemplazar los componentes sanguíneos perdidos.

"Estructura de tapa" o "resto de tapa terminal" significa modificaciones químicas, que se han incorporado en cualquiera de los extremos de un compuesto antisentido.

"Región químicamente distinta" se refiere a una región de un compuesto antisentido que es de alguna manera químicamente diferente que otra región del mismo compuesto antisentido. Por ejemplo, una región que tiene nucleótidos de 2'-O-metoxietilo es químicamente distinta de una región que tiene nucleótidos sin modificaciones de 2'-O-metoxietilo.

"Compuesto antisentido quimérico" significa un compuesto antisentido que tiene al menos dos regiones químicamente distintas.

"Administración conjunta" significa la administración de dos o más agentes farmacéuticos a un individuo. Los dos o más agentes farmacéuticos pueden estar en una única composición farmacéutica, o pueden estar en composiciones farmacéuticas separadas. Cada uno de los dos o más agentes farmacéuticos puede administrarse a través de la misma o diferentes vías de administración. La coadministración abarca la administración concomitante, paralela o secuencial.

"Complementariedad" significa la capacidad de emparejamiento entre nucleobases de un primer ácido nucleico y un segundo ácido nucleico.

"Nucleobases contiguas" significa nucleobases inmediatamente adyacentes entre sí.

"Desoxirribonucleótido" significa un nucleótido que tiene un hidrógeno en la posición 2' de la porción de azúcar del nucleótido. Los desoxirribonucleótidos pueden modificarse con cualquiera de una variedad de sustituyentes.

"Diluyente" significa un ingrediente en una composición que carece de actividad farmacológica, pero es farmacéuticamente necesario o deseable. Por ejemplo, el diluyente en una composición inyectada puede ser un líquido, p. ej., PBS.

"Unidad de dosificación" significa una forma en donde se proporciona un agente farmacéutico, p. ej., píldora, tableta u otra unidad de dosificación conocida en la técnica. En ciertas realizaciones, una unidad de dosificación es un vial que contiene oligonucleótido antisentido liofilizado. En ciertas realizaciones, una unidad de dosificación es un vial que contiene oligonucleótido antisentido reconstituido.

"Dosis" significa una cantidad especificada de un agente farmacéutico proporcionado en una sola administración, o en un período de tiempo especificado. En ciertas realizaciones, una dosis puede administrarse en uno, dos o más bolos, tabletas o inyecciones. Por ejemplo, en ciertas realizaciones donde se desea la administración subcutánea, la dosis deseada requiere un volumen que no se acomoda fácilmente con una sola inyección, por lo tanto, se pueden usar dos o más inyecciones para lograr la dosis deseada. En ciertas realizaciones, el agente farmacéutico se administra por infusión durante un período prolongado de tiempo o de forma continua. Las dosis pueden indicarse como la cantidad de agente farmacéutico por hora, día, semana o mes.

"Cantidad efectiva" o "cantidad terapéuticamente efectiva" significa la cantidad de agente farmacéutico activo suficiente para efectuar un resultado fisiológico deseado en un individuo que necesita el agente. La cantidad efectiva puede variar entre los individuos dependiendo de la salud y la condición física del individuo a tratar, el grupo taxonómico de los individuos a tratar, la formulación de la composición, la evaluación de la condición médica del individuo y otros factores relevantes.

"Completamente complementario" o "100% complementario" significa que cada nucleobase de una secuencia de nucleobase de un primer ácido nucleico tiene una nucleobase complementaria en una segunda secuencia de nucleobase de un segundo ácido nucleico. En ciertas realizaciones, el primer ácido nucleico es un compuesto antisentido y el segundo ácido nucleico es un ácido nucleico diana.

"Gapmer" significa un compuesto antisentido quimérico en donde una región interna que tiene una pluralidad de nucleósidos que soportan la escisión de RNasa H se coloca entre regiones externas que tienen uno o más nucleósidos, en donde los nucleósidos que comprenden la región interna son químicamente distintos del nucleósido o nucleósidos que comprenden las regiones externas. La región interna puede denominarse "segmento de separación" y las regiones externas pueden denominarse "segmentos de ala".

"Ampliado por espacio" significa un compuesto antisentido quimérico que tiene un segmento de espacio de 12 o más 2'-desoxinucleósidos contiguos colocados entre e inmediatamente adyacentes a segmentos de ala 5' y 3' que tienen de uno a seis nucleósidos.

"Hemocromatosis" es un trastorno del metabolismo del hierro que provoca que el exceso de hierro sea absorbido por el tracto gastrointestinal, lo que lleva a una acumulación y depósito excesivo de hierro en varios

tejidos del cuerpo. La hemocromatosis primaria, hereditaria o clásica es causada por una mutación genética, p. ej., en el gen HFE. Los sujetos con esta enfermedad tienen cantidades excesivas de hierro, que se absorbe en el tracto gastrointestinal y se acumula en los tejidos del cuerpo, particularmente en el hígado. La hemocromatosis secundaria o adquirida puede ser causada por transfusiones sanguíneas frecuentes, una alta ingesta oral o parenteral de suplementos de hierro o un efecto secundario de otras enfermedades.

"Hematopoyesis" se refiere a la formación de componentes celulares de la sangre, derivados de células madre hematopoyéticas. Estas células madre residen en la médula de la médula ósea y tienen la capacidad única de dar lugar a todos los diferentes tipos de células sanguíneas maduras.

"Hemólisis" se refiere a la ruptura de eritrocitos o glóbulos rojos y la liberación de su contenido en el fluido circundante. La hemólisis en un animal puede ocurrir debido a una gran cantidad de afecciones médicas, que incluyen infección bacteriana, infección parasitaria, trastornos autoinmunes y trastornos genéticos.

"Hepcidina" se refiere tanto a un ARNm como a una proteína codificada por el ARNm que producen los hepatocitos en respuesta a la inflamación o al aumento de los niveles de hierro en la sangre. La función principal de la hepcidina es regular los niveles de hierro en la sangre al facilitar una disminución en estos niveles de hierro en la sangre. La expresión de hepcidina aumenta en condiciones de inflamación aguda y crónica, lo que resulta en una disminución de la disponibilidad de hierro para la eritropoyesis.

"Hepcidina" también se conoce como péptido antimicrobiano hepcidina; HAMP; HAMP1; HEPC; HFE2; LEAP-1; LEAP1; y péptido antimicrobiano expresado en hígado.

"Anemia hereditaria" se refiere a la anemia causada por una afección hereditaria que hace que los glóbulos rojos en el cuerpo mueran más rápido de lo normal, sean ineficaces para transportar oxígeno desde los pulmones a las diferentes partes del cuerpo o no se creen en absoluto. Los ejemplos incluyen, entre otros, anemia de células falciformes, talasemia, anemia de Fanconi, anemia de Diamond Blackfan, síndrome de Shwachman Diamond, trastornos de la membrana de glóbulos rojos, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, o telangiectasia hemorrágica hereditaria.

"HFE" se refiere al gen o proteína de hemocromatosis humana.

"Mutación del gen HFE" se refiere a mutaciones en el gen HFE, que pueden provocar hemocromatosis hereditaria.

"Hibridación" significa el recocido de moléculas de ácido nucleico complementarias. En ciertas realizaciones, las moléculas de ácido nucleico complementarias incluyen un compuesto antisentido y un ácido nucleico diana.

"Identificar un animal en riesgo o tener una enfermedad, trastorno y/o condición asociada con una acumulación excesiva de hierro" significa identificar a un animal que ha sido diagnosticado con una enfermedad, trastorno y/o condición o identificar un animal predispuesto a desarrollar una enfermedad, trastorno y/o condición asociada con la acumulación excesiva de hierro. Los individuos pueden estar predispuestos a desarrollar una enfermedad, trastorno y/o afección asociada con la acumulación excesiva de hierro en individuos con antecedentes familiares de hemocromatosis. Dicha identificación puede lograrse mediante cualquier método, incluida la evaluación del historial médico de un individuo y las pruebas o evaluaciones clínicas estándar.

"Inmediatamente adyacente" significa que no hay elementos intermedios entre los elementos inmediatamente adyacentes.

"Individual" o "sujeto" o "animal" significa un animal humano o no humano seleccionado para tratamiento o terapia.

"Inhibir la expresión o actividad" se refiere a una reducción o bloqueo de la expresión o actividad de un ARN o proteína y no indica necesariamente una eliminación total de la expresión o actividad.

"Enlace internucleosídico" se refiere al enlace químico entre nucleósidos.

"Administración intravenosa" significa administración en una vena.

"Acumulación de hierro" o "sobrecarga de hierro" indica acumulación y deposición de hierro en el cuerpo por cualquier causa. Las causas más comunes son causas hereditarias, sobrecarga de hierro transfusional, que puede ser el resultado de transfusiones sanguíneas repetidas o ingesta excesiva de hierro en la dieta.

"Suplementos de hierro" se refieren a los suplementos recetados por una razón médica para tratar la deficiencia de hierro en un paciente. El hierro puede complementarse por vía oral o administrarse por vía parenteral. Nucleósidos unidos significa nucleósidos adyacentes que están unidos entre sí.

"Marcador" o "biomarcador" es cualquier parámetro biológico cuantificable y cuantificable que sirve como índice para evaluaciones relacionadas con la salud o la fisiología. Por ejemplo, un aumento en el porcentaje de saturación de transferrina, un aumento en los niveles de hierro o una disminución en los niveles de hepcidina pueden considerarse marcadores de una enfermedad, trastorno y/o trastorno por sobrecarga de hierro.

"MCH" se refiere a "hemoglobina corpuscular media" o "hemoglobina celular media", un valor para expresar la masa promedio de hemoglobina (Hb) por glóbulo rojo en una muestra de sangre.

"MCV" se refiere a "volumen corpuscular medio" o "volumen celular medio", un valor para expresar el tamaño promedio de glóbulos rojos.

"No coincidencia" o "nucleobase no complementaria" o "MM" se refiere al caso cuando una nucleobase de un primer ácido nucleico no es capaz de emparejarse con la nucleobase correspondiente de un segundo ácido nucleico o diana.

"Enlace internucleosídico modificado" se refiere a una sustitución o cualquier cambio de un enlace internucleosídico natural (es decir, un enlace internucleosídico fosfodiéster).

- “Nucleobase modificada” se refiere a cualquier nucleobase distinta de adenina, citosina, guanina, timidina o uracilo. Por ejemplo, una nucleobase modificada puede ser 5'-metilcitosina. Una "nucleobase no modificada" significa las bases de purina adenina (A) y guanina (G), y las bases de pirimidina timina (T), citosina (C) y uracilo (U).
- 5 “Nucleósido modificado” significa un nucleósido que tiene, independientemente, un resto de azúcar modificado o una nucleobase modificada.
- “Nucleótido modificado” significa un nucleótido que tiene, independientemente, un resto de azúcar modificado, enlace internucleósido modificado o nucleobase modificada.
- 10 “Oligonucleótido modificado” significa un oligonucleótido que comprende un enlace internucleosídico modificado, un azúcar modificado o una nucleobase modificada.
- “Azúcar modificado” se refiere a una sustitución o cambio de un azúcar natural. Por ejemplo, un azúcar modificado puede ser 2'-MOE.
- 15 “Modular” se refiere a cambiar o ajustar una característica en una célula, tejido, órgano u organismo. Por ejemplo, modular el nivel de TMPRSS6 puede significar aumentar o disminuir el nivel de ARNm de TMPRSS6 o proteína de TMPRSS6 en una célula, tejido, órgano u organismo. Un "modulador" efectúa el cambio en la célula, tejido, órgano u organismo. Por ejemplo, un oligonucleótido antisentido TMPRSS6 puede ser un modulador que aumenta o disminuye la cantidad de ARNm TMPRSS6 o proteína TMPRSS6 en una célula, tejido, órgano u organismo.
- 20 “Motivo” significa el patrón de regiones químicamente distintas en un compuesto antisentido.
- “Mutaciones” se refieren a cambios en una secuencia de ácido nucleico. Las mutaciones pueden ser causadas de varias maneras, incluyendo, pero no limitado a, radiación, virus, transposones y mutagénicos. químicos, así como los errores que ocurren durante la meiosis, la replicación del ADN, la transcripción del ARN y el procesamiento postranscripcional. Las mutaciones pueden provocar varios cambios diferentes en la secuencia; pueden no tener ningún efecto, alterar el producto de un gen o prevenir el gen de funcionar correctamente o completamente. Por ejemplo, la mutación HFE puede conducir al funcionamiento incorrecto del producto genético, lo que lleva a una absorción excesiva de hierro en los intestinos.
- 25 “Síndrome mielodisplásico” se refiere a una colección diversa de enfermedades, trastornos y/o afecciones médicas hematológicas. que incluyan la producción ineficaz de la clase mieloide de las células sanguíneas. El síndrome es causado por trastornos de las células en la médula ósea. En el síndrome mielodisplásico, la hematopoyesis es ineficaz y la cantidad y calidad de las células sanguíneas disminuye irreversiblemente, lo que perjudica aún más la producción de sangre. Como resultado, los pacientes con síndrome mielodisplásico desarrollan anemia severa y requieren transfusiones de sangre frecuentes.
- 30 “Enlace internucleosídico natural” significa un enlace fosfodiéster de 3' a 5'.
- “Resto de azúcar natural” significa un azúcar que se encuentra en el ADN (2'-H) o ARN (2'-OH).
- 35 “Ácido nucleico” se refiere a moléculas compuestas de nucleótidos monoméricos. Un ácido nucleico incluye ácidos ribonucleicos (ARN), ácidos desoxirribonucleicos (ADN), ácidos nucleicos monocatenarios, ácidos nucleicos bicatenarios, ácidos ribonucleicos interferentes pequeños (ARNip) y microARN (miARN).
- “Nucleobase” significa un resto heterocíclico capaz de emparejarse con una base de otro ácido nucleico.
- 40 “Secuencia de nucleobase” significa el orden de nucleobases contiguas independientes de cualquier azúcar, enlace o modificación de nucleobase.
- “Nucleósido” significa una nucleobase unida a un azúcar.
- 45 “Mimético de nucleósido” incluye aquellas estructuras usadas para reemplazar el azúcar o el azúcar y la base y no necesariamente el enlace en una o más posiciones de un compuesto oligomérico; tales como, p. ej., miméticos de nucleósidos que tienen miméticos de azúcar morfolino, ciclohexenilo, ciclohexilo, tetrahidropiraniolo, biciclo o triciclo, p. ej., unidades de azúcar sin furanosa.
- “Nucleótido” significa un nucleósido que tiene un grupo fosfato unido covalentemente a la porción de azúcar del nucleósido.
- 50 “Mimético de nucleótidos” incluye aquellas estructuras usadas para reemplazar el nucleósido y el enlace en una o más posiciones de un compuesto oligomérico; tales como, p. ej., ácidos nucleicos peptídicos o morfolinos (morfolinos unidos por -N(H)-C(=O)-O- u otro enlace no fosfodiéster).
- “Compuesto oligomérico” u “oligómero” se refiere a una estructura polimérica que comprende dos o más subestructuras y capaz de hibridarse a una región de una molécula de ácido nucleico. En ciertas realizaciones, los compuestos oligoméricos son oligonucleósidos. En ciertas realizaciones, los compuestos oligoméricos son oligonucleótidos. En ciertas realizaciones, los compuestos oligoméricos son compuestos antisentido. En ciertas realizaciones, los compuestos oligoméricos son oligonucleótidos antisentido. En ciertas realizaciones, los compuestos oligoméricos son oligonucleótidos quiméricos.
- 55 “Oligonucleótido” significa un polímero de nucleósidos unidos, cada uno de los cuales puede modificarse o no modificarse, independientemente uno del otro.
- 60 “Administración parenteral” significa administración por inyección o infusión. La administración parenteral incluye administración subcutánea, administración intravenosa, administración intramuscular, administración intraarterial, administración intraperitoneal o administración intracraneal, p. ej., administración intratecal o intracerebroventricular. La administración puede ser continua, crónica, corta o intermitente.
- 65 “Péptido” se refiere a una molécula formada uniendo al menos dos aminoácidos por enlaces amida. Péptido se refiere a polipéptidos y proteínas.

"Porcentaje de saturación de transferrina" se refiere a la proporción de hierro sérico con respecto a la capacidad total de unión al hierro multiplicada por 100. De las moléculas de transferrina que están disponibles para unir hierro, este valor le dice al médico cuánto hierro sérico está realmente unido.

"Composición farmacéutica" significa una mezcla de sustancias adecuadas para administrar a un individuo. Por ejemplo, una composición farmacéutica puede comprender uno o más agentes farmacéuticos activos y una solución acuosa estéril.

"Vehículo farmacéuticamente aceptable" significa un medio o diluyente que no interfiere con la estructura del oligonucleótido. Ciertos de tales vehículos permiten formular composiciones farmacéuticas como, p. ej., tabletas, píldoras, grageas, cápsulas, líquidos, geles, jarabes, lodos, suspensiones y pastillas para la ingestión oral de un sujeto. Por ejemplo, un vehículo farmacéuticamente aceptable puede ser una solución acuosa estéril, como PBS.

"Derivado farmacéuticamente aceptable" abarca sales, conjugados, profármacos o isómeros farmacéuticamente aceptables de los compuestos descritos en el presente documento.

"Sales farmacéuticamente aceptables" significa sales fisiológica y farmacéuticamente aceptables de compuestos antisentido, es decir, sales que retienen la actividad biológica deseada del oligonucleótido original y no imparten efectos toxicológicos no deseados a los mismos.

"Enlace de fosforotioato" significa un enlace entre nucleósidos donde el enlace de fosfodiéster se modifica al reemplazar uno de los átomos de oxígeno no puente con un átomo de azufre. Un enlace de fosforotioato es un enlace internucleósido modificado.

"Policitemia" se refiere a una condición de aumento de glóbulos rojos (RBC) en un volumen específico debido a un aumento en el número de glóbulos rojos (policitemia absoluta) o una disminución en el volumen plasmático (policitemia relativa). Las proporciones de volumen de sangre a glóbulos rojos se pueden medir como niveles de hematocrito. La mayor proporción de glóbulos rojos puede hacer que la sangre sea viscosa, lo que puede conducir a un flujo sanguíneo más lento a través del sistema circulatorio y a la posible formación de coágulos sanguíneos. Un flujo sanguíneo más lento puede disminuir el transporte de oxígeno a las células, tejidos y/u órganos, lo que conduce a enfermedades, trastornos o afecciones como angina o insuficiencia cardíaca. La formación de coágulos de sangre en el sistema circulatorio puede provocar daños en células, tejidos y/u órganos, lo que puede provocar enfermedades, trastornos o afecciones como infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. El tratamiento para la policitemia incluye flebotomía o medicamentos para disminuir la producción de glóbulos rojos (p. ej., INF- α , hidroxiurea, anagrelida). Los ejemplos de policitemia incluyen, pero no se limitan a, policitemia vera (PCV), policitemia rubra vera (PRV) y eritremia. En ciertos casos, la policitemia puede progresar a leucemia eritroide en un sujeto.

"Porción" significa un número definido de nucleobases contiguas (es decir, unidas) de un ácido nucleico. En ciertas realizaciones, una porción es un número definido de nucleobases contiguas de un ácido nucleico diana. En ciertas realizaciones, una porción es un número definido de nucleobases contiguas de un compuesto antisentido.

"Prevenir" se refiere a retrasar o prevenir el inicio, desarrollo o progresión de una enfermedad, trastorno o afección durante un período de tiempo de minutos a indefinidamente. Prevenir también significa reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad, trastorno o afección.

"Profármaco" significa un agente terapéutico que se prepara en una forma inactiva que se convierte en una forma activa dentro del cuerpo o las células del mismo por la acción de enzimas endógenas u otras sustancias químicas o afecciones.

"Efectos secundarios" significa respuestas fisiológicas atribuibles a un tratamiento distinto de los efectos deseados. En ciertas realizaciones, los efectos secundarios incluyen reacciones en el lugar de la inyección, anomalías en las pruebas de función hepática, anomalías en la función renal, toxicidad hepática, toxicidad renal, anomalías en el sistema nervioso central, miopatías y malestar general. Por ejemplo, el aumento de los niveles de aminotransferasa en suero puede indicar toxicidad hepática o anomalía de la función hepática.

"Oligonucleótido monocatenario" significa un oligonucleótido que no se hibrida con una cadena complementaria.

"Específicamente hibridable" se refiere a un compuesto antisentido que tiene un grado suficiente de complementariedad con un ácido nucleico diana para inducir un efecto deseado, mientras que exhibe efectos mínimos o nulos en los ácidos nucleicos no diana en condiciones en las que se desea una unión específica, es decir, bajo condiciones fisiológicas en el caso de ensayos *in vivo* y tratamientos terapéuticos.

"Administración subcutánea" significa administración justo debajo de la piel.

"Dirigido" o "dirigir" significa el proceso de diseño y selección de un compuesto antisentido que se hibridará específicamente con un ácido nucleico diana e inducirá un efecto deseado.

"Ácido nucleico diana", "ARN diana" y "transcripción de ARN diana" se refieren a un ácido nucleico capaz de ser objetivo de compuestos antisentido.

"Segmento diana" significa la secuencia de nucleótidos de un ácido nucleico diana al que se dirige un compuesto antisentido. "Sitio diana 5'" se refiere al nucleótido más 5' de un segmento diana. "Sitio diana 3'" se refiere al nucleótido más 3' de un segmento diana.

"Talasemia" se refiere a un subgrupo de anemias (p. ej., α -talasemia, β -talasemia, δ -talasemia, talasemia no dependiente de transfusiones (NTDT)) causadas por la formación de moléculas de hemoglobina anormales que conducen a la destrucción o degradación de glóbulos rojos. Las complicaciones de la talasemia incluyen exceso de hierro (es decir, sobrecarga de hierro en la sangre, ya sea por la talasemia en sí o por transfusiones

frecuentes para tratar la talasemia), mayor riesgo de infección, deformidades óseas, bazo agrandado (es decir, esplenomegalia), tasas de crecimiento más lentas y problemas cardíacos (p. ej., insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias).

"Cantidad terapéuticamente efectiva" significa una cantidad de un agente farmacéutico que proporciona un beneficio terapéutico a un individuo.

"TMPRSS6" (también conocido como "matriptasa-2") se refiere a cualquier ácido nucleico o proteína de TMPRSS6.

"Ácido nucleico TMPRSS6" significa cualquier ácido nucleico que codifica TMPRSS6. Por ejemplo, en ciertas realizaciones, un ácido nucleico TMPRSS6 incluye una secuencia de ADN que codifica TMPRSS6, una secuencia de ARN transcrita a partir de ADN que codifica TMPRSS6 (que incluye ADN genómico que comprende intrones y exones) y una secuencia de ARNm que codifica TMPRSS6.

"ARNm de TMPRSS6" significa un ARNm que codifica una proteína TMPRSS6.

"Inhibidor específico de TMPRSS6" se refiere a cualquier agente capaz de inhibir específicamente la expresión del gen TMPRSS6, ARN TMPRSS6 y/o proteína TMPRSS6 a nivel molecular. Por ejemplo, los inhibidores específicos de TMPRSS6 incluyen ácidos nucleicos (incluidos compuestos antisentido), péptidos, anticuerpos, moléculas pequeñas y otros agentes capaces de inhibir el nivel de TMPRSS6. En ciertas realizaciones, al modular específicamente TMPRSS6, los inhibidores específicos de TMPRSS6 pueden afectar los componentes de la ruta de acumulación de hierro.

"Tratar" se refiere a administrar una composición farmacéutica a un animal para efectuar una alteración o mejora de una enfermedad, trastorno o afección en el animal. En ciertas realizaciones, se pueden administrar una o más composiciones farmacéuticas al animal.

"Nucleótido no modificado" significa un nucleótido compuesto de nucleobases, restos de azúcar y enlaces internucleosídicos que se producen naturalmente. En ciertas realizaciones, un nucleótido no modificado es un nucleótido de ARN (es decir, ® -D-ribonucleótido) o un nucleótido de ADN (es decir, ® -D-desoxirribonucleótido).

Ciertas formas de realización

[0024] En ciertas realizaciones, descritos en este documento son moduladores TMPRSS6. En ciertas realizaciones, los moduladores de TMPRSS6 pueden ser inhibidores específicos de TMPRSS6. En ciertas realizaciones, los inhibidores específicos de TMPRSS6 son ácidos nucleicos (incluidos compuestos antisentido), péptidos, anticuerpos, moléculas pequeñas y otros agentes capaces de inhibir o disminuir la expresión de TMPRSS6.

[0025] En ciertas realizaciones, los métodos se describen en el presente documento para reducir la acumulación de hierro. En ciertas realizaciones, se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para uso en la reducción de la acumulación de hierro en un animal. En ciertas realizaciones, la acumulación de hierro es el resultado de una terapia para tratar una enfermedad, trastorno o afección en el animal. En ciertas realizaciones, la terapia es la terapia de transfusión. En ciertas realizaciones, la acumulación de hierro se debe a una enfermedad, trastorno o afección en el animal. En ciertas realizaciones, la enfermedad, trastorno o afección es hemocromatosis hereditaria o β -talasemia. En ciertas realizaciones, la β -talasemia es β -talasemia mayor, β -talasemia intermedia o β -talasemia menor.

[0026] En ciertas realizaciones, los métodos se describen en el presente documento para aumentar los niveles de hepcidina, tales como ARNm o proteína de los niveles de expresión. En ciertas realizaciones, se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para uso en niveles crecientes de hepcidina, tales como niveles de expresión de ARNm.

[0027] En ciertas realizaciones, los métodos se describen en el presente documento para disminuir el porcentaje de saturación de transferrina en un animal. En ciertas realizaciones, se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para usar en la disminución del porcentaje de saturación de transferrina en un animal. En ciertas realizaciones, la disminución de la saturación de transferrina conduce a una disminución en el suministro de hierro para la eritropoyesis. En ciertas realizaciones, la disminución de la eritropoyesis trata, previene, retrasa la aparición, mejora y/o reduce la policitemia, o síntoma de la misma, en el animal. En ciertas realizaciones, la policitemia es policitemia vera. En ciertas realizaciones, el tratamiento con el oligonucleótido modificado dirigido a TMPRSS6 evita o retrasa el avance de la policitemia hacia la leucemia eritroide.

[0028] Los métodos descritos en la presente memoria comprenden administrar al animal una cantidad terapéuticamente efectiva del inhibidor TMPRSS6. En ciertas realizaciones, se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para su uso en la administración a un animal en una cantidad terapéuticamente efectiva.

[0029] En ciertas realizaciones, se describen métodos para tratar, prevenir, retardar la aparición de, mejorar y/o reducir una enfermedad, trastorno y/o afección, o síntoma de la misma, asociada con el exceso de acumulación de hierro en un animal, que comprende administrando al animal una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de TMPRSS6, en donde la enfermedad, trastorno y/o afección asociada con la acumulación excesiva de hierro se trata, previene, el inicio se retrasa, el síntoma mejora o disminuye.

- 5 **[0030]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para tratar, prevenir, retardar la aparición de, mejorar, y/o reducir la hemocromatosis hereditaria, o síntoma de la misma, en un animal, que comprende administrar al animal una cantidad terapéuticamente eficaz de un oligonucleótido modificado dirigido a TMPRSS6, en donde el oligonucleótido modificado comprende (a) un segmento de separación que consiste en nucleósidos deoxi unidos (b) un segmento de ala 5' que consiste en nucleósidos unidos (c) un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos, y en donde el segmento de separación es colocado entre el segmento del ala 5' y el segmento del ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento del ala comprende un azúcar modificado.
- 10 **[0031]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para tratar, prevenir, retardar la aparición de, mejorar, y/o reducción de la anemia, o síntoma de la misma, en un animal, que comprende administrar al animal una cantidad terapéuticamente cantidad efectiva de un focalización oligonucleótido modificado TMPRSS6, en donde el oligonucleótido modificado comprende (a) un segmento de separación que consiste en nucleósidos unidos deoxi (b) un segmento de ala 5' que consiste en nucleósidos unidos (c) un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos, y en donde el segmento de separación está posicionado entre el segmento del ala 5' y el segmento del ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento del ala comprende un azúcar modificado.
- 15 **[0032]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para tratar, prevenir, retardar la aparición de, mejorar, y/o reducir β -talasemia, o síntoma de la misma, en un animal, que comprende administrar al animal una cantidad terapéuticamente efectiva de un oligonucleótido modificado dirigido a TMPRSS6, en donde el oligonucleótido modificado comprende (a) un segmento de separación que consiste en nucleósidos desoxi unidos (b) un segmento de ala 5' que consiste en nucleósidos unidos (c) un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos, y en donde el segmento de separación se coloca entre el segmento del ala 5' y el segmento del ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento del ala comprende un azúcar modificado.
- 20 **[0033]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para la disminución de la saturación de transferrina en un animal, que comprende administrar al animal una cantidad terapéuticamente eficaz de un oligonucleótido modificado de orientación TMPRSS6, en donde los comprende oligonucleótidos modificados (a) un segmento de hueco que consiste en nucleósidos desoxi enlaces (b) un segmento de ala 5' que consiste en nucleósidos unidos (c) un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos, y en donde el segmento de separación está posicionado entre el segmento de ala 5' y el segmento de ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento de ala comprende un azúcar modificado. En ciertas realizaciones, la disminución de la saturación de transferrina conduce a una disminución en el suministro de hierro para la eritropoyesis. En ciertas realizaciones, la disminución de la eritropoyesis trata, previene, retrasa la aparición, mejora y/o reduce la policitemia, o síntoma de la misma, en el animal. En ciertas realizaciones, la policitemia es policitemia vera. En ciertas realizaciones, el tratamiento con el oligonucleótido modificado dirigido a TMPRSS6 evita o retrasa el avance de la policitemia hacia la leucemia eritroide.
- 25 **[0034]** En ciertas realizaciones, se describen métodos para la identificación de un animal en riesgo de una enfermedad, trastorno y/o condición o que tiene una enfermedad, trastorno y/o afección que está asociada con un exceso de acumulación de hierro, administrar al animal una cantidad terapéuticamente cantidad efectiva de un inhibidor de TMPRSS6, tratando así al animal.
- 30 **[0035]** En ciertas realizaciones, describe en el presente documento es el uso de un inhibidor de TMPRSS6 para la preparación de un medicamento. En ciertas realizaciones, se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para su uso en la preparación de un medicamento.
- 35 **[0036]** En ciertas realizaciones, descritas en este documento es el uso de un inhibidor de TMPRSS6 como un medicamento para tratar, prevenir, retardar la aparición de, y/o reducir una enfermedad, trastorno y/o afección, o síntoma de la misma, asociada con un exceso de acumulación de hierro en un animal administrando al animal una cantidad terapéuticamente efectiva del inhibidor TMPRSS6. En ciertas realizaciones se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para su uso en el tratamiento, prevención, retraso del inicio y/o reducción de una enfermedad, trastorno y/o afección, o síntoma de los mismos, asociados con una acumulación excesiva de hierro en un animal.
- 40 **[0037]** En ciertas realizaciones, describe en el presente documento es el uso de un compuesto antisentido TMPRSS6 para inhibir TMPRSS6. En ciertas realizaciones, se describe en el presente documento un compuesto antisentido TMPRSS6 para su uso en la inhibición de TMPRSS6.
- 45 **[0038]** En ciertas realizaciones, la enfermedad es la hemocromatosis. En ciertas realizaciones, la enfermedad está asociada con mutaciones en el gen HFE. En otras realizaciones, la enfermedad está asociada con mutaciones en el gen de hemojuvelina. En otras realizaciones, la enfermedad está asociada con mutaciones en el gen de hepcidina.
- 50 **[0039]** En ciertas realizaciones, describe en el presente documento es el uso de un inhibidor de TMPRSS6 como un medicamento para tratar, prevenir, retardar la aparición de, y/o reducir la policitemia o leucemia del eritroides. En ciertas realizaciones se describen inhibidores de TMPRSS6 como se describe en el presente documento para su uso
- 55
- 60
- 65

en el tratamiento, prevención, retraso del inicio y/o reducción de policitemia o leucemia eritroidea. En ciertas realizaciones, la policitemia incluye, pero no se limita a, policitemia vera (PCV), policitemia rubra vera (PRV) y eritremia.

5 **[0040]** En ciertas realizaciones, la enfermedad, trastorno y/o afección puede deberse a múltiples transfusiones de sangre. En ciertas realizaciones, las transfusiones múltiples pueden conducir a policitemia. En realizaciones adicionales, múltiples transfusiones de sangre están asociadas con el animal que tiene anemia. Los ejemplos de anemia que requieren múltiples transfusiones de sangre son anemia hereditaria, síndrome mielodisplásico y hemólisis crónica grave. Los ejemplos de anemia hereditaria incluyen, entre otros, anemia falciforme, talasemia, anemia de Fanconi, anemia de Diamond Blackfan, síndrome de Shwachman Diamond, trastornos de la membrana de glóbulos rojos, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o telangiectasia hemorrágica hereditaria. En ciertas realizaciones, la talasemia es β -talasemia. En ciertas realizaciones, la β -talasemia es β -talasemia mayor, β -talasemia intermedia o β -talasemia menor. En ciertas realizaciones, la enfermedad, trastorno y/o afección está asociada con un exceso de ingesta de suplemento parenteral de hierro o un exceso de ingesta dietética de hierro.

15 **[0041]** En ciertas realizaciones, en el presente documento se divulgan compuestos dirigidos a un ácido nucleico TMRSS6. En ciertas realizaciones, el ácido nucleico TMRSS6 es la secuencia murina establecida en el N° de acceso GENBANK NM_027902,2 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 1). En ciertas realizaciones, el ácido nucleico TMRSS6 es cualquiera de las secuencias humanas establecidas en el N° de acceso GENBANK NM_153609,2 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 2), el complemento del N° de acceso GENBANK NT_011520,12 truncado de 16850000 a 16891250 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 3), GENBANK N° de acceso CR456446,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 4), GENBANK N° de acceso BC039082,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 5), GENBANK N° de acceso AY358398,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 6), o GENBANK N° de acceso DB081153,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 7).

25 **[0042]** En ciertas realizaciones, el ácido nucleico TMRSS6 es un oligonucleótido modificado. En ciertas realizaciones, el ácido nucleico TMRSS6 consiste en 12 a 30, 10 a 30, 8 a 80, 10 a 50, 15 a 30, 18 a 21, 20 a 80, 20 a 35, 20 a 30, 20 a 29, 20 a 28, 20 a 27, 20 a 26, 20 a 25, 20 a 24, 20 a 23, 20 a 22, 20 a 21 o 20 nucleobases unidas. En ciertas de tales realizaciones, el compuesto antisentido comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 30 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 u 80 nucleobases unidas en longitud, o un rango definido por cualquiera de los dos valores anteriores. En realizaciones adicionales, el oligonucleótido modificado es monocatenario.

35 **[0043]** En ciertas realizaciones, el compuesto para uso en los procedimientos puede comprender un oligonucleótido modificado que comprende una secuencia de nucleobase al menos 70%, al menos 75%, al menos 80%, al menos 85%, 90%, al menos 95%, al menos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 99% complementario a una porción de igual longitud de SEQ ID NOs: 1-7. En ciertas realizaciones, el compuesto puede comprender un oligonucleótido modificado que comprende una secuencia de nucleobase 100% complementaria a una porción de igual longitud de SEQ ID NOs: 1-7.

40 **[0044]** En ciertas realizaciones, se describen compuestos para uso en los métodos que comprenden un oligonucleótido modificado que tiene una secuencia de nucleobases que comprende al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11, al menos 12, al menos 13, al menos 14, al menos 15, al menos 16, al menos 17, al menos 18, al menos 19 o al menos 20 nucleobases contiguas de una secuencia de nucleobase complementaria a cualquiera de las secuencias enumeradas en SEQ ID NOs: 1-7.

45 **[0045]** En ciertas realizaciones, el oligonucleótido modificado para uso en los métodos consiste en ácido nucleico TMRSS6 consta de 12 a 30, 10 a 30, 8 a 80, 10 a 50, 15 a 30, 18 a 21, 20 a 80, 20 a 35, 20 a 30, 20 a 29, 20 a 28, 20 a 27, 20 a 26, 20 a 25, 20 a 24, 20 a 23, 20 a 22, 20 a 21 o 20 nucleobases unidas. En ciertas de tales realizaciones, el compuesto antisentido comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 50 79 u 80 nucleobases unidas en longitud, o un rango definido por cualquiera de los dos valores anteriores.

55 **[0046]** En ciertas realizaciones, el compuesto para usar en los métodos tiene al menos un enlace internucleosídico modificado. En ciertas realizaciones, el enlace internucleosídico modificado es un enlace internucleosido fosforotioato.

[0047] En ciertas realizaciones, el compuesto para usar en los métodos tiene al menos un nucleósido que comprende un azúcar modificado. En ciertas realizaciones, al menos un azúcar modificado es un azúcar bicíclico.

60 **[0048]** En ciertas realizaciones, el compuesto para usar en los métodos tiene al menos un nucleósido que comprende una nucleobase modificada. En ciertas realizaciones, la nucleobase modificada es una 5-metilcitosina.

65 **[0049]** En ciertas realizaciones, el oligonucleótido modificado del compuesto para usar en los métodos comprende: (i) un segmento de separación que consiste en desoxinucleósidos unidos; (ii) un segmento de ala 5' que consiste en

nucleósidos unidos; (iii) un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos, en donde el segmento de separación se coloca inmediatamente adyacente a y entre el segmento de ala 5' y el segmento de ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento de ala comprende un azúcar modificado. En ciertas realizaciones, el oligonucleótido modificado comprende además al menos un enlace internucleosídico de fosforotioato.

[0050] En ciertas realizaciones, se describen métodos o usos en donde el animal es humano.

[0051] En ciertas realizaciones, la administración de un inhibidor de TMPRSS6 reduce la acumulación de hierro en el animal. En ciertas realizaciones, el inhibidor TMPRSS6 aumenta los niveles de expresión de hepcidina. En otras realizaciones, el inhibidor TMPRSS6 disminuye el porcentaje de saturación de transferrina.

[0052] En ciertas realizaciones, el compuesto se coadministra con uno o más segundo(s) agente(s). En ciertas realizaciones, el segundo agente es un quelante de hierro o un agonista de hepcidina. En realizaciones adicionales, el quelante de hierro incluye FBS0701 (FerroKin), Exjade, desferal o Deferiprone. En ciertas realizaciones, el segundo agente es un segundo compuesto antisentido. En realizaciones adicionales, el segundo compuesto antisentido se dirige a TMPRSS6. En otras realizaciones, el segundo compuesto antisentido se dirige a un compuesto no TMPRSS6. En otras realizaciones, el inhibidor TMPRSS6 se administra antes, durante o después de la terapia de flebotomía.

Compuestos antisentido

[0053] Los compuestos oligoméricos incluyen, pero no se limitan a, oligonucleótidos, oligonucleósidos, análogos de oligonucleótidos, miméticos de oligonucleótidos, compuestos antisentido, oligonucleótidos antisentido, y ARNsi. Un compuesto oligomérico puede ser "antisentido" para un ácido nucleico diana, lo que significa que es capaz de someterse a hibridación con un ácido nucleico diana a través de enlaces de hidrógeno.

[0054] En ciertas realizaciones, un compuesto antisentido tiene una secuencia de nucleobases que, cuando se escribe en la dirección 5' a 3', comprende el complemento inverso del segmento diana de un ácido nucleico diana a la que está dirigido. En ciertas realizaciones de este tipo, un oligonucleótido antisentido tiene una secuencia de nucleobase que, cuando se escribe en la dirección 5' a 3', comprende el complemento inverso del segmento diana de un ácido nucleico diana al que se dirige.

[0055] En ciertas realizaciones, un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6 es de 10 a 30 nucleótidos de longitud. En otras palabras, los compuestos antisentido son de 10 a 30 nucleobases unidas. En otras realizaciones, el compuesto antisentido comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 8 a 80, 10 a 80, 12 a 50, 15 a 30, 18 a 24, 19 a 22 o 20 nucleobases unidas. En ciertas de tales realizaciones, el compuesto antisentido comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 u 80 nucleobases unidas en longitud, o un rango definido por cualquiera de los dos valores anteriores. En algunas realizaciones, el compuesto antisentido es un oligonucleótido antisentido.

[0056] En ciertas realizaciones, el compuesto antisentido comprende un oligonucleótido modificado acortado o truncado. El oligonucleótido modificado acortado o truncado puede tener un solo nucleósido eliminado del extremo 5' (truncamiento 5'), la porción central o, alternativamente, del extremo 3' (truncamiento 3'). Un oligonucleótido acortado o truncado puede tener dos o más nucleósidos eliminados del extremo 5', dos o más nucleósidos eliminados de la porción central o, alternativamente, puede tener dos o más nucleósidos eliminados del extremo 3'. Alternativamente, los nucleósidos eliminados pueden dispersarse por todo el oligonucleótido modificado, p. ej., en un compuesto antisentido que tiene uno o más nucleósidos eliminados del extremo 5', uno o más nucleósidos eliminados de la porción central y/o uno o más nucleósidos eliminados del 3' final.

[0057] Cuando un solo nucleósido adicional está presente en un oligonucleótido alargado, el nucleósido adicional puede estar situado en el extremo 5', extremo 3' o parte central del oligonucleótido. Cuando están presentes dos o más nucleósidos adicionales, los nucleósidos añadidos pueden estar adyacentes entre sí, p. ej., en un oligonucleótido que tiene dos nucleósidos añadidos al extremo 5' (adición 5'), al extremo 3' (adición 3') o la porción central, del oligonucleótido. Alternativamente, el nucleósido agregado puede dispersarse a través del compuesto antisentido, p. ej., en un oligonucleótido que tiene uno o más nucleósidos agregados al extremo 5', uno o más nucleósidos agregados al extremo 3', y/o uno o más nucleósidos agregados a la porción central.

[0058] Es posible aumentar o disminuir la longitud de un compuesto antisentido, tal como un oligonucleótido antisentido, y/o introducir bases desajuste sin eliminar la actividad. Por ejemplo, en Woolf et al. (Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 89: 7305-7309, 1992), se probó una serie de oligonucleótidos antisentido de 13-25 nucleobases de longitud para determinar su capacidad para inducir la escisión de un ARN diana en un modelo de inyección de ovocitos. Los oligonucleótidos antisentido de 25 nucleobases de longitud con 8 u 11 bases de emparejamiento erróneo cerca de los extremos de los oligonucleótidos antisentido pudieron dirigir la escisión específica del ARNm diana, aunque en menor medida que los oligonucleótidos antisentido que no contenían emparejamientos erróneos. De manera similar, se logró

la escisión específica de la diana usando oligonucleótidos antisentido de 13 nucleobases, incluidos aquellos con 1 o 3 desajustes.

[0059] Gautschi et al (J. Natl Cancer Inst 93: 463 a 471, marzo de 2001) demostró la capacidad de un oligonucleótido que tiene 100% de complementariedad con el ARNm de bcl-2 y que tiene 3 desapareamientos con el ARNm de bcl-xL a reducir la expresión de bcl-2 y bcl-xL in vitro e in vivo. Además, este oligonucleótido demostró una potente actividad antitumoral in vivo.

[0060] Maher y Dolnick (Nuc Acid R es 16: 3341-3358, 1988) probó una serie de 14 oligonucleótidos antisentido tándem de nucleobases, y unos 28 y 42 oligonucleótidos antisentido de nucleobases compuestos de la secuencia de dos o tres de los oligonucleótidos antisentido tándem, respectivamente, por su capacidad para detener la traducción de DHFR humano en un ensayo de reticulocitos de conejo. Cada uno de los tres oligonucleótidos antisentido de 14 nucleobases solo fue capaz de inhibir la traducción, aunque a un nivel más modesto que los 28 o 42 oligonucleótidos antisentido de nucleobase.

Motivos compuestos antisentido

[0061] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido dirigidos a un ácido nucleico TMPRSS6 han modificado químicamente subunidades dispuestas en patrones, o motivos, para conferir a las propiedades de los compuestos antisentido tales como actividad mejorada del inhibidor, aumento de la afinidad de unión por un ácido nucleico diana o resistencia a la degradación por nucleasas *in vivo*.

[0062] Compuestos antisentido quiméricos contienen típicamente al menos una región modificada de modo que confieren mayor resistencia a la degradación por nucleasas, aumento de la captación celular, aumento de la afinidad de unión para el ácido nucleico diana, y/o aumento de la actividad inhibidora. Una segunda región de un compuesto antisentido quimérico puede servir opcionalmente como sustrato para la endonucleasa celular RNasa H, que escinde la cadena de ARN de un dúplex de ARN:ADN.

[0063] Los compuestos antisentido que tienen un motivo gapmer se consideran compuestos antisentido quiméricos. En un gapmer, una región interna que tiene una pluralidad de nucleótidos que soporta la escisión de RNasa H se coloca entre regiones externas que tienen una pluralidad de nucleótidos que son químicamente distintos de los nucleósidos de la región interna. En el caso de un oligonucleótido antisentido que tiene un motivo gapmer, el segmento gap generalmente sirve como sustrato para la escisión de la endonucleasa, mientras que los segmentos del ala comprenden nucleósidos modificados. En ciertas realizaciones, las regiones de un gapmer se diferencian por los tipos de restos de azúcar que comprenden cada región distinta. Los tipos de restos de azúcar que se usan para diferenciar las regiones de un gapmer pueden en algunas realizaciones incluir β -D-ribonucleósidos, β -D-desoxirribonucleósidos, nucleósidos modificados en 2' (tales nucleósidos modificados en 2' pueden incluir 2'-MOE, y 2'-O-CH₃, entre otros), y nucleósidos bicíclicos modificados en el azúcar (tales nucleósidos bicíclicos modificados en el azúcar pueden incluir los que tienen un puente 4'-(CH₂)_n-O-2', donde n = 1 o n = 2) Preferiblemente, cada región distinta comprende restos de azúcar uniformes. El motivo ala-espacio-ala se describe con frecuencia como "X-Y-Z", donde "X" representa la longitud de la región del ala 5', "Y" representa la longitud de la región del espacio, y "Z" representa la longitud de los 3' región del ala. Como se usa en este documento, un separador descrito como "X-Y-Z" tiene una configuración tal que el segmento de separación se coloca inmediatamente adyacente a cada uno de los segmentos del ala 5' y el segmento del ala 3'. Por lo tanto, no existen nucleótidos intermedios entre el segmento de ala 5' y el segmento de separación, o el segmento de separación y el segmento de ala 3'. Cualquiera de los compuestos antisentido descritos en el presente documento puede tener un motivo gapmer. En algunas realizaciones, X y Z son iguales; en otras realizaciones son diferentes. En una realización preferida, Y tiene entre 8 y 15 nucleótidos. X, Y o Z pueden ser cualquiera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 o más nucleótidos. Por lo tanto, los gapmers incluyen, entre otros, por ejemplo 5-10-5, 4-8-4, 4-12-3, 4-12-4, 3-14-3, 2-13-5, 2-16-2, 1-18-1, 3-10-3, 2-10-2, 1-10-1, 2-8-2, 6-8-6, 5-8-5, 1-8-1, 2-6-2, 6-8-6, 5-8-5, 1-8-1, 2-6-2, 2-13-2, 1-8-2, 2-8-3, 3-10-2, 1-18-2 o 2-18-2.

[0064] En ciertas realizaciones, el compuesto antisentido como un motivo "wingmer", que tiene un ala-hueco o configuración de brecha de ala, es decir, una configuración X-Y o Y-Z como se describió anteriormente para la configuración de gapmer. Por lo tanto, las configuraciones de wingmer incluyen, pero no se limitan a, por ejemplo 5-10, 8-4, 4-12, 12-4, 3-14, 16-2, 18-1, 10-3, 2-10, 1-10, 8-2, 2-13 o 5-13.

Ácidos nucleicos diana, regiones diana y secuencias de nucleótidos

[0065] Las secuencias de nucleótidos que codifican TMPRSS6 incluyen, sin limitación, los siguientes: N° de acceso NM_027902,2 (incorporado en el presente documento como SEQ ID NO: 1), N° de acceso GENBANK NM_153609,2 (incorporados aquí como SEQ ID NO: 2), el complemento de N° de acceso GENBANK NT_011520,12 truncado de 16850000 a 16891250 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 3), N° de acceso GENBANK CR456446,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 4), N° de acceso GENBANK BC039082,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 5), N° de acceso GENBANK AY358398,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 6), o N° de acceso GENBANK DB081153,1 (incorporado aquí como SEQ ID NO: 7).

[0066] Se entiende que el cuarto conjunto de secuencias en cada SEQ ID NO en los ejemplos contenía el presente documento es independiente de cualquier modificación de un resto azúcar, un enlace internucleosídico o una base nucleotídica. Como tal, los compuestos antisentido definidos por una SEQ ID NO pueden comprender, independientemente, una o más modificaciones a un resto de azúcar, un enlace internucleosídico o una nucleobase. Los compuestos antisentido descritos por Isis Number (Isis N°) indican una combinación de secuencia de nucleobase y motivo.

[0067] En ciertas realizaciones, una región diana es una región estructuralmente definida del ácido nucleico diana. Por ejemplo, una región diana puede abarcar un 3' UTR, un 5' UTR, un exón, un intrón, una unión exón/intrón, una región de codificación, una región de inicio de traducción, una región de terminación de traducción u otra región definida de ácido nucleico. Las regiones estructuralmente definidas para TMPRSS6 se pueden obtener mediante el número de acceso a partir de bases de datos de secuencia como NCBI. En ciertas realizaciones, una región diana puede abarcar la secuencia desde un sitio diana 5' de un segmento diana dentro de la región diana hasta un sitio diana 3' de otro segmento diana dentro de la región diana.

[0068] En ciertas realizaciones, un "segmento diana" es una sub-porción más pequeña de una región diana dentro de un ácido nucleico. Por ejemplo, un segmento diana puede ser la secuencia de nucleótidos de un ácido nucleico diana al que se dirige uno o más compuestos antisentido. "Sitio diana 5'" se refiere al nucleótido más 5' de un segmento diana. "Sitio diana 3'" se refiere al nucleótido más 3' de un segmento diana.

[0069] La orientación incluye la determinación de al menos un segmento diana al que se hibrida un compuesto antisentido, de modo que se produce un efecto deseado. En ciertas realizaciones, el efecto deseado es una reducción en los niveles de ácido nucleico diana de ARNm. En ciertas realizaciones, el efecto deseado es la reducción de los niveles de proteína codificada por el ácido nucleico diana o un cambio fenotípico asociado con el ácido nucleico diana.

[0070] Una región diana puede contener uno o más segmentos diana. Múltiples segmentos diana dentro de una región diana pueden superponerse. Alternativamente, pueden no superponerse. En ciertas realizaciones, los segmentos diana dentro de una región diana están separados por no más de aproximadamente 300 nucleótidos. En ciertas realizaciones, los segmentos diana dentro de una región diana están separados por una cantidad de nucleótidos que es, es aproximadamente, no es más que, no es más que aproximadamente, 250, 200, 150, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o 10 nucleótidos en el ácido nucleico diana, o es un rango definido por cualquiera de los dos valores anteriores. En ciertas realizaciones, los segmentos diana dentro de una región diana están separados por no más de, o no más de aproximadamente 5 nucleótidos en el ácido nucleico diana. En ciertas realizaciones, los segmentos diana son contiguos. Se contemplan regiones diana definidas por un intervalo que tiene un ácido nucleico inicial que es cualquiera de los sitios diana 5' o sitios diana 3' enumerados aquí.

[0071] Segmentos diana adecuados se pueden encontrar dentro de un 5' UTR, una región codificante, una 3' UTR, un intrón, un exón, o un exón/intrón de conexiones. Los segmentos diana que contienen un codón de inicio o un codón de parada también son segmentos diana adecuados. Un segmento diana adecuado puede excluir específicamente una determinada región estructuralmente definida, como el codón de inicio o el codón de detención.

[0072] La determinación de segmentos diana adecuados pueden incluir una comparación de la secuencia de un ácido nucleico diana a otras secuencias de todo el genoma. Por ejemplo, el algoritmo BLAST puede usarse para identificar regiones de similitud entre diferentes ácidos nucleicos. Esta comparación puede evitar la selección de secuencias de compuestos antisentido que pueden hibridarse de manera no específica a secuencias distintas de un ácido nucleico diana seleccionado (es decir, secuencias no diana o fuera de diana).

[0073] Puede haber variación en la actividad (p. ej., como se define por el porcentaje de reducción de los niveles de ácido nucleico diana) de los compuestos antisentido dentro de una región diana activa. En ciertas realizaciones, las reducciones en los niveles de ARNm de TMPRSS6 son indicativas de inhibición de la expresión de TMPRSS6. Las reducciones en los niveles de una proteína TMPRSS6 también son indicativas de inhibición de la expresión de TMPRSS6. Además, los cambios fenotípicos son indicativos de inhibición de la expresión de TMPRSS6. Por ejemplo, un aumento en los niveles de expresión de hepcidina puede ser indicativo de inhibición de la expresión de TMPRSS6. En otro ejemplo, una disminución en la acumulación de hierro en los tejidos puede ser indicativa de inhibición de la expresión de TMPRSS6. En otro ejemplo, un aumento en el porcentaje de saturación de transferrina puede ser indicativo de inhibición de la expresión de TMPRSS6.

Hibridación

[0074] En algunas realizaciones, la hibridación ocurre entre un compuesto antisentido descrito en este documento y un TMPRSS6ácido nucleico. El mecanismo más común de hibridación implica la unión de hidrógeno (p. ej., Watson-Crick, Hoogsteen o unión de hidrógeno de Hoogsteen invertida) entre nucleobases complementarias de las moléculas de ácido nucleico.

[0075] La hibridación puede ocurrir en diferentes condiciones. Las condiciones estrictas dependen de la secuencia y son determinadas por la naturaleza y composición de las moléculas de ácido nucleico a hibridar.

[0076] Los métodos para determinar si una secuencia es específicamente hibridable con un ácido nucleico diana son bien conocidos en la técnica (Sambrook y Russell, *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 3ª ed., 2001). En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido descritos en este documento son específicamente hibridables con un ácido nucleico TMPRSS6.

Complementariedad

[0077] Un compuesto antisentido y un ácido nucleico diana son complementarios entre sí cuando un número suficiente de nucleobases de la unión puede hidrógeno compuesto antisentido con el correspondiente nucleobases del ácido nucleico diana, de modo que se producirá un efecto deseado (p. ej., inhibición antisentido de un ácido nucleico diana, tal como un ácido nucleico TMPRSS6).

[0078] Nucleobases no complementarias entre un compuesto antisentido y un ácido nucleico TMPRSS6 pueden tolerarse siempre que el compuesto antisentido sigue siendo capaz de hibridarse específicamente a un ácido nucleico diana. Además, un compuesto antisentido puede hibridarse sobre uno o más segmentos de un ácido nucleico TMPRSS6 de tal manera que los segmentos intermedios o adyacentes no estén involucrados en el evento de hibridación (p. ej., una estructura de bucle, desajuste o estructura de horquilla).

[0079] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido divulgados en el presente documento, o una porción especificada de la misma, son, o son al menos, 70%, 80%, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100% complementario a un ácido nucleico TMPRSS6, una región diana, un segmento diana o una porción específica del mismo. El porcentaje de complementariedad de un compuesto antisentido con un ácido nucleico diana se puede determinar utilizando métodos de rutina. Por ejemplo, un compuesto antisentido en donde 18 de 20 nucleobases del compuesto antisentido son complementarias de una región diana y, por lo tanto, se hibridarían específicamente, representarían un 90 por ciento de complementariedad. En este ejemplo, las nucleobases no complementarias restantes pueden estar agrupadas o intercaladas con nucleobases complementarias y no necesitan ser contiguas entre sí o con nucleobases complementarias. Como tal, un compuesto antisentido que tiene 18 nucleobases de longitud que tiene 4 (cuatro) nucleobases no complementarias que están flanqueadas por dos regiones de completa complementariedad con el ácido nucleico diana tendría 77,8% de complementariedad general con el ácido nucleico diana y, por lo tanto, caería dentro del alcance de la presente divulgación.

[0080] El porcentaje de complementariedad de un compuesto antisentido con una región de un ácido nucleico diana puede determinarse rutinariamente utilizando programas BLAST (herramientas básicas de búsqueda de alineación local) y programas PowerBLAST conocidos en la técnica (Altschul et al., *J. Mol. Biol.*, 1990, 215, 403 410; Zhang y Madden, *Genome Res.*, 1997, 7, 649 656). El porcentaje de homología, identidad de secuencia o complementariedad puede determinarse, p. ej., mediante el programa Gap (Wisconsin Sequence Analysis Package, Versión 8 para Unix, Genetics Computer Group, University ResearCHPark, Madison Wis.), utilizando la configuración predeterminada, que utiliza algoritmo de Smith y Waterman (*Adv. Appl. Math.*, 1981,2, 482 489).

[0081] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido divulgados en el presente documento, o partes especificadas de los mismos, son completamente complementarios (es decir, 100% complementarias) a un ácido nucleico diana, o una porción especificada de la misma. Por ejemplo, el compuesto antisentido puede ser completamente complementario a un ácido nucleico TMPRSS6, o una región diana, o un segmento diana o secuencia diana del mismo. Como se usa en el presente documento, "completamente complementario" significa que cada nucleobase de un compuesto antisentido es capaz de emparejar bases precisas con las nucleobases correspondientes de un ácido nucleico diana. Por ejemplo, un compuesto antisentido de 20 nucleobases es completamente complementario a una secuencia diana que tiene una longitud de 400 nucleobases, siempre que haya una porción correspondiente de 20 nucleobases del ácido nucleico diana que sea completamente complementaria al compuesto antisentido. Completamente complementario también puede usarse en referencia a una porción especificada del primer y/o el segundo ácido nucleico. Por ejemplo, una porción de 20 nucleobases de un compuesto antisentido de 30 nucleobases puede ser "completamente complementaria" a una secuencia diana que tiene una longitud de 400 nucleobases. La porción de 20 nucleobases del oligonucleótido de 30 nucleobases es completamente complementaria a la secuencia diana si la secuencia diana tiene una porción correspondiente de 20 nucleobase en donde cada nucleobase es complementaria a la porción de 20 nucleobase del compuesto antisentido. Al mismo tiempo, el compuesto antisentido de 30 nucleobases completo puede o no ser completamente complementario a la secuencia diana, dependiendo de si las 10 nucleobases restantes del compuesto antisentido también son complementarias a la secuencia diana.

[0082] La ubicación de una nucleobase no complementaria puede estar en el extremo 5' o extremo 3' del compuesto antisentido. Alternativamente, la nucleobase o nucleobases no complementarias pueden estar en una posición interna del compuesto antisentido. Cuando están presentes dos o más nucleobases no complementarias, pueden ser contiguas (es decir, unidas) o no contiguas. En una realización, una nucleobase no complementaria se encuentra en el segmento del ala de un oligonucleótido antisentido gapmer.

[0083] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido que son, o son de hasta, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o 20 nucleobases de longitud comprenden no más de 4, no más de 3, no más de 2, o no más de 1 nucleobase(s) no complementaria(s) con respecto a un ácido nucleico diana, tal como un ácido nucleico TMRSS6, o una porción especificada del mismo.

[0084] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido que son, o son de hasta, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, o 30 nucleobases de longitud comprenden no más de 6, no más de 5, no más de 4, no más de 3, no más de 2, o no más de 1 nucleobase(s) no complementaria(s) en relación con un ácido nucleico diana, tal como un ácido nucleico TMRSS6, o una porción especificada del mismo.

[0085] Los compuestos antisentido divulgados en el presente documento también incluyen los que son complementarios a una porción de una diana de ácido nucleico. Como se usa en el presente documento, "porción" se refiere a un número definido de nucleobases contiguas (es decir, unidas) dentro de una región o segmento de un ácido nucleico diana. Una "porción" también puede referirse a un número definido de nucleobases contiguas de un compuesto antisentido. En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido son complementarios de al menos una porción de 8 nucleobases de un segmento diana. En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido son complementarios a al menos una porción de nucleobase de un segmento diana. En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido son complementarios de al menos una porción de 15 nucleobases de un segmento diana. También se contemplan compuestos antisentido que son complementarios de al menos una porción de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o más nucleobases de un segmento diana, o un rango definido por cualquiera de estos dos valores.

Identidad

[0086] Los compuestos antisentido descritos en este documento también pueden tener un porcentaje de identidad se define a un nucleótido particular, secuencia, SEQ ID NO, o compuesto representado por un número Isis específico, o porción del mismo. Como se usa en el presente documento, un compuesto antisentido es idéntico a la secuencia descrita en el presente documento si tiene la misma capacidad de emparejamiento de nucleobase. Por ejemplo, un ARN que contiene uracilo en lugar de timidina en una secuencia de ADN descrita se consideraría idéntico a la secuencia de ADN ya que tanto el uracilo como la timidina se emparejan con adenina. También se contemplan versiones acortadas y alargadas de los compuestos antisentido descritos en el presente documento, así como los compuestos que tienen bases no idénticas con respecto a los compuestos antisentido descritos en el presente documento. Las bases no idénticas pueden ser adyacentes entre sí o dispersas por todo el compuesto antisentido. El porcentaje de identidad de un compuesto antisentido se calcula de acuerdo con el número de bases que tienen un emparejamiento de bases idéntico en relación con la secuencia con la que se compara.

[0087] En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido, o porciones de los mismos, son al menos 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100% idéntico a uno o más de los compuestos antisentido o SEQ ID NO, o una porción de los mismos, descritos aquí.

Modificaciones

[0088] Un nucleósido es una combinación de base-azúcar. La porción de nucleobase (también conocida como base) del nucleósido es normalmente un resto de base heterocíclica. Los nucleótidos son nucleósidos que además incluyen un grupo fosfato unido covalentemente a la porción de azúcar del nucleósido. Para aquellos nucleósidos que incluyen un azúcar pentofuranosilo, el grupo fosfato puede unirse al resto hidroxilo 2', 3' o 5' del azúcar. Los oligonucleótidos se forman a través del enlace covalente de nucleósidos adyacentes entre sí, para formar un oligonucleótido polimérico lineal. Dentro de la estructura oligonucleotídica, los grupos fosfato se denominan comúnmente formando los enlaces internucleosídicos del oligonucleótido.

[0089] Las modificaciones a compuestos antisentido abarcan sustituciones o modificaciones de enlaces internucleosídico, restos de azúcar, o nucleobases. Los compuestos antisentido modificados a menudo se prefieren a las formas nativas debido a propiedades deseables tales como, p. ej., captación celular mejorada, afinidad mejorada por la diana de ácido nucleico, mayor estabilidad en presencia de nucleasas o mayor actividad inhibitoria.

[0090] Nucleósidos químicamente modificados también se pueden emplear para aumentar la afinidad de unión de un oligonucleótido antisentido acortado o truncado por su ácido nucleico diana. En consecuencia, a menudo se pueden obtener resultados comparables con compuestos antisentido más cortos que tienen tales nucleósidos modificados químicamente.

Enlaces modificados internucleosídicos

[0091] El enlace internucleosídico de origen natural de ARN y ADN es un enlace 3' a 5' fosfodiéster. Los compuestos antisentido que tienen uno o más enlaces internucleosídicos modificados, es decir, de origen no natural, a menudo se seleccionan sobre los compuestos antisentido que tienen enlaces internucleosídicos de origen natural debido a

propiedades deseables tales como, p. ej., captación celular mejorada, afinidad mejorada por los ácidos nucleicos diana y aumento de estabilidad en presencia de nucleasas.

5 **[0092]** Los oligonucleótidos que tienen enlaces internucleosídicos modificados incluyen enlaces internucleosídicos que retienen un átomo de fósforo, así como enlaces internucleosídicos que no tienen un átomo de fósforo. Los enlaces internucleosídicos que contienen fósforo representativos incluyen, pero no se limitan a, fosfodiésteres, fosfotriésteres, metilfosfonatos, fosforamido y fosforotioatos. Los métodos de preparación de enlaces que contienen fósforo y no fósforo son bien conocidos.

10 **[0093]** En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido dirigidos a un ácido nucleico TMRSS6 comprenden uno o más enlaces internucleosídicos modificados. En ciertas realizaciones, los enlaces internucleosídicos modificados son enlaces de fosforotioato. En ciertas realizaciones, cada enlace internucleosídico de un compuesto antisentido es un enlace internucleosídico de fosforotioato.

15 *Restos de azúcar modificados*

[0094] Los compuestos antisentido pueden contener opcionalmente uno o más nucleósidos en donde el grupo azúcar se ha modificado. Dichos nucleósidos modificados con azúcar pueden impartir mayor estabilidad de la nucleasa, mayor afinidad de unión o alguna otra propiedad biológica beneficiosa a los compuestos antisentido. En ciertas realizaciones, los nucleósidos comprenden restos de anillo de ribofuranosa modificados químicamente. Los ejemplos de anillos de ribofuranosa modificados químicamente incluyen, sin limitación, la adición de grupos sustituyentes (incluidos grupos sustituyentes 5' y 2', puente de átomos de anillo no geminal para formar ácidos nucleicos bicíclicos (BNA), reemplazo del átomo de oxígeno del anillo de ribosilo con S, N(R) o C(R¹) (R²) (R, R¹ y R² son cada uno independientemente H, alquilo C₁-C₁₂ o un grupo protector) y combinaciones de los mismos. Ejemplos de azúcares modificados químicamente incluyen 2' -F-5'-nucleósido sustituido con metilo (consulte la solicitud internacional PCT WO 2008/101157 publicada el 21/08/08 para otros nucleósidos 5', 2'-bis sustituidos descritos) o la sustitución del átomo de oxígeno del anillo ribosilo con S con sustitución adicional en la posición 2' (véase la solicitud de patente de EE.UU. publicada US2005-0130923, publicada el 16 de junio de 2005) o, alternativamente, la sustitución 5' de un BNA (véase la solicitud internacional PCT WO 2007/134181 publicada el 22/11/07 en donde LNA está sustituido con, p. ej., un extremo 5' metilo o un grupo 5'-vinilo).

[0095] Ejemplos de nucleósidos que tienen restos de azúcar modificados incluyen, sin limitación, nucleósidos que comprenden grupos sustituyentes 5'-vinilo, 5'-metilo (R o S), 4'-S, 2'-F, 2'-OCH₃, 2'-OCH₂CH₃, 2'-OCH₂CH₂F y 2'-O(CH₂)₂OCH₃. El sustituyente en la posición 2' también se puede seleccionar de alilo, amino, azido, tio, O-alilo, O-C₁-C₁₀ alquilo, OCF₃, OCH₂F, O (CH₂)₂ SCH₃, O(CH₂)₂-O-N(R_m)(R_n), O-CH₂-C(=O)-N(R_m)(R_n), y O-CH₂-C(=O)-N(R¹)-(CH₂)₂-N(R_m)(R_n), donde cada R¹, R_m y R_n es, independientemente, H o alquilo C₁-C₁₀ sustituido o no sustituido.

[0096] Como se usa en este documento, "nucleósidos bicíclicos" se refieren a nucleósidos modificados que comprenden un resto de azúcar bicíclico. Los ejemplos de nucleósidos bicíclicos incluyen, sin limitación, nucleósidos que comprenden un puente entre los átomos del anillo ribosilo 4' y 2'. En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido descritos en este documento incluyen uno o más nucleósidos bicíclicos que comprenden un puente de 4' a 2'. Los ejemplos de tales nucleósidos bicíclicos puenteados de 4' a 2' incluyen, entre otros, una de las fórmulas: 4'-(CH₂)-O-2' (LNA); 4'-(CH₂)-S-2'; 4'-(CH₂)₂-O-2' (ENA); 4'-CH(CH₃)-O-2' y 4'-CH(CH₂OCH₃)-O-2' (y análogos de los mismos, véase la Patente de los Estados Unidos 7,399,845, emitida el 15 de julio de 2008); 4'-C(CH₃)(CH₃)-O-2' (y análogos de los mismos ver solicitud internacional publicada WO/2009/006478, publicada el 8 de enero de, 2009); 4'-CH₂-N(OCH₃)-2' (y análogos de los mismos ver solicitud internacional publicada WO/2008/150729, publicada el 11 de diciembre de 2008); 4'-CH₂-O-N(CH₃)-2' (véase la Solicitud de Patente de Estados Unidos desde 2004-0171570, publicada el 2 de septiembre del 2004); 4'-CH₂-N(R)-O-2', en donde R es H, C₁-C₁₂ alquilo, o un grupo protector (véase la patente de EE.UU. 7,427,672, expedida el 23 de septiembre de 2008); 4'-CH₂-C(H)(CH₃)-2' (ver Chattopadhyaya et al, J. Org Chem, 2009, 74, 118-134...); y 4' CH₂-C(=CH₂)-2' (y análogos de los mismos ver la solicitud internacional publicada WO 2008/154401, publicada el 8 de diciembre, 2008).

[0097] Otros informes relacionados con los nucleósidos bicíclicos que también se encuentran en la literatura publicada (véase, por ejemplo: Singh et al, Chem Commun, 1998, 4, 455-456; Koshkin et al, Tetrahedron, 1998, 54, 3607-3630; Wahlestedt et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU., 2000, 97, 5633-5638; Kumar et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 1998, 8, 2219-2222; Singh et al., J. Org. Chem., 1998, 63, 10035-10039; Srivastava et al., J. Am. Chem. Soc., 2007, 129 (26) 8362-8379; Elayadi et al., Curr. Opinion Invest. Drugs, 2001, 2, 558-561; Braasch et al., Chem. Biol., 2001, 8, 1-7; y Orum et al., Curr. Opinion Mol. Ther., 2001, 3, 239 -243; patentes estadounidenses números 6,268,490; 6,525,191; 6,670,461; 6,770,748; 6,794,499; 7,034,133; 7,053,207; 7,399,845; 7,547,684; y 7,696,345; publicación número de patente de Estados Unidos US2008-0039618; US2009-0012281; números de patente estadounidense 98,974. 61/026,995; 61/026,998; 61/056,564; 61/086,231; 61/097,787; y 61/099,844; Solicitudes PCT internacionales publicadas WO 1994/014226; WO 2004/106356; WO 2005/02 1570; WO 2007/134181; WO 2008/150729; WO 2008/154401; y WO 2009/006478. Cada uno de los nucleósidos bicíclicos anteriores se puede preparar con una o más configuraciones de azúcar estereoquímicas que incluyen, p. ej., α-L-ribofuranosa y β-D-ribofuranosa (véase la solicitud internacional PCT PCT/DK98/00393, publicada el 25 de marzo de 1999 como WO 99/14226).

[0098] En ciertas realizaciones, restos de azúcares bicíclicos de nucleósidos BNA incluyen, pero no se limitan a, compuestos que tienen al menos un puente entre la posición 4' y la posición 2' del resto de azúcar pentofuranosilo en donde dichos puentes comprende independientemente 1 o de 2 a 4 grupos vinculados seleccionados independientemente de $-[C(R_a)(R_b)]_n-$, $-C(R_a)=C(R_b)-$, $-C(R_a)=N-$, $-C(=O)-$, $-C(=NR_a)-$, $-C(=S)-$, $-O-$, $-Si(R_a)_2-$, $-S(=O)_x-$, y $-N(R_a)-$; en donde:

x es 0, 1 o 2;

n es 1, 2, 3 o 4;

cada R^a y R^b es, independientemente, H, un grupo protector, hidroxilo, C_1-C_{12} alquilo, C_1-C_{12} alquilo sustituido, C_2-C_{12} alquenoilo, C_2-C_{12} alquenoilo sustituido, C_2-C_{12} alquinilo, C_2-C_{12} alquinilo sustituido, C_5-C_{20} arilo, sustituido, C_5-C_{20} arilo, heterociclo radical, heterociclo radical sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, C_5-C_7 radical alicíclico, radical C_5-C_7 alicíclico sustituido, halógeno, OJ_1 , NJ_1J_2 , SJ_1 , N_3 , $COOJ_1$, acilo ($C(=O)-H$), acilo sustituido, CN, sulfonilo ($S(=O)_2-J_1$) o sulfoxilo ($S(=O)-J_1$); y

cada J_1 y J_2 es, independientemente, H, C_1-C_{12} alquilo, C_1-C_{12} alquilo sustituido, C_2-C_{12} alquenoilo, C_2-C_{12} alquenoilo sustituido, C_2-C_{12} alquinilo, C_2-C_{12} alquinilo sustituido, C_5-C_{20} arilo, C_5-C_{20} arilo sustituido, acilo ($C(=O)-H$), acilo sustituido, un radical heterociclo, un radical heterociclo sustituido, C_1-C_{12} aminoalquilo, C_1-C_{12} aminoalquilo sustituido o un grupo protector.

[0099] En ciertas realizaciones, el puente de un resto de azúcar bicíclico es $-[C(R^a)(R^b)]_n-$, $-[C(R^a)(R^b)]_n-O-$, $-C(R^aR^b)-N(R)-O-$ o $-C(R^aR^b)-O-N(R)-$. En ciertas realizaciones, el puente es $4'-CH_2-2'$, $4'-(CH_2)_2-2'$, $4'-(CH_2)_3-2'$, $4'-CH_2-O-2'$, $4'-(CH_2)_2-O-2'$, $4'-CH_2-ON(R)-2'$ y $4'-CH_2-N(R)-O-2'$, en donde cada R es, independientemente, H, un protector de grupo o C_1-C_{12} alquilo.

[0100] En ciertas realizaciones, los nucleósidos bicíclicos se definen adicionalmente por configuración isomérica. Por ejemplo, un nucleósido que comprende un puente $4'-2'$ metileno-oxi, puede estar en la configuración $\alpha-L$ o en la configuración $\beta-D$. Anteriormente, $\alpha-L$ -metileno-oxi ($4'-CH_2-O-2'$) BNA de se han incorporado en oligonucleótidos antisentido que mostraban antisentido actividad (Frieden et al., Nucleic Acids Research, 2003, 21, 6365-6372).

[0101] En ciertas realizaciones, los nucleósidos bicíclicos que incluyen, pero no se limitan a, (A) $\alpha-L$ -metileno-oxi ($4'-CH_2-O-2'$) BNA, (B) $\beta-D$ -metileno-oxi ($4'-CH_2-O-2'$) BNA, (C) etileno-oxi ($4'-(CH_2)_2-O-2'$) BNA, (D) amino-oxi ($4'-CH_2-ON(R)-2'$) BNA, (E) oxiamino ($4'-CH_2-N(R)-O-2'$) BNA y (F) metilo (metileno-oxi) ($4'-CH(CH_3)-O-2'$) BNA, (G) metileno-tio ($4'-CH_2-S-2'$) BNA, (H) metileno-amino ($4'-CH_2-N(R)-2'$) BNA, (I) metilo carbocíclico ($4'-CH_2-CH(CH_3)-2'$) BNA, y (J) propileno carbocíclico ($4'-(CH_2)_3-2'$) BNA como se muestra a continuación.

en donde Bx es el resto de base y R es independientemente H, un grupo protector o C_1-C_{12} alquilo.

[0102] En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula I:

5

10

en donde:

15

Bx es un resto de base heterocíclico;
 -Qa-Qb-Qc- es -CH₂-N(R_c)-CH₂-, -C(=O)-N(R_c)-CH₂-, -CH₂-O-N(R_c)-, -CH₂-N(R_c)-O- o -CN(R_c)-O-CH₂;
 R_c es C₁-C₁₂ alquilo o un grupo protector de amino; y T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte.

20

[0103] En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula II:

25

30

en donde:

35

Bx es un resto de base heterocíclico;
 T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte;
 Z_a es C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenoilo, C₂-C₆ alquinilo, C₁-C₆ alquilo sustituido, C₂-C₆ alquenoilo sustituido, C₂-C₆ alquinilo sustituido, acilo, acilo sustituido, amida sustituida, tiol o tio sustituido.

40

[0104] En una realización, cada uno de los grupos sustituidos es, independientemente, mono o poli sustituido con grupos sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, oxo, hidroxilo, OJ_c, NJ_cJ_d, SJ_c, N₃, O-C(=X)J_c, y NJ_aC(=X) NJ_cJ_d, en donde cada J_c, J_d y J_e es, independientemente, H, alquilo C₁-C₆ o alquilo C₁-C₆ sustituido y X es O o NJ_c.

45

[0105] En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula III:

50

55

en donde:

60

Bx es un resto de base heterocíclico;
 T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte;
 Z_b es C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenoilo, C₂-C₆ alquinilo, C₁-C₆ alquilo sustituido, C₂-C₆ alquenoilo sustituido, C₂-C₆ alquinilo sustituido o acilo sustituido (C(=O)-).

65

[0106] En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula IV:

5

10

15 en donde:

Bx es un resto de base heterocíclico; T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte; R_d es C₁-C₆ alquilo, alquilo C₁-C₆ alquilo sustituido, C₂-C₆ alqueno, sustituido C₂-C₆ alqueno, C₂-C₆ alquino o sustituido C₂-C₆ alquino; cada q_a, q_b, q_c y q_d es, independientemente, H, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquilo sustituido, C₂-C₆ alqueno, sustituido C₂-C₆ alqueno, C₂-C₆ alquino o C₂-C₆ alquino sustituido, C₁-C₆ alcoxi, sustituido C₁-C₆ alcoxi, acilo, acilo sustituido, C₁-C₆ aminoalquilo o C₁-C₆ aminoalquilo sustituido;

20

25 **[0107]** En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula V:

30

35

en donde:

Bx es un resto de base heterocíclica;
 T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte;
 q_a, q_b, q_c y q_f son cada uno, independientemente, hidrógeno, halógeno, C₁-C₁₂ alquilo, C₁-C₁₂ alquilo sustituido, C₂-C₁₂ alqueno, C₂-C₁₂ alqueno sustituido, C₂-C₁₂ alquino, C₂-C₁₂ alquino sustituido, C₁-C₁₂ alcoxi, C₁-C₁₂ alcoxi sustituido, O_j, S_j, SO₂J_j, SO₂J_j, N_jJ_jK, N₃, CN, C(=O)O_j, C(=O)N_jJ_jK, C(=O)J_j, O-C(=O)-N_jJ_jK, N(H)C(=NH)N_jJ_jK, N(H)C(=O)N_jJ_jK o N(H)C(=S)N_jJ_jK;
 o q_e y q_f juntos son = C(q_g) (q_h);
 q_g y q_h son cada uno, independientemente, H, halógeno, C₁-C₁₂ alquilo o C₁-C₁₂ alquilo sustituido.

40

45

[0108] La síntesis y la preparación de metilenoxi (4'-CH₂-O-2') BNA monómeros adenina, citosina, guanina, 5-metilcitosina, timina y uracilo, junto con su oligomerización y las propiedades de reconocimiento de ácidos nucleicos han sido descritos (Koshkin et al., Tetrahedron, 1998, 54, 3607-3630). Los BNA y la preparación de los mismos también se describen en los documentos WO 98/39352 y WO 99/14226.

50

[0109] Los análogos de metilenoxi (4'-CH₂-O-2') BNA y 2'-tio-BNA, también han sido preparados (Kumar et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 1998, 8, 2219-2222). También se ha descrito la preparación de análogos de nucleósidos bloqueados que comprenden dúplex de oligodesoxirribonucleótidos como sustratos para polimerasas de ácido nucleico (Wengel et al., WO 99/14226). Además, la síntesis de 2'-amino-BNA, un novedoso análogo de oligonucleótido de alta afinidad restringido por la conformación se ha descrito en la técnica (Singh y col., J. Org. Chem., 1998, 63, 10035-10039). Además, se han preparado 2'-amino- y 2'-metilamino-BNA y se ha informado previamente sobre la estabilidad térmica de sus dúplex con hebras complementarias de ARN y ADN.

55

60

[0110] En ciertas realizaciones, se describen nucleósidos bicíclicos que tienen la Fórmula VI:

65

en donde:

Bx es un resto de base heterocíclico;

T_a y T_b son cada uno, independientemente H, un grupo protector de hidroxilo, un grupo conjugado, un grupo de fósforo reactivo, un resto de fósforo o una unión covalente a un medio de soporte; cada q_i, q_j, q_k y q_l es, independientemente, H, halógeno, C₁-C₁₂ alquilo, C₁-C₁₂ alquilo sustituido, C₂-C₁₂ alquenilo, C₂-C₁₂ alquenilo sustituido, C₂-C₁₂ alquinilo, C₂-C₁₂ alquinilo sustituido, C₁-C₁₂ alcoxilo, C₁-C₁₂ alcoxilo sustituido, OJ_j, SJ_j, SO₂J_j, SO₂J_k, NJ_jJ_k, N₃, CN, C(=O)OJ_j, C(=O)NJ_jJ_k, C(=O)J_j, O-C(=O)NJ_jJ_k, N(H)C(=NH)NJ_jJ_k, N(H)C(=O)NJ_jJ_k o N(H)C(=S)NJ_jJ_k; y

q_i y q_j o q_l y q_k juntos son = C(q_g)(q_h), en donde q_g y q_h son cada uno, independientemente, H, halógeno, C₁-C₁₂ alquilo o C₁-C₁₂ alquilo sustituido.

[0111] Se ha descrito un nucleósido carbocíclico bicíclico que tiene un puente 4'-(CH₂)₃-2' y el puente análogo alquenílico 4'-CH=CH-CH₂-2' (Freier et al., *Nucleic Acids Research*, 1997, 25 (22), 4429-4443 y Albaek et al., *J. Org. Chem.*, 2006, 71, 7731-7740). También se ha descrito la síntesis y preparación de nucleósidos bicíclicos carbocíclicos junto con su oligomerización y estudios bioquímicos (Srivastava et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 2007, 129 (26), 8362-8379).

[0112] Como se usa en el presente documento, "nucleósido bicíclico 4'-2'" o "nucleósido bicíclico 4' a 2'" se refiere a un nucleósido bicíclico que comprende un anillo de furanosa que comprende un puente que conecta dos átomos de carbono del anillo de furanosa conecta el 2' átomo de carbono y el átomo de carbono 4' del anillo de azúcar.

[0113] Como se usa en este documento, "nucleósidos monocíclicos" se refieren a nucleósidos que comprenden restos de azúcar modificados que no son restos de azúcares bicíclicos. En ciertas realizaciones, el resto de azúcar, o análogo de resto de azúcar, de un nucleósido puede modificarse o sustituirse en cualquier posición.

[0114] Como se usa en el presente documento, "azúcar 2'-modificado" significa un azúcar de furanosilo modificado en la posición 2'. En ciertas realizaciones, tales modificaciones incluyen sustituyentes seleccionados entre: un haluro, que incluye, pero no se limita a, alcoxi sustituido y no sustituido, tioalquilo sustituido y no sustituido, aminoalquilo sustituido y no sustituido, alquilo sustituido y no sustituido, alilo sustituido y no sustituido, alquinilo sustituido y no sustituido. En ciertas realizaciones, las modificaciones 2' se seleccionan de sustituyentes que incluyen, pero no se limitan a: O[(CH₂)_nO]_mCH₃, O(CH₂)_nNH₂, O(CH₂)_nCH₃, O(CH₂)_nF, O(CH₂)_nONH₂, OCH₂C(=O)N(H)CH₃ y O(CH₂)_nON[(CH₂)_nCH₃]₂, donde n y m son de 1 a aproximadamente 10. Otros grupos sustituyentes 2' también pueden seleccionarse a partir de: C₁-C₁₂ alquilo, alquilo sustituido, alquenilo, alquinilo, alcarilo, aralquilo, o-alcarilo o o-aralquilo, SH, SCH₃, OCN, Cl, Br, CN, F, CF₃, OCF₃, SOCH₃, SO₂CH₃, ONO₂, NO₂, N₃, NH₂, heterocicloalquilo, heterocicloalcarilo, aminoalquilamino, polialquilamino, sililo sustituido, un grupo de escisión de ARN, un grupo indicador, un intercalador, un grupo para mejorar las propiedades farmacocinéticas, o un grupo para mejorar las propiedades farmacodinámicas de un compuesto antisentido y otros sustituyentes que tienen propiedades similares. En ciertas realizaciones, los nucleósidos modificados comprenden una cadena lateral 2'-MOE (Baker et al., *J. Biol. Chem.*, 1997, 272, 11944-12000). Dicha sustitución de 2'-MOE se ha descrito que tiene una afinidad de unión mejorada en comparación con nucleósidos no modificados y con otros nucleósidos modificados, tales como 2'-O-metilo, O-propilo y O-aminopropilo. También se ha demostrado que los oligonucleótidos que tienen el sustituyente 2'-MOE son inhibidores antisentido de la expresión génica con características prometedoras para uso *in vivo* (Martin, *Helv. Chim. Acta*, 1995, 78, 486-504; Altmann et al., *Chimia*, 1996, 50, 168-176; Altmann y col., *Biochem. Soc. Trans.*, 1996, 24, 630-637; y Altmann y col., *Nucleosides Nucleotides*, 1997, 16, 917-926).

[0115] Como se usa en este documento, un "nucleósido de tetrahidropirano modificado" o "nucleósido THP modificado" significa un nucleósido que tiene un "azúcar" de tetrahidropirano de seis miembros sustituido por el residuo pentofuranosilo en nucleósidos normales (un sustituto de azúcar). Los nucleósidos de THP modificados incluyen, entre otros, lo que se conoce en la técnica como ácido nucleico de hexitol (HNA), ácido nucleico de anitol (ANA), ácido nucleico de manitol (MNA) (véase Leumann, *Bioorg. Med. Chem.*, 2002, 10, 841-854), fluoro HNA (F-HNA) o aquellos compuestos que tienen la Fórmula VII:

VII

en donde independientemente para cada uno de dichos al menos un análogo de nucleósido tetrahidropirano de Fórmula VII:

Bx es un resto de base heterocíclico;

T_a y T_b son cada uno, independientemente, un grupo de enlace internucleosídico que une el análogo de nucleósido de tetrahidropirano al compuesto antisentido o uno de T_a y T_b es un grupo de enlace internucleosídico que une el análogo de nucleósido de tetrahidropirano al compuesto antisentido y el otro de T_a y T_b es H, un grupo protector de hidroxilo, un ligado grupo conjugado o un 5' o grupo 3'-terminal; q₁, q₂, q₃, q₄, q₅, q₆ y q₇ son cada uno independientemente, H, C₁-C₆ alquilo, alquilo C₁-C₆ alquilo sustituido, C₂-C₆ alqueno, C₂-C₆ alqueno sustituido, C₂-C₆ alquino o C₂-C₆ alquino sustituido; y cada uno de R¹ y R² se selecciona de hidrógeno, hidroxilo, halógeno, alcoxi sustituido o no sustituido, NJ₁J₂, S_Ji, N₃, O-C(=X)J₁, O-C(=X) NJ₁J₂, NJ₃C(=X) NJ₁J₂ y CN, en donde X es O, SoNJ₁ y cada J₁, J₂ y J₃ es, independientemente, H o alquilo C₁-C₆.

[0116] En ciertas realizaciones, se describen los nucleósidos THP modificados de Fórmula VII en donde q₁, q₂, q₃, q₄, q₅, q₆ y q₇ son cada uno H. En ciertas realizaciones, al menos uno de q₁, q₂, q₃, q₄, q₅, q₆ y q₇ es distinto de H. En ciertas realizaciones, al menos uno de q₁, q₂, q₃, q₄, q₅, q₆ y q₇ es metilo. En ciertas realizaciones, los nucleósidos de THP de la Fórmula VII se dan a conocer en donde uno de R¹ y R² es fluoro. En ciertas realizaciones, R¹ es fluoro y R² es H; R¹ es metoxi y R² es H, y R¹ es metoxietoxi y R² es H.

[0117] Como se usa en este documento, "modificado en 2'" o "2'-sustituido" se refiere a un nucleósido que comprende un azúcar que comprende sustituyente en la posición 2' que no sea H u OH. Los nucleósidos modificados en 2' incluyen, pero no se limitan a, nucleósidos bicíclicos en los que el puente que conecta dos átomos de carbono del anillo de azúcar conecta el carbono 2' y otro carbono del anillo de azúcar; y nucleósidos con sustituyentes 2 que no forman puentes, tales como alilo, amino, azido, tio, O-alilo, O-C₁-C₁₀ alquilo, -OCF₃, O-(CH₂)₂-O-CH₃, 2'-O(CH₂)₂SCH₃, O-(CH₂)₂-O-N(R_m)(R_n) u O-CH₂-C(=O)-N(R_m)(R_n), donde cada R_m y R_n es, independientemente, H o C₁-C₁₀ alquilo sustituido o no sustituido. Los nucleósidos modificados en 2' pueden comprender además otras modificaciones, por ejemplo en otras posiciones del azúcar y/o en la nucleobase.

[0118] Como se usa en este documento, "2'-F" se refiere a un nucleósido que comprende un azúcar que comprende un grupo fluoro en la posición 2'.

[0119] Como se usa en este documento, "2'-OMe" o "2'-OCH₃" o "2'-O-metilo" cada refiere a un nucleósido que comprende un azúcar que comprende un grupo -OCH₃ en la posición 2' del anillo de azúcar.

[0120] Como se usa en el presente documento, "MOE" o "2'-MOE" o "2'-OCH₂CH₂OCH₃" o "2'-O-metoxietilo" se refieren cada uno a un nucleósido que comprende un azúcar que comprende un grupo -OCH₂CH₂OCH₃ en la posición 2' del anillo de azúcar.

[0121] Como se usa en el presente documento, "oligonucleótido" se refiere a un compuesto que comprende una pluralidad de nucleósidos unidos. En ciertas realizaciones, se modifica uno o más de la pluralidad de nucleósidos. En ciertas realizaciones, un oligonucleótido comprende uno o más ribonucleósidos (ARN) y/o desoxirribonucleósidos (ADN).

[0122] Muchos otros sistemas de anillos sustitutos de azúcar biciclo y triciclo también son conocidos en la técnica que pueden usarse para ósidos para su incorporación en compuestos antisentido (ver, p. ej., artículo de revisión: Leumann, Bioorg. Med. Chem., 2002, 10, 841-854). Dichos sistemas de anillo pueden sufrir varias sustituciones adicionales para mejorar la actividad.

[0123] Los métodos para la preparación de azúcares modificados son bien conocidos por los expertos en la materia.

[0124] En los nucleótidos que tienen restos de azúcar modificados, los restos de nucleobase (naturales, modificados o una combinación de los mismos) se mantienen para la hibridación con un objetivo de ácido nucleico apropiado.

5 **[0125]** En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido comprenden uno o más nucleósidos que tienen restos de azúcar modificados. En ciertas realizaciones, el resto de azúcar modificado es 2'-MOE. En ciertas realizaciones, los nucleósidos modificados con 2'-MOE están dispuestos en un motivo gapper. En ciertas realizaciones, el resto de azúcar modificado es un nucleósido bicíclico que tiene un grupo puente (4'-CH(CH₃)-O-2'). En ciertas realizaciones, los nucleósidos modificados (4'-CH(CH₃)-O-2') están dispuestos a lo largo de las alas de un motivo gapper.

Nucleobases modificadas

10 **[0126]** Las modificaciones o sustituciones de nucleobase (o base) son estructuralmente distinguibles, pero funcionalmente intercambiables con nucleobases no modificadas de origen natural o sintético. Tanto las nucleobases naturales como las modificadas son capaces de participar en enlaces de hidrógeno. Dichas modificaciones de nucleobase pueden impartir estabilidad de nucleasa, afinidad de unión o alguna otra propiedad biológica beneficiosa a compuestos antisentido. Las nucleobases modificadas incluyen nucleobases sintéticas y naturales tales como, p. ej., 5-metilcitosina (5-me-C). Ciertas sustituciones de nucleobase, incluidas las sustituciones de 5-metilcitosina, son particularmente útiles para aumentar la afinidad de unión de un compuesto antisentido por un ácido nucleico diana. Por ejemplo, se ha demostrado que las sustituciones de 5-metilcitosina aumentan la estabilidad del dúplex de ácido nucleico en 0,6-1,2°C (Sanghvi, YS, Crooke, ST y Lebleu, B., eds., *Antisense Research and Applications*, CRC Press, Boca Raton, 1993, pp. 276-278).

20 **[0127]** Nucleobases adicionales no modificadas incluyen 5-hidroximetilo citosina, xantina, hipoxantina, 2-aminoadenina, 6-metilo y otros derivados de alquilo de adenina y guanina, 2-propilo y otros derivados de alquilo de adenina y guanina, 2-tiouracilo, 2-tiotimina y 2-tiocitosina, 5-halouracilo y citosina, 5-propinilo (-C≡C-CH₃) uracilo y citosina y otros derivados alquilo de bases pirimidínicas, 6-azo uracilo, citosina y timina, 5-uracilo (pseudouracilo), 4-tiouracilo, 8-halo, 8-amino, 8-tiol, 8-tioalquilo, 8-hidroxilo y otras adeninas y guaninas 8-sustituidas, 5-halo particularmente 5-bromo, 5-trifluorometilo y otros uracilos 5-sustituidos y citosinas, 7-metilguanina y 7-metiladenina, 2-F-adenina, 2-amino-adenina, 8-azaguanina y 8-azaadenina, 7-deazaguanina y 7-deazaadenina y 3-deazaguanina y 3-deazaadenina.

30 **[0128]** Restos de bases heterocíclicos también pueden incluir aquellos en los que la base de purina o pirimidina se reemplaza con otros heterociclos, por ejemplo 7-desaza-adenina, 7-desazaguanosina, 2-aminopiridina y 2-piridona. Las nucleobases que son particularmente útiles para aumentar la afinidad de unión de los compuestos antisentido incluyen pirimidinas 5-sustituidas, 6-azapirimidinas y purinas N-2, N-6 y O-6 sustituidas, que incluyen 2 aminopropiladenina, 5-propiniluracilo y 5-propinilcitosina.

35 **[0129]** En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido dirigidos a un ácido nucleico TMRSS6 comprenden una o más nucleobases modificadas. En ciertas realizaciones, los oligonucleótidos antisentido ensanchados dirigidos a un ácido nucleico TMRSS6 que comprenden una o más nucleobases modificadas. En ciertas realizaciones, la nucleobase modificada es 5-metilcitosina. En ciertas realizaciones, cada citosina es una 5-metilcitosina.

Composiciones y métodos para formular composiciones farmacéuticas

40 **[0130]** Los oligonucleótidos antisentido pueden mezclarse con una sustancia activa o inerte farmacéuticamente aceptable para la preparación de composiciones o formulaciones farmacéuticas. Las composiciones y los métodos para la formulación de composiciones farmacéuticas dependen de una serie de criterios, que incluyen, entre otros, la vía de administración, el alcance de la enfermedad o la dosis a administrar.

50 **[0131]** El compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMRSS6 se puede utilizar en composiciones farmacéuticas combinando el compuesto antisentido con un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable adecuado. Un diluyente farmacéuticamente aceptable incluye solución salina tamponada con fosfato (PBS). PBS es un diluyente adecuado para su uso en composiciones que se administrarán por vía parenteral. Por consiguiente, en una realización, se emplea en los métodos descritos en el presente documento una composición farmacéutica que comprende un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMRSS6 y un diluyente farmacéuticamente aceptable. En ciertas realizaciones, el diluyente farmacéuticamente aceptable es PBS. En ciertas realizaciones, el compuesto antisentido es un oligonucleótido antisentido.

55 **[0132]** Las composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos antisentido abarcan cualquier sal, éster o sal farmacéuticamente aceptable de dichos ésteres, o cualquier otro oligonucleótido que, tras la administración a un animal, incluido un humano, sea capaz de proporcionar (directa o indirectamente) el producto biológicamente activo. metabolito o residuo del mismo. Por consiguiente, p. ej., la divulgación también se refiere a sales farmacéuticamente aceptables de compuestos antisentido, profármacos, sales farmacéuticamente aceptables de dichos profármacos y otros bioequivalentes. Las sales farmacéuticamente aceptables adecuadas incluyen, pero no se limitan a, sales de sodio y potasio.

65 **[0133]** Las sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos descritos en la presente memoria pueden prepararse por métodos bien conocidos en la técnica. Para una revisión de las sales farmacéuticamente aceptables, ver Stahl y Wermuth, *Handbook of Pharmaceutical Salts: Properties, Selection and Use* (Wiley-VCH, Weinheim,

Alemania, 2002). Las sales de sodio de los oligonucleótidos antisentido son útiles y están bien aceptadas para la administración terapéutica en humanos. Por consiguiente, en una realización, los compuestos descritos en el presente documento están en forma de una sal de sodio.

- 5 **[0134]** Un profármaco puede incluir la incorporación de nucleósidos adicionales en uno o ambos extremos de un compuesto antisentido que se escinden por nucleasas endógenas dentro del cuerpo, para formar el compuesto antisentido activo.

Dosificación

- 10 **[0135]** En ciertas realizaciones, las composiciones farmacéuticas se administran de acuerdo con un régimen de dosificación (p. ej., dosis, frecuencia de dosis y duración) en donde el régimen de dosificación se puede seleccionar para lograr un efecto deseado. El efecto deseado puede ser, p. ej., la reducción de TMPRSS6 o la prevención, reducción, mejora o disminución de la progresión de una enfermedad, trastorno o afección asociada con TMPRSS6.

- 15 **[0136]** En ciertas realizaciones, las variables del régimen de dosificación se ajustan para dar como resultado una concentración deseada de composición farmacéutica en un sujeto. La "concentración de composición farmacéutica" tal como se usa con respecto al régimen de dosis puede referirse al compuesto, oligonucleótido o ingrediente activo de la composición farmacéutica. Por ejemplo, en ciertas realizaciones, la dosis y la frecuencia de dosis se ajustan para proporcionar una concentración de tejido o concentración de plasma de una composición farmacéutica en una cantidad suficiente para lograr un efecto deseado.

- 20 **[0137]** La dosificación depende de la gravedad y la capacidad de respuesta del estado de la enfermedad a tratar, con una duración del tratamiento de varios días a varios meses, o hasta que se efectúe una cura o se logre una disminución del estado de la enfermedad. La dosificación también depende de la potencia del fármaco y el metabolismo. En ciertas realizaciones, la dosis es de 0,01 µg a 100 mg por kg de peso corporal, o dentro de un rango de dosificación de 0,001 mg a 1000 mg, y se puede administrar una o más veces al día, semanalmente, mensualmente o anualmente, o incluso una vez cada 2 a 20 años. Después de un tratamiento exitoso, puede ser deseable que el paciente se someta a una terapia de mantenimiento para prevenir la recurrencia del estado de la enfermedad, en donde el oligonucleótido se administra en dosis de mantenimiento, que van desde 0,01 µg hasta 100 mg por kg de peso corporal, una vez o más al día, a una vez cada 20 años o con una dosis de 0,001mg a 1000mg.

Administración

- 35 **[0138]** Los compuestos o composiciones farmacéuticas descritas en el presente documento pueden administrarse de varias maneras dependiendo de si se desea un tratamiento local o sistémico y del área a tratar. La administración puede ser oral, inhalada o parenteral.

- 40 **[0139]** En ciertas realizaciones, los compuestos y composiciones como se describen en el presente documento se administran parenteralmente. La administración parenteral incluye inyección o infusión intravenosa, intraarterial, subcutánea, intraperitoneal o intramuscular; o administración intracraneal, p. ej., intratecal o intraventricular.

- 45 **[0140]** En ciertas realizaciones, la administración parenteral es por infusión. La infusión puede ser crónica o continua o corta o intermitente. En ciertas realizaciones, los agentes farmacéuticos infundidos se entregan con una bomba.

- 50 **[0141]** En ciertas realizaciones, la administración parenteral es por inyección. La inyección puede administrarse con una jeringa o una bomba. En ciertas realizaciones, la inyección es una inyección en bolo. En ciertas realizaciones, la inyección se administra directamente a un tejido u órgano.

- 55 **[0142]** En ciertas realizaciones, las formulaciones para administración parenteral, intratecal o intraventricular pueden incluir soluciones acuosas estériles que también pueden contener tampones, diluyentes y otros aditivos adecuados tales como, entre otros, potenciadores de la penetración, compuestos portadores y otros portadores o excipientes farmacéuticamente aceptables.

- 60 **[0143]** En ciertas realizaciones, las formulaciones para administración oral de los compuestos o composiciones pueden incluir, pero no se limitan a, vehículos farmacéuticos, excipientes, polvos o gránulos, micropartículas, nanopartículas, suspensiones o soluciones en agua o medios no acuosos, cápsulas, cápsulas de gel, bolsitas, tabletas o minitables. Pueden ser deseables espesantes, aromatizantes, diluyentes, emulsionantes, dispersantes o aglutinantes. En ciertas realizaciones, las formulaciones orales son aquellas en las que los compuestos descritos en el presente documento se administran junto con uno o más potenciadores de la penetración, tensioactivos y quelantes.

- 65 **[0144]** En ciertas realizaciones, la administración incluye la administración pulmonar. En ciertas realizaciones, la administración pulmonar comprende la administración de oligonucleótidos en aerosol al pulmón de un sujeto por inhalación. Después de la inhalación por un sujeto de oligonucleótido en aerosol, el oligonucleótido se distribuye a las células del tejido pulmonar normal e inflamado, incluidos los macrófagos alveolares, los eosinófilos, el epitelio, el endotelio de los vasos sanguíneos y el epitelio bronquiolar. Un dispositivo adecuado para el suministro de una

composición farmacéutica que comprende un oligonucleótido modificado incluye, pero no se limita a, un dispositivo nebulizador estándar. Los dispositivos adecuados adicionales incluyen inhaladores de polvo seco o inhaladores de dosis medida.

5 **[0145]** En ciertas realizaciones, las composiciones farmacéuticas se administran para lograr exposiciones locales en lugar de sistémicas. Por ejemplo, la administración pulmonar administra una composición farmacéutica al pulmón, con una exposición sistémica mínima.

10 **[0146]** Las rutas de administración adecuadas adicionales incluyen, pero no se limitan a, rectal, transmucosal, intestinal, enteral, tópica, supositorio, intratecal, intraventricular, intraperitoneal, intranasal, intraocular, intramuscular, intramedular e intratumoral.

Compuestos antisentido conjugados

15 **[0147]** En ciertas realizaciones, los compuestos descritos en el presente documento pueden unirse covalentemente a uno o más restos o conjugados que potencian la actividad, la distribución celular o la captación celular de los oligonucleótidos antisentido resultantes. Los grupos conjugados típicos incluyen restos de colesterol y restos de lípidos. Grupos conjugados adicionales incluyen carbohidratos, fosfolípidos, biotina, fenazina, ácido fólico, fenantridina, antraquinona, acridina, fluoresceínas, rodaminas, cumarinas y colorantes.

20 **[0148]** En ciertas realizaciones, los compuestos antisentido también pueden modificarse para tener uno o más grupos estabilizadores que generalmente están unidos a uno o ambos extremos de compuestos antisentido para mejorar propiedades tales como, p. ej., la estabilidad de la nucleasa. Se incluyen en los grupos estabilizadores las estructuras de tapa. Estas modificaciones terminales protegen el compuesto antisentido que tiene ácido nucleico terminal de la degradación de exonucleasa, y pueden ayudar en el suministro y/o localización dentro de una célula. La tapa puede estar presente en el terminal 5' (5' tapa), o en el terminal 3' (3' tapa), o puede estar presente en ambas terminales. Las estructuras de tapa son bien conocidas en la técnica e incluyen, p. ej., tapas invertidas de desoxi abásicas. Otros grupos estabilizadores 3' y 5' que pueden usarse para tapar uno o ambos extremos de un compuesto antisentido para impartir estabilidad nucleasa incluyen los descritos en el documento WO 03/004602 publicado el 16 de enero de 2003.

Cultivo celular y tratamiento de compuestos antisentido

35 **[0149]** Los efectos de los compuestos antisentido sobre el nivel, la actividad o la expresión de los ácidos nucleicos TMPRSS6 se pueden probar in vitro en una variedad de tipos de células. Los tipos de células utilizados para tales análisis están disponibles en proveedores comerciales (p. ej., American Type Culture Collection, Manassas, VA; Zen-Bio, Inc., Research Triangle Park, NC; Clonetics Corporation, Walkersville, MD) y las células se cultivan de acuerdo con las instrucciones del proveedor utilizando reactivos disponibles en el mercado (p. ej., Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA). Los tipos de células ilustrativos incluyen, pero no se limitan a, células HepG2, células Hep3B, células Huh7 (carcinoma hepatocelular), hepatocitos primarios, células A549, fibroblastos GM04281 y células LLCMK2.

Pruebas in vitro de oligonucleótidos antisentido

45 **[0150]** Aquí se describen métodos para el tratamiento de células con oligonucleótidos antisentido, que pueden modificarse apropiadamente para el tratamiento con otros compuestos antisentido.

[0151] En general, las células se tratan con oligonucleótidos antisentido cuando las células alcanzan aproximadamente 60-80% confluencia en el cultivo.

50 **[0152]** Un reactivo comúnmente usado para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye el reactivo de transfección de lípidos catiónicos LIPOFECTIN® (Invitrogen, Carlsbad, CA). Los oligonucleótidos antisentido se mezclan con LIPOFECTIN® en OPTI-MEM® 1 (Invitrogen, Carlsbad, CA) para lograr la concentración final deseada de oligonucleótido antisentido y una concentración de LIPOFECTIN® que típicamente varía de 2 a 12 ug/mL por oligonucleótido antisentido 100 nM.

55 **[0153]** Otro reactivo utilizado para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye LIPOFECTAMINE 2000® (Invitrogen, Carlsbad, CA). El oligonucleótido antisentido se mezcla con LIPOFECTAMINE 2000® en medio sérico reducido OPTI-MEM® 1 (Invitrogen, Carlsbad, CA) para lograr la concentración deseada de oligonucleótido antisentido y una concentración de LIPOFECTAMINE® que generalmente varía de 2 a 12 ug/mL por 100 nM antisentido oligonucleótido

60 **[0154]** Otro reactivo usado para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye Cytofectin® (Invitrogen, Carlsbad, CA). El oligonucleótido antisentido se mezcla con Cytofectin® en medio sérico reducido OPTI-MEM® 1 (Invitrogen, Carlsbad, CA) para lograr la concentración deseada de oligonucleótido antisentido y una concentración de Cytofectin® que generalmente varía de 2 a 12 ug/ml por oligonucleótido antisentido 100 nM.

65

[0155] Otro reactivo usado para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye Oligofectamine™ (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA). El oligonucleótido antisentido se mezcla con Oligofectamine™ en Opti-MEM™ -1 medio sérico reducido (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA) para lograr la concentración deseada de oligonucleótido con una relación Oligofectamine™ a oligonucleótido de aproximadamente 0,2 a 0,8 µL por 100 nM.

[0156] Otro reactivo utilizado para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye FuGENE 6 (Roche Diagnostics Corp., Indianápolis, IN). El compuesto oligomérico antisentido se mezcló con FuGENE 6 en 1 ml de RPMI sin suero para lograr la concentración deseada de oligonucleótido con una relación de FuGENE 6 a compuesto oligomérico de 1 a 4 µL de FuGENE 6 por 100 nM.

[0157] Otra técnica utilizada para introducir oligonucleótidos antisentido en células cultivadas incluye electroporación (Sambrook y Russell en Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Tercera Edición. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York. 2001).

[0158] Las células se tratan con oligonucleótidos antisentido por métodos de rutina. Las células se cosechan típicamente 16-24 horas después del tratamiento con oligonucleótidos antisentido, momento en el cual los niveles de ARN o proteína de los ácidos nucleicos diana se miden por métodos conocidos en la técnica y descritos en este documento (Sambrook y Russell en Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Tercera Edición. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York, 2001). En general, cuando los tratamientos se realizan en múltiples repeticiones, los datos se presentan como el promedio de los tratamientos replicados.

[0159] La concentración de oligonucleótido antisentido utilizada varía de una línea celular a otra. Los métodos para determinar la concentración óptima de oligonucleótidos antisentido para una línea celular particular son bien conocidos en la técnica (Sambrook y Russell en Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Tercera Edición. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, Nueva York. 2001). Los oligonucleótidos antisentido se usan típicamente en concentraciones que varían de 1 nM a 300 nM cuando se transfectan con LIPOFECTAMINE 2000®, Lipofectina o Citofectina. Los oligonucleótidos antisentido se usan en concentraciones más altas que varían de 625 a 20.000 nM cuando se transfectan mediante electroporación.

Aislamiento de ARN

[0160] El análisis de ARN se puede realizar sobre el ARN celular total o poli(A) + ARNm. Los métodos de aislamiento de ARN son bien conocidos en la técnica (Sambrook y Russell, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3ª ed., 2001). El ARN se prepara utilizando métodos bien conocidos en la técnica, p. ej., utilizando el reactivo TRIZOL® (Invitrogen, Carlsbad, CA) de acuerdo con los protocolos recomendados por el fabricante.

Análisis de inhibición de niveles diana o expresión

[0161] La inhibición de niveles o expresión de un ácido nucleico TMPRSS6 se puede analizar de diversas maneras conocidas en la técnica (Sambrook y Russell, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3ª ed., 2001.) P. ej., los niveles de ácido nucleico diana pueden cuantificarse mediante, p. ej., análisis de transferencia Northern, reacción en cadena de polimerasa competitiva (PCR) o PCR cuantitativa en tiempo real. El análisis de ARN se puede realizar en ARN celular total o poli (A) + ARNm. Los métodos de aislamiento de ARN son bien conocidos en la técnica. El análisis de transferencia Northern también es una rutina en la técnica. La PCR cuantitativa en tiempo real puede realizarse convenientemente utilizando el sistema de detección de secuencia ABI PRISM® 7600, 7700 o 7900 disponible en el mercado, disponible en PE-Applied Biosystems, Foster City, CA y utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Análisis cuantitativo de PCR en tiempo real de los niveles de ARN diana

[0162] La cuantificación de los niveles de ARN diana se puede lograr mediante PCR cuantitativa en tiempo real utilizando el sistema de detección de secuencia ABI PRISM® 7600, 7700 o 7900 (PE-Applied Biosystems, Foster City, CA) según las instrucciones del fabricante. Los métodos de PCR cuantitativa en tiempo real son bien conocidos en la técnica.

[0163] Antes de la PCR en tiempo real, el ARN aislado se somete a una reacción de transcriptasa inversa (RT), que produce ADN complementario (ADNc) que es luego se usa como sustrato para la amplificación por PCR en tiempo real. Las reacciones de RT y PCR en tiempo real se realizan secuencialmente en la misma muestra. Los reactivos de RT y PCR en tiempo real se obtienen de Invitrogen (Carlsbad, CA). RT, las reacciones de PCR en tiempo real se llevan a cabo mediante métodos bien conocidos por los expertos en la materia.

[0164] Las cantidades objetivo de genes (o ARN) obtenidas por PCR en tiempo real se normalizan usando el nivel de expresión de un gen cuya expresión es constante, tal como ciclofilina A, o cuantificando ARN total usando RIBOGREEN® (Invitrogen, Inc. Carlsbad, CALIFORNIA). La expresión de ciclofilina A se cuantifica por PCR en tiempo real, ejecutándose simultáneamente con el objetivo, multiplexando o por separado. El ARN total se cuantifica usando el reactivo de cuantificación de ARN RIBOGREEN® (Invitrogen, Inc. Eugene, OR). Los métodos de cuantificación de

ARN por RIBOGREEN® se enseñan en Jones, LJ y col., (Analytical Biochemistry, 1998, 265, 368-374). Se utiliza un instrumento CYTOFLUOR® 4000 (PE Applied Biosystems) para medir la fluorescencia RIBOGREEN®.

- 5 **[0165]** Las sondas y los cebadores están diseñados para hibridarse a un ácido nucleico TMPRSS6. Los métodos para diseñar sondas y cebadores de PCR en tiempo real son bien conocidos en la técnica y pueden incluir el uso de software como PRIMER EXPRESS® (Applied Biosystems, Foster City, CA).

Análisis de los niveles de proteína

- 10 **[0166]** La inhibición antisentido de los ácidos nucleicos TMPRSS6 se puede evaluar midiendo los niveles de proteína TMPRSS6. Los niveles de proteína de TMPRSS6 se pueden evaluar o cuantificar de varias maneras bien conocidas en la técnica, como inmunoprecipitación, análisis de transferencia Western (inmunotransferencia), ensayo de inmunosorción ligada a enzimas (ELISA), ensayos cuantitativos de proteínas, ensayos de actividad proteica (por ejemplo, ensayos de actividad de caspasa), inmunohistoquímica, inmunocitoquímica o clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS) (Sambrook y Russell, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3ª ed., 2001). Los anticuerpos dirigidos a un objetivo pueden identificarse y obtenerse de una variedad de fuentes, como el catálogo de anticuerpos MSRS (Aerie Corporation, Birmingham, MI), o pueden prepararse mediante métodos convencionales de generación de anticuerpos monoclonales o policlonales bien conocidos en la técnica.

Prueba in vivo de compuestos antisentido

- 20 **[0167]** Los compuestos antisentido, p. ej., oligonucleótidos antisentido, se prueban en animales para evaluar su capacidad de inhibir la expresión de TMPRSS6 y producir cambios fenotípicos, tales como la reducción de la acumulación de hierro en el cuerpo. Las pruebas se pueden realizar en animales normales o en modelos experimentales de enfermedades. Las pruebas se pueden realizar en animales normales o en modelos experimentales de enfermedades. Para la administración a animales, los oligonucleótidos antisentido se formulan en un diluyente farmacéuticamente aceptable, tal como solución salina tamponada con fosfato. La administración incluye vías de administración parenteral, como intraperitoneal, intravenosa y subcutánea. El cálculo de la dosificación de oligonucleótidos antisentido y la frecuencia de dosificación dependen de factores tales como la vía de administración y el peso corporal del animal. En una realización, después de un período de tratamiento con oligonucleótidos antisentido, se aísla el ARN del tejido hepático y se miden los cambios en la expresión del ácido nucleico TMPRSS6. Los cambios en los niveles de proteína TMPRSS6 también se pueden medir. Los cambios en la expresión de TMPRSS6 se pueden medir determinando el nivel de expresión de hepcidina, los niveles plasmáticos de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina presente en el animal.

Ciertas indicaciones

- 35 **[0168]** En ciertas realizaciones, se describen en el presente documento métodos para tratar a un individuo que comprende administrar una o más composiciones farmacéuticas como se describe en el presente documento. En ciertas realizaciones, el individuo tiene o está en riesgo de una enfermedad, trastorno o afección por acumulación de hierro. En ciertas realizaciones, el individuo está en riesgo de una enfermedad, trastorno o afección por acumulación de hierro como se describe, anteriormente. En ciertas realizaciones, se describen en el presente documento métodos para reducir profilácticamente la expresión de TMPRSS6 en un individuo. Ciertas realizaciones incluyen tratar a un individuo que lo necesita administrando a un individuo una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6.

- 40 **[0169]** En ciertas realizaciones, la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6 se acompaña de la monitorización de los niveles de TMPRSS6 en un individuo, para determinar la respuesta de un individuo a la administración del compuesto antisentido. En ciertas realizaciones, la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6 se acompaña de la monitorización de los niveles de hepcidina en un individuo. En ciertas realizaciones, la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6 se acompaña de la monitorización de los niveles de hierro en un individuo. En ciertas realizaciones, la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto antisentido dirigido a un ácido nucleico TMPRSS6 se acompaña de la evaluación del porcentaje de saturación de transferrina en un individuo. Un médico utiliza una respuesta individual a la administración del compuesto antisentido para determinar la cantidad y la duración de la intervención terapéutica.

- 50 **[0170]** En ciertas realizaciones, las composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto antisentido dirigido a TMPRSS6 se usan para la preparación de un medicamento para tratar a un paciente que padece o es susceptible a una enfermedad, trastorno o afección por acumulación de hierro.

- 55 **[0171]** En ciertas realizaciones, los métodos descritos en el presente documento incluyen administrar un compuesto que comprende un oligonucleótido modificado que tiene una porción de nucleobase contigua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20 complementarias a un ácido nucleico TMPRSS6.

65

Ciertas terapias de combinación

[0172] En ciertas realizaciones, un primer agente que comprende un oligonucleótido modificado descrito en el presente documento se administra conjuntamente con uno o más agentes secundarios. En ciertas realizaciones, dichos segundos agentes están diseñados para tratar la misma enfermedad, trastorno o afección por acumulación de hierro que el primer agente descrito aquí. En ciertas realizaciones, dichos segundos agentes están diseñados para tratar una enfermedad, trastorno o afección diferente como el primer agente descrito en este documento. En ciertas realizaciones, dichos segundos agentes están diseñados para tratar un efecto secundario no deseado de una o más composiciones farmacéuticas como se describe en el presente documento. En ciertas realizaciones, dichos primeros agentes están diseñados para tratar un efecto secundario no deseado de un segundo agente. En ciertas realizaciones, los segundos agentes se administran conjuntamente con el primer agente para tratar un efecto no deseado del primer agente. En ciertas realizaciones, los segundos agentes se administran conjuntamente con el primer agente para producir un efecto combinacional. En ciertas realizaciones, los segundos agentes se administran conjuntamente con el primer agente para producir un efecto sinérgico. En ciertas realizaciones, la administración conjunta del primer y segundo agente permite el uso de dosis más bajas de las que se requerirían para lograr un efecto terapéutico o profiláctico si los agentes se administraran como terapia independiente.

[0173] En ciertas realizaciones, un primer agente y uno o más segundos agentes se administran al mismo tiempo. En ciertas realizaciones, el primer agente y uno o más segundos agentes se administran en diferentes momentos. En ciertas realizaciones, el primer agente y uno o más segundos agentes se preparan juntos en una sola formulación farmacéutica. En ciertas realizaciones, el primer agente y uno o más segundos agentes se preparan por separado.

[0174] En ciertas realizaciones, los segundos agentes incluyen, pero no se limitan a, compuestos de ácido nucleico. Dichos compuestos de ácido nucleico pueden incluir un ARNip, una ribozima o un compuesto antisentido dirigido a TMPRSS6 u otra diana.

[0175] En ciertas realizaciones, los segundos agentes incluyen, pero no se limitan a, compuestos no antisentido tales como quelantes de hierro, transferrina, proteínas morfogenéticas óseas 6 (BMP6), agonistas de hepcidina, células madre o agentes que generan hemoglobina fetal (HbF). En realizaciones adicionales, los quelantes de hierro se seleccionan de, pero no se limitan a, FBS0701 (FerroKin), Exjade, Desferal y Deferiprone. En ciertas realizaciones, los agentes que aumentan el HbF incluyen 5-hidroxiurea, derivados de ácido graso de cadena corta (SCFA) (p. ej., HQK1001), inhibidores de ADN metiltransferasa (p. ej., decitabina) o inhibidores de histona desacetilasa (HDAC) (p. ej., Zolina, Panobinostat). En ciertas realizaciones, el segundo agente se administra antes de la administración del primer agente. En ciertas realizaciones, el segundo agente se administra después de la administración del primer agente. En ciertas realizaciones, el segundo agente se administra al mismo tiempo que el primer agente. En ciertas realizaciones, la dosis de un segundo agente coadministrado es la misma que la dosis que se administraría si el segundo agente se administrara solo. En ciertas realizaciones, la dosis de un segundo agente coadministrado es menor que la dosis que se administraría si el segundo agente se administrara solo. En ciertas realizaciones, la dosis de un segundo agente coadministrado es mayor que la dosis que se administraría si el segundo agente se administrara solo. En ciertas realizaciones, el primer agente se administra al mismo tiempo que la terapia de flebotomía. En ciertas realizaciones, el primer agente se administra antes de la terapia de flebotomía. En ciertas realizaciones, el primer agente se administra después de la terapia de flebotomía. En ciertas realizaciones, la frecuencia de flebotomía disminuye. En ciertas realizaciones, se reduce el tiempo requerido para la flebotomía.

VENTAJAS DE LA INVENCION

[0176] Aquí se describen, por primera vez, métodos y composiciones para la modulación de TMPRSS6 que pueden tratar, prevenir y/o mejorar una enfermedad de acumulación de hierro. En una realización particular, se describen inhibidores de TMPRSS6 tales como oligonucleótidos antisentido (oligonucleótidos dirigidos a un ácido nucleico que codifica la proteína TMPRSS6) para mejorar un trastorno de acumulación de hierro como hemocromatosis, policitemia o talasemia. La orientación de TMPRSS6 con inhibidores específicos de TMPRSS6 como se describe en el presente documento tiene varios efectos positivos que incluyen, pero no se limitan a: (a) aumentar los niveles de hepcidina, (b) prevenir la absorción excesiva de hierro y la sobrecarga de hierro, (c) aumentar las concentraciones de transferrina en suero, que disminuirá aún más la saturación de transferrina y la formación de hemicromos, (d) almacenará de forma segura el exceso de hierro en los macrófagos y (e) disminuirá la saturación de transferrina, lo que conducirá a una disminución del suministro de hierro para la eritropoyesis.

EJEMPLOS***Descripción no limitante***

[0178] Si bien ciertos compuestos, composiciones y métodos descritos en el presente documento se han descrito con especificidad de acuerdo con ciertas realizaciones, los siguientes ejemplos solo sirven para ilustrar los compuestos descritos aquí y no están destinados a limitar los mismos.

Ejemplo 1: Inhibición antisentido *in vivo* de la serina proteasa transmembrana murina tipo II (TMPRSS6)

[0179] Se diseñaron varios oligonucleótidos antisentido dirigidos al ARNm TMPRSS6 murino (N° de acceso GENBANK NM_027902,2, incorporado aquí como SEQ ID NO: 1). Los sitios de inicio objetivo y las secuencias de cada oligonucleótido se presentan en la Tabla 1. Los oligonucleótidos antisentido quiméricos en la Tabla 1 se diseñaron como separadores de MOE 5-10-5. Los separadores tienen una longitud de 20 nucleósidos, en donde el segmento de separación central está compuesto por diez 2'-desoxinucleósidos y está flanqueado en ambos lados (en las direcciones 5' y 3') por alas que comprenden cinco nucleósidos cada una. Cada nucleósido en el segmento del ala 5' y cada nucleósido en el segmento del ala 3' tiene una modificación 2'-MOE. Los enlaces internucleosídicos en cada gapmer son enlaces de fosforotioato (P = S). Todos los residuos de citosina en cada separador son 5- metilcitosinas.

Tabla 1

Gapmers dirigidos a TMPRSS6 murino			
ISIS N°	Secuencia	Sitio de inicio de destino	SEQ ID NO
537402	AGGCCTTCCGGGTCCACCTC	795	8
537450	TTTCTTTCTACAGAGACCC	2933	9
537451	AGCCTTGATAGAGGCACCTT	3001	10
537452	GCTTAGAGTACAGCCCACTT	3044	11
537480	TCACCAGGCCTTCCGGGTCC	800	12
537524	AGGCATCCTAACCACCAGCT	2789	13

Tratamiento

[0180] Se inyectaron grupos de cuatro ratones C57BL/6 cada uno con 25 mg/kg de ISIS 537402, ISIS 537450, ISIS 537451, ISIS 537452, ISIS 537480 o ISIS 537524 dos veces por semana durante 4 semanas. A un grupo de cuatro ratones se les inyectó 25 mg/kg de oligonucleótido de control, ISIS 141923 (CCTTCCCTGAAGGTTCCCTCC, designado aquí como SEQ ID NO: 14; un separador de MOE 5-10-5 sin diana murina conocida), dos veces por semana durante 4 semanas. Se inyectó un grupo control de ratones con solución salina tamponada con fosfato (PBS) dos veces por semana durante 4 semanas. Los ratones fueron sacrificados dos días después de la dosis final.

Análisis de ARN

[0181] Se extrajo ARN de tejido de hígado para análisis en tiempo real PCR de TMPRSS6, utilizando conjunto de sonda de cebador RTS3481 (ATTCCACGCTGGGCTGTTAT secuencia directa, designada aquí como SEQ ID NO: 15; CTGGTCAGGCCCTTCAA secuencia inversa, designada aquí como SEQ ID NO: 16; secuencia de sonda TGAACCCAGGCCAGGTCCTCCC, designada aquí como SEQ ID NO: 17). El análisis RT-PCR de hepcidina también se realizó, usando el conjunto de sonda de cebador RTS1777 (secuencia directa TGCAGAAGAGAAGGAAGAGAGACA, designada aquí como SEQ ID NO: 18; secuencia inversa CCACTGGGAATTGTTACAGCATT, designada aquí como SEQ ID NO: 19; secuencia de sonda CAACTTCCCCTCTGCATCTTCTGCTQT, designada aquí ID NO: 20). Los niveles de ARNm se normalizaron usando RIBOGREEN®. Como se muestra en la Tabla 2, la mayoría de los oligonucleótidos antisentido lograron la reducción de TMPRSS6 murino sobre el control de PBS. Los resultados se presentan como porcentaje de inhibición de TMPRSS6, en relación con el control. Como se muestra en la Tabla 3, la mayoría de los oligonucleótidos antisentido lograron un aumento en los niveles de hepcidina murina en comparación con el control de PBS. Los resultados se presentan como un cambio porcentual de los niveles de hepcidina, en relación con el control.

Tabla 2

Porcentaje de inhibición de los niveles de ARNm TMPRSS6 murino en ratones C57BL/6	
ISIS NO	% de inhibición de TMPRSS6
537402	65
537450	80
537451	39
537452	86
537480	60
537524	90
141923	0

Tabla 3

Aumento porcentual en los niveles de ARNm de hepcidina murina en ratones C57BL/6	
ISIS NO	% de hepcidina
537402	+28
537450	+113
537451	-7
537452	+201
537480	+13
537524	+181
141923	-38

15 *Efecto sobre los niveles de hierro*

[0182] Los niveles de hierro en suero se midieron usando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Siek, G. et al., Clin. Chem. 48: 161-166, 2002). Los resultados se presentan en la Tabla 4, expresados como µg/dL. Los resultados indican que varios de los oligonucleótidos ISIS redujeron los niveles de hierro.

Tabla 4

Niveles de hierro (µg/dL) en ratones C57BL/6	
	Hierro (µg/dL)
PBS	161
ISIS 537402	148
ISIS 537450	94
ISIS 537451	161
ISIS 537452	82
ISIS 537480	135
ISIS 537524	104
ISIS 141923	144

35 *Pesos corporales y de órganos*

[0183] El efecto de la inhibición antisentido de TMPRSS6 sobre la salud general de los animales, como lo demuestran los cambios en pesos corporales y de órganos, se evaluó. Como se muestra en la Tabla 5, no hubo cambios significativos en los pesos corporales de los ratones tratados con oligonucleótidos antisentido, en comparación con el control de PBS. De manera similar, como se muestra en la Tabla 6, hubo un cambio insignificante en los pesos de los órganos de los ratones tratados con oligonucleótido antisentido, en comparación con el control de PBS.

Tabla 5

Pesos corporales (g) de ratones C57BL/6	
	Peso corporal (g)
PBS	24,6
ISIS 537402	26,1
ISIS 537450	22,7
ISIS 537451	26,0
ISIS 537452	25,2
ISIS 537480	26,4
ISIS 537524	27,2
ISIS 141923	26,8

Tabla 6

Pesos de órganos (g) de ratones C57BL/6			
	Hígado	Riñón	Bazo
PBS	1,4	0,08	0,34
ISIS 537402	1,6	0,09	0,31
ISIS 537450	1,5	0,09	0,33
ISIS 537451	1,6	0,08	0,33
ISIS 537452	1,6	0,09	0,34
ISIS 537480	1,7	0,08	0,34
ISIS 537524	1,6	0,11	0,35
ISIS 141923	1,6	0,09	0,31

15 *Función hepática*

[0184] Para evaluar el efecto de los oligonucleótidos ISIS sobre la función hepática, se midieron las concentraciones plasmáticas de transaminasas utilizando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Nyblom, H. et al., Alcohol & Alcoholism 39: 336-339, 2004; Tietz NW (Ed): Clinical Guide to Laboratory Tests, 3ª ed. WB Saunders, Filadelfia, PA, 1995). Se midieron las concentraciones plasmáticas de ALT (alanina transaminasa) y AST (aspartato transaminasa) y los resultados se presentan en la Tabla 7 expresada en UI/L. Varios de los oligonucleótidos ISIS se consideraron tolerables en los ratones, como lo demuestra su perfil de transaminasas hepáticas.

25

Tabla 7

Niveles ALT y AST (UI/L) de ratones C57BL/6		
	ALT	AST
PBS	40	59
ISIS 537402	42	63
ISIS 537450	49	77
ISIS 537451	54	67
ISIS 537452	38	67
ISIS 537480	35	58
ISIS 537524	219	180
ISIS 141923	60	83

30

35

40 *Función renal*

[0185] Para evaluar el efecto de los oligonucleótidos ISIS sobre la función renal, se midieron las concentraciones plasmáticas de BUN utilizando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Nyblom, H. et al., Alcohol & Alcoholism 39: 336-339, 2004; Tietz NW (Ed): Clinical Guide to Laboratory Tests, 3ª ed. WB Saunders, Filadelfia, PA, 1995). Los resultados se presentan en la Tabla 8 expresada en mg/dL. Varios de los oligonucleótidos ISIS se consideraron tolerables en los ratones, como lo demuestra su perfil de BUN en plasma.

45

Tabla 8

Niveles de BUN (mg/dL) de ratones C57BL/6	
	BUN
PBS	41
ISIS 537402	43
ISIS 537450	42
ISIS 537451	47
ISIS 537452	37
ISIS 537480	34
ISIS 537524	40
ISIS 141923	35

50

55

60

Ejemplo 2: Efecto de la inhibición antisentido dependiente de la dosis de Tmprss6 murino

[0186] El efecto del tratamiento con varias concentraciones de dosis de ISIS 537450 e ISIS 537452 se evaluó en ratones C57BL/6 de tipo silvestre.

65

Tratamiento

[0187] Se inyectaron grupos de tres de cuatro ratones C57BL/6, cada uno con 25 mg/kg, 50 mg/kg, o 100 mg/kg de ISIS 537450, la semana durante 4 semanas. Se inyectaron tres grupos de cuatro ratones C57BL/6 cada uno con 25 mg/kg, 50 mg/kg o 100 mg/kg de ISIS 537452, semanalmente durante 4 semanas. Se inyectó a un grupo de 4 ratones cada uno con 50 mg/kg de oligonucleótido de control, ISIS 141923 (SEQ ID NO: 14), semanalmente durante 4 semanas. Se inyectó a un grupo de ratones control con solución salina tamponada con fosfato (PBS) administrada semanalmente durante 4 semanas. Los ratones fueron sacrificados dos días después de la dosis final.

ARN Análisis

[0188] Se extrajo ARN de tejido de hígado para análisis en tiempo real PCR de TMPRSS6, utilizando conjunto de sonda de cebador RTS3481. El análisis RT-PCR de hepcidina también se realizó, usando el conjunto de sonda de cebador RTS1777. Los niveles de ARNm se normalizaron usando RIBOGREEN®. Como se muestra en la Tabla 9, los oligonucleótidos antisentido lograron una reducción dependiente de la dosis de TMPRSS6 murino sobre el control de PBS. Los resultados se presentan como porcentaje de inhibición de TMPRSS6, en relación con el control. Como se muestra en la Tabla 10, los oligonucleótidos antisentido lograron un aumento dependiente de la dosis de los niveles de hepcidina murina en comparación con el control PBS. Los resultados se presentan como un porcentaje de aumento de hepcidina, en relación con el control.

Tabla 9

Porcentaje de inhibición de los niveles de ARNm TMPRSS6 murino en ratones C57BL/6		
	Dosis (mg/kg/semana)	% de inhibición
ISIS 537450	25	45
	50	76
	100	90
ISIS 537452	25	56
	50	50
	100	100
ISIS 141923	100	27

Tabla 10

Aumento porcentual en los niveles de ARNm de hepcidina murina en ratones C57BL/6		
Dosis (mg/kg/semana)	% de aumento	
ISIS 537450	25	28
	50	110
	100	372
ISIS 537452	25	55
	50	268
	100	349
ISIS 141923	100	109

Efecto sobre los niveles de hierro

[0189] La capacidad de unión al hierro insaturado (UIBC) se usa frecuentemente junto con una prueba de hierro en suero para evaluar la sobrecarga de hierro en pacientes con hemocromatosis (Yamanishi, H. et al., Clin. Chem. 49: 175-178, 2003). Estas dos pruebas se utilizan para calcular la saturación de transferrina, un indicador más útil del estado del hierro que solo el hierro o el UIBC solo (Adams, PC et al., N Engl. J. Med. 352: 1769-1778, 2005). Los niveles de hierro y la capacidad de unión de hierro insaturado de las moléculas de transferrina se midieron usando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Siek, G. et al., Clin. Chem. 48: 161-166, 2002). Los resultados para niveles de hierro, niveles de transferrina y porcentaje de saturación de transferrina se presentan en las Tablas 11 y 12, e indican que el tratamiento con oligonucleótidos ISIS redujo los niveles de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina y aumentó los niveles de transferrina.

Tabla 11

Niveles de hierro de ratones C57BL/6		
	Dosis (mg/kg/semana)	Hierro ($\mu\text{g/dL}$)
PBS	-	109
ISIS 537450	25	102
	50	56
	100	38
ISIS 537452	25	93
	50	53
	100	44
ISIS 141923	100	87

Tabla 12

Porcentaje de saturación de transferrina y niveles de transferrina en ratones C57BL/6			
	Dosis (mg/kg/semana)	Saturación de transferrina (%)	Transferrina (ng/ml)
PBS	-	35	122
ISIS 537450	25	28	136
	50	14	151
	100	9	159
ISIS 537452	25	25	142
	50	11	164
	100	8	183
ISIS 141923	100	23	144

Función hepática

[0190] Para evaluar el efecto de los oligonucleótidos ISIS sobre la función hepática, se midieron las concentraciones plasmáticas de transaminasas usando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Nyblom, H. et al., Alcohol & Alcoholism 39: 336-339, 2004; Tietz NW (Ed): Clinical Guide to Laboratory Tests, 3ª ed. WB Saunders, Filadelfia, PA, 1995). Se midieron las concentraciones plasmáticas de ALT (alanina transaminasa) y AST (aspartato transaminasa) y los resultados se presentan en la Tabla 13 expresada en UI/L. Los oligonucleótidos ISIS dirigidos a TMPRSS6 se consideraron tolerables en los ratones, como lo demuestra su perfil de transaminasas hepáticas.

Tabla 13

Niveles ALT y AST (UI/L) de ratones C57BL/6			
	Dosis (mg/kg/semana)	ALT	AST
PBS	-	45	79
ISIS 537450	25	50	95
	50	22	62
	100	24	66
ISIS 537452	25	17	38
	50	54	60
	100	38	76
ISIS 141923	100	112	172

Función renal

[0191] Para evaluar el efecto de los oligonucleótidos ISIS sobre la función renal, se midieron las concentraciones plasmáticas de BUN usando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Nyblom, H. et al., Alcohol & Alcoholism 39: 336-339, 2004; Tietz NW (Ed): Clinical Guide to Laboratory Tests, 3ª ed. WB Saunders, Filadelfia, Pensilvania, 1995). Los resultados se presentan en la Tabla 14 expresada en mg/dL. Los objetivos de oligonucleótidos ISIS se consideraron tolerables en los ratones, como lo demuestra su perfil de BUN en plasma.

Tabla 14

Niveles de BUN (mg/dL) de ratones C57BL/6		
	Dosis (mg/kg/semana)	BUN
PBS	-	36
ISIS 537450	25	32
	50	33
	100	32
ISIS 537452	25	32
	50	32
	100	35
ISIS 141923	100	32

Ejemplo 3: Efecto de la inhibición antisentido de TMPRSS6 murino en ratones inactivados con HFE

[0192] El efecto del tratamiento de oligonucleótido antisentido dirigido a TMPRSS6 murino se evaluó en ratones HFE^{-/-}. Los ratones HFE^{-/-} tienen profundas diferencias en los parámetros de la homeostasis del hierro en comparación con los compañeros de camada de tipo silvestre. La saturación de transferrina en ayunas es significativamente elevada y las concentraciones de hierro hepático son significativamente más altas que los ratones de control. Por lo tanto, los ratones inactivados con HFE se consideran un modelo estándar de hemocromatosis hereditaria (Zhou, XY y col., Proc. Natl. Acad. Sci. 1998. 95: 2492-2497).

[0193] ISIS 537450 (TTTCTTTCTACAGAGACCC; SEQ ID NO: 9) es un gapmer 5'-10-5 MOE, 20 nucleósidos de longitud, en donde el segmento gap central está compuesto por diez 2'-desoxinucleósidos y está flanqueado en ambos lados (en las direcciones 5' y 3') por alas que comprenden cinco nucleósidos cada una. Cada nucleósido en el segmento del ala 5' y cada nucleósido en el segmento del ala 3' tiene una modificación 2'-MOE. Los enlaces internucleosídicos en todo el gapmer son enlaces de fosforotioato (P = S). Todos los residuos de citosina en todo el gapmer son 5-metilcitosinas. ISIS 537450 se dirige a ARNm TMPRSS6 murino (Nº de acceso GENBANK NM_027902.2, incorporado aquí como SEQ ID NO: 1) con un sitio de inicio diana de 2933.

[0194] Se evaluó el efecto del tratamiento de los ratones con ISIS 537450 en los niveles TMPRSS6 ARNm y hierro.

Tratamiento

[0195] Un grupo de 12 ratones HFE⁺ macho y hembra fueron inyectados con 100 mg/kg de ISIS 537450 semanal durante 6 semanas. Un grupo de control de 11 ratones HFE^{-/-} machos y hembras se inyectó con PBS semanalmente durante 6 semanas. Los ratones recibieron comida normal durante el período de estudio. Los ratones fueron sacrificados 2 días después de la dosis final de oligonucleótido antisentido o PBS.

Análisis de ARN

[0196] Se extrajo ARN de tejido de hígado para análisis en tiempo real PCR de TMPRSS6, utilizando un conjunto de sonda de cebador RTS3481 (ATTCCACGCTGGGCTGTTAT secuencia directa, designada aquí como SEQ ID NO: 15; CTGGTCAGGCCCTTCAA secuencia inversa, designada aquí como SEQ ID NO: 16; secuencia de sonda TGAACCCAGGCCAGGTCCTCCC, designada aquí como SEQ ID NO: 17). El análisis RT-PCR de hepcidina también se realizó, usando el conjunto de sonda de cebador RTS1777 (secuencia directa TGCAGAAGAGAAGGAAGAGAGACA, designada aquí como SEQ ID NO: 18; secuencia inversa CACACTGGGAATTGTTACAGCATT, designada aquí como SEQ ID NO: 19; secuencia de sonda CAACTTCCCCATCTGCATCTTCTGCTQT, designada aquí ID NO: 20). Los niveles de ARNm se normalizaron usando RIBOGREEN®. El tratamiento con ISIS 537450 logró una reducción del 88% de TMPRSS6 murino sobre el control de PBS. El tratamiento con ISIS 537450 también logró un aumento del 152% de los niveles de hepcidina murina en comparación con el control de PBS.

Efecto sobre los niveles de hierro

[0197] Los niveles de hierro se midieron usando un analizador químico clínico automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Siek, G. et al., Clin. Chem. 48: 161-166, 2002). Los resultados para los niveles de transferrina, los niveles de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina se presentan en la Tabla 15, e indican que el tratamiento con oligonucleótidos ISIS aumentó los niveles de transferrina y redujo los niveles de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina. En comparación, los niveles de hierro en ratones de tipo silvestre no tratados (C57BL/6) mostrados anteriormente son generalmente de aproximadamente 110 µg/dL, los niveles de transferrina son de aproximadamente 122 ng/ml y la saturación de transferrina es de aproximadamente el 35%. Por lo tanto, la inhibición antisentido de

TMPRSS6 en este modelo resultó en una mejora de los niveles de hierro, niveles de transferrina y niveles de saturación de transferrina cercanos a los encontrados en ratones de tipo silvestre.

[0198] Los niveles de hierro en el hígado y el bazo fueron medidos por Exova (Santa Fe Springs, CA). Los datos se presentan en la Tabla 16. Los resultados indican que la inhibición antisentido de TMPRSS6 produjo una disminución en la acumulación hepática de hierro y un aumento en la retención de hierro en los macrófagos de los ratones HFE^{-/-}. La reducción de hierro del tejido hepático y la absorción simultánea de hierro sérico no unido por los macrófagos indican que la inhibición antisentido de TMPRSS6 en este modelo da como resultado la mejora de la sobrecarga de hierro en los tejidos (Nemeth, E. et al., Science. 2004. 306: 2090-3).

Tabla 15

Niveles séricos de hierro, saturación de transferrina y niveles de transferrina en ratones HFE ^{-/-}			
	Suero de hierro (µg/dL)	Saturación de transferrina (%)	Transferrina (ng/ml)
PBS	318	93	132
ISIS 537450	142	26	183

Tabla 16

Niveles de hierro en hígado y macrófagos de ratones HFE ^{-/-} (µg/g de tejido)		
	Hígado	Macrófagos
PBS	388	468
ISIS 537450	256	683

Ejemplo 4: Efecto de la inhibición antisentido de TMPRSS6 murino en ratones th3/+

[0199] El modelo de ratones th3/+, un modelo de β-talasemia, alberga una delección heterocigótica de genes β_{menor} y β_{mayor} (Yang, B. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 1995. 92: 11608-12; Ciavetta, DJ et al., Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 1995. 92: 9259-63) y exhibe características comparables a las de pacientes afectados por β-talasemia intermedia (TI). El efecto del tratamiento con un oligonucleótido antisentido dirigido a TMPRSS6 murino se evaluó en ratones th3/+.

[0200] ISIS 537452 (GCTTAGAGTACAGCCCACTT; SEQ ID NO: 11) es un gapmer 5-10-5 MOE, 20 nucleósidos de longitud, en donde el segmento de hueco central está compuesto por diez 2'-desoxinucleósidos y está flanqueado en ambos lados (en las direcciones 5' y 3') por alas que comprenden cinco nucleósidos cada una. Cada nucleósido en el segmento del ala 5' y cada nucleósido en el segmento del ala 3' tiene una modificación 2'-MOE. Los enlaces internucleosídicos en todo el gapmer son enlaces de fosforotioato (P = S). Todos los residuos de citosina en todo el gapmer son 5-metilcitosinas. ISIS 537452 se dirige a ARNm TMPRSS6 murino (Nº de acceso GENBANK NM_027902.2, incorporado aquí como SEQ ID NO: 1) con un sitio de inicio diana de 3044.

[0201] Se evaluó el efecto del tratamiento de los ratones con ISIS 537452 en varios parámetros en los ratones.

Tratamiento

[0202] Un grupo de igual número de ratones th3/+ machos y hembras, de 10-15 semanas de edad, se inyectó con 100 mg/kg de ISIS 537452 semanalmente durante 6 semanas. Un grupo de control de ratones th3/+ machos y hembras se inyectó con PBS semanalmente durante 6 semanas. Los ratones recibieron comida normal durante el período de estudio. Los ratones fueron sacrificados 2 días después de la dosis final de oligonucleótido antisentido o PBS. Los grupos de hombres y mujeres se evaluaron por separado.

Análisis ARN

[0203] Se extrajo ARN de tejido de hígado para análisis en tiempo real PCR de TMPRSS6, utilizando el conjunto de sonda de cebador RTS3481. También se realizó un análisis por RT-PCR de hepcidina, usando el conjunto de sonda de cebador RTS1777. Los niveles de ARNm se normalizaron usando RIBOGREEN®. Los datos se presentan en la Tabla 17. Los resultados indican que ISIS 537452 redujo significativamente los niveles de TMPRSS6 en el hígado. La inhibición antisentido de los niveles de TMPRSS6 se asoció con un aumento modesto en la expresión absoluta de hepcidina en los ratones th3/+. Sin embargo, cuando la expresión de hepcidina se normalizó por la concentración de hierro en el hígado, la diferencia entre los ratones de hielo th3/+ no tratados y tratados fue significativa, lo que corresponde a un aumento de 3,4 veces en los machos y un aumento de 2,0 veces en las hembras. Los niveles de TMPRSS6 y hepcidina se expresan como un porcentaje del grupo de control PBS masculino.

Tabla 17

% de cambio en ratones th3/+		
	TMPRSS6	Hepcidina
PBS-Hembra	+4	+34
ISIS 537452-Hembra	-85	+64
ISIS 537452-Macho	-85	+67

5

10 *Análisis del suero*

[0204] Niveles de hierro y transferrina se midieron usando un analizador de química clínica automatizado (Hitachi Olympus AU400e, Melville, NY) (Siek, G. et al, Clin Chem 2002 48: 161-166). Se calculó la saturación de transferrina. Los datos se presentan en la Tabla 18 e indican que el tratamiento con oligonucleótidos ISIS redujo los niveles de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina.

15

[0205] Niveles de bilirrubina total se midieron también por el mismo analizador de química clínica. Los datos también se presentan en la Tabla 18. Los resultados indican que la inhibición antisentido de TMPRSS6 resultó en una disminución en los niveles totales de Bilirrubina de los ratones. Además, la mayoría de la bilirrubina era bilirrubina indirecta (datos no mostrados) en los ratones th3/+, lo que indica que la inhibición antisentido disminuyó la hemólisis.

20

Tabla 18

Parámetros séricos en ratones th3/+					
		Niveles de hierro (µg/dL)	Transferrina (ng/ml)	Saturación de transferrina (%)	Bilirrubina total (mg/dL)
Masculino	PBS	199	138	63	0,32
	ISIS 537452	134	172	26	0,16
Hembra	PBS	179	135	55	0,30
	ISIS 537452	111	164	20	0,15

25

30

35

Análisis de órganos

[0206] Los niveles de hierro en el bazo y el hígado fueron medidos por el Centro de Diagnóstico para la Población y la Salud Animal (DCPAH) (Michigan State University, Lansing, MI). Los datos se presentan en las Tablas 19 y 20. Los resultados indican que el tratamiento con oligonucleótidos ISIS redujo la concentración de hierro en el hígado. La medición del peso del bazo indicó que la inhibición antisentido de TMPRSS6 también redujo el peso del bazo en comparación con los grupos de control. El peso del bazo se expresa como un porcentaje del peso medido en un grupo de ratones al comienzo del experimento. La tinción con azul de Prusia de Pearl indicó que el hierro en el bazo se localizó predominantemente en macrófagos (datos no mostrados) como se esperaba por el aumento de la expresión de hepcidina. La reducción de hierro del tejido hepático y la absorción simultánea de hierro sérico no unido por los macrófagos indican que la inhibición antisentido de TMPRSS6 en este modelo da como resultado la mejora de la sobrecarga de hierro en los tejidos (Nemeth, E. et al., Science. 2004. 306: 2090-3).

40

45

[0207] Por lo tanto, la inhibición de antisentido TMPRSS6 reduce la acumulación hepática de hierro y esplenomegalia asociada con este modelo de ratón (Pippard, MJ et al, Lancet 1979. 2: 819-21; Yang, B. et al, Proc Natl Acad. Sci. EE.UU. 1995. 92: 11608-12).

50

Tabla 19

Análisis de la concentración de hierro en el hígado en ratones th3/+		
		Conc. de hierro en hígado (µg/dL)
Masculino	PBS	605
	ISIS 537452	315
Hembra	PBS	1321
	ISIS 537452	816

55

60

65

Tabla 20

Análisis del peso del bazo en ratones th3/+		
		Peso relativo del bazo (%)
Masculino	PBS	1,1
	ISIS 537452	0,1
Hembra	PBS	1,6
	ISIS 537452	0,1

Análisis hematológico

[0208] El recuento de glóbulos rojos (RBC), recuento de reticulocitos, hemoglobina (HGB) y hematocrito (HCT) se midieron en el día 42 usando un Analizador de hematología ADVIA120 (Bayer, EE.UU.). Los datos se presentan en la Tabla 21 e indican que el tratamiento con oligonucleótidos ISIS aumentó el recuento de glóbulos rojos, los niveles de HGB y HCT, y disminuyó el recuento de reticulocitos (es decir, el número de reticulocitos como porcentaje del número de glóbulos rojos). El aumento de glóbulos rojos y la disminución del recuento de reticulocitos indica que el tratamiento antisentido mejoró la producción de glóbulos rojos.

[0209] Además, los ratones tratados con th3/+ exhibieron valores más bajos de MCHy MCV, lo que sugiere, como se observó anteriormente (Gardenghi et al., J Clin Invest, 2010, 120: 4466-4477), que niveles más bajos de saturación de transferrina se asociaron con una ingesta de hierro disminuida y formación de hemicromos.

[0210] Los resultados indican que la inhibición antisentido de TMPRSS6 mejoró el fenotipo anémico en este modelo.

Tabla 21

Análisis del fenotipo anémico en ratones th3/+					
		RBC ($\times 10^6$ células/ μ L)	Reticulocitos ($\times 10^5$ células/ μ L)	HGB (g/dL)	HCT (g/dL)
Masculino	Día 0	8,3	1404	7,6	28,6
	Día 42	11,1	472	9,2	34,5
Hembra	Día 0	8,5	1818	7,8	30,5
	Día 42	11,3	1029	10,0	36,5

LISTADO DE SECUENCIAS

[0211]

- 5 <110> Isis Pharmaceuticals, Inc.
Shuling Guo
- <120> MODULACIÓN DE EXPRESIÓN DE TMPRSS6
- 10 <130> BIOL0162WO
- <150> 61/556,755
- <151> 2011-11-07
- 15 <150> 61/710,636
- <151> 2012-10-05
- <160> 20
- 20 <170> FastSEQ para Windows Versión 4.0
- <210> 1
- <211> 3206
- <212> ADN
- 25 <213> Mus musculus
- <400> 1

```

30      agtttcattg  tgcacctgga  cctgacagga  gaggcccatg  gaacttgggg  ccacaggcca  60
      caagggacaa  gggccagaca  ccccagccat  ggctccaggc  cattgatcca  acctaagctg  120
      gccagttggg  ggtggaaaga  ccttggcctg  gataaacaga  ggctccagg  cctgtgtgca  180
      ggcccggcac  ctacctcca  ctcttgaaga  tgccgagatg  tttccagctc  ccctgttcta  240
      ccaggatgcc  caccaccgag  gtccccaag  cggctgatgg  tcagggcgat  gcgggtgatg  300
      gagaggaagc  tgctgagcca  gaggggaagt  tcaagcccc  aaaaaacacc  aagagaaaa  360
35      accgggacta  cgtccgcttc  acgccactgt  tgctggtcct  ggctgcgctg  gtctcagcag  420
      gggatcatgct  ttggtatttc  ctagggtaca  aagcggaaat  gaccgtaagc  caggtgtact  480
      ctggcagcct  ccgggtgctc  aaccgtcatt  tctcccagga  cctgggccga  cgggagtcta  540
      ttgctttccg  cagtgaatct  gccaaagccc  agaagatgct  ccaagaactg  gttgccagca  600
      cccgcctggg  tacttactac  aactctagt  ctgtctactc  ctttggggag  ggaccctca  660
40      cctgcttctt  ctggtttatc  cttgacatcc  ctgagtacca  gcgactgacc  ctgagccctg  720
      aagtagtgcg  cgagctcctg  gtggatgagc  tactgtccaa  cagctcaacc  ctggcttct  780
      ataagaccga  atatgaggtg  gaccgggaag  gcctggtgat  cctggaagcc  agtgtgaacg  840
      acatagtcgt  actgaattcc  acgctgggct  gttatcgcta  cagctatgtg  aaccaggcc  900
45      aggtcctccc  attgaagggg  cctgaccagc  agaccacaag  ctgcctgtgg  catctgcaag  960
      ggcccgaaga  cctcatgatc  aaagtgcggc  tggagtggac  ccgggtcgat  tgcaagagca  1020
      gggatggcgat  gtacgacgca  gctgggccc  tggagaagag  acttatcacc  tcggtctatg  1080
      ggtgcagccg  ccaggaacct  gtgatggagg  tgctggcatc  gggctccgtc  atggccgtgg  1140
      tgtggaaaaa  gggcatgcat  agctactatg  accctttcct  gctctcagtg  aagtctgtgg  1200
50      ccttccagga  ctgccaggtg  aacctgacac  tggagggccg  gctggacaca  caggccttcc  1260
      tcogtacacc  ctactacccc  agttactact  ctcccagtac  cactgctcc  tggcatctca  1320
      cggtagcctc  tctggactac  ggcttggcgc  tctggttcga  tgcctacgca  ctgaggaggc  1380
      agaagtacaa  ccgactgtgt  actcagggcc  agtggatgat  ccagaacagg  aggctgtgtg  1440
      gcttccgtac  cctgcagcca  tatgctgaga  ggatccccat  ggtggcctca  gatggtgtca  1500
55      ccatcaactt  cacctcccag  atctccctca  caggcccggg  tgtgcaagtg  tactacagct  1560
      tgtacaacca  atcagacccc  tgccctggtg  agttcctctg  ctctgtgaat  ggactgtgtg  1620
      tcctgcgctg  tgacgggatc  aaggactgcc  ccaatggcct  ggatgagaga  aactgtgtct  1680
      gcagagccat  gttccagtg  caagaggaca  gcacgtgcat  ttcactgcct  agagtctgtg  1740
60      accggcagcc  cgactgtctc  aatggcagtg  acgaagaaca  gtccaagaa  ggagtgcct  1800
      gtgggacatt  cactttccag  tgtgaggacc  ggagctgtgt  gaagaagccc  aaccagagt  1860
      gtgacggcca  gtcagattgc  agagacggct  cagatgagca  aactgtgac  tgtggcctcc  1920
      agggcctctc  ccagcgtatt  gtgggcggga  ccgtgtcctc  cgagggtagc  tggccatggc  1980
      agggcctcct  cagattcgg  ggtcgacaca  tctgtggggg  ggctctcatc  gctgaccgct  2040
65      gggtcataac  ggccgcccac  tgcttccagg  aggacagcat  ggcctccccg  aagctgtgga  2100
      ccgtgttctt  gggaaagatg  cggcagaact  cgcgctggcc  aggcgaggtg  tccttcaagg  2160

```

ES 2 761 343 T3

	tgagccgtct	gttcctgcac	ccgtaccacg	aggaggacag	ccatgactac	gacgtggccc	2220
	tgctgcagct	cgaccacccc	gtggtgtact	cggccactgt	gcgccccgtc	tgccctgcctg	2280
	cccgtccca	cttctttgag	ccaggccagc	actgctggat	cacaggctgg	ggagcccagc	2340
5	gagaggggtg	tccggtgagc	aacaccctgc	agaaggtgga	cgtacagctg	gtccctcagg	2400
	acctctgcag	tgaggcctac	cgctaccagg	tgtccccacg	catgctctgt	gctggctacc	2460
	gcaagggcaa	gaaagatgcc	tgccagggtg	actctggagg	cccactgggt	tgccagggagc	2520
	ccagtggccg	ctggttcctg	gcagggttgg	ttagctgggg	cctgggctgt	ggccgaccca	2580
	atttctttgg	cgtctacacc	cgtgtcacac	gtgtgatcaa	ctggatccag	caggtgctga	2640
10	cctgagggct	gttctacaga	gctggacctg	cctccaggcc	aagttcaggg	tgtccaccca	2700
	gccaggacac	aagtattctg	gggcaagtga	ccctgctaag	gcctgtttcc	ctcaggccta	2760
	ccccagtgac	agtacagaga	aggatgtcag	ctggtgggta	ggatgcctcc	tgaggtccag	2820
	ggccagcct	cggctagggt	tcacttctaa	ccctttctta	ttctagtctt	ttcccctccc	2880
	tgctcctacc	actgttttgg	agtggggctt	ggcggccatg	accttggcct	ccgggtctct	2940
15	gtaggaaaga	aagaatcctt	ccccttgcaa	aagcctcttg	ggggaactgc	acagagaaag	3000
	aaggtgcctc	tatcaaggct	ctatcagagc	ccttgagtct	gccaagtggg	ctgtactcta	3060
	agccaaatca	ccgggcagcc	tcagctgcag	atgcctgctg	aagctctgcc	tgctacaggg	3120
	gcctccctgc	cattcactgg	aggcccactg	tctgttctgg	gaataaagca	cttgaccaag	3180
20	ccctgacact	gaaaaaaaaa	aaaaaa				3206

<210> 2
 <211> 3212
 <212> ADN
 <213> Homo sapiens

25 <400> 2

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 761 343 T3

	cttgagccag	accagtcca	gctctggtgc	ctgccctctg	gtgagagctg	acctgagatg	60
	cacttccctc	ctctgtgagc	tgtctcggca	cccacttgca	gtcactgccc	cctgatggtg	120
	ttactcttcc	actccaaaag	gatgcccgtg	gccagggccc	cccaggtggc	tgccggggcag	180
5	ggggacggag	gtgatggcga	ggaagcggag	ccggagggga	tgttcaaggc	ctgtgaggac	240
	tccaagagaa	aagcccgggg	ctacctccgc	ctgggtcccc	tgtttgtgct	gctggccctg	300
	ctcgtgctgg	cttcggcggg	ggtgctactc	tggtatttcc	tagggataca	ggcggaggtg	360
	atgggtcagcc	aggtgtactc	aggcagtctg	cgtgtactca	atcgccactt	ctcccaggat	420
	cttaccggcc	gggaatctag	tgccttccgc	agtgaaccg	ccaaagccca	gaagatgctc	480
10	aaggagctca	tcaccagcac	ccgcctggga	acttactaca	actccagctc	cgtctattcc	540
	tttggggagg	gaccctcac	ctgcttcttc	tggttcattc	tccaaatccc	cgagcaccgc	600
	cggtgatgct	tgagccccga	ggtggtgagc	gactgctgg	tgaggagctg	gctgtccaca	660
	gtcaacagct	cggctgccgt	cccctacag	gccgagtacg	aagtggacct	cgagggcta	720
	gtgatcctgg	aagccaagtgt	gaaagacata	gctgcattga	attccacgct	gggtgtttac	780
15	cgctacagct	acgtgggcca	gggccaggtc	ctccggctga	aggggcctga	ccacctggcc	840
	tccagctgcc	tgtggcacct	gcagggcccc	aaggacctca	tgctcaaact	ccggctggag	900
	tggaagctgg	cagagtgccg	ggaccgactg	gccatgtatg	acgtggccgg	gcccctggag	960
	aagaggctca	tcacctcggc	gtacggctgc	agccgccagg	agcccgtggc	ggagggttctg	1020
	gcgtcggggg	ccatcatggc	ggtcgtctgg	aagaagggcc	tgcacagcta	ctacgacccc	1080
20	ttcgtgctct	ccgtgcagcc	ggtggtcttc	caggcctgtg	aagtgaacct	gacgctggac	1140
	aacaggctcg	actcccaggg	cgtcctcagc	accccgtact	tccccagcta	ctactcgccc	1200
	caaaccact	gctcctggca	cctcacgggtg	ccctctctgg	actacggctt	ggccctctgg	1260
	tttgatgcct	atgcaactgag	gaggcagaag	tatgatttgc	cgtgcaccca	gggccaagtgg	1320
25	acgatccaga	acaggaggct	gtgtggcttg	cgatcctgc	agccctacgc	cgagggatc	1380
	cccgtggtgg	ccacggccgg	gatccaccatc	aacttcacct	cccagatctc	cctcaccggg	1440
	cccgtggtgc	gggtgcaacta	tggcttgtac	aaccagtcgg	acccctgcc	tggagagttc	1500
	ctctgttctg	tgaatggact	ctgtgtccct	gcctgtgatg	gggtcaagga	ctgccccaac	1560
	ggcctggatg	agagaaactg	cgtttgca	gccacattcc	agtgcaaaga	ggacagcaca	1620
30	tgcatctcac	tgcccaaggt	ctgtgatggg	cagcctgatt	gtctcaacgg	cagcgacgaa	1680
	gagcagtgcc	aggaaggggt	gccatgtggg	acattcacct	tccagtgtga	ggaccggagc	1740
	tgcgtgaaga	agcccaaccc	gcagtgtgat	ggcggcccg	actgcaggga	cggtcggat	1800
	gaggagcact	gtgactgtgg	cctccagggc	ccctccagcc	gcattgttgg	tggagctgtg	1860
35	tcctccgagg	gtgagtggcc	atggcaggcc	agcctccagg	ttcggggctg	acacatctgt	1920
	ggggggggccc	tcacgctga	ccgctgggtg	ataacagctg	cccactgctt	ccaggaggac	1980
	agcatggcct	ccacggtgct	gtggaccgtg	ttcctgggca	aggtgtggca	gaactcgccg	2040
	tgccctggag	aggtgtcctt	caaggtgagc	cgctgctcc	tgaccccgta	ccacgaagag	2100
	gacagccact	actacgacgt	ggcgtgctg	cagctcgacc	acccgggtgt	gcctcggcc	2160
40	gccgtgcgcc	ccgtctgcct	gcccgcgcgc	tcccacttct	tcgagcccgg	cctgcactgc	2220
	tggattacgg	gctggggcgc	cttgcgcgag	ggcggcccca	tcagcaacgc	tctgcagaaa	2280
45	gtggatgtgc	agttgatccc	acaggacctg	tgcagcgagg	tctatcgcta	ccaggtgacg	2340
	ccacgcatgc	tgtgtgcccg	ctaccgcaag	ggcaagaagg	atgcctgtca	gggtgactca	2400
	ggtggtccgc	tggtgtgcaa	ggcactcagt	ggccgctggt	tcctggcggg	gctggtcagc	2460
	tggggcctgg	gctgtggccg	gcctaactac	ttcggcgtct	acaccgcat	cacagggtgtg	2520
	atcagctgga	tccagcaagt	ggtgacctga	ggaactgcc	ccctgcaaag	cagggcccac	2580
50	ctcctggact	cagagagccc	agggcaactg	ccaagcaggg	ggacaagtat	tctggcgggg	2640
	ggtgggggag	agagcaggcc	ctgtggtggc	aggaggtggc	atcttgtctc	gtccctgatg	2700
	tctgctccag	tgatggcagg	aggatggaga	agtgccagca	gctgggggtc	aagacgtccc	2760
	ctgaggacc	aggcccacac	ccagcccttc	tgctcccaa	ttctctctcc	tcctcccct	2820
	tcctccactg	ctgcctaagt	caaggcagtg	gctcagcagc	aagaatgctg	gttctacatc	2880
55	ccgaggagtg	tctgaggtgc	gccccactct	gtacagaggc	tgtttgggca	gccttgccctc	2940
	cagagagcag	attccagctt	cggaaagccc	tggtctaact	tgggatctgg	gaatggaagg	3000
	tgctcccact	ggaggggacc	ctcagagccc	tggagactgc	caggtgggcc	tgctgccact	3060
	gtaagccaaa	aggtggggaa	gtcctgactc	caggtgcctt	gccccacccc	tgctgccac	3120
	ctggggccctc	acagcccaga	ccctcactgg	gaggtgagct	cagctgccct	ttggaataaa	3180
60	gctgcctgat	caaaaaaaaa	aaaaaaaaaa	aa			3212

<210> 3
 <211> 41251
 <212> ADN
 <213> Homo sapiens

ES 2 761 343 T3

<400> 3

	atagtaagag	gagatgaact	tcgcagtagt	ctggagcctt	tgctctcccg	gtgggtgggt	60
5	caaaggcttt	ctctgtactg	tgggaaacc	tgcgtcaaag	gccaaataca	ttgggatggt	120
	tgcttgaaag	ggtctcaaaa	tagagttgga	accctggagc	gtggagaggg	gcgacattca	180
	gttgctattt	aatcatgatt	tgtaattaa	cagctcattt	atgggaggca	tcttagattc	240
	gtggaaaaag	cagggagtca	gacatctaga	ctcaacctcc	acttccctgc	tgtgtgatct	300
	tgggcaagcg	gcttagcctc	tctgggcttc	agggtttttt	taatctgtaa	aatgctctg	360
10	ggagtgaatg	tcaggtattc	aaatcacact	gggaaaatgg	ggctaggaaa	agccctagac	420
	tgagttagtg	ctagaacact	ctgggtctca	gtttccttat	ctggtcaatg	ggtgcagaac	480
	tggaggttta	agtgagataa	agcaggtgaa	gtaccacagt	ggtgtgggct	ggaggaagaa	540
	aacatgggac	aatggtcca	catccctggg	tgacctgaaa	attaagtgtg	agatgtctca	600
	tgagggcacg	aaatgaatat	tagttttgt	tcccttcctc	tgccacaaga	ctttgagagc	660
15	agaaaggtga	gagagacggt	actctgtgaa	ggaaggcagg	tccccggccc	agcgcagtgc	720
	cagctcaggg	gattctgggg	cgggggctaa	gtgcatggac	tgtgtgggcg	tgggtgggaag	780
	ctccgtgaac	cagaaccagg	agcaagaaa	agcattcctt	gcgtggacgg	gaaatgaggg	840
	caagaggtca	gatgtctaca	gaagtctgca	ccccatgtac	ttcagttctg	tctgtgggtg	900
20	cagcctctag	ggaggtgggt	gtttaggtac	tgagacctcc	gtctgtcctc	tgacctagag	960
	gaagccagtg	ggaagcaaa	gtggggttct	tgagccagac	ccagtccagc	tctggtgcct	1020
	gccctctggt	gcgagctgac	ctgagatgca	cttccctcct	ctgtgagctg	tctcggcacc	1080
	cacttgcagt	cactgccgcc	tgatgttgtt	actcttccac	tccaaaaggc	aggggaagtcc	1140
	tgcttccgtg	ccccaccggt	gctcagcaga	ggctcccttg	caaatgagag	gctgtttcca	1200
25	actttggtct	gtttccctgg	caggatgcc	gtggccgagg	ccccccaggt	ggctggcggg	1260
	caggggggacg	gaggtgatgg	cgaggaagcg	gagccggagg	ggatgttcaa	ggcctgtgag	1320
	gactccaaga	gaaaagcccg	gggctacctc	cgctggtg	ccctgtttgt	gctgctggcc	1380
	ctgctcgtgc	tggttcggc	gggggtgcta	ctctggtatt	tcctaggtaa	cgttgtggga	1440
	ccgcctggga	gaggcacctg	gggaggactt	ggggtgactg	tagcaggcac	agcaggacag	1500
30	gactgggttc	caggtcagc	cgtgcttagc	atattgctgt	gtgaccttg	gcaagtcaact	1560
	tctgttctct	gggtctccct	ccctgtcctt	ccagctggag	atgctgtcag	accctggctc	1620
	caggtcctat	ggctcgggtc	tgcttctg	ttgggcaaa	tgccccaaag	ctccccacca	1680
	ggtggggaaa	gtgggccctc	ctagcaccca	gttcttgtga	gccagccagc	ccacagagca	1740
35	taaacatcgc	cttcccttgc	ctgcagctc	cctgggttgc	ccctgaggct	tggagccaac	1800
	ccagccctaa	agaaggaggc	ccagaggcac	caatggtacc	tggtagcaat	tagtgcctct	1860
	gctcacttga	gcctagccta	ggttctcctc	taggctgggg	accacagctc	tatccctct	1920
	gggtctccag	ggtccagcat	gaatggggga	cggagcaggc	agctggagag	cagccagcct	1980
	tggggccctc	tgccatgtcc	ttaattatgg	ctggccccctc	cctgatgtca	cagccctcag	2040
40	tcagtcccct	ggtgcccg	gagcaattgg	cctgtgctct	gggccattc	atccaggcct	2100
	ccgttcattc	attcatggaa	taaagtctct	tgagcatcta	ttatctttct	ctaagattga	2160
	tggagtctct	cctcttctt	ctgcctttga	cagtgggaag	taatggagaa	accaaactcg	2220
	actgtgcctc	tacactgtac	actgtagaag	gccattcat	ttgttcattt	actcagtgcc	2280
	aagcacctcc	tgtgtgccag	gttctgggga	tagccccctgt	ccttgtgatt	tagccaaggc	2340
45	atcagacctg	acatttacgc	taaagcatag	catgtgatgg	gacagaggaa	gctgagggct	2400

50

55

60

65

ES 2 761 343 T3

	gggaagccac	aggagggaca	accagatgc	ctgcgtgatc	agaagcatcc	cattaaacat	2460
	cctgcaaagg	atagctagtg	ctcttactgg	ctgaatctcc	tgggtggaatt	ccaggcctgt	2520
	tгааagcaac	ctggggacca	actttgtagc	agtggagaga	aatccatgta	ggcctagatc	2580
	caaggggtca	gggttgggag	tgtctggaac	cagcatctgg	gagtgacact	attgggaacc	2640
5	ccaggctctga	cacgggcctg	cttgcaatga	cttatagtga	ttctaccag	agttgagcaa	2700
	cgcaggcagt	agacgccatg	tgcatttcac	caccagcagg	aagccagtgc	cccagatagc	2760
	acagggctgt	gggggcctcc	tcaggtagcg	ggctaattag	tctacagggt	aaaccacggg	2820
	gcactgggct	ggagggccag	gaactcacct	gcccaattatt	tctctttgca	gaggagtta	2880
	attccccctg	attatgctcc	tgggtaaat	cacccccac	cccaggagag	gtgctccatg	2940
10	gggctgagga	cccaaggggt	gagtgtccc	aagcctctgc	tgggggaagc	caactcccc	3000
	acagagggat	taagggttga	aggaggcact	ttgggagctg	tttгааagac	tcctcccgcc	3060
	ttgaccaggc	tgtgctcctg	ggactgggcg	ctgggcaagg	aagtggatca	gagacacgcc	3120
	ctgccctgtc	tggaaagagga	ggtgcacaag	tgaccagtga	cactggagca	ggacaggccc	3180
	caagcgagga	ggacagcctg	gcccgaggag	aggggtgtggc	tggettcccta	aggatggtag	3240
15	caggaccctt	aataccacca	accatatttc	ctgggtcctt	tcctttcct	gctctcccag	3300
	gcaagagttt	tatgtgttct	caagccccca	gcaccgcct	gcccctgtct	cctgcttcag	3360
	tgagaaaaca	aaacagctta	gaagagaagc	cccatatatg	ttggcccacc	tgccctccca	3420
	gctgcatcac	gtgcaactcct	cctgggaccc	cgatcccgcc	ccctctgcc	acacaatggc	3480
20	ccagcaccag	caaggatgcc	ctctctcccc	cagtgtccct	tgggggtgct	ccccatttc	3540
	tctgtctcctt	gaaagagctg	tcagtccaca	caccagctct	ctctgtgcc	tttccaacct	3600
	ggctccctct	gccccccaac	tccaatggcc	attgtcaagc	tcgccaacat	cccaggttgc	3660
	taaatccaat	gtccacttct	cagtcatcat	tgcaactgac	ccgggggctc	acccccacct	3720
	ccagaagccc	tttctctcct	agactttggg	cgccaccgg	gtcctttccg	ctcagcaggt	3780
25	tgctttttct	gtgtccctgc	tgatgggtgg	ggcctctcct	ttctctctcc	accogcttct	3840
	ttcgtgatct	catctgctac	ccttagcttc	aagtgcctt	tataccctga	taacaccac	3900
	atltgcattt	ctagcctggg	cctctccctt	gagcttgtct	ctagagctgc	ccctgctctt	3960
	cctcttaatg	tctaaggagc	atctcggacc	ctatgctttc	agaccatgag	gtctctgcat	4020
	aatttcccc	agacctgtac	ctccaacatc	ccagtccaag	accacttctt	tctggcacct	4080
30	tccccctact	cctttctttc	ttttccaccc	agccccactt	tgccagcaaa	cctggctcatc	4140
	tctaactcca	aaacacatca	aaagcagctg	acgccaatca	cttcccacc	tctcctctgc	4200
	ccagactggg	gcccaggctct	gtccccctgg	acatctctcc	cctggagccc	tgccagcgtg	4260
	tcctcgatgc	tctccctgcc	tctgcccctgc	ctccttagag	cctttctcaa	cagcagaggg	4320
	accatttgat	aaagcaaacg	aaatcctcta	acttcgctgc	ttaaaacctc	gcttggggcc	4380
35	aggcgcgtgg	ctcacgcccg	taatcccagc	actttggggag	gcccaggcag	atggatcacc	4440
	tgaggtcagg	agttcgagac	cagcctgacc	aatatgcaga	aaccctgtct	ctactaaaaa	4500
	tacaaaatta	accgggcgtg	gtggtgcatg	cctgtaatcc	cagctacttg	cgaggctgag	4560
	gcaggagaat	cgcttgaacc	cgggaggcag	aggttgtggt	gagcggagat	tgagccattg	4620
	cactccaagc	taggcaacaa	gagcgaactc	ctgtctcaaa	aacaaaacaa	aacaaaacaa	4680
40	aaaagaaaac	aaaaaacca	ctcccattc	ctcccattct	accagggtg	aaagccggg	4740
	tcctcccagg	cctggaaagc	cctaccagc	ctctcccctt	ccccatctca	taccctcctg	4800
	ctgtcctggt	gctcactctt	tgtgtctcct	gaaacacacc	aggcctttgc	acttgcccct	4860
	gcctgggaca	ttctttccac	agatgtacat	caccttcttc	cctgacctcc	atatcgcagc	4920
	ccgtcccctg	ccctgattcc	caccgcactg	accacctcta	acctgttata	cacgatgtgt	4980
45	ggtttaccgt	ctgattcctt	gctagtctac	aagctattaa	gggcagtttt	ttcttgatag	5040
	ttctgtccgt	tgttttgctc	atatagtccc	aagtactttg	gctcagttcc	tacacatagc	5100
	aggctctcaa	gaggtattta	ctgagtaaat	ggataggggt	gtaaaccagg	gctgtgagtc	5160
	taccctcttc	acttcagcca	aaatagcctt	tgcaaaacag	aagtctgatg	acatcattcc	5220
	tgattttaaa	cttttcatgg	ttacccttgt	tcatcgggta	aagacccaat	gggcccctgcc	5280
50	ctgcccaggc	cccagctcct	tgccgcccct	ccccatctct	gactgetcca	gccaacagg	5340
	ctttcagccc	gggtcctcac	catgggtccc	gtgctaccgg	ccccgtgcc	catgctgctc	5400
	cctctgctgg	aaggtacttc	cctccctctt	ctcttaccaa	tttacagttt	ccccatccct	5460
	acatctcagc	tggagggctca	ctccactctg	gcccaggctg	agtgtcctcg	tcacatcccc	5520
	tcaacagcac	catgtggcac	tgtccctga	tggcactgcc	cacagacaga	tgccacatgc	5580
55	tgtgtgggtg	ccagagccac	gcctttctta	cccaccactg	tcagcttcac	aaggggaggg	5640
	acatctgtct	ggtttaactg	gogtaccoca	tgtagtgggt	ggttagcaca	cactgtggga	5700
	tcctgtgggtg	accctcacgag	tggaaaggatg	cctagtgggtg	ctgaccatg	accttggcct	5760
	cctgggccta	tgtggatttc	ctggccttca	tgtcattgggt	gtcctggact	ggtcactgtg	5820
	tcagcctctc	cctgggaacc	tgtaggacac	catccatctg	ggagcctttc	acctccctgg	5880
60	taccttgtag	ccagtttgct	atccaataaa	cttttagatga	ccatgatgac	aatgggagtg	5940
	acaaagatga	tgatgatgac	attgatgggtg	ccatggagac	ccaagacact	gaggctgagc	6000
	tgaggggtgtg	ggtggcagga	gaaggcatgg	aagagacagg	agactttccc	acctgcttcc	6060
	tcactaacc	ctgctgggtc	cttccctgggc	agggtaacaag	goggaggtga	tggtcagcca	6120
	ggtgtactca	ggcagctctgc	gtgtactcaa	tcgccacttc	tcccaggatc	ttaccocccg	6180

65

5 ggaatctagt gccttccgca gtgaaaccgc caaagccag aagatggtag gaaaggatct 6240
 gggggatgag agggagggaa tatgggggtg aaaagagagg ggtggggtct gatcacatgg 6300
 agccagtgg tcaaccatc tggagcattc acagggacca cagccctgct ccaggcacca 6360
 tggaaagcaga tgaggttgag ggtcatggga aagttagtgg atgtttgggt caatagcact 6420
 cggattagat cctgatcatg cctcttacca ggggtggagc atgacctgg gaaaggtoct 6480
 acagtgcagc tgacactatt gagggcccgc tcoctgcccct ccgttacagg acggtggccc 6540
 gctcctcccc ctccgttaca ggacggtggc ccgctcctcc ccctccgtta caggacggg 6600
 gccgctcctg cccctccgtt acaggacggg ggccgctcct gccctccgt tacaggacgg 6660
 tggcccgctc ctccccctcc gttacaggac ggtggccctc tcctccccct ccgttacagg 6720
 10 acggtggccc tctcctcccc ctccgtaaca ggacggtggc cctctcctcc ccctccgtta 6780
 caggacgggtg gcccgctctt cccctccgt tacaggacgg tggccgctcc tgccccctcc 6840
 ttacaggacg gtggccact cctgcccctc cgttacagga cagtggccgc tcoctgcccct 6900
 ccgttacagg acggtggccc gctcctgccc ctctgttaca agacggtggc ccgctcctgc 6960
 ccctccgtta caggacgggt gccactcctg cccctctggt acaggatggt ggctcactgc 7020
 15 acggaggctg gtctactgcc tgccactctc aggtgcagg accactgccc agcaaggcag 7080
 gccagaagt cccgggagtt attcccagga gcaaccctga accatgacg ctggagggg 7140
 tggatcaata ccgacgctt tttggccctg gcaggggaa tagttcacag aatggtocag 7200
 gctgtctccc agagatgccc tattcggtg agctcagatg ctctcagctc tacactgggc 7260
 20 attcatggcc ctgtgttggg tgcccacttt ccagtctctc cctcccaact actgtttccc 7320
 agaatcacct ccaaataaac cactgcccc acctgtcaa tggagggtct gcttctgagg 7380
 gacccagcct gaggctgccc gttcctcct ccatgaggta ggggtgataa caacaggacc 7440
 cggctgcaga tttgttggg gttgcagtga agttgagata acacgaacac tattcccacg 7500
 ctgocgaaat gcttaagagc ctgtaatcct gccagcagcg ctgtagtgg agatgoccaa 7560
 25 aaactaccca tcagagctgc tggcttgtcc caggccatgg gaggaggtgc agaggggacc 7620
 caggagccga gtgggtttc cagagttga gtagtgactt ttggcaaggg gcagaggggt 7680
 catcagcagt gcaggtggag gtgagagtgc ggtgtagtgg aacagaaaag aaggggatgg 7740
 ggtgtgagat tcatgcatgc cccggcccgg cactcagca ctgtgtgacc gtgatcaagc 7800
 ctgtccacct tggagaatca tgcatggagc ggggctgcca gtaggagcaa agggcacctc 7860
 30 caggtaggaa gtggccctgt ctgcccctgca gagggtccca ggggctgttg tcttcccttc 7920
 tcacagctca aggagctcat caccagcacc cgcctgggaa cttactaaa ctccagctcc 7980
 gctatctctt ttgggtgagt tgccttggc cctgaccagc tcctgcaaga agctgagatt 8040
 caaagaatgg taggggctc ttaggcttc ttaggcaatg ccttcatggt tcaaagggg 8100
 aaactaaggc atagagagg aacttggctt cctgcatgct accctccctt cactgggctc 8160
 35 atctgtagaa tggaaacatg ggtgtgatag gtttgcacca gacaatgact gtgatggctg 8220
 atcaagggcc tgacaccatc aggcgaggcg atgttggagg ggcatggggt taaaagcatt 8280
 ggctccaggg cccgactgcc ccgtccacat ctggttctgc tacttgccgc atagtttatg 8340
 agacacaagt tcacctctca tgctcagtt ttctcattcg taaaataagg attatgagag 8400
 cgcctccttc agaggctcgt aggaggcttc tgctgaaga cggacagcaa tggctgaggt 8460
 40 cgggaaagtg ctcgatgtgc atgagcaggg gtggagctgg ggcagacct cagaatcctt 8520
 cctggcctc tctcacttct cctgcctta gggagggacc cctcacctgc tcttctggt 8580
 tcattctcca aatccccgag caccgcccgc tgatgctgag ccccaggtg gtgcaggcac 8640
 tgctggtgga ggagctgctg tccacagtca acagctcggc tgccgtcccc tacagggccc 8700
 agtacgaagt ggaccccag ggcctagtga tcoctgggtca gtactgcgag tggaaacgtg 8760
 45 gggttggcct catgaggttg ggggaaacaa gctgtggtgt ggcccgggga ggctgcctgc 8820
 caggcctggg gtgctgtcag ggtgggcccc ccaggagagc cccccaggtg aggtagcagt 8880
 gccattgcat tcaaggagcc aggaaagaag ggtgggatgg gggcatttag ggtaaatctc 8940
 agacaaggct ggctccaagg gtctcctcta attttatttt cattgtattt tcttttcttt 9000
 50 tttttttttt ttgttcttgt ttatttgttt gttcatttcc ttttatcaga agccagtggtg 9060
 aaagacatag ctgcattgaa ttccacgctg ggtacgctat ttttttttcc cctccccatt 9120
 ttctttttga gttggcattt gtcttgactt tgttgtgtat caggggggaca catggcttct 9180
 gttgtgtgtg cagggagccc tggccaagag tcacccaggg gatgccatgg tggactcagc 9240
 gatgtgtccc aagcaagtct tggagcctgt agggggagag gaggtggcga cgtgcatgcg 9300
 tgtatttgtg tgtgtcttgt agacgggtgt gcatgcgttc ctgtgtgggt gtgaggatga 9360
 55 gtcaggttta gtggtccacg aacgtgactc tcoctatca ttcacttcaa cctgccaca 9420
 agctagtttc cactgatggt agaaaatcat cttgccatt caggtttgt cagtcacgtt 9480
 ggttttaaaa cttggtcttt tggagtagc ggtgccattg cattcaagaa cgctccttcc 9540
 ctcttttctt ttcttccca gtacggctca tcagccctcc ctcctacct ggtgccgtat 9600
 tgctagagtc accttgcat tctccaagcg gaccacaaat ctttcagctg accagcacag 9660
 60 tcaccacgct gcacaaggca ggaggtgctg tccaagttgt agtttgtgtg agttgtgcag 9720
 tgcaccaact ggctgctgga ctctatggcc cetaaattct cagattcctc ccacactatc 9780
 tagtgttgtc acccagagcc aaggtggggg tgagcgtctc aacccttct cagggagggg 9840
 ggcagagttt aaatccttgt tatacctttc cttaccttcc cgtcttccca tcoctgctgg 9900
 65 caaatgcttg cttctttggt ggatggaggt gatgaggtca aagtacagt ttcaaagagg 9960

ES 2 761 343 T3

	tgaatcatg	attctcatac	aaagatagag	tgaccatgtg	tcaaatattt	atttggtga	10020
	ttaatggggg	aacgagtaga	atggtaaaga	atgcaagaaa	ctgatctatt	tgtctatcta	10080
	tctatctatc	tatctatcat	ctctgttgat	atctgtctgc	ttgtctatct	agttatctaa	10140
	ctagctagct	gtctattatc	tatctgtctg	tctctctgtc	tctgtctgtc	tagctagcta	10200
5	gctgtctggt	tatatctatc	tatctatcta	tctatctatc	tatctatcta	tctatctatc	10260
	atcaatcatt	aatggaaaaa	gagaattgct	agaataagat	taccaagtta	gatacaaac	10320
	tggtaagggt	cctaccaggc	aagaaaactc	aaacctttgg	agttgtcttt	tctagtgaat	10380
	taaaatcatt	gacagcttat	tacagtcttc	tgaagttaa	catctacctc	tacagagctc	10440
	gaggttgata	atctacaacc	aatagtaagt	cagagatatt	actcctgaga	gcctcagggg	10500
10	gacttaataca	gatgatgctt	ggagacagag	actggctcat	tgcagcctgg	acaccgaatc	10560
	tggccaattg	ctgcctgatt	ttgtatagcc	catgagccaa	gaatgacata	tatatatata	10620
	taacagagtc	tcactctgtc	atccaggctg	gagtgcagtg	ccgcgatctt	ggctcattgc	10680
	aacctccacc	tcccaggttc	aagcaattct	cctgcttcag	cctcctgagt	agctgggact	10740
	acaggtgcct	gccaccatgc	ctggctaatt	tgtatatttt	tagaagagat	gaggttttgc	10800
15	cgtgttggcc	aggctggtct	cgagctcctg	acctcaggtg	atccacctgc	ctccacctcc	10860
	caaagtgtcg	ggattacagg	tgtgagccac	cacgcctggc	tccataggcc	atthttcaat	10920
	tattaaaaaa	tataaaagtc	agccaggcat	ggtggctcat	gcctgtaacc	cagcactttg	10980
	ggaggcagag	gcaggcagat	cacctgaggt	caggagtttg	agaccagcct	ggccaagaag	11040
	gcgaaacccc	gtctcttcta	aaaatataaa	aattagccgg	gcatggtggt	gcgcacctgt	11100
20	agtctaacc	agtcaggagg	ctgaggcagg	agaatcactt	gaaccocgaa	gatggagctt	11160
	gcagtgagct	gagattgtga	ggttgtgcc	ctgtactcca	gcctgggcga	cagagtgaga	11220
	ctccatctca	aaaaaaaaaa	aaaaaaaaaa	aaaaaaaaag	agaaagaaag	gaaaggaaaa	11280
	ggtcctatgg	aaagttattt	ttctcctgct	aatagaagtg	ctatgtaata	gcctcatggt	11340
	gcctcgtgcc	tctgtgtccc	catgctcctg	gcagttgttc	tgtaattatc	tgtgctcagt	11400
25	gggtgttcgt	ttcatgaatg	aatgattgaa	caaatgaatg	aaagcatgaa	tgaggagact	11460
	ggttcagtgc	atgtccagag	cacagagtct	cagggggcag	agataacaac	tcaaatcctt	11520
	gaagtgcact	ttatgagcac	ttccttcatg	ccaggcccca	ttcctgcgct	gaggacacca	11580
	ggatgaccgt	gtcctcacc	ctgccctcgg	aggagcttta	agccccatga	gggagacaga	11640
30	cacataaaca	gattctcata	acaccaggtg	ccagtgtgag	aatagaggcc	ccagaggcag	11700
	tggagagagg	gaattgttcg	ttccaaagca	gaagaggggg	caaatacaaga	gcctcacaca	11760
	gagtcccaga	tctacaggag	ggaggggttg	ctcctgactg	ggggatcctg	gaagacttca	11820
	tggagggggc	atcagatttg	ggcatgggct	gggcgtggtg	gcacaagcct	gtaatcccag	11880
	cactttggga	ggccaagtgg	agcggatcac	ctgaggtcag	gagttcgagg	ccagcctggc	11940
35	caacatggca	aaaccccatc	tctactgaaa	atacaaaatt	agctggtcat	ggtggcccat	12000
	gcctgtaatc	ccagctactt	gggaggctga	ggcaggagaa	ttgcttgaac	ccaggaggtg	12060
	gaggttgcag	tgagccaaga	ttgcaccatt	gcactccagc	ctgggcagca	agagcaaat	12120
	ccattaaaaa	aaaaattagc	tggacatggt	ggtgtgcacc	tgtagtccta	gtactcggg	12180
	ggtgggggtg	gggggctaag	gtgggaggat	caccagagct	caggaggtcg	aggctgcaat	12240
40	gagctgttgt	gatcgcatca	ctgcctcca	gcctgagtga	caggctgtct	caacaataaa	12300
	ataaaaat	tttcaaaaga	aaaagaatt	caggcatggg	ggtaggcagg	aatttgtcag	12360
	ggcgagaaga	agaaagggtt	ccctgagcag	agggaaatggc	aggggcaaag	actgggggag	12420
	gggaacacc	aaggcgtggt	cagttaatc	ctcccagccc	cgagaggtgc	caggtccct	12480
	gaaggtgttt	ctgattaaca	agaggttagc	acacacctct	ccacggaatt	cgtctcaaaa	12540
45	aaaaaaaaaa	gggtaattat	taaagtggca	agagcaaaga	atctgcttgg	agcaagattt	12600
	aaagaacaca	aaaccctagg	aagagccagc	catctttccc	cagctgctgg	tggaggccct	12660
	gtccctccc	taggcagaca	ttgttgtct	ctctctgggg	aggtcagctc	ccactgcag	12720
	tcagcatggc	caggggtcag	ggagaagggg	ctgagccaca	ggtggcagca	tcagagcaaa	12780
50	gtgtattcac	ctccattccc	ttcctggtcc	tcagactgc	ccagaggagg	tcataggaca	12840
	gggtattatta	ttacatccat	ttgacagaac	ttggaatggc	taagccactg	ccccagactc	12900
	agttaactac	ccagaggtag	tgaacatcta	cctctacaga	gtctgaggtt	gataatctgc	12960
	aaccaatagt	aagtcaagat	tattactcct	gagagcctca	gggggactta	atcagacaat	13020
	gattggggac	agagactggc	tactgcagc	ctggacaccg	aatctggtcc	actgctgcct	13080
	gattttgtat	ggcccatgag	ccaagaatga	catcatcaca	cagctgatga	gtgttgggtc	13140
55	taggtgggga	gggtagtgcc	cctccctcct	tctctccagt	tcctccccca	tataccccct	13200
	cccctggggg	cccagcagat	ggcactagcc	tggggggcct	gccctcaggc	tgaccaagct	13260
	gacaggggga	cttttgcttg	cctgtggcct	tccaaagaag	acgatttaaa	gcagagaaaa	13320
	cagactgaaa	actcaggttt	tataatttca	tgtcaccagg	ctgcctccca	catcccaggt	13380
	tcatctctaa	atccccactg	gctcctggaa	gaacaccagg	cttctggcga	ggtttaaattg	13440
60	agatactgga	tgctccacgg	gagagaacat	gttcaactggc	agaccctggt	gcctagatcg	13500
	aacacacagt	cggtgcacag	tactgtttt	gaatgaatga	atgaatgaat	gaatgatgca	13560
	ggtggtactg	ctttgtaagt	tctagcagtg	catcagagct	tacggattag	atggaagagc	13620
	agagactcac	tgggtgtgtg	ggtagggggg	tggggtatga	tgggtgaaaca	gttgtgaagt	13680
65	gaggcagccg	tgagatgggc	taggtctgag	cctcagggcg	ggccagctgc	aggatgaaaa	13740

ES 2 761 343 T3

	gtcacaggcc	tttctcccca	gccctacctg	ctccgtctcc	ctcacaccca	cctgaggaac	13800
	caggcactgc	ctttattgag	cccctactgt	gcaaggtgct	gtgctgggca	ttcaaactgt	13860
	tatcatccta	cagcctctgc	tggcggccct	gcaagggtag	tgttatcgtc	ccattctata	13920
5	gatgaggaaa	gcaaggccca	ggaaagatta	ggtggtggct	gggcaaacc	agatgtgtct	13980
	ggcccaggtc	tgtgcaatgg	acacaatcat	tgaagtatc	tcatacagct	gttgtgggca	14040
	ttgagcgaga	cagtgagggg	aggcattcag	ttcagtttct	ggcctgtagc	aaatgcttga	14100
	taagcacctg	ttttattctg	atggcttcac	catcattagc	tcaaagctca	tgtcctcccc	14160
	ccagggcagc	ctcccagact	cctccttagg	gcactccctt	ctctctaccg	gaagtgaagc	14220
10	cctcatccct	tcttctcctc	attgctgtg	gcctcgctgg	tctccacagc	agccagagga	14280
	gtgtgtggtc	caagccagcc	catgtccagc	cttgcccac	cttctgtggc	tccttatggc	14340
	tgcaggagaa	agcagcgccc	atcctcggaa	tggcctgggc	caggcctccc	tgccttcagc	14400
	ttgtcctcta	gatacacgtg	ccctgtgtgt	acttttctca	aagctgcccg	gctcgcccca	14460
	gcctctttgc	tcacgcaggg	acccccagga	tgccccagc	ccacaggccg	ggtttgaagc	14520
15	cgctacctcc	tgagctattc	tgcctgttc	tgtgtctgtc	tgtccccgct	gtcatcctca	14580
	tccccaggca	gcgactggat	ttttacctgg	gcactgagaa	ggcgtgaagc	tcagtgtgtg	14640
	tccattccat	gagtgaatga	ctgaaccaat	gaacaaatgc	atgaatgagg	atactgacag	14700
	ggaaagagaa	ggatggggta	gagcatgtct	ggctatcccc	acccggctcc	cctgcccagc	14760
20	ccatcctgcc	tgggtggagga	ccttgagggg	cctggctccc	cagggtcccc	tccttctggc	14820
	tcacaggaat	caggggctgt	gcccctctcc	ccgctccagg	ttgttaccgc	tacagctacg	14880
	tgggccaggg	ccaggtcctc	cggctgaagg	ggcctgacca	cctggcctcc	agctgcctgt	14940
	ggcacctgca	gggccccaa	gacctcatgc	tcaaactccg	gctggagtgg	acgctggcag	15000
	agtgcgggga	ccgactggcc	atgtatgacg	tggccgggcc	cctggagaag	cctgcatca	15060
25	cctcgtgagt	ccctgggaag	gagggcagga	gggagggctg	gaaaagggag	tggttgatgg	15120
	gggagttgaa	agtcacacac	agcattctta	gacaagggag	ggtaggacct	tgggcctggg	15180
	tatctgggag	acaggacggc	tagcttagag	gggatagggg	agaggaggct	ggagatgggt	15240
	gtgtaactgg	ggcgcttccc	ctccgcgagc	ctcagtttcc	ccatctgtaa	caaagccgtt	15300
	gttgtagatg	actcctgaag	tcagctctgg	gaggcacctg	ggcttgttgg	gatgtttcag	15360
30	agtctaggctg	cagcctggac	tttcaacctc	tgggctcgtt	cctaaatcct	gactgcttcc	15420
	tggtagaaca	cccacctct	ctgcttccca	ggcttctggt	ggggtttaa	tgagactata	15480
	gattccccat	gggaggggat	gtcttcaact	ccgggcccctc	gtgcctagac	caaacgcaca	15540
	gtaggtgtgc	agtatctatt	ttgagtgaac	gaatgaatga	tgtaggtggt	actgctttgc	15600
	aagttctagc	aatgcatcag	agctcacgga	ttaaagttaa	gagcagagag	gcttactggg	15660
35	gtgtggggcg	gggggtgtgg	gatgtgacgg	ggaaccccc	gtctcctagc	tgcgtgccct	15720
	aaggcaagtt	actttgcctc	ttagaacctg	cttaccttgc	cggatcattg	gaggatttaa	15780
	atcagactat	ctgtgccatg	atccttacac	atagttagtg	cctagcactt	acacgctagc	15840
	cattattggt	atcattatat	atgctctaac	tgggactggg	ccgcaaaagg	cattgagtgc	15900
	caggagccat	ttggactttg	atatttggtg	agtggggagc	tattgaaagt	tcttgagcac	15960
40	agaagttagg	ctttagggca	taagatatgg	agtggagtac	agaagtgatc	aggatcagag	16020
	ggcaggtggt	tgggggtggg	gaggagggac	tggaaatggc	cctgacctct	gggagcctgg	16080
	tcctcccaca	ggatggggag	atgggtggtg	gcctacaaag	cactgcagga	ggtggggaag	16140
	atgctctggg	ctgggcagtt	ctcagcgatt	gtttattgag	cacttacttt	gtgctgggcg	16200
	tcaggctgat	gcctcttctg	tctcacttgg	gctgtggcca	gcctccaggc	agatggggat	16260
45	gggaccagtg	tgttcagatc	aagcgcagtc	tttgaatgtg	agctggcaga	ggttcttgcc	16320
	acacccctcc	cccagggcct	ctccaagctg	ctctctcctt	gtcaccctcc	ctgctgtcct	16380
	gctgggtgtg	acctcgatct	gcggcatgtg	cgtgggctga	gtttctggag	ggctctggga	16440
	agtgcagaga	agccagacac	catctgactt	ccaggcccaa	aaagggtggg	gacacttagg	16500
	ggtttccctc	ggggcttctc	cagggtgcctc	tcagcctggg	aggggacctg	actgccaggc	16560
50	ccagctctgt	tcctactcac	tgtggctcct	ggtggctctc	tcatcccaga	ccctgggaga	16620
	agctctaaaa	tgacaggtca	gacaacattt	ggggttctca	agcttgacc	ccagacacct	16680
	gctaggggat	gggggtgagg	gggactttgg	tgggtgatgg	aagacagagc	aggtggcccc	16740
	ttgtcagtt	tcaaccatgt	gctttgatcc	tgcgttccat	atttcattta	taagaagggc	16800
	tctgccgcta	ggtaaataaa	ataaaacccc	ccaacaatga	aagctaaagc	ccccattaaa	16860
55	ggtgacctcc	aggtctcttc	catcctaata	tcgtatctcc	cacctcccag	ggaagatgag	16920
	ccggtaaggc	caaaaaggac	gtggctgtat	gggagggtgg	ggggcaccgg	tgtggtggg	16980
	gagacttggg	tgctgcagca	ggaagatcaa	gctggaatgg	taggaagaag	ggacgagggc	17040
	ctgggggggtg	aggggggtgg	tgcctgctac	tggaggccac	ctccctcccc	tggcaagagg	17100
	ccaggggaaa	tgccccatcc	ccggacctg	ggcaccaaga	ccctcccagg	gagacccttg	17160
60	gggttatgcc	caccatgcct	ccagctggct	gcaggctgct	tgggtgccat	gtgtagcgat	17220
	tttgaggctg	tgcttggagg	agctcaggta	ctcgcttggc	aaggtgcctg	aaatccctcc	17280
	agcagcacc	cttctctctg	tcaaggccca	ggtgcccacg	cacagtctgc	aggcagggag	17340
	cgatattgggt	tgccattca	gagggaggtg	gggcccgttag	tttcttataa	attgacccat	17400
	cagatgcgct	gcactccaga	gagtgttgc	attgacactg	ggaagtttgg	tgagggttgg	17460
65	tgagagggtg	aaggggagct	ggggaacccc	tgtctgagac	aggcagacca	ggggcaccta	17520

ES 2 761 343 T3

	catatgtggg	agggtaccag	ccatcacaga	cagtgcctag	cgcaggccta	tctctgccat	17580
	ggactgccgg	tagggcctca	gtttccctat	ctggaaatca	agcagctgac	cccaacagtg	17640
	tcaccagtct	tttcagggct	gacattccag	atcttctaaaa	gcccagaagt	ctaagatcacg	17700
5	gttattttgtt	ccgagcctcc	cagggcgccaa	gctctgggca	gatttctggg	gcaccctggg	17760
	ggtcacgaga	ccacacctgc	cttctccctg	cctatccttg	agcacagcca	ggagtgcggg	17820
	tgccagaaac	ggtggtccct	gcagatgcca	gtctagtctt	cctgccaggg	acgctagggg	17880
	tcacagatga	ttctgtagca	gggtggaggg	gtctggggag	ggagcatggg	actcgagcca	17940
	gccgtcatca	tcaaactgta	agctccagaa	gtctggggaa	cctcctggcc	tctctacccc	18000
10	gaggagctag	cctggtcctt	ggagggcctt	cagtctgtcc	tctggggctg	gggagacaca	18060
	gaattctccc	cacagacaca	cagtggctct	tggtaggaga	cccggaccca	gaacccagat	18120
	gtccagactc	ccgtccaccc	tccccagca	gccgcctgcc	gccctccctg	ccactcccct	18180
	cccagacccc	agcccagcct	tgccaccttt	ctgttctgcc	agggtgtacg	gctgcagccg	18240
	ccaggagccc	gtggtggagg	ttctggcgtc	gggggccatc	atggcggtcg	tctggaagaa	18300
15	gggcctgcac	agctactacg	accccttcgt	gctctccgtg	cagccggtgg	tcttccaggg	18360
	tgagaggtca	gggtccctg	gggcagggga	ggggtggtgg	tagaatccaa	gggcccctcca	18420
	ctgggctcac	tgctcacctt	ttttgcccc	attgaggatg	ggatggggag	agggaagatt	18480
	ctggaagctc	ctgctgctct	ccactcccca	ccccggcccc	cctcttccct	ccgtcgtttg	18540
	cacttccacc	cccctcttcc	ccttgaccgt	cctaccatc	gcagtctctg	tcttccctggc	18600
20	atcgctccct	tgcttccctc	ctctttctct	gtccttcctt	ctctctcctt	ttctcttttc	18660
	tgtgctgacc	gcctctcctc	cctcctcaact	cgcttgacc	tgtgtcccct	cccctctgcc	18720
	cctcaccccc	tccttgccct	ctccccttgg	caccacccgg	tggctgggccc	tggaacacgg	18780
	gtctgthtgc	agcaggacta	agaactcctt	ggattccgcc	ctagacagtc	cgcttacagc	18840
	caagagggcg	cagggagctt	ggggaggtgt	gatggcagca	cagccaggcc	atggccactg	18900
25	gtgtggcagg	tctcccactg	ccttcccagc	ccccaccctc	ctcctgcttc	gggacctccc	18960
	tccttgcccc	cttcccagga	agggcaogtc	ccaccccgc	tgggacagct	gtcctgggccc	19020
	tggaccagcc	atacttctgc	gcaggaggcc	caaactttgc	catttctgga	gctcaggagg	19080
	ggaggatggc	agagaggagg	ccatagagtg	ttggcagctg	cttctgcctc	acctctctcc	19140
	ccactcttct	ccctcccact	cagggctcca	gccctcttct	cggtttatcc	ccaaactgtc	19200
30	tggcatagac	ctgggtcccc	agctggccaa	actggagcgc	taaatgggta	gcagagctgt	19260
	tcctttggga	gatgacaca	ggctcgaggg	gggagggaa	aaagggcttt	gggggcccct	19320
	gcccaatgga	gagatggcca	gggcaggtga	cgatgctcct	gtcctgaccc	ctggaccccct	19380
	cagcctctca	cggtgtagcc	tcaaccaagc	cactcctttt	ctccgaacct	catcttggaa	19440
35	aaggggaaca	gctctctctc	ccccagccac	caccgtgagg	cctgtgcagg	tgtgaatgca	19500
	ttttgtaaac	tggcgagtgc	tgtcccgcaa	atatcaataa	ctaaccggga	tcgagcactt	19560
	actacatgcc	aggctgtttg	aatgtttatg	tctttttaat	ccactctact	acctatgag	19620
	gtgtgtgcta	ttactgtcct	cattttacag	atgaggaaac	tgagaccag	attcacacaa	19680
	tcacattcaa	ccacagcaat	ttgctggcag	agggtgtagg	ggtggtgggg	ttacaagctg	19740
40	gccagcctg	ctgggaggtg	cagccagggg	accctgtgt	aacagctgct	ctctggtcc	19800
	agcctgtgaa	gtgcaacctg	cgctggacaa	caggctcgac	tcccagggcg	tcctcgacac	19860
	cccgtacttc	cccagctact	actcgcccca	aaccactg	tccctggcacc	tcacggtgag	19920
	acccacccct	gcctgcccac	ctgcccctct	ccgcaagcac	actacaggtc	cctggtgacc	19980
	cgggatgaga	gggggagctg	tcccgcctct	gctgaagcgc	ccacaggctg	agccctgggt	20040
45	acacatcctg	ccagggtgga	gagggctgtg	ggcgaggtct	ccctctgtgg	gtcacagcaa	20100
	tgcctgtht	ttgagtgact	gacagacttt	agccccacct	gggattctgt	gtttccttct	20160
	ctttgtttht	agggaggtgg	gttaccacaa	ctggccacac	cccattgggccc	acctgatggc	20220
	ccgctcctcc	ctcccaggtg	ccctctctgg	actacggctt	ggccctctgg	tttgatgcct	20280
	atgactgag	agtcagaag	tatgatttgc	cgtgcaccca	gggcccagtg	acgatccaga	20340
50	acaggaggt	ccacttccct	tcctccctct	ggcttccctt	cctccctccc	cctccctctc	20400
	ttccctcctc	aatagtgacc	ccctcattgg	aagcccaagt	ccccaatctc	agaggggag	20460
	caaggggagc	gagcagaggc	tggggctggg	gtcaggcctg	ttgcccttga	ccttgtcctc	20520
	gtcccagcct	ccgcccctgg	cccggcttcc	cctctggcta	ccccagagg	ctcagacacg	20580
	tttggctcatc	agacaccttg	gatgtttatt	ctaattacag	caaaattgtc	tcacttctct	20640
55	gggtgctgta	acccccctctg	gcacccctcaa	tccttcaata	aaatgtttcc	agagccaaa	20700
	gactcatggg	cactttggtg	ccttccctct	aaacccaagg	cgtaccatca	gaggtgcctc	20760
	tcctttatca	cgaaccccctg	ctgcacagcc	aggcccaatc	ccattgcaca	gggtaaacatg	20820
	gaaatcatgg	gtgccctgga	tccccggaat	ccccaacggg	gcaactgccc	tcttccctgc	20880
	tcttgccctt	gctccctctg	gtaactaagt	ttccgacaaa	gaagtgagtc	cttacagaga	20940
60	tgtgagcaag	agacagtggg	gttaggctaa	gcgactaccg	ttgccaggg	cactatggca	21000
	tgaggccagt	agggtcccac	tgggcccctg	caccaggaag	ccatgggtgg	tgccgacagc	21060
	ttcagaggcc	tgggctgggc	aaggaggcag	ggaaacagag	acaggggtgta	tggacaggtt	21120
	ttcattttgtc	tgggaagaaa	agagaactag	gaaattcaag	gaaggggaca	tttaagacgg	21180
	gagaggttcc	atatctcaa	tgtgtggatc	atcccagcat	ccccagagg	agagaaggag	21240
65	gctcaggtgc	aggtaaatatt	gttttagagt	gggaggggtg	gcaaggggag	agggagggccc	21300

ES 2 761 343 T3

	tcccatggct	ccattgttgg	ggagcagagg	tttggggaga	gagaagagga	atattgaagc	21360
	agcgatggca	gagccagggg	gaccctttcc	ctgggaatcc	ggggtgaaaa	cggtcacatcgt	21420
	gtcagcgtca	ggaaagagga	gactctatcc	ttcatcgag	gttgggcctc	tgccctccct	21480
5	tccaacctcg	gaattctggg	ggcctaatag	gttcagagtc	tagtatgaaa	gatttgtcat	21540
	ttcttgattt	cacagagttt	gaatatctaa	gatgccagtc	ttggaagatg	cctaaattgg	21600
	aaggctctgg	ggctctagaa	ttcttggatt	tctggggtgt	gtgttcccaa	tcaccaacac	21660
	ttgtaatttg	cttgttggct	gatcctattc	aaaaggatca	tccagacaaa	aggtgacgaa	21720
	gaatgacaag	gtttgettga	ctcctttttg	caattttatct	gggactagga	ttaaaagaaa	21780
10	ggagaagaaa	tactcatggc	atgatctagg	gctatgctgt	tgggggtaac	atggggagtg	21840
	actttgggcc	tgtgctgttg	ggggtgatat	ggcgaagcag	tgccctcagg	gctttgcatt	21900
	tgggtggtgat	atgctgatgg	agtgtgacat	caggcctgtg	ctgctggggg	gacatgctgg	21960
	ttcagtgatg	tcaggcctgt	gctgtctgga	gagcagaagg	cttctgtagc	atgatggggg	22020
	cacctctggg	aacggctgcc	ctgacccctc	atggagctca	cttgaagcct	ccttgctact	22080
15	cacctaggct	ggggatggct	ggcttcaccc	ccgctcacag	gaaccocgag	ggtgaccctg	22140
	agatggatcc	atgattcaca	gttctgcgaa	tgatgagaac	atgttttctc	gcctccctcc	22200
	ctaccgcaga	gctgaacttt	atgtctcagg	gaggcccaca	aaggagaagg	aacagtcttg	22260
	ggtctgacac	tcctctgtct	atccctcacc	cccttggcga	ctccatttgc	cagagggcggg	22320
	gccccagcat	tcaggggttg	tgggggggtt	ggtggcctgg	agttaggtgc	taagacaggc	22380
20	gttcagtgca	ttggcccaac	aacttgtgtg	gtcattggcg	ccgttctgt	ttcccagaga	22440
	aggaatcaa	ggctcagcag	gattaggtgg	cacgcagatg	ggtccacaga	tggggtctct	22500
	cccatacccc	caacagccac	aacagcagc	ccaaaggatg	ctccacccca	gggtgacag	22560
	gggaaggccc	tcctccctcc	ctgatgcagt	tgggcaaggg	tctgggtact	ggggagacag	22620
	ggacttcgtg	agctaccctt	gggtaatgac	agagagagtg	tggaacacgg	atgggagagt	22680
25	cttttcccta	atccaaagga	atgatgcctt	gatgggtgaat	ttgaggcact	aggacagctt	22740
	ccaacagggg	ggagggatct	cgccagagtc	tgagcaccac	tgagctatag	aatgtgtggg	22800
	ctgaactggt	cctagcacc	aacctatggt	acaggtgggg	aaactgggac	cagcgagggc	22860
	taaggacttg	gcctcttgtc	cctgtctttt	ctgcctttca	gtggtggaga	tgggcttcag	22920
	ggtgtagcca	agcgggtggc	gggtgggtgag	gatgaggcct	gacagctccc	tgtgcccaca	22980
30	tagctcccc	tctctctgtt	cagtcctccc	tcgccacag	ggggtggaag	ctgtcagcag	23040
	gggctggcat	cagggtttgc	atggatccct	agatgcaccc	ccttccctgt	ctgtgaaacg	23100
	aggggttcag	gccagcccag	ggccccaatc	tttgattgct	taccatcag	gaagctattg	23160
	tctcccatac	aagttgtgtt	tattaattcc	tggccaaacg	ccattccaag	tcaggctggg	23220
	gaggtggaaa	gcgcttaagt	gtcgaagcca	gacaggccag	ggctcagcac	ctgtctcctc	23280
35	tgcttcctac	ctgggcgagg	acttacatct	cccaacctca	ggtaaactcat	ctgaaaaaag	23340
	ggcgtgaaa	agacccccac	cctgggaaga	ctaagtgaga	caacgcgtgg	agaacattgc	23400
	acacgcgggg	ttaggtcaag	tgcaacaaac	ctgcgttcat	caccggctct	caactctgct	23460
	tgggcaggca	caagctgagg	ggtttatggt	ctgtgctctt	tcagcctcaa	caaccagcg	23520
40	aggaagcagg	tgcttact	gccttcacag	accagtgaga	cacccaagac	acagagagat	23580
	gaagtaattt	gcacaaagtc	accagctct	ttgagccaga	gttaaggcca	ggcagcctga	23640
	tctggagtgc	acgtgggtgc	acagatgcat	gtctgtgtgc	gtgcgtacat	ccatgcatgt	23700
	ctgtgcacgt	gtacgtgcat	gtgtgtgtgg	tcacgtgtg	cgattcttcc	ctctgagcct	23760
	ctagcggccc	atgccagctg	gtgactccct	cagccaaggc	atccccagcc	aaccactgg	23820
45	catctgggtg	gggggatcga	cagtttctgt	ggctgtccca	ccagttccag	agcggcctgg	23880
	gaagtcccag	ccctttcttc	tcagactttc	attaagggtc	cagggtcccc	aggggcagac	23940
	tcttgtcccc	tccccgcaga	ctcctcctgt	gtggaaggga	gtggaaggga	atggcagaggt	24000
	gggcctgca	aacctccgc	actgggccac	tgtgccctct	agttatgatc	atgggcgata	24060
	gtgatcatcc	catgtagatg	ctgagaaatt	cttagaatga	gcatttgttg	gaaatctgct	24120
50	tgtgtgggtg	gcaaagacat	gagaggtcta	gggaagagca	gattttcaga	caaggcactt	24180
	tagggagggg	gaggtacagc	cctttggccc	agaatgccc	ttgatggaga	gggocgggtca	24240
	ggggagaggg	tatcttaacc	ctcaagtgcc	agcgtagtga	tgaggaaagg	ctggcctggg	24300
	gggcccccca	tggactaagc	atccttaggc	acttcacctg	actcctctga	gactgtgggtg	24360
	cctccttcac	ccctgacctg	cctgctttct	acctagcttc	tcccgggtgcc	caactgagcc	24420
55	cagctgaggc	ctcaggccct	tgagtggcct	gggggtggta	gagggacttg	gcccgtgaga	24480
	tctggccatg	gctgtccat	ttcgcagaag	ccactctcac	gggctgccac	cgaagcacgg	24540
	gcttccccct	ttccgggaac	ctgcctcctg	ccagcttctc	ctcctgtgac	atcacttctc	24600
	ttgtgattcg	ccccaccatt	tccactcact	cccagccagt	ggggacaggc	agaaccatgg	24660
	gttccctagg	ccagctggag	ccacccccga	cccggcctgg	cctggctatg	gggtggccct	24720
60	tgtgttctcc	ggagcgtag	tggccagcac	agggcgcagc	cacagacact	tagtaggaac	24780
	ttcagtggtg	ctgacctgag	ctgggctggc	cgtgcaggag	agtgcaagct	gcttccctca	24840
	ttagctcaca	gcctgacgtc	agcaagtgtc	tcaaagaagt	catttctat	gcactcctta	24900
	aacctgccca	caagggat	acgatcacc	ctgttttaca	aatgtgaaaa	ctaaagcttg	24960
	ctgaggggtga	cccaaggtca	cacagcttgt	tccctggggca	aagccaggct	gccaattcag	25020
65	ctctgcagcc	ccaggtctag	agctctggca	atgccagggtg	ctgctctcct	cccccttca	25080

ES 2 761 343 T3

5 gcacttgct tctgtgacc tccttccct ttaatctgtc tgtaggtaa ggcacggggg 25140
 tgtgcattca tccaccacag cacccttctt tccttcttcc ttcttgtgtt ctccccaccc 25200
 ttccatccat ccacccatcc atccatgcac ctatccctcc aggcagtaca tcctgacagg 25260
 gtccctgtct acctcctgga tgaggcaaga aggaaatatt ccccatatcc agagaggtga 25320
 ggaagcaagg caggccacac ggtgcaaaaa tgtgccttca gacactcagt actttgtagc 25380
 caagatgaac tggcaggcat cgcagcagtc aggcttctgg tgcttcttgg agagggctag 25440
 aggggagcac ttgttgacg ggaggcactg gagagccaga gaatgtgcac cctccccag 25500
 10 agagtctctgc agcagaaaca gaaaactcag atggggcaag gggccaggcc agggctagag 25560
 tctatgatgg ggggtagggt agtccagtgg tgttttcggg gcttttcttt ctttctctct 25620
 ttctctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt ctttcttttt ctttctttct 25680
 ttctcttttt ctctctctcc ttctctctct tctctctctt tctctttctt ctttctttct 25740
 ccttattctc cttttccctt ctttccctt cctctctctc ttcttctctt tctcttctct 25800
 15 ctctctctcc tcttctctct tcttctctct cctctctctc tcttctctct tcttctctct 25860
 ctctctctcc tcttctctct tcttctctct tcttctctct catctttctt tcttctctct 25920
 ctccgctctc tcttctctct tcttctctct cttctctctc tcttctctct ggagcaggaa 25980
 tctggattat tatgtgaaat tagctcggca ctcaatgaag caatttctac atgggtgcata 26040
 20 aacagattgt ctttacgctg agtgactccg cttgggccac tagatttcag ccgctgcctt 26100
 gaattcctct ctggcgtctt ctaagcagac gcttgttcca gggattccac cacctctacc 26160
 cgtgctccag gcctccagag tgagaaccaa aactgcccga gacagacagg ttcccgggta 26220
 cacgggtgagg cctgggggaa aggttgtctc cagctacaga ctggttctag gactctctct 26280
 ggaggttgag agaacttctt gtagcaggca caggtgtctt tgccttacag cccctgcccga 26340
 25 aggcctgggt gacactacag gtctcaacg cagttgtctt tagggtgaaa cgttccactc 26400
 ccctccaacc ccggcttggg ttctctctct gtctccccac aatctccctg tgactgtggg 26460
 aagggacacc ccaaggccca tgggatgctc ttgactcctc attccccgca ctagtctctc 26520
 ccaaccctct gctcccctgt ctacttctct aggtccttct gtgaggaaaa caatccatga 26580
 taactttata gacaaacaga caccaaaacc tgcgtttctt gggttttaca agagcaagag 26640
 30 ggccaggctt gctcaggggc gccccctggc ggtgcctcgt cccccaccgg cctgctgagg 26700
 ctgggggaaac atggctcggg ggtgggggct cccaactctg tctgcctcag gaccagctca 26760
 ctctccgcaa catgactgag taccctaaag agtttttctt tatacaggtt atagactctat 26820
 acttgacgca ttagaaattg aaacaaaatt ttaaaatggt tattaattct tttaatataa 26880
 35 ttataagccc attacacatt tgaatataaa taacattcta tgaaaattag ttgcatcctc 26940
 caaaagtaaa aacatttagt gacaagagtg ctgtcatttt acatttttctt acatttcttt 27000
 aacaactggc ttcacagact acaggcggga ccttcgaatc tgcctccgag ttcaatcagt 27060
 cccgatgtca cacatcagtc tctggaaaaac tgcctgtca ccttatgaga gaatgagggc 27120
 aaaaaaggca aatgatctct gagtgtaact ataaacatga cttttggacc ccagggggtc 27180
 cctgactgtg gctttgagaa ctgctggttg gtgtaagggt aagatcgtgg tccctgtggc 27240
 40 cagatagact taggggggtg ccagagtcta ggcaggcgt gtggaggaca tgggctatgt 27300
 agggggctca gacctcagag ctctgttgc agtgggaatt cggagccctc cctcaagca 27360
 agctaggtga gctctctggt gtctgaggc aagattctgg ctccacctg gctcctgcac 27420
 tcttgagcct catctgtaa atgggatgag agcaattcct cctccctgg gtggagggtc 27480
 tgcttgaacc tcagaatccc cgtgcaatga ggccttgtga tgccatagcc aatgaggctc 27540
 45 agccccagcc acacacctgg agatgttaa acagcctcaa agctcatctt cagctgttctg 27600
 gtggctaagg aattgattaa cttattgaac ggttaagtgc ttaccacatt ctagaagttc 27660
 tggggaagtg cctggccctt gggaatcatg gccggctccg caggggtgtg gatttgcctg 27720
 gggatgtccc cactggcctt caggggcatt cctgatctc tctggatttc catctgcttt 27780
 ctctgccagg ggcattttca gctctccctg cagattttca acctgcacct tgagtgtgtt 27840
 50 tccccatct gcaaagcact ctgatattgt ctgtggaggg catttctatg agctgatgaa 27900
 gctgtcccca tctgttctgc aagggtgtcc cacctgggat gaaaaggaa ccccggtctc 27960
 tgtggaggga gggctccact gtccctgggg agtggctgca cccactctgt gaagtcatgc 28020
 cgctgcccac ttgctctgtg ggggtgagggt caccggactc tctgcaggag gaaccctctg 28080
 cccctgccc tggagatggg agggctccta cctgttctct ggtaggagag aaagactcag 28140
 55 cctctctgga gattccccc cctgctctgt ttgaacaac gtatcttctt ggtgggtgga 28200
 tggcaggggg gcaggggcgg tgttgtccag cagggatgtg aggggtctcc cacagctggg 28260
 ggtggtccca cccctgtgtg ccatgcacag agaaggtgct gccatcagc actaagctac 28320
 tggatcatgg agaaggactg gtcttccct caagcccaca gtgtcacagg gaggcaggag 28380
 ggttgggtgcc taaatgggga gcaactgctc cccctcgtcc cacaccaagc tcaaggcaga 28440
 60 tgaccgtgca catctgtgga cagtggggca gtcaaggctc tttgcctcaa ctgacacatt 28500
 gaagcctttt gtcagattca agatcaacag aaataatttt tctttcttt ctttctcttt 28560
 ttttcttttt ttttcttttt tctttccctc cctctctccc tttctttctt tcttctctc 28620
 tttcttcttt ctttctttct cctttctttt ctcttctttt ctttcttttt ccttctctc 28680
 ctctctctct tcttccctc tctcttctct tcttaccctc tgtctctttt tttcttttt 28740
 65 tgacgtactt tcttctttat tgcccaggct ggagtgcaat ggcacgatct cggctcaccg 28800
 caacctctgc ttctggggtt caagcgattc tctgtctca gcctcccgag tagctgggat 28860

ES 2 761 343 T3

	tacaagcatg	tgccaccatg	cctggcta	tttgtat	tagtagcaac	ggggtttctc	28920
	catgttggtc	agtctggtct	cgaactcccg	acttcagggtg	atccacccac	ctcagcctcc	28980
	caaagtgctg	ggattatagg	tgtgagccac	tgcgcccagc	caatttttct	tgttttataa	29040
	gggaggaagg	tgaggctcaa	agaaggacc	tgacttgcta	gaacctcaca	gttcacaggt	29100
5	gactgtgact	agaattgagt	tttttatctg	gcaggcaatg	gggagccatt	gaagat	29160
	gagcagggca	gtggcatagc	caggctagtt	tctagaagat	gactctgggg	gtgcactcat	29220
	ctaagggaga	aatcagggca	gaggaggcac	agcgggctg	cagctcccc	tgcccctctg	29280
	gctgcctgtc	cttgcctctg	ctgtgcacgg	gaccaggag	accagccagt	gcagccctga	29340
10	gtcgtctctg	actccccca	ggctgtgtgg	cttgcgcac	ctgcagccct	acgccgagag	29400
	gatccccgtg	gtggccacgg	ccgggatcac	catcaacttc	acctcccaga	tctccctcac	29460
	cgggcccggg	gtgcccgtgc	actatggctt	gtacaaccag	tccgaccgtg	agtatgggca	29520
	gcccggggaa	ccccctgcag	tgactcgtctg	cctcttgccc	atccctggaa	ccaccaaggg	29580
	ggctgtgggc	agctgcttat	gaggctgaac	aaaaggagag	agagagtgtg	tgtgtgtgtg	29640
15	tatgtgcttg	cacaaattta	tgcagctttg	tgtgcccacg	tgtgcaaggc	agccacaagg	29700
	gtttgcagga	atacacactc	atacatatcc	acgtgtgtgt	tgtgtattct	gtgtgtgtgt	29760
	ctggatatgt	atgtctgctt	ggactgtgta	cacagggtgc	caggaccacg	tctgtgggtg	29820
	cctgtccatg	cgctgtgag	tgaacaggtg	catcgctgtc	tttgtgccc	ttcgcggcta	29880
	cgcatggcct	aatggcggcc	tgccctgctc	cacggtcccc	tgtggttttg	cagcctgccc	29940
20	tggagagttc	ctctgttctg	tgaatggact	ctgtgtccct	gcctgtgatg	gggtcaagga	30000
	ctgcccacac	ggcctggatg	agagaaactg	cgggtgagtaa	cccgcctcgg	catccctcct	30060
	ctccctgccc	atcccttctc	cttcctcacc	tttcctgctc	tgagctgagt	ggagaccca	30120
	cttctacatg	cagcttccat	tatgagcacc	caggaagtgg	ggttctctca	ctgtgccggg	30180
	gtggcaaaat	gagacagacc	agcaatgcag	cctccccgag	accacctcgt	gggacagtgg	30240
25	cagggagaag	tggggagcca	ggtctcctga	cttcagctc	agggccatca	ccccagccc	30300
	ctgtcccagc	cagcctcca	ggaaggaaca	gaatgggtga	gggagatgtc	cccctcctct	30360
	gccctgtcaa	aggtttaaat	atgtgggaag	agggaaagcga	gatgttcatg	gtgggggat	30420
	gatcctgcc	cgggtgctgg	ggaggtacct	catattcaga	aactgaacat	ctggcttcaa	30480
	gttctggctc	agccaagtga	ccttggacaa	gtcacctcat	ctgtttccac	cagtgaatg	30540
30	gggtatctca	cagggttgct	gtgaaacttt	gggtgtaaaa	tagcagagaa	agaggccggg	30600
	cgcagtggtc	catgcctgta	atcctagcac	tttgggaggc	ggagtgcgagc	ggatcacctg	30660
	aggtcaggag	ttcaagatca	gcctggccaa	catggtgaaa	ccccgtctct	actaaaaata	30720
	caataattag	ctgggcgtgg	tagcaggagc	ctgtaattaa	tctcagctac	ctgggagtct	30780
	gagggcaggag	aatcgcttgg	acctgggagg	ttgcagtgtg	atcatgccat	cgactccag	30840
35	ccttcgtgac	aagagcgaga	cataaaaata	aagtagcaga	gaaagagatt	tgtgattggt	30900
	aacgtgcaat	acagcacacc	ttctacaggc	atcgccaagc	cccggctggc	tcctctggct	30960
	tcctcccacc	tgtcccctct	ctgtgtcccc	acacagtttg	cagagccaca	ttccagtgca	31020
	aagaggacag	cacatgcatc	tcactgccc	aggtctgtga	tgggcagcct	gattgtctca	31080
	acggcagcga	cgaagagcag	tgccaggaag	gtagggcagg	cctagccgag	tgtctggagg	31140
40	gacaccaaag	gcagtctagg	cctgctacat	gcttcagcaa	aagtttctag	cttctcctct	31200
	caacacccac	caaccctctc	gtatttacct	ctgtatgtct	gtccattcat	ccatccatcc	31260
	atccatccat	ccatccatcc	atccatccat	ccatcttctg	gtctccaate	accgctctg	31320
	cattgattca	tacagctacc	catttatcta	tgcactact	gacctgtgca	accatcaate	31380
	tcctatcat	caaactgtca	atctacccat	ttattggttt	ggctgactac	tggctctatat	31440
45	ggccactggt	ccatccatcc	atccatccat	ccatccatcc	accaccccat	ctacccccc	31500
	accatccac	ccatccatca	tccatccgctc	catcatccat	ccatccatca	tcogtctatc	31560
	catccatcca	tccatccatc	atccatccat	ccacccatcg	tccatccgctc	catcatccat	31620
	ccatccatccc	atcatccatc	catcatccat	ctatccatcc	atcatccttc	cacccatccg	31680
	tcctccaccc	atcgatcatc	catctgtcca	tcatccatcc	atacatcatc	catcatcca	31740
50	tccatccatt	catccatcca	tcatccatgc	atcatccatc	catcatccat	ccatccatcc	31800
	atcatccgctc	tatccatcca	tccatccatcc	atccatccat	ccatcatcca	tcogtccatc	31860
	atccatccat	ccatcatcca	tctatccatc	catccatccg	tccatcatcc	atccatccat	31920
	catccatcca	tcatccatcc	gtccatcacc	catccatcca	tcatccatcc	atccatcatc	31980
	catccatcca	tcatccatcc	gtccatcacc	catccatcca	togtccatca	tccatccatc	32040
55	catccatcat	ccatccatcc	atcatccatc	catccatcca	tcatccatcc	atccatccat	32100
	catccatcca	ttcatccatc	atccatctgt	ccatcgtcta	tccatccatc	atccatcatc	32160
	catccatcca	tccatccatc	catccatccat	ccatccatcc	atcatccatc	aatccatcaa	32220
	tccatcatcc	atccatccat	catccatoga	tccatcatcc	atccatccat	gcacccatcc	32280
	atcatccatc	catccatcca	tcatccatcc	atccatccat	catccatcca	tccatcatcc	32340
60	atccatccat	catccatcca	tccatgcaac	catccatcat	ccatccatcc	atccatccatc	32400
	catccatcat	ccatccatcc	atccatcatc	catccatcca	ttcatccatc	atccatccat	32460
	ccatcatccg	ttcatccatc	atccatccat	tcacccatca	tccatccatc	catcatccat	32520
	ccatcatccg	tccatccatc	atctgtccat	catccatcca	tccatcatcc	atccaacat	32580
65	ccatcatcca	tccatccacc	atccatccat	tcatccgta	gccatccatc	catccatgca	32640

ES 2 761 343 T3

	cccatccatc	atccatccat	ccatccatcc	atcatccatc	catcatccat	ccatcatcca	32700
	cccatccatc	atccatccat	ccatctaccc	atccatccac	ccatccatcc	acccatccac	32760
	tgatctccct	agccccctgt	ctgtccactg	gtccttatat	ccacacgttt	atccaacctt	32820
	ctagctgtct	gtcagctctcc	ctaatggacc	accactccac	ccattggctt	gtctgctcag	32880
5	tcttctgtct	gggtctatth	atccatccat	ccatctaccc	atccaactga	ccaactgacc	32940
	aacacttgca	ggctaccag	cgataggcaa	ggtgcagtaa	ggaagtgaga	ataaaacagc	33000
	agagatgcag	gccctgcctt	ccaaggctca	tctgtagta	ggaggatatg	atgggtgact	33060
	ctcctgcctt	gtaggaagat	tggagggcag	ggagggggtc	agacatgaaa	agcttcctgg	33120
	aggaggtagg	tgtttggccc	ttggtgagag	ctaaaactta	aataggcagg	aggaaaggag	33180
10	agaggcaaag	accaagtgg	ggagtggaaa	gttctttaca	gtgaagagca	gggaggaaaa	33240
	tgtggacaac	cgggcagggc	cagagcctgg	gagattgcca	ggctaggtgc	ggaccctggt	33300
	ctaaaagtgg	aggcacagtt	ctgccttcaa	gttccacact	ggagggggag	gcatgatctt	33360
	gtggtcagga	tctccagctc	gagaatggag	acaccacttt	gtgctcaata	ggccagtctg	33420
	agtggagggg	ctgtgggggg	cggggggaca	tggcctgctt	ttaggagacc	ctaaaggaca	33480
15	ctcaggaaaa	gactctctag	tcacctcctg	gctcttctgg	ctccatcgtt	ccatgcacct	33540
	actttggaag	gtttccttgg	ggctcagaga	cccaccttct	gtgccctgcc	cccatccctt	33600
	ctgtcccagg	ggtgccatgt	gggacattca	ccttccagtg	tgaggaccgg	agctgctgta	33660
	agaagcccaa	cccgcagtgt	gatgggcggc	ccgactgcag	ggacggctcg	gatgaggagc	33720
20	actgtggtga	gccctgcctg	gctgccgggg	ccctggagct	tgggagggag	ggggtgcccc	33780
	cagcaggaag	ctggagggaa	atctcactgt	tgtcccctgg	tctctctcta	tctcatcctc	33840
	tgcccccttg	cctgggtcct	gatggtctct	ccccctccat	cattctcctg	ttctctgtct	33900
	ctccatctct	ttcctttgcc	cttccctctc	gtctgcttct	ccccttcccc	tcctcctctg	33960
	tccaccocac	cacctgcctc	catccccaga	ctgtggcctc	cagggcccct	ccagccgat	34020
	tgttgggtgga	gctgtgtcct	ccgaggtgga	gtggccatgg	caggccagcc	tccaggttcg	34080
25	gggtcgacac	atctgtgggg	gggccctcat	cgctgaccgc	tgggtgataa	cagctgcccc	34140
	ctgcttccag	gaggacaggt	gagcgggagg	gtgtgggggc	ctaggcagta	agagacaagg	34200
	gcagggaaag	cccgggtggga	ggtgcactgt	gtctgagctc	tttgagata	gagggaaagg	34260
	tggtggacc	cccagacag	ctactgtgat	gtgagttcta	gtcctggctc	caccaggacc	34320
30	ttctgggtcc	cgggacacat	tgttccacct	ctctgccatc	tacttttgg	atcttgcttt	34380
	aagttggggc	agtaattcat	tcattcatct	cattcactca	ttcagcaaca	cttgtgtccc	34440
	tactatgtgc	cagggctgtg	ctagatgctg	gggattcagt	aaaggacaga	actgccccac	34500
	ctggtcataa	gctatgacac	tccccgaggt	gtgacacgag	gtagcaggtg	gggtggggga	34560
	gccccaggg	gacatctcat	caggcctcat	ggccatcttt	cccatctgct	tgggtgggtg	34620
35	aaacctccc	caatccacct	ccagacagat	ctgggctcca	gatcccggcc	ccaggccctg	34680
	cacagggatc	cccttttgta	tcctctctgg	gacgcagggc	gctctgacca	cctagctctc	34740
	tttaacccca	tctcaggtc	cccactgccc	tcaggtagag	ggtagagacc	cgaaggctgc	34800
	ccatctgcc	cccaggcagc	tgactgccgc	agtccaattc	ctccacgctc	aactcccacc	34860
	cgctccccac	taggaccac	cagcctcagg	gaattcagag	cagcctgggt	ctgtaaagca	34920
40	cacaggaaaa	aagaaatctg	tgtcgggggc	ctggcactgt	gtacatctt	ttagctacac	34980
	ggtcttattg	gattctctca	agaacattcg	agtagaaaat	gccattccca	tttgcatatg	35040
	aggtggcaga	ggcttagaga	ggcacaccca	tgtctagggg	gggatgaagc	tggggcgtgg	35100
	aaccaggca	ggccgagtg	gtgaaggctg	aacgctgtac	caccagctag	gcgaccttca	35160
	gggagggaa	ggagggctgg	gtgtggaggg	cactgtccc	ggcggggatc	tggctatctt	35220
45	gagggctcct	ggatggggag	aggcagcttc	ctcccacctc	acctcacc	accccccccc	35280
	accccccccc	accccagcat	ggcctccacg	gtgctgtgga	ccgtgttctt	gggcaagggtg	35340
	tggcagaact	cgcgctggcc	tggagaggtg	tccctcaagg	tgagccgctt	gctcctgac	35400
	ccgtaccacg	aagaggacag	ccatgactac	gacgtggcgc	tgctgcagct	cgaccacc	35460
	gtggtgcgct	cggccgcgct	gcgccccgct	tgcctgccc	cgcgctccca	cttctctcag	35520
50	cccggcctgc	actgctggat	tacgggctgg	ggcgccttgc	gcgagggcgg	tgagcagcgg	35580
	ggacttgcgg	cgggagggcg	agggagaccg	tggggatctg	cgccgtaaca	cctggcctgg	35640
	agaagggcgg	ggctgggggt	cccggggctc	caccccatag	gccctctagt	gctgggatc	35700
	aaattgggct	gaattttacg	gtagaaaacc	accatttaat	gcgccctgta	ggccccctgc	35760
	cctcccctcc	tagctcttcc	cttccctctg	gaaggcggtt	atgtgtgggg	caaaggggca	35820
55	ggtctgggac	gccactgccc	acgtgcaagc	tccacctgct	gttccctggg	gtgcaagggt	35880
	ggaaggctct	taattactag	cacttccac	atccaggctg	gattttagg	caacttgact	35940
	tcatataatc	cacccaacag	ccctacgggc	ggatgctgtg	gccctatctt	atggatggag	36000
	aaaccaaggc	tcagagacat	gttgcctgta	gtcacacagc	cagagaggac	tggagcaaa	36060
	attagaacct	agggctggct	gcctccagag	cccctgctct	tcctgctact	gctctcagaa	36120
60	acagggctct	tcccctttct	acgttccactg	accagagctc	ctggcggcca	ccgcacagtt	36180
	ttggggacac	agaccagct	ggcaaaccta	cagacatgcc	ctgcagcgtt	agtgttgggtg	36240
	gcttcaaaaa	tgtgtacagt	gacttacaat	ctggaagcag	gcgggggcgc	agagatattt	36300
	taaggatggg	gaaactgagg	ctcagaggaa	cagtgactta	cccaagggga	tggcagtggt	36360
65	catggcaaa	caaaggctgg	ttcattcact	attccttcc	tcattcagtc	actcaatgac	36420

ES 2 761 343 T3

5 actttctgag caccaagtac gtaccaggcg tggggttagg ggaagggtac ataaggatga 36480
 agagagaaca ttctcggggg agacagacag tggtaagagc tgacatggat ggggagatgc 36540
 aggaacagtg gagacacaga ggaggctcct gccagactag ggtcagggga ggcttccagg 36600
 ggagggttgt ttaagctgag gcctggaaga tgagttggca acattcagac aaaggggaaa 36660
 gacattcagg tgaagacaca ggtgccaaaga caggaagatg tgagaacatc cgcagcctgc 36720
 cagaggggct gaggtggggg gcaggcgtgc ctgggcgagg agcaaccaga atggcagaca 36780
 gggccttggg cgaggagcaa ccagaatggc agacagggcc ttgccggcca gcataaggat 36840
 cttaggccag gagttctccc tcctacctgc acctagAAC catacgggga gtttcaagaa 36900
 10 aaactgcgta tcaaggctcc ccgggggact gtgatatgca gccctcgtgg agaagcgcta 36960
 gggcagactg cagagttggg gcactgcaga gttctaagga aacctatgaag ggatcagatg 37020
 tgggcttcgg agacatctgc aggtgctgta acagagcagc gaggagccag ccagagccca 37080
 gaggtgcctc agcagacaga ggtgggggac aagaagctgg aggaagacac tcatccacac 37140
 gggctttttt cttttttctt ttttttgttt ttttgagaca gattttcgct ctgtttgccc 37200
 15 aggtcggagt gcaatggcgc gatctcggct cctctcccgg ttcccggg ttcaagcggt 37260
 tctcctgcct cagcctcctg agtAACTGGG attacaggca tgtgccacca caccagcta 37320
 attttgtatt tttagtacag acagggtttc tccatgttgg tcaagctggt ctcaaactct 37380
 tgacctcagg tgttccgctc gcctcagcct cccaaagtgc tgggattaca ggcatgagcc 37440
 accgtgcccg gccctccaca tgggctttgg tcgggggctg tcaccatgaa cccacagag 37500
 20 aaagagctag aataaagtga cagggaggca gaggggagcag tgcgacccta gcaggggtaa 37560
 gggtagggcag agcaggagag aagtaggctc ctgagatgca aagggataaa tgttagggag 37620
 aatagagaac aggggctcca ggctcctgag atctcacttc tgcccttgac cacggacagc 37680
 ccccatcagc aacgctctgc agaagtggg tgtgcagttg atcccacag atcctgtgag 37740
 cgaggctatc cgctaccagg tgacgccacg catgctgtgt gccgctacc gcaagggcaa 37800
 25 gaaggatgcc tgtcaggtga gtccccggg catgggaggg agagaggagg gagaaaggat 37860
 gctgccaca tcaccagggt ctggcccttt gctcacatca gcctgctgaa gcctcccatc 37920
 ctcccagcaa ggtggtgatg gccacccta ctttacagaa gaggagactg gggcttagaa 37980
 aggttgagga gcttgcccaa ggttgccagag ccacagatca gaagagatgc tgtgatgggc 38040
 aggtgttagg ctcaaaccct gttctgctcc ttgcccacca caaggcacta ggcccagggt 38100
 30 cccacagtga ggtggatgca tggagaaga aaggggtgtc agccacagaa gggagggcga 38160
 ggcagagtgg gggcgtgggg acacagccac agttccagga ggtcccagg tgctgtgagg 38220
 ccggggaggg ctgcttggg ctctctccat tttagcaggc aggggaaagc agagctttaa 38280
 gactgaacgt gactctggca cccagtcaat tcccaacagt caggacttaa tccctatggc 38340
 35 tcttcaoctg gaaaaggggg tgcccttacc ctgcttcagt cctttctcct tcccccttt 38400
 cagggtgact caggtggtcc gctggtgtgc aaggcactca gtggccgctg gtctcctggc 38460
 gggctggtca gctggggcct gggctgtggc cggcctaact acttcggcgt ctacaccgc 38520
 atcacaggtg tgatcagctg gatccagcaa gtggtgacct gaggaactgc cccctgcaa 38580
 agcagggccc acctcctgga ctcagagagc ccagggcaac tgccaagcag ggggacaagt 38640
 40 attctggcgg ggggtgggg agagagcagg cctgtggtg gcaggaggtg gcatctgtc 38700
 tcgtccctga tgtctgctcc agtgatggca ggaggatgga gaagtgccag cagctggggg 38760
 tcaagacgtc ccctgaggac ccaggcccac acccagccct tctgcctccc aattctctct 38820
 cctcogtccc ctctctccac tgctgcctaa tgcaaggcag tggctcagca gcaagaatgc 38880
 tggttctaca tcccaggag tgtctgaggt gcgcccact ctgtacagag gctgtttggg 38940
 45 cagccttgcc tcagagagc agattccagc ttcggaagcc cctggtctaa cttgggatct 39000
 gggaaatggaa ggtgctccc tccgagggga cctcagagc cctggagact gccaggtggg 39060
 cctgctgcca ctgtaagcca aaaggtgggg aagtctgac tccaggtccc ttgcccacc 39120
 cctgcctgcc acctggccc tcacagccca gccctcact gggaggtgag ctcagctgcc 39180
 ctttggaaata aagetgcctg atccaagccc cgctgctgga gtttgaatgg gaccagga 39240
 50 ccagcctcat gcccttgact ggagcagccc ctgcttctg ctccagcctgt ttgacaagtg 39300
 tccagaaggc caaggtgggc tcagtggcag tgggcgtggc cactgagggc tggggcctgc 39360
 agggcagctg cccaggtccc agaagaaatg ccaggaaggc aatcatttgg ggacctcag 39420
 gtcagagggg tgtgaggagc aatcgtctcc ttttggaaac ttaggaggaa actgaggctc 39480
 agagaggcgg ttaagacatc ctcatagtgg cactgggggt taggagtgga ggtggcatag 39540
 55 actcctgtct cccagctccc tgtctgcaa gggcccgtcc agtgcgacac tcccttctct 39600
 tgcattcttt gagccactga ataaagcctt gggctccaac catgtgccag cactatgctg 39660
 gggccacagg ggtgaaggac ctggctcctg acccaggag cagtggggat gatccagtgg 39720
 gaaggggccc gaggggagcg tggactgggc aagtcaaggc aagctgcctg gaggtgtgga 39780
 gacttgagct ggggttcaga ggtggtccag gtgggaatat cgggaaagga tattccaggc 39840
 60 agggaaagagc acgtgcaaag gcacagtccc ggaagaatga ggcacgctag gaccagcaa 39900
 gccgagtgag tgttagaaca gagctcgaga ggatgactca agaattcaga ggggcgaact 39960
 gaggggggat agcagagcct ggggttgagc caaggatttg atcttgaag ctctggggag 40020
 ccacggttgg ctctatagca taggagtgac atgagaggat tcacattttg caccagcct 40080
 tggcaccagt gtcagggag cggcagggcag taggagctgt taggaggcca ccagcagatt 40140
 65 ccaggatgga gaggatgggc cgggactgag cagcgcctat ggatggactg gaggatgatt 40200

ES 2 761 343 T3

5 ttagaccct gggggcagtt gtgatggagg cagggggctc gctggaggtg aggggtggacg 40260
 gtcaagtgtg gacaactctt tctagacgcc taactgggag cggaagggag agagggagct 40320
 tcagaggggc cccagactga agaggggttt ttccaacatg ggcgctgctg ccaggtctgt 40380
 gggatgaatga ggcagaaggg gaaccagggg cggggagcac ccacctgggt cctgccagga 40440
 cgagccggag cagctgggtg ggcagggagc gtctccagag caggtgggca gaacacatgc 40500
 agaatacctt gggatgatctg gaatcaccct gggccctacc tcagtcttca tcggaatcct 40560
 ggagggcggg ggacgtgtca tctgttctcc taacaagcct cctgggtgact cttttgcaag 40620
 10 gatagttgga ccctaaaaat ggtccagct ttggagtgga gtgtcctcag ggaagtggc 40680
 gagccctcc aggcttgagc tggcaagagg gtgccccgc cccagcctgt ggaaggcctg 40740
 cgcttaggg gctcactgcc cggcaggatt tcctcgagca gcggggagga ctgaggagt 40800
 gaaggaactg gccaggggtg gtggagggtc tgggtctgg gctgggtcca gcagggcag 40860
 agaagggaga gggcgggtg tttatatttc ctaggatttt ggcagaggg gtggcagcaa 40920
 15 tagggagggg tggcgggtgg ccaggtgtca gtagagaagt ggagggggcg cgctgagagg 40980
 tttaggatgt ggcagaggca gccagggct ctccctagag ttctgttttc tggctcccg 41040
 ccaggtaggg caggtgctct ggtatccggc cccagggcaa aggatatagc cagttcccca 41100
 agccctccct gcaacacaca caggaaaatg acaacagggc agcgtccctg ggcttttggg 41160
 20 acaaagccgc gttcctttgg accagactac cacacctta gtttagcccc gtccccaaaa 41220
 gtggcccaga gaaagagggc aacagccagg c 41251

<210> 4

<211> 2691

<212> ADN

25 <213> Homo sapiens

<400> 4

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 761 343 T3

ggacaaacag aggctcctga ggcctgtgtg caggcccggc acctatctgc cactcccaaa 60
 ggatgcccggt ggccgaggcc ccccaggtgg ctggcgggca gggggacgga ggtgatggcg 120
 aggaagcggga gccagagggg atgttcaagg cctgtgagga ctccaagaga aaagcccggg 180
 5 gctacctccg cctggtgccc ctgtttgtgc tgctggccct gctcgtgctg gcttcggcgg 240
 gggtgctact ctggtatttc ctagggtaca aggcggaggt gatggtcagc caggtgtact 300
 caggcagttc gcgtgtactc aatcgccact tctcccagga tcttaccgc cgggaatcta 360
 gtgccttccg cagtгааacc gccaaagccc agaagatgct caaggagctc atcaccagca 420
 cccgcctggg aacttactac aactccagct ccgtctattc ctttggggag ggaccctca 480
 10 cctgcttctt ctggttcatt ctccaaatcc ccgagcaccg ccggctgatg ctgagccccg 540
 agtggtgca ggcagtgctg gtggaggagc tctgtccac agtcaacagc tccgtgcccg 600
 tcccctacag ggccgagtac gaagtggacc ccgaggcct agtgatcctg gaagccagct 660
 tgaaagacat agctgcattg aattccacgc tgggttgta ccgctacagc tacgtgggcc 720
 agggccaggt cctccggctg aaggggcctg accacctggc ctccagctgc ctgtggcacc 780
 15 tgcagggcc caaggacctc atgctcaaac tccggctgga gtggacgctg gcagagtgcc 840
 gggaccgact ggccatgat gacgtggccg ggcccctgga gaagaggctc atcacctcgg 900
 tgtacggctg cagccgccag gagcccgtgg tggaggttct ggcgtcgggg gccatcatgg 960
 cggtcgtctg gaagaagggc ctgcacagct actacgacc cttcgtgctc tccgtgcagc 1020
 cggtggtctt ccaggcctgt gaagtgaacc tgacgctgga caacaggctc gactcccagg 1080
 20 gcgtcctcag cccccgtac ttcccagct actactcgc ccaaaccac tgctcctggc 1140
 acctcacggt gccctctctg gactacggct tggccctctg gtttgatgcc tatgactga 1200
 ggaggcagaa gtatgatattg ccgtgcacc agggccagtg gacgatccag aacaggaggc 1260
 tgtgtggctt gcgcatcctg cagccctacg ccgagaggt ccccggtggt gccacggccg 1320
 25 ggatcaccat caacttcacc tcccagatct ccctcaccgg gcccgtgctg cgggtgctc 1380
 atggcttgta caaccagtcg gaccctgcc ctggagagtt cctctgttct gtgaatggac 1440
 tctgtgtccc tgctgtgat ggggtcaagg actgccccaa cggcctggat gagagaaact 1500
 gcgtttgcag agccacattc cagtгcaaag aggacagcac atgcatctca ctgccccagg 1560
 tctgtgatgg gcagcctgat tgtctcaacg gcagcgacga agagcagtc caggaagggg 1620
 30 tgccatgtgg gacattcacc ttccagtgtg aggaccggag ctgctgaag aagccccacc 1680
 cgcagtgta tgggcggccc gactgcaggg acggctcggg tgaggagcac tgtactgtg 1740
 gcctccaggg cccctccagc cgcattgttg gtggagctgt gtcctccgag ggtgagtggc 1800
 catggcaggc cagcctccag gttcggggtc gacacatctg tgggggggccc ctcatcgctg 1860
 accgctgggt gataacagct gccactgct tccaggagga cagcatggcc tccacggctg 1920
 35 tgtggaccgt gttcctgggc aaggtgtggc agaactcgc ctggcctgga gaggtgtcct 1980
 tcaaggtgag ccgcctgctc ctgcaccctg acccgaaga ggacagccat gactacgac 2040
 tggcgctgct gcagctcgac cacccggtgg tgcgctcggc cgcctgccc cccgtctgcc 2100
 tgcccgcgcg ctcccacttc ttcgagcccg gcctgcactg ctggattacg ggctggggcg 2160
 40 ccttgcgcga gggcgccta cgggcggatg ctgtggccct attttatgga tggagaaacc 2220
 aaggctcaga gacatgttgc tgccccatca gcaacgctct gcagaaagtg gatgtgcagt 2280

tgatcccaca ggacctgtgc agcgaggtct atcgtacca ggtgacgcca cgcattgctgt 2340
 45 gtgccggcta ccgcaagggc aagaaggatg cctgtcaggg tgactcaggt ggtccgctgg 2400
 tgtgcaaggc actcagtggc cgctggttcc tggcggggct ggtcagctgg ggcctgggct 2460
 gtggccggcc taactacttc ggcgtctaca cccgcatcac aggtgtgatc agctggatcc 2520
 agcaagtggg gacctgagga actgcccccc tgcaaagcag ggccacctc ctggactcag 2580
 agagcccagg gcaactgcca agcaggggga caagtattct ggcgggggggt gggggagaga 2640
 50 gcaggccctg tgggtggcagg aggtggcatc ttgtctcgtc cctgatgtct g 2691

<210> 5
 <211> 1732
 <212> ADN
 <213> Homo sapiens

55 <400> 5

60

65

ES 2 761 343 T3

5
 10
 15
 20
 25
 30

```

gttcttgagc cagacccagt ccagctctgg tgcctgcct ctggtgagag ctgacctgag 60
atgcaactcc ctctctgtg agctgtctcg gcacccactt gcagtactg ccgcctgatg 120
ttgttactct tccactccaa aaggatgccc gtggccgagg cccccaggt ggctggcggg 180
cagggggacg gagtgatgg cgaggaagcg gagccagagg ggatgttcaa ggcctgtgag 240
gactccaaga gaaaagcccg gggctacctc cgctggtgc ccctgtttgt gctgctggcc 300
ctgctcgtgc tggcttcggc gggggtgcta ctctggtatt tcctagggtg caaggcggag 360
gtgatggtca gccagtgta ctcaggcagt ctgctgtac tcaatcgcca cttctcccag 420
gatcttaccg gccgggaatc tagtgccttc cgcagtgaaa ccgccaagc ccagaagatg 480
ctcaaggagc tcatcaccag caccgcctg ggaacttact acaactccag ctccgtctat 540
tcctttgggg agggacccct cacctgcttc ttctggttca ttctccaaat ccccgagcac 600
cgccggctga tgctgagccc cgagtggtg caggcactgc tgggtggagga gctgctgtcc 660
acagtcaaca gctcggctgc cgtcccctac agggccgagt acgaagtgga ccccgagggc 720
ctagtgatcc tggaaagccag tgtgaaagac atagctgcat tgaattccac gctggggtgt 780
taccgctaca gctacgtggg ccagggccag gtctccggc tgaaggggccc tgaccacctg 840
gcctccagct gcctgtggca cctgcagggc cccaaggacc tcatgctcaa actccggctg 900
gagtggacgc tggcagagtg ccgggaccga ctggccatgt atgacgtggc cggggcccctg 960
gagaagaggg tcatcacctc ggtgtacggc tgcagccgcc aggagcccgt ggtggaggtt 1020
ctggcgtcgg gggccatcat ggcggtcgtc tggaaagagg gcctgcacag ctactacgac 1080
cccttcgtgc tctccgtgca gccggtggtc ttccaggcct gtgaagtgaa cctgacgctg 1140
gacaacaggc tcgactccca gggcgtcctc agcaccctgt acttccccag ctactactcg 1200
ccccaaacc actgctcctg gcacctcagc gtgccctctc tggactacgg cttggccctc 1260
tggtttgatg cctatgcact gaggaggcag aagtatgatt tgccgtgcac ccagggccag 1320
tggacgatcc agaacaggag gtaccacttc ctctcctccc tctggcttcc tttcctccct 1380
ccccctccct ctcttccctc ctcaacagtg acccctcat tggaaagcca agtccccaat 1440
ctcagagggg cagcaagggg agcagcaga ggctggggct ggtgtcaggc ctgctgcctt 1500
tgaccttgct ctctgcccga cctccgccct ggccccggct tcccctctgg ctacccccaga 1560
ggtctcagac acgtttggtc atcagacacc ttggatgttt attctaatta cagcaaaatt 1620
gtctcatctt cttgggtgct gtaacccccct ctggcaccct caatccttca ataaaatgtt 1680
tccagagcca aaggaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aa 1732
  
```

<210> 6
 <211> 3143
 <212> ADN
 <213> Homo sapiens

35
 40
 45
 50
 55
 60
 65

```

gagccaccta ccctgctccg agggcaggcc tgcaggcct catcggccag aggggtgatca 60
gtgagcagaa ggatgcccgt ggccgaggcc cccaggtgg ctggcgggca gggggacgga 120
ggtgatggcg aggaagcggg gccagagggg atgttcaagg cctgtgagga ctccaagaga 180
aaagcccggg gctacctccg cctggtgccc ctgtttgtgc tgctggccct gctcgtgctg 240
gcttcggcgg ggggtgctact ctggtatttc ctagggtaca aggcggaggt gatggtcagc 300
caggtgtact caggcagtct gcgtgtactc aatcgccact tctcccagga tcttaccggc 360
cgggaatcta gtgccttccg cagtgaacc gccaaagccc agaagatgct caaggagctc 420
atcaccagca cccgcctggg aacttactac aactccagct ccgtctattc ctttggggag 480
ggacccctca cctgcttctt ctggttcatt ctccaaatcc ccgagcaccg ccggctgatg 540
ctgagccccg aggtggtgca ggcactgctg gtggaggagc tgctgtccac agtcaacagc 600
tcggctgccg tcccctacag ggccgagtac gaagtggacc ccgagggcct agtgatcctg 660
gaagccagtg tgaaagacat agctgcattg aattccacgc tgggttggtta ccgctacagc 720
tacgtgggcc agggccaggt cctccggctg aaggggctg accacctggc ctccagctgc 780
  
```

ES 2 761 343 T3

	ctgtggcacc	tgcagggccc	caaggacctc	atgctcaaac	tccggctgga	gtggacgctg	840
	gcagagtgcc	gggaccgact	ggccatgtat	gacgtggccg	ggcccctgga	gaagaggctc	900
	atcacctcgg	tgtacggctg	cagccgccag	gagcccgtgg	tggaggttct	ggcgtcgggg	960
5	gccatcatgg	cggtcgtctg	gaagaagggc	ctgcacagct	actacgacct	cttcgtgctc	1020
	tccgtgcagc	cggtggtcct	ccaggcctgt	gaagtgaacc	tgacgctgga	caacaggctc	1080
	gactcccagg	gcgtcctcag	caccccgtac	ttccccagct	actactcgcc	ccaaaccac	1140
	tgctcctggc	acctcacggt	gccctctctg	gactacggct	tggccctctg	gtttgatgcc	1200
	tatgcactga	ggaggcagaa	gtatgatttg	ccgtgcaccc	agggccagtg	gacgatccag	1260
10	aacaggaggc	tgtgtggcct	gcgcatcctg	cagccctacg	ccgagaggat	ccccgtggtg	1320
	gccacggccg	ggatcaccat	caacttcacc	tcccagatct	ccctcaccgg	gcccgggtgtg	1380
	cggtgcaact	atggcttcta	caaccagtcg	gacccctgcc	ctggagagtt	cctctgttct	1440
	gtgaatggac	tctgtgtccc	tgcctgtgat	ggggtcaagg	actgcccaca	cggcctggat	1500
	gagagaaact	gcgtttgcag	agccacattc	cagtgcaaag	aggacagcac	atgcatctca	1560
15	ctgcccaagg	tctgtgatgg	gcagcctgat	tgtctcaacg	gcagcagatga	agagcagtg	1620
	caggaagggg	tgccatgtgg	gacattcacc	ttccagtgtg	aggaccggag	ctgcgtgaag	1680
	aagcccaacc	gcagtggtga	tggcgggccc	gactgcaggg	acggctcgga	tgaggagcac	1740
	tgtgactgtg	gcctccaggg	cccctccagc	cgcttctgtg	gtggagctgt	gtcctccgag	1800
20	ggtgagtggc	catggcaggc	cagcctccag	gttcggggct	gacacatctg	tgggggggccc	1860
	ctcatcgctg	accgctgggt	gataacagct	gcccactgct	tccaggagga	cagcatggcc	1920
	tccacggtgc	tgtggaccgt	gttcctgggc	aaggtgtggc	agaactcgcg	ctggcctgga	1980
	gaggtgtcct	tcaaggtgag	ccgcctgctc	ctgcacccgt	accacgaaga	ggacagccat	2040
	gactacgacg	tggcgctgct	gcagctcgac	caccgggtgg	tgcgctcggc	cgccgtgcgc	2100
25	cccgtctgcc	tgcccgcgcg	ctcccacttc	ttcgagcccg	gcctgcaactg	ctggattacg	2160
	ggctggggcg	ccttgccgca	gggcccggccc	atcagcaacg	ctctgcagaa	agtggatgtg	2220
	cagttgatcc	cacaggacct	gtgcagcgag	gcctatcgct	accaggtgac	gccacgcatg	2280
	ctgtgtgccg	gctaccgcaa	gggcaagaag	gatgcctgtc	aggggtgactc	aggtggtccg	2340
	ctggtgtgca	aggcactcag	tggccgctgg	ttcctggcgg	ggctggtcag	ctggggcctg	2400
30	ggctgtggcc	ggcctaacta	cctcggcgct	tacaccgca	tcacaggtgt	gatcagctgg	2460
	atccagcaag	tgtgtacctg	aggaactgcc	cccctgcaaa	gcagggccca	cctcctggac	2520
	tcagagagcc	cagggcaact	gccaagcagg	gggacaagta	ttctggcggg	gggtggggga	2580
	gagagcaggc	cctgtggtgg	caggaggtgg	catcttgtct	cgctccctgat	gtctgctcca	2640
35	gtgatggcag	gaggatggag	aagtgccagc	agctgggggt	caagacgtcc	cctgaggacc	2700
	caggcccaca	cccagccctt	ctgcctccca	attctctctc	ctccgtcccc	ttcctccact	2760
	gctgcctaat	gcaaggcagt	ggctcagcag	caagaatgct	ggttctacat	cccgaggagt	2820
	gtctgaggtg	cgccccactc	tgtacagagg	ctgtttgggc	agccttgctc	ccagagagca	2880
	gattccagct	tcggaagccc	ctggtctaac	ttgggatctg	ggaatggaag	gtgctcccat	2940
40	cggaggggac	cctcagagcc	ctggagactg	ccaggtgggc	ctgctgccac	tgtaagccaa	3000
	aaggtgggga	agtccctgact	ccaggtcctc	tgccccaccc	ctgcctgcca	cctgggcccct	3060
	cacagcccag	accctcactg	ggaggtgagc	tcagctgccc	tttggataaa	agctgcctga	3120
	tcaaaaaaaaa	aaaaaaaaaaa	aaa				3143
	<210> 7						
45	<211> 528						
	<212> ADN						
	<213> Homo sapiens						
	<220>						
50	<221> misc_feature						
	<222> 168, 433						
	<223> n = A,T,C o G						
	<400> 7						
55	aaaaaggcag	ggaagtccctg	cttccgtgcc	ccaccggctgc	tcagcagagg	ctcccttgca	60
	aatgcgaggc	tgtttccaac	tttggctctgt	ttccctggca	ggatgcccg	ggccgaggcc	120
	cccaggtggg	ctggcgggca	ggggacgga	ggtgatggcg	aggaagcngg	agccggagg	180
	gagttcaag	gcctgtgagg	actccaagga	aaaagcccgg	ggctacctcc	gcctgggtgcc	240
60	cctgtttgtg	ctgctggccc	tgctcgtgct	ggcttcggcg	ggggtgctac	tctggtat	300
	cctagggtag	aaggcggagg	tgatggtcag	ccaggtgtac	tcaggcagtc	tgctgtact	360
	caatcgccac	ttctcccagg	atcttaccgg	ccgggaatct	agtgccttcc	gcagtgaaac	420
	cgccaaagcc	canaagatgc	tcaaggagct	catcaccagc	acccgcctgg	gaacttacta	480
65	caactccagc	tccgtctatt	cctttgggga	gggaccctc	acctgctt		528

<210> 8
 <211> 20
 <212> ADN
 5 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético

 10 <400> 8
 aggcttccg ggtccacctc 20

 <210> 9
 <211> 20
 15 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético
 20
 <400> 9
 tttcttct acagagacc 20

 <210> 10
 <211> 20
 25 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético
 30
 <400> 10
 agccttgata gaggcacctt 20

 35 <210> 11
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 40 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético

 <400> 11
 gcttagagta cagcccactt 20
 45
 <210> 12
 <211> 20
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 50
 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético

 <400> 12
 55 tcaccaggcc ttcgggtcc 20

 <210> 13
 <211> 20
 <212> ADN
 60 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético

 <400> 13
 65 aggcatccta accaccagct 20

<210> 14
 <211> 20
 <212> ADN
 5 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Oligonucleótido sintético

 10 <400> 14
 ccttcctga aggtctcc 20

 <210> 15
 <211> 20
 15 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador
 20
 <400> 15
 attccacgct gggctgtat 20

 <210> 16
 <211> 18
 25 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador
 30
 <400> 16
 ctggcaggc ccctcaa 18

 35 <210> 17
 <211> 22
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial

 40 <220>
 <223> Sonda

 <400> 17
 tgaaccagg ccagtcctc cc 22
 45
 <210> 18
 <211> 24
 <212> ADN
 <213> Secuencia artificial
 50
 <220>
 <223> Cebador

 <400> 18
 55 tgcagaagag aaggaagaga gaca 24

 <210> 19
 <211> 24
 <212> ADN
 60 <213> Secuencia artificial

 <220>
 <223> Cebador

 <400> 19
 65 cactggga attgtacag catt 24

ES 2 761 343 T3

<210> 20

<211> 28

<212> ADN

5 <213> Secuencia artificial

<220>

<223> Sonda

10 <400> 20

caacttcccc atctgcatct tctgctgt 28

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

- 5 **1.** Un compuesto antisentido que comprende un oligonucleótido monocatenario modificado que consiste en 12-30 nucleósidos enlazados, en donde el oligonucleótido modificado tiene una secuencia de nucleobases que es al menos 95% complementaria a un ácido nucleico Tmprss6, y en donde el compuesto reduce la expresión de Tmprss6, para uso en el tratamiento de la talasemia en un sujeto.
- 10 **2.** El compuesto para uso de la reivindicación 1, en donde el uso del compuesto reduce la acumulación de hierro, aumenta los niveles de expresión de hepcidina y/o disminuye el porcentaje de saturación de transferrina en el sujeto.
- 3.** El compuesto para uso de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde el uso comprende terapia de flebotomía.
- 4.** El compuesto para uso de la reivindicación 3, en donde el oligonucleótido modificado:
- 15 (i) se administra antes de la terapia de flebotomía;
 (i) se administra durante la terapia de flebotomía; o
 (i) se administra después de la terapia de flebotomía.
- 5.** El compuesto para el uso de cualquier reivindicación precedente, en donde el oligonucleótido modificado es complementario a un 3' UTR, un 5' UTR, un exón, un intrón, una unión exón/intrón, una región de codificación, una región de iniciación de la traducción, o una región de terminación de traducción.
- 20 **6.** El compuesto para uso de cualquier reivindicación precedente, en donde el oligonucleótido modificado:
- 25 (i) tiene una secuencia de nucleobase que es al menos 95%, al menos 99 %, o 100% complementario a un ácido nucleico Tmprss6; y/o
 (ii) comprende al menos un enlace internucleosídico modificado, opcionalmente en donde el enlace internucleósido modificado es un enlace internucleósido de fosforotioato; y/o
 30 (iii) comprende un azúcar modificado, opcionalmente en donde el azúcar modificado es un azúcar bicíclico; y/o
 (iv) comprende una nucleobase modificada, opcionalmente en donde la nucleobase modificada es una 5-metilcitosina; y/o
 (v) consiste en 15 a 30, 18 a 21, 20 a 30, 20 a 29, 20 a 28, 20 a 27, 20 a 26, 20 a 25, 20 a 24, 20 a 23, 20 a 22, 20 a 21 o 20 nucleobases unidas.
- 35 **7.** El compuesto para uso de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el oligonucleótido modificado comprende:
- 40 un segmento de separación que consiste en desoxinucleósidos unidos;
 un segmento de ala 5' que consiste en nucleósidos unidos;
 un segmento de ala 3' que consiste en nucleósidos unidos;
- en donde el segmento de separación se coloca entre el segmento de ala 5' y el segmento de ala 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento de ala comprende un azúcar modificado, opcionalmente en donde el oligonucleótido modificado comprende al menos un enlace internucleósido de fosforotioato.
- 45 **8.** El compuesto para uso de la reivindicación 7, en donde el oligonucleótido modificado comprende:
- 50 un segmento de separación que consiste en diez desoxinucleósidos unidos;
 un segmento de ala 5' que consta de cinco nucleósidos unidos; y
 un segmento de ala 3' que consta de cinco nucleósidos unidos.
- 9.** El compuesto para uso de la reivindicación 7 o la reivindicación 8, en donde cada nucleósido de cada segmento de ala es un nucleósido modificado en 2' o un nucleósido modificado con azúcar bicíclico.
- 55 **10.** El compuesto para uso de la reivindicación 9, en donde cada nucleósido de cada segmento de ala es un nucleósido 2'-MOE.
- 11.** El compuesto para uso de cualquier reivindicación precedente, en donde el compuesto antisentido está conjugado.
- 60 **12.** El compuesto para uso de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el compuesto se administra conjuntamente con uno o más segundos agentes.
- 13.** El compuesto para uso de la reivindicación 12, en donde el segundo agente:
- 65 (a) es un quelante de hierro, opcionalmente FBS0701 (FerroKin), Exjade, Desferal o Deferiprone; o

- (b) es un agonista de hepcidina; o
- (c) es un segundo compuesto antisentido.

5 **14.** El compuesto para uso de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el ácido nucleico TMPRSS6 tiene la secuencia de nucleobase de cualquiera de SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6 y SEQ ID NO: 7.